634.1
Р 954 р.г.
м142654

Рыпов М В

Папка для бумаг

Русские груши и
иностранные сорта

1916 г.

I. Вступительные заседания.

Новое оружие в садоводстве. Письменное [illegible] и следова-
ние свайеров рода нормальных форм [illegible]
II. Неурасленные и плодовые сорта.

2. 1884 г. Основы помологической системы [illegible] яблок. „Русское
садоводство", 1884 г. №49, стр. 1-2; №51, стр. 2-3.

3. 1885 г. Основы помологической системы [illegible] яблок. „Русское
садоводство". 1885 г. №4, стр. 27-28, №8, стр. 58-60; №11, стр. 81-82;
№16, стр. 117-118; №17, стр. 127-128; №18 стр. 133-135.

4. 1886 г. Нормальные сорта яблок. „Русское садоводство" 1886 г.
№24, стр. 368-376; №25, стр. 385-389; №26, стр. 401-407; №27,
стр. 417-424; №28, стр. 433-435; №29, стр. 449-454; №30, стр.
465-470; №31, стр. 481-486.

5. 1888 г. Что дали помологам [illegible] и какие [illegible] должны быть
„Сельский гость" 1888 г. №41-43, стр. 669-673; №42, стр.
684-686; №43, стр. 699-700.

6. 1890 г. К вопросу помологии. „Плодоводство" 1890. №39, стр.
338-341.

7. 1890 г. Как и для чего знать сорта. „Русское садоводство".
1890 г. №31, стр. 489-493.

8. 1892 г. Наши [illegible] помологи. „Русское садоводство", 1892 г. №30, стр.
465-469.

9. 1900 г. Основы будущей помологии (к вопросу о классификации
яблок, груш, вишен и слив). „Журнал Садовода" 1910 г. №2,
стр. 47-49; №3, стр. 75-78; №4, стр. 105-108; №8, стр. 229-235;
№9, стр. 261-266.

10. 1912 г. Новая помология г. Ковшикова. „Сельский гость", 1912 г.,
№2, стр. 48-51.

11. Типы сортов. „Прогрессивное садоводство и огородничество"
1912 г. №24, стр. 689-692; №25, стр. 721-726.

12. 1913 г. Вопрос об основах новой помологии. „Прогрессивное сад-
водство и огородничество", 1913 г. №15, стр. 457-461.

13. 1888 г. Помологи. „Сад и огород" №1. стр. 3.

14. Новая система яблок доктора Гогга. „Р.С." 1885 г. №34, стр.
264-265.

15. Русские плодовые сортоведение. „Сельский гость", год
XXVI-1911, №2

16. ~~Помология плодовых сортов. „Сельский гость" №41,~~
~~1913 г. 43.~~

I. Общие формулировки задач по черчению. 20
II. Кривые линии продольного разреза и оси рога.
III. Различия в очертании формы задней и передней.
IV. Изменение размеров задач по сравнению с нормальными.
1) Размеры задач зависят от наибольшего поперечного диаметра (высоты) задач и наибольшего диаметра (ширины).
2) Размеры задач зависят от наименьшего поперечного диаметра, который должен проходить через его средину, выше и ниже её.
3) Размеры задач зависят от удаления правой и левой сторон поперечного диаметра, пересекающего главную ось задач.
V. Изменение формы в зависимости от оси рога.
VI. Определение свойств кривой линии контура.
VII. Описание нормальных форм.
1. Формы равномерного рога.
1) Формы с преобладающим диаметром рога.
2) Задачи, ось рога которых выходит из плоскости.
2. Формы неравномерного рога.
1) Формы с одной скрытой осью.
2) Формы с двумя скрытыми осями рога.
3) Формы с косыми осями рога.

1918. 3 [illegible] Ерол
[illegible] 17 [illegible]

4. Нормальные формы яблок. „Р. С." = 1886 г. №№ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31.
8. Помологи. „С. и О." = 1888 г. № 1, стр. 3.
4. Наши яблоки-полевки. „Р. С." = 1892 г. № 30, стр. 365-369
5. Вопрос об основах новой помологии. „Пр. С. и О." = 1913 г. № 15.
Помология на новых началах, пессимизм и оптимизм. Калиневич. Тоже № 18.
6. Типы фруктов. „Пр. С. и О." = 1912 г. № 24, стр. 689-692 и № 25 „ 721-726.
7. Основы будущей помологии (классификация яблок). „Н. Д." = 1910 г. № 2, 47-49, № 3, 75-78 и № 4, 105-108.
8. Новая культура в садоводстве. Анализ и исследование сортов рода нормальных форм груш. 1916 г.
9. Новая помология Коваленко. „С. Х." = 1912 г. № 2, стр. 48-51,
10. ~~Эволюция плодовых сортов.~~ „С. Х." № 41, 42, 43 1911 г.

Таксономические единицы в плодоводстве. Определение сортов. „Труды отдела сортов." 1884. № 9. стр. 325-338.

6. 1910 г. „Основы будущей таможни (к вопросу о пересмотре пошлин, ввозимых в Россию)". „Журнал Министерства", № 8, стр. 229–233; № 9, стр. 261–266.

7. 1885 г. „Новая система таможенных пошлин Голля". „Русская старина", № 34, стр. 264–265.

8. 1911 г. „Русская таможенная терминология". „Сельское хозяйство", № 2, стр. 57–61.

Кроме указанных мною выше статей, помещенных в вышеуказанных журналах, есть еще несколько неуказанных.

Также прошу о высылке рисунков, помещенных в отчете 1886 г. „Нормальные формы ящиков". „Русская старина": № 24, стр. 368–376; № 25, стр. 385–389; № 26, стр. 401–407; № 27, стр. 417–424; № 28, стр. 433–435; № 29, стр. 449–454; № 30, стр. 465–470; № 31, стр. 481–486.

Прошу сообщить о сроке выполнения вышеуказанного.

Канд. техн. наук Сергей Рыбин

4/IV 1959 г.

В Центральную библиотеку им. Ленина

Бюро обслуживания.

Прошу переслать ~~на машине и выслать мне нало-~~
~~жением платежом~~ по адресу: г. Курган областной,
Красноармейская 33 Ветлову Сергею Михайловичу
книги (в одном экземпляре)
~~книги следующих авторов~~ Ветлова отца, Ветлова
Михаила Васильевича (в журналах и газетах):

1. 1884 г. „Основы полицейской службы нравственности". „Русский судебник" № 48 (стлб. 49), стр. 1-2 и № 51, стр. 2-3.
2. 1885 г. „Основы полицейской службы нравственности". „Русский судебник". № 4, стр. 24-28; № 8, стр. 58-60; № 11, стр. 81-82; № 16, стр. 117-118; № 17, стр. 127-128; № 18, стр. 133-135.
3. 1888 г. „Что такое полицейский надзор и кого он должен быть". „Судебный листок" № 41-43, стр. 669-673; № 42, стр. 684-686; № 43, стр. 699-700. „Судебник" № 8-9, стр. 338-341.
4. 1890 г. „К вопросу полицейского надзора".
5. 1890 г. „Как и за чем должен следить суд". „Русский судебник" № 31, стр. 489-493.

Белоконь.


Тимм. сборник стр. 204. „Прав. сб." 1912 г. №№ 24 и 25.
Вопросы об основах новой полиции стр. 213. „Прав. сб." 1915 г. №15.
Н. А. Макаров.
Вопрос об основах новой полиции. „Прав. сб." №15. стр. 228
Тимм сборник стр. 187.
Выбор судов общ. стр. 198.
„Р. Сов." 1892 г. №14-15.
Положение мировых судов стр. 155.
„Журнал Гражд." 1901 г. №24, 25.

Торговая обрѣзка плодовыхъ деревьевъ.

Что это еще за новый терминъ „торговая обрѣзка"? спроситъ читатель, которому надоѣли всякого рода обрѣзки: на ростъ на плодъ, на формовку и пр. Затрудняюсь иначе и назвать, но поясню, что такая обрѣзка изобрѣтена нашими торгующими садовниками и доведена до поразительно малаго приложенія труда. Если вы, читатель, любитель плодоводства и если бы надъ вашими возрастающими деревцами производили такого рода увѣчья, то [illegible] пришли бы въ ужасъ, но въ томъ то и дѣло, что торговая обрѣзка применяется для выведенія деревцовъ, сбываемыхъ всякимъ покупателямъ, часто не имѣющимъ малѣйшаго понятія о правильности выведенія деревцовъ

М. В. РЫТОВ.

РУССКИЕ ГРУШИ И ИНОСТРАННЫЕ, РАЗВОДИМЫЕ В РОССИИ.



634.13

Мой отец, Михаил Васильевич Рытов, работая по плодоводству в течение более сорока лет и посещая сады и выставки, описал, кроме 800 сортов яблок, около 200 сортов груш. Только описания трёх сортов груш были напечатаны при жизни М.В.: 1/ Бессемянка /"Атлас плодов", изд. 1906 г./, 2/ Сапеганка или польский бергамот /"Сад и огород", 1888 г., № 2/и 3/ Александровка /"Плодоводство/, 1900 г., № 1/. Остальные сорта груш М.В. описаны и зарисованы в разрезах карандашом в двух переплетённых томах, хранящихся у меня /около 300 описаний/.

Из вышеозначенных описаний мною выделено 157 сортов и их уклонений и оставлено не включёнными в данный труд 60 сортов. Последние сорта по преимуществу относятся к культивируемым в Польше и имеют краткие описания.

М.В. придавал очень большое значение сортам народной селекции, которые в большинстве в течение долгого времени приспособились к местным условиям и потому являются очень ценными. Кроме того, М.В. ценил иностранные сорта, разводимые в России, имеющие плоды высокого качества, поэтому пригодные для наших садов.

Описанию сортов груш здесь предшествует выдержка, взятая из статьи М.В. "Основы будущей помологии" /журнал "Новая деревня", 1910 г./.

Описания М.В. мною дополнены выдержками из описаний др. ав-

Алагирская, Алагирская черная /на Кавказе/.

Зимний Нелис, Winter Nelis, Nélis d hiver, Bonne de Malines, Colmar Nélis, Colmar Winter Butter Birne.

Образцы плодов получены от Лейениака из Курляндской губ.

(под назв. Зимний Нелис)

Величина плодов маленькая. Форма низкая кубаревидная, к тупой верхушке овальная, к ножке коническая, правильная, только в конической части по бокам слабо вдавленная.

Верхняя ямка немного углубленная, правильная, как бы выточенная, без складок. Листики чашечки звездчатые, открытые. Нижняя ямка в виде небольшого полукольцевого вдавления с мелкими центральными морщинами, сбоку с слабым ребростом. Ножка тонкая, длиной более половины высоты плода.

Кожа толстая, плотная, тусклая, по окраске совсем похожая на Gute grave, светло-зеленая, на большей части с шершавым охряно-серым ржавым налетом, переходящим в конической части в пятна, так что ясно виден зеленый цвет, которого у Gute grave меньше, с мелкими частыми серыми подкожными точками.

Мякоть белая, маслянистая, пряничко-сахаристая, вяжущая, очень сочная.

Семена узкие, тонкие, темно-бурые.

Плоды поспевают в начале [средине] октября.

Хороший столовый сорт, очень похожий на Gute grave, очень желательный для разведения.

Из Кубанской области плоды больше, грушевидной формы, с красивой изумрудно-зеленой окраской, выделяющейся пятнами из под сплошной шершавой серо-бурой ржавой окраски. Мякоть в половине [конце] октября зеле-

шие, звездчатые. Нижняя ямка углубленная, бороздчатая. Кожа без зелени, вся пестрая. Мякоть, как у образцов от Лейениака.

Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 664-666./ пишет, что деревья этого сорта более или менее холодостойкие, но необходимо выбирать возможно более теплое и защищенное место для посадки. Обычно они слабого роста, образуют нередко изогнутый кривой ствол с небольшой, жидкой и некрасивой пирамидальной кроной, с длинными тонкими, отвисающими сучьями, с характерными узкими листьями. Рано начинают плодоносить, затем плодоносят довольно правильно и удовлетворительно. Почва необходима сильная, теплая и несухая. При выращивании на айве нужна двойная прививка. Лучше пользоваться обыкновенными подвоями. Плоды редко и слабо поражаются паршей. Надо не торопиться с сбором урожая, так как при раннем сборе плоды в хранении морщатся и не созревают. Сорт любительский.

Г.А.Рубцов /"Груша", Изд. 2-ое, 1937 г., стр. 196./ считает достоинствами сорта: выносливость дерева и превосходный вкус плодов, а недостатками - общую слабость деревьев.

Л.М.Сергеев /"Сорта плодовых и ягодных культур", изд. 1953, стр. 275-276./ считает отличительными признаками сорта: неправильную поникшую крону, тонкие ветви, узкие листья, темнооранжевые плоды и позднее распускание листьев. Достоинствами сорта: высокие вкусовые качества плодов, а недостатками: сильную подверженность заболеванию паршей, плохую морозоустойчивость и общее плохое развитие деревьев. Сорт рекомендуется

4) Алдагирская /Иллагирская/ желтая.

Образцы плодов получены от Барыкинского Александра Андреевича из Ставропольской губ. Помологическое определение: бера.

Величина плодов средняя. Форма кубаревидная, неправильная, с многоребристой широко-округлой верхушкой, выдающимися округлостями по бокам, у основания низко коническая, с поперечным перехватом.

Верхняя ямка очень широкая, простертая на верхушку, глубокая, с сильно выдающимися узкими бороздами и широкими неровными ребристыми складками, переходящими в неровные ребристые подземы. Чашечка неправильная, с короткими черными открытыми листиками, гладкая. Нижняя ямка малая, углубленная, косая, бороздчатая, неправильная. Ножка короткая.

Кожа толстая, плотная, тусклая, мелкопегреневатая и поэтому неровная на ощупь, совершенно одноцветная, лимонно-желтая, немного зеленоватая. Точки [подкожные] очень мелкие и очень частые, серые. В верхней ямке желтоватая с трещинами ржавчина. Запаха нет.

Мякоть белая, около чашечки потемнее, с белыми просвечивающимися сосудистыми пучками, очень сочная, тающая, нежная, вяжущая, сладкая, но отзывает кочерыжкой и слабо пряная.

Семена большие, широкие, плоские, с острым носиком, темнобурые.

Плоды созревают в половине октября [в конце октября по новому стилю].

Хороший компотный сорт.

5) Алдагирская /Иллагирская/ черная.

Образцы плодов получены от Барыкинского А.А. из Ставропольской губ.

Помологическое определение: бера.

Кожа толстая, плотная, мелко-шагреневатая, неровная, зеленовато-желтая, одноцветная, на солнечном боку более желтоватая. [Подкожные] точки очень частые, резкие, бурые. Верхняя ямка и почти вся верхушка с бурым ржавым покровом, спускающимся пятнами и полосами. Отдельные более бурые пятна на основании и боках. Местами от пятен вдавления. Запаха нет.

Мякоть белая, около чашечки грубая, около гнезд зернистая, с желтыми сосудистыми пучками, очень сочная, тающая, немного вяжущая, сладкая, с малой пряностью.

Семена отличительно большие, длинные, широкие, с кривым длинным носиком, черно-бурые.

Плоды в половине октября [конце октября] начинают созревать и держатся до конца октября [средины ноября].

Сюда следует добавить образец, полученный от Грабовского под названием Алагирки. Величина большая, с продольной бороздой. Верхняя ямка вдавленная. Основание светло-зеленого цвета. Мякоть белая, тающая, кисловато-сладкая, очень сочная, с мармеладной пряностью. Созревает в лежке в конце октября [начале ноября].

Я. Немец в журнале "Плодоводство" за 1892 г., стр. 197-198 пишет, что считать Алагирскую грушу тождественной с Winter Nelis преждевременно. Вероятно на Кавказе довольно иностранных груш, которые теперь уже получили местные названия, но в данном случае, как мне кажется [Немецу], мы имеем дело с сортом туземным, а не привозным.

После Зимний Нелис

4

Серая хорошая, Gute graue. - - -

Образцы плодов от Гартневича

Величина плодов малая. Форма правильная, к чашечке овальная, к ножке коническая, с тупым основанием и несколько тупой верхушкой, по бокам немного приплюснутая, с слабыми неровностями на поверхности.

Верхняя ямка мелкая, неправильная, без складок. Листики чашечки широкие, открытые. Нижняя ямка мало вдавленная, с мелкими выростами. Ножка тонкая, длиной равная половине высоты плода.

Кожа крепкая, толстая, светло-зеленая или зеленовато-желтая, вся покрытая сплошным охряно-серым ржавым налетом, от которого очень пестрая, с мелкими частыми вдавленными подкожными точками, на солнечной стороне более желтоватая.

Мякоть белая, очень сочная, маслянистая, каменистая около чашечки, сладкая, с небольшой пряностью, вяжущая.

Семена большие, тонкие, темно-бурые.

Плоды созревают в лежке в начале [средине] октября и хорошо держатся в хранении.

Хороший десертный сорт, но вяжущая мякоть много уменьшает достоинство плодов. Близок к Зимнему Нелису /Алагирской черной/.

Александр Ламбре;
Alexandre Lambre.

Образцы от Бохвица из Минской губ. Помологическое определение: бера.

Величина плодов менее средней. Форма неправильная овально-коническая, немного сплюснутая с боков, с некоторыми выдающимися округлостями, хотя и сглаженными на верхушке, с почти прямой ножкой, но часто и боковой, [т.е. отходящей несколько сбоку,] сопровождаемой на конической части поперечными слабыми складками. Верхняя ямка малая, мало углубленная, по краям неровная, без складок. Листики чашечки маленькие, открытые. Ямка при ножке вдавленная, с небольшими мясистыми выростами. Ножка толстая, равная половине высоты плода.

Кожа гладкая, тусклая, светло-желтоватая, на солнечной стороне с легкими красноватыми полосами с несколькими буроватыми ржавыми пятнами и налетом при ямках чашечки и ножки. Подкожные точки мелкие, не резкие или мало заметные.

Мякоть белая, немного желтоватая, связная, очень сочная, хотя и теряющая вкус в начале [средине] октября, тающая, нежная, сладкая, вяжущая, несравненно лучше Беры слуцкой, маслянистая.

Осенний сорт. Плоды поспевают в лежке в начале [средине] октября.

Образцы плодов, полученные от Варшавского помологического сада были большой величины, правильной формы, с одноцветной кожей, с ясными мелкими подкожными точками. Мякоть в конце октября [начале ноября] уже очень мягкая, около гнезд зернистая, кнаружи слизеватая, но сладкая и не вяжущая.

тая, на солнечной стороне без особенной желтизны, местами с зеленными пятнами. Подкожные точки частые, серо-бурые, придающие шероховатость, [illegible] как у сетчатого. В верхней ямке бурый тонкий ржавый покров, лучисто спускающийся на бока, где бывают такие же пятна. Семена кривые, продолговатые, острые, черно-бурые. Мякоть белая, каменистая около чашечки и зернистая около гнезд, нежная, тающая, сладкая, с бергамотной пряностью. В конце сентября [начале октября] уже начинает мучнеть.

Образцы, полученные от Л.П.Симиренко /Городище, Киевской губ./ были неравнобокие, вверху более правильные, округлые, книзу конические. Верхняя ямка немного углубленная, с ровными складками. Чашечка открытая, с короткими листиками. Ножка тонкая, равная половине высоты плода, загнутая крюком.

Кожа зеленовато-белая или немного желтоватая, тусклая, одноцветная, с частыми ржавыми подкожными точками и такими же пятнами.

Мякоть белая, зернистая, вяжущая и немного слизеватая, сладкая, нежная.

Александровка. /Журнал "Плодоводство", 1900 г., № 1, стр. 3-6./

М.В.Рытов.

Сколько раз было уже писано о том, что мы не знаем наших собственных сортов плодовых деревьев, не думаем серьезно приняться за их исследование, соединенное с открытием многих ценных и редкостных сортов, благодаря чему у нас даже в печати заявлялось, что ничего хорошего по этой части мы не имеем, а потому должны приняться за производство искусственных гибридов, в которых плохие качества наших сортов сочетались бы с превосходными достоинствами заграничных. Оказывается, что в то время, когда сулятся эти облагороженные журавли, а в руки не даются даже синицы, в наших провинциальных захолустьях втихомолку кушают отличные груши вполне акклиматизировавшихся деревьев, - груши, нисколько не уступающие заграничным сортам и даже превосходящие их своей выносливостью. Как там не говорят, а все-таки облагороженный журавль остается на долгое время сулимым журавлем для тех наших местностей, где вместо сладких груш с оппетитом кушают что-то вроде шестинедельного картофеля, даже прозвав такие груши у себя "картофлянками". Я говорю о Белоруссии, где большею частью распространены недостойные культуры по местным условиям сорта груш, проникшие из остзейских питомников, откуда вместе с превосходными сортами распространяется всякое ничтожество. Да не подумает читатель, что примеры отыскания захолустных редкостей весьма ограничены и что из наших провинций нельзя извлечь ничего дельного для всего нашего плодоводства: уже из одной Похвицы /Полтавской губ./ я вывез три отличных, совсем неизвест

плодоводства О.П.Навроцкая, выделившая для такой выставки вполне достойный культуры сорт. Представленные образчики были, однако, по моему мнению, недостигшими своей надлежащей величины, которую у них можно скорее назвать малой, тогда как она должна быть средней, во всяком случае больше груши Магдалинки. Всякий помолог отнес бы эти образцики к классу бер, притом настоящих, а не полубер, - тех бер, которых не хватает в Белоруссии, как и в средних губерниях. Форма образциков продолговато-грушевидная, к верхушке яйцевидная или овальная, иногда округлая, к ножке прямо или косо продолженная в острый конус. Верхушка ровная, без ребер и борозд, с мелкой ямкой, без складочек. Чашечка открытая, с короткими и широкими листиками. При ножке мелкая полулунная ямка, окруженная кольцевыми выростами мякоти. Ножка дуговидная, тонкая, длинная, более половины высоты плода. Кожа неровная, бугристая, блестящая, гладкая, светло-зеленая, к солнечной стороне, желтоватая и на ней желтовато-красноватая, повсюду с частыми, резко выделяющимися, ржавыми точками серого цвета, местами с небольшими, ржавыми, серо-бурыми пятнами, а на верхней ямке с тонким, такого же цвета, ржавым, жестким налетом. Мякоть белая, связная в гездах мелко крупитчатая, около чашечки с каменистой грануляцией, нежная, тающая, сахаристая, с незначительной пряностью или без нее, семена кривые, толстые, светлобурые. Время пригодности плодов полтавского урожая - вторая половина сентября [начало октября]; в начале [половине] октября выставочные образцы уже испортились.

Об этом сорте О.П.Навроцкая сообщила мне следующие любопытные сведе-

разно погоде бывшего лета и времени своего сбора; в жаркое и сухое лето они быстро зреют, делаются мягкими и к лежке непригодны; в обыкновенные годы их собирают до зрелости, и тогда они могут лежать в погребе, разложенными на полках, до января, изредка удается сохранить их даже до [половины] февраля. Употребляют их в сыром виде, как десертную грушу, но и в других видах они имеют широкое применение в хозяйстве; из них варят варенье и смокву, хороши они также в солке и в сухом виде, годны и для наливки. Рыночная цена их разная... Деревья раскошно растут на суглинисто-черноземной почве, как в долине, так и на горе, отличаясь здоровьем и быстрым ростом, а также полной выносливостью, так как прекрасно переносят суровые зимы с морозами в 25 - 26° Р. Плодоношение начинается рано: деревья шести лет дают уже плоды; урожайность постоянная и обильная, но после засух плоды бывают мелкие /очевидно, в этом случае требуется поливка деревьев/.

Какая выгода разводить этот сорт в Полтавской губернии, где легко удаются превосходные торговые промышленные сорта груш? - этот вопрос я предоставляю решению местных плодоводов, хотя, замечу, Веру Жифар рекомендует Л.И.Симиренко в своем каталоге так: "едва ли этот сорт не есть самый лучший из числа ранних летних груш; дерево слаборослое и умеренно урожайное". Не буду также вдаваться в тонкости помологического различия Александровки и Веры Жифар; как сорт акклиматизированный и народный, получивший свое особое название, Александровка отличается от Веры Жифар весьма мало и от ее приспособления к русскому климату и почве не прои-

одно из них зацвело даже на 4-м году. Выносят они зимы превосходно на нашей суглинисто-подзольной, хотя и удобренной, почве имеют тур тый и слабый рост, сравнительно с Бессемянкой и Бере слуцкой. Таух ворит, что Бере Жифар требует легкой, питательной, влажной почвы и суглинке не так хорошо удается; по-видимому, тоже самое сохранила бой и Александровка. Однако, по сравнению с Бере лифляндской, Алек ровка растет у нас много сильнее и гораздо выносливее ее. Полагаю, в нашем крае, не страдающем недостатком влаги, эта груша может хор расти на подзолистых супесях, если они будут глубоко вскопаны и хо удобрены компостом и если на должной глубине имеется проницаемый д ды слой почвы. Деревца в питомнике характерно отличаются своей кра то-бурой корой, которая с возрастом ветвей переходит в серо-бурую. стья овальные, с короткой, острой верхушкой, цельнокрайние, без зу ков, по краям и снизу вскоре после распускания с тонким пушком, ко потом пропадает, сначала светло-зеленые, потом все-таки более свет чем у других наших груш.

+/ В виду всего этого, невольно является вопрос, можно-ли счита Александровку особым русским сортом. Ред [акция журнала Плодоводст

В том же журнале и за тот же год на стр. 274-276 М.Вороной гово что Александровка в Полтавской губ. также называется Шумкой. Ее пл находятся в большой зависимости от состава и влажности почвы. Они влажных сильных суглинках гораздо крупнее, чем на более бедных поч больше
Величина плодов и их вкус лучше при средних урожаях, чем при обил

Александровка.

Плоды получены от Наврoцкой из Полтавской губ.

Помологическое определение: (полу)бера.

Величина средняя. Форма овальная или округлая, при верхушке постепенно продолженная в острый конус с прямой или несколько боковой ножкой. Верхушка почти правильная, без ребер и борозд. Верхняя ямка мелкая, безскладок. Листики короткие, широкие, открытые. Нижняя ямка мелкая, с мелкими бугристыми выростами. Ножка очень тонкая, более половины высоты плода.

Кожа неровная, бугристая, блестящая, толстая, крепкая, гладкая, светло-зеленая, на солнечной стороне с желтовато-красным (оват) румянцем, с частыми резкими серыми точками и небольшими ржавыми серо-бурыми пятнами. На верхушке тонкий такой же налет, при чашечке жесткий.

Мякоть белая, тающая, сахаристая, крупитчатая, без приятности, но каменистая около чашечки.

Семена кривые, толстые, светло-бурые.

Плоды созревают в сентябре, но в начале октября [средине октября] портятся.

Хороший столовый сорт, похожий на Беру Жифар, описанную в помологии Лаухе, Deutsche Pomologie, 57. Перспективный для разведения в более северных местностях.

В Горках, Могилевской губ. (в училищном фруктовом и, в моем саду деревья пирамидальные, густо ветвистые, красивые, с плодами средней и даже большой величины, созревающими в половине [конце] октября и к концу октября [началу ноября] делаю(и рыхлой)

Астраханская ранняя /Губернаторская/.

Образцы плодов от Астраханской школы садоводства и огородничества.

Величина плодов средняя и меньше. Форма кубаревидная, вверху коническая с тупой верхушкой и слабыми неровными округлыми ребрами, к основанию правильная, остро-коническая, без нижней ямки. Верхняя ямка малая, узкая, мелкая, по краям неровная, без складок. Листики чашечки короткие, бурые, звездчатые, открытые. Вместо нижней ямки кольцевая слабая впадина с малыми бугорками, продолжающимися на основание ножки в морщинистые мясистые наросты. Ножка длинная, дуговидная.

Кожа гладкая, лоснящаяся, нежная, тонкая, жирная светло-зеленая или зеленовато- белая, при созревании несколько желтоватая, на солнечной стороне с тонким мутным сероватым красноватым очень слабым румянцем. Подкожные точки мелкие, частые, темно-зеленые и серые. Запаха нет.

Мякоть белая, мягкая, полутающая, сочная, нежная, мало сладкая, почти пресная, около гнезд и у чашечки каменистая.

Сорт кухонный. Плоды зреют в половине [конце] сентября.

Образцы плодов, доставленные из Астрахани в Саратов, определены М.В. помологически: жирные.

Величина этих плодов средняя. Форма двояко-коническая, неправильная: кверху усеченная с расширенной верхушкой, где сильные бугры от ребер, к ножке также усеченная конически, с ямкой у ножки и с поперечным перехватом. Верхняя ямка углубленная, бороздчатая, с широкими ребрами, обращенными в поднятые бугры. Чашечка сильно открытая. Нижняя ямка с кольцевыми вали-

пряности, десертная второго разряда, но вкусная, более пригодная для компота.

В начале [средине] августа плоды еще зеленне. Созревают в половине [конце] августа. По созревании могут держаться еще с неделю.

В.К.Заец /"Сорта плодовых и ягодных культур", изд. 1953 г., стр. 276/ считает, что родиной этого сорта является, по-видимому, Астраханская область, где он издавна культивируется и занимает 11,6 % общей площади грушевых насаждений. Он является основным стандартным сортом Астраханской области и рекомендуется для испытания в Сталинградской области.

+/ Со времени написания данной статьи прошло около полувека. За это время помология достигла больших успехов.

Современных помологов уже не удовлетворяет определение сортов лишь по различиям плодов. В определение сорта включаются описание самого дерева: габитуса, побегов, листьев и прочих внешних признаков, а также биологические особенности: морозостойкость, долговечность, время цветения, созревания плодов; потребительская и товарная ценность плодов того или иного сорта. Помология становится наукой, основанной на ботанических данных, о которой мечтал и за которую боролся в свое время М.В.Рытов.

Но все же следует отметить, что единого, унифицированного метода помологических описаний до сих пор еще не выработано. В очень ценных трудах, вышедших в последнее время по вопросам плодового сортоведения, все-таки каждый автор описывает сорта по собственно им выработанному плану.

Нам кажется, что пора приступить к составлению общей и единой схемы помологических описаний, к классификации сортов, как это имеет место в ботанике. - С.М.Рытов.

+/ Со времени написания данной статьи прошло около полувека. За это время помология достигла больших успехов.

Современных помологов уже не удовлетворяет определение сортов лишь по различиям плодов. В определение сорта включаются описание самого дерева: габитуса, побегов, листьев и прочих внешних признаков, а также биологические особенности: морозостойкость, долговечность, время цветения, созревания плодов; потребительская и товарная ценность плодов того или иного сорта. Помология становится наукой, основанной на ботанических данных, о которой мечтал и за которую боролся в свое время М.В.Рытов.

Но все же следует отметить, что единого, унифицированного метода помологических описаний еще не выработано. В очень ценных трудах, вышедших в последнее время по вопросам плодового сортоведения, каждый автор описывает сорта по собственно им выработанному плану.

Нам кажется, что пора приступить к составлению общей и единой схемы помологических описаний, к классификации сортов, как это имеет место в ботанике. - С.М.Рытов.

Астраханская ренетовая.

Образцы плодов из Астрахани. Помологическое определение: бера.

Величина плодов небольшая.

Форма плодов неправильная, двояко-коническая, кверху усеченно-коническая с усеченной плоской верхушкой, книзу остро-коническая, неравнобокая, с мелкобугристыми ребрами, впадинами и продольными бороздами, иногда остро-вдавленными, которые проходят от верхушки к ножке.

Верхняя ямка плоская, мелкая, с сильными неправильными ребрами. Чашечка открытая, с черными листиками. Ножка в половину высоты плода, кривая, отогнутая вбок выростом мякоти.

Кожа гладкая, блестящая, несколько жирная, совершенно одноцветная, без всякой красноты, беловато-зеленоватая, с мелкими и частыми ржавыми точками, немногими ржавыми сероватыми пятнами и ржавыми полосами, при созревании светло-желтая.

Мякоть белая, нежная, без зернистой грануляции около чашечки, очень сочная, чисто сладкая, без пряности, таящая.

Созревает в конце июля и начале августа [начале и средине августа]. Плоды привозятся в Саратов из Астрахани.

Летний сорт.

Баба.

Образцы плодов от Тропаного из Полтавской губ. Помологическое определение: бергамот.

Величина плодов средняя, форма с 2/3 высоты к ножке усеченно-коническая и на верхушке около ямки с бугристыми выступами ребристых складок; к ножке низко-коническая.

Верхняя ямка неправильная, глубокая, с неровным расширением, к краям ребристая. Чашечка сомкнутая, из беловатых длинных листиков. Нижняя ямка вдавленная, кольцевая. Ножка равна или почти равна высоте плода, кривая, у основания с малыми мясистыми выростами.

Кожа тонкая, зеленовато-желтая, одноцветная, с многими частыми темно-серыми ржавыми точками.

Мякоть белая, мягкая, в конце сентября [начале октября] становящаяся перезрелой мучнистой, сладкая.

Бабкой называется самое старое дерево в старом помологическом саду учхоза Уманского с.х. института, могучего развития, со штамбом до 0,5 м в диаметре. Его плоды бергамотной формы, плоско-округлые к чашечке и широко-конические к ножке, которая довольно тонкая, искривленная, длиной равняется высоте плода. Окраска кожи в зрелости лимонно-желтая, с небольшой прозеленью. Мякоть суховатая, малосочная, грубая. Созревание в конце июля [первой половине августа]. Использование плодов очень кратковременное, так как они очень быстро перезревают, делаются сильно водянистыми, а оставшиеся на дереве, упадая на землю разбиваются в лепешку. Плоды следует

Федора или Баба.

Образцы плодов от Рушновых, вблизи Лохвицы, Полтавской губ.

Величина плодов средняя. Форма грушевидная, неравнобокая, в верхней округлой части местами с слабыми выпуклостями, далее коническая. Верхняя ямка мелкая, неправильная, с сильными ребристыми выступами и бугорками между ними. Ножка длинная, более половины высоты плода, толстая; у основания ее небольшая впадина. Чашечка сомкнутая.

Кожа блестящая, светлозеленая, с зелеными точками и ржавыми пятнами, без румянца.

Мякоть белая, с большими каменистыми частицами, довольно сочная и сладкая.

Семена большие длинные.

Осенний сорт. Плоды пригодны для сушки и кухни.

БИБЛИОТЕКА БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ
Отд.
Шифр
Инв. №

Белолистка. Получила название от сильной опушенности молодых побегов и листьев. Распространена в Поволжье.
Образец из Мариинской Саратовской земледельческого училища.

Величина небольшая или менее средней.

Форма овальная, переходящая в коническую, поверхность почти ровная, с маленькими ямками от черных точек, с небольшими бороздками и ребрами около чашечки.

Верхняя ямка не глубокая, с ребристыми складками и серыми мелкими согнутыми листиками чашечки. У нижней ямки небольшая поперечная складка. Ножка прямая, длиной в половину высоты плода.

Кожа сухая, толстая, плотная, блестящая, светло-зеленая, в зрелости светло-желтоватая, мутная, на большей части с мутным разлитым розовым румянцем, с частыми черно-серыми мелкими ржавыми точками.

Мякоть белая, очень сочная, ~~очень~~ весьма плотная, кисловатая.

Плоды используются на компот.

Ранний
Осенний сорт. Плоды плохо хранятся, та как скоро загнивают внутри. Необходим хороший подвал.

Деревья этого сорта довольно часто встречаются в саратовских садах. Они не отличаются плодородием, дорастают до средней (и даже большой) высоты и развития. Образуют шаровидную крону с свисающими ветвями. Листья сверху светло-зеленые, а снизу с густыми серовато-белыми волосками и на солнце кажутся серебристыми. Типичный ксерофитный сорт. Плоды пригодны лишь для кухни и хозяйственных заготовок.

В.К.Заец /"Сорта плодовых и ягодных культур", изд. 1953 г., стр. 277/ считает достоинствами сорта: высокую зимостойкость и засухоустойчивость, обильную урожайность и нетребовательность к условиям произрастания, а не-

V.

Beurre d'Aremont, 220

Бёре Боск, Бёре Александр, Beurre Bosk, Bosc's Flaschenbirn
Kaiser Alexander, Kaiser Krone.

Образцы плодов получены из сада учхоза Херсонского с.х. института.

Величина плодов средняя или больше средней. Форма плоско-округлая п
открытой
верхней ямке, которая малоуглубленная, с чашечкой средней величины и ч
от средней высоты
нными листиками; к ножке узко-коническая, нижней ямки нет. Ножка корот-
кая, искривленная, средней толщины. Весь плод часто бывает кособоким.
тонкая,
Кожа основного цвета зеленовато-желтого, но в значительной части и
золотистая,
особенно в верхушке сильная светло-коричневая ржавчина.

Мякоть желтовато-беловатая, тающая, сладкая, сочная, высокого десер
ного качества, без грануляций.

Семенные гнезда небольшие. Семена крупные.

Плоды снимаются в конце сентября и в начале октября и могут сохраня
ся 3-4 недели. Они используются по преимуществу свежими, но также на
сушку, компоты и другие виды переработки. / В.И.Шабловский /"Пров1дн1
сорти плодових культур УРСР", изд. 1937 г. пишет, что
Деревья в молодом возрасте сильнорослые, но достигают только средни
размеров. Имеют высокую пирамидальную, довольно редкую крону. Долговеч
ность средняя. Непритязательны на почву и в условиях юга, где этот сор
разводится, полезно садить деревья в защищенные места, так как они мало
холодостойки. Плоды хорошо держатся на ветках и не сбиваются ветром.

Старый французский сорт, заслуживающий широкого распространения как
один из самых ценных десертных и технических сортов.

Д.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г.,
осенняя
стр. 514-520./пишет, что это самая популярная в Крыму груша, так де-

плоды. Рост в молодости деревьев сильный. На айве они не идут. В молодом возрасте чувствительны к морозу, к почве не требовательны. Плодоношение раннее, урожайность умеренная. Плоды довольно крепко держатся на дереве, не повреждаются паршей, созревают неодновременно, хорошо переносят транспорт. На айве и для получения прямого ствола на дичке прививается на промежуточном сорте. Требует длинной обрезки. Нуждается в большом количестве влаги.

Это лучший осенний доходный промышленный современный сорт. Характерная форма, довольно крупная величина и золотистая окраска плодов завоевали большую популярность сорту. ~~Самый доходный промышленный сорт.~~ Его достоинства: красота и высший десертный вкус плодов, а недостаток - нежность дерева.

Г.А.Каблучко /"Сорта плодовых культур Молдавии", изд. 1953 г., стр. 273-276./ говорит о данном сорте, называя его "Бутылочной", что он довольно распространен в Молдавии, на юге Украины, в Крыму и в других южных местностях СССР.

Beurré Alexandre Lucas,

Бёрр Александр Лукас, Alexander Lucas Butter Birne.

Образцы плодов от Павильчуса из Сувалок.

Величина плодов большая. Форма очень правильная, грушевидная, вверху овальная, в нижней половине усеченно-коническая, с тупым основанием, ровная, с боков немного приплюснутая, без ребер, только на верхушке узкие ребристые следы.

Верхняя ямка малая, мелкая, с широкими слабыми ребристыми складками. Листики чашечки слегка опушенные, раздельные, открытые. Ямка при ножке вдавленная, углубленная, с небольшим боковым выростом. Ножка толстая, равная четверти высоты плода.

Кожа тусклая, гладкая, местами от подкожных точек слегка шершавая, одноцветная, светло-желтая, с легкой краснотой при точках на солнечной стороне, ржавые точки частые, неправильные расположены на верхушке и при ножке тонкий бурый ржавый налет, спускающийся от ножки пятнами.

Мякоть белая, немного желтоватая, тающая, каменистая при чашечке, очень сочная, сладкая, без пряности и без вяжущего вкуса.

Плоды держатся до половины и конца октября [до конца октября и половины Ноября].

Превосходный десертный сорт.

Образчик, полученный от Варшавского помологического сада, крепкий в начале [средине] ноября и показывает [характеризует] себя как ноябрьскую грушу. Форма кубаревидная, округло-коническая, с узким косым основанием, очень правильная. Лучистая ржавчина только при ножке. Остальное также, как вышеопи-

но не бугристая, более ровная и у полузрелых плодов светло-желтая с зелеными пятнами, как у дюшесса, тусклая, мелко-шагреневатая, с небольшой неясной разлитой желтоватой красноватостью. Подкожные точки серые, частые, резкие. Есть пятна. 27 сентября [10 октября] начинает созревать. Ножка толстая, короткая. Нижняя ямка углубленная, бороздчатая.

Мякоть желтоватая, около чашечки каменистая, около гнезда и к ножке зернистая оранжевая, в остальных местах маслянистая, нежная, тающая, очень сочная, винно-сладковатая, несколько вяжущая, с слабой грушевой пряностью.

При созревании зеленые пятна исчезают и плоды делаются светло-желтыми, пропадает вязкость на вкус.

Груша октябрьского [и ноябрьского] созревания.

Семена длинные, острые, черно-бурые, часто не вырастают, без зародышей.

Бези де Сэнт-Аджиль, Besi de Saint Agil, синоним Beurré Alexandre Lucas.

Образцы от Л.П.Симиренко /Городище, Киевской губ./.

Величина плодов средняя и более. Форма кубаревидная, т.е. широкая с низким конусом к ножке, с едва заметными у верхушки бороздами, местами на поверхности бугровидная неровность. Верхняя ямка глубокая, с ребристыми складками. Чашечка сероватая, закрытая. Нижняя ямка мелкая. Ножка толстая, короткая, загнутая.

Кожа немного блестящая, тонкая, светло-желтая или лимонно-желтая, одноцветная, на солнечной стороне с слабым розовым румянцем, с частыми

правильнее считать названием сорта по праву приоритета Берэ Александр Люкас, как данное ранее других.

Деревья здоровые и сильного роста, образуют негустую пирамидальную крону, с сочной крупной зеленой листвой, рано вступают в плодоношение, правильно и обильно плодоносят.

Это несомненно ценный промышленный сорт, плоды которого прочно держатся на ветках, никогда не поражаются паршей.

V

Beurré Baltet père. Бёрр Балтэ отец.

Образцы плодов получены от Кончевского.

Помологическое определение: бера.

Величина плодов более средней. Форма кубаревидная, неправильная по бокам от больших округлостей, которых иногда не бывает, на большей части шаровидная, к верхней тупая, к ножке низко-коническая с поперечными складками.

Верхняя ямка углубленная, неправильная, бороздчатая, с мелкими складками. Листики чашечки короткие, открытые. Конус при ножке слабо вдавлен, с бугровидным слабым выростом, почти прямой. Ножка прямая, толстая, короткая, длиной менее 1/4 высоты плода.

Кожа на румянце гладкая и блестящая, на теневой стороне слегка шершавая, травяно-зеленая с мелкими частыми серыми подкожными точками. Румянец мутно-красноватый с неясными подкожными точками. При созревании кожа несколько бледнеет и желтеет. Ржавые серо-бурые пятна только от повреждений.

Мякоть белая, сочная, сладковатая, вяжущая, но тающая и вкусная, с небольшой каменистостью около гнезд.

Семенные гнезда малые. Семена, несмотря на зеленую характерную кожу, зрелые, большие, широкие, чернобурые.

Осенний сорт. Плоды готовятся [созревают] в начале [средине] октября и, несмотря на зеленый цвет кожи, отличного десертного качества, равного Бере Наполеона.

Beurre Bachelier.-

Образцы плодов от Лейениака из Митавского у., Курляндской губ. Помологическое определение: бера.

Величина плодов средняя. Форма кубаревидная, шаровидная, широко-овальная, почти плоская и тупая к верхушке и низко-коническая к ножке, довольно правильная, с слабыми сглаженными ребрами на широкой верхушке.

Верхняя ямка широкая, углубленная, простирающаяся на верхушку, сглаженно бороздчатая. Листики чашечки короткие, полуоткрытые. Сумка при ножке вдавленная кольцом или заполненная мясистыми неправильными выростами и поперечно-мясистыми складками. Ножка толстая, равная половине высоты плода.

Кожа гладкая, блестящая, одноцветная, лимонно-желтая, на солнечной стороне иногда немного оранжевая, с очень мелкими частыми серыми подкожными точками. Тонкая буроватая лучистая ржавчина распространена в ямке чашечки или переходит на верхушку.

Мякоть белая, тающая, маслянистая, каменистая около чашечки, кисло-сладковатая и вяжущая.

Семена длинные, тонкие, темно-бурые.

Хороший осенний десертный сорт, во всяком случае лучше Беры слуцкой. Плоды созревают в лежке и хорошо держатся в начале [средине] октября.

Образцы плодов от Л.П.Симиренко /Городище, Киевской губ./.

Величина плодов больше средней и большая. Форма соединяет плоско-шаровидную у верхушки с конической у ножки, с неровной поверхностью и ямками, с бороздами около очень широкой верхней ямки. Нижняя ямка косая, не глубокая, с мясистым выростом.

Кожа бело-желтоватая, толстая, плотная, жирная, одноцветная, с мелкими серыми подкожными точками.

Мякоть очень нежная, сочная, пряная, мягкая как сливочное масло. Дозревает в ноябре [декабре].

Превосходный сорт для продажи в конце декабря [в начале января], так как 26 декабря в первой декаде января плоды бывают отличного вкуса.

Бёрэ ванильная, Beurré vanille

Образцы плодов от Л.П.Симиренко /Городище, Киевской губ./.

Величина плодов малая. Форма неправильно округлая, с тупой верхушкой, конической низкой к основанию, по бокам с выдающимися выступами.

Верхняя ямка мелкая, немного углубленная, с неровными краями, с слабыми ребристыми складками. Чашечка малая, черная, закрытая. Нижней ямки нет. Основание с неправильными выростами кольцевых складок. Ножка короткая, толстая.

Кожа толстая, плотная, тусклая, не жирная, в зрелости светло-желтая, с небольшой желтой розоватостью на солнечной стороне. Подкожные точки мелкие, бурые. Запаха нет. Часто ржавые сетчатые пятна.

Мякоть желтоватая, в половине [конце] октября плотная, полузрелая, мало-сочная, вязкая сладковатая, травянистая, с особенной пряностью вроде ванили. Затем становится более мягкой и сладкой.

Семена продолговатые, острые, бурые.

Осенний сорт. Плоды требуют хорошего хранилища, так как иначе в половине [конце] октября морщатся.

Бера Гарди, Beurré Hardy, Gellertsbutterbirne, Beurré Gellert.

Образцы плодов от Янковского /Варшава/, X X ! † ; IX - X.

Величина плодов большая. Форма длинная, грушевидная, округлая, длинно-коническая, с широким косым основанием, без ребер и их следов, но часто неправильная от боковой ржавчины.

Верхняя ямка малая, углубленная, с сглаженными мало-ребристыми складками, с слабо неровными краями. Листики чашечки черные, пригнутые, полуоткрытые. Нижней ямки почти нет или она в виде слабого плоского углубления, против которого плоский широкий вырост. Ножка серая, очень толстая.

Кожа тонкая, очень нежная, желто-картофельного цвета или лимонно-желтая, совсем одноцветная. Подкожные точки очень мелкие, буроватые, слабо заметные. На верхушке и по бокам тонкий желто-бурый ржавый налет, придающий коже слабую шероховатость. Запаха нет. Сбоку одно большое ржавое пятно и в этом месте мякоть уродливо вдавлена; тоже на нескольких образцах.

Мякоть белая, нежная, очень сочная, тающая, около чашечки и гнезд, слегка каменистая, даже зернистая, винно-кисловатая, с небольшой приятностью и несколько приторным вкусом.

Семена длинные, черные.

старый французский
Ранне-осенний сорт. Плоды совершенно зрелые 17 сентября [в конце сентября]. Б.И.Шабловский/"Провідні сорти плодових культур УРСР" изд. 1937 г./ пишет, что

Деревья дорастают до большой величины, сильнорослые, с высокой негустой пирамидальной или метельчатой кроной, отличаются здоровьем и средней долговечностью. Они невысокой холодостойкости, любят теплое и защищенное местоположение и влажную питательную почву. Плодоношение наступает чаще на 8-9 году, урожайность умеренная.

Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 521-523./ пишет, что деревья этого сорта плохо разветвляются, но отличаются здоровьем, довольно порядочной холодостойкостью, красивым, очень сильным и быстрым ростом, образуют прямой, стройный ствол с высо-

См. на обороте:

кой, но не густой пирамидальной кроной, с темными крупными листьями. Деревья долговечные, невзыскательные на почву, но не любят недостаток влаги в почве; плодоносят правильно, но не очень щедро и нуждаются в защищенном от ветров местоположении. В Киевской губ. деревья безусловно выносливы и никогда не страдают от холода в саду, но в питомнике они менее выносливы. Хорошо удаются на айве.

Отличный во всех отношениях сорт.

Г.Штапельберг /г. Одесса/ пишет в "Атласе плодов", изд. 1906 г., стр. 539-541./, что плоды этого сорта созревают в половине [конце] сентября и сохраняются околомесяца. Это превосходный десертный сорт. Деревья растут сильно, образуют ветвистую пирамидальную крону, выносливы, невзыскательны на почву, хорошо растут на айве, особенно на несколько влажной почве. Вследствие сильного роста, в молодости малоплодны, но с возрастом родят обильно.

Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 176-177./ считает достоинствами сорта: силу роста побегов деревьев и десертный вкус плодов и недостатками - неспособность плодов к хранению.

Бёрэ Гарди, Велике Наиду, Gellerts butterbirne.

Образцы от Янковского из Варшавы, X X ! † ; IX-X.

Величина плодов большая. Форма длинная, грушевидная, округлая, косая длинно-коническая с широким косым основанием, без ребер и их следов, часто неправильная от боковой ржавчины.

Верхняя ямка малая, углубленная, с сглаженными мелкими ребристыми складками, с слабо неровными краями. Листики чашечки черные, приплюснутые, полуоткрытые. Нижней ямки почти нет или она в виде слабого плоского углубления, против которого плоский широкий вырост. Ножка короткая, очень толстая, серая.

Кожа тонкая, очень нежная, тусклая, лимонно-желтого или картофельно-желтого цвета, совсем одноцветная. Подкожные точки очень мелкие, буроватые, слабо заметные. На верхушке и по бокам тонкий желто-бурый ржавый налет, придающий коже слабую шероховатость. Запаха нет. Сбоку одно большое ржавое жесткое пятно и в этом месте уродливое вдавление; тоже повторяется на нескольких образцах.

Мякоть белая, нежная, очень сочная, тающая, около чашечки и гнезд слегка каменистая, далее зернистая, винно-кисловатая, с небольшой приятностью, нежного приятного вкуса.

Семена длинные, черные.

Плоды созревают в половине [конце] сентября. В конце сентября [в половине октября] они совсем зрелые.

Кожа жирная, лоснящаяся, немного шершавая от точек, светло-зеленая, при созревании зеленовато-желтая, местами светло-желтая, мелкозагреневатая. Подкожные точки очень частые, мелкие, серые, резкие. Ржавых пятен нет. Запаха нет. Совсем без пятен парши.

Мякоть белая, каменистая около чашечки, зернистая около гнезд, с просвечивающимися сосудистыми пучками, нежная, тающая, винно-сладкая, с ягодным привкусом, не вяжущая, очень сочная.

Гнезда большие, имеется осевая пустота. Семена толстые, с одной стороны плоские, с длинным острым носиком, светло-бурые, на концах черные.

Плоды совсем зрелые 30 сентября [в половине октября].

3. Образцы от Л.П.Симиренко /Городище, Киевской губ./.

Величина плодов большая. Форма продолговатая, вверху шаровидная и неправильная, ребристо-бугристая, к ножке тонко-косая, с перехватом выше средины. Верхняя ямка глубокая, с буграми, переходящими на края и местами обращающимися в острые ребра. Ножка короткая, в косой ямке у основания мясистый вырост.

Кожа блестящая, тонкая, зеленовато-белая. Подкожные точки мало заметные серо-ржавые, местами переходящие в бурые пятна.

Мякоть белая, сочная, сладкая.

Плоды созревают в конце сентября [начале октября] и перезревают, становясь внутри бурыми в половине [конце] октября.

4. Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 524-525./ пишет, что деревья средней силы, развиваются медленно и отличаются долговечностью. Например в Литве вырастают очень мощными деревьями. Крона широкая пирамидальная, негустая. Деревья требуют открытое место, с сильной, глубокой, глинистой и суроватой почвой; отличаются достаточной холодостойкостью, не любят сильной обрезки, в плодоношение вступают поздно, плодоносят правильно и обильно. Этот сорт на айве развивается очень слабо, почему для карликовой культуры требуется двойная прививка.

Бера Диль, Масляная Диля, Beurré Diel, Beurre impérial, Beurré magnifique, Beurré incomparable, Des Trois Tours, Dil's Butterbirne.

Образцы плодов от Янковского /Варшава/. Помологическое определение: бера.

Величина плодов большая. Форма кубаревидная, широкая, к ножке низко-коническая, с косым конусом, при верхушке с выдающимися ребровatыми округлостями.

Верхняя ямка неправильная от узких борозд, углубленная, без складок. Листики чашечки малые, пушистые, открытые. Ямка при ножке правильно вдавленная. Ножка толстая, длиной с 1/4 высоты плода.

Кожа тусклая, немного шершавая от подкожных точек, одноцветная, светло-желтая с тонким бурым ржавым налетом и сетчатыми пятнами в разных местах, особенно на верхушке и при ножке.

Мякоть белая, тающая, сочная, сахаристо-вяжущая и пряная.

Плоды созревают в конце сентября [начале октября] и держатся до половины [конца] октября, когда мякоть внутри становится бурой.

Образцы плодов от Варшавского помологического сада.

Величина плодов большая. Форма грушевидная, неправильная, кособокая, в верхней части широко-округлая, с выпуклостями и коническим заострением к тупой верхушке, с узкими сглаженными угловатыми ребрами и плоскими бороздами, отчего граневидная; в конической нижней части поперек вдавленная, с неровным основанием.

Верхняя ямка небольшая, неровная, с слабыми ребристыми подъемами, около чашечки с короткими ребристыми складками и маленькими бугорками. Листики чашечки малые, гладкие, раздельные, короткие, открытые, бурые. Бока с выдающимися неправильными округлостями. Нижняя ямка глубокая, неровная, бороздчатая, с боков с выростами. Ножка очень толстая, черно-бурая.

Кожа толстая, нежная, тусклая, мелко-шероховатая, зеленовато-желтая, местами светло-зеленая, при созревании светло-желтая, грязноватая от многочисленных резко выступающих и придающих небольшую шероховатость подкожных точек. В ямках, особенно в нижней, бурая лучистая ржавчина и

См. на обороте:

на боках сетчатые пятна. Запах слабый.

Мякоть с сильной каменистостью около чашечки, слабая около гнезд и к ножке, с просвечивающимися сосудистыми пучками, мало сладкая, не очень тающая, несколько вяжущая, с слабой пряностью.

Семена продолговатые, узкие, с длинным острым носком, черно-бурые.

Плоды созревают в конце сентября [начале октября], вкусом хуже Пюиссa д'Ангулем.

1. Образцы от П.П.Симиренко /Городище, Киевской губ./.

Величина плодов большая. Форма неправильная, 2/3 верхней части почти округлая, с неровными боковыми выростами, нижняя часть коническая, с перехватом и с широкой глубокой ямкой у толстой ножки. Верхняя ямка менее углубленная, с 10 короткими бугровидными складками. Чашечка открытая, из длинных чашелистиков.

Кожа сухая, тусклая, тонкая, нежная, бело-желтая, одноцветная, с множеством частых мелких и нечсно заметных ржавых точек. У нижней ямки желтоватая ржавчина из широких пятен.

Мякоть белая, тающая, очень сочная, мелкозернистая, сливочная, очень сладкая, с пряностью.

Образцы от Янковского /Варшава/ X X + +; X1, под названием Diel Butterbirne Jertyz, Padiew radn.

Величина плодов большая. Форма кубаревидная, у верхушки широкая, тупая, овальная или округлая, на 1/2 коническая, с широким ямчатым основанием, почти яйцевидная, без ребер.

Верхняя ямка большая, широкая, глубокая, неправильная, по краям с несколькими плосковатыми бороздами, переходящими на верхушку, около чашечки с короткими ребристыми складками. Листики чашечки бурые, короткие, опущенные, сомкнутые. Нижняя ямка косая, довольно углубленная. Ножка толстая, короткая.

Кожа тусклая, тонкая, нежная, лимонно-желтая, на солнечной стороне оранжевая с тонким разлитым мутным желто-розовым румянцем. Поверхность неровная, шероховатая, с частыми серыми точками. Около ямок тонкий бу-

См. 2-ой лист.

ный ржавый покров и по всей поверхности местами тонкие ржавые пятна. Запах мускатный.

Мякоть белая, нежная, тающая, винно-сладкая, немного вяжущая, с слабым мускатным вкусом.

Семена длинные, острые, темно-бурые.

Плоды вполне зрелые 20 сентября [в начале октября], а 25 сентября [8 октября] мякоть в гнездах бурая и мучнистая.

Очень походит на Лесную красавицу, Fondante des bois.

Сорт бельгийского происхождения, распространенный в Крыму, Молдавии и др. южных местностях. 3. Б.И.Шабловский /"Провідні сорти плодових культур УРСР", изд. 1937 г./ сообщает, что

Деревья дорастают до средних размеров, с широко-пирамидальной кроной, с немного свисающими ветками. Морозостойкость слабая, особенно в молодом возрасте, лучше выращивать в искусственной ~~формовой~~ форме при защите на зиму. Необходимо выбирать самые теплые места с хорошей питательной супесчаной почвой. При недостатке влаги в почве опадают плоды, а при избытке влаги сильно поражает парша. Плодоношение начинается на 8-9 году или даже на 10-11-ом. Урожайность вообще умеренная.

2. Л.П.Симиренко /Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 526-530./ пишет, что деревья отличаются здоровьем, долговечностью, сильным и быстрым ростом. Кроны широко-пирамидальные. Рано вступают в плодоношение, плодоносят правильно и хорошо. Листья чувствительны к большому зною и часто обжигаются в конце лета. В Киевской губ. молодые деревца в питомнике в суровые зимы нередко мерзнут, но взрослые деревья вполне устойчивы и благополучно переносят - 26-27° R. Необходима питательная, свежая и нетяжелая почва и местоположение хорошо защищенное от ветра.

4. Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 172-174./ пишет, что сорт превосходно растет на груше и айве. Требует питательной, проницаемой почвы, защитного место-положения, длинной стстематической обрезки. Достоинства сорта: сила роста побегов, урожайность, однородность плодов, сравнительная холодостойкость деревьев. Недостатки: непостоянство вкуса

См. на обороте:

плодов, их осыпаемость, поражаемость грибными болезнями.

Бёрр Дюранд, Beurré Durandeau, Poire de Fongre, Fongre-Notre Dame, Birne von Fongre.

Образцы плодов от Л.П.Симиренко /Городище, Киевской губ./.

Величина плодов средняя и меньше. Форма кубаревидная, на большей части широкая, к ножке с небольшим конусом, довольно правильная, без ребер и бугров, только в нижней части кольцевая ямчатость от перехвата.

Верхняя ямка глубокая, с неясными краями. Чашечка закрытая, с черными листиками. Нижняя ямка малая. Ножка короткая, или средней длины.

Кожа тусклая, тонкая, грязно-желтая или буровато-желтая от ржавого налета, на основании серо-желтоватая, с частыми просвечивающимися подкожными точками; на солнечной стороне желтовато-тусклая, с пятнами.

Мякоть белая, очень сочная, мягкая, не тающая, мало-сладкая, с приятной кислотой, несколько вяжущая, качеством второго разряда.

Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 599-601./пишет, что деревья с неправильной пирамидальной кроной, рано начинают плодоносить, вообще плодоносят неутомимо и правильно. Прививки на айве отлично удаются. Почва требуется хорошая, питательная, не сухая и не тяжелая. Местоположение нужно теплое и защищенное. В Киевской губ. деревья выказывают большую зябкость, особенно деревца в питомнике. Взрослые деревья часто успешно переносят морозы в -25-27°R. Вообще автор относит данный сорт к числу наилучших десертно-промышленных сортов, так как он имеет много бесспорных достоинств, в числе которых общепризнанная щедрая урожайность, красота и качества плодов; последние удивительно прочно держатся на ветках. В Киевской губ. плоды никогда, кажется, не червивеют и не поражаются паршей.

Главные недостатки этого сорта: упомянутая зябкость молодых деревцов и пухлость плодов при их переспевании.

Н.Буренков в журнале "Плодоводство" за 1897 г., стр. 363 пишет, что деревья этого сорта не очень сильного роста, с тонкими, длинными ветвями, требуют внимательной обрезки и склонны к образованию пирамидальных крон. Плодоношение наступает рано, бывает ежегодным и часто обильным. Кожа плодов очень красивой окраски, в зрелости золотисто-желтая, с ярко-красным ру-

См. на обороте:

ароматная.
мянцем на солнечной стороне. Усыпана мелкими желтыми бугорками, "яноть бе-
крепко держатся на ветках, не обираются ветр
лая, сладкая, кисловатая, полутающая, очень вкусная. Плоды снимаются в на-
чале 10-20 сентября [в конце сентября]. Сохраняются около месяца.

Дынная.

Образцы плодов из Ставропольской губ. Помологическое определение: бера.

Величина плодов средняя. Форма высокая, кубаревидная, неправильная округлая с тонким характерным острым конусом, по бокам с бороздками и бугорчатыми выступами на поверхности, редко с слабыми угловатыми ребрами. Верхушка круглая, неровная.

Верхней ямки нет или очень мелкая, с короткими слабыми складочками. Чистики короткие, широкие, полуоткрытые, гладкие. При ножке нет ямки, но имеется косое острие конуса. Ножка тонкая, короче половины плода, [загнутая].

Кожа гладкая, блестящая, лимонно-желтая, одноцветная, на большей части плода шершавая от тонкого буроватого сероватого налета. Подкожные точки мелкие частые, ржавые на теневой стороне.

Мякоть белая, нежная, тающая, весьма сочная, с пряностью дыни, очень сладкая, без пряности.

Семенные гнезда круговые. Семена короткие, толстые, темно-бурые.

Превосходный десертный сорт. Плоды [начинают созревать] в начале [средине] сентября. В конце сентября [начале октября] совсем зрелые. Могут держаться только до октября [средины октября].

Походит на Durandeau, Beurré de Congres.

равная половине высоты плода.

Кожа слабо блестящая, гладкая, светло-желтая, на солнечной стороне с красивым желто-розовым разлитым румянцем, с резко выступающими на нем серыми точками; на теневой стороне более мелкими, на верхушке с тонким бурым ржавым налетом.

Мякоть белая, тающая, но зернистая и каменистая около чашечки и гнезд, сладкая, не вяжущая, не маслянистая, без пряности.

Семена длинные, острые, темно-бурые.

Плоды поспевают в начале [средине] октября и портятся, начиная от ножки в конце октября [начале ноября]. Это не ноябрьский сорт, а октябрьский.

Образцы на Нижегородской выставке 1896 г. /X X †; X - XII/ более близки к типу.

Величина плодов большая. Форма длинная, роговидная, как у роговидного картофеля, на верхушке округлая и с 2/3 криво-конечная, с округлой правильной верхушкой и косым основанием.

Верхней ямки почти нет, с широкими, но короткими ребристыми складками и маленькими шишечками бугорков. Листики чашечки на выпученной верхушке, короткие, черные, без волосков, открытые. Нижней ямки нет и вместо нее косая заостренная. Ножка короткая, кривая, очень толстая.

Кожа тонкая, нежная, тусклая, на солнечной стороне блестящая, мелкошагреневатая, с едва заметными частыми невязкими точками, лимонно-желтая, с очень красивым киноварно-красным разлитым румянцем вдоль выдающейся стороны. По всему плоду сероватые бурые точки, а около чашечки и ножки тонкий буровато-ржавый покров. Запах слабый.

Мякоть белая, сливочная, но около чашечки каменистая, около гнезд даже грубовато-зернистая, однако нежная, тающая, сладкая, сильно вяжущая, с сильной эфирной пряностью. Вяжущий вкус получается от большого количества дубильных кислот, это, а также зернистость ухудшает достоинство этого превосходного сорта. Плоды зрелые и уже желтые 25 сентября [8 октября].

См. 2-ой лист.

Образцы от Варшавского помологического сада, по форме и величине типичные, но отличаются окраской и большей крепостью, а также сохранением.

Величина плодов большая. Форма длинная грушевидная, на 1/3 от верхушки овальная, сплюснутая или с неправильными округлостями, далее заостренная в косой конус с вдавлением в сторону отклоненной ножки, без ребер.

Верхняя ямка широкая или расширенная, на тупой верхушке с немного неровными краями от слабых ребровидных низких широких складок с слабыми бороздами. Листики чашечки черные, шерстистые, сомкнутые. Нижняя ямка с малым кольцевым вдавлением и с противоположным сильным боковым выростом, отклоняющим значительно вбок толстую короткую ножку.

Кожа тонкая, нежная, тусклая, слабо блестящая на окрашенном боку, мелко-сетчатая, или слабо шагреневатая, основного светло-желтого цвета, покрытого тонким налетом лучистых пятен буроватой ржавчины, отчего грязно-желтоватая, на солнечном боку с грязным мутным желто-розоватым слабым румянцем. Эти признаки отличительны. Подкожные точки частые, бурые. Запах нежный.

Мякоть желтоватая, около чашечки, в верхней части гнезд и около ножки каменистая, с просвечивающимися сосудистыми пучками в средней части, не очень сочная, тающая, вяжущая, винно-кисловатая, с сильной эфирной грушевой пряностью. 7 [20] октября начинает делаться слизеватого вкуса, хотя мякоть крепкая.

Семена толстые, с острием, прямые, темно-бурые.

3 Образцы от Капустина /Крым/ на Нижегородской выставке 1896 г. были такого же цвета, как выше описано, также крепкие, но большей величины. Верхняя часть несколько неправильно округлая, с следами реброватости на верхушке, на 2/3 остроконечная, с косым острым основанием. Верхняя ямка неправильная, бороздчатая, с широкими ребристыми складками и неровными краями. Листики чашечки длинные, узкие, звездчатые и широко-раскрытые. Нижней ямки нет. Ножка короткая, крючковатая, толстая.

Кожа лоснящаяся, жирная, мелко-сетчатая, зеленовато-желтая и светло-

См. на обороте:

желтая; на боку с разлитым мутным желто-розовым румянцем. Подкожные точки резкие, очень частые, бурые и на румянце широкие, серые. Верхняя ямка и около ножки с ржавым покровом, у первой бурого, у второго серого. Запах слабый, эфирно-грушевый.

Мякоть белая, около чашечки каменистая, около гнезд вверху желтая зернистая, очень сочная, ~~зернистая~~, винно-кисловатая, с слабым эфирно грушевым вкусом, не вяжущая.

Плоды 13 [25] октября были еще не вполне зрелые, но их можно держать только несколько дней.

Семена большие, длинные, с острым носиком, тонкие, светло-бурые.

2, Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 531-536./сообщает, что Р.Гетэ категорически утверждает о необходимости очень рано снимать плоды этого сорта, иначе они нередко бывают не вкуснее свеклы. Но автор говорит: "В Крыму замечено, что на одном и том же дереве у Бёрэ Клержо нередко получаются плоды разных достоинств, от вкусных, полувкусных и решительно до безвкусных включительно в зависимости от того, в каком месте короны [кроны] они выросли. И там находят, что поздний сбор урожая у этого сорта является одним из обстоятельств, обусловливающих положительные десертные достоинства." Далее он говорит: "Более широкому распространению Клержо в Крымских садах служит помехой главным образом очень тупой рост его дерева. Оно растет сжато пирамидально, отличаясь нечувствительностью к холоду, очень рано вступает в пору плодоношения и родит почти без устали, из года в год правильно и, соответственно силе растения, очень благодарно. Дерево любит солнечное положение и требует защиты от ветров, так как объемистые и тяжелые плоды его недостаточно прочно держатся на ветках..." Я снимаю Клержо в моем саду в Киевской губернии не раньше конца сентября [начала октября], при чем эти плоды [леживаются во второй половине ноября [первой половине декабря] и держатся иногда по декабрь включительно [первую половину января], часть же плодов урожая 1890 г. сохранились до конца января [половины февраля] 1891 г."

См. 3-ий лист.

Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 180-181./ считает, что это один из привлекательных сортов груш по величине и окраске плодов. Но внешность их не гармонирует с внутренними качествами. Достоинствами сорта являются: эффектный вид плодов, раннее плодоношение деревьев, сравнительная холодостойкость, иммунность. Недостатки: посредственный вкус плодов и осыпаемость плодов и слабый рост деревьев.

Г.А.Каблучко /"Сорта плодовых культур Молдавии", изд. 1953 г., стр. 281-282./говорит, что Берэ Клержо, или Краснобокая, распространена в южных районах СССР. В Молдавии имеется в садах Южного Приднестровья и в Кодрах. Деревья небольшие. Сначала плодоношения растут хорошо, но потом, в связи с почти ежегодным обильным плодоношением, растут слабее.

47 (fürstliche Tafelbirne.

Бёрэ Лигеля, Коперечка, Мускатная Лигеля, Амарет, Suprême Coloma, Ziegels Winter Butterbirne, Coloma's Köstliche Winterbirne, Koperstsche

Образцы плодов от Розера в Варшаве и от Варшавского помологического сада.

Величина плодов средняя. Форма почти яйцевидная, к верхушке овальная, к ножке неясно коническая и притупленная, часто кособокая, по бокам ровная или только на верхушке с следами выдающихся угловатых ребер. Верхняя ямка малая, очень мелкая, без складок. Листики чашечки короткие, звездчатые, открытые, черные. Ямка при ножке вдавленная, углубленная, с боковым выростом и без него. Ножка тонкая, равная 1/4 высоты плода.

Кожа гладкая, лоснящаяся, очень жирная, сначала светло-зеленая, затем зеленовато-желтая и бело-зеленая с желтоватым оттенком, одноцветная, без румянца, с мелкими серо-зелеными резкими подкожными точками. Запах сильный.

Мякоть белая, нежная, тающая, маслянистая

Семена острые, средней величины, светло-бурые.

Образцы плодов от Вириона.

Величина плодов больше средней. Форма более правильная, чем предыдущая, к ножке усеченно-коническая, к верхушке округлая, с выдающимися сглаженными угловатыми ребрами.

Мякоть белая, тающая, сладкая, с пряничным вкусом, нежная, с мускатным привкусом. Около чашечки каменистая, около гнезд зернистая, с просвечивающимися сосудистыми пучками.

Плоды созревают в половине [конце] октября.

Образцы плодов типичные от Т.П.Симиренко из Городища, Киевской обл.

Величина плодов средняя. Форма широкая грушевидная, на большей части почти круглая с мало усеченной верхушкой, к ножке островато-коническая, по бокам и к верхушке с сглаженными ребрами.

Верхняя ямка малая, мелкая, с острыми короткими складками. Чашечка короткая, открытая, бурая. Нижняя ямка вдающаяся, иногда с слабыми выростами. Ножка короткая, крючковидная.

Кожа тонкая, нежная, тусклая, жирная, одноцветная, светло-зеленая

См. на обороте:

или желтовато-зеленая. Подкожные точки очень мелкие, серне с зеленым контуром. На верхней ямке бурый налет.

Мякоть белая, не очень сочная, зернистая около гнезд и волокнистая к ножке, довольно каменистая к чашечке, нежная, тающая, сладкая с грушевой пряностью, отличная десертная.

Семена короткие, толстые, бурые.

Плоды начинают зреть в половине [конце] октября и могут держаться лишь две недели, затем делаются водянистыми и портятся.

6. Сорт чешского происхождения, распространенный в Украине, Литве, Белоруссии Б.И.Шабловский /"Провідні сорти плодових культур УССР", изд. 1937 г./ пишет, что

Деревья среднего роста, с пирамидальной густо-ветвистой кроной, которая с возрастом делается развесистой, довольно долговечные, но при сильном урожае требуют подстановки подпор[illegible], чтобы не было поломов ветвей. Мало-холодостойкие и требуют защищенных мест, [illegible] легкую и суховатую почву; на влажных местах листья и плоды поражаются паршей.

2. Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 356-362./говорит: "Дерево у Лигеля хорошего роста, красивое, здоровое, образует высоко построенную, довольно густую, пирамидальную крону; оно входит рано в пору плодоношения, родит почти из года в год правильно и, достигнув известного возраста, делает это с весьма большой щедростью,... не выказывает особенной требовательности ни в отношении положения, ни в отношении качества почвы и удается во всех не слишком сухих грунтах,... принадлежит к числу сортов наиболее надежных, прочных и устойчивых в отношении холода... На айве очень хорошо удается,... безукоризненно хорошо удается на Украине.

3. Л.П.Симиренко далее сообщает, что, кроме вышеописанной груши, хотя и редко, встречается Бер Э осенняя Лигеля /Beurre Liegel d'automne /. Характер роста дерева последней, его побеги, листва - все это очень напоминает типичную Мускатную Лигеля, но форма плодов более длинная.

4. А.С.Гребницкий /"Атлас плодов", изд. 1906 г., стр. 406./ пишет: "Коперечка прекрасный промышленный сорт для многих мест России."

См. 2-ой лист.

7. Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 186-187./ считает ценным сортом для Украины, юга и юго-востока СССР. Его достоинства: прекрасный вкус плодов, урожайность и выносливость. Недостатки - поражаемость паршей.

8. Г.А.Каблучко /"Сорта плодовых культур Молдавии", изд. 1953 г., стр. 279-280./ говорит, что Коперечка, или Берэ Лигеля /в Крыму ее называют Аморет/, повсеместно распространена в Молдавии, однако в значительных количествах встречается в центральной части и в Приднестровье.

5. Я.Немец в журнале "Плодоводство" за 1892 г., стр. 197 сообщает из Винницы: "Масляная груша Лигеля /Коперечка/ рекомендована дарно М.Н.Раевским для больших насаждений в южной России, но, несмотря на то, разводится у нас в слишком незначительном количестве. Дерево этого отличного торгового сорта дает ежегодно обильный урожай и растет пирамидально, а поэтому занимает в саду мало места; ветер меньше сбивает плодов Коперечки, чем других поздних груш."

Бера лифляндская. Сорт народной селекции. Происходит из Лифляндии [Латвии].

Образцы плодов из Горецкого фруктового сада. Помологическое определение: бера.

Величина плодов средняя или малая.

Форма шаровидная, к ножке конически суженная, довольно правильная, ровная, без ребер и бугров. При ножке неглубокая косая ямка, без выростов или с небольшим боковым полукольцевым, отгибающим немного ножку, которая тонкая буроватая, длиной с высоту плода или короче. Чашечная ямка мелкая или довольно углубленная, плоская, с очень слабыми бороздами. Листики короткие, узкие, открытые, отогнутые.

Кожица тусклая, нежная, одноцветная, светло бело-желтая, почти восковая, без всякой красноты, с равномерно размещенными мелкими серыми точками, не придающими шершавость, но испещряющими светлый плод. Местами ржавые черточки, вероятно от легких поранений.

Мякоть белая, нежная, сочная, тающая, сладкая, с нежной пряностью сливочных конфет.

Плоды созревают в конце августа [первой половине сентября]. Держатся с неделю, дозревая в лежке и получая отличный вкус.

Превосходный десертный сорт. Каменистость сильная и главным образом около чашечки. Единственная вкусная и нежная по вкусу плодов у нас [в Горках, Могилевской губ.] бера.

Семена короткие, черные, с носиком.

Рост кроны пирамидальный, очень слабый. Крона округло-пирамидальная, густая, с многими тонкими ветками, которые нужно прорезывать [удалять лишние]. Штамб страдает вдоль от огневицы, но деревья долго крепко держатся. В защите, а не [на] открытом месте, деревья [по-видимому] не будут уродливыми. Лучше прививать в крону, чтобы штамб был более выносливого сорта или дикий. Обычно тонкие ветви совершенно здоровы. Молодые побеги тонкие, светло-бурые, гладкие, с редкими чечевичками, которые сохраняются несколько лет.

В суровую зиму 1893 г. у молодых деревцов частично померзли однолетние побеги сильного роста, вообще же они мало пострадали и сорт оказался выно-

См. на обороте:

сливным. Цветение позднее других сортов. [Листья небольшие овально-округлые, слабо на конце заостренные.]

В моем саду [М.В.] совершенно несливной сорт, но мякоть плодов не иная: с особой резкой пряностью, отдающей смолистым веществом и похожая на сливочные конфеты, хуже, хотя также мягкая, но менее тающая.

В.Ф.Смирнов в книге "Яблоня и груша в саду мичуринца-опытника", изд. 1951 г., на стр. 258 пишет: "По морозостойкости деревья несколько уступают стандартным сортам, однако даже в Московской области благополучно зимуют и плодоносят."

Г.Черабаев в журнале "Прогрессивное садоводство и огородничество" за 1915 г., № 4, стр. 105-107 пишет, что в Саратовской губ. плоды этого сорта даже в начале [средине] сентября довольно прочно держатся на ветках и после снятия хранятся в подвале более или менее продолжительное время, обычно до [половины] октября, а отдельные экземпляры даже до половины [конца] октября. У лежалых плодов менялась окраска кожи зеленой на бледновато-желтую, а мякоть становилась [тающей,] сочной, маслянистой, с мускатным привкусом. Молодые деревца имеют сжато-пирамидальную крону, а к 18 годам последняя становится широкой.

Бера Наполеон, Beurre Napoleon.

Образцы из Горецкого, Могилевской губ., фруктового сада.

Образцы плодов средней и малой величины. Форма грушевидная, довольно сильно заостренная к ножке, которая менее половины плода и всегда кривая в маленькой правильной ямке ровной или косой с боковым выростом. На боках часто небольшие продольные неправильные углубления и слабые продольные выступы. Поверхность иногда неправильно бугристая. Основание сильно неровное, ребристое и неправильное от весьма глубоких борозд и грубых уродливых ребристых широких выростов вблизи чашечки, при чем выросты даже сдавливают друг друга. Иногда имеются два мясистых выроста, подобных тем, которые бывают при ножке. Чашечка сдавленная, но иногда открытая, когда нет глубоких борозд.

Кожа гладкая, слабо-блестящая, зеленовато-желтая, потом становящаяся светло-желтой, на большей части с весьма красивым мутным сургучно-красным румянцем, прерываемым желтыми мраморными полосками. По румянцу чаще мелкие зеленые подкожные точки, а также белые, похожие на фарфоровые, а на теневой стороне подкожные точки как у яблок, иногда мало-заметные, обыкновенно зеленые. Ржавые мелкие точки редко рассеяны у чашечки, а вблизи нее на основании бывают ржавые полосы и пятна, а также шагреневатость.

Мякоть белая, суховатая, крупнозернистая, пресная, с малой сладостью и кислотой, при созревании делается пресно-мучнистой.

Сорт в условиях Горок кухонный. Плоды созревают в начале [средине] сентября вместе с фунтовой, не трескаются в мокрое и холодное лето.

Молодые деревья с гнилой древесиной и поражениями огневицей на южной стороне штамбов и ветвей. В суровую зиму 1893 г. сучья, пораженные огневицей, совсем замерзли. Также вымерзли почки на плодовых побегах, уцелев только на их концах. Нужно было осенью в прежние годы сильно обеливать ветви и штамбы, чтобы спасти от огневицы, заделывать раны и их замазывать, чтобы не было гнили, но этого не делалось и деревья имеют жалкий вид и могут совсем погибнуть.

См. на обороте:

2. Образцы плодов от Вепер(а) из Вильны /Вильнюса/. Плоды отличаются своей формой и окраской.

Величина плодов средняя. Форма длинная, овальная или круглая, к ножке конически продолговатая, по бокам с слабыми округлостями и при конической части с боковым поперечным вдавлением и мясистыми морщинами, при чашечке слабо бороздчатая и ребристая. Верхняя ямка мелкая, с широкими ребристыми складками и многими мелкими продолговатыми буграми. Листики чашечки узкие, удлиненные, сомкнутые. При ножке углубленная правильная ямка или ножка боковая, с морщинами на ней. Ножка толстая, равная половине высоты плода.

Кожа гладкая, блестящая, без налета, характерного светло травяно-зеленого цвета, при созревании зеленовато-желтая, на солнечной стороне с мутной желтоватостью. Подкожные точки мелкие, частые, серо-ржавые. Слабая лучистая бурая ржавчина только в ямке при ножке.

Мякоть белая, очень сочная, тающая, сладкая, с слабым вяжущим вкусом, лучшим, чем у Веры белой /бланковой/. Каменистость небольшая при чашечке.

Семена большие, плоские, светло-бурые.

Превосходный десертный сорт. Плоды созревают в конце сентября [начале октября].

3. В Курляндской /Латвии/ губ. от Лейениака плоды меньше, формы такой же, но кожа не блестящая, ножка боковая с поперечными морщинами мякоти, с ржавчиной только при ножке. Мякоть также очень сочная, но менее тающая, крупитчатая около гнезд и более вяжущая, несколько даже кисловатая. Вероятно только в хорошие годы плоды удается. Они значительно уступают виленским. Поспевают в начале [средине] октября. Сорт все-таки в Курляндии может выращиваться для домашнего употребления плодов и местных рынков.

4. Образцы от Л.П.Симиренко /Городище, Киевской губ./ в верхней половине не окружены ребрами и заметно граненые, в нижней конические с небольшим перехватом. Верхняя ямка неправильная, с открытыми бурыми длинными листиками. Ножка равна половине высоты плода. Кожа желтовато-белая, однотонная, немного блестящая, с очень мелкими и редкими подкожными бурыми точками, мало заметными. Мякоть белая, сливочная, без зернистости. Плоды 15[28] октября совсем зрелые, затем мякоть становится внутри бурой.

См. 2-ой лист.

Л.И.Сергеев /"Сорта плодовых и ягодных культур", изд. 1953 г., стр. 295-296./ пишет, что деревья этого сорта небольшие, с неправильной или широкопирамидальной кроной. Побеги серовато-коричневые. Листья крупные, яйцевидные, толстые, блестящие, темно-зеленые, длинно-заостренные. Достоинства сорта: раннее плодоношение и очень хороший вкус плодов, а недостатки, - слабый рост дерева и недостаточная его зимостойкость. Сорт рекомендован для широкого производственного испытания в Грозненской области и Ставропольском и Краснодарском краях.

V

Бера серая зимняя, Beurré gris d'hiver de Luson.

1. Образцы плодов от Гозера /Варшава/. Помологическое определение: полубера.

Величина плодов малая. Форма высокая овально-коническая, к верхушке овальная, к ножке неправильно коническая, с косым основанием.

Верхняя ямка малая, выпученная, мелкая, ровная, без складок. Листики чашечки малые, короткие, открытые, серые. Нижняя ямка боковая, вдавленная, с бороздой и большим боковым выростом. Ножка тонкая, короткая, черная, равная 1/4 высоты плода и менее, крючковатая.

Кожа светло-зеленая, без ржавых пятен, вся покрытая тонким буровато-серым ржавым налетом, слегка шершавая, более на верхушке.

Мякоть белая, зернистая, около гнезд каменистая, полутающая, сладкая с пряностью. Вкус портит каменистость.

Плоды держатся до половины [конца] ноября и созревают в начале [средине] ноября и далее, но морщатся.

Образцы от Янковского /Варшава/: ✝ ✝ †; XII - 1.

Такой же величины и формы как вышеописанная, только более продолговатая, с такими же ямками и ровными боками.

Кожа толстая, нежная, основного красивого травяно-зеленого цвета, блестящая, несмотря на очень мелкую шероховатость, с частыми светло-бурыми ржавыми точками, вся покрытая тонким серым или серо-бурым ржавым покровом, оставляя зеленую окраску местами. От этого /пятен и точек/ кожа шероховатая. Ямки слабо вдавленные.

Мякоть зеленоватая или бело-зерная, около чашечки и гнезд грубо-каменистая, с большими твердыми крупинками, мало-сочная, полу-тающая, безвкусная, полутравянистая. Последнее, по-видимому, произошло от преждевременного сбора и поэтому недостаточного дозревания.

Семена большие, кривые, узкие, с длинным острием, черно-бурые.

1. Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1913 г., стр. 542-547./ описывает Бера_гри_или_Серое_масло, Beurré gris d'Amboise, Beurré doré, Beurre rouge, Beurre vert, Ysembart, Grane, Herbst-Butterbirne.

F Это старинный французский сорт, который известен в культуре более 300 лет. Его плоды по форме и величине очень варьируют даже на одном и том же де-

См. на обороте:

неправильная, кособокая.
реве. Плоды около средней величины. Форма округло-коническая, чашечка открытая и заключенная в очень плоской верхней ямке. Ножка короткая, толстая, окруженная вдавлением и выростом. Кожа тонкая, светло-зеленая, покрытая серо бурой ржавчиной; у спелых плодов желтая, иногда с румянцем на солнечном боку. У плодов, выросших на карликах, а также с деревьев на хорошей почве и при благоприятном местоположении, мякоть зеленовато-белая, очень сочная, маслянисто-тающая, сладкая, с приятной кислотой, весьма вкусная. При неблагоприятных условиях плоды поражаются паршей и трескаются, мякоть бывает крупно-зернистой, с твердыми грануляциями и безвкусная. Сбор плодов на южном берегу Крыма бывает около 1 /13/ августа, а в северном Крыму около 15 [в конце] августа. Созревание наступает в начале [средине] сентября и держатся в хранении недели две и редко больше. Это ранний осенний сорт.

Деревья небольшие и некрасивые, хотя в молодости сильно растут. В хороших условиях на теплой, питательной и легкой почве отличаются здоровьем, нечувствительны к холоду, образуют несиметричную крону с немного свисающими ветвями, рано плодоносят и потом довольно правильно и хорошо урожайны. Особенно хорошо растут на айве. В Киевской губ. деревья с возрастом становятся вполне холодо-устойчивы, хорошо плодоносят и плоды никогда не пятнились паршей, за исключением низких мест с сырой почвой, а также глухих с слабым притоком воздуха.

3. Бе́ра серая зимняя.

Образцы от М.К. Тенишевой из Смоленской губ. Помологическое определение: полубера.

Величина плодов средняя и менее средней.

Форма округлая, неправильная, к верхушке иногда коническая, с неровными угловатыми ребрами вблизи ножки с коротким поперечно [illegible] складчатым мясистым конусом, поднятым на [illegible] кольцевой борозде ямки.

Верхняя ямка небольшая, мелкая, окруженная бугроватыми складками, переходящими на краях в ребра. Чашечка открытая, из коротких листиков, пригнутых внутрь. Нижней ямки совсем нет и вместо нее полу или кольцевая борозда с поднятым мясистым конусом. Ножка прямая, отклоненная в сторону.

Кожа плотная, лоснящаяся, жирная, зеленовато-желтая, при созревании лимонно-желтая, совершенно одноцветная, неровная, бугроватая, с очень мелкими и частыми серыми точками. Запаха нет.

Мякоть бе́лая, мало сочная, мало-каменистая, чрезвычайно вяжущая, кислая, без всякой сладости.

Плоды созревают во второй половине сентября [первой половине октября], пригодны только для сушки и кухни.

1960 3-мой

V

4. Бе́ра зимняя.

Образцы плодов от Д.В. Разумеева из Гомельского у., Могилевской губ.

Величина плодов более средней. Форма продолговатая кубаревидная, неправильная и характерно бугристая, на верхушке округлая, с бороздами, по бокам с округлыми буграми, к ножке вдруг с перехватом, косо коническая и бороздчатая.

Верхняя ямка неправильная, углубленная, бороздчатая. Листики чашечки короткие, пушистые, сомкнутые и вдавленные в глубь ямки. Ямки при ножках с большим полукольцевым вдавлением и большим бороздчатым мясистым боковым ростом, отклоняющим ножку вбок. Ножка тонкая, равная четверти - половине высоты плода.

Кожа гладкая, блестящая, одноцветная, желтовато-зеленая, на солнечной стороне с легкой краснотой, с мелкими неясными серыми точками.

Мякоть белая, крупитчатая, мучнистая, безвкусная, каменистая около гнезд и в начале средине октября внутри гнилая.

Семена большие, толстые, светло-бурые.

Плоды используются во второй половине сентября [начале октября]. Необходимо не допускать плоды до перезревания и собирать вовремя.

_Бера слуцкая, _в Ковенской губ. [Литве] Бера золотая.

Образцы от М.К.Мороза /ст. Бочейково, Витебской губ./. Помологическое определение: полубера.

Величина плодов больше средней. Форма кубаревидная, яйцевидная или округлая, к ножке коническая, со слабыми ребрами на верхушке.

Верхняя ямка малая, с открытой неразвитой чашечкой из коротких черных листиков. Нижней ямки нет. Около нее каменистая мякоть с многими кольцевыми складками, а также у основания ножки мясистые кольцевые наросты. Ножка дуговидная, длиной с половину высоты плода.

Кожа тонкая, сухая, тусклая, светло-желтая, одноцветная, с редкими неясными зелеными точками, почти вся покрытая рыжеватыми сетчатыми пятнами ржавчины.

Мякоть белая, в конце сентября [начале октября] мучнистая, суховатая и сладковатая, совершенно перезрелая.

Семена замечательно большие, характерные своей величиной, длинные, широкие, с кривым носиком, бурые даже в полной зрелости.

2. Образцы от Бохвица / из Минской губ. / имеют уклонения по окраске плодов: зеленой, серой и красной.

1/ Зеленая.

Величина плодов средняя. Форма высокая, длинная, овально-коническая, кособокая, с вдающимися частями боковой поверхности. Основание узкое, с сильным боковым выростом, отклоняющим толстую ножку, длиной в 1 д /2,5 см/, в очень малой ямке. Верхушка овальная или округлая, неправильная, немного реброватая.

Верхняя ямка мелкая, малая, правильная, гладкая, без складок и бугров. Листики чашечки малые, короткие, открытые.

Кожа нежная, зеленовато-желтая, гладкая, блестящая, жирная, у верхушки с сетчатым ржавым налетом и пятнами вдоль с ржавыми лучами; при ножке на выросте с мелкою ржавчиной. Подкожные точки мелкие, ржавые. На солнечной стороне с слабым разлитым желто-красным прерывчатым румянцем.

Мякоть белая, желтоватая, нежная, тающая, приятно-сладковатая, не-

См. на обороте:

сколько вяжущая, весьма сочная. Каменистые частицы по пучкам к гнезду от ножки, слабо около гнезд и сильнее между гнездами и верхушкою. Семена длинные, черные.

2/ Серая.

Отличается более низкой и правильной овально-конической формой, длинной ножкой и тонким ржавым налетом, покрывающим почти весь плод. Ямка при ножке небольшая, косая, с бугристыми слабыми выростами. Кожа плотная. Мякоть менее сладкая, более вяжущая. Семена буроватые.

3/ Красная.

Походит на серую, отличаясь большим разлитым румянцем, на котором подкожные точки выделяются мелкими сероватыми. Мякоть с большею сладостью, но вместе с тем и большею плотностью, а также несколько пряным ее вкусом.

Зеленая лучше всех. Красная порядочная по сладости и пряности, но серая довольно посредственная.

Плоды созревают в начале [средине] сентября.

Это один из наилучших и распространенных в Белоруссии сортов груш.

Деревья среднего роста, с широко-пирамидальной кроной. Достаточно в БССР зимостойки. Начинают плодоносить на 7-8 году. Урожайность по большей части ежегодная и высокая.

3 В.К.Заец /"Сорта плодовых и ягодных культур", изд. 1953 г., стр. 297-298./ пишет, что Бера слуцкая - местный белорусский сорт, происхождение которого неизвестно. Широкую популярность в южных и ряде центральных районов БССР эта груша завоевала благодаря хорошим вкусовым качествам плодов, щедрой урожайности и довольно высокой устойчивости деревьев к неблагоприятным условиям. Начало плодоношения начинается с 8-10 года, но затем урожайность щедрая и регулярная. Плоды крепко держатся на дереве. Сорт рекомендован для широкого производственного испытания в Курской области.

Бёра Стеркман, Beurré Sterckmanns, Belle Alliance, Doyenné Sterckmanns, Sterckmanns Butterbirne.

Образцы от Гозера в Варшаве. Помологическое определение: бера.

Величина плодов средняя. Форма почти кубаревидная, широко-плоская в верхней части и низко-коническая в нижней, с острым конусом с вдавленной поверхностью; по бокам с выдающимися округлостями; верхушка плоско-округлая, с слабыми узкими неровными ребрами и бороздками, основание узкое, косое. Верхняя ямка мелкая, занимающая верхушку, с слабыми ребристыми складками. Листики чашечки короткие, раздельные, открытые. Нижняя ямка малая, с кольцевым вдавлением, боковым выростом и мясистым наростом у основания ножки. Ножка тонкая, кривая, равная половине высоты плода.

Кожа тусклая, неровная от сетчатой шагреневатости, одноцветная, светло-зеленая, с слабой желтизной, без красноты. Ржавые точки неправильные, более на солнечной стороне и имеют вид мелких поранений. Запаха нет.

Мякоть белая, немного зернистая, каменистая около чашечки, тающая, но не маслянистая, очень сочная, сахаристо-сладковатая, без вяжущего привкуса и пряности.

Плоды созревают в лежке в конце октября [начале ноября], в половине [конце] ноября становятся внутри совсем бурыми, испортившимися, только снаружи остаются (как бы) не поврежденными.

Хороший десертный сорт, лучше Сапежанки.

Образцы плодов от Янковского из Варшавы, ~~X X~~ † ; XI - XII.

Величина плодов большая или более средней. Форма неправильная широкая с выдающимися боками и широкой тупой округло-угловатой верхушкой, с поперечным вдавлением и небольшим косым основанием.

Верхняя ямка широкая, простертая на верхушку, глубокая, с сглаженными складками, по большим краям бороздчатая. Нижняя ямка косая, с боковым выростом. Ножка тонкая, длиной в 1 д. [2,5 см].

Кожа тусклая, плотная, шагреневатая, светло-зеленая, на верхушке грязно светло-желтая, вдоль на солнечной стороне яркий разлитый мутноватый розовый от точек румянец. Подкожные точки серые, частые, резкие, местами

См. на обороте:

ми собранные в ржавые пятна, придающие шероховатость. Запах как у зонтичных растений.

Мякоть белая, очень сочная, с просвечивающимися сосудистыми пучками, не каменистая и не зернистая около гнезд, маслянисто-вяжущая, сладкая, с слабой пряностью.

Семена большие, толстые, продолговатые, с тонким носиком, светло-бурые.

Сорт осенний. Плоды созревают в сентябре, 27 сентября [около 10 октября] совсем зрелые и могут в хорошем хранилище сохраняться до декабря или несколько дольше.

Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 540-541./сообщает; "Существенный недостаток сорта в том, что его иногда довольно большие и подкупающе-красивые плоды энергично гниют на дереве, и этот порок служит едва ли не главным препятствием к распространению Бере Стеркманс в крымских садах... Хотя дерево... и не отличается особенной требовательностью, однако в [на] легких почвах оно приносит плоды, которые бывают и вкуснее и маслянистее, чем в [на] тяжелых почвах; в положениях же хорошо освещенных и теплых их окраска много выигрывает в смысле интенсивности и яркости."

65

Бёрр Стеркмана, Beurré Sterckmans.

Образцы от Варшавского помологического сада. Помологическое определение: бера.

Величина плодов большая. Форма толстая грушевидная, почти на 2/3 к верхушке округлая неправильная, с плоскими бороздами и округло-выдающимися ребристыми выступами, с тупо-округлой верхушкой, к широкому и косому основанию неправильно-коническая.

Верхняя ямка широкая, плоская, переходящая кверху, мало углубленная, с несколькими узкими бороздками, переходящая за края на верхушку или с слабыми бороздками складок. Чашечка открытая. Листики короткие, мелкие, черные, пригнутые внутрь. Нижняя ямка косая, углубленная, с сильным боковым выростом, с узкими бороздками, переходящими из ямки на края. Ножка толстая, короткая.

Кожа тонкая, нежная, на солнечной стороне гладкая и блестящая, не жирная, на теневой грубо шагреневатая, неправильная, грязного светло-желтого цвета; на солнечной стороне с разлитым желто-розовым ярким румянцем, который на краях переходит на ржавые подкожные точки и принимает такую же окраску. Подкожные точки бурые ржавые, не очень частые, лежащие в мелких углублениях. На ямках тонкий бурый покров. Запах эфирно-грушевый слабый.

Мякоть желтоватая, нежная, хрустящая под ножем, очень сочная, сладкая, но мало, с небольшой пряностью, без кислоты и без вяжущего привкуса, тающая.

Семена толстые, продолговатые, с длинным носиком, светло-бурые. Семенные гнезда с пустотой, большие.

Отличный десертный сорт. Плоды поспевают в лежке в начале [средине] ноября. Потом портятся от ножки внутрь.

Собран Др. сорт. [illegible] от Тышкевича

Бёрр Урбанистка. Beurré Colomas Herbst, Der Urbanistes.

1. Образцы плодов получены от Кеппе из Прибалтики.

Величина плодов малая. Форма каротидная, незаметно переходящая в косую коническую, немного продолговатая, по покам не совсем правильная от наличия сглаженных округлостей, но без борозд.

Верхняя ямка мелкая, неправильная, с узенькими короткими ребристыми складками или с выпуклостями и широкими бороздами по краям, почти ровная. Листики чашечки мелкие, короткие, сомкнутые. Нижняя ямка косая, с бугристыми выростами на одной стороне. Ножка толстая, по длине равная половине высоты плода, на конце крючковатая.

Кожа тусклая, шершавая от характерного серо-бурого плотного ржавого налета, иногда покрывающего большую часть плода и переходящего на теневой стороне в ржавые пятна. Цвет светлый травяно-зеленый, видный только на теневой стороне. Точки под кожей не видны, но на теневой стороне они мелкие серые ржавые, а на ржавой стороне беловатые и также серые. Иногда пятен мало и выступает светло-зеленая и желтоватая окраска.

Мякоть желтоватая, сочная, тающая, сладковатая, без вяжущего привкуса, с едва заметной прочностью.

Семена длинные, острые, черно-бурые.

Плоды совсем созрели к концу сентября [началу октября] и держатся далее.

Сорт отличается по цвету кожи светлой зеленовато-желтоватой при косой конической форме и сильным тамариндовым или бадьянным запахом.

2. Отличные образцы плодов получены от Лейенмака из Курляндской губ., Митаво-Бауского уезда, Нейбергородской волости, усадьбы Яун-Клунгест. Необходимо обратить внимание, что этот сорт отлично культивируется в Курляндской губ.

Образцы плодов от Вирциона, а также от Гельцевского из Гродненской губ. были средней и более средней величины.

Форма неправильно-округлая, при чашечке почти круглая, но с слабыми ребрами и бороздами, или с сглаженными ребрами, к ножке высоко неправи-

См. на обороте:

но коническая, с косым основанием.

Верхняя ямка округлая, небольшая, мало углубленная, иногда неправильная. Листики чашечки широкие, сомкнутые. Складок при чашечке нет. Нижняя ямка с боковым выростом. Ножка толстая, загнутая, равная по длине половине высоты плода.

Кожа слабо блестящая, гладкая, светло-зеленая или желтоватая, с частыми зелеными и серыми подкожными мелкими точками, с тонкими ржавыми пятнами и сильным желто-буроватым налетом около чашечки и при основании.

Мякоть белая, тающая, сладковатая, но мало-сладкая, немного вяжущая.

Семена острые, тонкие, темно-бурые.

Хороший сорт с плодами десертного качества.

Образцы плодов, полученные от Янковского из Варшавы: ✝ ✝ ! †; X - X1.

Величина плодов более средней. Форма грушевидная, на 1/2 в верхней части округлая и округло-ребристая, далее коническая с поперечным вдавлением, с тупой верхушкой и тупым широким косым основанием.

Верхняя ямка глубокая, правильная, с плоскими ребристыми складками, с несколькими бороздками. Листики чашечки узкие, серые, пушистые, сомкнутые. Нижняя ямка косая, кольцем вдавленная, с широким боковым выростом. Ножка очень толстая, с мясистым наростом внизу, бурая, короче половины высоты плода.

Кожа тусклая, не жирная, тонкая, нежная, лимонно-желтая, одноцветная, мелко-шагреневатая, с редкими серыми ржавыми подкожными точками, у чашечки и ножки с тонким буроватым ржавым покровом. Запаха нет.

Мякоть белая, нежная, тающая, около чашечки каменистая, около гнезд и к ножке зернистая, очень сочная, сладкая, не вяжущая, с пряничной приятностью, очень вкусная.

Образцы плодов от Варшавского помологического сада.

Величина плодов большая. Форма яйцевидно-грушевидная, с округло-плоской чашечкой, суженной округло-ребровато перхушко[й] или на ней с следами ребер и бороздок, далее правильная, с 1/2 коническая, с тупым широким основанием.

Верхняя ямка малая, углубленная, с мелкими бороздками, к краям неровная. Листики чашечки короткие, бурые, гладкие, пригнутые, но открытые. Нижняя ямка правильно углубленная. Ножка несколько изогнутая, тонкая, длиной около полокины высоты плода.

Кожа толстая, нежная, тусклая, жирная, зеленовато-желтая, грязноватая от подкожных точек и пятен, на солнечной стороне более желтоватая. Точки частые, мелкие, бурые. На ямках лучистый бурый ржавый тонкий покров и на большей части ямок местами такие же пятна. Запах слабый.

Мякоть белая, тающая, сладкая, слабо вяжущая, с грушевой пряностью, каменистая около чашечки и зернистая около гнезд.

Семена длинные, тонкие, острые, черно-бурые.

Плоды перезревают в конце сентября [начале октября], портятся снутри.

3. Дюшес польский, Duchess de Pologne. Урбанистка.

Образцы плодов от Э.Л.Фрика /Идалин близ Ковно [Каунаса] /. Помологическое определение: бера.

Величина плодов средняя или большая. Форма к верхушке неправильно-округлая, к ножке заостренная в неправильный косой конус с боковой ножкой. Бывают и более правильные формы без выдающихся округлых мест, отсутствуют ребра и борозды. Верхушка характерная, круглая, с круглой мелкой ямкой, без складок. Листики чашечки короткие, открытые. Ямка при ножке вдающаяся с боковым выростом. Ножка толстая, равная половине плода или несколько менее.

Кожа слабо блестящая, не жирная, светло-зеленоватая, при созревании светло-желтоватая, одноцветная, с многими частыми мелкими и слабыми зелеными, а потом ржавыми подкожными точками и тонкими серо-буроватыми пятнами, сплошными при мясистости ножки и при чашечке.

Мякоть белая, тающая, с каменистостью около гнезд, сладковатая, но не сильно сладкая, без пряности.

Семена острые, тонкие, плоские, темно-бурые.

Плоды начинают созревать к сентябрю [к половине сентября]. Обычно в течение всего сентября [до половины октября] бывают хорошего качества, но в начале [средине] октября [3] мякоть [1] внутри становится бурой, хотя снаружи остается хорошей.

Этот сорт вполне походит на Урбанистку от Вириона и Тельшевского и нет надобности давать ему новое название Дюшеса польского.

Арданпон,
Бёра Фердинанд, Вейчё de Нарdenpont, Hardenpont's Winter Butterbirne, Kronprinz Ferdinand von Oestreich, Gton Morceau.

Образцы от варшавского помологического сада на Международной выставке садоводства 1894 г. Помологическое определение: бера.

Величина плодов большая или более средней. Форма кубаревидно-грушевидная, широкая и толстая к верхушке, где почти усеченно-коническая, к ножке заостренно-коническая, низкая, с узким тупым основанием, по бокам и к верхушке неровная, бугроватая или бугристо-ребристая с многими слабыми бороздами, идущими от верхушки. В основной части иногда узкие мелкие борозды и поперечное вдавление при переходе брюшной части в коническую.

Верхняя ямка очень широкая, по краям неровная, мелко бороздчатая, глубокая. Листики чашечки длинные, раздельные, полуоткрытые. Нижняя ямка вдавленная, с слабыми ребристыми складками. Ножка толстая, равная 1/4 высоты плода.

Кожа гладкая, блестящая на солнечной стороне и тусклая на теневой, везде характерно мелко шагреневидная и как бы мершавая, одноцветная, светло-зеленая, чуть желтоватая на солнечной стороне или серовато-зеленая. Подкожные точки незаметны, изредка только местами ржавые и ржавые пятнышки пятен, скорее от повреждений. Запаха нет. Характерный признак: мелкие, правильно расположенные и частые точечные бугорки, придающие особый вид шагреневатости кожи.

Мякоть белая, без зернистости, каменистость только около чашечки, тающая, как у дыни, маслянистая, сладкая, вяжущая. Последнее очень изменяет достоинство качество вкуса.

Семена большие, толстые, длинные, острые, черно-бурые. Имеется осевая пустота.

Хороший десертный, торговый сорт. Плоды отлично держатся сахраняются до половины и даже более ноября [до декабря].

Другой образец оттуда же. Плод менее развит.

Величина более средней. Форма двояко-коническая, на верхушке и при ножке усеченная, довольно правильная, без ребер, с поперечным вдавлением в основной конической части. Верхняя ямка углубленная, без складок.

См. на обороте:

листики чашечки открытые. Нижняя ямка правильная, вдавленная. Ножка, тонкая, менее половины высоты плода.

Кожа тусклая, одноцветная, светло-зеленая, с мелкими серыми точками и со ржавым серым налетом около чашечки и нижней ямки.

Мякоть белая, маслянистая, сладковатая, не вяжущая/ без пряности.

Семена большие, длинные, темно-бурые.

Плоды созревают в начале [средине] октября.

Образцы плодов оттуда же на Нижегородской выставке 1896 г.

Величина плодов средняя. Форма кубаревидная, на большей части конически-округленная и ребристая, на меньшей коническая, косая, по бокам без бугров. Нижняя ямка глубокая, бороздчатая, с широкими, но низкими ребристыми, неровными подъемами. Чашечка открытая, черная. Ее листики узкие, длинные. Нижняя ямка углубленная, с большим выростом, отклоняющая тонкую ножку, равную половине высоты плода.

Кожа тонкая, нежная, мелко-шагреневатая, сухая, тусклая, в половине [конце] ноября морщится, грязно зеленовато-желтого цвета от множества мелких серых ржавых точек. На ямках бурая ржавчина. Запах пряный.

Мякоть белая, около чашечки мелко-каменистая, с слабыми сосудистыми пучками около гнезд, сливочная, тающая, сочная, сладкая, но вяжущая, отчего значительно портится вкус.

Семена большие, толстые, широкие, черно-бурые.

Ценный десертный сорт бельгийского происхождения, довольно распространенный у нас на юге.

Б. И. Шабловский /"Провідні сорти плодових культур УРСР", изд. 1927 г./ говорит, что деревья достаточно сильнорослые, с высоко-пирамидальной густой кроной, очень требовательны к условиям произрастания, теплолюбивы, мало морозостойки, требуют плодородную, свежую, теплую и питательную почву. Плоды очень прочно держатся на ветках, но при запоздалом сборе осыпаются.

Л. П. Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 507-513/ пишет, что деревца хорошо удаются на подвое - айве, в питомнике имеют довольно тупой рост, но с течением времени они прекрасно развиваются и образуют густую высокую крону, не опаздывают с первыми урожаями и отличаются долговечностью

См. 2-ой лист.

Фердинанд. Иностранный сорт.

Образцы плодов от Капустина из Крыма.

Величина плодов большая. Форма в большей части неправильно-округлая, кособокая, округло-ребристая и бугристая, с ребрами дини, к ножке менее 1/4 неправильно коническая, также ребристая, с сильным поперечным перехватом, отделяющим эту часть.

Верхняя ямка очень глубокая, бороздчатая, с ребристыми подъемами, переходящими в ребра, пониженные на косой стороне. Чашечка небольшая; листики малые, узкие, волосистые, открытые; ямка с малой бурой ржавчиной. Нижняя ямка косая, углубленная, неправильная, бороздчатая, с сильным боковым выростом и пучистой бурой ржавчиной. Ножка очень толстая, короткая, бурая.

Кожа тонкая, нежная, мелкозернистая, слабо-жирная, тусклая, совершенно одноцветная, в полной зрелости во второй половине ноября [первой половине декабря в лежке] лимонно-желтая. Ржавые точки очень мелкие, частые, но не резкие.

Мякоть белая, очень сочная, нежно-тающая, винно-кислая, не вяжущая, превосходного вкуса.

Осевой пустоты внутри нет. Семена большие, прямые, толстые, с длинным острием, бурые.

В Киевской губ. отличаются большой стойкостью к холоду и в нормально холодные зимы, с морозами не ниже -26°R, не наблюдалось морозобоин даже у молодых деревцов. В суровую же зиму 1910-1911 гг., с морозами даже несколько ниже -30°R, было смерзание до уровня снега не только 1-2 летних экземпляров, но и более взрослых деревьев.

К числу недостатков плодов этого сорта надо отнести их "раскосость", т.е. большую разницу по величине и форме, благодаря чему много экземпляров может отходить в низкие сорта и даже брак.

Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 191-193./ считает достоинствами этого сорта: урожайность и холодостойкость деревьев и великолепный вкус плодов, а недостатками: Очень большую требовательность деревьев к внимательному и правильному уходу и сильную поражаемость /как и плодов/ паршей и неоднородность /раскосость/ плодов.

Г.А.Каблучко /"Сорта плодовых культур Молдавии", изд. 1953 г., стр. 296-298./ говорит: "Арданпон, Превосходная зимняя, Масляная зимняя, или Фердинанд, - ценный зимний сорт груш. Арданпон в Молдавии имеет наибольшее распространение из всех зимних сортов, за исключением Кюре и из летних - Чудинки и Лимонки. Арданпон принадлежит к самым ценным среднезимним сортам груш Молдавии. В первую половину зимы нет другого сорта, который мог бы конкурировать с ним.

Бера Фердинанд полосатая. Вейче d'Havdenpont panache.

Образцы от Варшавского помологического сада. Помологическое определение: бера.

Величина плодов более средней. Форма неправильная, грушевидная, кособокая, на половине усеченно-коническая, с сильными граневидными ребрами и широкой косой верхушкой, по бокам с ребристыми бугровидными выступами, к основанию коническая с неправильным перехватом.

Верхняя ямка широкая, глубокая, по краям очень неровная от узких борозд, отходящих от чашечки и переходящих за края на верхушку и бока, без складок. Чашечка полуоткрытая; листики бурые, длинные, почти сомкнутые. Нижняя ямка правильно угловатая или косая, с мелкими бороздками. Ножка тонкая, длиной менее половины высоты плода.

Кожа тонкая, нежная, тусклая, не жирная, мелко-шагреневатая, (по большей части) совершенно-однответная, (но на зеленой окраске бывают белые полоски,) зеленовато-желтая или почти лимонно-желтая; ~~не~~ грязноватая от мелких буроватых возвышений шагреневатой поверхности. На ямках тонкий желто-бурый лучистый ржавый налет. Запаха нет.

Мякоть белая, нежная, маслянистая, без каменистостей и зернистости, сочная, чисто сладкая, но мало, несколько хрустит от ножа; вяжущая в большой степени, слабо пряная.

Несортный сорт. Плоды поспевают в лежке в начале [средине] ноября, потом мякоть становится постепенно мучнистой.

Delices d'Hardenpont d'Angers.

Образцы от Варшавского помологического сада.

Величина более средней. Форма продолговатая, грушевидная, в верхней половине усеченно-коническая, с тупой верхушкой, с неравномерно-угловатыми ребрами, в верхней остро-коническая, с острием у ножки.

Верхняя ямка неправильная, углубленная, сильно бороздчатая и ребристая, с переходами ребристых складок в неровные ребристые подъемы. Чашечка большая, открытая, с короткими черными гладкими листиками. Подъемы переходят в угловатые ребра, а борозды продолжаются лучисто на бока, где ребра выдаются округлыми буграми. Около конической части сильные перехваты. Нижней ямки совсем нет. Ножка длинная, равная половине высоты плода.

Кожа тонкая, нежная, слабо блестящая, не жирная, мелко-шагреневатая, одноцветная, желтовато-зеленая, с очень частыми мелкими серыми подкожными точками. В верхней ямке тонкий бурый покров. Запах слабый.

Мякоть белая, около чашечки каменистая, около гнезд зернистая и волокнистая, но тающая, очень сахаристая, без всякой кислоты, немного вяжущая, с небольшой пряностью, не маслянистая. Немного хрустит под ножом.

Гнезда с щелями, имеется осевая пустота. Семена толстые, острые, бурые.

Отличный десертный сорт. Плоды крепко держатся в хранении, не портясь только мякоть становится мягкой от совершенно здоровой снаружи к более внутренней части. Созревают в половине [конце] ноября.

Бергамот ананасный.

Образцы плодов от Дядюни из Калужской губ. Помологическое определение: бергамот.

Величина плодов меньше средней и малая.

Форма округлая, по бокам с округлыми слабыми выступами, к ножке с сильным боковым выростом, поднимающим мякоть на половине плода в виде конуса, но на другой стороне вдавление.

Верхняя ямка широкая, плоская, мелкая, неправильная от борозд, с очень мелкими короткими ребристыми складочками. Листики чашечки гладкие, широкие, короткие, открытые. Ножка тонкая, равная по длине высоте плода.

Кожа тусклая, немного шершавая от мелких ржавых точек, светло-зеленая, при созревании желтоватая, на солнечной стороне с легким мутно-розовым румянцем. Точки мелкие, частые, бурые, местами сетчато-пятнистый ржавый налет.

Мякоть белая, рыхлая, мало-сочная, совсем испортившаяся в конце сентября [начале октября], однако заметна большая крупитчатость и сладковатость.

Замечено, что в неурожайные годы плоды покрываются пятнами.

Образцы плодов от Гудкова в Смоленске.

Величина плодов средняя. Форма плоская, к ножке несколько суженная, неправильная, без ребер, с плоской широкой верхушкой.

Верхняя ямка очень широкая, немного углубленная, выточенная, без всяких складок. Чашечка открытая, звездчатая, глубоко входящая. Нижняя ямка вдавленная, с большим выростом при короткой ножке.

Кожа тусклая, сухая, плотная, желтовато-зеленая, сначала совершенно зеленая, одноцветная, с редкими серыми и бурыми точками, на верхушке с ржавым буроватым налетом, где плод трескается в сырое и прохладное лето также, как у Сапежанки.

Мякоть белая, плотная, мало сочная, каменистая, мало сладкая, вяжущая.

Плоды поспевают во второй половине сентября [в первой половине октября].

Полубергамотный сорт, более компотный и кухонный, но не десертный.

Бергамот зеленый.
Ст. Утемено, Калужской губ.
Образцы плодов от Сапунова. Помологическое определение:

Величина плодов менее средней и малая.

Форма округло-репчатая, неправильная, с тупой, косой и неровной верхушкой и плоским или неправильно-коническим небольшим основанием с боковым выростом и складками мякоти при ножке, по бокам с несколькими выдающимися округлостями.

Верхняя ямка очень широкая, занимающая широкую верхушку, неровная от борозд, с слабыми низкими и широкими ребристыми складками или без них. Листики чашечки короткие, гладкие, полуоткрытые. Ямки при ножке нет; вместо нее с одной стороны, противоположной боковому выросту, поперечное складчатое вдавление. Ножка короткая, толстая, равная половине высоты плода или менее ее.

Кожа гладкая, сильно блестящая, светлого травяно-зеленого цвета, на солнечной стороне с слабой мутноватой краснотой. Подкожные точки очень частые, белые, просвечивающиеся; ржавых нет, как и налета. При созревании в начале [средине] сентября кожа немного желтеет.

Мякоть белая, в конце сентября [начале октября] испортившаяся, но ясно крупитчатая и мало сладкая.

Деревья этого сорта встречаются в саратовских садах, Они очень плодоносны. Среди местных сортов груш это один из лучших. Плоды созревают позже других, в конце августа [начале сентября].

Величина плодов менее средней. Форма низкая типично бергамотная, плоско-округлая, правильная, Верхняя ямка средне-углубленная, нижняя несколько мельче верхней. Ножка средней толщины, прямая, длиной в половину высоты плода.

Кожа очень толстая, основной зеленой окраски, с более темными местами около подкожных точек и буро-красным цветом на солнечной стороне. На коже сизый налет.

Мякоть полутающая, сладкая, без плохого привкуса и без пряности, но около семян сильно-каменистая. Семена в значительном количестве, темно-коричневые.

Бергамот зимний. Bergamota Zimowa.

Образцы плодов от М.Э.Гейштора из из имения Шальтуне, Мариампольского уезда, Сувалкской губ. Помологическое определение: бергамот.

Величина плодов средняя. Форма репкообразная, бергамотная, плосконическая, с тупой широкой верхушкой и тупым более суженным основанием, по бокам правильная с боковым мясистым выростом.

Верхняя ямка мелкая, широкая, плоская, занимающая верхушку, с мелкими ребристыми складками и без них. Листики чашечки короткие, открытые. Ямка при ножке широкая, глубокая, правильная, только с одной стороны с округлым боковым выростом. Ножка тонкая, равная половине высоты плода.

Кожа тусклая, светло-зеленая, на солнечной стороне слегка желтоватая, шершавая от частых мелких серых точек и рыжих охряно-желтых сетчатых пятен. Такого же цвета налет на плоской верхушке и на боковом выросте ножки.

Мякоть белая, не совсем тающая, сочная, но не очень сладковато-кисловатая, не вяжущая.

Семена средние, темно-бурые.

Требуется точное определение съемной зрелости плодов, чтобы плоды не были сняты впрозелень преждевременно, когда они в хранении не дают полного хорошего вкуса, а также нельзя их и передерживать, чтобы не уменьшить срок хранения и не ускорить перезревание. При последнем в начале [середине] октября мякоть становится внутри бурой, негодной для использования.

Сорт осенний.

осенний
Бергамот красный, Bergamotte rouge. Bergamotte d'automne, Rote Bergamotte.

Образцы получены от Кеппе из Прибалтики. Помологическое определение: бергамот.

Величина плодов менее средней и малая. Форма плоско-округлая или плоско-коническая, с широкой тупой верхушкой и широким основанием, весьма правильная, иногда на верхушке с несколькими слабыми бороздами.

Верхняя ямка ровная, плоская, мелкая, с неправильно выросшими ребристыми бугорками вместо складок. Листики чашечки гладкие, полуоткрытые, короткие. Ямка при ножке углубленная или глубокая, бороздчатая. Ножка тонкая, равная половине высоты плода.

Кожа шершавая от множества мелких серых ржавых точек и сероватых ржавых пятен. На верхушке сплошной серый налет, иногда жесткий, с трещинами, при ямке около ножки большая серо-бурая ржавчина. Цвет [кожи] травяно-зеленый или светло-зеленый, иногда с мутной краснотой на солнечной стороне.

Мякоть белая, таящая, хорошего качества.

Плоды держатся до конца сентября, начала октября [начала, средины октября].

Деревья сильнорослые, с высокопирамидальной кроной и довольно редко расположенными ветками, выносливые и достаточно морозостойкие. На обыкновенных подвоях начинают плодоносить с 7-8 года. Урожайность хорошая.

Осенний сорт, заслуживающий распространения в средней полосе вследствие своих положительных качеств деревьев и плодов.

Г. А. Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 188-190./ пишет, что прививка удается на груше и айве. Рост сильный. Деревья выносливые, урожайные, долговечные. На сухих почвах не удаются. Плоды очень крепко держатся на ветках, перезревшие никогда не делаются мучнистыми.

Это самый известный сорт столового качества из группы бергамотов. В Курской области разводится Бергамот курский, разновидность вышеописанного, с плодами средней величины, созревающими в лежке в половине ноября и сохраняющимися до половины декабря и в Воронежской области - Бергамот воронежский, с плодами мелкими, созревающими в сентябре и деревьями менее выносливыми, чем Бергамота курского.

4) В.К.Заец /"Сорта плодовых и ягодных культур", изд. 1953 г., стр. 279-280./ пишет, что этот старинный русский сорт в средней полосе СССР занимает третье место после Бессемянки и Тонковетки и введен в стандартный сортимент ряда областей этой полосы. Кроме разновидностей Бергамота Курского и Воронежского в районах Поволжья имеются свои формы Бергамота волжского. Там же В.К.Заец говорит о Бергамоте летнем красном, который является местным средне-волжским сортом, встречается в садах Куйбышевской области и введен там в стандартный сортимент. Этот сорт более зимостоек, чем Бергамот осенний красный и приносит ежегодно высокие урожаи.

2) Н.И.Кичунов, описывая в журнале "Плодоводство" за 1894 г. [Курские груши] на стр. 66 говорит, что Красный бергамот один из лучших местных сортов, так как при хорошем хранении его плоды могут долежать до декабря [до половины декабря] и даже несколько позже. Мякоть вкусная, хотя и не тающая, подходящая к полубергамотам. Плоды пригодны в пищу уже в первой половине [второй половине] сентября.

5. _Юматовская._

Образцы плодов от Рего /Коровчино, Горецкого у., Могилевской губ./.

Помологическое определение: бергамот.

Величина плодов малая. Длина 1 7/8 д. [4,7 см] , ширина около 2 д. [5 см]. Форма плоская, к верхушке неправильно ребристо-бугристая, к ножке характерно узкая, сплюснутая, плосковатая. Верхняя ямка с большими бугристыми выростами. Чашечка открытая, очень неправильная, с отогнутыми листиками; подчашечная ямка внутренняя, скрытая. Ножка короткая, в половину высоты плода.

Кожа зеленая, на солнечной стороне мутно-красная, с светлыми точками.

Мякоть удовлетворительного качества.

Сорт осеннего поспевания.

Бергамот летний.

Образцы плодов от Привальневой из Смоленской губ. Помологическое определение: круглая винная.

Величина плодов малая. Форма шаровидная, несколько приплюснутая на темени, ровная без ребер.

Верхняя ямка плоская, мелкая, без складок. Чашечка открытая, звездчатая из узких серых листиков. Нижней ямки совсем нет.

Кожа не жирная, блестящая, травяно-зеленая, на солнечной стороне светло-зеленая, совершенно одноцветная. Подкожные точки очень мелкие, серые, ржавые. Ножка прямая, короткая, равная половине высоты плода. Запаха нет.

Мякоть белая, зеленоватая, плотная и твердая до половины [конца] сентября, грубо-зернистая и каменистая около гнезд, в это время как кочерыжка, мало сочная и с очень малой сладостью, кажется незрелой, однако семена совсем зрелые. Затем происходит размягчение мякоти, но она скоро делается водянистой, буреет и загнивает.

Срок использования плодов в свежем виде очень короткий. Сорт скорее поздне-летний и даже осенний.

Бергамот лифляндский.

Образцы плодов от И.К.Мороза /ст. Бочейково, Витебской губ./. Помологическое определение: бергамот.

Величина плодов средняя и менее. Форма плоская с тупой верхушкой, к ножке неправильно-коническая, с характерными широкими бороздами на краях обеих ямок.

Верхняя ямка глубокая, широкая, с широкими ребристыми складками. Чашечка открытая, из узких коротких черных листиков. Нижняя ямка также глубокая, бороздчатая. Ножка прямая.

Кожа толстая, сухая, тусклая, [в зрелости] светлого грязновато-желтого цвета с нерезкими зелеными и ржавыми точками, которые более [многочисленны] вблизи верхней ямки, покрытой тонкой лучистой желтой ржавчиной.

Мякоть держится до начала или средины сентября [средины или конца сентября], когда пригодна для использования, а затем в конце сентября [начале октября] портится, делается внутри и у ножки бурой и под кожей мучнистой.

Перехожу к образцам из Горецкого [Могилевской губ.] фруктового сада.

Величина плодов средняя. Форма репчатая, яблоковидная, с широкой тупой верхушкой, к ножке немного суженная, тупо-плоская, весьма правильная, без выростов по бокам. Основание тупое, бороздчатое или неровное от борозд и ребристых выростов. Ямка при ножке [нижняя ямка] глубокая, немного неправильная от малого бокового в ней выроста, отклоняющего в ней ножку несколько вбок. Ножка короткая, прямая. Причашечная ямка плоская, немного углубленная, часто неправильная от широких больших ребристых складок и борозд, переходящих на верхушку, которая представляет собой всю ямку. Листики чашечки короткие открытые или полуоткрытые, отогнутые вбок боковым выростом.

Кожа тусклая, с налетом, потом немного жирная, блестящая, в зрелости светло-желтая или лимонная, на солнечной стороне с киноварево-красным румянцем с красными правильно расположенными значками, которые на теневой стороне (и на нее последовательно переходят) также правильно распола-

См. на обороте:

(у основания и на верхушке лучистый розовый налет.

женные в виде крапчатости и слабой полосатости; шероховатости нет. Подкожные точки частые, мелкие, ржаво-желтые; румянец состоит из розовых точек.

Съемочная зрелость в конце августа [половине сентября]. Плоды, снятые зелеными, дозревают в хрании, получая красивую окраску лимонного цвета с румянцем.

Мякоть белая, немного желтоватая, крупитчатая, с мелкими хрупкими зернами, довольно плотная, совсем не тающая, разделяющаяся на зерна, не очень сочная, мало сладкая, немного вяжущая, с сильным бергамотным ароматом и пряностью, несколько каменистая только в одном комочке под чашечкой; в нее проходит подчашечная трубка, входящая на четверть высоты плода внутрь его.

Плоды, снятые зелеными, держатся около недели, затем размокают и внутри буреют, делаясь непригодными для использования.

Деревья имеют низкий усадистый [короткий сильный] рост. Кроны густо разветвленные. Штамбы сильно страдают от огневицы, но все ветви кроны остаются целыми. От огневицы деревья гибнут. Поэтому необходимо делать прививку в крону на выносливый штамб.

Молодые побеги толстые, светло-бурые с характерным серым налетом, а молодые ветки /2 летние/ серые с большими чечевичками.

Листья особые, синеватые [сизоватые] от волосистости на верхней стороне, овальные, с острием, мелко-зубчатые по краям, с короткими черешками, только в половину длины пластинки.

В суровую зиму 1893 г. пострадали сучья с их ветками, а также и ростовые молодые побеги. Была сделана короткая обрезка и оборваны цветы, чтобы не обессиливать деревья. Три дерева этого сорта погибли в 1896/7 г. после зимы.

В 1897 г. 8 /21/ августа созрели плоды.

Бергамот полосатый.

Образцы плодов из Смоленской губ., от Рубца.

Величина плодов менее средней. Форма плоская или округлая, коническая к тупой верхушке, от которой по краям ямки идут слабые ребровидные возвышения, составляющие продолжение складок верхней ямки. Чашечка открытая, звездчатая, из черных узких листиков. Нижняя ямка с плоским основанием, или ямки совсем нет. Ножка тонкая, длиной в половину высоты плода. Иногда бока округло-угловатые, с небольшими бороздами.

Кожа толстая, плотная, блестящая, не жирная, желтовато-зеленая, на солнечной стороне с мутным коричнево-красным румянцем, на котором заметны неясные полоски. Подкожные точки очень частые, белые просвечивающиеся, резкие на румянце. Запаха нет.

Мякоть белая, сочная, зернистая и каменистая, мало сладкая, скоро делающаяся водянистой.

Плоды созревают во второй половине сентября [начале октября].

Бергамот румяный.

Образцы плодов от К.П.Клейнмихеля из Твни, Обоянского уезда, Курской губ. Помологическое определение: бергамот.

Величина плодов менее средней и малая. Форма плоская, иногда с 5 мало заметными округлыми ребрами или с 1-2 округлыми выступами на боках, несколько неравнобокая, с тупой широкой верхушкой.

Верхняя ямка углубленная, слабо бороздчатая или с широкими ребристыми складками. Чашечка открытая, с короткими черными листиками. Основание округлое. Нижней ямки нет или она в виде кольцевого углубления, иногда сбоку с мясистым выростом. Ножка толстая, короткая.

Кожа толстая, тусклая, немного жирная и лоснящаяся, темно-зеленая, на солнечной стороне несколько желтоватая и на большей части с разлитым мутнокрасным румянцем с очень неясными размытыми полосками, но с частыми белыми форелевыми точками. На некоторых местах очень мелкие ржавые точки, не просвечивающиеся, зеленые. Зеленая окраска кожи восковидная, как бы из подкрашенного воска, подобная окраске некоторых ренетов. Запаха нет.

Мякоть зеленоватая, около гнезд зернистая, около чашечки каменистая, сочная, сладкая и пряная. 20 августа 2 сентября совсем бурая, так что сорт даже в 1899 г. в неблагоприятное лето созрел к 15 /28/ августа. Семена средние, клиновидные, острые, черно-бурые.

Летний сорт. Плоды пригодны для использования в свежем виде.

V

Бергамот серый осенний, Bergamotte gris d'automne.

Образцы плодов от Варшавского помологического сада. Помологическое определение: бера.

Величина плодов менее средней. Форма яйцевидная, с притупленно-округлой верхушкой, без ребер, с узко-коническим основанием и слабым при нем поперечным перехватом.

Верхняя ямка широкая, мелкая, с сглаженными короткими складками и без них, почти ровная. Чашечка большая, неправильная. Листики чашечки короткие, черно-бурые, сильно открытые. Нижняя ямка с слабым кольцевым вдавлением, косая. Ножка тонкая, длинная.

Кожа толстая, плотная, тусклая, шершавая, шагреневатая, желтовато-зеленая, на солнечной стороне с мутной и слабой желтоватой красностой. Верхняя ямка, основание и солнечный бок с тонким бурым ржавым покровом, на прочих местах бурые сетчатые пятна. Подкожные точки мелкие, редкие, бурые, местами среди пятен незаметные. Запаха нет.

Мякоть белая, без каменистости и почти без зернистости, тающая, немного зерноватая, но почти сливочная, сладкая, с порядочной сладостью, очень сочная.

Семена широкие, короткие, плоские, с малым носиком.

Плоды поспевают в лежке в половине [конце] октября.

Бергамот серо-зеленый.

1. Образцы От Бохвица из Минской губ. Помологическое определение: бергамот.

Величина плодов малая или почим средняя. Форма репчатая, широкая и тупая при чашечке, округлая к ножке, часто с низкими выростами по бокам. Верхушка широкая плоская, ровная. Верхняя ямка мелкая, плоская. Листики [чашечки] короткие, широкие, пушистые, полуоткрытые. При ножке ямки нет. Ножка средней толщины, равная половине высоты плода.

Кожа тусклая, толстая, плотная, шершавая, как бы шагреневая, травяно-зеленая, на большей части с мутным серым кровяно-красным разлитым румянцем, на котором резко выделяются частые серые ржавые точки. По всему плоду тонкий серый ржавый налет. Запах эфирно-грушевый.

Мякоть белая; вокруг гнезд каменистая, сладкая, тающая, несколько вяжущая, очень сочная.

Семена плоские, бурые.

Плоды созревают к сентябрю [к половине сентября] и хорошо держатся до конца сентября [средины октября].

2. Н.И.Кичунов в журнале "Плодоводство" за 1894 г. на стр. 66 в своем описании курских груш говорит, что плоды Серого бергамота поспевают в начале [средине] сентября и не держатся более двух недель. Кожа остается зеленой, с слабым тусклым румянцем на солнечной стороне. Мякоть внизу около кожи зеленоватая. Деревья достигают больших размеров и образуют круглую, раскидистую крону.

Н.И.Кичунов от предыдущего сорта отличает Белый бергамот, с небольшими плодами, поспевающими в конце августа [начале сентября]; кожа в зрелости желтеет и плоды держатся недолго. Мякоть плодов белая, невысокого качества; хотя и съедобна в сыром виде, но этот сорт более пригоден для хозяйственного использования.

Бергамот французский.

Образцы плодов от Щербатовых /Почт. ст. Терны, Харьковской губ./.

Помологическое определение: бергамот.

Величина плодов больше средней. Форма к верхушке плоская, с широкой верхней ямкой, к основанию коническая, неравнобокая, без боковых выростов, с узкой нижней ямкой. Вдоль плода небольшие сглаженные неправильные ребра. Верхняя ямка глубокая с несколькими ребристыми складками, без ржавчины, с сомкнутой чашечкой. Ножка тонкая, длиной более половины высоты плода, на конце загнутая.

Кожа тонкая, маслянистая, лоснящаяся, светло-зеленая, к зрелости немного желтеющая, с частыми мелкими темно-зелеными подкожными точками. Запах слабый.

Мякоть белая, рыхлая, сочная, около чашечки и гнезд грубо каменистая, мягкая, винно-кислая, сахаристая, пряная, совершенно тающая, в сосудистых пучках волокнистая, зернистая.

Плоды созревают от 7 по 15 /22-28/ сентября. Но в это время они уже страдают от пересылки, образуя мягкие ударные пятна. Поэтому требуют хорошей упаковки. Во время хранения плоды часто портятся около ножки, которая выпадает.

Осенний сорт, вполне пригодный для использования плодов в свежем состоянии.

Бергамот черкесский.

Образцы плодов из Туапсинского округа, Черноморской губ. в старых черкесских садах. Помологическое определение: бергамот.

Величина плодов Средняя. Форма округло-коническая, заостренная к ножке, иногда с крупными буграми, делающими плод неправильным. Чашечка открытая, в мелкой ямке с ребристыми складками. Ножка толстая, равная половине высоты плода, иногда кривая, отогнутая в сторону, в мелкой нижней ямке.

Кожица грубая, с многочисленными серыми [подкожными] точками, сначала [при созревании] зеленоватая, потом желтовато-зеленая, около чашечки и в верхней ямке с серо-бурой ржавчиной. Румянца нет.

Мякоть белая, твердая, сочная, сладкая, несколько вяжущая, после сушки получается отличный сладкий вкус. сушеного продукта

Созревание плодов в начале [средине] августа. Для сохранения от сбивания ветром плоды снимаются ранее зрелости, в просто устроенные сумки. Плоды используются на сушку. Сухие груши сбываются в Кубанских казачьих станицах. При улучшенной сушке получается почти прозрачный продукт, который может иметь весьма большое торговое значение. Кроме того, плоды также пригодны для разных консервов и сидра [плодового вина].

Деревья долговечные, сильного роста, выдерживают всякие невзгоды и дают обильные урожаи, при которых [в защищенных местах] и плоды держатся и не сбиваются ветром. Урожаи приносятся через год. Молодые побеги с малыми глазками [почками]. Листья овальные, цельнокрайние. В вышеуказанной мастности считается, что деревья хорошо растут там, где имеются дикие груши.

~~108~~-163 Poire Espéren,

Бергамот Эсперена. Bergamotte Espéren, (Esperens Bergamotte.

Образцы плодов от Лейениака из Курляндской губ. [Латвии]. Помологическое определение: бергамот.

Величина плодов малая. Форма репообразная или бергамотная, плосконическая, с широкой тупой верхушкой и тупым основанием, неровным от ребристых выростов, из которых один сильнее прочих.

Верхняя ямка мелкая, плоская, расположенная на верхушке, иногда ровная, как бы выточенная, но часто с несколькими бороздками, идущими на верхушку и бока. Листики чашечки широкие, пушистые, полуоткрытые или открытые. Нижняя ямка глубоко вдавленная, бороздчатая, часто косая, с неровными выростами. Ножка тонкая, короткая, длиной менее половины высоты плода.

Кожа травяно-зеленая, при созревании несколько беловатая или желтоватая, на солнечной стороне с небольшим мутно или серо-красным румянцем, с резкими частыми серыми и серо-зелеными точками, в ямках верхушки и ножки с желто-серым ржавым налетом.

Мякоть белая, сочная, тающая, сахаристая, не вяжущая, около гнезд зернистая, немного пряная.

Семена небольшие, темнобурые, зрелые в половине [конце] октября.

Хороший столовый сорт, достойный разведения, однако это осенняя, а не зимняя груша. Плоды поспевают в начале [середине] октября.

Образцы от Варшавского помологического сада.

Величина плодов средняя. Форма плоская, к основанию несколько суженная или округлая, сверху широкая, тупая, без выпуклостей и ребер, правильная.

Верхняя ямка широкая, плоская, с короткими широкими ребристыми складками и без них. Листики чашечки черные, полуоткрытые. Нижняя ямка малая углубленная. Ножка толстая, короткая.

Кожа толстая, плотная, шершавая, мелко-шагреневатая, очень красивого травяно-зеленого, почти изумрудного цвета, с частыми резкими серыми подкожными точками. На верхушке, сбоку и у нижней ямки сильный серо-бурый,

См. на обороте:

отливающий золотистостью ржавый налет и на боках сероватые точки. Запаха нет.

Мякоть белая, под кожей зеленоватая. 13 [26] октября плоды начинают быть снаружи несколько мягкими, но внутри совсем еще незрелые. Мякоть еще мало-сочная, плотная, каменистая около чашечки и зернистая около гнезд, травянистая, репного вида.

Семена толстые, короткие, широкие, с тонким носиком.

Превосходный зимний сорт.

2. Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 504-506/ пишет, что деревья данного сорта пирамидального склада, в Киевской губ. безусловно здоровые и очень стойко переносят зимние стужи даже ниже - 27° R., имеют умерено-сильнный рост и плодоносят через год. По мнению Л.В.Капустина при значительной культуре этого сорта следует сажать деревья отдельным кварталом, чтобы лучше регулировать полив, так как от излишка влаги штамбы сильно болеют и даже погибают деревья.

Сорт нередко встречается в наших южных садах, но обычно в количестве немногих экземпляров.

3. Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 209-210./ считает этот сорт самым известным из европейских бергамотов, с плодами отличного десертного вкуса. Особенно высокого качества плоды получаются в Узбекистане. Его достоинства: урожайность и сравнительная холодостойкость деревьев, а также великолепный вкус плодов.

Бессемянка.

Нрзвание сорт получил по отсутствию семян в гнездах; этот признак указывает на происхождение из семян какого-нибудь иностранного сорта, размножавшегося долгое время путем прививки. Думают также, что бессемянность могла произойти от раскалывания штамба, удаления сердцевины и затем сращивания расколотых продольных половин, что практикуется для получается бессемянного винограда и бескосточкой вишни.

Красноглазов /Прав[ила] плод[оводства], стр. 96/ говорит, что Бессемянка в Москве называлась Сахарной грушей и получила свое название в его время, когда стала привозиться из Украины. По его описанию, это превосходная груша, не уступающая по вкусу бергамоту, отменно сладка, сочна и мягкотела, не может лежать более 3-х недель и то, если снята зеленою, в погребе на снегу сохраняется до 6 недель. Дерево пирамидального роста с круглыми листьями и круглыми почками на побегах, чем отличается будто бы от всех других груш; выносливость дерева доходит только до - 27° Р. [= 33,7° Ц.]. Плодоношение обильное, наступающее на 5-м году. Грелль /Дох[одное] Плод[оводство], стр. 137/ к этому описанию Красноглазова добавляет, что Бессемянка в Москве часто страдает от морозов в сельских садах, лучше держится в городских и южнее Москвы.

Краткое помологическое описание Бессемянки сделано Н. Лодыгиным /Журн[ал] сад[оводство] 1863 г., стр. 217/ с приложением хорошего хромолитографного рисунка типичного плода, но лист вместо светло-зеленого нарисован темно-зеленым, также неверной окраски кора и почки молодого побега. По словам Лодыгина, Бессемянка, бесспорно, достойна занимать первое место в ряду русских сортов груш. По крайней мере, из сортов, разводимых в средней полосе России, только один Бергамот арабский или золотой /ныне уже неразводимый/ может соперничать с нею, но он далеко не так плодоносен, не так прочен для перевозки и страдает в суровые зимы.

Достоинства Бессемянки по Лодыгину заключаются: 1/ в ее превосходном вкусе плодов, делающем ее одним из лучших десертных фруктов; 2/ в ее относительной прочности, ибо плоды, снятые с дерева до совершенной зре-

лости, в конце августа [в начале сентября н.ст.], легко могут быть перевозимы на значительные расстояния, например до 400-500 верст [427-533 км], а водою и далее; 3/ по плодородию и сносливости деревьев Бессемянка разводится даже в северо-восточных губерниях, например в Симбирской [Ульяновской обл.], Казанской [Татарской АССР], где не разводят никаких других сортов груш и где не вызревают сливы. В суровые зимы 1859-61 гг. в Елецком уезде [Орловской обл.] сильно пострадали не только Бергамот арабский, но даже тонковетка и многие другие самые обыкновенные сорта груш, совершенно уцелела одна Бессемянка. Рекомендовать разведение Бессемянки нет надобности: в средней полосе России не встретишь ни одного сада, в котором бы не было хотя нескольких деревьев Бессемянки, а в доходных промышленных садах она играет главнейшую роль. Лоджин относит Бессемянку к круглым осенним таящим грушам.

Помол[огическое] опред[еление]: полубергамот.

Величина менее средней. Вышина обыкновенных плодов 2 1/4 д. [5,7 см]; ширина такая же или немного менее или более.

Форма бергамотовидная: в верхней половине округлая, в нижней коническая вдавленная, у типичных форм с несколько расширенным основанием, по бокам с небольшими округлыми выступами.

Верхняя ямка малая, мелкая, с открытой неразвитой чашечкой с короткими сухими листочками [чашелистиками]. Около чашечки 10 слабых узких ребристых складок, переходящих на верхушку. Редко вместо промежуточных складок небольшие мясистые бугорки /перлы/. Нижняя ямка мелкая, часто косая, гладкая, с кольцевидными складками. [Плодо]ножка тонкая, кривая, равная половине высоты плода.

Кожа [кожица] плотная, сухая, матовая, при трении блестящая, не пахучая, у незрелого плода травяно-зеленая, у зрелого в лежке желтеющая, светло-желтая, на солнечной стороне с мутным киноварным румянцем в виде неясных полос и пятен. Подкожные точки ржавые, мелкие, серне, многочисленные, не придающие коже жесткости или шероховатости. Иногда бывают серые неправильные ржавые пятна. Запах только у зрелых плодов.

Мякоть белая или слегка желтоватая, около чашечки с каменистой, около гнезд с мягкой грануляцией, сочная, у зеленых незрелых плодов плотная, раскалывающаяся, как у кочерыжки, сладковатая или слабо сахаристая, грубо зернистая, без кислоты и без вяжущего вкуса, также без пряности. У зрелых, желтоватых, особенно румяных плодов мякоть очень сочная, сладкая, с небольшой эфирно-грушевой пряностью, почти тающая или полутающая, при чем каменистость и зернистость не портят вкуса.

Семенные гнезда узкие, в виде сомкнутых щелей, без семян, редко в одном или в двух гнездах по одному семени. Семена толстые, короткие, черные. Подчашечная трубка широкая, малая, воронковидная, с тонким носиком, который никогда не соединяется с веретенообразным узким осевым каналом.

Сорт осенний. Съем плодов следует за Сапеганкой, которая к концу августа [началу сентября] в нашей местности [г. Горки, Могилевской губ.] отходит, сменяясь Бессемянкой. Созревание и готовность к употреблению начинаются в начале сентября [в половине сентября н.с.], когда собирается эта группа одновременно с осенними и зимними сортами яблок. Снятые плоды без всякой порчи могут держаться в комнате с неделю, в подвале 2-3 недели, до конца сентября [половины октября н.ст.]. Только зрелые плоды могут быть десертными, притом второго качества, так как им недостает нежности мякоти. В полузрелом виде они идут для кухонного употребления и для сушки, но сладкие сушеные груши получаются только из зрелых плодов, напротив для компота лучше выбирать плотные, незрелые плоды. Несмотря на второстепенное вкусовое достоинство, Бессемянка в средней России составляет среди остальных разводимых сортов наилучший десертный сорт, который стоит однако ниже Бергамота красного осеннего, а тем более Веры лифляндской. Плоды никогда не страдают от сажистого грибка /*Fusicladium*/ [парши], не покрываются пятнами и не трескаются даже в сырое и холодное лето. Кроме того, урожай их бывает почти каждогодный, как у Тонковетки и Магдалинки, вместе с которыми Бессемянка составляет доходный сорт, разводимый для торговли в промышленных садах.

Область распространения Бессемянки громадная. Она почти совпадает с областью разведения яблони Антоновки, при которой Бессемянка в доходных промышленных садах часто является неизменной спутницей. Деревца Бессемянки выращиваются без прикрытия на зиму даже в Ярославле /в питомнике Кокуева/ вместе с Сапеганкой и Лимонкой. Северная граница разведения Бессемянки в доходных промышленных садах , по-видимому, проходит через губернии: Псковскую, Тверскую, Московскую и Симбирскую [области: Псковскую, Калининскую, Московскую и Ульяновскую]. Здесь Бессемянка не выдерживает только суровые зимы, но вынослива в защищенных местах. Южная граница, вероятно проходит от Вильно [Вильнюс] на Минск, Могилев и Курск, южнее границы промышленного разведения груши. Несомненно, что Бессемянка предпочитается в северных и даже средних черноземных губерниях /например в Воронежской/ всем остальным сортам груш. Причиной такого широкого распространения этой груши служит ее выносливость и плодовитость, но не отличное качество фруктов, которому остается многое желать. Можно сказать, что до сих пор [начало XX ст.] средняя Россия, выработавшая отличные сорта яблок, не обращала внимания на выведение более лучшего и вместе с тем выносливого сорта груш.

Рост молодых деревцов довольно сильный, но побеги и штамб часто получаются тонкими, особенно на слабых дичках. Сравнительно с Фунтовой грушей /бабой/, отличающейся необычайно толстыми побегами, у Бессемянки побеги вдвое тоньше, но больше и крепче, чем у малорослой Беры лифляндской. В питомнике деревца выращиваются скорее и успешнее многих сортов яблонь, перед которыми Бессемянка имеет большое преимущество по росту, рано распуская почки и давая более сильные побеги. Молодые побеги длинные, желто-бурые, гладкие, с мелкими беловатыми чечевичками. Молодые ветви серо-бурые с крупными белыми чечевичками. Листья средние, правильно овальные, с заостренной верхушкой, по краям цельные или с мелкими зубчиками, до половины лета отличаются бледно-зеленой, несколько желтоватой окраской, которая темнеет с одревеснением побегов во второй половине лета. Часто листья бывают скручены, с поднятыми вверх и перегнутыми по главной жилке краями. Больших деревьев, как это бывает у Сапеган-

ки и Ильинки [вернее Тонковетки] , Бессемянка не образует и в нашем крае [Белоруссии] я их не видел. Деревья в возрасте около 40 лет однако достигают 3 сажен [6,4 м] роста, получают густую и красивую широко пирамидальную крону, которая нуждается в прореживании.

Изменением сорта можно считать иногда встречающуюся разность, плоды которой с развитыми гнездами и всегда приносят семена. Форма этой разности более широкая, кубаревидная, с остро-коническим заострением к плодоножке и, вследствие этого, с меньшей нижней ямкой, верхушка с слабыми узкими ребрами, идущими от промежуточных складок, тогда как главные складки, расположенные против листиков чашечки, имеют вид бугорков. Впрочем, слабая ребристость на верхушке бывает иногда и у типичных бессемянных форм.

Это описание составлено М.В.Рытовым для "Атласа плодов", издание 1906 г. В "Атласе плодов" оно несколько несущественно изменено.

Г.А.Рубцов /"Груша, изд. 2-ое, 1937 г., стр. 162./ пишет: "Рост сильный. Дерево выносливое, нетребовательное. Плодоношение раннее. Урожайность сильная. Плоды прочно висят на дереве. Устойчивы против грибных болезней. Лежат около 3 недель. Хорошо переносят транспорт. Пригодны для стола и хозяйственных целей. Самый распространенный на северных и центральных рынках сорт. Промышленный для всей северной половины РСФСР, где не могут разводиться европейские столовые груши. В суровые зимы иногда подмерзает".

Бессемянка, Sans pepins.

Образцы от Варшавского помологического сада.

Величина плодов большая. Форма продолговатая, грушевидная, с большой округлой кособокой нижней частью, с продольной вдоль плода вдавшейся бороздой, с половины или выше косо-коническая с поперечным вдавлением, тупой верхушкой и острым основанием, без ямки.

Верхняя ямка небольшая, мелкая, правильная, ровная, без складок и бороздок. Листики чашечки узкие, темные, паутинистые, пригнутые внутрь но открытые. Нижней ямки нет, даже кольцевого вдавления. Сбоку выросты отклоняющие толстую кривую короткую ножку, длиной в 1 д. [2,5 см].

Кожа слабо блестящая, гладкая, не жирная, совершенно однотонная, лимонно-желтая, грубо шагреневатая, с множеством мелких неясных серых подкожных точек. Вблизи чашечки и ножки тонкий бурый ржавый покров и на боках местами такой же покров.

Мякоть белая, нежная, сочная, тающая, сладковатая и чуть кисловатая без пряности, но с запахом древесных клопов.

Гнезда очень малые, без семян.

Плоды держатся [сохраняются] только до половины [конца] сентября и 25 сентября [8 октября] совсем портятся, начиная с гнезд, хотя снаружи мякоть и кожа держатся.

Бессемянка Ржиги, Riha's Kernlose Butterbirne.

Образцы от Л.П.Симиренко /Городище, Киевской губ./.

Величина плодов средняя. Форма продолговатая, на высоте половины плода овальная или яйцевидная, при верхушке с неровными небольшими ребровидными округлостями или сглаженными выростами; в нижней половине коническая.

Верхняя ямка небольшая, с сглаженными бороздами. Чашечка из бурых листиков, открытая. Нижняя ямка мелкая. Ножка короткая.

Кожа сухая, толстая, плотная, грязно-зеленоватая, с серо-желтой ржавчиной из пятен, сетчатости и мелких частых серых подкожных точек.

Мякоть белая, под кожей зеленоватая, плотная, довольно сочная и сладкая, но грубая и дающая при жевании безвкусную пресную массу.

А.Б. в журнале "Плодоводство" за 1896 г., стр. 287 пишет, что Бессемянка, маслянка Ржиги отличается в своих плодах совершенным отсутствием семян и даже семенного гнезда. Величина плодов большая. Кожица зеленовато-желтая с ржавыми пятнами. Мякоть вкусная, чрезвычайно сочная. Поспевание плодов в лежке в ноябре - декабре. Деревья очень плодовиты, сильного пирамидального роста, с светло-бурыми побегами и светло-зелеными листьями.

Бураковка, Красномдская. По-видимому относится к форме Armud
/гранатной/ Pyrus nivalis Jacq., Снеговой груши.
Образцы плодов из Обухова, Киевского уезда.

Величина плодов малая. Форма кубаревидная, кособокая, без выпуклостей, плоская на верхушке и косо утонченная у ножки. Верхняя ямка мелкая, правильная, с черной открытой чашечкой; впадины у нижней ямки мелкие, кольцевые. Ножка тонкая, длинная.

Кожа блестящая, зеленая с темным красным крапом и пятнами, не жирная, с мелкими едва заметными ржавыми [подкожными] точками.

Мякоть колкая, белая, вся с розовыми точками или вся розоватая, цветом как у бураков. Семенные гнезда треугольные. Семена большие черные, широкие, похожие на арбузные. Вкус мякоти вяжущий, кисловатый, без сладости, с эфирной пряностью.

Плоды зреют во второй половине июля [первой половине августа]. В конце бывают с зрелыми семенами. Держатся несколько дней.

Листья овальные или продолговато-овальные, цельнокрайние, без зубчиков, сверху тусклые или слабо блестящие.

Сорт мало заслуживающий культурного разведения.

Образцы из сада Н.М.Мирошниченко, Херсонской области с основной окраской плодов светло-оливковой. На солнечной стороне расплывчатые ржаво-кирпичные пятна, сливающиеся между собой. Подкожные точки мелкие, частые, зеленые. Имеется средний аромат. Кожица плотная.

Мякоть желтоватая, но у семенных камер розово-малиновая и в мякоть такая окраска распространяется почти на всю толщу. Она плотная, довольно сладкая и сочная.

Семена средней величины, коричневые.

Осенний сорт, пригодный для потребления в свежем виде.

VII

Williams,

Вильямс, Bon Chretien Williams, Bartlett, Williams Christenbirne

1. Образцы плодов от Горшкевича из Гродненской губ.

Величина плодов большая. Форма у верхушки широко-округлая, от 2/3 высоты заостренная в косой тупой конус с выдающимися боками. Верхушка ровная, иногда слабо бороздчатая. Верхняя ямка мелкая, ровная или с небольшими бороздками. Листики чашечки короткие, открытые. Ямка при ножке косая, вдающаяся, с боковым мясистым выростом. Ножка толстая, боковая, кривая, равная 1/4 высоты плода.

Кожа плотная, гладкая, немного блестящая, светло-желтая, на солнечной стороне оранжевая или светло-красновато-желтая, с частыми мелкими, не очень резкими серо-зелеными и зелеными подкожными точками. На верхушке при ямке и при ножке, изредка по бокам плода ржавые пятна и налеты желто-бурого цвета.

Мякоть белая, крупитчатая, крепкая, колкая, мало сочная, сладковатая, не вяжущая, крепкая в начале [средине] октября.

Хотя и достигает большой величины, но не получает полного достоинства сорта.

По Янковскому плоды готовятся [созревают] от половины августа до половины сентября [от конца августа до конца сентября]. Плоды довольно большой величины, при сильном урожае - средней. Форма плодов тупо обрубленная при ножке, мало суженная, при чашечке неровная, лоснящаяся, золотисто-желтая, с крапинками, с слабым румянцем. Кожа тонкая, с мускатным запахом, как и мякоть, которая сильно маслянистая. Один из лучших столовых сортов груш. Дерево растет скоро, но мало вырастает не формовой пирамидой, сильно плодоносит, на морозы чувствительно, требует теплого закрытого места.

2. Образцы от Дитриха из Калужской губ. с деревца, привитого на айве.

Величина плодов средняя. Форма округло-коническая, продолговатая, с почти правильным коническим заострением к ножке, по бокам с широкими, но слабыми округлостями.

Верхняя ямка малая, мелкая, с незначительными короткими ребристыми

См. на обороте:

складками или их следами. Листики чашечки короткие, полуоткрытые. Ямка при ножке мелкая, косая, с бугорками. Верхушка округлая, с широкими бороздками. Ножка средняя, длиной более половины высоты плода.

Кожа тусклая или слабо блестящая, зеленовато-желтая, при созревании светло или лимонно-желтая, без красноты, одноцветная, с многими частными серыми ржавыми точками. Около ямки при ножке тонкая бурая ржавчина.

Мякоть желтоватая, сочная, сладковатая, но очень вяжущая. Хотя не имеет кислинности, но мало сладкая и мало вкусная. Вкус очень походит на вкус Тонковетки.

3. Образцы из сада учхоза Уманского с.х. института.

Величина плодов большая и больше средней. Форма плоско округло-бутылочная. Верхняя ямка большая, почти без углубления. Чашечка с крупными листиками.

Кожа жестковатая, желтовато-зеленоватая одноцветная, с зеленовато-оливковыми подкожными точками. При чашечке сильная светло-коричневая ржавчина.

Мякоть очень нежная, тающая, очень сочная, с слабым мускатным ароматом. Семена черные.

Плоды созревают в конце августа [начале сентября]. Снятые с дерева, могут лежать только несколько дней.

Сорт английского происхождения, рекомендуемый к разведению у нас на (сорт) юге и юго-западе. 5 В.И.Шабловский /"Провідні сорти плодових культур УРСР, изд. 1937 г./ пишет, что

Деревья достигают средней величины, с редкой пирамидальной кроной. Их зимостойкость невысокая. Необходимо защищенное местоположение, к почве не требовательны. Плодоношение наступает рано. Плоды хорошо держатся на ветках, мало поражаются паршей, как и листья.

4. Л.П.Симиренко/"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 555-560./ говорит, что деревья редко-кронные, пирамидальные, в молодости довольно гонкого роста, но в возрасте 10-12 лет рост очень замедляется и далее почти не бывает прироста. Это явление должно поставить до известной степени на счет ранней и щедрой урожайности, угнетающей прирост и мешающей образовать более крупные размеры. Деревья мало прихотливы на почву. Они в Киевской губ. нередко примерзают. Это чудный скороспелый, де- (сортно-промышленный сорт.)

См. 2-ой лист.

6. Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2, 1937 г., стр. 163-164./ говорит, что это сорт мирового значения. Считается идеалом среди летних промышленных сортов. Имеет достоинства: широкую приспособляемость к климатическим и почвенным условиям, раннее плодоношение, урожайность, крупную величину, привлекательную величину и вкусовые достоинства столовой груши, транспортабельность и лежкость. Плоды во всех отношениях перворазрядные. Дерево также почти во всех отношениях идеально, лишь недостаточно холодостойко. Имеет исключительное значение для юга и юго-запада СССР. Промышленная его культура доходит на север до Белоруссии.

7. Г.А.Каблучко /"Сорта плодовых культур в Молдавии", изд. 1953 г., стр. 271-273./ пишет: "Вильямс летний - старинный сорт летних груш, довольно значительно распространен в Молдавии во всех районах,... пригодный для потребления в свежем виде, так и для приготовления компотов и других изделий на консервных заводах."

Виневка литовская. Winiowka Litewska.

1. Образцы плодов от Вириона из Минской губ. и от Ковенского Общества садоводства. Помологическое определение: кухонная круглая.

Величина плодов средняя и менее средней. Форма плоско-коническая, по бокам немного неправильная, с глубокой бороздой и неровной поверхностью; борозды чаще в конической части, в которой поперечное вдавление. Верхушка округлая, иногда с сглаженными угловатыми ребрами и бороздками. Верхняя ямка широкая, плоская, мелкая, с слабыми широкими ребристыми складками. Листики [чашечки] короткие, мелкие, открытые. Ямка при ножке косая, углубленная, но мало, с ребристыми складками или поперечными морщинами, неправильная. Ножкая тонкая, равная всей высоте плода или немного короче.

Кожа гладкая, сильно блестящая, жирная, иногда от точек несколько шагреневидная, зеленовато-желтая, при созревании желтоватая с частыми серыми ржавыми точками, без красноты или с сильной краснотой; на верхушке при ямке слабые сероватые ржавые пятна.

Мякоть белая, сочная, мало сладковатая, полутающая, но крупитчатая. По сладости и вкусу походит на Серую осеннюю /Картофлянку/.

Семена большие, толстые, светло-бурые.

Ранний осенний сорт. Плоды созревают к сентябрю [средине сентября] и держатся до конца сентября [начала октября].

По сведениям от Ковенского общества садоводства плоды созревают во второй половине сентября [начале октября] и могут держаться до начала [средины] октября. Сорт дает средний урожай.

Мякоть плодов, полученных от Ковенского О-ва Сад-ва, была сочная, сладкая, очень хорошая для сидра [плодового вина].

2. Под названием Виневки плоды получены от И.К.Мороза /ст. Бочейково, Витебской губ./. [Помологическое определение дано М.В. :] полубергамот.

Величина плодов малая. Форма плоская, бергамотообразная, с тупой верхушкой, к ножке слабо коническая, к которой идут несколько продольных борозд, а иногда вместе с ними и слабые ребра, что характерно для этого

См. на обороте:

сорта. Верхняя ямка широкая, углубленная, с ровными широкими складками. Чашечка открытая, с темными пушистыми лепестками. Нижней ямки нет. На ее месте ребристые продолжения и морщинистые кольцевые складки. Ножка длиннее или равна плоду.

Кожа тонкая, лоснящаяся, жирная, светло-желтая, на солнечной стороне с мутным слабым желтовато-красным румянцем. Темно-зеленые и ржавые точки более ясны на румянце.

Мякоть в конце сентября [начале октября] перезрелая, мучнистая, белая, зернистая, несколько кисловатая.

3. От Н.А.Козырева /Ивановское почт. отд., Смоленской губ./ получены два обращика, подобные обращикам от Мороза: один больней величины, с сильно блестящей и жирной кожей, другой по форме, как от Мороза, с кожей мало блестящей и мало жирной от ржавых точек и сильной ржавчины на верхушке. Они же [плоды] с красноватыми полосками на солнечной стороне. В половине [конце] октября мякоть рыхлая, белая, немного желтоватая, сладковатая или почти сладкая, десертная, но с довольно сильным вяжущим вкусом и несколько кисловатая. У чашечки большая каменистость, около гнезд рыхлая масса без грануляций. Семена короткие, толстые, округлые, не похожие на обыкновенные грушевые. [По сообщению Козырева] сорт в нашей местности торговый и достойный десерта.

4. В корреспонденции из Петровичской школы Бабруйского уезда, Минской губ. /журнал "Плодоводство", 1894 г., стр. 515/ П.Андреев пишет, что описываемый сорт столовый и хозяйственный. Плоды средней величины, хорошо держатся на дереве. Деревья очень сильные, скороростущие, пирамидальной формы, к почве неприхотливы и не имеют себе подобных по выносливости, плодоносят ежегодно и обильно.

Гданка.

1. Образцы плодов от К.П.Клейнмихеля из Ивны, Обоянского у., Курской г. Помологическое определение: бера.

Величина плодов средняя. Форма продолговатая наполовину к верхушке округлая, к ножке коническая, широкая или продолговатая, немного неравнобокая, без всяких ребер и бугров. Верхняя ямка мало углубленная, не широкая, с плоскими небольшими бугорками или без них. Чашечка открытая, из коротких листиков. Нижняя ямка образует небольшую косую впадину около кривой ножки, равной половине высоты плода.

Кожа толстая, плотная, тусклая, не жирная, травяно-зеленая в конце августа [начале сентября] ; на боку с мутным кровяно-красным разлитым румянцем, подернутым частыми серыми точками и серыми ржавыми пятнами, от которых зависит тусклость кожи; на теневой стороне этих пятен нет, но находятся частые, мелкие серые точки с просвечивающимися темно-зелеными ободками. Запаха нет.

Мякоть белая, очень сочная, при чашечке каменистая, нежная, мягкая, без зернистости, тающая, сладковатая с приятной конфетной пряностью, немного от дождливой погоды водянистая. делающаяся

Семена, несмотря на зеленую кожу, уже бурые, продолговатые, острые. 2 1

Согласно сообщению из указанного места выращивания плодов: превосходный для нашей местности десертный сорт. Отлично плоды выдерживают далекую пересылку и даже на побитых местах не портятся. После съема отлично держатся в комнате примерно до 28 августа [10 сентября] , в подвале могут сохраняться до половины [конца] сентября. Весьма желаемый для нас сорт. Зеленая окраска кожи не имеет никакой желтизны и плоды на вид кажутся зимними и далеко незрелыми. Пригодность к десерту узнается по некоторой мягкости плодов.

2. Образцы от И.Н.Гангардта из Курской губ. помологически определены М.В. как относящиеся к круглому кухонному сорту.

Величина плодов малая. Форма при чашечке неправильно овальная, мелкоребристая, к ножке сильно суженная, коническая, по бокам с выдающимися

См. на обороте:

округлостыми и слабыми бороздками. Верхняя ямка неправильная, косая с ребристыми складками, переходящими за края в небольшие угловатые ребра; слабо углубленная. Листики чашечки короткие, открытые. Ямка при ножке мелкая, ровная. Ножка почти равна высоте плода или немного короче.

Кожа немного гладкая и блестящая, слегка пагреневидная, зеленовато-желтая, на солнечной стороне с разлитым тонким желто-малиновым румянцем без полос или с очень слабыми полосами. Подкожные точки частые, ржавые, серого цвета.

Мякоть очень плотная, желтоватая, колкая, сочная, с сладким соком, но вяжущая, дающая травяной остаток при еде.

Сорт кухонный.

Образцы плодов от Р.П.Тропаного из Полтавской губ. были средней величины. Форма к верхушке усеченно-коническая, ребристая и бороздчатая, на средине выступы, к ножке коническая, с слабым перехватом. Верхняя ямка большая, углубленная, с 10 равными ребристыми складками, переходящими за края в ребра, отчего здесь даже подобие 5 граней, более сильны главные ребра. Чашечка открытая, из длинных листиков. Нижняя ямка небольшая косая, кольцевидная. Ножка тонкая, равная половине высоты плода.

Кожа толстая, тусклая, не жирная, травяно-зеленая, одноцветная, пагревидная, с редкими ржавыми точками.

Мякоть в конце сентября [начале октября] была совершенно гнилью испорченная, так сорт раннего осеннего поспевания.

Семена большие, тупые, широкие, светло-бурые, в полной зрелости.

Н.И.Кичунов в описании курских груш /журнал "Плодоводство" за 1894 г стр. 70-72/ пишет, что Гданка один из лучших и наиболее ценных сортов губернии, где она очень распространена и принадлежит к самым любимым. Ее плоды скорее крупные, чем мелкие, характерной и неправильной формы, с выступами и неровностями, поспевают в половине конце сентября и при хорошем хранении могут лежать до Начала средины января. Для роста деревьев более благоприятны возвышенные, а не пониженные места. На последних наносится морозами значительный вред. Молодые деревья имеют свои ветви, направленные вверх, а затем с годами крона делается распростертой.

Глек. Местный украинский сорт.

Образцы плодов получены от Уманского с.х. училища, Киевской губ.

Величина плодов средняя и меньшее средней. Форма двусторонне-коническая верхняя (1/3 плода) широко-округлая, с неуглубленной чашечкой, с небольшими чашелистиками и легкими буграми; нижняя 2/3 к ножке, без ямки, с перехватом на 1/3 от ножки, которая длиной около половины высоты плода, тонкая, несколько изогнутая.

Кожа плотная одноцветная, зеленовато-желтая с немногими ржавыми пятнами около чашечки.

Мякоть беловато-зеленоватая, особенно кнаружи, сухая не вкусная, грубая, мало-сладкая.

Плоды поспевают в начале [средине] сентября и вовсе не могут лежать, так как загнивают сначала. Пригодны для сушки и технической переработки.

Деревья начинают поздно плодоносить и на 10-летних бывают немногие плоды, но с разрастанием деревьев и их возмужалостью урожайность становится высокой. Деревья хорошо выносят ветры, мало подвергаются болезням и вредителям и живут долго. Хороши для обсадки дорог и краев сада.

Сорт распространен в юго-западной украине.

По сообщению И. Усикова / журнал "Плодоводство" за 1908 г., стр. 709/ урожайность Глека в Подольской губ. вне конкуренции.

Слива украинская. Имеет ряд вариаций:

1. Слива сахарная желтая.

Образцы плодов от Гангардта И.Н. из Курской губ. Помологическое определение: жирная.

Величина плодов средняя. Форма грушевидная, в верхней части сжатая, плоская, с узкими неровными ребрами, сходящимися на верхушке, в нижней части на одну треть от ножки с перехватом, усеченно-коническая. Верхней ямки нет или она очень мала, с ребристыми складками, переходящими в ребра, из которых некоторые разрастаются более других. Между складками маленькие бугорки. Чашечка закрытая, из темных листиков. Нижняя ямка вдавленная, с кольцевыми мясистыми выростами около ножки. Ножка тонкая, кривая, равная половине высоты плода.

Кожа тусклая, не жирная, толстая, нежная, мелко шагреневатая, совершенно одноцветная, мутноватого светло-желтого или лимонного цвета, без всякой красноты. Подкожные точки мелкие, частые, темно-зеленые, не очень резкие. Запах слабый.

Мякоть желтоватая, очень сочная, около чашечки и гнезд каменистая, сахаристо-кисловатая, вяжущая, с эфирно-грушевой пряностью. Совсем зрелая в конце августа [начале сентября], очень приятная по вкусу, сильно сахаристая, но вяжущая, что является недостатком.

Семенные гнезда небольшие, сжатые.

2. Слива харьковская.

Образцы плодов от Приводного из Полтавской губ.

Величина плодов менее средней. Форма продолговатая, коническая к тупой верхушке, более длинно заостренная к ножке, с боков несколько сплюснутая и неправильная, без ребер. Верхняя ямка углубленная, с многими островатыми складками. Чашечка открытая, из коротких малых листиков. Нижняя ямка кольцевидная, около ножки мясистые наросты; ножка длиной в половину высоты плода.

Кожа плотная, жирная, лоснящаяся, светло-желтая, на солнечной стороне с разлитым кармино-красным румянцем. Подкожные точки частые, мелкие, серые, на румянце желтоватые. Запаха нет.

См. на обороте:

сладковатая,
Мякоть белая, суховатая, мягкая, 19 сентября [2 октября] совершенно мучнистая вследствие перестревания.

Сорт ранний осенний, по качеству плодов невысокий.

5. Слива.

Плоды от Дорагана из Могилевской губ.

Величина плодов малая. Форма плоско-коническая, с острым, но низким конусом к ножке, по бокам с выдающимися округлостями. Верхушка тупая, немного округлая, с широкими бороздами. Верхняя ямка мелкая, с ребристыми складками, которые в числе нескольких округло поднимают края. Листики чашечки слабо опущенные, сомкнутые. Ямка при ножке косая, мелкая, с поперечными складочками мякоти. Ножка тонкая, равная половине высоты плода.

Кожа тусклая, шагреневидная, с мелкими частыми серыми подкожными точками, светло-желтая, на солнечной стороне с разлитым киноварным румянцем, на котором иногда тонкие слабые полоски.

Мякоть плотная, потом делящаяся губчатой, грубо зернистая, каменистая, бесвкусная.

Плоды поспевают к сентябрю [средине сентября]. Плоды пригодны для сушки, мариновки и других заготовок.

3. Слива киевская.

Образцы плодов из Подольской губ. Помологическое определение: бера.

Величина плодов средняя. Форма длинная, к чашечке овальная, далее с перехватом, как бы насаженая, коническая неправильная, кособокая, на овальной нижней части ребристая и немного бугристая. Верхняя ямка боковая, углубленная, по краям неровная, без складок, с большими открытыми листиками. Нижней ямки нет. Ножка тонкая, равная половине высоты плода.

Кожи блестящая, гладкая, светло или бело-зеленая, на солнечной стороне с сильным разлитым серо-красноватым румянцем, с серыми тонкими ржавыми пятнами и поперечными полосками. По бокам, а чаще при чашечке и ножке серо-бурые неправильные пятна и по всему плоду мелкие серые точки.

Мякоть желтоватая, тающая, винно-кислая, не вяжущая, с каменистостью

См. 2-ой лист.

около чашечки.

Семена средней величины, толстые, темно-бурые.

Плоды созревают в начале [средине] октября. Вкус плодов походит на вкус посредственных яблок, отличается от других груш кислотой.

4. Б.И.Шабловский в книге "Провідні сорти плодових культур УРСР", изд. 1937 г. описывает Сливу мачускую, как местный украинский сорт, распространенный сорт на Харьковщине и Полтавщине.

Величина плодов средние. Форма неправильная, округло-коническая, ребристая, изогнутая, с перехватом; коническая часть по сравнению с округленной сильно сужена. Верхняя ямка небольшая, мало углубленная. Нижней ямки нет. Ножка изогнутая, довольно тонкая, искривленная.

Кожа зеленовато-желтая, обычно одноцветная.

Мякоть белая, мелко-зернистая, очень нежная, сочная, сладкая, с незначительной кислотой, мелкозернистая, среднего вкусового качества.

Плоды созревают в конце июля [первой половине августа]. Используются свежими и на сушку.

Деревья довольно сильнорослые, с округло-пирамидальной кроной, долговечные, нетребовательные к почве и местоположению, очень зимостойкие. Плодоношение начинается с 8-9 года. Взрослые деревья отличаются высокой и правильной урожайностью. Листья и плоды не сильно поражаются паршей. Плоды крепко держатся на ветках, не обиваются ветром, но при сырой погоде загнивают, оставаясь висеть.

5. В.К.Заец /"Сорта плодовых и ягодных культур", изд. 1953 г., стр.305./ пишет, что Слива украинская местный украинский сорт, наиболее широко распространенный в Харьковской и Полтавской областях. Он часто встречается в южной части Курской области. В культуре известен ряд форм Сливы украинской, которые различаются между собой по вкусу и размеру плодов, урожайности деревьев и другим признакам. Наиболее известной, описанной в литературе, вариацией является Слива мачухская, распространенная в Харьковской и Полтавской областях.

Говель, Howell.

Образцы от Варшавского помологического сада.

Величина плодов большая. Форма округло-коническая, очень правильная, на половину от верхушки округлая, без всяких ребер и борозд, к ножке коническая, с слабо вдавленными боками.

Верхняя ямка средняя, правильная, как бы выточенная, углубленная, без складок и борозд, с ровными краями. Листики чашечки короткие, черные, открывающие широкую трубку. Нижней ямки нет, как и кольцевого углубления. Ножка короткая, черная, кривая, средней толщины.

Кожа тонкая, нежная, слабо блестящая, не жирная, совершенно одноцветная, светло-желтая, почти лимонно-желтая, местами зеленоватая, с множеством частых мелких буроватых подкожных точек. В верхней ямке лучистый бурый покров, у чашечки жесткий, у ножки лучистый серо-бурый. Запаха нет.

Мякоть белая, около чашечки каменистая, внизу около гнезда слабо зернистая, очень сочная, нежная, тающая, мало-сладкая, чуть кисловатая, немного вяжущая, с слабой грушевой пряностью.

Семена продолговатые, толстые, острые, чено-бурые.

Плоды вполне зрелые 25 сентября [8 октября], но могут держаться до конца месяца [до половины октября].

Отличный десертный сорт.

Образцы с лежачих решеток из Горецкого, Могилевской губ., фруктового сада, урожая 1901 года, но плоды недостаточно сформировались. Урожай был наибольший, чем у других сортов груш.

Величина плодов средняя и менее. Форма продолговатая, без ребер, округлая у вершины и остро-коническая к основанию. Верхняя ямка мало углубленная, с бороздками, разделяющими на неправильные широкие складки. Нижней ямки нет, или же косая небольшая впадина. Ножка длинная, кривая, у основания мясистая. Чашечка открытая, черная, короткая.

Кожа толстая, шершавая от черно-бурых многих подкожных точек, черных пятен и сетчатой серо-бурой ржавчины, покрывающей весь плод, более при верхней ямке. Цвет в конце сентября [половине октября] травяно-зеленый,

См. на обороте:

местами светло-желтый от неполного созревания.

Мякоть белая, очень сочная, тающая, но кислая и невкусная, портится снаружи какими-то водянистыми, потом буреющими и делающимися пятнами местами.

[Недостаточное развитие плодов и плохое созревание, по-видимому, были от прохладной погоды и недостаточного освещения.] Плоды 24 сентября [7 октября] были незрелыми.

Горничка.

Выведена профессором Киевского университета Горнич-Гарницким из семян французских груш, от которых сеянец отличается.

Величина плодов большая. Форма неправильная, плоско-кубаревидная, с неровными буграми при верхушке, переходящими в широкие округлые ребра, с бороздами, разными углублениями и кольцевой перетяжкой в нижней части. Более плоские образцы напоминают В Sterkmann, а продолговатые Бикрет летний /Bon Chrétien d'été, Sommer-apotheKerbirne/. Верхняя ямка широкая и глубокая, с ребристыми складками, переходящими в ребристые подъемы и ребра. Чашечка открытая. Ножки толстые короткие, с кособокими наростами мякоти.

Кожа бледно-желтая, в лежке ярко-желтая, лоснящаяся, мелко-ямчатая, с точками; на солнечной стороне часто с лаковым румянцем.

Мякоть желтовато-белая, под кожей с редкими мелкими зернами, тающая, сочная, сладко-кисловатая с побочным привкусом. Между гнездами в средине осевая пустота овальной формы, величиной с гнездо. Около гнезда мелкая хрящеватая зернистость, расположенная 5-угольниками с бо́льшими местами против гнезд и с меньшими в промежутках.

Семена небольшие, темно-бурые.

Плоды созревают [в лежке] с половины [конца] ноября и сохраняются до половины [конца] января.

Дерево сильного роста, с широко-пирамидальной кроной, ежегодно обильно плодоносит. В суровые зимы в Харькове не страдает. В Туркестане обращается в осенний сорт, созревающий в октябре.

Господская. Herrenbirne.

Образцы из Горецкого [Могилевской губ.] фруктового сада.

Величина плодов менее средней и малая. Форма кубаревидная, по виду походит на дулю, к верху и к ножке коническая, но к ножке более острая, с усеченной неровной складчатой верхушкой, без верхней ямки, чем отличается от Дули. Чашечка открытая, с большими узкими сероватыми отклоненными листиками, с подчашечной трубкой оранжевого цвета. Против и в промежутках листиков ребристые складки, из которых против листиков переходят в слабые ребра на верхушке. Основание чашечки несколько вдавлено. Нижней ямки нет. У ножки много находящих друг на друга кольцевых складок, мясистый большой вырост и полукольцевая впадина. Ножка равна длине плода, дуговидная.

Кожа гладкая, мало блестящая, не жирная, светло-зеленая, одноцветная, без желтизны, с мелкими часто сероватыми точками с темно-зеленым ободком. Запаха нет.

Мякоть белая, колкая, плотная, сильно вяжущая, еще не зрелая, когда уже готова Дуля.

У зрелых плодов 24 июля [5 августа] 1897 г. кожа была лимонно-желтая, одноцветная, с слабозаметными мелкими сероватыми точками. Мякоть мало сочная, вяжущая, сладковатая, более вкусная, чем у зеленых плодов, но вообще это очень плохой сорт. Отличается от других простых груш тем, что с созреванием и мучнением мякоти вкус улучшается.

Крона дерева раскидистая, с длинными тонкими свешивающимися сучьями, имеющими вид гирлянд. Сучья развиты сильнее, чем у Осенней серой груши и ветви свешиваются, только внутренние подняты вверх. Побеги серо-бурые, с мелкими чечевичками. Листья небольшие, овальные, с длинными черешками, у основания розоватые.

В 1899 г. после сырого и прохладного июля и августа плоды были еще меньше обычных и стали годны к еде 20 августа [1 сентября] еще зеленые, сочные, сладкие и менее вяжущие, без желтизны. В этот год плоды созрели первые [раньше других сортов] и были на расхват благодаря сладости. Были без пятен, но очень терпкие.

_Графиня парижская, Comtesse de Paris, _ _ _

Образцы плодов от Л.П.Симиренко, из Городища, Киевской губ.

Величина плодов небольшая. Форма неправильная, вверху овальная, ровная, без борозд и ребер, к ножке коническая, с небольшим поперечным перехватом. Верхняя ямка мелкая, малая, ровная, с широкой и открытой чашечкой из узких бурых листиков. Нижней ямки нет. Ножка короткая, на конце с выростом.

Кожа тусклая, толстая, зеленовато-желтая, вся покрытая ржавчиной в виде налета/на солнечной стороне/, пятен и точек /на теневой стороне/.

Мякоть белая, тающая, сливочная, сладкая и пряная..

Л.П.Симиренко рекомендует на этот сорт обратить внимание, как на перспективный. Плоды поспевают в октябре и сохраняются до ноября, когда могут появляться пятна от порчи мякоти.

Даймио, Даймё /японская/.

Образцы плодов от Л.П.Симиренко, Городище, Киевской губ. Помологическое определение: бергамот.

Величина плодов более средней. Форма бергамотная, вверху широкая, с несколькими сглаженными продольными бороздами, к ножке коническая. Верхняя ямка небольшая и мало углубленная. Чашечка открытая, из очень коротких листиков в виде оторочки. Нижняя ямка малая. Ножка длинная, немного изогнутая.

Кожа слабо блестящая, лимонно-желтая, одноцветная, с частыми серыми ржавыми подкожными точками, толстая, крепкая.

Мякоть очень плотная, ломкая, мало сочная, почти пресная, с небольшой сладостью, хотя зрелая.

Семенное гнездо большое камерное, с осевой пустотой. Семена большие крупные.

Плоды созревают около 20 октября [в начале ноября].

Чухонный сорт.

Н.Шавров в журнале "Прогрессивное садоводство и огородничество" за 1914 г., № 50, стр. 1552 пишет, что деревья описываемого сорта хорошо растут и приносят красивые золотисто-желтые плоды на очень длинных ножках. Плоды вполне дозревают только в ноябре и декабре и очень хороши для компотов и обсахаривания. Плодоношение обильное. Сорт заслуживает полного внимания.

Девичья.

Образцы плодов из горецкого /Могилевской губ./ фруктового сада. Помологическое определение: жирная.

Величина плодов средняя и менее средней. Форма грушевидная, неравнобокая, в верхней части круглая, с округлой верхушкой, к ножке с половины высоты плода остроконическая, вдавленная.

Верхняя ямка малая, мелкая, или ее нет, с широкими, иногда бугровидными ребристыми складками, разделенными бороздами. Чашечка открытая, с небольшим зевом и узкими приподнятыми пушистыми серыми, иногда белыми листиками, светлым или темным зевом. Бока иногда с слабыми выдающимися округлостями. Нижняя ямка небольшая, с кольцевым углублением и однобоким мясистым выростом. Ножка крючковидная, длинная, более половины высоты плода.

Кожа тонкая, нежная, гладкая, мало блестящая, у незрелых светло-зеленая, у зрелых светло-желтая, одноцветная, с очень мелкими зелеными или серыми ржавыми точками; иногда на боках или на верхушке оранжево-ржавые пятна. Запах слабый, мускатный.

Мякоть белая, сочная, сладковатая, вяжущая, крупитчатая, с слабым ароматом, вкусная только у зеленых плодов, с желтизной которых делается сухой и мучнистой.

В 1897 г. плоды были вполне зрелыми 25 июля [6 августа] , в другие годы зреют около половины [конца] августа. По вкусу лучше июльские.

Деревья сильного роста, очень правильной красивой пирамидальной формы с сильно вытянутой кроны, с тонкими, слегка свешивающимися ветвями. Ростовые побеги, покрытые плодушками, придают ветвям особый гирляндообразный вид, где листья в пучках светло-зеленого цвета придают вид, резко отличающий деревья от других. Листья светло-зеленые, овальные, заостренные, по краям цельные, слегка волнистые; черешки у основания розовые. Побеги темно-серые, тонкие, с мелкими, мало заметными чечевичками.

V

Деканка зимняя, Doyenne d'hiver; Winter-Dechantsbirne.

Образцы от Павильчуса из Сувалок.

Величина плодов средняя и больше. Форма неправильная грушевидная, с боков приплюснутая, на верхушке с широкими округлыми выростами неравной величины, между которыми находится верхняя ямка с ребристыми складками и бороздами. Листики чашечки гладкие, длинные, узкие, сомкнутые. Нижняя ямка углубленная, бороздчатая. Ножка тонкая, короткая.

Кожа плотная, толстая, тусклая или мало лоснящаяся, несколько шероховатая от точек, мелко-шагреневатая, сначала травяно-зеленая, потом желтеющая, на солнечной стороне с мутной разлитой красностой. Подкожные точки частые, серые, ржавые, резкие. Запаха нет.

Мякоть желтоватая около гнезд и к ямкам каменистая, сочная, сладкая, тающая, не вяжущая, без пряности.

Семена узкие, тонкие, острые, черно-бурые

Образцы от Янковского из Варшавы /X X †, III - IV/ отличались от вышеописанных двояко-конической формой, с широкой тупой верхушкой, на которой углубленная правильная ямка с узкими ребристыми складками. Нижняя ямка с серо-бурым ржавым налетом. На верхней ямке налет серо-бурый. Остальное то же.

Отличный торговый промышленный сорт.

Плоды были с большим количеством пятен грибка Fusicladium. Они требуют возможно более позднего сбора и хорошего хранилища, а иначе в лежке морщатся, хотя остаются крепкими. До созревания /4 [17] октября/ мякоть была зеленоватого цвета, сильно каменистая около чашечки, гнезд и к ножке, сладковатая, слизеватая, еще совсем не готовая. Созревание наступает во второй половине декабря [в начале января].

Образцы от Варшавского помологического сада были средней величины. Формы неправильной, продолговато-мешетчатые, с усеченой ребристо-бугристой верхушкой и неправильно-конической к основанию, бугроватой.

Верхняя ямка широкая, неправильная, углубленная, очень неровная к краям от резких ребристых складок и бугристых подъемов, разделенных боль

См. на обороте:

ними бороздами. Чашечка очень малая, скрытая сомкнутая, черная, с ребристыми складками. Нижняя ямка вдавленная, бороздчатая, бугристая. Ножка короткая, толстая.

Кожа сухая, толстая, плотная, тусклая, грязно-зеленая с желтоватыми окнами, на солнечной стороне мутная киноварная небольшая и слабая полосатость, с многочисленными бурыми точками, а более ржавые бурые пятна, соединены в сетку. Запаха нет.

Плоды созревают к январю [в январе]. До этого они совсем зеленые, пахнут кочерыжкой. Мякоть зеленоватая, сильно каменистая около чашечки, гнезд и к ножке. При неудовлетворительном хранении плоды морщатся и некрасивы на вид, хотя семена черные, узкие, длинные.

При неудовлетворительных условиях роста плодов и недостатке тепла они могут быть использованы только для компота.

Это один из самых поздних сортов груш.

Образцы от Тельшевского имели величину менее средней. Форма к верхушке овальная, к ножке коническая, с довольно широкой и тупой верхушкой и узким основанием, по бокам с слабо выдающимися округлостями.

Верхняя ямка широкая, мелкая, с узкими ребристыми складками и между ними с несколькими буграми. Листики черные, гладкие, узкие, длинные, тесно сомкнутые. Нижняя ямка малая, неровная, вдавленная, бороздчатая. Ножка толстая, равная по длине половине высоты плода.

Кожа плотная, гладкая, лоснящаяся, немного жирная, сначала по съемке светло зеленовато-желтая, на солнечной стороне желтоватая и с разлитым желто-красным румянцем без пятен и полос. Подкожные точки серые, ржавые, частые, резко выделяющиеся. В нижней ямке и от нее серо-бурый ржавый налет. Запаха нет.

Мякоть в половине [конце] декабря желтоватая, сочная, сладкая, с слабым мускатным вкусом, не вяжущая, около гнезд и чашечки каменистая.

Семена продолговатые, острые, черно-бурые.

Сорт десертный первого качества, но плоды значительно меньше южных.

См. 2-ой лист:

1. Образцы плодов от Капустина из Крыма.

Величина большая. Форма неправильная, кособокая, толстая, с очень широкой тупой и ребристой верхушкой, около которой вдавления, по бокам неровная, с выступами, у ножки косая.

Верхняя ямка большая, глубокая, неправильная, с ребристыми складками и ребрами, закрывающими с боков чашечку, по краям бороздчатая и бугристая. Чашечка закрытая, с буроватыми листиками. Нижняя ямка глубокая, косая, бороздчатая, с боковыми выростами мякоти. Ножка короткая, очень толстая.

Кожа очень тонкая, сухая, слабо блестящая, неровная с сетчатой крупной шагреневатостью, не жирная, долгое время темно-зеленая, в зрелости зеленовато-желтая или светло-желтая, на солнечной стороне с разлитым тонким желто-красным, иногда полосатым, румянцем. Подкожные точки частые, большие, бурые, не резкие на румянце. Ржавчины нет. Запах травянистый.

Мякоть желтоватая, каменистая около чашечки и грубо зернистая около гнезда и к ножке, снаружи слабо-мучнистая, очень сочная, нежная, тающая, очень приятного винно-кисловатого вкуса с мускатной пряностью.

Сорт первого десертного достоинства. Плоды созревают в конце декабря [начале января] и держатся до средины января и позднее [до конца января].

3. Образцы плодов от Лейениака из Курляндской губ.

Величина малая. Форма неправильная низкая кубаревидная или бергамотная, овальная к тупой верхушке и округло и косо-коническая к ножке, по бокам с выдающимися округлостями. Верхняя ямка углубленная, неправильная, немного бороздчатая, с следами тонких складочек. Листики чашечки короткие, открытые. Ямки при ножке нет и следа, только небольшой боковой вырост мякоти. Ножка тонкая, кривая, равная по длине половине высоты плода.

Кожа крепкая, иногда тусклая, травяно-зеленая, на солнечной стороне с слабым мутно-красным румянцем, с частыми серо-зелеными подкожными

См. на обороте:

точками, резко выступающими. На верхушке и на боковом выросте при ножке ржавый желто-бурый налет и по бокам иногда такие же пятна.

Мякоть белая, маслянистая, зернистая около гнезд, каменистая около чашечки, сладковатая, без пряности.

Семена большие, толстые, темно-бурые.

Плоды созревают в начале [средине] октября.

Хороший столовый сорт, бельгийского происхождения. Разводится на юге СССР. Б.И.Шабловский /"Провідні сорти плодових культур УРСР", изд. 1937 г./ пишет, что

Деревья умеренного роста и достигают только средней величины. Их кроны средней густоты, широко-пирамидальные. Требуют свежую, глубокую, теплую питательную почву и теплое защищенное местоположение. Кроме того, при недостатке влаги обязательно требуется полив. Морозостойкость небольшая. Плодоношение начинается на 7-8 году, правильное, ежегодное, но умеренное.

И.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1913 г., стр. 584-594./ сообщает, что Деревья этого сорта имеют пирамидальную крону, в Крыму очень холодостойки, в Киевской губ. с успехом переносили морозы до - 28° R., растут туповато, если садятся на щебенистой, сухой, горячей и не орошаемой почве, а также они не любят низин, где урожаи недостаточные и плоды поражаются паршей. Необходима глубокая, свежая, очень плодородная, но не тяжелая почва. Прививка на айве не всегда дает хорошие результаты, так как получается слабый рост. В Крыму плодоношение начинается рано, но потом урожаи бывают недостаточно высокими. Кроме того, этому сорту свойственно осыпание завязи, если место оказывается слишком закрытым, а почва сильно переудобрена.

Плоды крымского происхождения начинают созревать в лежке с декабря [января], обыкновенно же в январе - феврале.

"Зимняя деканка - самая тяжелая, самая вкусная и вместе с тем самая поздняя из числа культивируемых в Крыму зимних десертных грушевых сортов."

Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 204-206./ считает

См. 3-ий лист.

достоинствами сорта: величину, красоту, высший вкус и лежкость плодов, а недостатками - требовательность деревьев к почве, теплу и уходу и поражаемость плодов паршей и насекомыми.

Г.А.Каблучко /"Сорта плодовых культур Молдавии", изд. 1953 г., стр. 305-307./ пишет, что вышеописанный сорт распространен в небольших количествах в Молдавии по всем плодовым районам. Он ценится за высокие вкусовые качества и продолжительность лежки плодов.

Деканка июльская, лимон.

1. Образцы плодов из Горецкого /Могилевской губ./ фруктового сада.

Величина плодов средняя и малая. Форма около чашечки плоская, у ножки без ямки или с малой боковой впадиной около ножки, округлая, часто на боку с слабо заостренным выростом, Поверхность ровная, правильная, без бугров, ребер и пр. Ножка длиною с высоту плода и более, тонкая, на конце загнутая. Основание плоское, с ребристыми складками, идущими от чашечки; складки разделены резкими бороздами и часто неправильны. Листики отверстые, короткие.

Кожа зеленоватая, немного желтоватая, слабо блестящая, гладкая, с мелкими расбросанными по всему плоду ржавыми точками. На солнечной стороне сплошной мутно-красный румянец с беловатыми ржавыми точками.

Мякоть белая, сочная, немного вяжущая, сладковатая, без кислоты, плотная, крупнозерная, с грубою каменистостью. Плоды перед сбором на дереве с грубой и вяжущей мякотью, но довольно сладкой и сочной. Начинают созревать в половине [конце] сентября, держатся в погребе до 20 сентября [до октября] и позднее.

Семена большие, бурые.

Осенний сорт.

2. Образцы плодов от Брока в г. Горках, Могилевской губ.

Величина плодов средняя и меньше. Форма правильная, немного продолговатая, к ножке суженная. При ножке небольшая косая ямка, от которой вдоль по боку идет только одно островатое ребро. Нижняя ямка с тонкой серой ржавчиной. Верхушка плоская, ровная, немного выгнутая, с следами слабых ребристых складок. Листики чашечки узкие, черные, звездчатые, открытые. Ножка тонкая, длиной равняется плоду.

Кожа крепкая, плотная, блестящая, сухая, светло-желтая, на солнечном боку с разлитым красно-желтым тонким или слабым румянцем. Много желто-красных ржавых точек, местами серые тонкие пятна.

Мякоть желтоватая, сочная, полутающая, сладкая, без пряности, сахаристая.

Семена большие, широкие, желто-бурые.

Плоды по окраске и форме походят на Тонковетку, но отличаются заме-

См. на обороте:

чательно долгим сохранением даже в комнате, до конца октября [половины ноября] , когда они только морщатся от тепла.

5. Деканка летняя, Sommer Dechants Birne.

Образцы плодов от И.Я.Лейениака из Латвии.

Величина плодов менее средней. Форма длинная, тонкая, столбчато-грушевидная, в верхней части на 1/3 длины округлая, а далее к основанию коническая, почти цилиндрическая, с широким косым основанием, без ребер.

Верхняя ямка мелкая, не широкая, с очень слабыми узкими складками. Листики чашечки короткие, черные, широко открывающие зев трубки. Нижняя ямка значительно углублена, косая. Ножка средней толщины, косая.

Кожа слабо блестящая или тусклая, нежная, одноцветная, светло-желтая, немного зеленоватая, с частыми розовыми точками на солнечной стороне и мелкими слабыми на теневой. Верхушка с тонким ржавым желтым покровом и такими же характерными на боках ржавыми пятнами, не делающими кожу шероховатой. Запаха нет.

Мякоть белая, желтоватая, тонкая, мягкая, лоснящаяся, очень сочная, тающая; к 15 сентября [в конце сентября] уже мучнистая, пресная, похожая вкусом на плоды спелого боярышника.

Летний сорт, с плодами хорошего десертного качества.

Деканка летняя, (Summer Doyenné)

Деканка июльская, Doyenné de Juillet, Juli Dechantsbirne,

Образцы плодов от Брока из г. Горок, Могилевской губ. Помологическое определение: полубергамот.

Величина плодов маленькая. Форма почти плоская или круглая, всегда шире в нижней части, с слабыми бороздками и сетчатой неровностью. Верхняя ямка мало углубленная, плоская, с слабыми ребристыми складками. Чашечка открытая, с широкими листиками. Около ножки плод выше и с бугровидными выростами. Ножка короткая, немного кривая.

Кожа гладкая, блестящая, светло-желтая, на солнечной стороне с чрезвычайно красивым ярким красным румянцем, на котором резко выдаются серо белые подкожные точки, по поверхности часто тонкий ржавый сероватый налет. На теневой стороне зелено-серые редкие подкожные точки.

Мякоть белая, очень сочная и сладкая, но колкая и не тающая, с слабой пряностью.

Созревание плодов вместе с Тонковеткой, около 15 августа [в конце августа].

Ч. Г.А. Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 167-168./ пишет, что сорт происходит из Бельгии, встречается на Северном Кавказе. Деревья небольшие, с раскидистой кроной. Ветви длинные, тонкие. Побеги красно-коричневые. Листья небольшие, продолговатые, кожистые, с длинно-заостренным кончиком, с мелко-пильчатым краем. Рост слабый, неправильный. Деревья выносливые, к почве нетребовательные. Плодоношение раннее. Урожайность щедрая. Удается на груше и айве. Не любит обрезки.

Помимо раннего созревания плодов не представляет интереса. Плоды мелки и невзрачны, скоро портятся.

Пеканка дю Комис, Комисувка, Doyenné du Comise, Doyenné du Comice d'Angers, Fondante du Comice, Verein's Dechantsbirne

Образцы от Кончевского из Западной Белоруссии. Французский сорт, выведенный в половине XIX века.

Величина плодов средняя. Форма при верхушке округлая, где с слабыми складками реброватости, далее вытянутая в острый, почти правильный конус с косой ямкой. Верхняя ямка углубленная, немного бороздчатая, с мелкими складками или без складок. Листики чашечки очень короткие, открытые. Нижняя ямка слабая, Ножка толстая, ровная, длиной в 1/4 высоты плода.

Кожа тусклая, шероховатая от множества мелких частых серых ржавых точек, зеленовато-белая, в зрелости светло-желтая, на солнечной стороне светло-желтая, с слабыми следами красноватых полосок или без них, с большими бурыми ржавыми сплошными пятнами при верхушке.

Мякоть белая, тающая, очень сочная, сладковатая, но очень вяжущая, чем отличается от Урбанистки, хотя более сладкая и сахаристая.

По янковскому плоды средней или довольно большой величины. Кожа светло-желтая или золотистая, с тонкой ржавчиной. На солнечной стороне часто зарумяненная.

Деревья растут умеренно, не вполне хорошо формируют небольшие раскидистые кроны с густыми ветвями. Побеги усеяны светлыми чечевичками. Урожаи достаточные, но лишь по достижении взрослого возраста. Молодые деревья немного чувствительны к морозу. Цветут поздно. Плоды крепко держатся на ветвях и не имеют пятен. Необходима хорошая почва.

Торговый сорт. Плоды прекрасные, столовые, не хуже Дюшессов, с прелестной тающей, сладкой мякотью. Созревают в половине [конце] октября и могут держаться до Нового года.

Образцы от Варшавского помологического сада на Нижегородской выставке 1896 года.

Величина плодов большая. Форма кубаревидная, вверху круглая с широкой тупой верхушкой, с половины высоты косо-коническая, с косым основанием и при переходе с слабым поперечным вдавлением, в верхней части с угловатыми сглаженными ребрами.

См. на обороте:

Верхняя ямка широкая, глубокая, почти с ровными краями, слабо бороздчатая. Листики чашечки короткие, широкие, гладкие, черные, сильно откинутые, так как чашечка очень широкая. Нижняя ямка с кольцевым косым вдавлением и сбоку с сильным боковым выростом, отклоняющим вбок короткую очень толстую серую ножку.

Кожа тонкая, нежная, мелко-шероховатая, зеленовато-желтая, потом светло желтеющая, на боку с слабым мутно-оранжевой или слегка желто-розовой окраской. Подкожные точки очень частые, бурые, резкие. В верхней ямке бурый ржавый покров, в нижней и на всем основании серый или серо-бурый, по бокам неправильно сплетающиеся или отдельные бурые ржавые пятна. Запах слабый.

Мякоть белая, без каменистости и зернистости, с плотной сосудистой частью по оси, нежная, очень сочная, сливочная, скоро тающая, винно-кисловатая, не вяжущая, с тонкой эфирной грушевой пряностью, по вкусу отличная.

Семена длинные, плоские, с широким кривым носком, бурые с темно-бурым концом.

Плоды были 7 [20] октября совсем зрелые.

Сорт весьма достойный разведения, почти единственный из коллекции сада – с тонким превосходным вкусом.

2. Пеканка дю Комис полосатая, *Doyenné du Comice panachée.*

Образцы плодов от Л.П.Симиренко из Городища, Киевской губ.

Величина плодов большая. Форма вверху шаровидная, неровная от слабых реброватых выростов, внизу коническая, с слабым перехватом. Верхняя ямка очень глубокая, бороздчатая /5 борозд/, с сомкнутой узкой чашечкой. Ножка короткая, в ямке.

Кожа беловато-желтая, на солнечной стороне со слабыми розоватыми полосами, с частыми буроватыми подкожными точками, без пятен и лучей.

Мякоть белая, очень нежная, сливочная, тающая, очень сочная. Гранулляции в виде зернистости под чашечной трубкой, с едва заметной кислотой, сладковатая, сахаристая, с пряностью.

Плоды 15 октября [в конце октября] зрелые. Отличный десертный сорт.

См. 2-ой лист.

Л.Ф.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр.570-574./ пишет, что деревья этого сорта смолоду имеют сильный рост, но потом бывают только средней силы, с сжато-пирамидальной кроной. Они порядочной холодостойкости, но не выносят температуру в -30°R. Отличаются не ранним, но правильным умеренным плодоношением. Необходима тучная, теплая и не сухая почва. Отлично удается прививка на айве.

Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 174-175./ считает, что при всех достоинствах, в большинстве стран, это, по преимуществу любительский сорт, массовому разведению которого препятствуют существенные недостатки: нежность дерева и слабая урожайность.

5. _Королька._

Образцы от Пото, имение Пилява, Каневского уезда, Киевской губ.

Помологическое определение: бера.

Величина плодов более средней. Форма неравнобокая, неправильная, вверху овально-коническая, с тупой верхушкой, внизу косо-коническая, по бокам с большими округлыми выступами.

Верхняя ямка углубленная, неправильная, с широкими, сглаженными ребристыми складками, переходящими на краях в округлые выступы. Чашечка открытая, из черных коротких отогнутых на верхушке листиков. Нижняя ямка мелкая, с кольцевой впадиной. Ножка короткая, толстая, отогнутая вбок.

Кожа тонкая, нежная, зеленая, на солнечной стороне зеленовато-желтая, одноцветная, на большей части с серо-бурым ржавым пятнистым покровом и мелкими ржавыми точками. Запах слабый.

Мякоть белая, нежная, сплошная, каменистая только около чашечки, тающая, винно-кислая, почти кислого вкуса, сахаристая, без пряности.

Семена длинные, острые, темно-бурые.

Плоды в половине [конце] сентября совсем зрелые.

Летне-осенний сорт, подходит к Doyenné du Comice.

Деканка красная, Doyenne rouge, Dansel's Bergamotte.

Образцы плодов от Чикоского из Варшавы /**†; X/.

Величина плодов средняя. Форма плоско-коническая, с широкой плоской верхушкой и несколько расширенным основанием, сплюснная снизу с боков, но ровная.

Верхняя ямка глубокая, небольшая, с бороздами, переходящими на плоскую верхушку и разделяющими низкие подъемы, однако сильно сглаженные. Нижней ямки почти нет, с неправильным слабым кольцевым углублением. Ножка короткая, толстая.

Кожа толстая, нежная, тусклая, шероховатая, основного зеленовато-желтого цвета, на солнечной стороне с мутно-красным разлитым румянцем. Подкожные точки частые белые просвечивающиеся, видны на румянце в виде слабых фореленых, но незаметные на других частях. Поверхность, особенно на солнечной стороне, покрыта першавым серо-буроватым налетом и местами желто-бурыми пятнами.

Мякоть желтоватая, очень сочная, тающая, очень сладкая, с эйирно-грушевой пряностью, около чашечки сильно каменистая, около гнезд зернистая, очень вкусная, не вяжущая.

Семена короткие, толстые, бурые.

Плоды вполне зрелые 19 сентября [2 октября].

Превосходный десертный сорт.

Иного свойства образцы от Варшавского помологического сада.

Величина плодов средняя. Форма яйцевидная, на 1/2 округлая, к ножке коническая, с косым тупым основанием, по бокам совсем ровная, с правильно-округлой верхушкой с слабыми остро-угловатыми следами ребер.

Верхней ямки совсем нет и чашечка находится на выдающейся верхушке, с широкими плоскими ребристыми складками, или же узкими, переходящими в ребристо-островатые следы, а между складками маленькие бугорки. Листики чашечки короткие, гладкие, сильно открытые. Нижняя ямка широкая, но мелкая, косая, с несколькими слабыми бороздами. Ножка толстая, короткая, у основания мясистая.

См. на обороте:

Кожа толстая, плотная, тусклая, шагреневатая и шероховатая от множества частых ржавых серых подкожных точек, но ржавых пятен и покрова нет, сначала травяно-зеленая, потом пятнами светло-желтая, на солнечной стороне с мутной или сероватой от точек желтизной. Запаха нет.

Мякоть желтоватая, около чашечки сильно-каменистая, около гнезд менее и зернистая /также местами/, очень сочная, тающая, но зерноватая, очень сладкая, с бергамотной пряностью.

Семена большие, толстые, широкие, бурые.

Плоды созревают в конце сентября или в начале октября [в первой половине октября]. Крепко держатся в хранении.

Превосходный десертный сорт.

Деканка Мерода, Doyenne de Merode, Double Philippe, Doyenne Boussoch, Doppelte Philippsbirne.

Образцы плодов от П.П.Симиренко из Городища, Киевской губ.

Величина средняя. Форма в верхней части плоско-округлая, нижняя округло-коническая, правильная, без ребер. Верхняя ямка мало углубленная, с охристо-желтыми пятнами и открытой чашечкой с длинными черными листиками. Ножка короткая, толстая в косой ямке.

Кожа сухая, светло-желтая и белая, одноцветная, с бурыми или охристо-бурыми подкожными точками и такими же пятнами.

Мякоть белая, тающая, сливочная, сладко-кисловатая.

Плоды созревают в конце сентября [начале октября] и совершенно зрелые в половине [в конце] октября.

Под названием Двойной Филипп, Double Philippe образцы плодов получены от Навильчуса из Сувалок.

Величина плодов менее средней. Форма кубаревидная, с плоской верхушкой, округлая, незаметно переходящая в низкий конус, правильная, но неравнобокая, без ребер. Верхняя ямка как бы выточенная, мелкая, малая, ровная без складок. Листики чашечки короткие, пушистые, открытые. ямка при ножке, вдавленная. Ножка толстая, равная 1/4 высоты плода.

Кожа шершавая от почти сплошного бурого ржавого налета. Где его нет - на свободной малой части светло-желтая окраска.

Мякоть белая, сладкая, тающая.

Плоды поспевают в конце сентября [начале октября]. В половине и в конце октября [в конце октября и начале ноября] мякоть становится совсем бурой. Плоды обычно держатся не позднее, чем до начала [средины] октября, вместе с Лесной красавицей, Fondante des bois.

П.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 575-577./ пишет, что деревья этого сорта здоровые, нормальной силы, рано входят в пору плодоношения, отличаются хорошей урожайностью, холодостойкие, долговечные, в старости с широкопирамидальными кронами. Сорт хорошо удается на айве и на карликах бывают особенно красиво окрашенные плоды.

Двойной Филипп, Double Philippe.

Образцы плодов получены от Павильчуса из Сувалок.

Величина плодов менее средней. Форма кубаревидная, с плоской верхушкой, округлая, незаметно переходящая в нижний конус, весьма правильная, без ребер.

Верхняя ямка как бы выточенная, малая, мелкая, ровная, без складок. Листики чашечки короткие, пушистые, открыты. Нижняя ямка вдавленная. Ножка толстая, почти прямая, равная 1/4 высоты плода.

Кожа первая от почти сплошного бурого ржавого налета, от которого освобождена малая часть с светло-желтой окраской.

Мякоть белая, сладкая, тающая.

Плоды созревают в конце сентября [начале октября]. В половине октября и в конце [в конце октября и в начале ноября] мякоть становится совсем бурой. Вообще плоды держатся в хранении (в хорошем хранилище) одинаково с плодами сорта Тесная красавица.

Деканка осенняя, (Doyenne blanc,)

Вера бланковая / Вера белая / (Beurre blanc, Doyenne St. Michel,
Kaiserbirne, Kaiser Krone, Sommer Kronenbirne, Weisse Herbst Butterbirne,

Образцы плодов от Гарткевича из Гродненской губ.

Старинный итальянский сорт.

Величина плодов малая или менее средней. Форма овальная или округло-коническая, шаровидная к чашечке и коническая к ножке, по бокам немного неровная от слабых округлостей.

Верхняя ямка мелкая, неровная от широких борозд, с узкими ребристыми складками. Листики чашечки гладкие, очень малые, сомкнутые. При ножке углубленная бороздчатая ямка, косая. Ножка тонкая, длиной равная половине высоты плода.

Кожа пестрая от тонкого сетчатого или пятнистого серо-бурого налета, покрывающего почти весь плод и сплошного при верхней и нижней ямках, характерного светло-желтого или лимонного цвета, с многими мелкими частыми ржавыми точками. Каменистость слабая, только при чашечке.

Мякоть желтоватая, нежная, тающая, винно-кислая, с небольшой сладостью, несколько вяжущая.

Семена широкие, почти черные.

Плоды поспевают в начале [средине] сентября и бывают совершенно зрелыми в конце сентября [начале октября].

Разведение в Гродненской губ. и др. аналогичных местностях рациональ(но).

3. Образцы плодов, полученные от Лейниака из Курляндской губ. [Латвии] были меньшей величины, несколько уродливой формы, почти конические и кособокие, мякоть сладковатая, без пряности, но крупитчатая от каменистости, немного водянистая. Удается [там] только в хорошее лето. Едва ли выгодна в Курляндии для разведения после Бенне Наполеон, которая лучше.

Образцы плодов от Янковского /✝ ✝ ! † ; X/ из Варшавы.

Величины средней и малой. Формы яйцевидной или у верхушки округлой и к 1/2 коническ[ой], без ребер, правильн[ой], с тупо-округлой верхушкой и косым, немного расширенным основанием, слабо ребрист[ой].

Верхняя ямка широкая, очень мелкая, с короткими ребристыми складками переходящими в слабые угловатые ребра, разделенные низкими бороздками. Листики чашечки черные, короткие, полуоткрытые. Нижняя ямка с кольцевым вдавлением и небольшим боковым выростом, отклоняющим толстую дуговидную

См. на обороте:

короткую ножку.

Кожа гладкая, блестящая, ровная, очень тонкая, нежная, не жирная, одноцветная, светло-желтая, на солнечной стороне более желтая, с мало заметными мелкими серыми ржавыми точками, местами с тонкими буроватыми, ржавыми пятнами. Запаха нет.

Мякоть белая, без зернистости даже около чашечки, нежная, тающая как масло, очень сочная, сладкая, с нежной или тонкой пряностью, очень вкусная.

Семена длинные, острые, черные.

Плоды вполне зрелые 25 сентября [8 октября] и лежать далее этого времени не могут.

2. П.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 578-582./ говорит, что Деканка осенняя классический десертно-промышленный сорт и единственный осенний сорт груши, плоды которого вывозились из Крыма в столицы до проведения железно-дорожных путей.

Величина плодов средняя и меньше средней. Форма характерная, яйцевидно-усеченная сверху и снизу. Чашечка открытая или полуоткрытая. Ножка короткая и толстая.

Кожа очень нежная, сперва светло-зеленая, в спелости золотисто-желтая, на солнечной стороне с нежным румянцем, иногда с ржавыми пятнышками, сливающимися в сплошной буроватый налет.

Мякоть молочно-белая, нежная, маслянистая, очень сочная, очень сладкая, с небольшим мускатным запахом, отличного вкуса.

Деревья рано плодоносят, затем правильно и щедро. В Киевской губ. иногда оказываются зябкими. Смолоду рост быстрый, но крона образуется небольшая, жидковатая, с несколько отвисающими сучьями. Не отличаются долговечностью. Листья продолговатые, узкие, ланцетовидно-заостренные, с тонкими черешками. Хорошо удается прививка на айве. Требуется защищенное и теплое местоположение, с плодородной, но не тяжелой почвой. Плоды страдают от парши. В Крыму плоды снимают в августе. Они держатся в хранении около месяца. На Украйне в защищенных городских киевских садах отлично удается.

См. 2-ой лист.

4. В.В.Пашкевич /"Атлас плодов", изд. 1906 г., стр. 413./пишет, что плоды этого сорта созревают около средины [конца] сентября и держатся 3-4 недели, а при исключительно благоприятных условиях даже до конца ноября [начала декабря]. Нельзя снимать плодов ни слишком рано, иначе они вянут и менее вкусны, ни слишком поздно, ибо так снятые скоро портятся.

В молодости дерево отличается довольно сильным ростом, впоследствии же оно становится умеренно-рослым. На айве растет отлично. Листья эллиптические, мелко зазубренные, коротко заостренные, гладкие. Хороший сорт для формовой культуры. Дерево очень урожайно, взыскательно к качеству почвы. Наиболее благоприятен глубокий чернозем, или мергель с умеренной влажностью. В Киеве была аллея 60-летних деревьев этого сорта, вполне выносливых, здоровых и урожайных.

5. Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 184-186./ считает, что для сорта наиболее характерны: тупо-яйцевидная форма плода с короткой ножкой и эллиптическая форма листьев. Один из лучших осенних десертных сортов. Достоинством служит - высший вкус плодов, а недостатками: требовательность деревьев к почве и климату и слабая иммунность.

6. Г.А.Чаблучко /"Сорта плодовых культур Молдавии", изд. 1953 г., стр. 283-284./ пишет, что Деканка осенняя, или Желтое масло, - повсеместно распространенный в садах Молдавии осенний сорт, хороший по урожайности, здоровью дерева и особенно по вкусовым качествам плодов.

Деканка серая, Doyenné gris.

Образцы плодов от Л.П.Симиренко из Городища, Киевской губ.

Величина плодов средняя и менее. Форма к верхушке овальная, слегка и косо притупленная, к ножке коническая, остро или тупо, без ребер, часто неравнобокая, иногда с перехватом.

Верхняя ямка широкая, мелкая, с слабыми складками или бороздами, иногда без них, неправильная. Чашечка короткая, бурая, открытая, такого же цвета, как и плод. Нижняя ямка вдавленная, остро-коническая, с боковым полукольцевым вдавлением и боковым выростом мякоти. Ножка короткая, прямая или кривая, на конце утолщенная, длиной менее половины высоты плода.

Кожа крепкая, сухая, слегка шершавая, зеленовато-желтая или желтая, сплошь покрытая ровным тонким желто-бурым ржавым налетом без всяких пятен или полос. Подкожные точки частые, очень мелкие, серые. Запаха нет.

Мякоть белая, мало сочная, винно-кисловатая, сладковатая, с малой пряностью.

Семена в малом количестве, продолговатые, бурые.

Плоды начинают созревать в половине [конце] октября и используются во второй половине октября и первой половине ноября [в течение ноября].

Превосходный десертный сорт, но деревья очень слабого роста

Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 581-582./ советует для замены более прихотливой Деканки осенней садить Деканку серую, плоды которой называет превкусными. По его сообщению деревья этого сорта пирамидальные, с редкой кроной, умеренного роста, средней урожайности. Сорт удается на айве. Прививка 2/1

Плоды этого сорта принадлежат к числу самых изысканных и самых вкусных и, по-видимому, деревья предпочитают сухую, но орошаемую почву, но нуждаются в защищенном местоположении.

Пуля. Вставка (на обороте).

1. Образцы плодов из Минской губ. Помологическое определение: длинная кухонная.

Величина плодов средняя. Форма длинная, неправильная, к чашечке ребристо-коническая, с косой неправильной верхушкой, к ножке остро-коническая и бугристая, с малой косой ямкой при ножке.

Верхняя ямка мелкая, неправильная, с мелкими ребристыми складками. Листики чашечки широкие, пушистые, полуоткрытые. Ножка длиной равна половине высоты плода, тонкая.

Кожа травяно-зеленая, шагреневидная, с частыми серыми подкожными точками, гладкая, при ножке с ржавым налетом.

Мякоть белая, плотная, хрупкая, мало-сладкая, водянистая.

Ранний осенний сорт. Плоды созревают к сентябрю [половине сентября]. Используются на сушку и для кухни.

2 Образцы из Смоленска от Рубца. Помологическое определение: кухонная.

Величина плодов больше средней. Форма при верхушке округлая, к ножке коническая, без ребер, ровная или немного бугристая, правильная.

Верхняя ямка плоская, мелкая, с широкими складками или без них. Чашечка открытая, из черных коротких листиков. Нижняя ямка углубленная узкая, косая, с неровными краями. Ножка длинная, немного кривая, длиной более половины высоты плода.

Кожа не жирная, блестящая, светло-зеленая, с мутной желтизной на солнечной стороне. Подкожные точки частые, серые, просвечивающиеся и буровато-серые пятна. Запах слабый.

Мякоть желтоватая, зернистая, около чашечки и гнезд каменистая, сочная или мало-сочная, сладковатая, но мягкая.

Семена большие, длинные, узкие, черно-бурые.

Плоды на верхушке трескаются, по качеству лучше Тонковетки, но хуже Сапежанки. Около 10 сентября [во второй половине сентября] плоды внутри буреют и мокнут. Они годятся для сушки и кухни, но недостаточно хороши как десертные, похожи на Ильинку.

См. на обороте:

Кайсер. Дули образуют сборную группу сортов груш, имеющих довольно значительную величину плодов, продолговатой усеченно-конической, более или менее закругленной формы. Окраска кожицы по большей части зеленая одноцветная или с неясным румянцем. Мякоть невысокого качества. Плоды преимущественно используются на сушку и вообще для технической переработки.

Дуля зеленая настоящая.

Образцы плодов от Гудкова в Смоленске под неправильным названием Фунтовой.

Величина плодов более средней. Форма продолговатая грушевидная, округлая, к ножке коническая, с перетяжкой, без ребер, ровная.

Верхняя ямка мелкая, плоская, без складок. Чашечка открытая, звездчатая, из узких листиков. Нижняя ямка углубленная, с неровными краями. Ножка средней толщины, прямая, длиной в 2/3 высоты плода.

Кожа немного жирная, лоснящаяся, светло-зеленая, без желтизны, совершенно одноцветная, поверхность слегка неровная, шагреневатая. Подкожные точки частые, мелкие, серые. На верхушке бурый налет.

Мякоть белая, мало сочная, грубо или крупно-зернистая, около гнезд каменистая, около чашечки твердая каменистая, сладковатая, с малой сладостью, без всякой кислоты и пряности.

Семена большие, длинные, острые, черно-бурые; большая осевая пустота.

Плоды созревают в половине [конце] сентября. Кухонный сорт, но гораздо лучше Тонковетки и может при недостатке быть десертным, наравне с Серой осенней /Картофлянкой/.

Груля московская, или астраханская.

1. Образцы от Астраханской школы садоводства. Помологическое определение жирная.

Величина плодов большая. Форма неправильная грушевидная, в верхней части очень толстая с сильным боковым округлым выростом ребра, на верхушке с глубокими бороздами и большими ребристыми подъемами, с половины поперечное вдавление и тонко-коническое [сужение], с косым основанием.

Верхняя ямка большая, широкая, очень глубокая, неправильная, бороздчатая, с вдавленными бороздами разной глубины и широкими ребристыми (д-ка)ми, из которых некоторые переходят в подъемы. Листки чашечки темные буроватые, узкие, скрученные в узкий пучек, закрытые, почти гладкие. Нижняя ямка с полукольцевым вдавлением и боковым выростом, отклоняющим ножку. Ножка тонкая, в 1,5 д. [4 см].

Кожа толстая, плотная, лоснящаяся, жирная, желтовато-зеленая /13 октября [в конце октября], сначала травяно-зеленая, шагреневатая, вся испещренная мелкими серыми ржавыми точками, на солнечной стороне с слабой подернутой желтизной, с следами красноты. Ржавых пятен и налета нет. Запах винный.

Мякоть белая, около чашечки, гнезд и даже внутри их и к ножке грубо каменистая, особенно около чашечки, с сильно просвечивающимися большими сосудисто-волокнистыми пучками, очень сочная, колкая, зернистая, режущаяся ножем как кочерыжка, но нежная, легкого кисловато-сахаристого вкуса.

Семена длинные, острые, темно-бурые.

Отличный компотный сорт. Плоды, вполне зрелые в средине [конце] октября, портятся снаружи. Грубая зернистость мякоти препятствует быть десертной. При полной зрелости плодов особая пряность и запах, как у азиатских сортов /японских/.

3. Г.А. Рубцов в своей книге "Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 160 пишет, что это один из самых распространенных в Поволжье летних сортов.

_Пуля астраханская.

2. Образцы плодов от Т.Скокова в г.Астрахани. Помологическое определение полубера.

Величина плодов большая. Форма грушевидная, кособокая, редко правильная, большей частью по бокам с различными вырастающими округлостями, широкоокруглая, с небольшим косым, поперечно вдавленным конусом.

Верхняя ямка очень широкая, мало углубленная, с ребристыми складками и без них. Листки чашечки короткие, открытые. Ямка при ножке вдавленная, косая, ровная, с боковым выростом. Ножка почти толстая, равная половине высоты плода.

Кожа гладкая, лоснящаяся, жирная, одноцветная, травяно-зеленая, в половине конце октября желтеющая и делающаяся желтовато-зеленой, с частыми серыми точками, без пятен и налета.

Мякоть белая, сочная, зернистая, полутающая, почти крупитчатая, сладковатая, без пряности, в половине [конце] октября мучнистая, около чашечки сладкая, около гнезд, к ножке и чашечке каменистая.

Семена неразвитые.

Осенний сорт. Плоды поспевают в начале [средине] октября, идут для сушки и кухни. /"Сорта плодовых и ягодных культур", изд. 1953 г., стр. 310-311./

4. В.К.Заец в описании Пули астраханской /Пули московской, Пули осенней/ говорит, что этот сорт ценится за зимостойкость и высокую урожайность деревьев, за удовлетворительные качества плодов, их продолжительную лежкость /около двух месяцев/ и хорошую транспортабельность. Плодоношение начинается на 6-7 году. Урожаи ежегодные. Плоды крепко держатся на ветках. Деревья достигают больших размеров. Их кроны широко-пирамидальные, негустые. Листья крупные, округлые, коротко-заостренные, кожистые, с мелко-пильчатым краем и тонким, длинным черешком. Сорт является основным стандартным в Астраханской области и дополнительным - в Волго-Ахтубинской зоне Сталинградской области.

Тот же автор и в той же книге /стр. 348-350./ описывает грушу Французскую /Пулю французскую/, летний сорт, издавна разводимый в садах Аст-

См. на обороте:

рахани и прилегающих к ней районах.

Ее плоды средней величины, неправильной формы, с кожей лимонного цвета, с белой мякотью желтоватого оттенка, сочной, полутающей, кисло-сладкой, терпкой, но хорошего качества.

Деревья медленного роста, дорастают до больших размеров, с широко-пирамидальной густой кроной. Побеги оливково-коричневые, листья мелкие, яйцевидные, темнозеленые.

Сорт ценится за выносливость и здоровье дерева и хороший вкус плодов.

старинный сорт народной селекции.

Дуля новгородская. Впервые описана И.В.Мичуриным в журнале "Прогрессивное садоводство и огородничество", № 10 за 1908 год. И.В.Мичурин предполагает ее происхождение из Лифляндии или Остзейского края.

Величина плодов более средней величины. Форма округло-коническая, правильная. Верхней ямки нет. Чашечка большая, открытая. Нижней ямки нет, но при ножке имеется небольшое кольцевое вдавление. Ножка средней толщины, длиной в половину высоты плода или несколько больше.

Кожа основного желтого цвета, блестящая, на солнечной стороне с ярко малиновым румянцем и красными пятнами по всей поверхности плода.

Мякоть сладкая, сочная, около гнезд каменистая, при перезревании мучнистая.

Семенные гнезда продолговатые, узкие.

Плоды поспевают в первой [второй] половине августа и могут сохраняться до средины [конца] сентября. Они пригодны для невзыскательного десерта и хозяйственных заготовок.

Деревья любят глинистую почву, холодостойки, тугого роста, однолетние побеги серовато-зеленые. Кроны широко-пирамидальные. Листья овальные, с длинными черешками. Плодоношение раннее и потом обильное.

И.В.Мичурин рекомендует данный сорт для коммерческих промышленных садов средней полосы России.

Сорт введен как допускаемый в стандартный сортимент Новгородской, Ленинградской и Псковской областей и для широкого производственного испытания в Калининской, Московской и Ярославской областях.

Н.И.Кичунов, описывая в журнале "Плодоводство" за 1894 г. курские груши, говорит, что Новгородка скорее большая, нежели средней величины груша из "длинных кухонных". Деревья дорастают до громадных размеров. Их кроны раскидистые.

Плоды поспевают в половине [конце] сентября, в зрелости они желтоватые, на солнечной стороне с размытой полосатостью. Мякоть твердая, белая. Благодаря величине плодов, их красоте и ароматичности, Новгородка весьма ценится фруктовщиками, так как используется для мочки, маринадов и консервов в сахаре.

Груша прибалтийская /остзейская/.

Образцы из Горецкого, Могилевской губ., фруктового сада. Помологическое определение: бергамот.

Величина плодов средняя. Форма кубаревидная, плоская, с тупой широкой верхушкой, с низким неравнобоким коническим заострением к ножке, по бокам с слабыми округлыми ребрами или без них и широкими бороздками или ребра сглажены, у ножки кособокая.

Верхняя ямка широкая, мелкая, с широкими или расширяющимися ребристыми складками, переходящими на боках в округлые ребристые выступы. Чашечка широкая, открытая; листики широкие в виде зубчиков, серо-бурые. Нижней ямки нет. и около ножки несколько косых кольцевых складок друг около друга или полукольцевая борозда с боковым выростом. Ножка средней толщины, бурая, длиной более половины высоты плода или равна половине.

Кожа твердая, толстая, немного лоснящаяся, не жирная, у полузрелых плодов светло-зеленоватая или зеленовато-желтого цвета, у зрелых светло-желтого, без румянца, заменяемого желтизной, гладкая, испещренная резкими темно-зелеными и серыми частыми мелкими точками. Запах эфирно-грушевый.

Мякоть белая, под кожей зеленоватая, с желтой мягкой грануляцией, мягкая, рыхлая, рассыпчатая, почти тающая, сочная, немного вяжущая, сахаристая, очень сладкая, без пряности, более сладковатая внутри. Сахаристый сок довольно липкий.

Семенные гнезда далеко разъединенные.

В 1897 г. плоды созрели 24 июля [5 августа]. Мякоть была рыхлая, полумучнистая, даже у полузрелых плодов.

Рост деревьев довольно сильный. Побеги тонкие, вытянутые. Крона пирамидальная, высокая с тонкими поднятыми ветвями, часто кривыми, требующими обрезки на наружную почку, чтобы побеги отклонялись в сторону. Молодые побеги бурые, с серыми чечевичками, двухлетние также бурые, только у 3-х летних кора серая. Листья овально- или яйцевидно-сердцевидные, заостренные к верхушке, светло-зеленые, с длинными черешками.

В 1899 г. в сырое прохладное лето плоды были малой величины, но чистые, созревшие к 20 августа [1 сентября] вместе с Господской грушей.

Багор._

Образцы плодов от Бакланова в Киеве. Помологическое определение: кухонная длинная.

Величина плодов большая. Форма неправильная, в верхней части до половины усеченно-коническая, с тупой косой бугорчатой с одной стороны верхушкой; в нижней части остроконическая, с перехватом, без ребер, с неровными выступами по бокам.

Верхняя ямка углубленная, по краям неровная, с ребристыми складками, без бугорков. Чашечка большая, открытая, с очень узкими бурыми пушистыми листиками, прислоненных друг к другу. Нижней ямки нет и около ножки малая впадина. Ножка средняя, с 1/3 высоты плода.

Кожа толстая, плотная, тусклая, не жирная, шагреневатая, одноцветная, при снятии с дерева темно-зеленая, в зрелости в лежке в конце декабря [в начале января] лимонно-желтая, одноцветная. Точки мелкие, ржавые, бурые, частые.

Мякоть желтоватая, сочная, нежная, слизеватая в полной зрелости и мучноватая, в полузрелости кисловатая, вяжущая, без пряности.

Семенные гнезда малые. Около них сильная каменистость и зернистость [в мякоти]. Семена длинные, узкие, острые, черно-бурые.

Сорт для мариновки и плохой для десерта, для которого может употребляться только до половины [конца] декабря.

† Образцы плодов от Павильчуса из Сувалок.

Величина плодов средняя и большая. Форма неправильная, грушевидная, с округлой неровной угловато-ребристой и бороздчатой верхушкой, коническая и поперечно вдавленная к ножке, с широким тупым основанием.

Верхняя ямка неправильная, сжатая, бороздчатая и складчатая. Листики чашечки длинные, гладкие, сомкнутые, но также бывают открытые. Нижняя ямка довольно углубленная, неровная, с бороздками и мясистыми выростами. Ножка толстая, крючковидная, равная по длине половине высоты плода или несколько менее.

Кожа тусклая, немного шершавая от мелких серых подкожных точек, одноцветная, светло зеленовато-желтая, при созревании почти светло-желтая, без красноты. Подкожные точки частые, резко выступающие, правильно расположенные, при ямках небольшой бурый налет.

Мякоть желтоватая, сочная, тающая, сахаристо-сладкая, без пряности.

Семена щуплые, без зерен.

Плоды начинают созревать в конце сентября [в начале октября] и держатся до половины [конца] октября, загнивают от ножки.

† Образцы плодов от Янковского из Варшавы на Нижегородской выставке 1896 года/ ✳ ✳ † ; П/.

Величина плодов большая. Форма грушевидная, с перехватом выше середины, грубо бугристая, в верхней части сплюснутая, округло-ребристая, неправильная, бугроватая, с тупой верхушкой, широким тупым основанием и широко-коническим заострением почти с 1/2 высоты.

Верхняя ямка широкая, правильная, глубокая. Ножка толстая, крупная, бурая, длиной в 1 д. [2,5 см] .

Кожа тусклая, не жирная, мелко-шагреневатая, более гладкая и несколько блестящая на солнечной стороне, бугроватая, толстая, довольно плотная, зеленоватая 25 сентября [8 октября] , потом желтеющая, на солнечной стороне с тонким мутно-красноватым или красным желтоватым румянцем. Множество редких буроватых подкожных точек и по всему плоду такие же большие сургучные пятна.

См. 2-ой лист.

Мякоть белая, сливочная, нежная, очень сочная, тающая, сладкая, не вяжущая, с пряностью. У чашечки каменистая, около гнезд слабо-зернистая.

Семенные гнезда очень малые. Семена в небольшом количестве, небольшие острые, тонкие, черные.

Плоды начинают созревать в конце сентября [начале октября], хотя бывают еще зеленоватыми.

Образцы от Варшавского помологического сада.

Величина плодов большая. Форма неправильная грушевидная, с боков сплюснутая, с неровной больше-бугристой поверхностью, к верхушке суживающаяся конически, с угловатыми неровными ребрами, выдающимися буграми и разделяющими их слабыми бороздами; более 1/2 тупо-коническая, с тупым косым основанием.

Верхняя ямка суженная, глубокая, бороздчатая и складчатая, с неровными краями от ребристых подъемов. Листики чашечки узкие, приплюснутые, но широкой открытые. Нижняя ямка с большим боковым выростом, глубокая. Ножка толстая, короткая, черная.

Кожа толстая, нежная, слабо блестящая, мелко-шагреневатая, зеленовато желтая, с большими светло-зелеными пятнами, вся испещрена частыми резкими бурыми ржавыми подкожными точками. На верхушке тонкий бурый налет, спускающийся полосами и пятнами; то же в нижней ямке. Запах слабый.

Мякоть около чашечки каменистая, около гнезд зернистая, с сильно просвечивающимися сосудистыми пучками, но сливочная, тающая, сладкая /20 сентября [10 октября] еще мало/, с слабой пряностью. Нет нежности мякоти.

Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 802-807./ пишет, что этот сорт найден во Франции в начале XIX века. Деревья должны быть отнесены к нежным, зябким и требовательным, они нуждаются в очень теплом и защищенном положении и в почве проницаемой, питательной и с достаточным содержанием извести. В Крыму они дают самые сладкие плоды в сухих, а также щебенистых грунтах и обязательно при возможно более позднем сборе с деревьев, так как иначе они в хранении вя-

См. на обороте:

нут и не получают хорошего десертного качества.

Деревья рано начинают плодоносить, а затем более щедрые урожаи правильно чередуются с более скромными. Цветение происходит из ряда вон ра нее и цветы очень чувствительны к холоду. Прививки на айве в молодом возрасте растут довольно сильно, но необходимо иметь в виду слабое срастание привоя с подвоем и поэтому надо тщательно подвязывать и вообще оберегать деревца.

Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 169-171./ говорит, что для этого сорта предпочтительна карликовая и шпалерная культура. Требуется промежуточная прививка на айве. Необходима регулярная обрезка, иначе основные ветви оголяются. Требует сухой питательной почвы и защищенного местоположения. Достоинства сорта: величина, красота плодов, раннее плодоношение, устойчивость против грибных болезней, транспортабельность. Недостатки: нежность деревьев и цветов к холоду, требовательность к почве и климату, изменчивый вкус плодов.

Дюшесс Ангулем бронзовый, Duchesse d'Angoulême bronzée.

1. Образцы плодов из Киева.

Величина плодов более средней. Форма неправильная, сплюснутая с боков, кособокая, и на них с неровными выступами, с широкой верхушкой, заостренная к ножке, с косым основанием.

Верхняя ямка глубокая с слабыми короткими ребристыми складками. Чашечка закрытая или полуоткрытая; листики чашечки неразвитые, мелкие, черные. Нижняя ямка косая, углубленная, с бороздками. Ножка кривая, отклоненная ростом вбок, почти равная по длине 1/2 высоты плода.

Кожа толстая, нежная, грязно-желтая или оранжевая, вся покрытая желто-серой ржавчиной, местами в виде пятен. Подкожные точки частые, серые. Запаха нет.

Мякоть желтоватая, нежная, тающая, около гнезд с незначительной грануляцией, очень сочная, сахаристая, с превосходной пряностью.

Семена узкие, тонкие, длинные, черно-бурые.

Плоды созревают в лежке в конце ноября [в начале декабря].

2. Образцы плодов от Л.П.Симиренко из Городища, Киевской губ.

Величина плодов довольно большая. Форма вверху округленная, с большими, широкими и глубокими ямками, книзу коническая и кособокая от неправильных выростов сбоку. Верхняя ямка с закрытой чашечкой, с узкими черно-бурыми листиками, без складок и борозд. Нижняя ямка с несколькими бороздами. Ножка толстая, длиной почти с половину высоты плода.

Кожа тусклая, светло зеленовато-белая или желтоватая, с серыми подкожными точками, но на всем плоде с ржаво-бурой сетчатостью и сплошными пятнами, часто с бронзовым отливом.

Мякоть белая, тающая, сливочная, чуть зерноватая, очень сочная, сахаристая, пряная, хорошо держится в хранении, нежели обыкновенный Дюшесс Ангулем. Плоды созревают в половине [конце] октября.

3. Этот дюшесс, как и Duchesse d'Angoulême panachée (полосатый), является разновидностью типичной формы Duchesse d'Angoulême.

V

Дюшесс зимний, Duchesse d'hiver, Tardive de Toulouse, Sparte Toulouse.

1. Образцы от Воронцова-Дашкова из Крыма.

Величина плодов большая. Форма грушевидная, толстая, по бокам с выдающимися округлостями, к чашечке округло-коническая, мелко-ребристая и бороздчатая, к ножке усеченно-коническая с вдавленной поверхностью.

Верхняя ямка углубленная, мелко-бороздчатая. Листики чашечки короткие, открытые. Нижняя ямка углубленная, с слабыми выростами. Ножка толстая, короткая, длиной менее 1/4 высоты плода.

Кожа гладкая, блестящая, светло-зеленая, потом желтоватая, на солнечной стороне с слабой разлитой розоватой краснотой и без нее, с мелкими серо-зелеными, резко выступающими подкожными точками.

Мякоть белая, зернистая, строения как у редьки, мало-сочная и малосладкая, около гнезд и к чашечке каменистая, очень похожая на мякоть Дули астраханской.

Семена большие, толстые, темно-бурые.

Плоды созревают в лежке в начале [средине] ноября. Сладкие, пригодные для сушки и др. заготовок, а также для кухни.

2. Образцы плодов от П.П.Симиренко из Городища, Киевской губ.

Величина плодов большая. Форма кубаревидная, на верхней половине яровидная с слабыми округлыми ребрами и бороздами, к ножке коническая, с поперечным перехватом, везде, особенно к ножке, неровная поверхность от бугристости. Верхняя ямка с угловатыми ребрами и узкой открытой чашечкой из тонких листиков. Нижняя ямка углубленная. Ножка толстая, короткая.

Кожа тусклая, сухая, очень толстая, плотная, одноцветная. Сначала в лежке светло-зеленая, потом в январе и феврале светло-желтая, с серовато-ржавыми подкожными точками и с большими серо-желтыми сетчатыми ржавыми пятнами.

Мякоть белая, плотная, кочерыжная, мало-сладкая, вверху прозрачная, в конце хранения бурая.

Плоды могут лежать до половины [конца] февраля и даже позднее.
Компотный сорт.

См. стр. 2. (Тулузская поздняя)

3. Л.Н.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 608-610./пишет, что этот сорт получен во Франции в половине XIX века. Деревья в Крыму отличаются здоровьем, бывают средней силы, образуют довольно большую, широкую и разветвленную крону, рано начинают плодоносить и потом ежегодно и хорошо плодоносят. Прививка на айве хорошо удается.

171 Считать 2-ой стр. К. Дюшесс зимний-

Тулузская поздняя, Tardive de Toulouse, Späte von Toulouse.

† Образцы плодов (получены от Варшавского помологического сада. под Гатчиным наименем

Величина плодов больше средней. Форма двояко-коническая, кособокая, конус к верхушке заостренный, к ножке с вогнутой поверхностью, вверху ребристая и бороздчатая.

Верхней ямки почти нет, узкая, мелкая на очень узкой верхушке, с ребристыми складками. Листики чашечки узкие, черные, длинные, полуоткрытые. чашечка малая. Нижняя ямка небольшая. Ножка толстая, кривая, длиной в 1/4 высоты плода.

Кожа не жирная, слабо блестящая, толстая, плотная, шагреневидная, бугристая, однотонная, грязно лимонно-желтая, до созревания темно-зеленая, с многочисленными подкожными бурыми точками, без запаха. К созреванию сильно сморщивается и чаще у чашечки и ножки.

Мякоть желтоватая, плотная, мало-сочная, каменистая около чашечки, мало-сладковатая, безвкусная, напоминающая репу.

Семена зрелые, темно-бурые, толстые, длинные, с прямым длинным острием.

Плоды созревают в декабре в конце января [в начале февраля]. Годятся только для компота. Сорт с плодами зимнего поспевания.

† Образцы плодов, полученные от Янковского из Варшавы: ✕ † ; IV – V.

Величина плодов меньше, чем предыдущего описания. Форма продолговатая грушевидная, к верхушке усеченно-коническая, но к ножке более острая.

Верхняя ямка малая, с короткими открытыми листиками чашечки, слабо ребристая, с бурой ржавчиной. Нижней ямки почти нет, образованы только бугорки. Ножка длинная, кривая, почти равная половине высоты плода.

Кожа почти зеленая, очень толстая и плотная, весьма сильно сморщенная, с особыми крупными ржаво-бурыми пятнами, величиной с горошину – это верно болезнь, ибо не походит на ржавый налет. Подкожные точки слабые.

Мякоть значительно хуже, чем предыдущего описания.

Зимний сорт с плодами поздне зимнего или весеннего использования для переработки и компотов.

См. на обороте:

4. Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 193-194./ считает этот сорт преимущественно декоративным. Ценное его достоинство - выдающаяся лежкость и красивый вид плодов. Сорт может разводиться только на крайнем юге СССР.

2 1
Дюшес английский полосатый.

Образцы плодов от К. Н. Клейнмихеля из Ивн, Обоянского у., Курской губ.

Величина плодов малая. Форма кубаревидная, к верхушке круглая, к ножке коническая, правильная, без всяких ребер. Верхняя ямка мало углубленная, без складок, как бы выточенная. Чашечка открытая с бурыми, звездчато прилегающими к плоду, листиками. Ножка почти равна высоте плода, при ней кольцевая бороздка.

Кожа плотная, не жирная, бело-зеленая, на солнечной стороне с различным желто-киноварным неясно-пятнистым румянцем и по всему плоду, особенно при верхней ямке, с слабо пестрой желто-буроватой ржавчиной. Подкожные точки очень частые, мелкие, ржавые. Запаха нет.

Мякоть белая, очень сочная, плотная, зернистая, полутающая, винно-кисловатая и вяжущая, с едва заметной пряностью.

Плоды этого сорта могут заменять бергамот, но гораздо хуже его по вкусу. Название дюшес нисколько не соответствует величине и вкусу.

Семена небольшие, продолговатые, с коротким носиком, черные, зрелые 20 августа [1 сентября], но мякоть в это время еще плотная.

Летний сорт. Созревание плодов во второй половине августа [первой половине сентября].

Л\гоивсjпоолосатый,

Образцы плодов от Четыркина в Смоленске.

величина плодов средняя и более. Дорма округлая, сплюснутая на темени и вытянутая концом и косая к ножке, без ребер, ровная. Верхняя ямка мелкая, плоская, без всяких складок. Чашечка с короткими, отогнутыми, неровными листиками, открытая. Нижняя ямка боковая, вдавленная, свевху с боков выросты. Ножка тонкая, длиной с 9/3 высоты плода.

ложа не жирная, неровная, гвубо-шагвеневатая, светло-зеленая, на солнечной стороне с мутно буровето-красным румянцем и с слабой полосатостыо. На вевхуике жесткая ржавчина, от верхушки по бокам хавактевние серо-белые крапины от ржавых раскрытых точек, ^апах слабый.

Мякоть белая, сочная, нежная, мелкозернистая, около гнезд с малыми

175.

Дюшесс сухумский.

1. Описание сделано по В.В.Марковичу /"Известия Сухумской Садовой и с.-Опытной Станции", № 4, 1912 г./, который впервые описал этот сорт.

Среди промышленного сортимента для Сухумского округа груша Дюшесс сухумский занимает первое место.

Величина плодов средняя. Вес около 110 г. Форма колокольчатая или опрокинутого усеченного конуса, плоско округло-коническая. Широкая часть в верхней 1/3 плода. Чашечка твердая, в неглубоком плоковатом углублении; листики короткие. Ножка длиной в 1/3 высоты плода, довольно толстая, утолщенная к нижней ямке, почти прямая.

Кожа тонкая, гладкая. Во время съемной зрелости одноцветная, зеленая, /особенно около чашечки/ покрытая ржавыми пятнами и точками, делающими ее местами шероховатой.

Мякоть беловато-желтоватого /кремового/ цвета, тающая, сочная, сладкая, /слабо окрашенная/ слабо-каменистая около гнезд, с небольшой терпкостью, очень приятного вкуса.

Семенные гнезда овальные, с продолговато-овальными семенными камерами. Семена часто щуплые, недоразвитые, черно-коричневые.

Это самая ранняя из маслянистых груш в Сухуми. Плоды поспевают в первой [второй] половине июля, когда они совершенно зеленой окраски. До начала пожелтения проходит недели две. Могут сохраняться в хорошем хранилище до конца октября [начала ноября] .

По-видимому, это совершенно особый сорт, образовавшийся при исключительно местных условиях. Он ближе всего подходит к Дюшессу летнему, Duchesse d'été.

Деревья [очень выносливы, не требовательны к уходу, не болеют и ежегодно плодоносят. Образуют пирамидальную крону. Высота деревьев 10 аршин [7 м], диаметр у основания пирамиды 7 арш [около 5 м. Диаметр ствола на высоте груди 5,5 вершков [около 25 см] .

2. Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 157./ говорит, что это сорт исключительного значения для Абхазии, где превосходно удается, в

См. на обороте:

то время как большинство европейских сортов сильно страдает от болезней, главным образом от парши.

177

Дюшесса Эльза, Duchesse Elsa.

Образцы плодов от Л.П.Симиренко из Городища, Киевской губ.

Величина плодов более средней. Форма коническая длинная, тупо-усеченная на верхушке и при ножке, часто на 1/3 к ножке с боковым перехватом, несколько сплюснутая с боков и с округлыми выпуклостями к верхушке.

Верхняя ямка широкая, углубленная, с неровными короткими сглаженными ребристыми складками, переходящими в выпуклости. Чашечка малая, короткая, сильно открытая. Нижняя ямка углубленная, с боковыми выростами. Ножка дуговидная, тонкая, длинная, более 1/2 высоты плода, черная.

Кожа тонкая, нежная, светло-зеленая, потом зеленовато-желтая и светло-желтая, вся покрытая мелкими темно-серыми подкожными точками и бурыми сетчатыми пятнами ржавчины. Запах слабый. Местами очень слабая розоватость, иногда в виде полосок.

Мякоть белая, нежная, мало каменистая около чашечки, очень сочная, тающая, винно-кисловатая, с нежной пряностью, более кисловатая, чем Бера Клержо.

Плоды созревают в начале [средине] октября, используются в течение октября [до половины ноября], отлично выдерживают перевозку.

а

Желтая летняя.

Образцы из Горецкого, Могилевской губ., фруктового сада.

Величина плодов малая. Длина около 2 д. [5 см], ширина 1,5 д. [3,5-4 см]. Форма яйцевидная, неравнобокая, с ростом около ножки и против него с складчатым вдавлением. Верхняя ямка плоская, мелкая, с небольшими ребристыми складками. Чашечка звездчатая, с длинными зубчиками. Подчашечная трубка идет иногда очень глубоко внутрь гнезд, почти до средины плода. Ножка тонкая, очень длинная, длиннее плода, на конце изогнутая, при плоде прямая.

Кожа зеленовато-желтая, на плоде [с солнечной стороны] с маслянистым налетом, жирная на ощупь, с мелкими редкими зеленоватыми и черноватыми пятнами.

Мякоть даже при лежке не сладкая, бесвкусная.

5.

179

Желтая осенняя.

Образцы плодов от Четыркина в Смоленске.

Величина плодов средняя и менее средней. Форма продолговатая грушевидная, вверху округлая, неправильная, к ножке коническая, с слабыми продольными бороздами и ребрами, иногда борозды проходят по всему плоду, а на конической части с слабым перехватом. Верхняя ямка малая, очень мелкая с короткими слабыми ребристыми складками. Чашечка сильно открытая, из темных длинных завернутых наружу листиков. Нижняя ямка неправильная, углубленная, с мясистым выростом. Ножка коротная, кривая.

Кожа слабо-жирная, лоснящаяся, неровная, светло-желтая, на солнечной стороне слабый мутный киноварно-красный румянец. Подкожные точки мелкие, серые, на румянце тусклые розоватые. Запаха нет.

Мякоть желтоватая, зернистая, сочная, почти без сладости и кислоты, но до такой степени сильно вяжет, что походит на раствор танина, около гнезд слабо каменистая, грубо зернистая.

Семена большие, острые.

Кухонный сорт. Плоды созревают во второй половине сентября [первой половине октября].

Листья овальные, с загнутой верхушкой, цельнокрайние, с редкими волосками.

1. Жозефина, Josephine d'hiver, Jaminette, Poir d'Austrasie.

Образцы плодов от Капустина из Крыма.

Величина плодов средняя или большая. Форма бергамото-образно-шаровидная, на большей части конически-округлая, с плосковатыми гранями и бороздами до наибольшей выпуклости в средине, откуда к ножке остро-коническая с поперечным вдавлением.

Верхняя ямка углубленная, средней ширины, по краям с слабыми бороздами, переходящими на бока, с сглаженными складками. Чашечка открытая. Ее листики короткие, буроватые, опущенные. Бока пятиугольные, округлые. Нижней ямки нет или слабое кольцевое вдавление и небольшие продольные борозды. Ножка тонкая, короткая, прямая.

Кожа тусклая, толстая, плотная, слабо-жирная, сначала темно-зеленая, крупно-шагреневатая до легкой шершавости, с резкими большими и частыми серыми подкожными точками, в зрелости зеленовато-желтая. Запах слабый специфический [специфический].

Мякоть желтоватая, сочная, около чашечки и гнезд каменистая и далее к ножке, тающая, очень нежная, сладкая, хотя и несколько, не вяжущая, очень вкусная, без пряности.

Семена толстые, светло-бурые, с тонким вытянутым носиком.

Плоды созревают в начале [средине] декабря и хорошо держатся иногда до начала [средины] февраля.

Отличный торговый [промышленный] сорт.

2. Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 611-212./пишет: "Дерево развивает бойкий и сильный рост и образует пирамидальную, не густую крону. Оно отличается здоровьем, но, по-видимому, несколько чувствительно к зимнему холоду, почему требует защищенного положения и легкой, теплой и не сырой почвы. Дерево входит довольно поздно в пору плодоношения, которое, однако, с возрастом налаживается и отличается правильностью и обилием."

V

Жозефина мехельнская, Joséphine de Malines, Josephine von Mecheln

1. Образцы плодов от Л.П.Симиренко из Городища, Киевской губ.

Величина плодов средняя. Форма бергамотная, кособокая, при верхушке и основании плоско-округлая и даже к ножке бывает низко-коническая, с сглаженными бороздами, вообще довольно ровная.

Верхняя ямка широкая, углубленная, с открытой чашечкой из узких листиков.

Нижняя ямка косая, углубленная. Ножка, прямая, очень толстая, длиной более 1/2 высоты плода.

Кожа сухая, тусклая, толстая, плотная, светло лимонно-желтая, одноцветная, с мелкими серыми подкожными точками. На одном боку, при чашечке и нижней ямке с серо-ржавыми мраморными пятнами.

Мякоть желтоватая, очень сочная, пряная, мягкая, нежная, тающая, сладковатая, без кислоты /с небольшим сладковатым остатком/.

Плоды созревают в декабре, в конце декабря [начале января] совсем зрелые и в хороших условиях сохраняются до марта.

Превосходный бергамот, выведенный в Бельгии в 1830 г. и разводимый у нас на юге. Б.М.Шабловский /"Провідні сорти плодових культур УРСР", изд. 1937 г./ пишет, что

3. Деревья в молодом возрасте тугорослы и дорастают только до средней величины. Их кроны широко-пирамидальные, с развесистыми ветвями средней густоты, средней долговечности. Холодостойкость средняя, но лучше представлять теплое местоположение, наиболее защищенное от холодов. Засухоустойчивость лучше многих сортов; при недостатке влаги плоды не опадают, хотя и бывают мелкими. Плодоношение на 8-9 году, затем правильное и достаточно высокое. Сорт стойкий против парши.

2. Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 613-616./ пишет, что деревья этого сорта умеренной силы и совсем в Крыму нечувствительны к холоду, так как (например) в зиму 1910-11 гг. во взрослом возрасте хорошо перенесли морозы - 30° R. Они образуют разветвленную широко-пирамидальную крону, довольно поздно начинают плодоносить, но потом хорошо приносят урожаи через год. Не следует злоупотреблять обрезкой и

См. на обороте:

надо иметь в виду, что все короткие побеги обыкновенно оканчиваются плодовыми почками. Деревца на айве сначала развиваются медленно, но потом образуют пирамиды номальной силы и относительно большой долговечности. Плоды бесспорно принадлежат к числу самых тонких десертных.

Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 202-204./ считает наиболее характерными для сорта: поникую крону деревьев, оливковую окраску молодых побегов, мелкие листья и розовую окраску мякоти плодов. Сорт в СССР мало распространенный, рекомендуемый для Украины. Недостатком сорта является малая величина и невзрачность плодов, но необходимо учитывать их высокие вкусовые качества.

Г.А.Каблучко /"Сорта плодовых культур Молдавии", изд. 1953 г., стр. 309-311./ говорит, что Михельнская, или Жозефина Михельнская, - старый сорт. Встречается повсеместно в Молдавии, но в небольшом количестве.

Л.И.Сергеев /"Сорта плодовых и ягодных культур", изд. 1953 г.,стр. 313-316./ считает достоинствами сорта хорошую морозоустойчивость деревьев и высокие вкусовые качества плодов, а недостатками - сравнительно небольшую величину и невзрачный вид плодов. Сорт принят в стандартный сортимент Северного Кавказа и Крыма по третьей группе., а в Северной Осетии и отдельных районах Кабардинской АССР и Краснодарского края по второй группе.

Звонок.

Образцы плодов из сада против грота в парке Горецкого с.х. училища. Под названием Звонок в местной торговле. Помологическое определение: кухонная длинная.

Величина плодов средняя. Форма длинная, грушевидная, сильно заостренная к ножке, где при высыхании сморщивается, большей частью неравнобокая, с отклоненной ножкой, равной по своей длине ширине плода. Бока на суженной части с слабыми буграми, а на утолщенной с слабыми ребровидными округлыми выступами. Верхушка округлая или немного плоская, ровная или с мелкими бороздами. Чашечка широко раскрытая в мелкой ямке.

Кожа тусклая, немного жирная, одноцветная, светло-зеленая или зеленая, при созревании немного белеющая, вся покрыта мелкими ржавыми подкожными точками. Около чашечки небольшие ржавые пятна. Ножка окружена серой ржавчиной.

Мякоть белая, немного сладковатая, потом мягкая, мучнистая, пресная и бесвкусная. В конце сентября [начале октября] в хранении буреет около гнезд, оставаясь однако сочной.

Плоды легко сохраняются даже в комнате до конца сентября [половины октября], оставаясь с плотной мякотью, но сморщивающейся и стягивающейся у ножки. Не годится для сушки, потому что сильно морщится; также не пригода для мариновки: делается очень мягкой и дряблой. Во время хранения также невкусная, так как вкусом похожа на репу. Вообще сорт не стоющий разведения.

[Деревья возрастом свыше ста лет. Очень стойкие против разных невзгод, с достаточным приростом. Было бы целесообразно использовать сеянцами и отводками для получения подвоев с выносливыми штамбами.]

_Зеленая_столовая._

Образцы плодов от Борзенской школы садоводства, Полтавской губ.

Величина плодов большая. Форма грушевидная, к основанию косая, остроконическая, далее с небольшим перехватом или округлая, с широкой тупой верхушкой, к которой с боков идут ребра и борозды, образующие на краях ямки небольшие подъемы; бугров нет и поверхность ровная.

Нижней ямки нет. Полукольцевая впадина около толстой, внизу мясистой ножки, сильно отогнутой вбок. Верхняя ямка широкая, углубленная, с 10 ребристыми складками, более узкими и широкими. Чашечка открытая, из коротких, на концах буроватых листиков.

Кожа тусклая, крепкая, толстая, однообразного светло-зеленого цвета, даже в полной зрелости без всякой желтизны и красноты. Вся поверхность с частыми мелкими буроватыми подкожными точками, окруженными зелеными пятнами, но вообще не резко выдающимися и даже мало заметными, иногда сбоку на поверхности бурые пятна, образующие подобие сетки.

Мякоть 15 [28] августа у одних плодов совсем перезрелая, у других крепкая, довольно мягкая у ножки, белая, мало сочная, буреющая около гнезд, волокнистая, вяжущая, кисловатая, довольно приятного вкуса, вообще в побуревшей части более сладкая. Может служить для десерта 2-го качества. У перезрелых водянистая, сладковатая. Слаще и лучше Тонковетки. Пригодна для разведения.

V

Zephrin Gregoire, Зефир Грегуара.

Образцы плодов от Янковского из Варшавы /* * † ; XII - III/.

Величина плодов большая. Форма широкая, грушевидная, на 2/3 от верхушки плоская, книзу с перехватом коническая, с очень широкой верхушкой, без ребер, но с выдающимися округлостями.

Верхняя ямка глубокая, слегка бороздчатая, без складок, с сильной бурой ржавчиной. Чашечка короткая, открытая, буроватая. Нижняя ямка правильная, углубленная. Ножка средняя.

Кожа слабо блестящая, не жирная, шагреневатая, некрасивого грязно-желтого цвета от частых бурых подкожных точек и с мутной разлитой желтоватой краснотой на солнечной стороне. Точки резкие. Запах грушевый.

Мякоть белая, около чашечки и к ножке сильно каменистая, сочная, полутающая, сладковатая, мучнеет в конце декабря [начале января] и делается не вкусной.

Плоды созревают в декабре, требуют хороших хранилищ, а иначе загнивают снаружи и вообще портятся преждевременно.

Н. Буренков в журнале "Плодоводство" за 1897 г., стр. 661-662 пишет, что рост деревьев не очень сильный, ветки довольно тонкие, длинные, прямостоящие. Плоды держатся крепко на ветках и от ветра не падают. Сбор в Киеве производится в конце сентября или в начале октября [в начале или середине октября] . Сохраняются в лежке до декабря - января, Плоды достигают средней величины. При сборе они зеленые, а в лежке становятся лимонно-желтыми. Вкус очень хороший. Имеется весьма приятный аромат. Мякоть очень сладкая и сочная.

Золотая.

Образцы плодов из Ростова на Дону.

Величина плодов больше средней. Форма грушевидная, к ножке утонченная, неравнобокая. Чашечка большая в углубленной ямке на широкой тупой верхушке. Ножка толстая, длиною в половину плода, у основания с мясистым выростом.

Кожа желто-зеленая, в зрелости золотисто-желтая, откуда название сорта; на солнечной стороне с ярким пламенным румянцем.

Мякоть бледно-желтая, тающая, сочная.

Семенные гнезда узкие, вытянутые.

Плоды поспевают в половине [конце] августа, имеют на рынке большой спрос и продаются по высокой цене. Превосходный десертный сорт с очень сильным своеобразным ароматом.

Деревья выносят морозы в 30° Р. [37,5° Ц.], не замерзая даже на верхушках.

Золотистая зимняя. *Traite d'hiver.*

Образцы от Л.П.Симиренко из Городища, Киевской губ.

Величина плодов небольшая. Форма к чашечке овальная, на верхушке с сглаженными бороздами и ребрами, более заметные в ямке, где открытая чашечка из коротких листиков; к ножке коническая. Нижней ямки нет. Около ножки мясистый вырост. Ножка тонкая, несколько отклоненная в сторону, равная половине высоты плода.

Кожа слабо лоснящаяся, плотная, зеленовато-желтая, на большей части с разлитым желто-розовым румянцем, с мелкими и слабо заметными серыми подкожными точками.

Мякоть желтоватая, не тающая, но мягкая или полутающая, сладкая.

Плоды на вид красивые, но малой величины, поспевают в лежке в начале [в средине] ноября.

Л.П.Симиренко рекомендует обратить внимание на этот сорт.

Ильинка. Очень часто Ильинкой называют Тонковетку, но первая весьма отличается от второй и является особым сортом. Немцы называют этот сорт, а в Крыму его зовуи Кабак армуд, что в переводе значит "груша тык-
Образцы плодов получены от Уманского с.х. училища, Киевской губ.

Величина плодов по большей части средняя, но бывает больше средней и меньше средней. Форма округло-коническая или плоско округло-коническая по большей части неравнобокая.

Верхняя ямка широкая и довольно углубленная. Листики чашечки значительной величины, бурые. Нижняя ямка большая. Ножка средней толщины, длиной в половину высоты плода или даже длиннее, отклоненная в сторону, сильно изогнутая.

Кожа основной окраски желтовато-зеленоватой, с хорошо заметными подкрупными, оливковыми, редкими кожными точками. На солнечной стороне желто-оранжевый или коричнево-буроватый румянец. Аромат слабый.

Мякоть беловато-зеленоватая, мало-сочная и мало-сладкая, довольно рыхлая, почти без кислоты.

Очень распространенный на Украине летний сорт, плоды которого поспевают в конце июля [начале августа] и быстро переспевают, так как мякоть делается мучнистой. Однако сорт отличается неодновременным поспеванием плодов и поэтому приходится делать два или несколько сборов. Лежкость плодов около недели и то, если сбмка произведена лишь в начале поспевания. Урожайность очень хорошая. Б.И.Шабловкий /"Провідні сорти плодових культур УРСР", изд. 1937 г./ пишет, что

Деревья очень сильно-рослые, долговечные и достигают огромных размеров. Сначала их кроны овальные, а потом становятся пирамидальными, с средним расположением веток. Листья крупные. Плоды часто поражаются грибком парши, которая также бывает и на листьях.

Это один из любимых на Украине летних сортов груш.

Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 620-622/ говорит: "дерево совсем неприхотливое, безусловно холодостойкое, мирится со всякой почвой, но в мало-мальски порядочном грунте оно очень пышно развивается, достигает тут громадных размеров и доживает до глубокого возраста"... По щедрости плодоношения Кабак армуд едва

См. на обороте:

ли уступает такому благодарному сорту, как Франц-Мадам: полные урожаи повторяются у него через год и как нельзя лучше отвечают силе дерева, нередко приносят от 25 до 40 пудов."

Г.А.Рубцов /"Груша", 2-ое изд., 1937 г., стр. 157-158./ считает достоинствами сорта: силу роста, здоровье и урожайность деревьев и недостатками - посредственный вкус и малую лежкость плодов.

Г.А.Каблучко /"Сорта плодовых культур Молдавии", изд. 1953 г., стр. 263-264/ пишет: "Ильинка - один из самых старых отечественных сортов. Она имеет большое распространение в Каменец-Подольской, Винницкой и других областях лесостепной части Украины, а также повсеместно в Молдавии. Деревья в садах поймы Южного Приднестровья и в Кодрах нередко достигают 80 лет и даже больше... Ильинка ценится как один из ранних сортов груш, высокой урожайности, большой долговечности и хорошей устойчивости к неблагоприятным условиям. Транспортабельность плодов Ильинки невысокая, однако снятые в недозревшем виде плоды могут перевозиться на значительные расстояния."

3. _Осиновка._

Образцы плодов из Могилевской губ.

Величина плодов средняя. Форма на верхушке усеченно-коническая, с тупой верхушкой, неравнобокая, с слабо выдающимися неравными округлостями, без ребер, к ножке коническая, с слабым перехватом.

Верхняя ямка правильная, мало углубленная, с тонкими ребристыми складками. Чашечка малая, открытая с черными отклоненными листиками. Нижняя ямка косая, с кольцевым углублением. Ножка длинная, немного изогнутая.

Кожа тонкая, нежная, одноцветная, светло-желтая, ровная. Подкожные точки незаметные, без всякой ржавчины и красноты.

Мякоть нежная, тающая, сладкая, мало-зернистая около гнезд.

Плоды созревают в начале средине сентября и держатся до средины конца сентября . Пригодны для десерта и кухни. Похожа на Ильинку.

Кадильница.

Образцы плодов от И.И.Каразина, вблизи Харькова.

Величина плодов менее средней. Форма длинная, при верхушке округлая, к ножке сильно вытянутая в кривой длинный конус, который переходит в морщинистый длинный конический мясистый нарост на ножке с поперечными морщинистыми перехватами. Ножка равняется высоте плода. Верхняя ямка мелкая, с неясными складками. Чашечка малая, из узких закрученных листиков, открытая. Нижней ямки нет и края ее обозначаются кольцевым перехватом.

Кожа тусклая, сухая, светло-зеленая, шагреневатая, одноцветная, с неясными мелкими зелеными подкожными точками, а к ножке с мелкими ржавыми точками.

Мякоть белая, не зернистая, мягкая, кисловато-сладкая, в полной зрелости полутающая, без вяжущего привкуса или немного с ним.

Семена длинные, узкие, острые, темно-бурые.

Зреет в начале [средине] октября и держится до его половины [конца]. В конце сентября [начале октября] крепкая, но с зрелыми семенами.

V

192

_Калебаса плоцкая, Kalebasa plocka,

Два сходных обращика от Гозера /Варшава/ и Варшавского Общества садоводства значительно отличаютсяот типичной формы Grum Kower Butter birne, под каким названием у Гозера. Этот сорт скорее может рассматриваться как более близкий к Triumph de Jadaigne, от которого отличается тонкостью кожи и более сильной ребристостью, но не имеет бугорчатости и в зрелости желтого цвета, как у Беры грумбковской.

Помологическое определение: бера зеленая длинная.

Величина плодов более средней. Форма продолговатая, грушевидная, неправильная, кверху неправильно округлая и иногда с боков сплюснутая, к ножке с перехватом, переходящим в конус; на округлой части с выдающимися округлостями ребер и небольшими бороздами, но не суживается в ребристый конус к верхушке, как у Беры грумбковской. Верхняя ямка мелкая, неровная по краям, без складок. Листики чашечки длинные, звездчатые, открытые. Ножка с кольцевым вдавлением ямки, тонкая, крючковидная, равная половине высоты плода.

Кожа слабо блестящая, гладкая, светло-зеленая, а не травяно-зеленая, в зрелости немного желтеющая, с частыми мелкими серыми подкожными точками, около чашечки с ржавым налетом и ржавыми тонкими пятнами на верхушке.

Мякоть белая, нежная, очень сочная, тающая, маслянистая, сладкая с небольшой кислотой.

В конце октября [начале ноября в лежке становится] совсем зрелой..

Превосходный десертный сорт.

Чаштелянка.

Образцы плодов от О.Ф.Бохвица из Минской губ. Помологическое определение: полубергамот.

Величина плодов средняя. Форма округло-коническая, неправильно заостренная к ножке, с выдающимися по бокам, по ширине, округлыми выдающимися частями, в нижней части правильно округлая. Верхушка округлая, плосковатая, немного неровная. Чашечная ямка правильная, не глубокая. Чашечка широкая, открытая, с широкими и короткими отвернутыми листиками. Ножка косая, тонкая, длиной в половину высоты плода.

Кожа тусклая, неровная, шагреневидная, желтоватая, на солнечной стороне светло-желтая, с слабыми сургучно-красными полосами и пятнами, соединенными крапом в один как бы сплошной желто-красный румянец. Подкожные точки мелкие, сероватые.

Мякоть белая, сладковатая, нежная, полутающая. Каменистая часть между чашечкой и гнездами.

Плоды созревают в начале [половине] сентября. Хороший летний десертный сорт, также может служить для кухни и заготовок.

V

194

Киффер, Сеянец Киффера, Kiefer's seedling.

1. Образцы плодов от Брика

Величина плодов средняя. Форма очень неправильная, кособокая, овально-коническая, приплюснутая с боков и с большим половинным [на половину окружности] выростом плода при верхушке, с округлыми сглаженными к верхушке ребрами и бороздами. Верхняя ямка очень неправильная, глубокая с вдавленной чашечкой с мелкими листиками, с мелкими складками. Нижняя ямка углубленная, узкая, с боковыми выростами. Ножка тонкая, равная по своей длине половине высоты плода.

Кожа тусклая, слабо шершавая от многих серых подкожных точек и сплошного серо-бурого налета на верхушке, местами сетчатые шершавые ржавые пятна. Цвет лимонно-желтый, на солнечной стороне ярко-красный с резкими серыми подкожными точками, румянец переходит в слабую полосатость. Приятный сильный пряный клубничный аромат.

Мякоть желтая, полутающая, каменистая около чашечки, сладковатая, с сильной пряностью клубники, чем резко отличается от др. сортов.

Семена длинные, толстые, темно-бурые, с характерным белым носком. Семенное гнездо общее.

Плоды созревают в конце сентября [начале октября] и уже в начале [средине] октября портятся.

Деревья этого сорта у Гозера в Варшаве погибли вследствие зимних морозов 1892-93 гг.

2. Образцы плодов от Л.П.Симиренко из Городища, Киевской губ.

Величина плодов средняя. Форма сложная, в средине овальная, как у лимона, к верхушке тупо-коническая с сглаженными ребрами, к ножке остро-коническая, с перехватом, боковым выростом и мякотью при ножке, часто неравнобокая.

Верхняя ямка широкая, косая, с сглаженными ребристыми складками. Чашечка короткая, полузакрытая, черная. Нижняя ямка в виде кольцевого валика или только боковая. Ножка толстая, короткая, внизу мясистая.

См. на обороте:

Кожа тонкая, нежная, тусклая или лоснящаяся, жирная, одноцветная, лимонно-желтая, на солнечной стороне на небольшой части слабая мутная полосатость. Подкожные точки мелкие, частые, резкие, серые, на верхушке бурый налет. Мякоть желтоватая, очень сочная, нежная, тающая, винно-сладкая с мускатной пряностью, от гнезда к ножке винно-кислая, грубее клеровато.

Гнезда крупные. Семена продолговатые, острые бурые.

Созревание плодов в начале [средине] октября, совсем зрелые в половине [конце] октября и могут лежать до конца октября [начала ноября].

Отличный десертный сорт.

Образцы, полученные оттуда же, были средней величины. Формы продолговатой. Вверху овальной с узкой верхней ямкой, внизу конической. В верхней ямке оранжевые складки. Они мало углубленные и очень характерные. Чашечка из бурых длинных листиков. Нижняя ямка углубленная. Ножка толстая, в 1/4 высоты плода.

Кожа толстая, плотная лимонно-желтая, одноцветная, с мелкими или более крупными серо-бурыми подкожными точками, тусклая.

Мякоть белая, плотная, кисловатая, мало-сахаристая, сочная, с мускатным запахом. Темные пятна от давлений во время пересылки не распространяются вглубь, но придают плодам некрасивый вид.

Плоды созревают в начале [средине] октября, хорошо зрелые в средине [конце] октября.

Г.А.Каблучко /"Сорта плодовых культур Молдавии", изд. 1953 г. стр. 287-288./ описывает данный сорт под названием "Урожайная" и говорит, что он широко распространен в Молдавии, благодаря высокой урожайности и неприхотливости к местоположению и почве, а также высокой морозоустойчивости. При обследовании садов были обнаружены деревья не только с осенним сроком созревания плодов, но также с зимним созреванием.

Плоды, купленные в Сухуми под этим названием 23/IX 1959 г. в недозрелом состоянии. Описание сделано 8/X после пересылки почтой в течение 6 дней.

Величина плодов средняя, более средней и большая, некоторые даже весьма крупные, весом до 400 г.

Форма мешетчатая, кособокая, с небольшим расширением на средине высоты, к верху тупо широко-коническая, с неровной и сильно бугристой верхушкой, с большими широко-округлыми буграми и бороздами. Верхняя ямка очень глубокая, широкая, с дольчатыми краями. Чашечка огромная, широкая, очень глубокая, с широкими листиками, буро-черного цвета. Основание более сужено, чем верхушка и нижняя часть более коническая, но также тупая и сильно бугристая. Нижняя ямка углубленная, правильная, менее глубокая, чем верхняя. Бока довольно гладкие, но с большими неровностями, немного ниже уровня чашечки имеется заметный перехват. Ножка короткая, толстая, буро-черная.

Кожа тонкая, плотная, одноцветная, зеленовато-желтая, на солнечной стороне более желтая, с очень частыми мелкими подкожными точками оливкового цвета. У верхней ямки и далее, спускаясь на бока, оранжево-ржавая сплошная окраска и пятна. Запах сильный мускатный.

Семенные камеры узкие продолговатые. Семена бывают очень редко, не развиты.

Мякоть беловато-желтоватого цвета, до потребительской зрелости в свежем виде плотная, около чашечки сильно каменистая, менее каменистая около гнезд и у основания ножки, достаточно сладкая, с очень небольшой кислотой, хрустящая. При созревании приближается к слабо-тающей и даже к сильно тающей, с сильной мускатной пряностью.

Осенний сорт для использования плодов в свежем виде, а также для компотов и других заготовок, промышленный. Плоды хорошо выносят транспортировку. В хороших хранилищах могут лежать продолжительное время.

С. М. Рытов.

См. на обороте:

4. В.И.Шабловский /"Провідні сорти плодових культур УРСР", изд., 1937 / г./ пишет, что это

197

Северо-американский сорт, гибрид Вильямса летнего с китайской песчаной группей. Распространен в лесостепной Украине, Молдавии, в южных местностях РСФСР, Грузии и проч.

Деревья умеренного роста, с густой пирамидальной кроной и тонкими ветками, довольно холодостойки, но требуют защищенного местоположения, к почве нетребовательны и выдерживают значительную засоленность, влажность почвы, засухи и высокие температуры.

5. Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 171-172./считает, что наиболее характерны для сорта: редкая среди груш форма плодов /особенно декоративная/, золотистая, просвечивающаяся окраска кожи с многочисленными выступающими подкожными точками; сильный мускусный запах плодов; кожистые, блестящие зеленые листья, вытянутые в длинный кончик. Рост побегов сильный. Деревья нежные к холоду, но прекрасно переносящие жару и сырость. Плодоношение раннее, регулярное. Урожайность выдающаяся. Прививка делается только на дичке. Осенний сорт невысокого вкусового достоинства плодов, представляет интерес для наших влажных субтропиков.

Контарешты.

Образцы плодов от И.Мейтуса в Бендерах. Помологическое определение: жирная.

Признается сходным сортом с Буздурханом крымских садоводов.

Величина плодов средняя. Форма неправильная, грушевидная, с широкой сильно бугристой и неправильно ребристой верхушкой, к основанию усеченно-коническая.

Верхняя ямка большая, глубокая, неправильная, с округлыми бороздами, без складок, с очень неровными краями от больших округлых ребристых выростов. Листики чашечки малые, черно-серые, опушенные, открытые. Основание широкое с кольцевым углублением или на одной стороне небольшой боковой вырост, отклоняющий длинную толстую ножку с мясистыми наростами внизу.

Кожа толстая, нежная, слабо блестящая, немного жирная, легко-шагреневидная и слегка шероховатая, лимонно-желтая, на солнечной стороне с резким желто-розовым румянцем. Подкожные точки мелкие, ржавые, сероватые, не резкие; на большей части тонкий буровато-ржавый покров шагреневидневидный. Запаха нет.

Мякоть желтоватая, мягкая, довольно нежная, внутри губчатая, рыхловатая или зернистая, сладкая, с медовым привкусом.

Гнезда характерно малые, звездчатые, как у Буздухана.

Плоды зреют 20 сентября [в начале октября]. Осений сорт, вполне сходный с Буздурханом, но более годится для десерта по нежности мякоти/меньшей губчатости около гнезд/.

Княжна русская.

Образцы от К.Д.Горбань из с.Головковки, Чигиринского уезда, Киевской губ. Помологическое определение бера.

Величина плодов средняя. Форма продолговатая, грушевидная, вверху широкая с неправильными большими округлостями ребер и слабыми бороздами, к ножке с высоким усеченным конусом. Верхняя ямка глубокая, неправильная, слабо складчатая, по краям неровная. Листики чашечки большие гладкие, полуоткрытые. Ямка при ножке вдавленная, с бороздками и иногда с мясистым выростом. Ножка толстая, равная половине высоты плода.

Кожа отчасти гладкая /к ножке/, и к верхушке шершавая от ржавых пятен и налета. одноцветная, желтовато-зеленая, иногда на солнечной стороне с мутно-красным румянцем, от верхушки на большей части с серо-бурым ржавым налетом, пятнами и мелкими точками. в половине [конце] октября в хранении желтеет. Есть совсем шершавые желто-серые или серо-желтые плоды с зеленой окраской при ножке.

Мякоть белая, тающая, сахаристо-сладкая и вяжущая, без пряности, превосходного вкуса. Созревает в лежке в начале [половине] октября. В конце октября [начале ноября] начинает портиться внутри гнезд.

Сорт по местному зовется Ю[ю]шесом. Плоды десертного качества.

Дерево кронистое, выдерживает морозы, чрезвычайно плодородное, любит глинистую почву.

Царский рожок (Крым), 200, tin.

Пасс Кольмар, Passe Colmar, Beurré d'Argenson, Regen-

Выведен в Бельгии 200 лет тому назад.

1. Образцы плодов получены от Куфальта в Риге.

Величина плодов средняя. Форма кубаревидная, к верхушке почти правильная, округлая с небольшими сглаженными ребристыми выростами, к ножке коническая, косая, с поперечным вдавлением и мясистыми выростами.

Верхняя ямка малая, мелкая, без складок. Листики чашечки маленькие, опущенные, полуоткрытые. Нижняя ямка слабо вдавлена, с мясистыми бугристыми выростами. Ножка боковая /направлена вбок/, очень толстая, дугоридная, по длине равная половине высоты плода.

Кожа гладкая, слабо блестящая, светло-желтая, на солнечной стороне с разлитым желто-красным румянцем, на котором резко выделяются мелкие беловатые подкожные точки. В ямках желто-бурый налет, изредка такие же пятна на боках. Налет придает некоторую шершавость тусклой коже. Подкожные точки на желтой окраске мелкие, незаметные.

Мякоть желтоватая, маслянистая, очень сочная, винно-кисловатая, вяжущая, каменистая около гнезд, к чашечке и к ножке.

Плоды созревают во второй половине сентября [в начале октября] и в начале [средине] октября уже бывают перезревшими.

Это сентябрьский сорт, достойный разведения, особенно в формовой культуре.

Плоды полученные от Ульриха иной формы: длинной, узкой, у верхушки овальной, к ножке очень высокой, острой. Верхушка с неровными округлостями. Верхняя ямка без складок, углубленная. Листики чашечки черные, длинные, сомкнутые. Нижней ямки нет. Ножку окружают мясистые выросты. Кожа грязно-желтоватая, с мелкими ржавыми неясными точками, на верхушке с пятнисто-ржавым бурым налетом, который на конусе переходит в пятна; красноты нет.

Мякоть желтоватая, тающая, но не маслянистая, винно кисло-сладкая, сильно вяжущая, с особой пряностью и сладостью.

2. Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 676-679./ пишет, что форма плодов довольно непостоянная, у обоих полюсов находятся небольшие ребрышки, окружающие основание ножки и ча-

См. на обороте:

шечки, которая полузакрыта и помещается в небольшом бугристом блюдце. Ножка толстая, короткая, несколько косая, при основании с мясистым выростом.

Кожа тонкая, нежная, блестящая, светло-зеленая, с мелкими темно-серыми подкожными точками и кое-где с ржавыми пятнышками. При созревании плода блестящая лимонно-желтая, часто с густым румянцем на солнечной стороне.

Мякоть желтоватая, нежная или несколько плотная, но тающая, очень сладкая и сочная, с приятной кислотой, с приятным ароматом и вообще тонкого десертного вкуса.

Плоды созревают в лежке, начиная с ноября и держатся по январь включительно и даже дольше.

Деревья долговечные, вынослиные, но слабо-рослые, с негустой пирамидальной кроной, с отвисающими длинными и тонкими сучьями, хорошо удаются на айве. Нуждаются в очень питательном и не сухом грунте, требуют теплого и защищенного положения. Плоды чувствительны к ветрам.

Существует разновидность с полосатыми плодами, Passe-Colmar panache.

209. Сорт 3 класс Кольмар

Кольмар зимний, Colmar d'hiver, Colmar, Poire manne, Bergamotte tardive, Manna Birne, Spaete bergamotte.

Образцы плодов от Топанова из Крыма.

Величина плодов средняя и менее. Форма коническая, широкая у верхушки и конически суженная к ножке. Верхняя ямка очень широкая, но плоская и мелкая, неровная, слабо бороздчатая, распростертая на всю широкую и тупую верхушку. Листики чашечки черные, звездчатые, открытые. Нижняя ямка мало вдавленная, косая. Бока с сглаженными округлостями. Ножка тонкая, кривая, равная половине высоты плода.

Кожа плотная, тусклая, не жирная, шагреневидная, перед началом созревания травяно-зеленая, потом грязноватого светло-желтого цвета, одноцветная, с частыми резкими черно-серыми подкожными точками. Запаха нет.

Мякоть желтоватая, полутающая, сладковатая, с малой пряностью, мало сочная.

Семена продолговатые, бурые.

Плоды готовятся [созревают в лежке] в половине [конце] января и даже во второй половине января [начале февраля], десертные второго качества.

Образцы плодов на Нижегородской выставке 1896 года от Варшавского помологического сада.

Величина плодов средняя. Форма почти яйцевидная, без ребер, правильная, с круглой верхушкой и косым туповатым основанием. Верхняя ямка малая, мелкая, ее почти нет, с слабыми короткими складками. Листики чашечки короткие, черные, широко и звездчато открытые. Нижняя ямка вдавленная, косая. Ножка тонкая, кривая, короткая.

Кожа тусклая, толстая, крепкая, шагреневатая, слегка шершавая, желтовато-зеленая, на солнечном боку грязновато /от налета/ светло-желтоватая, с множеством частых бурых подкожных точек. Верхушка и основание с бурым ржавым покровом, переходящим на бока и сетчатость почти того же цвета. Запаха нет.

Мякоть белая, каменистая около чашечки, зернистая около гнезд, зерноватая, сладковатая, немного вяжущая.

Семена большие, длинные, острые, темно-бурые. В половине [конце] октября совсем зрелые.

См. на обороте:

В половине [конце] октября плоды внутри портятся.

Сорт похожий плодами на предыдущий, но осеннего созревания плодов, а не зимнего.

3. Л.Н.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 624-627./ пишет, что этот сорт принадлежит к числу старинных западно-европейских сортов.

Величина средняя, иногда большая, на карликах же получаются порою очень крупные экземпляры. Форма неправильная, не симметричная и непостоянная бергамотная или продолговатая с характерной неглубокой бороздкой, тянущейся вдоль по всему плоду. Чашечка открытая или полуоткрытая находится в значительной складчатой верхней ямке. Ножка короткая или до 1/3 длины плода, в плоской нижней ямке, окруженная мясистыми выростами и буграми.

Кожа тонкая, негладкая, светло-зеленая, усеянная светло-серыми и темно-зелеными подкожными точками и бурыми пятнышками, затем желтеющая, с небольшим бледно-розовым румянцем на солнечной стороне.

Мякоть у спелых плодов желтоватая, слегка душистая, нежная, маслянистая, полутающая, сочная, сладкая, иногда у гнезд с грануляциями.

Плоды иногда в лежке вянут, исподволь созревают с декабря по март и в состоянии полной зрелости весьма долго сохраняются.

Деревья средней величины, иногда довольно сильные, с мало облиственной прозрачной кроной, с несколько отвисающими сучьями, рано начинают плодоношение, не любят сильной обрезки и в Крыму нечувствительны к холоду. Любят плодородную легкую почву, на которой имеют сильный рост и хорошо через год плодоносят. Сбор плодов в Крыму бывает около 10 [в конце] сентября.

Колмар Аренбери, Colmar d'Arenbery.

Образцы плодов от Чиковского из Варшавы: ✝ - ✝✝† ; X - X1.

Величина плодов большая. Форма неправильная, грушевидная, кособокая, у основания широкая, неправильная, бугристая и плоско-бороздчатая, далее к ножке длинно-коническая, неровная, с косым основанием.

Верхняя ямка широкая, глубокая, неправильная, плоско-бороздчатая, с слабыми бороздами. Листики чашечки черные, открытые, короткие. Нижняя ямка углубленная, с тонкими бороздами. Ножка тонкая, короткая.

Кожа гладкая, блестящая, не жирная, тонкая, нежная, светло-желтая или лимонного цвета, на солнечной стороне с розовато-оранжевым разлитым румянцем. Подкожные точки незаметные. Местами тонкий буроватый ржавый налет пятнами и несколькими полосами. Запаха нет.

Мякоть белая, немного желтоватая, нежная, очень сочная, таящая, остро-виннокислая, сильно вяжущая, с уксусным фруктовым привкусом.

Семена большие, широкие, толстые, черные.

Плоды созревают в половине [конце] сентября – начале октября и могут сохраняться до ноября и несколько позднее.

Отличный десертный сорт, достоинству которого вредит вяжущий привкус мякоти.

Компотная зимняя./Неаполитанская зеленая по определению А.П.Осипова

Образцы плодов от Лещенко, Киевского уезда и Губернии. Помологическое определение: кухонная длинная.

Величина плодов большая. Форма округлая к широкой косой верхушке, к ножке коническая, с малым перехватом, без ребер и бугров.

Нижняя ямка широкая, без складок и бугорков, углубленная. Чашечка большая, закрытая, из сильно опушенных листиков. Нижняя ямка в виде очень малой впадины у ножки.

Кожа толстая, плотная, не жирная, при снятии темно-зеленая, в зрелости [в лежке] в начаде [средине] декабря мутного лимонно-желтого цвета с очень частыми, мелкими, серыми, резко выступающими ржавыми точками. Запаха нет.

Мякоть белая, нежная, колкая, сладковатая, без пряности, вяжущая, каменистая только около чашечки.

Семена длинные, узкие, черно-бурые, пустые.

Плоды [используются для компота].

Сорт часто разводится в юго-западных губерниях [в юго-западной Украине].

3 1
_ Шарль Конье, Charles Cognée. Сорт выведен во Франции в 1876 г

Образцы плодов от Варшавского помологического сада.

Величина плодов малая. Форма грушевидная, с тупой верхушкой и тупым основанием, по бокам с выдающимися округлыми ребрами.

Верхняя ямка широкая, углубленная, с тонкими бороздками, около чашечки небольшие перлы. Листики чашечки сомкнутые, узкие, черные. Нижняя ямка малая, углубленная, с малым боковым выростом. Ножка тонкая, короткая, черная.

Кожа жирная, тусклая, шагреневатая, светло-желтая, с слабой желтоватой краснотой на солнечной стороне, с очень мелкими нерезкими буроватыми подкожными точками, у ножки серая ржавчина с спускающимися полосками

Мякоть белая, каменистая около чашечки, не сочная, сладковатая, кочерыжная, но это, по-видимому вследствие преждевременного сбора плодов.

Семена тонкие, длинные, острые, темно-бурые.

Плоды созревают в конце декабря [начале января] . Необходимо снимать плоды с деревьев возможно позже, чтобы во время хранения они не морщились и лучше вызревали.

Образцы плодов от Л.П.Симиренко из Городища, Киевской губ.

Величина плодов средняя. Форма неправильная, грушевидная, к верху овальная, но неправильная и неравно ребристая, к ножке коническая, с слабым перехватом. Верхняя ямка большая, широкая и глубокая, с ребристыми округлыми выступами по краям и слабыми бороздами, с рыжей лучистой ржавчиной. Чашечка большая, открытая, с бурыми листиками. Нижняя ямка косая, углубленная. Ножка небольшая, тонкая, немного загнутая и отклоненная в сторону.

Кожа толстая, плотная, жирная, маслянистая, блестящая или лоснящаяся /при трении на пальцах остается жир/, зеленовато-желтая или лимонно-желтая, с очень слабым розоватым румянцем, мелко-шагреневатая, с мелкими сероватыми точками.

Мякоть белая, сочная, тающая, очень сладкая, с гранулящимися у чашечки, с пряностью.

См. на обороте:

Плоды начинают поспевать в половине [конце] ноября и вполне зрелые в конце декабря [начале января]. В хороших хранилищах возможно хранение до марта - апреля, т.е. возможно использование плодов в течение всей зимы.

Превосходный сорт, очень ценный как зимний. Л.П.Симиренко рекомендует на него обратить внимание.

2. Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 734-735./ говорит, что деревья средней силы роста, рано начинают плодоносить, урожайность правильная и умеренная, необходимо теплое местоположение, хорошая питательная почва и достаточная влага. При прививке на айву полезна двойная прививка.

Король Карл Вюртембергский, Roi Charles de Wurtemberg.

1. Образцы плодов от П.П.Симиренко из Городища, Киевской губ.

Величина плодов большая. Форма у вершины шаровидная с неправильными округлостями от борозд и широких округлостей ребер. К основанию широко-коническая, косая.

Верхняя ямка небольшая, не широкая, с маленькой открытой чашечкой из коротких листиков. Нижняя ямка косая, не глубокая. Ножка толстая, длиной почти в половину плода.

Кожа толстая, уплотнная, сухая, тусклая, светло зеленовато-желтая, с большими желто-бурыми ржавыми подкожными точками и такими же пятнами, сливающимися местами в сплошной покров.

Мякоть белая, плотная, сильно зернистая, слизеватая, сладкая, вкусом похожая на [сырую осеннюю,] картофлянку.

Плоды без семян, Созревают в конце сентября или в начале октября [в начале или в средине октября,] в конце октября [в начале ноября] уже перезревают.

2. П.Буренков в журнале "Плодоводство" за 1897 г., стр. 662-663 пишет, что деревья (не боятся морозов,) образуют сбатую, красивую пирамидальную крону, имеют сильный рост и толстые ветви. Плодоношение начинается рано и бывает ежегодным. Плоды поспевают в лежке в октябре - ноябре. Их величина большая. Окраска очень красивая - ярко желтая, с ярко-красным румянцем на солнечной стороне. В дождливое лето плоды сильно гниют на ветках. По своему вкусу плоды непригодны для десерта и могут быть использованы (толсто) на разные заготовки

V

Кошачья голова, Catillac (Tête de Chat), Grosser Katzenkopf. – из Крыма.

1. Образцы плодов от Хаджи Кушанова на Нижегородской выставке 1896 г.

Величина плодов очень большая. Форма широкая, кубаревидная, довольно продолговатая, с неровными выступами по бокам и вдавленными местами. На 1/3 низко-коническая, с широкой неровной верхушкой и узким основанием.

Верхняя ямка широкая, очень большая, глубокая, с слабыми ребристыми складками. Чашечка большая. Ее листики пушистые, пригнутые, полуоткрытые, не короткие, серо-бурые. Нижняя ямка углубленная, с очень слабыми бороздками и неровным большим мясистым выростом. Ножка длинная, бурая.

Кожа толстая, нежная, тусклая, шершавая от подкожных точек и ржавого покрова, у незрелых плодов в сентябре темно травяно-зеленая, у зрелых в конце октября [начале ноября] светло-желтая, но от ржавчины буровато-желтая, без всякой красноты. Подкожные точки большие, частые, характерные: желто-ржавые, с отделяющимися чешуйками и с трещинами; между точками ржавые мелкосетчатые пятна. Запах слабый.

Мякоть желтоватая, около чашечки каменистая, около гнезд зернистая, с просвечивающимися сосудистыми пучками, мягкая, мало-сочная, немного кисло-сладковатая, слизеватая, не тающая, без мускатной приятности, чем отличается от Аарской груши. При ножке мякоть имеет очень горький вкус.

Семена очень длинные, до 13–14 мм, бурые, тонкие, кривые, с длинным кривым носиком и с коротким отростком на толстой части.

Два плода весом 3 3/4 фунта [1,537 кг].

Кухонный сорт, описанный у Яна в Illustrirt Handbuch der Obstkunde, N 251.

2. Образцы от Л. П. Симиренко из Городища, Киевской губ.

Величина плодов большая. Форма кубаревидная, на большей части к верхушке шаровидная с резко выступающими ребрами, образующими широкие грани; к ножке малый широкий конус. Верхняя ямка очень большая, широкая и глубокая, с сильными бороздами и округлыми ребрами. Чашечка огромная, открытая, внутри черно-бурая. Нижняя ямка небольшая, с короткими бороздками. Ножка длиной в 1/2 высоты плода.

Кожа толстая, плотная, шагреневая, зеленовато-желтая, при созревании

См. на обороте:

лимонно-желтая, на солнечной стороне с малым желто-розовым румянцем, с многими частыми и резкими подкожными точками и черноватым налетом в виде светло-чернильной помазки.

Мякоть желтоватая, репная, сладкая, вяжущая, волокнистая, с пряностью, менее сладкая, чем у Картофлянки [Серой осенней] но походит на нее, отличаясь более вяжущим вкусом, волокнистая, с грубой и крупной зерноватостью.

Семенные гнезда сравнительно небольшие, но имеется большая осевая пустота. Семена неразвитые, но встречаются и зрелые.

Плоды пригодны для заготовок и кухни. Поспевают в лежке в половине [конце] ноября.

Красавица анжуйская, Belle Angevine, Schöne von Angevine,

Образцы плодов получены от Настройко из Крыма.

Величина плодов более средней. Форма грушевидная, округлая или почти усеченно-коническая к верхушке и остро-коническая с вдавленной поверхностью к косому коническому основанию; только в верхней части с следами угловатых ребер.

Верхняя ямка малая, мелкая, с слабыми ребристыми складками. Листики чашечки большие, длинные, сомкнутые. Вместо нижней ямки конический наплыв у основания ножки. Ножка довольно толстая, равная по длине или более половины высоты плода.

Кожа на солнечной стороне гладкая и блестящая, на теневой тусклая и шершавая, зеленовато-желтая, с ярким разлитым мутно киноварно-красным румянцем, на котором резко выдаются ржавые подкожные точки. На теневой стороне эти точки перемешаны с ржавыми пятнами. У основания и на верхушке серый ржавый налет.

Мякоть белая, немного желтоватая, колкая, с привкусом кочерыжки, от которой отличается сильно вяжущим вкусом и малой сочностью.

Плоды поспевают в лежке в январе.

Образцы плодов от Капустина из Крыма.

Величина плодов большая. Форма продолговатая, грушевидная, широкая и округлая в верхней половине, с угловатыми ребрами, далее впадиной отделяется остро-коническая нижняя часть; в теневой части угловатые

Верхняя ямка углубленная, к ней верхушка сужена, бороздчатая, с слабым подъемом, внутри с шаровидными перлами между сомкнутыми буроватыми листиками чашечки. Нижней ямки нет, основание острое. Ножка короткая, толстая, длинная.

Кожа толстая, плотная, жирная, лоснящаяся, светло-желтая, на солнечной стороне с тонким или светлым желто-красным румянцем, мелко-шагреневатая, с мелкими частыми нерезкими, буроватыми подкожными точками, у ножки с лучистой бурой ржавчиной, спускающейся полосами по бокам.

Мякоть желтоватая, сухая, очень каменистая около чашечки, плотная,

См. на обороте:

волокнистая, грубая, но сладкая, хотя и мало, почти кочерыжная, для десерта непригодная.

Плоды созревают в начале [половине] января. Пригодны для компота и других видов заготовок, но не для десерта.

2. П.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 497-498/ сообщает, что плоды данного сорта отлично и долго сохраняются, до мая включительно, но все их значение исчерпывается чудовищными размерами и красотой.

Деревья образуют высоко-пирамидальную негустую крону, нуждаются в очень питательной почве, хорошо защищенном и солнечном местоположении. Особенно крупные плоды получаются на карликовых подвоях. На обыкновенных подвоях размеры деревьев бывают громадными и приносящими огромный урожай великолепно окрашенных плодов.

3. Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 199-200./ находит наиболее характерными для сорта: редкие ветви, желтовато-зеленую окраску и эллиптическую форму листьев, а также огромную величину плодов, по которым они являются самыми крупными и декоративными, доходящими до 3 кг весом, но имеющими недостатком плохой вкус. Из-за последнего ~~они~~ плоды часто в сыром виде несъедобны и используются для компотов.

Красавка.

Образцы плодов от Молодченко в Лохвице, Полтавской губ.

Величина плодов средняя и более средней. Форма округлая, к ножке с низким коническим заострением, по бокам с небольшими выпуклостями. Верхняя ямка с буграми около ножки и кольцевой бороздой. Ножка тонкая, бурая, длиной в половину высоты плода.

Кожа слабо блестящая, сначала созревания светло-зеленая, потом светло-желтая, с мелкими зеленовато-бурыми точками, ржавой полосой и ржавчиной около ножки, на солнечной стороне с сургучно-красным полосатым румянцем.

Мякоть белая, рыхлая, внутри скоро делается водянистой и гниет, каменистая около чашечки.

Плоды созревают в конце июля и начале августа [в первой половине и средине августа]. Сохраняются около недели.

Сорт летний.

Деревья достаточно выносливые. Листья овальные, по краям мелкозубчатые, с тонким и длинным черешком.

Кузьминка.

Образцы плодов из Ростова на Дону.

Величина плодов средняя. Форма неправильная грушевидная, вблизи чашечки с разными сильными или слабыми ребрами, доходящими до половины длины плода ; у крупных плодов при слабых ребрах на боках бугры, которые характеризуют груши аптекарки. Чашечка темно-бурая, закрытая, в небольшой ямке. Ножка тонкая, довольно длинная, отогнутая вбок, у основания с мясистым наростом.

Кожа тонкая, блестящая, зеленая, с мелкими бледными подкожными точками, в зрелости беловато-желтая, иногда с редкими светло-бурыми пятнами, без румянца.

Мякоть беловато-желтая, сладкая, тающая, с сильным ароматом.

Семенные гнезда малые, сдавленные, щелистые; семена удлиненные, бурые.

Плоды поспевают в половине [конце] июля. Могут лежать лишь 2-3 дня, поэтому снимаются раньше зрелости и тогда хорошо выносят перевозку. В лежке вызревают.

Деревья сильного роста. Кроны пирамидальные, с обильными листьями. Молодые побеги тонкие, короткие, желтовато-зеленые. Листья темно-зеленые, с мелкими зубчиками. Цветет раньше других сортов.

Деревья очень выносливые и одинаково хорошо растут на сухой и влажной почве, давая два урожая /в два года/ и потом год, оставаясь без урожая. Достигают 90 лет с стволами 12 вершк. [53 см] в диаметре.

Сорт с плодами второстепенного качества, используемыми для сушки, Плоды перед сушкой режутся пополам, получается очень сладкий продукт.

_Курляндская_белая.

Образцы плодов из Латвии.

Величина плодов средняя. Форма яйцевидная, коническая к верхушке и к основанию, где более сужена, неравнобокая, без ребер, с характерным бородавчатым выростом, как у дичной бородавчатой тыквы и такого же зеленовато-желтого цвета окраской кожи. Темя притупленное и округлое. Верхней ямки нет. Чашечка открытая, гладкая, из коротких широких листиков; вокруг нее бугровидные выросты в виде складок. Нижняя ямка с кольцевым углублением, косая. Ножка кривая, длинная, равная половине высоты плода.

Кожа тусклая, плотная, зеленовато-желтая, одноцветная, с неясно заметными мелкими серыми частыми точками. На верхушке и около ножки буроватый ржавый налет. Запаха нет.

Мякоть белая, очень сочная, крепкая, кочерыжная, но обильно пропитанная сахаристым соком, колкая или жестковатая. В начале [средине] октября внутри мягкая, побуревшая.

Плоды зреют во второй половине сентября [начале октября], годятся для сушки.

Вильямс зимний, Пасторская, (Wiekfield, Vicaire de Winkfield, Curé, De Curé, Pastorenbirne, Belle de Berry, Vicaire de)

Образцы плодов от Чижовского из Варшавы. ∓ – ∓ † ; ∓П – 1.

Величина более средней и средняя. Форма длинная, грушевидная, книзу овальная, усеченная на верхушке, слабо ребристая или с сглаженными ребрами, к ножке с длинным конусом с вдавленной поверхностью, ровная.

Верхняя ямка малая, мелкая. Листики чашечки длинные, звездчатые, открытые. Нижняя ямка вдавленная, с небольшими бугорками. Ножка тонкая, кривая, длиной менее половины высоты плода.

Кожа гладкая, блестящая, не жирная, светло-зеленая, потом становящаяся желтоватой, на солнечной стороне с мутной красноватостью, с очень мелкими серыми подкожными точками.

Мякоть белая, нежная, тающая, маслянистая, сладкая, ароматная.

Другие образцы оттуда же.

Величина плодов средняя. Форма продолговатая или длинная, узкая, на 1/3 длины в верхней части овальная с закругленной верхушкой, далее 2/3 длины коническая с тупым усеченным основанием.

Верхняя ямка мелкая, без складок или с слабыми бороздками. Чашечка большая, открытая, с длинными, узкими, черными, звездчатыми, распростертыми листиками. Рёбер нет, но форма косая. Нижняя ямка углубленная, широкая, косая. Ножка тонкая, короткая.

Кожа тонкая, нежная, лоснящаяся, жирная, мелкозернистая, на теневой стороне светло-желтая, а на большей части с разлитым слабым мутно-розовым румянцем. Подкожные точки мелкие, серые, окруженные желтыми обо[л]ками, отчего румянец испещряется как бы крапинками. На верхней и нижней ямке тонкий ржавый бурый налет. Запаха нет.

Мякоть белая, около чашечки каменистая, сочная, винно-кисловатая, немного вяжущая, с малой сладостью и карамельной приятностью, не маслянистая, винно кисло-сладкая, но тающая.

Гнезда малые. Семена узкие, длинные, кривые, острые, с длинными остриями, черные.

Плоды созревают во второй половине октября [начале ноября]. В нача-

См. на обороте:

ле ноября [в средине ноября] мякоть к наружной стороне уже мучнистая и загнивает в гнездах /плохо сохраняется/.

Не особенно хороший сорт, хотя по вкусу мякоти десертный.

+ Образцы от Варшавского помологического сада.

Величина плодов большая. Форма длинная, двояко-коническая, с боков приплюснутая, к верхушке усеченно-коническая и с сглаженными ребрами, с поперечным вдавлением, к ножке с более длинным конусом.

Верхняя ямка мелкая, мало углубленная, неправильная. Листики чашечки очень длинные, большие. Ямка при ножке косая, вдавленная, с боковым выростом. Ножка тонкая, у основания с мясистым наростом, длиной менее половины высоты плода.

Кожа гладкая, блестящая, одноцветная, светло зеленовато-желтая, с частыми серо-зелеными подкожными точками, около верхней ямки с бурым ржавым налетом.

Мякоть без зернистости и каменистости, нежная, тающая, с ароматной пряностью.

Плоды совершенно зрелые в конце октября и начале ноября [начале и средине ноября].

Образцы от Тейнмака из Лифляндии.

Величина плодов средняя. Форма кубаревидная, вверху широко-округлая, с сглаженными ребрами на верхушке, к ножке коническая, косая с мясистыми наростами и поперечными складками.

Верхняя ямка мелкая, без складок или с небольшими широкими складками по краям неровная и бороздчатая, хотя слабо. Листики чашечки узкие, длинные, звездчатые, открытые. Ножка средней толщины, равная по длине половине высоты плода, боковая и скошенная, с мясистыми складками у основания.

Кожа немного блестящая, слабо шершавая от множества мелких подкожных точек, несколько жирная, одноцветная, лимонно-желтая, с многими частыми, правильно расположенными серо-зелеными точками; иногда на боку и при ножке с желто-бурыми ржавыми пятнами.

См. 2-ой лист.

Мякоть белая, плотная, крупитчатая и каменистая около гнезд, крупнозерная, с слабым водянисто-сахаристым соком, с крупитчатым остатком мякоти, колкая, как у кочерыжки, довольно безвкусная, гниет внутри около гнезд и снаружи от ударов. Вкусом хуже Танковетки, так как мякоть грубозернистая.

Семена большие, толстые, темно-бурые.

Плоды созревают в конце сентября [начале октября].

Отличительные признаки: характерная кубаревидная форма и лимонно-желтая окраска кожи с резко выступающими мелкими серо-зелеными подкожными точками. 3. Б.И.Шабловский /"Провідні сорти плодових культур УРСР", изд. 1937 г./ пишет, что это

Старый французский сорт, известный в культуре около 200 лет, распространенный у нас на юге.

Деревья скороростущие, достигающие больших размеров, с высокой широкопирамидальной кроной, долговечные, непритязательны к почве и местоположению, но предпочитают свежую, легкую, питательную и теплую почву. Их холодостойкость невысокая. Плодоношение начинается на 8-9 году. Урожайность высокая и регулярная. Можно садить на открытых местах, так как плоды прочно держатся на ветках. Нельзя однако опаздывать с сбором, потому что плоды близкие к созреванию легко опадают.

2. Л.П.Симоренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 629-635./ говорит, что этот сорт получен случайным сеянцем в 1760 г. во Франции. Деревья отличаются прочностью, холодостойкостью, сильным и быстрым ростом, невзыскательностью к почве, отлично удаются на айве. Они образуют широкую крону, не рано начинают плодоношение, но потом правильно и очень щедро плодоносят и иногда в 20-летнем возрасте приносят 30-40 пудов. В Крыму снимают урожай в начале [средине] сентября. Плоды созревают в лежке в половине [конце] октября и держатся до конца ноября [половины декабря].

4. Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, стр. 197-199./ пишет, что это весьма популярный сорт, несмотря на второразрядный вкус плодов. Плоды чрезвы-

См. на обороте:

чайно декоративны, Один из доходнейших сортов. Культура возможна до средней Украины. Особенно хорошо удается на Черноморском побережье. Достоинства сорта: сильный рост деревьев, здоровье, урожайность, нетребовательность к условиям произрастания и транпортабельность плодов.

Г.А.Каблучко /"Сорта плодных культур Молдавии", изд. 1953 г., стр.301-303./пишет: "Кюре, Вильямс зимний, или Зимняя крупная, в Молдавии произрастает повсеместно. Наибольшее же распространение Кюре имеет в Кодрах, в Южной зоне и в Южном Приднестровье. Это самый распространенный промышленный зимний сорт груш."

Лектье, Le Lectier. Сорт выведен во Франции около 1882 г.

1. Образцы плодов от Л.П.Симиренко из Городища, Киевской губ.

Величина плодов более средней. Форма сверху шаровидная, к ножке с характерным узким конусом, с высотой его не более 1/3 длины плода. (В коническом части перехват с ясной кольцевой бороздкой.) В шаровидной части многочисленные /до 10/ борозды и между ними округлые ребра. Верхняя ямка углубленная, с резко выступающими узкими ребрышками. Чашечка из черных листиков. Нижняя ямка узкая, косая, с мясистым выростом. Ножка короткая, толстая, кривая.

Кожа тонкая, крепкая, с слабым блеском, светло-зеленая, одноцветная, без желтизны, с частыми сероватыми мало заметными мелкими подкожными точками.

Мякоть, несмотря на травяно-зеленый цвет кожи, вблизи кожи зеленоватая, внутри белая, очень сочная, полутающая, кисловатая, с малой сладостью, по качеству скорее второго разряда.

Очень крепкие сосудистые пучки.

Плоды созревают в первой [второй] половине октября. 20 октября [в начале ноября] вид зрелые, только некоторые у ножки немного портятся.

2. Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 636-638./ в своем описании этого сорта говорит, что величина плодо большая, форма неправильная, кособокая, с большими выпуклостями и неров ностями, вытянуто-колокольчатая. Чашечка открытая или полуоткрытая, вер хняя ямка широкая, ножка чаще короткая, толстая, косая и несколько разду тая на наружном конце.

Кожа гладкая, нежная, зеленая, при созревании желтая с прозеленью и даже золотистая, вся испещренная ржавыми подкожными точками, пятнышками и такими же прожилками, на солнечной стороне иногда с легким румянцем.

Мякоть белая, тающая, сочная, сладкая, с приятной кислотой и пряностью.

Плоды созревают в лежке постепенно с ноября по январь.

Деревья смолоду симметрично-правильные и сильного роста, с крупной

См. на обороте:

блестящей, темно-зеленой листвой, отличаются здоровьем. Плоды на ветках держатся недостаточно прочно. С возрастом деревья очень умеряют свой рост. Они не рано начинают плодоносить и затем приносят умеренные урожаи. АйВе сорт не антипатизирует, ~~на~~ сила роста небольшая, но вполне достаточная.

Лепин. Notoire Lepin.

Образцы плодов получены от Л.П.Симиренко из Городища, Киевской губ.

Величина плодов большая. Форма к верхушке на половину плоская и неровная, с редкими бороздками. Верх ямки и верхушка очень широкие, а ямка углубленная с охряной ржавчиной. Чашечка открытая, из узких чернова-тых листиков. К ножке форма коническая с перехватом и неправильными бороздками. Нижняя ямка косая, неправильная. Ножка короткая, толстая.

Кожа толстая, плотная, тусклая, сухая, лимонно-желтая, однотонная, с многими частыми мелкими серыми покровными точками.

Мякоть белая, очень сочная, мягкая, без грануляций /15 [28] января/, но связная, сладковатая, сахаристая, с небольшой пряностью.

Плоды перворазрядного достоинства и высокой ценности. Созревают в лежке в первой [второй] половине января и могут в хорошем хранилище продолжительно храниться.

Лесная красавица, Fondante des bois. Масляная древоцветная.
Belle de Flandres, Notenfarbige Butterbirne, Flemish Beauty.

Образцы плодов получены от С. Д. Тельшевского /почт. ст. Тевли, Пружанского у., Гродненской губ, Имение Олиняно.и от Кончевского из Крыма.

Величина плодов от Кончевского средняя и большая. Форма правильная, овально-коническая, более округлая к чашечке и коническая или суженная к ножке с тупым, довольно широким, основанием, совершенно ровная, без ребер и бугров.

Верхняя ямка мелкая, с мелкими ребристыми складками. Листики чашечки короткие, широкие, открытые. Ямка при ножке правильная, углубленная. Ножка тонкая, равная по длине половине высоты плода или короче.

Кожа тусклая, шершавая от желто-бурого ржавого налета, зеленовато-желтая, потом желтоватая, на большей части с пятнистым желто-красным румянцем, с многими частыми серыми подкожными точками.

Мякоть белая, нежная, тающая, сладкая. Семена длинные, острые, светло-(бурые.

Плоды у Кончевского созревают в конце сентября [начале октября] и уже не годятся в начале [средине] октября. В Гродненской губ. в начале [средине] октября мякоть еще плотная, белая, мало тающая, вяжущая. На коже пятна от грибка парши. Более лучшие плоды возможны разве в формовой культуре.

У плодов от Горшкевича из Варшавы мякоть белая, тающая, сладковатая, но не сахаристая, немного вяжущая и с малой каменистостью около чашечки.

Образцы от Варшавского помологического сада на Всероссийской с.х. и промышленной выставке 1896 г. в Нижнем-Новгороде (большой величины, красивые. Форма их яйцевидно-грушевидная, правильная, без ребер.

Верхняя ямка мелкая, небольшая, правильная, как бы выточенная, без складок. Листики чашечки короткие, черные, открытые. Основание несколько косое, широкое, почти с правильной углубленной ямкой. Ножка тонкая, короткая.

Кожа тусклая, слабо жирная, гладкая, красивая, лимонно-желтого цвета, испещренная множеством частых мелких бурых ржавых подкожных точек, на солнечной стороне с красивым киноварно-красным мраморным /с желтыми пят-

См. на обороте:

нами/ румянцем, на котором выделяются серые пятна точек.

Мякоть белая, нежная, без зерен и каменистых грануляций, тающая, сладкая, с сильной пряностью.

Плоды созревают во второй половине сентября [первой половине октября] и совершенно зрелые к октябрю [половине октября]. Больше держаться не могут. Семена при полной зрелости длинные, острые, светло-бурые или желтовато-бурые.

Образцы от Капустина из Крыма средней и более средней величины. Формы яйцевидной, в верху округлой, с тупым основанием, очень правильной, без ребер и их следов.

Верхняя ямка правильная, как бы выточенная, средней величины, ровная, без складок и бугров. Листики чашечки малые, слабо опущенные, черные, открытые или полуоткрытые. Основание правильное, как у яблок, с узкой глубокой гладкой ямкой, без ржавчины. Ножка короткая, толстая, длиннее ямки.

Кожа гладкая, блестящая, не жирная, желтовато-зеленая, потом зеленовато-желтая и чисто желтая, на большей части с разлитым очень красивым желто-розовым румянцем. В верхней ямке точечный жесткий бурый покров, переходящий на верхушку в тонкий ржавый налет. Подкожные точки частые, мелкие, темно-зеленые и бурые ржавые, на румянце форелевые. Запаха нет.

По форме и гладкости плоды почти походят на яблоки.

Мякоть чисто-белого цвета, очень сочная, тающая, нежная, сладкая, с тонкой пряностью.

Семена продолговатые, плоские, острые, светло-бурые, несмотря на полную зрелость плодов, что наступает в конце сентября [начале октября].

2. Образцы из сада М.В. Рытова в Горках, Могилевской губ.

Величина плодов большая и более средней. Форма кубаревидная, правильная, к верхушке округлая, к основанию коническая, без всяких ребер и бугров, иногда в конической части с легким перехватом.

Верхняя ямка широкая, немного углубленная, как бы выточенная, с едва заметными мелкими складочками около чашечки, которая открытая, неразви-

См. 2-ой лист.

тая, снаружи желтая, внутри черная и пригнутая. Около ножки ровная или немного неровная ямка, не кольцевая. Ножка тонкая, бурая, загнутая на конце крючком, длиной в половину высоты плода.

Кожа тонкая, матовая, без всякого блеска, при снятии с дерева перед заморозками травяно-зеленая, в зрелости в лежке светло-желтая, на солнечной стороне после хорошего теплого и солнечного лета с красивым киноварным румянцем, испещренным блестящими серо-бурыми ржавыми пятнами и пятнами около многочисленных серым подкожных точек. На верхней ямке тонкая бурая ржавчина, переходящая на бока.

Мякоть белая, тающая, очень сочная, нежная, зернистая только около чашечки, сладкая, с тонкой конфетной пряностью, совершенно расплывается как масло.

Превосходный десертный сорт. Плоды снимаются во второй половине сентября [в первой половине октября] и после двухнедельной лежки используются в течение около недели. При съеме (с дерева) кожа бывает совсем зеленая. Мякоть портится раньше всего около гнезд, буреет и становясь слизистой.

Молодые деревца отлично вырастают, не страдают от морозов и плодоносят на 4-5 году. Это самый лучший (сорт из иностранных) в западном районе. Кожа на ржавых местах толстая. Плоды равномерной величины, нисколько не страдают от грибка *Fusicladium*.

В учебном хозяйстве Уманского с.х. института имеются деревья возрастом около 60 лет, которые отлично плодоносят и не страдают от морозов. Их плоды пользуются особенным вниманием ос, которые истребляют мякоть полностью, вследствие большой ее сладости и мягкости, и оставляют лишь одни кожурки, висящие на плодоножках и сохраняющие форму плодов.

Ф.Я.Левчук в книге "Двадцать лет в сибирском саду", изд. (Новосибирск 1948 г., на стр. 83 (86) говорит, что стелющееся дерево Лесной красавицы, возраста 13 лет, находящееся в его саду в г. Новосибирске (в 1946 г.) дало урожай этого сорта 20 кг и других, привитых на нем сортов еще 22 кг, а всего 42 кг. Это дерево плодоносило в первый раз на 5-ом году жизни. Этот сорт для разведения в Сибири в стланцевой форме вполне пригоден. Поэтому заслуживает

См. на обороте:

внимания сибирских садоводов.

4. Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 651-655./ пишет: "Дерево долговечное и прочное. Оно характеризуется здоровьем, выносливостью и почти совершенной нечувствительностью к холоду, по крайней мере в условиях Киевской губернии, в которых взрослые деревья никогда не страдают от морозов, а у нас иногда случались зимы, когда Реомюр опускался ниже - 30°, как это было в 1910/11 году. Дерево Лесной красавицы доживает до глубокой старости, и в литературе встречаются упоминания об отдельных экземплярах этого сорта в возрасте выше ста лет.

В молодости дерево отличается очень живым ростом и образует широкопирамидальную крону, с несколько отвисающими сучьями; оно входит рано в пору плодоношения, родит же неутомимо и почти что из года в год правильно, а через год очень обильно... Дерево невзыскательно на почву, хорошо удается и в сухом грунте, и в умеренно-влажном, и в суглинке, а также и в песчаной почве. Но в виду значительного объема и веса плодов и относительной легкости, с которой они сбиваются ветром, необходимо сажать Лесную красавицу в положениях хорошо защищенных от ветров, избегая, однако глухих углов и очень сырых почв". При последних условиях плоды и листья сильно поражаются пятнами парши, а плоды, кроме того, иногда трескаются до семенных гнезд.

3. А.С.Гребницкий в "Атласе плодов", изд. 1906 г., стр. 132, пишет, что дерево этого сорта в Ковенской губ./Литва/ и, конечно, южнее и западнее, вполне выносливо к морозам, отличается здоровьем и достигает глубокой старости; требует защищенного положения от ветра. Это сорт: "прекрасный, заслуживающий широкого распространения в промышленных, хорошо защищенных от ветров, садах".

4. Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 187-188./ считает, что достоинства этого сорта: красота и великолепный вкус плодов, а также холодостойкость деревьев, а недостатком (хвалится) - поражаемость болезнями.

См. 3-ий лист.

Г.А.Каблучко /"Сорта плодовых культур Молдавии", изд. 1953 г., стр. 276-279./ пишет, что данный сорт является распространенным осенним в Кодрской зоне плодоводства Молдавии, в Приднестровье, а также в северных районах. Широкое распространение имеет на Украине, в южной половине лесостепной и степной части.

Лимонка Лимонная. Чигиринского уезда, Киевской губ.

1. Образцы плодов от И.П.Горбаня из с. Гелевщины, б. Помологическое определение: жирная.

Величина плодов средняя. Форма неправильная грушевидная, кособокая, с округлой, слегка ребристой верхушкой и косым основанием, вдавленным и с мясистым выростом у ножки. Поверхность иная, вдавленно-ямчистая, как бы истыканная деревянным гвоздем.

Верхняя ямка с многими сглаженными ребрами верхушки, мало углубленная. Листики чашечки черные, гладкие полуоткрытые. Ножка толстая, равная половине высоты плода и меньше.

Кожа гладкая, тусклая или слабо блестящая, одноцветная, светло-желтая, без всякой красноты, без точек или с очень мелкими бурыми подкожными точками, у ножки с бурым налетом.

Мякоть желтоватая, нежная, тающая, каменистая только около чашечки, очень сочная, винно-кислая, без пряности.

Плоды созревают к сентябрю [половине сентября] и держатся до половины [конца] октября.

Хороший столовый осенний сорт.

6. В.Ф.Смирнов в книге "Яблоня и груша в саду мичуринца-опытника", изд. 1951 г., на стр. 264-265 говорит: Под названием Лимонки на Украине, в Белоруссии и других районах распространены летние отечественные сорта груши, отличающиеся между собой размером плодов, вкусом и другими признаками. По данным Е.Ф.Демьянец /"Асортименти плодових та ягодних культур УРСР"/, дерево Лимонки сильнорослое с широко-пирамидальной кроной. В УССР зимостойкость деревьев полная. В 1949 г. автору пришлось видеть в саду Украинского научно-исследовательского института плодоводства /Киев/ 60-70 летние деревья, усыпанные плодами. Деревья эти благополучно перенесли суровые зимы 1939/40 и 1941/42 гг."

5. Г.А.Рубцов /"Груша", 2-ое изд. 1937 г., стр. 158-159./пишет: "Рост сильный. Дерево долговечное, выносливое, нетребовательное к почве, урожайное. Плоды с.. сильно пятнятся грибком. Лежат не долго. Далекого

См. на обороте:

транспорта не выносят. Их следует снимать до созревания, иначе они осыпаются и делаются мучнистыми. В сырое лето излишне терпки. Пригодны для сушки. Рыночный сорт. Благодаря раннему созреванию и дешевизне пользуется спросом на местных и даже крупных рынках. По вкусовым качествам уступает настоящим столовым грушам. Поступает на рынки следом за "Ильинкой".

7. Г.А.Каблучко /"Сорта плодовых культур", изд. 1953 г., стр. 284-286./ пишет: "Имеется несколько форм Лимонки, которые отличаются вкусовыми особенностями, размером плодов, а также урожаями... Своевременно снятые плоды Лимонки... сохраняются дольше других летних сортов груш - в среднем 20-25 дней и хорошо переносят дальние перевозки... Лимонка, несмотря на средние вкусовые качества, представляет значительную ценность как один из наиболее устойчивых, долговечных и обильно урожайных летних сортов груш. Она заслуживает повсеместного распространения в Молдавии.".

4. Н.Буренков /Киев/, описывая в журнале "Плодоводство" за 1906 г., стр. 747-753 Лимонку, говорит, что она принадлежит к лучшим летним сортам груш и что при разведении промышленного сада непременно надо обратить внимание на этот превосходный рыночный сорт, плоды которого всегда в цене и покупаются нарасхват. Из разновидностей сорта выгоднее садить Лимонку большую, потому что ее плоды гораздо крупнее и ценятся дороже. Необыкновенная выносливость деревьев к морозам, нечувствительность цветов к холоду, невзыскательность деревьев к почве, позволяют думать, что она может разводиться далеко к северу от Киева.

2. Лимоновка.

Образцы плодов от Борзенской школы садоводства в Полтавской губ.

Величина плодов малая. Форма кубаревидная, короткая, к ножке остроконечная, без ямки, в верхней части округлая с тупой верхушкой, без ребер, но иногда с одной правильной бороздой, как у сливы, с вдавленной линией. Ножка тонкая, дуговидная. У основания иногда отклоненная, с одной стороны при ней мякоть с полукольцевой складкой.

Верхняя ямка немного вдавленная, ровная. Чашечка открытая, из длинных бурых листиков, пригнутых к краям ямки.

Кожа тусклая, толстая, плотная, одноцветная, лимонно-желтая, с очень мелкими точками, слабо заметными даже в лупу. Без запаха.

Мякоть 15 августа [в конце августа] плотная, белая, сочная, очень ~~сильно~~ вяжущая, сладкая, но грубая, около чашечки сильно каменистая; по сладости хороша.

Кроме невзыскательного десерта, плоды пригодны для сушки, мариновки и кухни.

3. Лимонка саратовская.

Образцы взяты с Саратовского рынка. Помологическое определение: кухонная круглая.

Величина плодов средняя. Форма кубаревидная, к ножке коническая, с боковой кольцевой ямкой и против нее кольцевыми складками, отклоняющими ножку вбок, к верхушке усеченно-коническая, неправильно ребристая с бороздками.

Верхняя ямка широкая с ребрами и бороздами, резко выступающими. Чашечка из тонких длинных опушенных засохших листиков. Ножка равна половине высоты плода.

Кожа жирная, шагреневидная, с мелкими частыми зелеными точками, одноцветная, лимонно-желтая, с слабым запахом.

Мякоть желтовато-белая, около гнезд и чашечки грубо-каменистая, сочная, грубо-волокнистая и крупно-зернистая, сладковатая, без пряности.

Летний сорт. Плоды поспевают 15 [28] августа.

Лимонная летняя, Sommer Citronbirne.

1. Образцы плодов от И.Я.Лейениака из Латвии. Помологическое определение: Жирная.

Величина плодов средняя. Форма кубаревидная, в верхней части конически-округлая, с суженной туповатой верхушкой, к основанию остроконечная, неравнобокая, с сильно отклоненной большим выростом ножкой, с сглаженными угловатыми ребрами в верхней части.

Верхняя ямка плоская, мелкая, с низкими широко-ребристыми складками. Листики чашечки короткие, бурые, открытые. Нижней ямки нет. Ножка длинная, с мясистым выростом.

Кожа очень толстая, плотная, тусклая, одноцветная, лимонно-желтая, с множеством мелких темно-зеленых ржавых точек, которые жестко-шагреневатые, неровные.

Мякоть желтоватая, около чашечки и гнезд сильно каменистая, малосочная, плотная и колкая, как у репы, но мельче, сладковатая, с приятной пряностью. Достоинству мякоти вредит недостаток сладости и некоторая грубость. Все же лучше обыкновенных сортов.

Семена черные, острые, длинные.

Плоды совершенно зрелые 15 [в конце] сентября, но крепко держатся на дереве. Сохраняются до октября [половины октября в лежке] и очень пригодны для транспортирования.

2. Образцы плодов из садов под Саратовом.

Величина плодов малая или меньше средней. Форма кубаревидная, округло-коническая. Чашечка немного углубленная, с загнутыми чашелистиками темно-бурой окраски, полуоткрытая. В конической части плода иногда бывает небольшой перехват, нижней ямки нет. Ножка тонкая, несколько изогнутая, длиной менее высоты плода, светло-коричневатая.

Кожа у зрелых плодов почти светло-желтого цвета, одноцветная, только на теневой стороне желтовато-зеленоватая и зеленоватость имеется вообще около подкожных точек. Румянца и полос совершенно нет.

Мякоть бело-желтоватого цвета, несколько зеленоватая кнаружи. Около

См. на обороте:

семенных гнезд зернистая. Почти пресная, с очень малой кислотой, малосочная, без пряности, но с небольшой горечью.

Плоды очень красивые. Поспевают в Конце июля [начале августа]. Могут храниться лучше Краснобочки, поспевая несколько позже ее.

Семена в плоде в количестве 7-8 штук, средней величины, черно-бурые.

Листья крупные светло-зеленые, с удлиненной пластинкой. Деревья сильного роста, плодовитые.

Образцы плодов из сада учхоза Уманского с.х. института меньше средней величины округло-конической формы, несколько неравнобокие, с отклоненной в бок плодоножкой. В остальном как в предыдущем описании. Поспевают также в конце июля [начале августа].

Лимонная осенняя. Citronbirne.

1, Образцы плодов получены от Кеппе из Латвии.

Величина плодов средняя или меньше. Форма шаровидная, к ножке суженная в острый конус, по бокам почти ровная, при верхушке с слабыми следами ребер и в конической части с поперечными бороздами, образующими складки при ножке.

Верхняя ямка мелкая, без складок. Листики чашечки короткие, звездчатые, открытые. При ножке нет ямки, но складчатые выросты, из которых один больше и отклоняет ножку. Ножка тонкая, равная половине высоты плода.

Кожа гладкая, блестящая, лимонно-желтая, одноцветная, равномерной окраски, с очень мелкими серыми ржавыми точками. Изредка на плоде местами серо-буроватые ржавые пятна. В зрелости кожа желтая.

Мякоть белая, колкая, крупитчатая, сладковатая, не вяжущая или слабо вяжущая, но несколько водянистая, полутающая, почти без каменистости.

Семенные гнезда большие, широкие. Семена плоские, широкие, темно-бурые.

По вкусу плодов приближается к Магдалене, но имеется приторный привкус. Плоды созревают в конце сентября [начале октября].

Осенний сорт десертного качества.

2, Образцы из Горецкого, Могилевской губ., фруктового сада ~~питомника~~.

Величина плодов средняя. Форма грушевидная, низко-коническая, к ножке заостренная, в нижней части широкая, часто с продольной бороздой от ножки к чашечке, как у слив и по бокам с боковыми неправильными выростами. Ножка в половину длины плода, отклоненная мясистым выростом. Чашечная ямка углубленная, неправильная. Чашечка с узкими листиками, открытая.

Кожа тусклая, гладкая, лимонно-желтого цвета, с многими мелкими сероватыми ржавыми точками и мелкими сероватыми пятнами, рассеянными по всему плоду и придающими слабую шершавость, тогда плод не блестящий, но есть и блестящие плоды.

Мякоть желтоватая, сочная, сладкая, нежная, но не тающая, с камени-

См. на обороте:

стостью. Отличный десертный сорт при полном созревании, которое бывает около 20 августа [в первых числах сентября]. Идет несколько позднее Тонковетки и превосходит ее по сладости.

V

Бон-Луиз д'Авранш, Bonne Louise d'Avranches, Louise bonne de Jersey, Louise bonne, Gute Louise von Avranches.

+ Образцы плодов, полученные от Тельтевского

Величина плодов средняя. Форма длинная, с боков и солнечной стороне немного приплюснутая, к верхушке неправильно овальная и к ножке постепенно продолженная в островатый длинный конус почти с прямой ножкой.

Верхняя ямка углубленная, неправильная, с следами ребристых складок. Чистики чашечки опущенные, узкие, открытые. При ножке небольшая, почти правильная ямка с малыми выростами. Ножка тонкая, немного искривленная, равная 1/3 высоты плода.

Кожа гладкая, лоснящаяся, особенно на солнечной стороне, светло зеленовато-желтая или светло-желтая, на солнечной стороне с красивым желто-красным или малиновым разлитым румянцем, с частыми мелкими серыми подкожными точками, изредка на верхушке и при ножке с небольшими буроватыми пятнами.

Мякоть белая, немного крупитчатая, почти тающая, сахаристая с большой пряностью.

Семена малые, тонкие, остроконечные, светло-бурые.

Плоды созревают в конце сентября [начале октября]; в начале [средине] октября внутри начинается загнивание, хотя снаружи плоды остаются целыми.

+ Образцы плодов, полученные от Варшавского помологического сада.

Величина плодов большая. Форма коническая, сверху широкая плоская и, начиная с 1/4 длины, заостренная к узкому основанию в конус, очень правильная, с ребрами на верхушке.

Верхняя ямка очень широкая, глубокая, распростертая на верхушку, с широкими бороздами, разделяющими округло-угловатые ребристые выступы, без складочек. Чистики чашечки очень большие, черные, открытые. Нижняя ямка кольцевая. Ножка тонкая, с загнутым концом, длиной в половину высоты плода.

Кожа тонкая, нежная, тусклая, мелко-шагреневатая и от этого шероховатая, одноцветная, лимонно-желтая, с очень мелкими сероватыми подкожными

См. на обороте:

точками. В верхней ямке и на основании бурый лучистый ржавый покров и почти вся поверхность с мелкими сетчатыми бурыми пятнами. Запах пряный.

Мякоть белая, нежная, тающая, очень сочная, сладкая, с грушевой пряностью, не вяжущая, тонкого превосходного вкуса, около чашечки каменистая, около гнезд без зерен. Семенные гнезда узкие, наподобие яблочных. Семена толстые, короткие, с коротким носиком, темно-бурые.

Плоды созревают в половине [конце] сентября, в конце сентября [начале октября] вполне зрелые, далее не держатся.

Отличный десертный сорт.

+ Образцы плодов, полученные от Янковского из Варшавы: ~~X X~~ ! † ; X.

Величина плодов средняя. Форма длинная, кособокая, роговидная, с косоватой верхушкой, с боков несколько сплюснутая, косо заостренная в длинный кривой конус на 2/3, с косым основанием.

Верхняя ямка косая, с слабыми короткими ребристыми складками, немного углубленная и по краям отчасти неровная. Листики чашечки короткие, шерстистые, открытые. Нижняя ямка косая, с неправильным кольцевым вдавлением, а ниже его на вогнутой стороне с поперечной полулунной бороздой. Ножка тонкая, кривая, длиной с 1/3 высоты плода.

Кожа тонкая, нежная, не жирная, на солнечной стороне блестящая, на теневой тусклая, мелкошагреневатая, некрасивая зеленовато-желтая, с желто-красным румянцем, с зелеными пятнами около больших бурых и серых подкожных точек. Ржавые точки мелкие, редкие, серые. Весь румянец некрасиво испещрен желтоватыми пятнами. Около ножки ржавчина.

Мякоть белая, на вид крупитчатая, не маслянистая, но зернистая только около чашечки и нигде не каменистая, винносладкая, мало-вяжущая, с слабой эфирной пряностью.

Плоды созревают в конце сентября [начале октября] и используются в течение октября [до половины ноября]. Отрицательным качеством для торговли является некрасивый вид плодов.

1. Образцы плодов от Л.П.Симиренко, из Городища, Киевской губ.

Величина плодов средняя. Форма продолговатая. Вверху овальная, с широкой и глубокой верхней ямкой, с бороздками от неясных широких ребер.

См. 2-ой лист.

Чашечка в глубокой ямке, сдавленная, закрытая, с узкими черными листиками. У ножки форма правильная, довольно остро-коническая и также с правильной ямкой. Ножка короткая, прямая, тонкая.

Кожа тонкая, нежная, на румянце блестящая, на теневой стороне тусклая, светло-желтая, на солнечной стороне с разлитым желто-красным румянцем, на котором более ясные частые буровато-ржавые подкожные точки.

Мякоть белая, тающая, сливочная, очень сочная, сахаристая, без кислоты или с небольшой кислотой.

Плоды красивые по румянцу, созревают в начале [средине] октября и могут использоваться в течение месяца. Б.И.Шабловский /"Провідні сорти плодових культур УРСР", изд. 1937 г./ пишет, что

Это десертный сорт французского происхождения. Его деревья сильнорослые, достигающие средней и даже большой величины, с высоко-пирамидальной кроной, с свисающими длинными ветвями, невысокой холодостойкости, требуют свежую почву, с высокой урожайностью. Плодоношение наступает рано.

Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 549-553./говорит, что деревья этого сорта невзыскательны на почву и положение, но предпочитают свежий грунт сухому и рекомендуется выбирать сильную и тучную почву, избегая сырого грунта, чтобы не было серьезного поражения паршей.

Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, стр. 178-180./говорит, что данный сорт в СССР прививается большей частью на грушевом дичке, любит свежую питательную почву, требует длинной обрезки и прореживания плодов. В СССР, по преимуществу, любительский сорт, так как плоды быстро отходят и не переносят далекого транспорта. Кроме того, они сильно поражаются паршей и поэтому сильно обезображиваются.

Н.М.Сергеев /"Сорта плодовых и ягодных культур", изд. 1953 г., стр. 299-300/ считает достоинствами сорта: высокую зимостойкость по сравнению с другими осенними сортами и хороший вкус плодов. Отличительные признаки сорта: удлиненные изогнутые пильчатые листья и ярко-окрашенные пестрые плоды, вначале с терпкостью. Сорт рекомендуется для широкого разведения на Северном Кавказе.

Бёрэ Луиза, Beurré Luizet.

Образцы от Л.П.Симиренко /Городище, Киевской губ./.

Величина плодов крупная. Форма продолговатая, вверху овальная, ребристая, с одной плоской бороздой. Верхняя ямка не широкая и не глубокая, с мелкими ребристыми складками и небольшой открытой чашечкой. Нижняя ямка косая или ее совсем нет, а все ее место заплывшее. Ножка короткая.

Кожа тусклая, толстая, плотная, мелко-шагреневатая, грязно зеленовато-желтая, с очень мелкими и частыми сероватыми подкожными точками.

Мякоть белая, мягкая, сливочная, нежная, тающая, сладкая, пряная, превосходного вкуса.

Л.П.Симиренко рекомендовал обратить внимание на этот сорт. Плоды 23 октября [5 ноября] были крепкими, с светло-травяного цвета кожей. 10 [23] ноября они совершенно созрели вместе с семенами.

Большая Луиза, Grosse Louise.

1. Образцы плодов из Крыма.

Величина плодов более средней. Форма кубаревидная, широко-округлая и почти с половины остро-коническая, правильная, с острым косым основанием, без ребер, но с неровной бугроватой поверхностью на конической части.

Верхняя ямка широкая, углубленная, почти глубокая, правильная, без складок. Листики чашечки короткие, черные, сажистые, открытые. Нижняя ямка косая, неправильная, с кольцевым неправильным углублением и небольшим мясистым выростом, из которых один более других. Ножка отклоненная, тонкая, длиной в 1/4 высоты плода.

Кожа тусклая, не жирная, тонкая, нежная, совершенно одноцветная, лимонно-желтая, с мелкими, частыми бурыми ржавыми подкожными точками, более резкими на теневой стороне и мало заметными на солнечной, где кожа несколько блестит. В верхней ямке тонкий бурый лучистый налет, который и в нижней ямке, также ржавые пятна на теневом боку. Запаха нет.

Мякоть белая, около гнезд зернистая, нежная, очень сочная, тающая, сахаристая, винно-кисловатого вкуса, с некоторой пряностью.

Плоды созревают во второй половине сентября [в начале октября].

Превосходный десертный сорт первого качества.

4. Образцы плодов, полученные от Янковского из Варшавы: ✠ – ✠; XI – XII.

Величина плодов средняя. Форма продолговатая грушевидная, округлая у верхушки и ровно переходящая в конус, с несколько расширенным основанием, без ребер.

Верхняя ямка малая, очень глубокая, правильная, характерная без ребер и складок, как бы выточенная. Листики чашечки короткие, черные, сильно открытые. Нижняя ямка мелкая, с неровным выростом. Ножка толстая, короткая.

Кожа тонкая, нежная, слабо блестящая, светло-желтоватая, одноцветная, с частыми мелкими серыми точками, местами слабо заметными. Запаха нет.

См. на обороте:

Мякоть снежно-белая, нежная, тающая, очень сочная, винно-кисловатая, со слабой кислотой и с незначительной пряностью.

Плоды созревают во второй половине сентября [начале октября], но могут храниться в течение ноября и даже в хорошем хранилище в декабре.

Любимица.

Любимица Клаппа. Clapp's Favorite, Favorite de Clapp, Clapps Liebling.

Образцы плодов взяты из Горецкого фруктового сада, Могилевской губ.

Величина плодов средняя. Форма кубаревидная, к верхушке округло-коническая, с округло-угловатыми и мало заметными ребрами, к ножке сужается в острый косой конус, кроме с переменными кольцевыми слабыми

По мнению Л.П.Симиренко этот сорт представляет большой интерес для вообще Украины, благодаря стойкости деревьев к холоду. Даже деревца в питомнике выносили морозы -30°R.

2. А.С.Гребницкий /"Атлас плодов", изд. 1906 г., стр. 419-420./ пишет, что рост деревьев этого сорта сильный, прямой, крона овальная, редкая, высокая, сучья мало ветвящиеся. Листья средней величины, яйцевидно-заостренные или овальные, снизу и по краю совершенно голые, с тонкими светло-зелеными голыми черешками. Деревья хорошо растут на глинистой, тяжелой почве, но поздно начинают плодоносить. Раньше плодоносят на песчаной почве и сразу плодоносят изумительно обильно. Сильно боятся ветра. К зимам в Ковенской губ. /Литва/ относятся безразлично.

4. Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 161./ считает достоинствами этого сорта: "выносливость, красоту и десертный вкус плодов, иммунность, раннее плодоношение" и недостатками - "недостаточную прочность прикрепления плода и непродолжительную лежкость".

5. Г.А.Каблучко /"Сорта плодовых культур Молдавии", изд. 1953 г., стр. 269-271./ пишет: "Любимица, или Любимица Клаппа, после Ильинки и Лимонки, - наиболее распространенный летний сорт груш в Молдавии... По устойчивости к неблагоприятным почвенным и климатическим условиям, по высоте урожая и по качеству плодов Любимица является перворазрядным столовым летним сортом груш и высоко ценится для технической переработки, особенно для сушки и консервирования."

Magdalene.

Магдалена полосатая, Citron de carmes panaché, Gestreifte Sommer)

Образцы плодов получены из Горецкого фруктового сада, Могилевской г.

Величина плодов малая. Форма продолговатая, у верхушки округлая или овальная, к ножке длинная коническая, со слабым боковым сдавлением, с ясными продольными ребрами, сглаженными к верхушке. Чашечная ямка мелкая или ее совсем нет, с пушком. Листики чашечки длинные, звездчатые, выдающиеся на верхушке. Ножка тонкая, часто в половину высоты плода, зеленая или желтоватая, отогнутая вбок, отчего в мелкой ямке складки в этой части около ножки.

Кожа мелко шагреневатая от множества тонких трещин, преобладающих на солнечной стороне и придающих шероховатость, по цвету зеленая или желтоватая, на солнечной стороне с мутным ржаво-красным или коричневым пятнистым или полосатым румянцем.

Мякоть сочная, крупитчатая, мягкая, рыхловатая, слабого кисловато-сладкого вкуса, полутающая, даже зрелая не рассыпчатая и не имеющая пресной мучнистости. Каменистая часть только около чашечки, немного заходит на бока, но не кругом гнезд.

Особенно отличаются листья, которые с волосистыми черешками и волосистой снизу главной жилкой. По этим признакам узнается сорт без плодов.

Надам Трейв, Madame Treuve. Образцы плодов получены от Тейе-
ника из Курляндии.

Величина плодов средняя и меньше средней. Форма неправильно-овальная, к ножке конически суженная, к верхушке с выдающимися округлостями ребер, более ясных (по одному на плоде в конической части.

Верхняя ямка неправильная, углубленная, с следами складок. Листики чашечки узкие, звездчатые, открытые. Нижняя ямка не косая, небольшая, с ребристыми выростами. Ножка тонкая, длиной в половину высоты плода и длиннее.

Кожа гладкая, тусклая, светло-желтая, несколько зеленоватая, одноцветная, на верхушке или сбоку с тонким желто-бурым ржавым налетом. Подкожные точки совсем не видны, что очень характерно для этого сорта вместе с окраской и особой формой.

Мякоть белая, в начале [средине] октября мучнистая, около гнезд (и чашечки каменистая, безвкусная.

Плоды, по-видимому, созревают в начале [средине] сентября. Судя по нежности строения мякоти, надо полагать, что плоды в должную пору использования /конец августа - начало сентября [начало - средина сентября] / вкусные и сорт достоен разведения в Курляндской губ.

Х.И.Клейн в журнале "Прогрессивное садоводство и огородничество" за 1907 г., в № 30, стр. 368 пишет, что этот сорт встречается в любительских садах Харьковской губ. и везде на разных почвах деревья автор находил здоровыми, урожайными, а плоды совершенно свободными от парши. Деревья среднего роста, плоды прочно держатся на ветках. Они созревают в августе - сентябре и в лежке сохраняются продолжительное время.

В том же журнале за 1908 г., № 20, стр. 368, садовник Е.П.Денисенко указывает на сильную вымерзаемость описываемого сорта, который полагает едва-ли возможным разводить на границе Харьковской и Курской губерний, откуда посылает свое сообщение.

"Майская, De Mai."

Образцы на Нижегородской выставке 1896 г. из Крыма.

Величина плодов большая. Форма двояко-коническая, неправильная, верхний конус /к чашечке/ больший, нижний меньший /к ножке/, с округлой верхушкой и небольшим кольцевым вдавленным основанием, в верхнем конусе 5-ребристая и бороздчатая, с короткими не цельными вдавленными бороздками, а в нижнем с поперечными ямчатыми вдавлениями. Верхней ямки нет. Листики чашечки узкие, черные, полуоткрытые. От чашечки идут ребристые складки, неровные, спускающиеся по верхушке. Ножка тонкая.

Кожа тусклая, не жирная, сплошь травяно-зеленая, в феврале грязно желтовато-зеленая, одноцветная, шагреневидная, сетчатая, вся усеянная частыми мелкими серыми ржавыми подкожными точками. Приятный запах чувствуется на расстоянии ясного зрения.

Мякоть белая, в начале [средине] февраля очень плотная, рецного вкуса, мало-сочная, сладковатая.

Сорт кухонный, зимний. По-видимому плоды могут храниться продолжительное время, чему соответствует название.

Малгорзатка, Маргаритка, Петровка, Кирез армуд.

1. Образцы плодов получены из Уманского с.х. училища, Киевской губ.

Величина плодов маленькая. Форма кубаревидная, округлая в верхней части, обычно с заметным перехватом на средине и коническая к ножке. Поверхность, в особенности к чашечке, бугристая. Листики чашечки открытой и неуглубленной большие, несоразмерные с величиной плода, коричневые. Нижней ямки нет. Ножка тонкая, довольно прямая, длинная, равная по длине высоте плода или длиннее ее.

Кожа перед созреванием желтовато-зеленоватого цвета, при созревании лимонно-желтая, однотонная. Полос румянца никаких нет.

Мякоть желтоватая, достаточно сочная, очень мягкая, сладкая, почти без кислоты, с слабой пряностью.

Семенные гнезда небольшие. Семена не всегда развитые, пустые, черные.

Деревья среднего развития, с раскидистыми кронами, могут доростать до значительного возраста и даже до 80-100 лет, какие приходилось видеть в садах Киевской губ. Плодоношение обычно ежегодное и обильное. Листья мелкие, светло-зеленые.

Сорт по-видимому иностранного западно-европейского происхождения, так как он там значительно распространен. Деревья часто встречаются на Украине, в Белоруссии и Литве, а также в нашей средней полосе. (И.В. Мичурин в описании этого сорта /т. II, изд. 1948 г., стр. 271-272/ говорит, что к морозам этот сорт в Тамбовской губ. вполне вынослив.)

Главное значение данного сорта состоит в том, что его плоды весьма значительно опережают по созреванию все другие разводимые у нас летние сорта груш. На Украине сорт называется Петровкой, так как обыкновенно плоды созревают во второй половине июня по ст. стилю, т.е. к дню Петра и Павла /29 июня ст. ст. или 12/VII по новому/. И.В. Мичурин считает сорт выгодным для коммерческих садов.

3. Л.П. Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 623./ говорит: "Скороспелка Кирез армуд открывает в Крыму грушевый сезон, и она, согласно Палласу, культивировалась там уже в Хуш отметил, при чем получила свое название благодаря тому, что ее плоды созревают в одну пору с майскими вишнями /кирез значит по-татарски вишня/... Оче-

См. на обороте:

видно, все достоинство сорта исчерпываются тем, что его плоды являются на рынок первинкой".

4. В.К.Заец /"Сорта плодовых и ягодных культур", изд. 1953 г., стр. 340-341./ пишет, что Малгоржатка русская выведена И.В.Мичуриным путем скрещивания Малгоржатки, старинного сорта груши, и мичуринского сорта Бергамот Новик. Отличительные признаки сорта: раскидистая крона; мелкие округлые листья на длинных черешках; мелкие кубаревидные плоды на длинной плодоножке, ранне-летнего созревания.

2. И.В.Мичурин описал данный сорт в журнале "Прогрессивное садоводство и огородничество" за 1910 г., № 5, стр. 135-136. Он говорит, что особо раннее созревание этой груши делает ее очень выгодной для коммерческих садов. Ее деревья средней силы. Ветви растут раскидисто, а иногда и совершенно горизонтально; склонна к кустовой форме. К морозам в Тамбовской губ. вполне выносliва и неразборчива на почву; плодоносит обильно и почти ежегодно. Листва мелкая, светло-зеленая.

Маликовка, Молдавка красная, Молдавка курская, Шпанка.

Образцы плодов от И.Н.Гангардта из Курской губ. Помологическое определение: бера. или большая.

Величина плодов средняя. Форма неправильная, грушевидная, сплюснутая с боков, на верхушке более половины плоско-расширенная или коническая, к основанию с перехватом и более низкой конической частью, по бокам с сглаженными бороздами.

Верхняя ямка углубленная, неправильная, бороздчатая, с большими четными, зрездчатыми и открытыми листиками чашечки. Нижняя ямка косая, углубленная, с кольцевыми складками мякоти около ножки, которая тонкая, длинная, кривая, равная половине высоты плода.

Кожа тонкая, нежная, ровная, без шагреневатости, светло-желтая, на большей части с красивым желто-розовым разлитым румянцем с таким же расплывчатым крапом или с неясными белыми точками. Подкожные точки черно-серые. Запах слабый.

Мякоть белая, нежная, сладкая, мелкозернистая.

Там же в садах И.Н.Гангардта.

Величина плодов средняя. Форма яйцевидная, у верхушки овальная, к ножке коническая, с боков приплюснутая, к верхушке с слабо выдающимися ребрами, сглаженная по бокам.

Верхняя ямка углубленная, с малыми короткими складками. Чашечка неразвитая, открытая, бурая. Нижняя ямка углубленная, косая. Ножка равна половине высоты плода, кривая.

Кожа тусклая, сухая, лимонно-желтая, с частыми зеленными точками, сначала зеленовато-желтая, на боку разлитый шарлаховый румянец с фореловыми точками.

Мякоть в половине [конце] сентября белая, зрелая, сочная, тающая, но несколько волокнистая, кисловато-сахаристая, с вяжущим, слабо мандариновым привкусом.

Ранне-осенний десертный сорт.

Образцы плодов от Корочанского земства, Курской губ.

Величина плодов менее средней. Форма неправильная длинная, к верши-

См. на обороте:

не и ножке конически суженная; к ножке сильнее, чем к тупой широкой и косой верхушке, по бокам неправильно ребристая и бугристая, с широко округлыми ребрами и мелкими узкими бороздами. Верхняя ямка по краям ровная, но косая, углубленная, без складок. Листики чашечки узкие, тонкие, При чашечке узкие малые складки и между ними небольшие бугорки, сомкнутые. Ямка при ножке очень мелкая. Ножка очень длинная.

Кожа тусклая, гладкая, серо зеленовато-желтая, одноцветная, без всякой красноты. Подкожные точки мелкие, мало заметные. Ржавых пятен, налета и точек нет. Даже зрелые плоды зеленоватого цвета.

Мякоть белая, достаточно хорошего вкуса.

Плоды созревают в начале [средине] сентября и держатся до половины [конца] сентября.

3. В.Ф.Смирнов в книге "Яблоня и груша в саду мичуринца-опытника", изд. 1951 г., на стр. 266-267 пишет: "Дерево средней силы роста с несколько раскидистой пирамидальной кроной. В Тамбовской области взрослые деревья этого сорта зимуют удовлетворительно. В пору плодоношения деревья вступают на 6-8-й год после посадки. Урожайность очень хорошая... По величине плодов и хорошим их вкусовым качествам Маликовка представляет большой интерес для испытания в саду опытника в условиях севернее Тамбовской области."

4. В.К.Заец /"Сорта плодовых и ягодных культур", изд. 1953 г., стр. 326-328./ пишет, что этот сорт издавна культивируется в Курской области, откуда он распространился в Воронежскую, Орловскую и Тамбовскую области. Сорт описан И.В.Мичуриным в 1910 г. в журнале "Прогрессивное садоводство и огородничество", (№45, стр. 1281-1282 и №46, стр. 1300 и 1301, И.В.Мичурин отмечает интересное явление: увеличение величины плодов в два раза, если деревце Маликовки не привито, а растет на своих корнях. Сорт введен в стандартный сортимент по первой группе в Курской, Брянской и Орловской областях и по третьей группе - в Воронежской области.

2. Н.Т.Кичунов /журнал "Плодоводство", 1894 г., стр. 282-284/ считает, что Маликовка лучшая из местных груш Курской губ., издавна разводится по преимуществу в Корочанском уезде и представляет перерод неизвестного иностран-

См. 2-ой лист.

ного сорта.

Деревья растут довольно быстро, но не образуют прямых штамбов, хорошо переносят морозы. Сорт выделяется среди других местных величиной плодов, их вкусовыми качествами и красивым видом. Время созревания плодов - средина и вторая половина августа [конец августа и начало сентября]. Кроме потребления в свежем виде, плоды идут на кондитерские изделия и очень ценны для сушки и приготовления кваса.

Недостатками сорта являются: неодинаковость плодов по форме и величине и легкая поражаемость грибком парши, от которого в сырое лето они изменяются до неузнаваемости.

Марианна, Салисбюри, Princesse Marianne, Prinzessin Marianne, Salisbury.

Сорт выведен в Бельгии в начале XIX века.

1. Образцы плодов получены от Кончевского

Величина плодов средняя. Форма неправильная овальная, с округлостями и неровностями к верхушке, к ножке суживается почти вдруг, с поперечным перехватом, в косой и неправильный острый конус с боковой [направленной вбок] ножкой. Верхушка округло-ребристая и бороздчатая.

Верхняя ямка мелкая, с сглаженными складками. Чистики чашечки малые, разъединенные, короткие, открытые. Нижняя ямка с боковым и поперечным выростами.

Кожа тусклая, пестрая от ржавых пятен, лимонно-желтая, на солнечной стороне оранжевая, с мелкими буроватыми ржавыми подкожными точками и многими тонкими ржавыми буроватыми пятнами.

Мякоть белая, тающая, сладкая, с конфетной нежностью, но крупитчатая и сильно вяжущая. В вкусе превосходны сладость /сахаристость/ и пряность.

Семена плоские, светло-бурые.

Осенний сорт. Плоды созревают в конце сентября [начале октября], в начале [середине] октября мякоть буреет, начиная от ножки, продолжаясь на гнезда и делается негодной к использованию.

3. П.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 183-184./ пишет, что наиболее характерные признаки сорта: округлая пониклая крона и ржавые плоды. Рост деревьев сильный на дичке и айве. Деревья высокоурожайные, нуждаются в питательной глинистой, влажной почве. Плоды крепко держатся на дереве. Не поражаются паршей. Сохраняются около месяца.

Хороший осенний столовый сорт. Плоды похожи на Бере Боск, с которым смешиваются на рынках. Отличаются меньшей величиной и несколько худшим вкусом. Сорт хорошо удается на Украине.

Марьяна.

Образцы плодов получены из сада учхоза Уманского с.х. института.

Величина плодов средняя. Форма округло-коническая, с перехватом в 1/3 от ножки, поверхность немного бугристая. Верхняя ямка немного углубленная. Нижней ямки нет. Ножка прямая или изогнутая, длиной в половину высоты плода.

Кожа основной окраски светло-зеленоватой, в полной зрелости желтая. На солнечной стороне небольшой румянец из расплывшихся кирпично-оранжевых полос и пятен. Аромат небольшой.

Мякоть беловато-желтоватая, сочная, сладкая, немного вяжущая.

Семена небольшие, коричневые.

Плоды поспевают в средине [конце] сентября. Могут храниться в хорошем хранилище около месяца. Это хороший осенний сорт, выведенный в Бельгии под названием Принцессы Марианы, Princesse Mariane.

Деревья хорошего роста, в молодости с пирамидальной кроной, а взрослые с округло-пирамидальной и даже поникшей, любят свежую и питательную почву, средней долговечности, довольно холодостойки, мало страдают от ветра. Вступают в плодоношение на 7-8 году, в взрослом возрасте достаточно урожайны.

Образцы плодов из сада Мирошниченко вблизи города Херсона были поспевания в конце сентября [начале октября]. В остальном как в предыдущем описании.

Мария Луиза. Marie Louise.

Образцы плодов получены от Гейниака из Курляндской губ.

Величина плодов средняя. Форма продолговатая, к верхушке неправильно овальная, с бугристо-ребристыми неровными выростами, к ножке почти правильно суженная в острый конус, переходящий в мясистые наросты около ножки.

Верхняя ямка углубленная, очень неправильная, с двумя ребристыми сильными складками, переходящими в ребра. Листики чашечки короткие, открытые. Ножка короткая, толстая, равная 1/4 высоты плода по своей длине.

Кожа тусклая, немного шершавая от ржавого бурого налета и пятен, спелое травяно-зеленая, на солнечной стороне с мутной красностью.

Мякоть белая, немного зеленоватая, нежная, тающая, винно-кисловатая, очень вяжущая. Каменистость очень слабая.

Семенные гнезда малые. Семена небольшие, тонкие, острые, черно-бурые.

Плоды созревают в конце сентября [начале октября]. Нельзя снимать плоды сильно зрозелень, так как тогда в лежке получается сильно вяжущий вкус, зеленоватый цвет мякоти и недостаточное качество.

Сорт достойный разведения.

Мария Луиза, Marie Louise d'Uccle.

Образцы плодов получены от Варшавского помологического сада.

Величина плодов большая, форма коническая, сверху широкая и с 1/3 заострением в сплюснутый конус, с широкой округло-ребристой или бороздчатой с большими округлостями верхушкой и косым основанием, с очень большим боковым выростам; выпадание боек делает коническую часть сплюснутой. Вообще по форме очень походит на Bonne Louise d'Avranches.

Верхняя ямка очень широкая, простертая на верхушку, углубленная, без складок, с бороздами и низкими широкими округлыми выростами на краях. Листики чашечки узкие, длинные, черные, гладкие, открытые. Чашечка очень большая, как у Bonne Louise d'Avranches. Нижняя ямка косая, очень малая, с слабым кольцевым углублением и неровными мясистыми выростами. Ножка тонкая, короткая, кривая.

Кожа тусклая, тонкая, нежная, не шагреневатая, но слабо шершавая от очень мелких лучистых ржавых бурых пятен в виде тонкой сетки, совсем однотонная лимонно-желтая. Около чашечки и ножки тонкий бурый лучистый ржавый покров. Запах слабый.

Мякоть белая, нежная, каменистая только около чашечки, без зернистости около гнезд, тающая, сладкая, не вяжущая, очень сочная, с грушевой пряностью.

Семенные гнезда узкие, как у яблони. Семена короткие, толстые, с коротким носиком, темно-бурые.

Превосходный десертный сорт первого качества, очень сходный с Bonne Louise d'Avranches. Плоды созревают в половине конце сентября, в конце сентября в начале октября вполне зрелые и далее не держатся.

Мария Луиза, Marie Louise Delcourt.

Образцы плодов получены от Тикровского из Варшавы: ⁂ ! † :, x .

Величина плодов средняя. Форма длинная грушевидная, вверху округлая и более 1/2 остроконическая, с нешироко вдавленными боками и немного расширенным основанием; на верхней округлой части с сглаженными округлыми ребрами, всегда правильная.

Верхняя ямка малая и мало углубленная, без складок. Листики чашечки короткие, черные, полуоткрытые или сомкнутые, пушистые. Край ямки немного бороздчатые. Нижней ямки нет, выполнена. Ножка немного изогнутая, толстая, длиной с 1/3 высоты плода.

Кожа тонкая, нежная, не жирная, немного блестящая, одноцветная, светло или лимонно-желтая, без всякой красноты. Подкожных точек не видно, но местами тонкий налет желто-буроватой ржавчины, более сильный вблизи ножки. Запаха нет.

Мякоть белая, нежная, сочная, тающая, тонкого кисловатого и пряного вкуса.

Плоды созревают в первой [второй] половине сентября и используются по октябрь включительно.

_Маркграфская, _Маркиза, Markgräfin.

Образцы плодов от Лейениака из Латвии.

Величина плодов более средней. Форма грушевидная длинная, неравнобокая, в верхней части округлая, в нижней коническая и в промежутке перетянутая, по бокам ровная, только в широкой части с несколько выступающими округлостями. Верхняя ямка ровная, широкая, мало углубленная, немного неправильная, с слабыми бороздами. Листики чашечки короткие, широкие, черные, открытые. Нижняя ямка небольшая, с боковым выростом, косящим короткую ножку.

Кожа толстая, плотная, тусклая, травяно-зеленая, совершенно одноцветная, с множеством мелких темно-зеленых и ржавых желто-бурых внизу точек, придающих коже шероховатость. На верхней ямке тонкая желто-бурая лучисто расходящаяся по всей верхушке ржавчина. Местами на боках ржавые пятна. У ножки боковой вырост с серой ржавчиной. Запаха нет.

Мякоть желтоватая, сильно каменистая около чашечки и зернистая около гнезд, очень сочная, нежная, мягкая, тающая, сладкая и мало кисловатая, с небольшой пряностью.

Плоды совершенно зрелые 15 [в конце] сентября и могут сохраняться до октября [половины] октября.

Отличный десертный сорт.

Медведевка.

Образцы из Горецкого, Могилевской губ., фруктового сада. Помологическое определение: полубера.

Величина плодов большей частью малая, редко средняя. Форма кубаревидная, в верхней части с выступающими ребрами, более заметными около неглубокой чашечной ямки, где они образуют складки. Чашечка короткая, сильно открытая. К ножке коническая часть с небольшим перехватом и с малой кольцевой ямкой, с складчатыми морщинами. Ножка тонкая, кривая, у основания мясистая, бурая.

Кожа толстая, плотная, сухая или с малой жирностью на ощупь, зеленоватая с светлой желтизной, одноцветная, редко с мутным румянцем, с многими частыми зелеными и серыми ржавыми точками. Иногда около чашечки ржавые желтые пятна.

Мякоть желтоватая, очень сочная, нежная, около чашечки сильно каменистая, около гнезд менее, почти тающая, с признаками полубер, чисто сладкая, без пряности, вкуснее Бессемянки.

Плоды малой величины скоро портятся, как и Бессемянки, но позднее ее в ходу [в пользовании], в начале [средине] сентября. Скоро проходят, делаясь внутри бурыми и мягкими, так что делать сбор нужно совсем зелеными, после чего они могут держаться только несколько дней. Плоды средней величины держатся несколько дольше.

Деревья сильно-пирамидального роста, весьма выносливые, но очень долго не входят в пору плодоношения, не менее лет 10-12. В плодах часто совсем нет семян. Плоды по сладости выше Бессемянки, также по нежности и сочности мякоти. Хороши для сушки. Сорт сравнительно плодовитый, как и Бессемянка, но плоды часто бывают мелкими.

И.В.Мичурин в журнале "Прогрессивное садоводство и огородничество" в № 32 за 1913 год описал Медведевку серую, относя ее к лучшим сортам, вполне пригодным для культуры в средней России, и родственным старинному сорту Бере бланковой.

Величина плодов средняя и больше средней. Форма округло-колокольчатая, тупая у ножки. Чашечка полуоткрытая. Ее листики мелкие, зеленовато-

См. на обороте:

желтые. Верхняя ямка широкая, пологая. Нижняя ямка углубленная, с бугристыми краями, часто кособокая. Ножка тонкая, искривленная, длиной в половину высоты плода.

Кожа плотная, почти гладкая, светло зеленовато-желтая, на солнечной стороне при хорошей и жаркой летней погоде золотисто-желтая, без румянца.

Мякоть довольно нежная, белая, сладкая, с пряностью, с небольшими грануляциями вблизи семенных гнезд. Семена крупные, заостренные, темно-бурые.

Плоды созревают в зависимости от погоды с конца августа до половины сентября и могут храниться около трех недель.

Деревья морозоустойчивые, щедрой урожайности, среднего роста, с широко-пирамидальной кроной. Молодые побеги буро-красноватые. Листья эллиптические, слабо зазубренные, с длинными черешками.

Мережка. Сорт народной селекции, описание которого впервые сделано Г.Д.Нагорожным. Здесь описание по В.Ф.Смирнову /"Яблоня и груша в саду мичуринца опытника", изд. 1951 г., стр. 266-267/.

Величина плодов больше средней. Форма округло-коническая, неправильная, неравнобокая, с большими продольными вдавлениями. Верхняя ямка углубленная, с значительной чашечкой, около которой бугры и углубления. Около верхней ямки углубление. Ножка отклонена вбок, средней толщины, прямая, в 1/4 высоты плода.

Кожа одноцветная зеленая, сплошь усеянная крупными подкожными точками.

Мякоть белая, нежная, тающая, сладкая, сочная.

Плоды созревают в Воронежской области в июле и могут сохраняться 7-10 дней.

Деревья очень сильнорослые. В Воронежской области исключительно морозостойкие, в Московской слегка подмерзают. Плодоносят очень рано: на 2-3 год по посадке в сад.

Сорт исключительно скороспелый, большой урожайности, с высоким качеством и большой величиной плодов введен в стандартный сортимент Воронежской области и, по-видимому, заслуживает продвижения в более северные местности.

2 1
Вчоот Рач, Мелкочатая.

Образцы плодов от К.П.Симиренко, Городище, Киевской губ. Помологическое определение: бергамот.

Величина плодов средняя. Форма яблоковидная, бергамотная, неправильная от неровных выростов по бокам, более округлая к верхушке и несколько суженная к ножке. Верхняя ямка большая, глубокая, без борозд, но с одним округло-ребристым подъемом, нарушающим правильность формы. Чашечка сомкнутая, закрытая, из мелких узких листиков. Нижняя ямка небольшая, углубленная. Ножка тонкая, почти равная длине плода.

Кожа гусклая, светло-зеленая или бело-зеленая, одноцветная, не желтеющая, с частыми бурыми подкожными точками и в ямке с ржаво-бурыми пятнами, которые также на боку.

Мякоть белая, не очень сочная, зернистая или волокнистая, кисловато-сладкая, пресноватая.

Плоды следует собирать возможно позднее, чтобы они хорошо сохранялись и не вяли. Созревание около половины [конца] октября. Могут держаться до конца октября или начала ноября [средины или конца ноября].

_Митавская_желтая._

Образцы плодов из Горецкого, Могилевской губ., фруктового сада. Помологическое определение: винная.

Величина плодов малая, длина около 2 д.[5 см] , ширина 1 5/8 д.[4 см]. Форма к верхушке округло-коническая и на верхушке тупая, к ножке с невысоким, но острым коническим сужением, по бокам с слабой ребристо-бугристой поверхностью, с сглаженными ребрами в толстой части, а вблизи ножки с мелкими буграми и на конусе с мелкими складками. Чашечка неправильная, зубчатая, с узкими длинными зубчиками. Верхняя ямка медкая, гладкая, блестящая. Ножка тонкая, в половину длины плода, розовато-бурая, на конце кривая, от плода прямая.

Кожа гладкая, блестящая, светло-зеленая, без заметных точек, на солнечной стороне желтоватая, с редкими карминовыми точками.

Мякоть вяжущая, слабого кисловато- сладковатого вкуса, не вкусная.

Плоды созревают в конце августа [начале сентября]. Пригодны для кухни и сушки.

Молдавская.

1. Образцы от К.Н.Клейнмихеля, из Ивн, Обоянского у., Курской губ.

Величина плодов малая. Форма низкая плоско-коническая, неправильная, к верхушке иногда немного заостренная, к ножке с острым конусом, косым, с боковым слабо бороздчатым вдавлением, по бокам с небольшими неровно-вырастающими и бугроватыми округлыми ребрами. Чашечка открытая, с узкими распростертыми звездчатыми буроватыми листиками.

Верхней ямки нет или очень мала, с складками против листиков, переходящих в неясные ребра, разделенные неправильными бороздами. Нижней ямки нет, или она в виде слабого очень узкого кольцевого углубления. Ножка кривая, у основания мясистая.

Кожа жирная, лоснящаяся, зеленовато-желтая, одноцветная, с очень мелкими, частыми, но ясно заметными бурыми точками. Поверхность слабо шагреневатая. Запаха нет.

Мякоть белая, 20 августа [в начале сентября] перезрелая, не тающая, мягкая и сладковатая, очень сочная, не вяжущая; после перезревания бурая.

Ранний летний сорт, с плодами отличного качества, с очень сильной сочностью и довольно большой сладостью.

2. _Молдавская красная._ Впервые описана И.В.Мичуриным в 1910 году в журнале "Прогрессивное садоводство и огородничество", № 45-и 46. И.В.Мичурин говорит, что это прекрасный сорт, деревья которого хотя и нельзя считать безусловно выносливыми в нашей местности /в молодости, на тяжелых тучных почвах, они несколько страдают от сильных морозов/, но в старшем возрасте и в особенности на легких почвах легко переносят зимы и обильно плодоносят. Кроме того интересно увеличение плодов до двойного размера, если деревце не привитое, а отводочное, на своих корнях.

Величина таких плодов большая. Форма правильная грушевидная, удлиненная. Верхняя ямка неправильная углубленная. Чашечка средней величины, с полуоткрытыми листиками, коротими и тупыми. Нижней ямки нет. У основания ножки несколько кольцевых вдавлений. Ножка длинная, примерно в высоту плода, довольно тонкая, гибкая, способствующая сохранению плодушек от полома ветром.

См. на обороте:

Кожа плотная, не блестящая, основного светло-зеленого цвета, на солнечной стороне с карминовым размытым румянцев. Подкожные точки частые, мелкие, также как и серые пятнышки.

Мякоть белая, мягкая, сладкая, с небольшой пряностью, с зернистостью около семенных гнезд только в плодах с деревьев, росших в плохих условиях.

Семенные гнезда яйцевидно-вытянутые. Семена не всегда развитые, темно коричневые.

Сбем плодов небходимо для хорошего сохранения делать заблаговременно, за неделю до начала созревания, т.е. примерно в средине сентября. Хранение продолжается до конца ноября.

Сорт вполне пригоден для защищенных мест в садах средней полосы России, особенно на легких почвах. Молодые побеги толстые, короткие. Листья средней величины, темно-зеленые.

Граф Мольтке.

Образцы с лежачих решеток из Горецкого, Могилевской губ., фруктового сада.

Величина плодов менее средней и средняя, довольно неравномерная по размеру. Форма продолговатая, кособокая, у тупой верхушки округлая, к ножке тонко-коническая, на солнечном боку перехваченная. Верхняя ямка углубленная, с широкими ребристыми складками. Чашечка полузакрытая, с длинными листиками, сжатыми в пучек. Нижней ямки нет и в зрелости кожа при ней морщится. Ножка короткая, тонкая, почти прямая, на конце немного загнутая.

Кожа толстая, матовая, шершавая, в зрелости основного зеленоватого и бело-зеленого цвета, но кажется почти желтоватой от сплошной тонкой желто-бурой ржавчины и многочисленных мелких бурых подкожных точек, которые затем обращаются в жесткие черные ржавые. Нет никакой красноты.

Мякоть белая, сочная, тающая, винно-кисловатая, с слабой кислотой в начале созревания, нежная, с небольшой пряностью.

Плоды созревают после 20 сентября [в начале октября], следуя за Лесной красавицей, Fondante des bois.

Превосходный десертный сорт.

Мускатная, Мушкателька.

Образцы плодов получены из сада учхоза Уманского с.х. института, Киевской, теперь Черкасской обл. УССР.

Величина плодов малая. Форма округло широко-коническая, несколько кособокая. Верхней ямки почти нет, нижняя также отсутствует, но при ней полукольцевое вдавление и ножка отклонена вбок. Последняя тонкая, прямая, длиной больше половины высоты плода.

Кожа основной окраски, переходящей к зрелости от светло-зеленой к желто-зеленоватой и наконец к лимонно-желтой. На значительной части румянец, который сначала буро-красный, а затем коричнево-красный. Подкожные точки хорошо заметные.

Мякоть довольно плотная, сочная, сладкая, с сильным мускатным запахом, каменистых частиц нет. Семена коричнево-черные.

Плоды созревают в начале [половине] августа .Могут лежать только несколько дней. Они по большей части используются в свежем виде.

Деревья достаточно здоровые, неприхотливые, дорастающие до средней величины.

(619-620)

Мясоедовка. Название дано по фамилии К.Мясоедова из Смоленской губ. /журнал "Прогрессивное садоводство и огородничество", 1909 г., № 51, стр. 2/ в саду которого эта груша имелась. И.В.Мичурин /"Сочинения", т.II, изд. 1948 г., стр. 371-374./ считает грушу Мясоедовку родственной Бере Слуцкой и единственной из старых сортов, разводимых в нашей средней полосе, зимнего поспевания плодов.

Образцы плодов получены из сада учхоза Уманского с.х. института, Киевской губ. и из сада Глухова Шацкого уезда, Рязанской губ.

Величина плодов меньше средней и средняя. Форма округлая или овально-округлая, часто кособокая, с пологими выступами на боках. Верхняя ямка широкая и значительно углубленная. Чашечка небольшая, сжатая. Нижней ямки почти нет, около нее значительные бугры. Ножка короткая, средней толщины, отклоненная в сторону.

Кожа плотная, блестящая, основного зеленовато-желтого цвета, с мелкими буроватыми подкожными точками. На солнечной стороне коричневато- красный румянец и подкожные точки более темные.

Мякоть белая, мало сочная, довольно вкусная, грубоватая, с каменистыми прослойками около гнезд, которые небольшие. Семена очень крупные, темно-коричневые.

Рекомендуется снимать плоды возможно позже, т.е. в средине [конце] сентября и сохранять около месяца в хранилище, где они хорошо вызревают и могут держаться еще около двух месяцев.

Деревья сильного роста, с высоко-конической кроной и хорошим штамбом. Листья крупные, темно-зеленые, овальные, с длинными тонкими черешками. Плодоношение начинается поздно, только лет с 12 после посадки в сад.

К.К.Мясоедов/журнал "Прогрессивное садоводство и огородничество", 1909 г., № 51, стр. 77/ пишет, что данный сорт получен сеянцем Матузовым в Бельском уезде, Смоленской губ. от посева семян американских сортов груш. Большинство сеянцев вымерзло и только сохранилось одно дерево в возрасте 50-ти лет, которое и является родоначальником описываемого сорта. По мнению Мясоедова этот сорт должен занять среди груш центральной полосы такое же место, как Антоновка среди яблонь. Деревья выдерживают в Смоленской губ. самые сильные морозы, никогда не обмерзают, и

См. на обороте:

почве неприхотливы, хотя любят удобрение, очень урожайны, но поздно плодоносят - не ранее 12-15 лет. Плоды сохраняются до февраля. Снимаются с дерева около 1 октября [половины октября] совершенно зелеными, крепкими как камень, но недели через две доходят в лежке и кожа становится желтой с ярким румянцем и ароматом. Мякоть белая, грубозернистая, сочная, полубергамотная. Листья густо расположенные, темно-зеленые, поздно опадающие. Древесина крепкая и среди 500 штук деревьев не было никогда поломов от бурь. Кроны скорее пирамидальные, чем развесистые.

_Народная /Царская.

Образцы плодов из Ставропольской губ. Помологическое определение: бера.

Величина плодов средняя или более средней. Форма широкая, почти плоская, переходящая в широкий и низкий неравнобокий конус, на котором ножка [отклонена] вследствие бокового выроста; ниже верхушки, по бокам неправильно округлена и в конической части к ножке с поперечными морщинами. Верхушка круглая, неровная, слабо бороздчатая. Верхняя ямка неправильная, ровная, без ребристых складок. Листики чашечки маленькие, слабо пушистые, полуоткрытые. Ямка при ножке боковая, мелкая, с мелкими бугорчатыми выростами. Ножка короткая, толстая, равная 1/4 высоты плода.

Кожа тусклая, немного шероховатая от мелких частых серых подкожных точек и тонкого сетчатого желто-бурого налета, особенно на верхушке. Цвет травяно-зеленый, переходящий в светло-зеленый. Тонкая ржавчина при чашечке и при ножке.

Мякоть белая, нежная, каменистая около чашечки и от ножки до гнезда, тающая, сладкая, без пряности.

Семена острые, темно-бурые.

Плоды зреют в начале [средине] октября и держатся октябрь [до половины ноября].

Сорт осенний. Плоды более пригодны для сушки и кухни.

В журнале "Прогрессивное садоводство и огородничество" за 1909 год, в № 11 помещено описание И.В.Мичурина груши Царской, в котором указывает, что этот сорт в нашей средней полосе выращивается в садах уже в продолжении 300 лет, благодаря хорошим качествам плодов.

Плоды средней или менее средней величины. Формы округло овально-конической, с мало выдающейся чашечкой и с небольшой ямкой при ножке; средней толщины и длиной около половины высоты плода.

Кожа в зрелости основного желтого цвета, на солнечной стороне ярко-малиновый румянец, переходящий к краям в пятна, также и на теневую сторону.

См. на обороте:

Мякоть сочная, мягкая, без грануляций, сладкая, почти без кислоты. Семенные гнезда узкие. Семена длинные, черные.

Плоды созревают в конце июля - начале августа [начале или половине августа] и собранные без опозданий могут храниться в течение недели.

Деревья вполне выносливые в нашей средней полосе, нетребовательны к почве, с узко-пирамидальной кроной. Листья блестящие, темно-зеленые. Плодоношение начинается рано и затем вполне достаточное.

Это ранний сорт средней полосы России.

2) Н.И.Кичунов, описывая в журнале "Плодоводство" за 1894 г. курские груши, на стр. 69 пишет, что время спелости Царской выпадает на половину [конец] сентября. Плод небольшой; по форме, а также по плотной, желтовато-белой мякоти, его надо отнести к классу "круглых кухонных". Плод при созревании становится желтым, а один бок окрашен румянцем, с темными точками. Груша эта, по уверению курских фруктовщиков, одна из самых лучших для мочки. Деревья с возрастом образуют пирамидальную крону, которая растет раскидисто и становится отчасти даже плакучей.

Н.И.Кичунову случалось зимою на рынке покупать под тем же названием другую небольшую круглую грушу, с очень гладкой кожей и почти сплошь красной от румянца, с весьма твердой и мало-вкусной мякотью.

V.

Оливье де Серр, Olivier de Serres.

1. Образцы получены от Варшавского помологического сада и от Розера в Варшаве. Помологическое определение: бергамот.

Величина плодов средняя и малая. Форма репчатая, с тупой неправильно-ребристой верхушкой и коническим основанием, с угловатыми сглаженными ребрами, иногда с коническим подъемом и отдельными поперечными вдавлениями.

Верхняя ямка очень неправильная, бороздчатая, с неровными бугристыми или бугристо-ребристыми складками. Листики чашечки, большие, сомкнутые. Нижняя ямка узкая, углубленная, неправильная, бороздчатая. Ножка толстая, длиной равная половине высоты плода.

Кожа чрезвычайно плотная, гладкая или слегка неровная от мелкой сетчатой шагреневатости, светло травяно-зеленая, на солнечной стороне с мутной сероватой желтизной или же с мутной сероватой красноты. Подкожные точки ржавые мелкие, частые, делающие иногда плод шершавым. На Верхушке серые, ржавые пятна. В нижней ямке сплошная серая лучистая ржавчина, переходящая в пятна.

Мякоть белая, плотная, очень вязкая, так что трудно разорвать надрезанный плод, очень каменистая около чашечки, менее около гнезд, полутающая, картофелистая, мало сочная, кисловатая, мало вкусная.

Семена толстые, широкие, черно-бурые. (кабря,) и могут храниться в течение де-

Плоды созревают в леже в половине [конце] ноября, но по вкусу малокачественны. Характерные отличия, кроме формы, малая сочность и необыкновенная вязкость мякоти. В связи с небольшой островатой кислотой и др. недостатками вкуса плоды для десерта совсем не годятся, но вполне пригодны для мариновки и прочих заготовок, а также для переработки. /Б. И. Паблоский

3. /Провідні сорти плодових культур УРСР", изд. 1937 г. пишет, что это очень ценный французский десертный сорт, существующий в культуре более ста лет, распространенный в Средней Азии, Крыму и др. южных местностях.

Деревья умеренного роста, достигают не более средней высоты, имеют широко-пирамидальную крону с короткими и толстыми ветками, очень требо-

См. на обороте:

вательны на почву и местоположение. Для нормального роста и плодоношения требуют глубокую, теплую, питательную почву. При благоприятных условиях плодоношение наступает на 7-8 году. Урожайность умеренная. Плоды крепко держатся на ветках и стойки против парши.

2. Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 667-670./ говорит, что деревья данного сорта отличаются требовательностью к защищенному, теплому и хорошо освещаемому месту культуры, при достаточно влажной и питательной почве, так как в сухом грунте плоды получаются недоразвитые и мало-качественные, а в очень тяжелых, мокрых и холодных плоды редко вызревают настолько, чтобы потом в лежке не сморщиться и нормально созреть. Рост очень умеренный. Холодостойкость большая. Урожайность умеренная. Прививки на айве развиваются довольно удовлетворительно. Листья и плоды редко поражаются паршей.

4. Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 207-209./ пишет, что сорт принадлежит к числу лучших десертных поздне-зимних груш. Особенно хорошо удается в Узбекистане, где плоды доходят до 600 г весом, замечательного вкуса и нежности. Ценными достоинствами сорта являются: однородность плодов и их устойчивость против парши и плодожорки. Недостатками являются: требовательность деревьев к почве и климату, а также иногда невызреваемость плодов и недостаточная их величина, т.е. меньше средней.

5. Г.А.Каблучко /"Сорта плодовых культур Молдавии", изд. 1953 г., стр. 303-305./ говорит: "Пряная, или Оливье де-Сер, - ценный позднезимний сорт груш, распространен в Крыму, на юге Украины и в Узбекистане. В Молдавии Пряная имеется в небольшом количестве в садах Кодр, Приднестровья и Южной зоны плодоводства."

Опошнянка.

Образцы от Русиловых, вблизи г. Лохвицы, Полтавской губ. Помологическое определение: полубера.

Величина плодов малая. Форма овальная, к ножке коническая, неравнобокая, с мясистым выростом, сильно отклоняющим в бок ножку. Верхней ямки нет или она очень малая, отчего вся чашечка наружная; листики чашечки длинные, открытые. Ножка толстая.

Кожа гладкая, блестящая, с зелено-буроватыми мелкими ржавыми точками, скопленными более у чашечки в буроватую ржавчину легкого покрова. Поверхность характерно ямчатая или мелко-бугристая, в округлой части с слабыми продольными ребрами. Цвет светло или лимонно-желтый.

Мякоть желтоватая, мягкая, полутающая, сладкая, с малой каменистостью, по достоинству полубера.

Созревание плодов в конце июля [начале августа].

Хороший летний сорт.

Деревья очень плодовитые, выносливые. Листья средней величины, широкие, яйцевидные, мелкозубчатые, с длинным тонким черешком.

Орловская зимняя.

Образцы плодов из Горецкого, Могилевской губ., фруктового сада.

Величина плодов малая. Форма продолговатая, в верхней части округлая, с небольшой туповатой верхушкой, в нижней более чем на половину высоты остроконическая, вдавленная, неравнобокая; на верхушке, идя на бока, слабые ребристые выступы и бороздки.

Верхняя ямка малая, мелкая, с широкими сглаженными ребристыми складками и между ними бороздками, переходящими на верхушку. Чашечка открытая с сероватым зевом и короткими неразвитыми сероватыми листиками, от которых часто остается только суховатое кольцо. Нижней ямки нет. У ножке плод остро сужен, с неправильными кольцевыми складками, которые, сглаживаясь, далее продолжаются на коническую часть. Ножка кривая, длинная, равная половине высоты плода и более ее.

Кожа нежная, толстая, тусклая, не жирная, у незрелого плода в конце июля [начале августа] грязно-зеленая, одноцветная, мелкопагреневатая, с частыми мелкими мало-заметными серыми точками; есть серые ржавые пятна. С созреванием кожа лоснится и желтеет.

Мякоть после лежки становится мягкой и достаточно хорошего вкуса.

Сорт поздне-осенний. Деревья выносливые. Листья овальные, мелкозубчатые, с длинным тонким черешком.

(Sucré Romain, Fondante de Rome, Römische Schmalzbirne, Madam de France, Prinz Madam,)

1. Панна, Красавка,

(Бедреная, Франц-мадам, Большая Магдалина, Зеленая длинная, Sparagne, Sparbirne, Die Franz-Madam, Grosse Madeleine, Beurre romain.)

Образцы из Горецкого, Могилевской губ., фруктового сада.

Величина плодов средняя. Форма длинная, к ножке весьма правильно-суженная, несколько плоская, более с теневой стороны, ровная, без всяких бугров и выростов, у верхушки овальная, к ножке вытянуто-коническая. Верхняя ямка с открытыми листиками чашечки, мелкая, плоская, с едва заметными складочками. Ножка в 1 д. [2,5 см] длины, с правильно вырастающей около нее мякотью и редко отклоненная вбок.

Кожа зеленовато-желтая, плотная, толстая, слабо блестящая, на солнечной стороне почти желтая, не жирная и покрытая небольшой мутно-розоватой или киноварной /желто-красной/ полосатостью, как у Магдалинки на румянце/ Подкожные точки серые ржавые, также пятна, выделяются (еще зеленые.

Мякоть белая, сочная, мягкая, крупитчатая, но не тающая, мало сладковатая, с сильно вяжущим вкусом, который не пропадает даже при полном созревании. Лучший вкус у полузрелых. Потом мякоть делается мучнистой.

У некоторых плодов верхней ямки нет. Чашечка открытая широкая, с узкими черно-серыми опушенными и правильно открытыми в стороны листиками. Вдоль плода часно имеется борозда, как у слив. Около нижней ямки несколько бугровидных складок, идущих на бока.

Плоды созревают в конце июля – начале августа [начале или средине августа]. Например в 1897 году совсем созрели 24 июля [6 августа]. Лежатся неделю.

Деревья с длинными (и редкими ветвями, часто свешивающимися. Дают крупные плоды, но мало-плодны(й сорт) и годится у нас в Белоруссии для шпалер. Рост сильный.

2. Вариацией данного сорта является Панна, которая в свою очередь имеет несколько уклонений и распространена на Украине, в Белоруссии и других прилежащих местностях.

Образцы плодов получены из сада учхоза Уманского с.х. института.

См. на обороте:

Величина плодов средняя и меньше средней. Форма округло-коническая, верхняя 1/3 плоско округло-коническая, остальная коническая с перехватом, после которого правильно узко суживается к ножке, при последней нижней ямки нет. Верхняя ямка пологая, с небольшой чашечкой.

Кожа очень красивой окраски, основной в зрелости желтовато-зеленоватой, кроющей кирпично-красной яркой. Подкожные точки светлые. Кожа плотная, толстая, с слабым ароматом.

Мякоть беловато-желтая, умеренно-сочная, сладкая, немного терпкая, в полной зрелости рыхлая, суховатая.

Семена средней величины, темно-коричневые.

Плоды созревают в средине [конце] августа . В хорошем хранилище могут лежать около недели. Используются как десертные среднего качества и для хозяйственных заготовок.

Деревья начинают плодоносить на 7-8 году по посадке в сад. Они сильного роста, достигают большого возраста и значительной величины, имеют высокую пирамидальную крону.

Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 673-675./ говорит: "Панна - старинный немецкий промышленный сорт, известный уже в середине XVIII столетия... Благодаря действительно подкупающей красоте, несмотря на посредственность их вкуса, плоды Франц-Мадам всегда находят у нас на юге вполне обеспеченный сбыт. Поэтому если Панне и не место в саду сколько-нибудь разборчивого любителя, то культура этого сорта в промышленных садах везде приносит несомненную прибыль...Дерево отличается у нас могучим ростом и безусловной холодостойкостью, так как прекрасно выдержало 30° мороза; оно складывает большую высоко-пирамидальную крону, рано входит в пору плодоношения и в плодородном, не сухом, а напротив, несколько свежем грунте родит из года в год правильно и притом весьма благодарно."

Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 165-167./считает данный сорт весьма распространенным ранним рыночным. С красивыми плодами, которые несмотря на второразрядные вкусовые достоинства, пользуются хо-

См. 2-ой лист.

рошим спросом. На рынках Ленинграда появляется с начала августа. Промышленный сорт на Кавказе и Украине, включая Крым.

8 Г.А.Каблучко /"Сорта плодовых культур Молдавии", изд. 1953 г., стр. 266-268./ говорит, что это распространенный в Молдавии, особенно севернее линии Бендеры - Ниспорены, летний сорт груш... Созревают плоды в конце третьей декады июля, не одновременно, поэтому уборку урожая лучше всего производить в два приема. Сохраняются плоды в обычных плодохранилищах не больше 8-10 дней."

5 В.Макаров в журнале "Прогрессивное садоводство и огородничество", 1914 г., стр. 1284-1285 пишет, что деревья этого сорта образуют высоко пирамидальную крону, с возрастом ветки отвисают книзу; вполне выносливы к морозам и не подвергаются грибным болезням. Это автор утверждает по отношению к Киевской губ., но считает, что Панна может удаваться и севернее, как, например в Воронежской, Черниговской и др. По его наблюдениям, в Воронежской она прекрасно перенесла морозы до - 34° Р. Урожайность этой груши большая и с возрастом доходит до 20-25 пуд. с одного дерева. Хороша для сушки.

6 А.П. в том же журнале за 1915 г,. № 5, стр. 139 говорит, что описываемый сорт очень распространен в Минской губ. и свободно переносит климат Ковенской губ., где морозы в иные зимы достигают 30° Р., как, например, в Новоалександровском уезде Имеются деревья возрастом более 40 лет.

3. Принцесская /Панночка/.

Образцы плодов от Короновского из Смоленска.

Величина плодов больше средней и средняя. Форма продолговатая, к вер хушке плоско-округлая и на 1/3 к ножке коническая, с вдавлением на боку, без ребер.

Верхняя ямка малая, мелкая, плоская, без складок. Чашечка открытая, из коротких бурых листиков. Нижней ямки нет, или в виде небольшого полукольцевого валика, против которого мясистый большой вырост, последним обрастает иногда вся толстая, прямая, но отклоненная в бок ножка.

Кожа гладкая, блестящая, не жирная, местами неровная, зеленовато-желтая, на большей части поверхности с длинными мутно-киноварными полосами. Точки большие, серые, к окрашенной части в виде серых пятен.

Мякоть белая, мало сочная, плотная, сладковатая, нежная, прямая, не вяжущая, в половине [конце] сентября еще незрелая. Созревает во второй половине сентября [первой половине октября] и тогда качество десертного сорта.

Andenken an den Congress.

Подарок конгресса. Souvenir de Congrès, Сорт выведен во Франции в половине XIX века.

Образцы плодов от Янковского из Варшавы: ✻✻ † ; IX .

Величина плодов большая. Форма широко плоско-округлая у верха и с 2/3 высоты высоко-коническая с косым основанием и неровною слабо бугристой поверхностью.

Верхняя ямка широкая, углубленная. Листики чашечки короткие, черные, полуоткрытые. Нижняя ямка полукольцевая, с мясистым выростом. Ножка косая, очень толстая, короткая.

Кожа очень тонкая, нежная, светлого желтовато-белого цвета с легким небольшим красноватым румянцем, гладкая, не жирная. Подкожные точки очень мелкие малозаметные, местами темно-зеленые. У основания тонкие ржаво-бурые пятна.

Мякоть белая, довольно сладкая, с небольшой кислотой.

Плоды созревают в начале [средине] сентября и в половине [конце] сентября мякоть становится мучнистой. Использование плодов в течение сентября [второй половины сентября и первой половины октября], но необходимо следить, чтобы не было перезревания.

2. Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 671-672./ считает, что это скорее эфектный по плодам и декоративний сорт, чем десертный, а поэтому мало выгодный для промышленного сада.

Плоды великолепно окрашены и очень красивы, большие, непостоянной формы, держатся довольно прочно на ветках. Деревья средней силы и не достигают больших размеров. Достигнув известного возраста, в Киевской губ. становятся довольно холодостойкими, плодоносят правильно и удовлетворительно. Прививки на айве развиваются слабо, а поэтому полезна двойная прививка.

3. П.М.Сергеев /"Сорта плодовых и ягодных культур", изд. 1953 г., стр. 330./ пишет, что этот сорт изредка встречается в Крыму и очень редко на Северном Кавказе. Основные достоинства сорта заключаются в крупных плодах с красивой внешностью, а отличительные признаки сорта: крупные широко-грушевидные, заостренные, несколько бугристые, светло-желтые плоды.

См. на обороте:

почти одновременно с Вильямсом летним.

V

Подарок Монтлусона, *Souvenir de Montlugon.*

Образцы плодов получены от Радзиевского, из Киева.

Величина плодов средняя. Форма грушевидная, к верхушке округло и притуплено-коническая, сжатая с боков и неправильная, к ножке с перехватом и довольно остро-коническая, без ребер и бугров.

Верхняя ямка углубленная, с бороздами, без складок и бугорков. Чашечка малая, неразвитая, открытая, из коротких бурых, пригнутых внутрь листиков. Нижняя ямка косая, в виде впадины у ножки, которая тонкая, длинная, немного искривленная, длиной в 1/2 или 2/3 высоты плода.

Кожа толстая, нежная, мелко-шероховатая, совершенно одноцветная, лимонно-желтая в начале [средине] декабря, а ранее зеленая. Подкожные точки очень мелкие, ржавые, заметные только местами. Запах бадьянный.

Мякоть белая, нежная, рязкая, без зернистости и почти без каменистости, очень сочная, каменистость только около чашечки, тающая, винно-сладковатая, с легкой приятной пряностью, почти сладкая.

Семена узкие, черно-бурые.

Превосходный десертный сорт.

V

Груша Принц Наполеон, Prince Napoleon.

1. Образцы плодов от Л.П.Симиренко /Городище, Киевской губ./. Помологическое определение: полубергамот.

Величина плодов меньше средней и малая. Форма бергамотная или кубаревидная, широкая с низким конусом к ножке. В широкой части ясные борозды и округлые ребра, особенно при верхушке, где они отходят от краев широкой неправильной верхней ямки. Нижняя ямка мелкая, косая, с бугровидными выростами. Ножка равна половине длины плода. Чашечка большая, открытая.

Кожа тусклая, травяно-зеленая, одноцветная, с желтовато-серыми ржавыми подкожными точками и на солнечной стороне более яркая, около ножки с налетом.

Мякоть зеленоватая, мало сочная, похожая на кочерыжку, плохого вкуса.

Созревание плодов в конце октября [начале ноября]. Пригодны для кухни и заготовок.

2. Л.П.Симиренко в "Крымском промышленном плодоводстве", изд. 1912 г., стр. 687-688 описывает под тем же названием, по-видимому, крымский другой сорт, значительно отличающийся по времени готовности плодов. Крымский Принц наполеон снимается с дерева в конце августа начале сентября и поспевают в лежке уже в конце сентября начале октября, а французский сорт часто бывает готов в лежке только в январе.

Плоды Принца Наполеона крымского небольшие или средней величины, непрочно держатся на дереве.

Кожа зеленая, с серым налетом, при созревании желтеющая.

Мякоть сочная, сладкая, приятного вкуса,

Плоды созревают в первой половине средине сентября и держатся в лежке не больше 3-4 недель.

Деревья очень хорошо развиваются и имеют шаровидные кроны. Их урожайность правильная через год и обильная.

Новая Пуато. Nouveau Poiteau.

1. Образцы из Горецкого фруктового сада, Могилевской губ., с лежащих шпалер.

Величина плодов средняя и более средней. Форма продолговатая, неправильная, бугристая, бороздчатая и ребристая на верхушке, которая очень уродливая от восьма глубоких бороздок, доходящих почти на 1/4 высоты плода, отчего образуются разделы, покрытые мелкими бороздками и ребрами, теряющимися на боках.

Верхняя ямка очень глубокая, с черно-серой приватой короткой чашечкой; по бокам бугры, как у аптекарки. У ножке длинный неправильный конус, с боковой впадиной. Ножка отогнута в сторону, у основания с одной стороны мясистая.

Кожа плотная, тусклая, травяно-зеленая даже в полной зрелости, иногда местами несколько желтоватая, почти вся покрыта бурой ржавой сетчатой ржавчиной, придающей шероховатость.

Мякоть белая, под кожей зеленоватая, очень сочная, нежная, тающая, только около чашечки каменистая, отличного сладкого вкуса.

Часто без семян, но у части плодов, несмотря на совершенно зеленый цвет кожи, с зрелыми семенами.

Плоды поспевают в лежке с половины [конца] октября. Мякоть делается мягкой и вкусной сначала около ножки. В лежке хорошо держатся, к полной зрелости делаются мягкими, но не гниют.

Один из лучших сортов с плодами октябрьского поспевания. Сорт достойный разведения в шпалерной форме, как промышленный.

2. Образцы плодов, полученные от Горткевича из Гродненской губ.

Величина плодов средняя. Форма к верхушке неправильно-овальная, к ножке суженная в тупой кривой и косой конус немного выше 1/2 высоты, по бокам ровная, только на верхушке с сглаженными ребрами и бороздами.

Верхняя ямка немного углубленная, неправильная, с бороздами. Чистики чашечки короткие, открытые. Нижняя ямка заполненная мякотью. Ножка короткая, толстая, направленная вбок.

Кожа плотная, на светлых местах светло-желтая и блестящая, на солнеч-

См. на обороте:

ной стороне на охряно-желтом ржавом налете, занимающем большую часть плода, - оранжевая, слегка шершавая, с частыми серыми подкожными точками и немногими большими зелеными.

По форме и цвету походит на B. Chr. Will. , но отличается охряно-ржавым налетом.

Мякоть белая, крупитчатая, крепкая, колкая, около гнезд каменистая, мало-сочная и мало-сладкая, в начале [средине] октября мучнистая, не вяжущая, мало-вкусная. Достоинству мякоти вредит крупитчатость и малая сладость.

+ Образцы от Варшавского помологического сада с другими признаками.

Величина плодов большая. Форма длинная, неправильно-грушевидная, изогнутая, с боков сплюснутая, в верхней половине широко-коническая, с широкой тупой очень неровной, неправильной, бороздчатой и ребристой верхушкой, в нижней половине косая остро-коническая, несколько поперечно вдавленная, с косым острым основанием.

Верхняя ямка большая, широкая, очень неправильная, с разделяющими глубоко вдающимися бороздами и неровными округлыми ребрами. Чашечка большая. Ее листики длинные, черные, пригнутые, но открытые, почти гладкие. От ямки борозды далее мелкие и в верхней части плод неправильно ограненный. Следы угловатых ребер продолжаются и в остро-коническую часть. Нижняя ямка мало вдавлена, мелкая, косая, с малым боковым выростом. Ножка толстая, крючковидная.

Кожа тусклая, толстая, нежная, не жирная, совершенно однотонная, травяно-зеленая, немного светлее на одной стороне. Верхняя и нижняя ямки с тонким буро-ржавым покровом, также местами на боках. Подкожные точки мелкие, бурые, частые, довольно ясные. Запаха нет.

Мякоть маслянистая, зеленоватая, каменистая только около чашечки и слабо зернистая около гнезд, тающая, очень сочная, весьма нежная, винно-кислая, часто с резкой кислотой и малой пряностью.

Семена узкие, длинные, острые, черные.

Плоды созревают в половине [конце] сентября, в конце сентября [начале октября] уже перезревают. Портятся свнутри, а кнаруже остаются совершенно целыми. Мягкость узнается на ощупь. Держатся лишь до конца сентября [начала октября]. Время использование можно считать вторую половину сентября [первую половину октября].

Royal d'hiver, Royal d'hiver, Spina di Carpi, Spina Carpi, Pera Reale d'inverno, Pera Passana, Königliche Winterbirne, Winter Königsbirne.

Образцы плодов получены от Капустина из Крыма.

Величина плодов средняя. Форма неправильно-коническая, кособокая, с широкой приплюснутой верхушкой, с сильными большими и малыми бороздками, на 2/3 к ножке коническая с поперечными бороздками и боковой широкой ямкой.

Верхняя ямка очень широкая, широко-ребристая и бороздчатая, переходящая на всю верхушку, без складок. Чашечка большая, открытая, с темно-бурыми, волосистыми листиками. Бока неправильно округлые. Нижняя ямка снизу с полукольцевым вдавлением, а сверху с сильным боковым выростом, отклоняющим вбок длинную средней толщины ножку, равную по длине половине высоты плода.

Кожа толстая, плотная, тусклая, не жирная, мелко-шагреневатая, зеленая, в зрелости светло-желтая или зеленовато-желтая, на солнечной стороне лимонно-желтая. Подкожные точки мелкие, редкие, не резкие. У ножки несколько бурых пятен.

Мякоть желтоватая, зернистая только около чашечки, не очень сочная, волокнистая, сладкая, слабо ароматная, с недостатком сочности и даже хорошего вкуса.

Семена щуплые.

Плоды созревают в лежке в начале [средине] декабря.

Нельзя считать превосходным сортом.

Образцы плодов, полученные от Варшавского помологического сада.

Величина плодов средняя. Форма плоско-коническая, широкая и с плоской верхушкой; коническая и усеченная к ножке; довольно правильная; на верхушке с выдающимися ребристыми округлостями и сглаженными широкими бороздами. Верхняя ямка широкая, правильная, глубокая, листики чашечки узкие, открытые. Нижняя ямка вдавленная, правильная, без выростов. Ножка тонкая, длиной равная половине высоты плода, прямая, немного отклоненная в сторону.

Кожа плотная, гладкая, мало блестящая, одноцветная, светло-желтая, с

См. на обороте:

слабой желтоватой розоватостью на солнечной стороне, с мелкими серыми пятнами, на нижней ямке с тонким серым налетом.

Мякоть желтоватая, тающая, но зернистая, сладкая или сахаристо-медовая с слабой пряностью, без каместости за исключением мест около чашечки.

Плоды созревают в лежке в конце октября и начале ноября [в течение ноября].

Отличный столовый сорт. итальянского происхождения, известный в культуре около 400 лет. Встречается в культуре на южном берегу Крыма, в Молдавии и Закавказье.

3. Б.И.Чабловский /"Провідні сорти плодових культур УРСР", изд. 1937 г./ пишет, что этого сорта

Деревья сильного роста, с толстыми, сильными ветвями и крупными листьями. Очень требовательны к теплу, продолжительному вегетационному периоду и почве, в которых находится известь. При благоприятных условиях местоположения и почвы вступают в плодоношение на 7-8 году. Урожайность бывают обильная. Плоды хорошо держатся на ветках до полного созревания. Часто сильно поражаются паршей.

2. Л.И.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 689-694./ говорит, что деревья сорта Рояль здоровые и очень сильнорослые, в особенности в молодом возрасте, отличаются долголетием, рано начинают плодоношение, которое потом отличается большой правильностью и щедро. Прививки хорошо идут на айве, но у места прививки образуют большой наплыв и поэтому рекомендуется пользоваться обыкновенными дичками. Для успешной культуры необходим очень теплый климат и высокое положение, почва же легкая, очень питательная, содержащая известь. В низких же местах, на сырой почве с водонепроницаемой подпочвой плоды поражаются паршей. В Крыму Рояль вырастает очень крупными деревьями, которые ежегодно щедро плодоносят. Плоды готовятся в лежке исподволь, начиная с декабря и по январь, иногда сохраняются до средины [конца] апреля, в исключительных случаях до средины [конца] июня.

4. Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 194-195./ находит этот сорт пригодным лишь для крайнего юга. Его ценные качества: выдающаяся

См. 2-ой лист.

сила роста и урожайность деревьев, а также однообразие плодов, а недостатки - чрезвычайная требовательность деревьев к теплу и почве и посредственный вкус плодов.

Г.А.Каблучко /"Сорта плодовых культур Молдавии", изд. 1953 г., стр. 307-309./ сообщает: " Рояль, или Рояль зимний, - старинный сорт зимней груши... В СССР распространен в Крыму и меньше в южной части Украины. В Молдавии Рояль встречается в центральной и южной части республики, а также в небольших количествах в Приднестровье, главным образом, привитый на айве."

Русачка. Чигиринского уезда, Киевской губ.

Образцы от Горбаня из с. Половковки, б. Помологическое определение: бера.

Величина плодов средняя и меньше. Форма неправильная, грушевидная, прямая, с боков сплюснутая, с округной неребристой верхушкой, на конической части поперечно вдавленная.

Верхняя ямка малая, глубокая, по краям неправильная от борозд, без складок. Листики чашечки длинные, гладкие, звездчатые. Ямка при ножке вдавленная, с складками и с несколькими мясистыми выростами. Ножка тонкая, равная половине высоты плода.

Кожа тусклая, слабо шершавая, одноцветная, светло серовато-зеленая, потом светло серовато-зеленая, потом светло зеленовато-желтая, на солнечной стороне с мутным серо-красным боком. Подкожные точки мелкие, частые, серые, при верхушке и ножке с ржавым налетом.

Мякоть белая, в половине [средине] октября еще зеленоватая, с зрелыми семенами, нежная, тающая, но мало сочная и мало сладкая, сильно вяжущая. Эти недостатки мякоти бывают при преждевременном сборе плодов, которые созревают в конце октября [начале ноября], когда вкус значительно улучшается.

Русселе штутгартский, Rousselet de Stuttgart.

Образцы плодов получены из сада учхоза Уманского с.х. института и от Мирошниченко из Херсонской обл.

Величина плодов средняя и меньше средней. Форма правильная или немного кособокая округло-коническая форма. Верхняя ямка широкая пологая. Чашечка небольшая, полуоткрытая. Нижней ямки почти нет. При ней полукольцевое углубление. Ножка отклонена вбок, средней толщины, длиной в половину высоты плода или даже значительно короче.

Кожа основной окраски желто восково-зеленоватой. На солнечной стороне темно-красный румянец и подкожные точки хорошо заметные, окруженные коричнево-буроватыми пятнами. На теневой стороне подкожные точки и пятна вокруг них зеленовато-буроватые. Около чашечки значительная ржавчина.

Мякоть беловато-желтоватая, довольно сочная, без грануляций, достаточно вкусная, с специфической пряностью.

Семенные гнезда небольшие. Семена черные.

Плоды созревают в Умани [во второй половине августа], в Херсонской области [в конце июля] [первой половине августа] и могут сохраняться около недели.

Хороший десертный сорт, пригодный для сушки и различных заготовок.

Деревья здоровые и нетребовательны к условиям произрастания, достигают средних или даже больших размеров, очень урожайны. В Умани наблюдались деревья 50-70 возраста.

Сорт рекомендуется для южных местностей СССР.

П.М.Сергеев /"Сорта плодовых и ягодных культур", изд. 1953 г., стр. 340./ считает достоинствами сорта: хороший вкус плодов и особенную их пригодность для переработки. Сорт введен в стандартный сортимент по второй и третьей группе в Ростовской области и по третьей в Северо-Осетинской и Кабардинской АССР, Грозненской области и в Краснодарском крае.

Салдин, Saladin.

Образцы плодов получены от Л.П.Симиренко из Городища, Киевской губ.

Величина плодов большая. Форма как бы двояко-коническая, с низким конусом к чашечке и с длинным к ножке; на солнечной стороне более округлая, а на теневой с перехватом; в верхнем конусе заметны ребра.

Верхней ямки почти нет. Чашечка черно-бурая, с короткими открытыми листиками. Нижней ямки совсем нет. Ножка длиной равна половине высоты плода.

Кожа очень толстая, крепкая, долгое время в лежке почти одноцветная, зеленоватая, с желтоватым румянцем, но в январе желтеет и приобретает грязно-желтую окраску, с множеством частых мелких серых подкожных точек, которые и придают грязный оттенок; на солнечной стороне желто-красный румянец, без заметных точек.

Мякоть суховатая, мало сочная, желтоватая, очень плотная, кочерыжная, сладковатая, кислая.

Семена черные.

Плоды более годятся для компота и для нетребовательного десерта.

Сорт с поздне-зимним поспеванием плодов, способных храниться до апреля и несколько далее.

Сапежанка.

Свое название эта груша /Sapieżanka / получила от польского вельможи Сапеги, разведшего этот сорт в Литве, где в настоящее время сохранились местами громадные деревья, посаженные в прошлом XVII столетии. Янковский /Sad i ogród owocowy , стр. 327/ считает Сапежанку синонимом французского сорта - Бергамота крупного летнего /Bergamotte ronde d'été, Runde Sommer Bergamotte/, описанного Флотовым /Illustrirt Handbuch der Obstkunde № 271/ и Лероа /Dictionnaire de pomologie, № 114/; так как начало получение французского сорта относится к концу XVI ст. и началу XVII ст., то можно полагать, что Сапега ввел этот сорт вскоре после его появления. Однако Бергамот круглый летний, хотя и тождествен с Сапежанкой и имеет такой же сильный рост, но деревья его не достигают громадных размеров и молодые побеги даже в Германии страдают от морозов, тогда как Сапежанка вполне вынослива в литовских и польских губерниях. Тем менее можно считать Сапежанку произведшею от Бергамота красного осеннего /Bergamotte rouge /, называемого также золотым и мускусным. форма, вкус мякоти и созревание плодов у него иные, чем у Сапежанки. Бергамот красный в 60-х гг. XIX ст. носил в средней России название арабского или золотого и не смешивался с известною Сапежанкою. В Курляндии [южной Латвии] Сапежанка называется Бергамотом курляндским /Kurlandische Bergamotte/, а местами в средней России ее зовут Бергамотом польским. В Виленской губ. [Литва] и в Петербурге [Ленинграде] она известна под названием Еврейки и Еврейской груши, вероятно потому, что сбывается на рынках евреями. Лучшее ее изменение, отличающее большими вкусными плодами, называется в Минске Головянкою.

Первое описание Сапежанки находится в Вест[нике] сад[оводства] 1889 г., стр. 63, с приложением хромолитографного рисунка нетипичного плода, с сильным коническим заострением к ножке [плодоножке] , и не характерной желтой окраской.

Помол[огическое] опред[еление]: бергамот краснобокий.

Сапежанка 2.

Величина плодов средняя. Высота 2 1/8 - 2 3/8 д. [5,3-6 см], ширина на 1/4 - 3/8 д. [0,3-1 см] более.

Форма в верхней части плоская, с широкой тупой верхушкой, к ножке округло-коническая, с слабым коническим заострением, которое бывает более сильным только у нетипичных плодов, имеющих остро-коническое основание; нижняя часть обыкновенно неравнобокая; поверхность ровная, без ребристых выступов и борозд.

Верхняя ямка широкая, довольно углубленная, правильная, с мелкими бороздками или без них. Чашечка неразвитая, открытая, с малыми короткими черными листиками. Нижняя ямка мелкая, косая, с небольшим однобочным мясистым выростом, несколько отклоняющим ножку, которая немного изогнута и равна 1/2-1/3 высоты плода.

Кожа [кожица] толстая, плотная, гладкая или немного шершавая от ржавых точек, слабо лоснящаяся или тусклая, у полузрелых плодов зеленовато-желтая, у зрелых светло-желтая, иногда восково-белая, на солнечной стороне или на большей части плода с разлитым мутным малиновым румянцем, который иногда очень красив у зрелых плодов. Подкожные точки мелкие, частые, серые или бурые, окруженные розовым ободком, отчего они кажутся розовыми, притом резко выступающими на светло-желтой окраске. От нижней ямки часто идут лучи и пятна тонкого серо-желтого, ржавого налета, рассеянного по всему плоду и придающего ему в зрелости сероватый цвет. Запах фенхельный.

Мякоть белая, мелкозерная, около гнезд мало каменистая и рыхлая, сначала плотная и тяжелая, потом мягкая, полутающая, довольно сочная, сладковатая, у полузрелого плода несколько кисловатая, с вяжущим вкусом, без пряности. Сравнительно с Бессемянкой мякоть грубоватая, менее сочная и не нежная, но более сладковатая. Маслянистой мякоти, свойственной настоящим бергамотам, Сапежанка не имеет, даже в Польских губерниях, где мякоть достигает высоких качеств.

Семенные гнезда небольшие, с узким осевым каналом, окруженные мякотью рыхлой грануляции, более каменистой у чашечки. Подчашечная труб-

ка воронковидная или коническая. Семена толстые, короткие, чернобурые, похожие на яблочные.

По созреванию плодов Сапежанку скорее можно считать поздним летним, нежели осенним сортом. Плоды ее готовятся в литовских губерниях к 13-20 августа [26 августа - 2 сентября] и могут сохраняться до 1/2 [конца] сентября, после чего они мучнеют и мокнут внутри; только при хорошем сохранении в подвале они могут держаться до конца сентября [начала октября], если собраны были незрелыми. В Тамбовской губ. Сапежанка вызревает в начале [средине] сентября и будто бы может сохраняться в подвале два месяца, что для нее сомнительно. Повсюду плоды считаются десертными и ценятся выше прочих груш средней полосы России.

Рост дерева несколько сильнее Бессемянки. Крона шаровидная, с развесистыми кривыми ветвями. Молодые побеги тонкие, светло-бурые, с редкими чечевичками; двулетние побеги серо-бурые, с крупными чечевичками.

В сырое и прохладное лето плоды страдают от *Fusicladium pyrinum* [парши], делаются жесткими и невкусными.

/Это описание сделано М.В.Рытовым в конце XIX ст. (Сад и огород", 1888 г., №2.

В.К.Заец /"Сорта плодовых и ягодных культур", изд. 1953 г., стр. 341-343./пишет, что Сапежанка или Бергамот польский культивируется, главным образом, в Белоруссии и Литве, встречается также в западных областях Украины и в Воронежской, Курской и Орловской областях РСФСР. К достоинствам этого сорта следует отнести хорошую урожайность, мощность и долговечность деревьев и удовлетворительные вкусовые качества плодов. Крупным недостатком сорта является сильная поражаемость плодов паршей. Сапежанка является основным летним сортом в БССР и в южной зоне Воронежской области и допустимым сортом - в южной зоне Курской области, северной зоне Воронежской области и в Великолуцкой области.

Сариновка.

Образцы плодов из Ростова на Дону. Помологическое определение: бергамот.

Величина плодов средняя. Форма бергамотная, гладкая, иногда с продольной бороздкой, делающей форму неправильной. Чашечка открытая с небольшой черноватой ямкой. Ножка тонкая, длинная, кривая, крепкая.

Кожа зеленая, с бледными подкожными точками, в зрелости желтовато-зеленая, сквозная, при жаркой погоде на солнечной стороне едва заметный розовый румянец.

Мякоть плотная, белая, очень сочная и очень сладкая, с сильным запахом.

Семенные гнезда широкие, большие, в которых семена при трясении издают шорох. Семена большие, овальные, светло-бурые.

Плоды созревают в конце июля [начале августа], снимаются впрозелень, когда бывают еще твердыми, чтобы выносили перевозку и могли лежать 1-2 дня.

Деревья с низким штамбом и большой развесистой кроной. Побеги длинные, красно-бурые с сероватыми чечевичками. Листья крупные, долго держатся осенью, дольше других сортов. Цветение бывает позднее. Морозов не боится. Растет и родит одинаково хорошо на сухой и влажной почве, но не ежегодно, а через год или раз в 3 года, но обильно.

Плоды имеют на рынке хороший сбыт, так как ценятся покупателями. Особенно пригодны по своей сладости для сушки, но не для сидра [плодового вина], для которого необходима кислота.

Сары-буздурхан.

Образцы плодов от В. А. Иванова, из Алминской долины, Симферопольского уезда. Помологическое определение: жирная.

Величина плодов средняя. Форма неправильная, коническая, сплюснутая с боков, с плоским основанием, разделена поперек глубокой бороздой ямки; у широко-округлой верхушки с бугристыми, неправильно вырастающими ребрами.

Верхняя ямка очень глубокая, бороздчатая, с широкими сглаженными складками, переходящими на краях в неправильные ребристые подъемы. Листики чашечки малые, бурые, узкие, открытые. Нижняя ямка глубокая, бороздчатая. Ножка согнутая, длиной в половину высоты плода, черноватая.

Кожа нежная, тусклая или слабо лоснящаяся, жирная, одноцветная, сначала светлого зеленовато-желтого цвета, потом лимонно-желтая, часто на солнечной стороне с тонким разлитым желто-розовым румянцем. Подкожные точки темно-зеленые мелкие и серые ржавые, не придающие шероховатости. Запаха нет.

Мякоть желтоватая, в неполной зрелости плотная, колкая, сочная, сладкая, потом губчатая, рыхлая, довольно нежная, с отсвечивающимися белыми сосудистыми пучками, вяжущая. Гнезда малые.

Осенний сорт. Плоды созревают около 15 [в конце] сентября. Плоды годятся для компота, хотя по большой сладости пригодны для десерта.

Вероятно севернее плоды теряют высокую сладость и созревают позднее в лежке. Долго и прочно держатся.

Другой образец с одноцветной лимонно-желтой кожей отличался более длинной формой, острым концом к ножке, неправильным скошенным выростом верхушка была бугристая и ребристая.

Сахарная.

Образцы плодов от Привальневой из Смоленской губ.

Величина плодов средняя. Форма продолговатая, на средине округлая, к тупой верхушке коническая, с неясными ребристыми выступами, к ножке сильно заостренная в более длинный конус с боковым вдавлением.

Верхняя ямка плоская, мелкая, с неясными складками. Чашечка малая, открытая, из коротких черных листиков. Нижняя ямка кольцевая, неправильная, ножка длинная, более половины высоты [плода], у основания при ямке мясистая.

Кожа сухая, тусклая, одноцветная, зеленовато-желтая, на солнечной стороне лимонно-желтая, с частыми серыми подкожными точками, резкими на солнечной стороне. Запаха нет.

Мякоть плотная, суховатая, мало-сочная, репо-образная или кочерыжная, слегка сладковатая, вяжущая.

Компотный осенний сорт. Плоды поспевают во второй половине сентября [начале октября].

И.В.Мичурин в № 33 журнала "Прогрессивное садоводство и огородничество" за 1913 год N 33, стр. 1037-1039, дает описание груши Сахарной, рекомендуя ее для средней России.

Величина плодов менее средней. Форма правильная, грушевидная, при ножке переходит в почти острый конус, с слабо выраженными кольцевыми наплывами. Вдоль всего плода по длине заметен вогнутый шов, разделяющий плод на две равные половины. с открытой чашечкой.

Верхняя ямка довольно широкая, углубленная, Нижней ямки нет. При ножке несколько кольцевых вдавлений. Ножка средней толщины, изогнутая, длиной около половины высоты плода. Хорошо выдерживает сильные ветры.

Кожа матовая, зелено-желтая, с частыми мелкими расплывчатыми серовато-зелеными крапинками.

Мякоть белая, сочная, без грануляций, сладкая, без следов вязкости, приятного вкуса.

Семенные гнезда длинные. Семена удлиненные, коричневые.

Плоды поспевают в начале сентября и сохраняются около двух недель.

См. на обороте:

Деревья вполне выносливые к морозам, весенним ожогам и неприхотливы к почве, прекрасно развиваясь даже на сухой песчаной.

2) Образцы плодов, полученных от Короновского из Смоленской губ.

Величина малая и меньше средней. Форма кубаревидная, на темени плоская, к ножке остро-коническая, без ребер. Верхняя ямка углубленная, с неясными бороздами. Чашечка открытая, с отогнутыми внутрь листиками. Нижней ямки нет или она на очень узком основании в виде углубленной полукольцевой борозды. Ножка тонкая, длиной в 1/2 высоты плода.

Кожа тонкая, слабо жирная, лоснящаяся, светло-зеленая или зеленовато белая, одноцветная. Подкожные точки редкие, мелкие, серые или зеленые; на боку пятнистый налет буроватой ржавчины.

Мякоть белая, суховатая, хрящеватая, плотная, мало сочная, сладковатая и вяжущая, большей частью каменистая.

Плоды созревают во второй половине сентября /первой половине октября/. Могут лежать около двух недель. Пригодны для невзыскательного потребителя в свежем виде и для хозяйственного использования.

Деревья вполне выносливы, долговечны и достаточно урожайны.

Подобрать дополнения по синонимам.

1. Сен-Жермен зимний, Saint-germain d'hiver, Louise bonne ancienne, Yale Louise.

Образцы плодов получены от Варшавского общества садоводства.

Величина плодов средняя и менее. Форма продолговато-грушевидная, кособокая, в верхней части овальная с округлой верхушкой, на которой следы мелких угловатых ребер; от нижней трети высоты к основанию длинная остро-коническая, с косым основанием и без ребристых следов.

Верхняя ямка малая, мелкая, без складок, с серо-бурой ржавчиной. Листики чашечки широкие, короткие, гладкие, отогнутые. Нижней ямки нет. Ножка толстая, кривая, при основании с наростом, равная по длине 1/4 высоты плода.

Кожа тусклая, неровная, мелко-шагреневидная от мелко сетчатой шагреневатости, одноцветная, светло травяно-зеленая, с частыми выдающимися и резкими серыми ржавыми точками, без желтизны и красноты. Пучистая серо-бурая ржавчина только в верхней ямке.

Некоторые образчики меньшей величины, неправильной формы, к верхушке усеченно-конической, с боков сплюснутой, без правильных угловатых ребристых следов, с большой серо-бурой ржавчиной на верхушке, оттуда сплошная ржавчина переходит на бока в мелкие пятна, с более резкими ржавыми подкожными точками.

Мякоть белая, зеленоватая, немного зернистая, но не каменистая, винно кисловатая, с малой сладостью, с слабым вяжущим вкусом, без пряности.

Семена большие, толстые, острые, черно-бурые, созревают в половине [в конце] ноября.

Плоды съедобны в половине [конце] ноября, но лучше вкусом со второй половины ноября [первой половины декабря].

2. Образцы плодов от Варшавского помологического сада.

Величина плодов средняя и менее. Форма продолговатая, овально-коническая, к чашечке с выдающимися округлостями, слабо бороздчатая, к ножке продолговато-коническая, с боковой ножкой [отклоненной вбок].

Верхняя ямка мелкая, с слабыми бороздками. Листики чашечки короткие, открытые. Нижней ямки нет. Ножка тонкая, равная половине высоты плода.

См. на обороте:

Кожа гладкая, слабо блестящая, одноцветная, травяно-зеленая, без красноты, с мелкими серыми точками.

Мякоть белая, около гнезд и чашечке и ножке зернистая, очень сочная, кисловато-сладковатая, без пряности.

Плоды созревают в конце октября [и начале ноября [в начале и средине ноября].

3. Сен-Жермен полосатая, *Saint-germain panache.*

Образцы плодов от Варшавского помологического сада.

Величина плодов средняя и меньше. Форма длинная кривая, тонкая, ребристо-коническая к тупой верхушке и криво-коническая к основанию, с бугристыми выростами по бокам.

Верхняя ямка глубокая с слабыми складками. Чашечка черная, малая, сомкнутая. Нижней ямки нет. Ножка тонкая, короткая.

Кожа сухая, зеленовато-желтая, без румянца и каких-либо полос, с мелкими ржавыми подкожными точками и пятнами на верхушке и боках. Запах не ароматный.

Мякоть белая, сочная, сильно каменистая около чашечки и к ножке, нежная, сладковатая, но плохого качества.

Семена большие, широкие, толстые, острые, темно-бурые.

Плоды созревают в лежке во второй половине декабря [в первой половине января]. Для хорошего хранения требуют возможно более позднего сбора с деревьев, так как, недостаточно выдержанные на деревьям, потом в хранении морщатся и гниют, когда мякоть еще не получила хорошего вкуса.

5. (Сен-Жермен)

Б. и Шабловский /"Провідні сорти плодових культур УССР", изд. 1927 г.

Старый десертный французский сорт, распространенный у нас на юге.

Деревья по большей части сильнорослые, с широко-пирамидальной кроной очень долговечные, в ареале разведения достаточно холодостойки, наилучше растут на питательной, теплой, свежей и дренированной почве, не выносят близких грунтовых вод, [не выносят] закрытых и пониженных местоположений, приносят мелкие плоды на сухой почве; при условиях недостатка влаги обязательно орошение. Плодоношение наступает на 7-8 году, урожайность ежегодная и очень высокая. Плоды прочно держатся на ветках и при созревании не опадают.

См. 2-ой лист:

4. Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 705-720./ описывает сорта Сен-Жермена:

Сен-Жермен, Saint-Germain blanc, Saint-Germain blanc d'automne, Louise bonne, Louise bonne ancienne, Frühe St. Germain, Gute Louise, Duhamel's gute Louise, Warhe Gute Louise, Erlaner Birne, Virgoulese von Ungarn.

Это старый французский сорт, известный в культуре около 300 лет. Его плоды по большей части средней величины. Длинно-яйцевидной формы, с отнесколько изогнутой,
крытой чашечкой, и ножкой умеренной длины или короткой, часто косой, окв зрелости желтовато-зеленая,
руженной мясистым выростом. Кожа тонкая, плотная, бледно-зеленоватая, ароматная,
усеянная многочисленными серыми подкожными точками, а иногда и прожилками, с ржавчиной у чашечки. Мякоть зеленовато-белая, нежная, очень сочная, тающая, винно-сладкая, тонкого десертного вкуса. Деревья дорастают до большей величины и долголетия, прочные, с объемистой кроной, хорошего роста, требуют теплую легкую почву с водопроницаемой подпочвой. Одинаково хорошо удаются на обыкновенных дичках и на айве. Необходима регулярная и достаточно обильная поливка. Плоды снимаются с конца августа по конец сентября [с начала сентября до средины октября], дозревают в лежке с ноября и могут храниться до января и даже позже.

Сен-Жермен зимний, Saint-Germain d'hiver, Poire de St. Germain, Saint-Germain doré, Inconnue de la Fare, Herrmannsbirne, Spadone d'inverno.

Также известен во Франции уже около 300 лет. Давно в культуре в Крыму. Плоды хорошей средней величины или даже большие, слегка бугристые, никогда не повреждаются паршей, с большой открытой чашечкой, находящейся в очень широкой плоской верхней ямке. Ножка средней длины или короткая, косая. Кожа шероховатая, толстая, светло-зеленая с рассеянными мелкими бурыми подкожными точками, иногда у обеих ямок серо-бурая ржавчина; у зрелых кожа зеленовато-желтая, на солнечной стороне золотистая и даже с слабым румянцем. Мякоть зеленовато или желтовато-белая, нежная, тающая, очень сочная, сладкая, с небольшой кислотой. На сильной, питательной и не сухой почве деревья дорастают до большой величины, с пирамидальными кронами, с яркой темно-зеленой блестящей листвой. Урожайность очень щедрая. Сбор пло-

См. на обороте:

дов производится около 10 [23] сентября. Они дозревают в лежке в полови-
не [конце] ноября и сохраняются до марта и несколько далее.

Кроме описанного Зимнего Сен-Жермена существует разновидность с поло-
сатыми плодами, St.-Germain panaché, (почти тех же достоинств, т.е. только с менее сладкой мя-
котью.

Сен-Жермен летний, Saint-Germain d'été, старый французский сорт, из-
вестный с половины XVII века. Встречается в крымских садах. Плоды хоро-
шей средней величины, яйцевидно-удлиненной формы, с открытой чашечкой и
длинной ножкой, прямой или косой, несколько изогнутой. Кожа тонкая, плот-
ная, светло-зеленая, с разбросанными серыми подкожными точками и немно-
гочисленными буро-ржавыми пятнами; в зрелости кожа лимонно-желтая. Мя-
коть белая, сочная, полутающая, достаточно сладкая. Сбор производится
между 5 и 15 [18-28] июля и больше двух недель не могут сохраняться. Де-
ревья развиваются медленно, но с возрастом становятся фильными, с пира-
мидальными кронами, рано вступают в плодоношение, плодоносят потом пра-
вильно и щедро.

6. Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 190-191./ считает до-
стоинствами сорта: здоровье, урожайность и приспособляемость дерева к са-
мым разнообразным условиям и транспортабельность плодов и недостатками:
короткую лежкость и изменчивый вкус плодов.

7. Г.А.Каблучко /"Сорта плодовых культур Молдавии", изд. 1953 г., стр.
294-296./ описывает сорт Жермен с синонимами Кодринская зеленая и Подоль-
ская и говорит, что он довольно широко известен в Молдавии и на Украине
считается местным сортом.

_Серая_летняя,_Картофлянка. В Могилевской губ. зовется также Августовской.

Образцы плодов из сада М.В.Рытова в Горках, Могилевской губ. Помологическое определение: кухонная круглая.

Величина плодов малая. Форма почти круглая, кверху немного суженная, иногда коническая заостренная, с впадиной около ножки, края которой неправильно вырастают в мясистые складки. Бока часто с неровной поверхностью, но без бугров. Верхняя ямка несколько углубленная, плоская с широкими ребристыми складками или бороздами. Чашечка открытая, с короткими листиками. Ножка короткая, длиной в 1 д. [2,5 см], немного отклоненная, редко прямая, без мясистых выростов.

Кожа тусклая, неровная, сухая, в зрелости лимонно-желтого цвета, на солнечной стороне с слабой желто-киноварной легкой окраской, которой часто не бывает, с многими мелкими ржавыми точками, придающими малую шершавость. На теневой стороне перед зрелостью эти точки окружены зеленой окраской, у ножки и чашечки шероховатый серо-бурый налет. Часто точки ржаво-красные.

Мякоть до полного созревания сочная, сладковатая, без пряности, несколько вяжущая, при созревании теряет сочность и скоро делается суховатой и мучнистой, при чем плоды желтеют, не теряя однако совсем сладковатого вкуса.

Плоды созревают к 20 августа [около 1 сентября], неделею после Тонковетки. Держатся только несколько дней.

Дерево растет слабее, чем Тонковетки. Листья овально-продолговатые, с мелкими зубчиками и длинным тонким черешком.

В холодное лето 1894 г. плоды совсем не созрели, даже к 10 [22] сентября, созревание было сильно постепенное, вкус плодов был более сладкий /без всякой кислоты/ и величина их значительно больше. По этому свойству такой сорт выгодно разводить в северных местностях, где другие сорта груш, даже Бессемянка, плохо удаются.

2. Серая осенняя.

а Образцы плодов из Горецкого, Могилевской губ., фруктового сада.

Величина плодов малая. Форма круглая, к ножке с сильным боковым клювовидным выростом, отклоняющим ее бок и иногда продолженным в ребро. Верхняя ямка мелкая, плоская, неправильная, с бороздами и около чашечки с слабыми складками. Ножка в 1 д. [2,5 см], в небольшой ямке.

Кожа тусклая, зеленовато-желтая, в зрелости светло-желтая, на солнечной стороне лимонно-желтая с слабой киноварной полосатостью, на всем плоде с тонкой ржавчиной, придающей коже небольшую шероховатость. Подкожные точки очень мелкие.

Мякоть рыхлая, мало-сочная, сильно вяжущая и мало-сладкая, у незрелых зеленых более сладкая.

Плоды готовятся в конце августа [начале сентября] после Картофлянки, которая превосходит ее по величине, вкусу и урожайности. Ни по величине, ни по вкусу плодов, а также урожайности не заслуживает разведения. Но в неурожайный 1893 год, когда плоды покрывались у других сортов груш пятнами и трескались этот сорт был самым урожайным и плоды не трескались. Очень плохой предшедуррь.

Серая /Шарая/ (с. осенняя).

15 Образцы плодов от К.Д.Горбаня, из с. Головковки, Чигиринского уезда, Киевской губ. Местное название также Ивановская.

Величина плодов малая. Форма кубаревидная, овальная с конусом к ножке, весьма правильная, без ребер и бугров. Верхняя ямка малая, мелкая, с следами складок. Листики чашечки короткие, гладкие, открытые. Тика при ножке мало вдавленная, ровная, с слабым боковым выростом. Ножка тонкая, длиной немного более половины высоты плода.

Кожа тусклая, светло-желтая, при созревании охряно-желтая, одноцветная, с мелкими незаметными точками и слабым буроватым налетом около верхушки и ножки.

Мякоть белая, тающая, нежная, сладкая, не вяжущая.

Семена короткие, толстые, черно-бурые.

Плоды поспевают в конце сентября [первой половине октября], чрезвычайно вкусные, ароматные. Перезревают в лежке в конце октября [первой половине ноября].

Дерево штамбовое, очень плодородное, выдерживает зимы.

Сорт заслуживает распространения. Он близок к Бере лифляндской, но кожа плодов очень желтая и охряного цвета.

Серая. (С. осенняя.)

2. Образцы плодов от Гудкова из Смоленска. Помологическое определение: бергамот серый.

Величина плодов малая. Форма округло-коническая, у верхушке плоская и с слабым ребровидным выступом. Верхняя ямка углубленная, с сглаженными складками. Чашечка открытая, с короткими сухими серыми листиками. Нижняя ямка косая, неправильная, бороздчатая. Ножка тонкая, длиной в половину высоты плода.

Кожа толстая, плотная, тусклая, без всякого блеска, шероховатая, желтовато-зеленая, вся покрытая тонким буроватым ржавым налетом. Подкожных точек нет.

Мякоть 19 сентября [1 октября] мягкая, зеленоватая, сладковатая, без кислоты и пряности, около гнезд каменистая и еще более около чашечки.

Семена мелкие, черные.

Осенний сорт. Плоды поспевают в половине [конце] сентября. В начале [средине] октября, хотя снаружи плоды сохраняют нормальный цвет кожи и даже имеют вид зеленых и незрелых, но мякоть внутри буреет и портится.

Сорт может служить для нетребовательных потребителей как десертный и заслуживает разведения.

Смолянка.

Образцы плодов от Кусцинского из Витебской губ. Помологическое определение: кухонная круглая.

Величина плодов малая. Форма бергамотная, плоская к чашечке и округлая или несколько расширенная к ножке. В основной части с слабыми узкими ребрами или ребровыми складками. Верхушка плоская, широкая.

Верхняя ямка широкая, мелкая, с широкими ребристыми складками. Листики чашечки короткие, широкие, открытые. Ямка при ножке мелкая, с небольшим бугристым выростом, не отклоняющим однако ножки. Ножка толстая, короткая.

Кожа тусклая, на румянце блестящая, светло-желтая, на солнечной стороне с красивым разлитым желтовато-малиновым румянцем, с частыми серо-желтыми ржавыми точками. Поверхность шагреневидная.

Мякоть белая, под кожей желтоватая, плотная, но хрупкая, сладковатая, безвкусная, хотя и сочная, с большим остатком травянистой мякоти, которую нельзя есть.

Плоды созревают в начале [средине] сентября и держатся до половины [конца] сентября.

В Бобруйске, Минской губ. этот сорт лучше вызревает, чем в Витебской и имеет сладкую мякоть с смоляным привкусом, от которого произошло название сорта.

Приходилось наблюдать, что при близкой посадке деревцов груши, в частности сорта Тонковетки, когда корни груш соприкасались, при своем разрастании, с корневыми системами ели, образующей живую изгородь, плоды груши Тонковетки были с очень сильным смолистым привкусом. Можно полагать, что подобное близкое соседство деревьев груши и хвойной породы и было причиной получения груши "Смолянки". Вышеописанное явление я наблюдал в садике врача М.О.Гедеонова в г.Горках, Могилевской губ. при его квартире в Земледельческом /с.х./ училище. С.М.Рытов

Спасовка.

Образцы плодов от И.К.Мороза /ст. Бочейково, Витебской губ./.

Величина плодов средняя. Форма округлая, к ножке немного суженная; здесь образуется кособокая ямка с ребристыми мясистыми выростами. Верхняя ямка углубленная с бороздками и широкими ребристыми складками. Чашечка открытая, гладкая, из коротких листиков. На плоской верхушке ребристые неровные выступы и борозды. Бока ровные, Ножка толстая, длинная.

Кожа толстая, крепкая, тусклая, не жирная, немного шероховатая, травяно-зеленая, без желтизны, иногда даже темно-зеленая, на солнечной стороне с мутноватыми полосами или без них, с множеством частых серых пятен, без аромата. На верхушке серые ржавые точки.

Мякоть белая, очень сочная, нежная, сладковатая, слизеватая, напоминающая мякоть боярышника, без всякой кислоты и аромата, около чашечки каменистая, около гнезд менее зернистая.

Плоды 6 [19] августа совершенно зрелые, несмотря на зеленый цвет кожицы. Семена также зрелые, большие, толстые, длинные, бурые.

Очень хороший летний сорт для севера, поспевающий вместе с Грушовкой московской. Слизеватый вкус ухудшает свойства мякоти и препятствует большому распространению, хотя в это время очень мало зрелых груш такой величины.

Листья овальные, с длинными (тонкими) черешками, мелкозубчатые.

Тонковетка, в Белоруссии называется Ильинкой, которая является другим сортом. Старинный русский сорт народной селекции.

Образцы плодов из сада М.В.Рытова /г.Горки, Могилевской губ./. Помологическое определение: кухонная круглая.

Величина плодов менее средней и малая. Форма в верхней части овально коническая, с тупой усеченной верхушкой, иногда на верхушке с слабыми ребрами, к основанию неравнобоко-коническая, низко заостренная. Верхняя ямка малая или ее нет, с сглаженными ребристыми складками. Чашечка открытая, с длинными сероватыми приподнятыми листиками, с широким зевом. Нижней ямки нет или она в виде вдавлений на стороне против мясистого выроста с кольцевой складкой. Ножка очень длинная, в 1 - 1 1/2 раза от длины плода, тонкая, дуго или крючковидная.

Кожа гладкая, тонкая, не жирная, слабо блестящая, у полузрелого вкусного плода светло-зеленая с полосами или полосатым слабым киноварно-красным или желто-красным румянцем, у зрелого охряно лимонно-желтого цвета и с сильным румянцем. Подкожные точки очень мелкие, не заметные, более видны у основания, серые, на румянце беловатые, окруженные окраской, отчего и происходит весь румянец. Запах иногда смолистый [, когда вблизи находятся хвойные деревья].

Мякоть белая, мало-сочная, вяжущая, кисловато-сладкая, скоро мучнеет, когда желтеют плоды. Каменистая часть около чашечки, около гнезд зернистая.

Плоды обычно созревают к 15 августа [в конце августа], но в 1897 г. зрелые уже были 24 июля [в начале августа]. В 1899 г. в сырое и прохладное лето плоды едва начали созревать 15 августа [в конце августа], но были негодны для еды; только червивые [, пораженные плодожоркой] немного пожелтели и были годны, но мало-сладки, большая часть плодов была с пятнами грибка парши Fusicladium и с трещинами от обилия влаги.

Плоды широко используются в свежем виде, а также для сушки и мариования.

VC 2-ой с/х Деревья невзыскательны к почве и уходу, бывают высотой в 3-4 сажени

См. на обороте:

[6,4-8,5 м] вышины, доживают до 100-150 лет и приносят, в таком возрасте, хотя не ежегодно большой урожай плодов.

3. Разновидностью Тонковетки является Краснобочка, распространенная в садах Поволжья и в частности Саратовской губ.

Величина плодов средняя или меньше средней величины. Форма округло-овальная, правильная, с ровной поверхностью. Верхней ямки почти нет. Листики чашечки большие. При чашечке заметные бугорки. Нижней ямки также нет, но бывает небольшое круговое вдавление около ножки, которая по длине равняется высоте плода, тонкая, изогнутая.

Кожа основного зеленовато-желтого цвета с сильным кармино-красным румянцем на солнечной стороне, среди которого более темные полосы и пятна. Последние около подкожных точек. Ножка на солнечной стороне коричневого цвета, на остальных как кожа плода.

Мякоть светло-желтая, ароматная, в недозрелом состоянии вяжущая, к полной зрелости этот привкус почти пропадает, сочная, сладкая, с небольшой кислотой. Семена обычно в количестве 10-12, светло-коричневые, средней величины.

Плоды поспевают в Саратове в половине [конце] июля. Спелые плоды могут храниться несколько дней. Необходимо производить съемку впрозелень.

Листья малой величины, с короткими пластинками, светло-зеленые.

Деревья сильного роста и, несмотря на плохой уход, хорошо плодоносят.

Это один из самых ранних и любимых в Поволжьи сортов груш. Плоды, кроме использования в свежем виде, идут на сушку и техническую переработку.

Деревья сильнорослые. В молодости основные сучья кроны растут под острым углом, но потом отклоняются, вступают в плодоношение на 8-10 году по посадке в сад. Морозостойки и хорошо плодоносят.

2. Г.А. Рубцов /"Груша", 2-ое изд., 1937 г., стр. 159./ характеризует сорт: "Рост сильный. Самый выносливый сорт, идущий дальше всех на север. По вкусовым качествам должен быть отнесен к хозяйственным сортам. Годится для сушки".

Триумф Жодуани. *Triumphe de Jodoigne.* Сорт выведен в Бельгии в 1831 г. и широко потом распространен.

Образцы плодов получены от Павильчуса из Сувалок.

Величина плодов более средней. Форма продолговатая, грушевидная, довольно правильная, к верхушке овальная, к ножке переходящая довольно резко в тонкий прямой конус, по бокам при верхушке с слабо выдающимися округлостями.

Верхняя ямка углубленная, по краям неровная, без складок. Листики чашечки длинные, звездчатые, открытые. Нижняя ямка с кольцевым вдавлением и боковым выростом. Ножка тонкая, почти прямая, длиной менее половины высоты плода.

Кожа гладкая, слабо блестящая, светло-зеленая, на солнечной стороне с легкой мутной красностой, с частыми серыми подкожными точками, на верхушке и менее по бокам и около ножки с сетчатыми или лучистыми тонкими ржавыми пятнами.

Мякоть белая, нежная, маслянистая, без всякой зернистости и каменистости, сладкая, с тонкой пряностью.

Плоды созревают в конце сентября [начале октября], в конце октября [в начале ноября] в гнездах мякоть становится бурой и снаружи мучнистой.

Образцы плодов, полученные от П.П.Симиренко из Городища, Киевской г.

Величина плодов большая. Форма в верхней половине плоско-шаровидная, в нижней коническая, с сравнительно небольшим туповато-узким концом при ножке, вообще правильная, прямая.

Верхняя ямка широкая, с сглаженными бороздами, углубленная, с открытой чашечкой из коротких листиков. Нижняя ямка с бороздами. Ножка длиной в 1/3 высоты плода, с мясистым выростом у основания.

Кожа сухая, слабо блестящая, тонкая, нежная, беловато-зеленоватая, одноцветная, с резкими серо-бурыми ржавыми подкожными точками и на верхней части, особенно около чашечки с такими же пятнами.

Мякоть белая, тающая, сливочная, сладкая, ароматная, превосходного вкуса, немного вяжущая.

См. на обороте:

Семена не развит.

Плоды созревают в лежке во второй половине октября [начале ноября], оставаясь довольно крепкими, вкусом нисколько не уступают Дюшессу д'Ангулем.

Превосходный десертный сорт.

2. Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 724-728./ пишет, что деревья смолоду имеют живой и сильный рост и впоследствии образуют редкую, раскидистую и неправильную крону, с несколько отвисающими ветвями. В Киевской губ. они очень чувствительны к холоду, особенно в молодом возрасте. Урожайность удовлетворительная и правильная. Плоды начинают поспевать с половины [конца] сентября и держатся около месяца. Недостатком сорта является так называемая "раскосость" плодов, т.е. они имеют разную величину и форму.

3. Г.А.Рубцов /"Груша", изд. 2-ое, 1937 г., стр. 175-176./пишет, что наиболее характерны для сорта: крупная величина, форма, бугристость, интенсивная окраска плодов; кривые и изогнутые побеги; крупные, кожистые, блестящие листья. Растет на груше и вайе.

Фиговая. Feigenbirne.

1. Образцы плодов получены от Варшавского помологического сада.

Величина плодов средняя. Форма продолговатая или почти длинная, в верхушке округлая, к основанию заостренная в высокий конус, с сдавленно-поперечной поверхностью при переходе широкой части в коническую, с косым основанием и округлой верхушкой, с сглаженными узкими угловатыми ребрами. По наружному виду эта груша напоминает Сен-Жермен зимний.

Верхняя ямка малая, мелкая, слабо бороздчатая, без складок. Листики чашечки короткие, широкие, звездчато-открытые. Нижней ямки нет или она косая, слабо вдавленная, но с кривым мясистым боковым выростом. Ножка тонкая, боковая, изогнутая, равная по длине половине высоты плода.

Кожа гусклая, сетчато-шагреневатая, одноцветная, светло травяно-зеленого цвета, без желтизны и красноты, с частыми неправильными слабыми серыми ржавыми подкожными точками. В верхней ямке небольшая буроватая ржавчина, в нижней серо-бурая.

Мякоть белая, под кожей зеленоватая, около гнезд, к чашечке и ножке каменистая, зернистая, плотная, рыхлая, сладковатая, в половине [конца] ноября мало-сочная.

2. Оттуда же образцы, представленные на Нижегородскую с.х. и промышленную выставку 1896 года, имели форму кособокую, кривую, у верхушки широкую, плоско-туповатую и с слабыми ребрами, к основанию косо-коническую сдавленную дугой с теневой стороне.

Верхняя ямка широкая, мелкая, с сглаженными ребристыми складками. Чашечка широкая. Листики ее черные, звездчатые. Нижняя ямка слабо вдавленная, с боков с мясистыми выростами, отклоняющими ножку.

Кожа плотная, толстая, сухая, мелко-шагреневатая, одноцветная, зеленовато-желтая /25 октября [7 ноября] / или почти лимонно-желтая, испещренная очень частыми мелкими бурыми подкожными точками и на солнечной стороне слабый мутно-красноватый румянец. На верхней ямке черно-бурая, при нижней бурая ржавчина.

Мякоть 25 октября [7 ноября] желтоватая, сильно каменистая около ча-

См. на обороте.

шечки, зернистая около гнезд, полутающая, волокнистая, не очень сочная, репного сладковатого или слизеватого вкуса.

Семена длинные, толстые, острые, чёрно-бурые.

Не десертный сорт. Плоды пригодны для переработки.

_Филонка.

1. Образцы плодов из Полтавской губ. Помологическое определение: полубера.

Величина плодов малая. Форма при верхушке овальная, к ножке вытянутая в длинный и острый конус, очень правильная, без ребер и бугров. Верхняя ямка мелкая, с небольшими складками. Листики чашечки очень большие, длинные, открытые. Ямка при ножке косая, морщинистая. Ножка тонкая, равная половине высоты плода.

Кожа тусклая, светло-зеленая, на солнечной стороне желтоватая, с многими мелкими серыми подкожными точками, местами покрытая сетчатыми тонко-слойными светло-бурыми или желтоватыми ржавыми пятнами.

Мякоть белая, полутающая, с каменистостью около чашечки, сладковатая,

Семена толстые, длинные, светло-бурые.

Осенний сорт с плодами, поспевающими в конце сентября [начале октября], пригодными для свежего использования и для заготовок.

2. Под названием Филонка получены плоды от Р.П.Трипольского из с. Должек, Зеньковского у., Полтавской губ.

Величина плодов средняя. Форма продолговатая, к верхушке округлая, к основанию вытянутая, коническая, без ребер и бугров. Верхняя ямка немного углубленная, ровная, без складок. Чашечка большая, черно-сажистая, открытая. Нижняя ямка кольцевидная, окруженная морщинистыми мясистыми выростами вблизи длинной тонкой ножки, равной высоте плода.

Кожа тусклая, толстая, зеленовато-желтая, одноцветная, немного жирная, с частыми мелкими зелеными подкожными точками, на верхней ямке с бурой ржавчиной.

Мякоть белая, полутающая, сладковатая, не вяжущая, в полной зрелости 20 сентября [в начале октября] посредственного десертного достоинства.

3. В книге Б.И.Шабловского "Провідні сорти плодових культур УРСР", изд. 1937 г. Филонивка и Шумка считаются синонимами Александровки, но выше помещенное описание относится к сорту, который не похож на Александровку

Форелевая, Forellenbirne, Forelle, Fruitee. Старый немецкий сорт, известный в культуре с начала XIX века.

Образцы плодов получены от Варшавского помологического сада.

Величина плодов средняя и менее. Форма длинная, грушевидная, кособокая, кривая, к верхушке овальная, суженная и на 2/3 остро-коническая, с поперечным вдавлением, с узким основанием, без ребер, только на верхушке плода с 1-2 слабыми бороздами.

Верхняя ямка узкая, малая, мелкая, без складок, с слабыми бороздками. Листики чашечки короткие, черно-бурые, открытые. Нижняя ямка с кольцевым вдавлением и малыми бороздами. Ножка тонкая, кривая, короткая.

Кожа толстая, нежная, несколько жирная, на солнечной стороне блестящая, мелко-пагреневатая, травяно-зеленая, при созревании желтоватая, на солнечной стороне с мутным кровяно-красным продольным румянцем, испещренная очень частыми ржавыми подкожными точками - серыми с розовым ободком. Верхняя ямка с слабым буроватым налетом; нижняя гладкая, от точек слабо шероховатая.

Мякоть около чашечки сильно каменистая и около гнезд зернистая, кислая, полутающая, сладкая, мало сочная и немного отзывается кочерыжкой, но это, вероятно, от неполной зрелости плодов.

Семена толстые, темно-бурые.

Плоды созревают в начале [средине] октября, используются в течение месяца и затем уже негодны для еди вследствие перезревания и загнивания.

Сорт заслуживающий разведения.

Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 729-731./ говорит, что деревья характеризуются живым и сильным ростом. Они с довольно высокой и жидковатой кроной, не любят сильной обрезки и нуждаются в глубокой, сильной и сырой почве, отличаются долговечностью. Рано начинают плодоносить, правильно родят, особенно с возрастом. В молодости чувствительны к холоду, почему требуют защищенное положение, важное также потому, что плоды страдают от ветра. Прививки на айве удаются одинаково хорошо, как и на обыкновенных подвоях. Сбор плодов в Крыму в конце августа [начале сентября], хранение около месяца,

См. на обороте.

но плоды более северного происхождения созревают в лежке в ноябре и иног
да сохраняются до средины [конца] декабря.

Кроме вышеописанного сорта Л.П.Симиренко приводит форель зимнюю, Fruité d'hiver, Winter Forellenbirne, Nordhauser Winter-Forellenbirne, которая выведена в Германии около ста лет тому назад.

Величина плодов средняя; более типична вытянутая грушевидная форма.

Кожа при созревании из зеленой становится лимонно-желтой, с расбросанными повсюду ржавыми пятнышками, с румянцем на солнечной стороне.

Мякоть довольно плотная, мягкая, сочная, сладкая, с приятным привкусом.

Плоды созревают в лежке во второй половине декабря [в начале января].

Деревья имеют средне-сильный рост, здоровые и холодостойкие, с редкой пирамидальной кроной. Урожайность ранняя и удовлетворительная. Прививки на айве удаются.

309.

V

Новая Гульвия, Nouvelle Fulvie; Fulvie Grégoire.

1. Образцы плодов получены от Варшавского помологического сада.

Величина плодов более средней. Форма продолговатая, грушевидная, к верхушке округлая с выдающимися угловатыми ребрами, к ножке с вдавлением, переходящим в острый косой конус.

Верхняя ямка малая, мелкая, без складок. Листики чашечки гладкие, полуоткрытые. Ножка с мясистыми наростами, из которых один больший. На конической части продолговатые борозды. Ножка тонкая, прямая, отогнутая в сторону, длиной в половину или несколько менее высоты плода.

Кожа тусклая, светло-желтая, одноцветная, с мелкими частыми серыми подкожными точками.

Мякоть белая, желтоватая, без зерен и гранулящий, маслянистая, тающая, не вяжущая, превосходного вкуса.

Семена длинные, острые, бурые.

Плоды созревают в конце сентября начале октября и держатся до конца октября начала ноября .

2. Образцы плодов оттуда же на Нижегородской с.х. и промышленной выстав-ке 1896 года.

Величина плодов средняя, неправильная грушевидная, с ребристой верхней частью, где на солнечной стороне (обко) ребро вырастает наиболее, другие менее слабо выдающиеся, к основанию сплюснуто-коническая, с перехватом.

Верхняя ямка широкая, углубленная, с тонкими вдающимися бороздами, образующими низкие широкие складки. Чашечка большая, неправильная. Ее листики короткие, черные, гладкие, полуоткрытые. Бока неправильно угловатые. Нижней ямки нет, с полукольцевой перетяжкой. Ножка тонкая, прямая отклоненная в сторону, длиной около половины высоты плода.

Кожа тонкая, плотная, сухая, слабо лоснящаяся, на теневой стороне шагреневатая, желтовато-зеленая, в зрелости светло-желтая с слабой зеленоватостью, на солнечному боку с малыми мутно-красноватыми пятнами. У основания слабая лучистая бурая ржавчина и местами по бокам широкие, частые, серо-бурые и бурые пятна. Запаха нет.

См. на обороте:

Мякоть белая, около чашечки каменистая, около гнезд зернистая, кожая, сочная, винно-кисловатая и сахаристая, полутающая, не тающая, с слабой грушевой пряностью. Недостаток в небольшой грубости мякоти, сосудистые пучки желтоватые.

Семена средней величины, острые, темно-бурые.

Плоды хорошего десертного качества

Н. Буренков в журнале "Плодоводство" за 1898 г., стр. 703-705 пишет, что плоды описываемого сорта очень лежки, созревают медленно, поспевают в ноябре и сохраняются до февраля. Деревья плодоносят ежегодны и сильно урожайны, но растут не сильно и образуют неправильную крону, с растопыренными и часть отвислыми ветками, требуется внимательная обрезка. Деревья в Киеве нестрадают от морозов. Автор горячо рекомендует разведение данного сорта, плоды которого очень хороши по вкусу и красоте. Автор рекомендует этот сорт не смешивать с Léon Grégoire , который не советует разводить.

Тунтовая.

1. Образцы плодов из Горецкого, Могилевской губ., фруктового сада. Помологическое определение: кухонная крупная.

Величина плодов большая и средняя. Форма неправильная низко-коническая или широкая, слабо заостренная к ножке, вблизи которой всегда очень большой кособокий вырост, сильно отклоняющий ножку вбок. Ножка около 1 д. [2,5 см] длины, толстая, зеленая, как бы втиснута в неправильную ямку с мелкими радиальными морщинками. От ямки на бока и основание идут довольно сильные борозды, делающие бока неправильно округлыми. Основани неровное, безобразно неправильное от уродливо вырастающих широких расходящихся чашечных ребер, разделенных глубокими разной глубины различными бороздами. Эти неправильнне ребра в виде уродливых бугристых выростов. Чашечка сдавлена и стиснута, так что торчат 2-3 листика. Такая верхушка очень характерна - достаточно на нее посмотреть, чтобы узнать эту грушу.

Кожа тусклая, сухая, матовая, травяно-зеленая, сначала темно-зеленая, потом светлее, даже несколько желтоватая, на солнечной стороне с сургучно-красным или киноварным пятнистым румянцем и многими темно-зелеными точками с мелким черным пунктом ржавых точек. При чашечке и на основании тонкая буроватая слабо першавая ржавчина, которая на боках делается пятнистой, а выше переходит в отдельные ржавые точки. Вдковой румянец иногда очень сильный.

Мякоть белая, немного желтоватая, очень сочная, нежная, грубо каменистая около гнезд, особенно у чашечки, вяжущая, не тающая, но сладкого и приятного вкуса, без пряности или с малою пряностью.

Плоды созревают в начале [средине] сентября и лежат две недели и более. Сорт с плодами 2-3 качества. Большой плод 54 золотника [230 г] весом.

Деревья высокие с длинными частыми, почти голенастыми сучьями, раскидисто-пирамидальной кроной. Штамбы сильно страдают от огневицы, которая переходит на сучья, но деревья долго держатся живыми. Рост очень сильный, побеги толстые, бурые, гладкие. Лучше этот сорт прививать в крону

См. на обороте:

и на слабо-рослых дичках.

Листья большие, светло-зеленые, гладкие, крупные, цельнокрайние, с очень длинными белыми черешками.

Листья и длинные сучья характерны.

Вообще деревья мало-плодны и требуют правильной обрезки для [хорошего] плодоношения.

В суровую зиму 1893 г. только несколько ветвей замерзли на концах, молодые же сучья покрылись поперечными морщинами от огневицы и потом вдоль их засыхала кора. Небходимо сильное обмазывание [поврежденных мест].

Цветет вместе с обыкновенными сортами.

+ Под названием Фунтовка, Funtowka образцы плодов получены от В.А.Завады из Ченстохова, Петраковской губ. Помологическое определение: кухонная длинная.

Величина плодов большая. Форма сплюснутая с боков, продолговатая, к верхушке широкая, усеченно-коническая, к ножке заостренно-коническая, с косым основанием.

Верхняя ямка широкая, глубокая, косая, неправильная, с широкими, глубокими сглаженными бороздами, идущими от верхушки на бока, без складок. Листики чашечки мелкие, сомкнутые. Нижняя ямка вдавленная, с огромным боковым мясистым выростом. Ножка тонкая, равная 1/4 высоты плода.

Кожа тусклая, немного шершавая от точек, светло-желтая, на солнечной стороне с легкою красноватой желтизной, с многими резкими частыми ржавыми точками. На верхушке тонкие ржавые полоски буроватого цвета расходящиеся от ямки. Запаха нет.

Мякоть белая, кочерыжная, вяжущая, сладковатая, по вкусу походит на Пулю астраханскую.

Плоды созревают в начале [средине] ноября, отлично держатся до половины [конца] ноября. Пригодны для сушки.

[Сорт совсем другой, чем вышеописанный.]

Ша-исмати туркестанская.

Образцы плодов из Туркестана.

Величина плодов большая. Форма неправильная, кособокая, усеченно-коническая. Чашечная ямка сливается с подчашечной трубкой, образуя общее углубление, расширенное вверх ворончато, на краях с ребрами, которые идут по всему плоду до ножки. Нижняя ямка менее глубокая. Ножка толстая, выходящая из ямки. Кожа светло-зеленая, в зрелости желтоватая, жирная, с мелкими буграми и ямками, с густыми темно-бурыми подкожными точками, гладкая.

Мякоть белая, плотная, колющаяся и хрустящая на зубах, грубо зернистая, очень сочная, сладкая, с рассеянными каменистыми частицами, которые около гнезд образуют хрещеватое скопление.

Осевая полость, как у Pirus sinensis и Pirus Pashia ; отсутствие чашечки и хрустящая, очень сочная и вкусная мякоть составляют выдающееся отличие.

Сорт сходный с Passe-Crassane. Существенным отличием от европейских сортов является опадающая чашечка, которая указывает на происхождение от гималайских родичей /Pirus Pashia, p. betulifolia/.

Плоды могут сохраняться в холодном подвале до января.

Зимний сорт. Плоды пригодны для использования в свежем виде и для заготовок.

Ша-ислами ходжентская. Название дано по имени оригинатора в г. Ходженте.

Образцы плодов получены из Ходжентского уезда, Самаркандской обл.

Величина плодов средняя или более. Форма довольно правильная. Плодоножка длинная, тонкая, при хранении засыхающая и чернеющая.

Кожа желтая, одноцветная, с мелко-ржавыми пятнами от трения о ветви и листья, на ощупь жирная.

Мякоть не тающая, но мягкая, кисловато-сладкая, с запахом сафьяна.

Плоды лежат до мая и мякоть не делается мучнистой. Используются в качестве компотных. Очень прочны в хранении и бывают на рынке, когда сойдут европейские груши.

См. на обороте:

Деревья с высокими штамбами, пирамидальными кронами. Побеги толстые, с крупными листовыми почками, бурые, с белыми чечевичками. Плодовые почки толще, чем у европейских груш. Листья большие.

В Ходжентском уезде, где вместе с подобными грушами служит для угощения /достархана/ носит также общее название "Нак".

Шангирей красный.

Образцы плодов от И.А.Селинова /Крым, долина Биюк-Карасу, Экономия Мушаш/. Помологическое определение: Полубера.

Величина плодов средняя. Форма яйцевидная, к ножке конически заостренная, с мясистым от нее боковым выростом, переходящим на нее и ее отклоняя, с образованием полукольцевой борозды, с тупой верхушкой, без всяких ребер, правильная.

Верхняя ямка малая, мелкая, правильная, как бы выточенная. Листики чашечки малые, бурые, скрученные и немного открывающие трубку. Нижней ямки нет и вместо нее однобочные выросты мякоти. Ножка дуговидная, косая.

Кожа тонкая, плотная, местами блестящая, не жирная, местами шероховатая от тонкого ржавого налета. Основного светло-зеленого цвета, на большей части с желто-красным разлитым румянцем, который немного затемнен желто-серым ржавым налетом на всем почти плоде. Подкожные точки мелкие, частые, ржавые, серые. Запах мускатный. Обычно кожа не поражается парше

Мякоть белая, немного желтоватая, мягкая, полутающая, нежная, сочная, кисловато-сладкая, вяжущая, с мускатной пряностью.

Плоды созревают около 1 сентября [в половине] сентября , перезревает около 15 [в конце] сентября, сохраняются до половины [конца] сентября. Второго десертного качества.

Крымский татарский сорт.

V

Шарль Эрнест, Charles Ernest. Сорт выведен во Франции в 1874г

Образцы плодов от Янковского из Варшавы: ✻ ✻ † ; ХП - 1.

Величина плодов большая. Форма широкая, грушевидная, при верхушке широко-округлая, слабо-ребристая и бороздчатая, с 1/2 коническим сужением и вдавленная, с округло-широкой верхушкой и косым суженным основанием.

Верхняя ямка большая, широкая, глубокая, с неровными бороздчатыми краями. Листики чашечки узкие, шерстистые, пригнутые и мало открытые. Нижняя ямка с кольцевым углублением и мясистым выростом, отклоняющим в сторону короткую кривую ножку средней толщины, бурую.

Кожа тусклая, толстая, крепкая, на солнечной стороне более гладкая и несколько блестящая, с теневой - мелко-шагреневатая и от этого немного шероховатая, красивого лимонно-желтого цвета, на солнечной стороне с красивым разлитым желто-розовым румянцем, простертым вдоль. Подкожные точки бурые, мелкие, редкие, мало-заметные. У ножки лучистая бурая ржавчина, на верхушке тонкий ржавый покров. Запаха нет.

Мякоть белая, каменистая около чашечки и зернистая вблизи гнезд, с просвечивающимися белыми сосудистыми пучками, не сливочная, но нежная, тающая, сладкая, очень приятного вкуса, мало-вяжущая, с слабой пряностью.

Семена средней величины, толстые, острые, черные.

Плоды созревают около 25 сентября [6 октября], но могут сохраняться далее при хороших условиях хранения в декабре и даже в январе, до средины этого месяца.

По Янковскому величина плодов средняя или большая, поверхность бугристая, Кожа желтая с румянцем. Плоды снимаются в начале [средине] октября. Деревья умеренного роста образуют высокую опрокинутую пирамидальную крону с густыми ветвями, как ни у одного из известных сортов груш. Листья темные. Плодоношение обильное, но поздно начинает плодоносить. Морозы выдерживают хорошо, но в молодом возрасте от них страдают. Сорт торговый, хороший столовый, отчасти кухонный.

См. на обороте:

1. Образцы от Кончевского из Люблинской губ.

Величина плодов более средней. Форма правильно шаровидная на половине высоты к верхушке и правильно суженная конически к ножке, имеющей однако боковое положение. На шаровидной верхушке слабые узкие борозды. Верхняя ямка мелкая, с бороздами и слабыми широкими ребристыми складками. Листики чашечки короткие, открытые. Ямка при ножке мелкая, с неровными слабыми выростами. Ножка толстая, равная 1/4 высоты плода.

Кожа гладкая, слабо блестящая, немного местами бороздчатая, светло-желтая, на солнечной стороне с слабым желто-красноватым разлитым румянцем. Подкожные точки мало-заметные и только местами серо-зеленые. У основания сплошной тонкий ржавый буроватый налет и по бокам несколько буроватых ржавых тонких пятен.

Мякоть белая, немного желтоватая, каменистая около чашечки и от ножки к гнездам, очень сочная, сахаристая, тающая, с небольшой приятной пряностью.

Семена небольшие, толстые, черные.

Плоды созревают в начале [средине] октября и отлично держатся до половины зимы, будучи вполне зрелыми, крепкими и хорошего вкуса.

2. Образцы от Л.П.Симиренко из Городища, Киевской губ.

Величина плодов большая. Форма правильная, грушевидная, округлая в верхней половине и коническая в нижней; на верхушке немного неровная от слабых борозд и сглаженных ребер; этих продольных борозд несколько и они характерные. Верхняя ямка немного углубленная, с бороздами, без ребер. Чашечка открытая с бурыми листиками. Нижняя ямка косая и от нее идут борозды. Ножка короткая, довольно толстая, почти прямая.

Кожа тусклая, тонкая, нежная, одноцветная, лимонно-желтая, с очень мелкими серовато-ржавыми подкожными точками, мало заметными; у чашечки лучистость ржаво серовато-желтая.

Мякоть белая, тающая, сливочная, без зернистости, очень сладкая, превосходного вкуса как у Тюмессов.

Плоды созревают и хранятся как в предыдущем описании.

См. 2-ой лист.

3 Л.П.Симиренко /"Крымское промышленное плодоводство", изд. 1912 г., стр. 736-738./ пишет, что деревья отличаются умеренно сильным ростом, образуют довольно высоко-пирамидальную и негустую крону, требуют глубокую теплую и питательную почву, рано начинают плодоносить, родят правильно и удовлетворительно. Хорошо удаются на айве.

4 Н.Шавров в журнале "Прогрессивное садоводство и огородничество" за 1914 г., № 50, стр. 1551, пишет, что вкус мякоти плодов превосходного качества, тонкий и во всех отношениях отличный. Сорт зимний. Кроны деревьев пирамидальные.

_Шип_крапчатый.

Образцы плодов от И.И.Каразина, вблизи Харькова.

Величина плодов маленькая. Форма продолговатая, округлая к верхушке и на темени сплюснутая, к ножке коническая, с неясными бороздами в верхней части. Верхняя ямка мелкая, с сильной бурой сплошной ржавчиной. Чашечка открытая, с длинными листиками черными на концах. Нижняя ямка неправильная, полукольцевая, с морщинистыми складками. Ножка правильная, тонкая, почти равная по длине высоте плода.

Кожа толстая, тусклая, сухая, светло-желтая или лимонная, одноцветная, с частыми мелкими серыми ржавыми точками.

Мякоть белая, мягкая, кисловато-сахаристая, несколько вяжущая, но с очень приятным медовым привкусом и, несмотря на большую твердость плода, очень вкусная, что трудно ожидать по наружному виду.

Осенний сорт. Плоды поспевают в конце сентября [начале октября] и выносят перевозку на далекое расстояние по своей крепости.

Эмиль Гейст. Emil Heyst.

1. Образцы плодов получены от Чиковского из Варшавы: ✻✻†; XII.

Величина плодов средняя. Форма длинная грушевидная, у верхушки тупоконическая, с сглаженными 5 ребрами, отчего несколько угловатая; к ножке остро-коническая, неровная, местами бугристая, с вдающимся поперек перехватом и косым острым основанием.

Верхняя ямка широкая, мелкая с бугроватыми ребристыми складками и между ними бугорками. Листики чашечки короткие, пригнутые, пушистые, черные, открытые. Нижней ямки нет. Ножка короткая, тонкая.

Кожа тонкая, нежная, тусклая, слегка шероховатая, лимонно-желтая, совершенно одноцветная, с резкими частыми желто-бурыми ржавыми подкожными точками и на большей части местами с тонкими ржавыми пятнами. Без запаха.

Мякоть очень нежная, белая, очень сочная, тающая /каменистая только около чашечки/, винно-кисловатая, с небольшой сладостью, вяжущая, без пряности.

Плоды созревают в начале [средине] сентября.

2. Образцы плодов, полученные от Варшавского помологического сада.

Величина плодов средняя. Форма длинная грушевидная, немного косая, неравнобокая, к тупой верхушке округлая, к ножке остро-коническая с острым основанием, где /на основании/ следы ребристости.

Верхняя ямка широкая, мелкая, с короткими острыми выпуклами ребристыми складками и вдоль между ними пупковидными или плоскими бугорками. Нижней ямки нет. Ножка изогнутая, тонкая.

Кожа тонкая, нежная, тусклая, неровная, шагреневатая, основного светло-желтого цвета, почти лимонного, одноцветная, испещренная частыми бурыми подкожными точками. У ямок и местами на боках бурая ржавчина. Запаха нет.

Мякоть белая, почти без каменистости и зернистости, с очень малой каменистостью около чашечки, сливочная, тающая, очень сочная, винно-кисловатая, сахаристая, сладкая, с эфирной пряностью.

См. на обороте:

Семена малые, узкие, острые, светло-бурые.

Плоды используются примерно с половины[конца] сентября и в течение октября.

Отличный десертный сорт.

Эсперинка. Esperine. Esperynka.

1. Образцы плодов получены от Тнковского из Варшавы: ✳✳†; X.

Величина плодов менее средней. Форма продолговато-яйцевидная, округлая, к острому основанию конически суженная, без ребер.

Верхняя ямка расширенная, углубленная, с сглаженными короткими ребристыми складками, с ровными краями. Листики чашечки очень короткие, открытые, черные. Вместо нижней ямки маленькое вдавление с одной стороны, против небольшой вырост. Ножка тонкая, короткая.

Кожа тонкая, нежная, не жирная, гладкая, блестящая, светло-желтая, на верхушке тонкий разлитый желто-розовый румянец и от нижней ямки тонкий желтовато-буроватый ржавый налет, идущий несколько лучами. Запаха нет.

Мякоть белая, нежная, сочная, тающая, сладкая, с небольшой кислотой, несколько вяжущая, с малой пряностью.

Гнезда большие. Семена большие, толстые.

Плоды совершенно зрелые 17 [30] сентября. Также и по Тнковскому плоды созревают во второй половине сентября [в начале октября] и держатся в лежке до ноября [до половины ноября]. Плоды десертного качества.

Деревья небольшие, пирамидальные, плодоносные, выдерживающие морозы.

Торговый [промышленный] сорт.

2. Образцы плодов от Вирионa

Величина плодов средняя. Форма длинная, изогнутая, рогообразная, при чашечке ровная, округлая, без ребер и борозд, ниже переходящая в высокий тонкий неравнобокий конус, с ножкой, отклоненной вбок, без нижней ямки, с мясистым поперечным выростом.

Верхняя ямка очень мелкая или ее почти нет, без складок. Листики чашечки короткие, звездчатые, открытые. Ножка тонкая, длиной равная 1/4 высоты плода.

Кожа гладкая, блестящая, светло-желтая, на большей части с сплошным красновато-оранжевым или киноварно-желтым румянцем. На верхушке очень тонкий ржавый налет. Подкожные точки незаметные, только заметны на кон-

См. на обороте:

ческой части, где они при ножке мелкие, сероватые.

Мякоть белая, почти тающая, сдзная, сочная, мало сладковатая.

Плоды созревают в конце сентября и в начале октября [в начале и в средине октября].

4. Принцесса Эсперена, Princesse d' Esperen.

Образцы плодов получены от Янковского из Варшавы: ж ж † ; У .

Величина плодов больше средней. Форма неправильная грушевидная, утолщенная и ребристая, с округлыми ребрами на верхушке и к ножке коническая неправильно-угловатая, с косым основанием.

Верхней ямки почти нет на тупой неровной верхушке, с сглаженными широкими ребристыми складками около чашечки и с небольшими бороздами, переходящими за края. Листики чашечки короткие, темные, открытые. Нижняя ямка углубленная, широкая, с большим боковым выростом. Ножка толстая, длиной, черная, несколько короче половины высоты плода.

Кожа тонкая нежная, тусклая, не жирная, светло-зеленого цвета, совершенно одноцветная, с темно-зелеными подкожными точками и около них с темно-зелеными пятнами. Около ножки в ямке сильно черно-серая ржавчина.

Мякоть белая, немного желтоватая, сочная, нежная, тающая, сладкая, с небольшой пряностью. Каменистость сильная около чашечки и зернистость около гнезд (грануляции).

Семена острые, длинные, черные.

Плоды созревают в половине [конце] сентября. и используются в октябре.

Отличный десертный сорт.

72

~~6~~ 1.

ОСНОВЫ БУДУЩЕЙ ПОМОЛОГИИ.

/Классификация груш, ~~вишен и слив.~~/

Помологические системы груш так же мало обработаны, как и яблок+/; здесь также пользуется большим почетом система Люка-са, тоже с 15 классами, как и его система яблок. Происхождение групп сходное: часть их взята из ходячих обозначений на практике и к ней добавлены вымышленные группы, но, несмотря на это, система все-таки называется естественной, какой и кажется она с первого взгляда.

Группы тут следующие: 1/ беры /от французского слова *beurré* - масло, так как мякоть этих груш при еде как бы тает во рту/, 2/ полуберы, 3/ бергамоты, 4/ полубергамоты, 5/ зеленые длинные, 6/ бутылочные, 7/ аптекарские, 8/ рыжухи, 9/ мускатки, 10/ жирные /*Schmalzbirnen* /, 11/ пряные, 12/ длинные кухонные, 13/ круглые кухонные, 14/ длинные винные и 15/ круглые винные.

Говорить о недостатках этой общепринятой системы, а также органографических признаках груш, которыми пользуются помологи, значит повторять все сказанное мной о помологии яблок. Курьезен в этой системе 10 класс, к которому, по словам Люка-са /*Auswahl wertvoller Obstsorten* /, относятся все столовые груши продолговатой формы, не включающиеся в предыдущие 9 классов - это какой то запасный ящик, довольно не хитроумно изобретенный классификатором.

Между другими системами груш имеется интересная, но совсем не распространенная система Яна/ *Jahn* /, который, конечно, не по тщательным научным исследованиям, а по собственному соображению разделил груши на 6 классов только по одной

- - - - - -

+/ См. мою статью: "Основы будущей помологии /Классификация яблок/", где указаны недостатки помологических систем яблок.

I.

ОСНОВЫ БУДУЩЕЙ ПОМОЛОГИИ.

/Классификация груш, вишен и слив./

Помологические системы груш так же мало обработаны, как и яблок+/; здесь также пользуется большим почетом система Люка-са, тоже с 15 классами, как и его система яблок. Происхождение групп сходное: часть их взята из ходячих обозначений на практике и к ней добавлены вымышленные группы, но, несмотря на это, система все-таки называется естественной, какой и кажется она с первого взгляда.

Группы тут следующие: 1/ беры /от французского слова beurré - масло, так как мякоть этих груш при еде как бы тает во рту/, 2/ полуберы, 3/ бергамоты, 4/ полубергамоты, 5/ зеленые длинные, 6/ бутылочные, 7/ аптекарские, 8/ рыжухи, 9/ мускатки, 10/ жирные /Schmalzbirnen /, 11/ пряные, 12/ длинные кухонные, 13/ круглые кухонные, 14/ длинные винные и 15/ круглые винные.

Говорить о недостатках этой общепринятой системы, а также органографических признаках груш, которыми пользуются помологи, значит повторять все сказанное мной о помологии яблок. Курьезен в этой системе 10 класс, к которому, по словам Люка-са /Auswahl wertvoller Obstsorten /, относятся все столовые груши продолговатой формы, не включающиеся в предыдущие 9 классов - это какой то запасный ящик, довольно не хитроумно изобретенный классификатором.

Между другими системами груш имеется интересная, но со-всем не распространенная система Яна/ Jahn /, который, конечно, не по тщательным научным исследованиям, а по собствен-ному соображению разделил груши на 6 классов только по одной

- - - - - -

+/ См. мою статью: "Основы будущей помологии /Классификация яблок/", где указаны недостатки помологических систем яблок.

форме листьев: 1/ деревья с круглыми листьями, 2/ округло яйцевидными, 3/ яйцевидными, 4/ эллиптическими, 5/ широко-эллиптическими и 6/ ланцетовидными листьями.

Несмотря на такой единичный выбранный признак, система Яна, как оказалось по исследованиям К.Коха, стоит весьма близко к науке, чего, вероятно, и сам Ян не подозревал. К.Кох нашел, что 1-й класс его системы составляют груши, происшедшие от двух видов: китайской /Pyrus sinensis Desf/ и сердцевидной /P. cordata Decaisne /; конечно, здесь должны быть две различные группы, но Ян не усмотрел между округлыми листьями груш листья, несколько сердцевидные при основании, исключая уже всякие другие признаки этих видов; к 2 и 3 классам системы Яна относятся груши, происшедшие от P. achras Gaertn.: к 4 и 5 классам - груши, происшедшие от P. sinai Desf. /синайская/ и к 6 классу - груши, имеющие своим родичем маслично-листную грушу /P. elaagrifolia Pall./. Вероятно кавказские и персидские груши имеют своим родичем иволистную грушу /P. salicifolia Pall./.

Рассматривая ботанические признаки культурных груш, можно видеть, что эти растения легче подвести под научные категории, чем яблони, при чем в основу разделения должны быть приняты не признаки только одного плода /при том признаки ботанические/, но также листьев и разных частей цветка.

Могут ли обе системы Люкаса /яблок и груш/ называться естественными, за какие их считают заграничные помологи? Очевидно нет: это системы наполовину вымышленные и с ботанической точки зрения их нельзя назвать даже искусственными; во всяком случае, они вовсе не научные, а сбитые на скорую руку, по ходячим общим названиям, с придачей разных выдумок для включения в них имеющегося разнообразия плодов.

Естественной системой следует называть ту, которая опре-

деляет сродство форм, чем может заниматься только морфология растений: она не берет никаких произвольно выбранных признаков, под которые подводилось бы разнообразие форм, а исследует различие и сходство растений по признакам, какие у них обнаружатся сами собой при тщательном исследовании. Такой системы в помологии совсем не имеется. Искусственной научной системы в ней строго говоря, такке нет, ибо такая система предполагает все-таки точное и правильное знакомство с растениями по научным признакам, из которых классификатор выбирает лишь один или несколько по собственному усмотрению. Так, даже система груш Яна в научном смысле не может быть названа искусственной; это система лишь личной выдумки самого Яна и больше ровно ничего.

Плодоводу-практику, тем более мало знакомому с разными помологиями - к большой его невыгоде, как узнаем ниже - покажется странной моя речь о какой-то переработке помологии на ботанический лад, о введении науки в такую сферу, где, по его убеждению, всецело должна царить одна практика; ему покажется также странным отрицание пригодности ходячих, большей частью торговых обозначений сортов, и от самого заскорузлого практика я даже могу услышать слова: "да дело вовсе не в названиях". Конечно дело не в названии, но с названиями, ведь, соединяются определенные понятия и путать их не следует, а еще хуже изобретать разные вычурные наименования, вроде брюхастых яблок, жирных груш и пр.

Практик-плодовод, надеюсь, убедится из дальнейшего моего изложения, насколько может быть полезна для него настоящая научная, не современная помология. От продавца же, знакомого с помологией, я наперед слышу возражение, вроде того, которое высказал Э.Регель; он сказал: "Что же делали ботаники до сих пор, не представив нам своих монографий по сортам садовых растений? Наука - их дело и плодоводам некогда ею заниматься".

Но даже и в том случае, если бы ботаники занимались плодовыми деревьями, то их исследования не внесли бы общедоступных данных для плодоводов, которыми они могли бы пользоваться без ботанической подготовки. Наконец, мне повторили бы то же, что сказал и Э.Регель: "Научно изучать и классифицировать садовые сорта плодовых деревьев положительно невозможно, вследствие весьма смешанной гибридизации самых разнообразных видов".

Если бы мне всё так сказали, то я ответил бы, что всё это ошибочно.

Ботанические описания вышеупомянутого К.Коха, а также Де-Кандоля, Э.Регеля, Палласа, Дево, Гертнера и др., правда разбросаны в разных дендрологиях и других изданиях, но всё-таки они существуют и только не собраны воедино; о грушах же имеются два обширных сочинения Декена /Decaisne/; 1/ Monographie du poirier и 2/ Le jardin fruitier du Museum сочинения, впрочем, недоступные по цене: первое стоит дороже 200 рублей, а второе 300 рублей. Ученому помологу всегда бы нашелся в ботанике подходящий ему материал, если бы он занялся научной помологией, а не каким-то призраком науки, созданным фантазией Христа, Диля и Лукаса. Этот призрак науки сознается всеми плодоводами, но к нему всегда прибегают вместо всяких работ о научных исследованиях плодовых сортов. Исследовать же эти сорта вовсе не дело ботаников, а особых специалистов из ученых плодоводов, знакомых как с ботаникой, так и с плодоводством. В постановке же опытов и наблюдений на научных началах никогда не было бы заграницей препятствий, так как там издавна уже существуют большие помологические сады, опытные садовые станции, при которых имеются во всякое время авторитетные знатоки сортов, так что в сто лет от появления системы Диля они своими опытами и наблюдениями могли бы обогатить как

науку плодоводства, так и ботанику.

Виной всего этого является упорное нежелание плодоводов пользоваться наукой, даже пренебрежение ею из-за какой-то воображаемой недоступности и даже непригодности; нет ни одной иной отрасли прикладного знания, где бы так изгонялась наука, как в плодоводстве. Кузнецу и слесарю всегда стараются сообщить сведения о свойствах металлов при их обработке; всякий мастер-механик так или иначе знаком с различными отделами физики; фельдшера, даже сиделки, обучаются анатомии и начаткам медицины; даже садовнику плодоводы не возбраняют познать кое-что из науки о растениях, но когда дело касается практического пользования этой наукой в применении ее не только в помологии яблок и груш, но и к разным приемам культуры, - тогда плодоводы подымаются на дыбы и гонят от себя науку прочь. В самом деле: что мешало, например, ученым плодоводам воспользоваться исследованиями К.Коха, Декена и др., открывших связь ботаники с плодоводством в признаках диких родичей яблонь и груш и происшедших из них садовых сортов? Если бы толчок, данный в этом направлении, был замечен учеными плодоводами и найден ими благотворным для создания новой науки, то не имелось бы в ходу той вычурной бестолковщины, которой по настоящее время плодоводы пользуются вместо науки.

"Нужды деревни"- еженедельный иллюстрированный журнал /бывший"Хозяин". 1910 г., № 8, стр. 229-233.

форме листьев: 1/ деревья с круглыми листьями, 2/ округло яйцевидными, 3/ яйцевидными, 4/ эллиптическими, 5/ широко-эллиптическими и 6/ ланцетовидными листьями.

Несмотря на такой единичный выбранный признак, система Яна, как оказалось по исследованиям К.Коха, стоит весьма близко к науке, чего, вероятно, и сам Ян не подозревал. К.Кох нашел, что 1-й класс его системы составляют груши, происшедшие от двух видов: китайской /Pyrus sinensis Desf./ и сердцевидной /P. cordata Decaisne /; конечно, здесь должны быть две различные группы, но Ян не усмотрел между округлыми листьями груш листья, несколько сердцевидные при основании, исключая уже всякие другие признаки этих видов; к 2 и 3 классам системы Яна относятся груши, происшедшие от P. achras Gaertn.: к 4 и 5 классам - груши, происшедшие от P. sinai Desf./синайская/ и к 6 классу - груши, имеющие своим родичем маслично-листную грушу /P. eleagrifolia Pall./. Вероятно кавказские и персидские груши имеют своим родичем иволистную грушу /P. salicifolia Pall./.

Рассматривая ботанические признаки культурных груш, можно видеть, что эти растения легче подвести под научные категории, чем яблони, при чем в основу разделения должны быть приняты не признаки только одного плода /при том признаки ботанические/, но также листьев и разных частей цветка.

Могут ли обе системы Люкаса /яблок и груш/ называться естественными, за какие их считают заграничные помологи? Очевидно нет: это системы наполовину вымышленные и с ботанической точки зрения их нельзя назвать даже искусственными; во всяком случае, они вовсе не научные, а сбитые на скорую руку, по ходячим общим названиям, с придачей разных выдумок для включения в них имеющегося разнообразия плодов.

Естественной системой следует называть ту, которая опре-

деляет сродство форм, чем может заниматься только морфология растений: она не берет никаких произвольно выбранных признаков под которые подводилось бы разнообразие форм, а исследует различие и сходство растений по признакам, какие у них обнаружатся сами собой при тщательном исследовании. Такой системы в помологии совсем не имеется. Искусственной научной системы в ней, строго говоря, также нет, ибо такая система предполагает все-таки точное и правильное знакомство с растениями по научным признакам, из которых классификатор выбирает лишь один или несколько по собственному усмотрению. Так, даже система груш Яна в научном смысле не может быть названа искусственной; это система лишь личной выдумки самого Яна и больше ровно ничего.

Плодоводу-практику, тем более мало знакомому с разными помологиями - к большой его невыгоде, как узнаем ниже - покажется странной моя речь о такой-то переработке помологии на ботанический лад, о введении науки в такую сферу, где, по его убеждению, всецело должна царить одна практика; ему покажется также странным отрицание пригодности ходячих, большей частью торговых обозначений сортов, и от самого заскорузлого практика я даже могу услышать слова: "да дело вовсе не в названиях". Конечно дело не в названии, но с названиями, ведь, соединяются определенные понятия и путать их не следует, а еще хуже изобретать разные вычурные наименования, вроде брюхастых яблок, жирных груш и пр.

Практик-плодовод, надеюсь, убедится из дальнейшего моего изложения, насколько может быть полезна для него настоящая научная, не современная помология. От продавца же, знакомого с помологией, я наперед слышу возражение, вроде того, которое высказал Э.Регель; он сказал: "Что же делали ботаники до сих пор, не представив нам своих монографий по сортам садовых растений? Наука - их дело и плодоводам некогда ею заниматься".

Но даже и в том случае, если бы ботаники занимались плодовыми деревьями, то их исследования не внесли бы общедоступных данных для плодоводов, которыми они могли бы пользоваться без ботанической подготовки. Наконец, мне повторили бы то же, что сказал и Э.Регель: "Научно изучать и классифицировать садовые сорта плодовых деревьев положительно невозможно, вследствие весьма смешанной гибридизации самых разнообразных видов".

Если бы мне всё так сказали, то я ответил бы, что всё это ошибочно.

Ботанические описания вышеупомянутого К.Коха, а также Де-Кандоля, Э.Регеля, Палласа, Дево, Гертнера и др., правда разбросаны в разных дендрологиях и других изданиях, но всё-таки они существуют и только не собраны воедино; о грушах же имеются два обширных сочинения Декена /Decaisne/; 1/ Monographie du poirier и 2/ Le jardin fruitier du Museum сочинения, впрочем, недоступные по цене: первое стоит дороже 200 рублей, а второе 300 рублей. Ученому помологу всегда бы нашелся в ботанике подходящий ему материал, если бы он занялся научной помологией, а не каким-то призраком науки, созданным фантазией Христа, Диля и Люкаса. Этот призрак науки сознается всеми плодоводами, но к нему всегда прибегают вместо всяких работ о научных исследованиях плодовых сортов. Исследовать же эти сорта вовсе не дело ботаников, а особых специалистов из ученых плодоводов, знакомых как с ботаникой, так и с плодоводством. В постановке же опытов и наблюдений на научных началах никогда не было бы заграницей препятствий, так как там издавна уже существуют большие помологические сады, опытные садовые станции, при которых имеются во всякое время авторитетные знатоки сортов, так что в сто лет от появления системы Диля они своими опытами и наблюдениями могли бы обогатить как

науку плодоводства, так и ботанику.

Виной всего этого является чудная человеческая способность пользоваться наукой, даже пренебрежение ею из-за какой-то воображаемой недоступности и даже непригодности; нет ни одной иной отрасли прикладного знания, где бы так изгонялась наука, как в плодоводстве. Кузнецу и слесарю всегда стараются сообщить сведения о свойствах металлов при их обработке; всякий мастер-механик так или иначе знаком с различными отделами физики; фельдшера, даже сиделки, обучаются анатомии и начаткам медицины; даже садовнику плодоводы не возбраняют познать кое-что из науки о растениях, но когда дело касается практического пользования этой наукой в применении ее не только в помологии яблок и груш, но и к разным приемам культуры, - тогда плодоводы подымаются на дыбы и гонят от себя науку прочь. В самом деле: что мешало, например, ученым плодоводам воспользоваться исследованиями К.Коха, Декена и др., открывших связь ботаники с плодоводством в признаках диких родичей яблонь и груш и происшедших из них садовых сортов? Если бы толчок, данный в этом направлении, был замечен учеными плодоводами и найден ими благотворным для создания новой науки, то не имелось бы в ходу той вычурной бестолковщины, которой по настоящее время плодоводы пользуются вместо науки.

"Нужды деревни"- еженедельный иллюстрированный журнал /бывший"Хозяин". 1910 г., № 8, стр. 229-233.

Арт. 1065
Цена 3 р. 30 к.