

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА

ДЛЯ

РУССКИХЪ СЕЛЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ

СОСТАВЛЕНА

А. П. Людоговскимъ, И. Н. Чернопятовымъ,
И. А. Стебутомъ, А. А. Фадеевымъ,

ЧЛЕНАМИ

КОМИТЕТА СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОНСУЛЬТАЦІИ,

СОСТОЯЩАГО ПРИ

ИМПЕРАТОРСКОМЪ

МОСКОВСКОМЪ ОБЩЕСТВѢ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА

ТОМЪ I



САНКТ-ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНИЕ А. Ф. ДЕВРІЕНА.
1875.

Три года тому назадъ при Императорскомъ Московскомъ Обществѣ сельскаго хозяйства учрежденъ Комитетъ сельскохозяйственной консультаціи, въ число задачъ котораго уставъ его включаетъ разрѣшеніе различныхъ вопросовъ по всѣмъ отраслямъ сельскохозяйственной промышленности. Вслѣдствіе этого въ Комитетъ поступали и поступаютъ на разрѣшеніе самые разнообразныя вопросы, которые ставятся, однако, большей частью такъ неопредѣленно и широко, что не допускаютъ частнаго, опредѣленнаго отвѣта, а вынуждаютъ въ отвѣтъ на нихъ ссылаться на руководства по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства. При этомъ оказалось, что въ нашей сельскохозяйственной литературѣ по многимъ вопросамъ вовсе не имѣется сочиненій; изъ имѣющихся же весьма мало такихъ, на которыя можно дѣлать удовлетворительныя ссылки. Къ тому же приобрѣтеніе всѣхъ сочиненій, необходимыхъ хозяину для справокъ по разнымъ вопросамъ, которые можетъ представить ему его хозяйство, стоитъ не дешево и потому недоступно для многихъ хозяевъ, имѣющихъ нужду въ такихъ справкахъ. Кромѣ того, имѣющіяся сочиненія представляютъ большей частью еще тотъ недостатокъ, что, за отсутствіемъ въ нихъ такого системати-

ческаго изложенія предмета, которое позволяло бы читателю, нуждающемуся въ справкѣ относительно извѣстнаго вопроса, ограничиться прочтеніемъ по возможности только относящагося къ этому вопросу, заставляють его часто читать много лишняго для уясненія себѣ того, что его интересуетъ въ данный моментъ.

Недостатокъ въ русской сельскохозяйственной литературѣ сочиненій, рассматривающихъ сельскохозяйственные вопросы въ указанныхъ объемѣ и формѣ и отсутствіе сочиненій по нѣкоторымъ сельскохозяйственнымъ предметамъ побудили Комитетъ сельскохозяйственной консультаціи взяться за составленіе сочиненія, которое удовлетворяло бы сказаннымъ требованіямъ, т. е. давало бы русскому хозяину возможность найти въ немъ настолько достаточное разъясненіе интересующихъ его сельскохозяйственныхъ вопросовъ, чтобы онъ, затѣмъ, если бы и не былъ въ состояніи самъ рѣшить вопросъ совершенно опредѣленно, могъ, по крайней мѣрѣ, предложить его специалисту въ формѣ, допускающей опредѣленное рѣшеніе. Такое сочиненіе, чтобы быть доступнымъ для возможно большаго числа занимающихся хозяйствомъ, должно, при невысокой цѣнѣ его, обнимать возможно большее число вопросовъ, съ которыми можетъ встрѣтиться сельскій хозяинъ въ своемъ хозяйствѣ. Вотъ почва, на которой выросла и созрѣла мысль о составленіи предлагаемой нынѣ русской сельскохозяйственной публикѣ *„Настольной книги для русскихъ сельскихъ хозяевъ“*.

Въ осуществленіи этой мысли Комитета мы, члены его, принявшіе на себя составленіе книги, руководились отчасти образцами такихъ книгъ, существующихъ издавна въ западной литературѣ, какъ-то сочиненіями: Штекгард-

товъ „Der angehende Pächter“, Эберта „Die landwirthschaftlichen Verhältnisse in vergleichender Darstellung für das praktische Bedürfniss“, Стефенса „Book of farming“, обработанномъ по нѣмцки Шмидлиномъ, и т. д.; но слѣдовать вполне этимъ образцамъ не могли: во 1-хъ потому, что изложеніе въ нихъ предмета или слишкомъ поверхностно, или вдается въ излишнія частности; въ теоретическомъ же отношеніи нѣредко устарѣло; во 2-хъ потому, что алфавитный и календарный распорядки матеріала въ нѣкоторыхъ изъ нихъ казались намъ несоотвѣтствующими для задуманной Комитетомъ книги: алфавитный распорядокъ, правда, облегчаетъ отысканіе вопросовъ, но дѣлаетъ сочиненіе слишкомъ объемистымъ, вслѣдствіе необходимости рассматривать отдѣльные вопросы болѣе независимо одинъ отъ другаго; календарный же распорядокъ или разсмотрѣніе вопросовъ въ хронологическомъ порядкѣ исполненія различныхъ сельскохозяйственныхъ работъ въ хозяйствѣ въ теченіи года, неудобенъ для книги, которая назначается для хозяевъ, находящихся въ столь разнообразныхъ климатическихъ условіяхъ, какъ русскіе хозяева, и въ которой рассматривается множество вопросовъ, не имѣющихъ никакой связи съ временами года. Наиболее подходящимъ для нашей книги казался намъ распорядокъ матеріала въ книгѣ „Der angehende Pächter“; въ ней сельскохозяйственные вопросы рассматриваются до нѣкоторой степени въ томъ порядкѣ, въ которомъ они представляются хозяину арендатору, принимающемуся за хозяйство. Но и въ этомъ распорядкѣ мы должны были измѣнить нѣкоторыя частности, чтобы, при возможно полномъ содержаніи книги, не увеличить напрасно ея объема. Что касается содержанія книги, то въ настольной книгѣ рассматриваются преи-

мущественно тѣ вопросы, которые, на сколько опытъ успѣлъ выяснитъ это Комитету, особенно существенны для сельскихъ хозяевъ различныхъ полосъ Россіи; этимъ послѣднимъ объясняется въ особенности послѣдняя часть заголовка книги: „*для русскихъ сельскихъ хозяевъ*“. Факты, данныя, на которыхъ основываются тѣ или другіе выводы книги, заимствованы нами по возможности изъ русской природы, изъ практики русскаго сельскаго хозяйства; въ тѣхъ же случаяхъ, когда мы не могли получить такихъ, мы пользовались данными западной Европы, чтобы дать нашему хозяину хотя какія либо основанія для его хозяйственныхъ соображеній. Въ разсмотрѣніи различныхъ вопросовъ мы имѣли постоянно въ виду интересы практическаго хозяина, строго придерживаясь, однако, научныхъ основъ, которыя должны руководить хозяина въ разрѣшеніи имъ практическихъ вопросовъ. Крупный и мелкій шрифты назначены для отличенія болѣе общаго отъ частныхъ изложеній. Въ концѣ книги помѣщенъ, для удобства наведенія справокъ въ книгѣ, алфавитный указатель предметовъ, о которыхъ говорится въ сочиненіи, и помѣщенныхъ въ сочиненіи полиграфическихъ. Избранная нами система изложенія и разсмотрѣніе различныхъ сельскохозяйственныхъ вопросовъ не только съ практической, но и съ теоретической стороны, хотя съ послѣдней и не такое полное какъ съ первой, даютъ намъ основаніе думать, что настольная книга можетъ служить также полезнымъ пособіемъ для учащихся въ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

Указанная выше задача не могла быть разрѣшена книгой очень малаго объема, при всемъ нашемъ желаніи сдѣлать изложеніе предмета возможно сжатымъ. Поэтому два

тома *) „Настольной книги“, обнимающіе сельскохозяйственную экономію (организацию хозяйства и бухгалтерію), земледѣліе, скотоводство и краткія свѣдѣнія о сельскохозяйственныхъ техническихъ производствахъ, будутъ содержать не менѣе 75—80 печатныхъ листовъ. Несмотря на такой объемъ и значительное число полиграфическихъ, которые оказались необходимыми для поясненія текста и сокращенія его вслѣдствіе этого, издатель, неощадившій ни труда, ни средствъ для соотвѣтственной обстановки изданія, нашелъ возможнымъ назначить весьма умѣренную цѣну за сочиненіе и тѣмъ сдѣлать его доступнымъ дѣйствительно для всякаго занимающагося хозяйствомъ.

Настольная книга должна замѣнить хозяину въ извѣстномъ случаѣ нѣсколько дорого стоящихъ книгъ; но она отнюдь не претендуетъ сдѣлать бесполезными многія другія хорошія сельскохозяйственныя книги, въ особенности для хозяина съ нѣсколько большими средствами; она требуетъ даже дополненія ея нѣкоторыми специальными сельскохозяйственными сочиненіями въ библіотекѣ каждаго хозяина. А потому мы считали полезнымъ въ одномъ изъ прибавленій, помѣщенныхъ въ концѣ книги, указать на важнѣйшія сельскохозяйственныя сочиненія преимущественно русской литературы.

Наконецъ, настольная книга, способная въ главныхъ своихъ основаніяхъ сохранить весьма долгое время свое значеніе, состарѣтся сравнительно скорѣе въ своихъ частностяхъ, напр. въ отношеніи наиболѣе пригодныхъ для

*) Имѣется въ виду изданіе третьяго тома, который будетъ заключать въ себя лѣсоводство, садоводство и огородничество, при содѣйствіи членовъ же Комитета сельскохозяйственной консультаціи В. Т. Собичевскаго и Р. И. Шредера.

известныхъ цѣлей орудій и машинъ, туковъ, сортовъ растений, мѣстъ производства ихъ и цѣнъ на нихъ, въ отношеніи различныхъ приѣмовъ обработки и удобрения почвы, кормленія животныхъ и т. д.; и въ отношеніи новыхъ, возникающихъ въ русскомъ сельскомъ хозяйствѣ вопросовъ. А потому, Комитетъ сельско-хозяйственной консультаціи, въ соглашеніи съ издателемъ „настойной книги“ предполагаетъ издавать ежегодно недорогія добавленія къ настольной книгѣ, которыя бы сохраняли за „настойной книгой для русскихъ сельскихъ хозяевъ“ возможно долго ея современность. †

Затѣмъ, намъ остается лишь желать, чтобы составленная нами книга принесла русскимъ сельскимъ хозяевамъ желаемую нами пользу, а Комитету сельско-хозяйственной консультаціи облегчило его задачу въ служеніи нуждамъ отечественнаго сельскаго хозяйства.

А В Т О Р Ы:

Сельско-хозяйственно-экономической части:

А. П. Людоговскій.

Скотоводственной части:

И. Н. Чернопятавъ.

Земледѣльческой части:

И. А. Стебуть.

Сельско-хозяйственныхъ техническихъ производствъ:

А. А. Фадѣевъ.

Москва,
1874 г. ноября 9-го.

ВТОРОЕ ПРЕДИСЛОВІЕ.

Выходъ втораго выпуска перваго и перваго выпуска втораго тома, въ особенности же выходъ третьяго выпуска перваго и втораго выпуска втораго тома, заканчивающихъ нынѣ „Настольную книгу“ въ объемѣ первоначальной программы, замедлился, главнымъ образомъ, вслѣдствіе болѣзней и семейныхъ несчастій, постигшихъ нѣкоторыхъ изъ составителей книги; вслѣдствіе обремененія составителей прямыми служебными обязанностями и вслѣдствіе значительности объема всей книги, который, сравнительно съ первоначально предположеннымъ, увеличился на 25 % слишкомъ. Это послѣднее произошло оттого, что печатаніе „Настольной книги“, для выигрыша времени, начато было въ то время, когда были опредѣлены только общій характеръ ея и программа ея въ общихъ чертахъ, но не была еще готова даже большая часть рукописи; такъ что тогда, поэтому, невозможно было съ большей точностію, чѣмъ это было сдѣлано, опредѣлить тотъ объемъ, котораго потребуетъ детальное выполненіе предположенной программы.

При составленіи нынѣ выходящихъ равно какъ и вышешихъ въ маѣ истекшаго года выпусковъ „Настольной книги“, мы, составители книги, руководились той же цѣлію, которой руководились при составленіи перваго выпуска,

вышедшаго въ декабрѣ 1874 года, и которая приведена нами въ сопровождавшемъ первый выпускъ предисловіи. А потому, здѣсь, мы можемъ развѣ, въ разъясненіе этой цѣли, добавить, что мы убѣждены въ невозможности предложить сельскому хозяину рецепты на всевозможные случаи, чего хотѣлось бы многимъ, или, что еще заманчивѣе, продиктовать хозяину рецептъ универсальнаго средства, и тѣмъ освободить его отъ всякаго напряженія мысли для улучшенія своего хозяйства или отъ всякаго расхода на приглашеніе для этаго послѣдняго добросовѣстнаго специалиста, если бы онъ не желалъ или не могъ самъ заняться своимъ хозяйствомъ. По этому-то, въ „Настольной книгѣ“ мы старались дать русскому сельскому хозяину, занимающемуся дѣйствительно своимъ хозяйствомъ, разъясненіе интересующихъ его вопросовъ, дающихъ для разрѣшенія частнаго вопроса или, по крайней мѣрѣ, для предложенія такого вопроса на разрѣшеніе специалисту, и матеріалъ для его спеціальнаго самообразованія. Такимъ же матеріаломъ могутъ служить не только факты, выводы и приемы, заимствованные изъ русскаго хозяйства, но и факты, выводы, приемы, заимствованные изъ хозяйствъ западной Европы; послѣдніе могутъ даже имѣть преимуществва передъ первыми по большой ихъ точности и большому числу ихъ. Слѣдовательно, такимъ матеріаломъ можетъ служить не только то, что непосредственно примѣнимо въ русскомъ хозяйствѣ, но и то, что, небудучи прямо примѣнимо въ немъ, можетъ, однако, дать новую мысль русскому хозяину, расширить его пониманіе. А потому, при бѣдности нашей хозяйственной литературы и нашей хозяйственной практики точно изслѣдованными фактами, мы не стѣснялись пользоваться, въ случаяхъ недостатка по-

слѣднихъ, иностранной, въ особенности же богатой такими фактами нѣмецкой хозяйственной литературой, руководясь той несомнѣнной, хотя не всегда для всѣхъ памятной истиной, что научные основы хозяйства вездѣ одни и тѣ же. Только, спеціально образованные, съ самостоятельной мыслью хозяева могутъ создать русское рациональное хозяйство на новыхъ началахъ; люди же, которые, для разрѣшенія каждаго хозяйственнаго вопроса, ищутъ въ книгахъ или въ дѣйствительности готовыхъ отвѣтовъ, образцовъ для рабскаго подражанія безсильны сдѣлать это; а потому, всѣ усилія людей радѣющихъ объ успѣхахъ нашего хозяйства, должны быть направлены къ тому, чтобъ помочь такому образованію нашихъ хозяевъ.

На сколько мы достигли предположенной нами и разъясненной здѣсь цѣли нашей „Настольной книги“ судить не намъ, а читателю, передъ которымъ теперь сполна обѣ части „Настольной книги“, выполняющія первоначальную часть ея программы, *) и отъ котораго мы, въ интересахъ дѣла, которому мы хотѣли послужить ея составленіемъ, ждемъ строгаго но безпристрастнаго и безкорыстнаго суда. Такой судъ, который, мы надѣемся, признаетъ за книгой ея достоинства и пользу, которую она можетъ принести русскому сельскому хозяйству, укажетъ въ тоже время на ея недостатки и пробѣлы, **) которыхъ въ „Настольной

*) Третья часть, обнимающая: огородничество, садоводство и лѣсоводство и отчасти составленная уже, отчасти же еще составляемая членами комитета сельскохозяйственной консультаціи Р. И. Шредеромъ и И. Т. Собичевскимъ, печатается уже.

**) Всѣ замѣчанія, относящіяся до настольной книги, могутъ быть присланы въ комитетъ сельскохозяйственной консультаціи (Москва, Смоленскій бульваръ, домъ земледѣльческой школы), который будетъ очень благодаренъ за это лицамъ, выразившимъ такимъ образомъ сочувствіе дѣятельности комитета на пользу отечественнаго сельскохозяйства.

книгъ", при ея объемѣ и разнородности ея содержанія, найдется, конечно, не мало, и тѣмъ будетъ содѣйствовать исправленію и пополненію ея въ предположенныхъ къ ней ежегодныхъ прибавленіяхъ, а затѣмъ, можетъ быть, и во второмъ изданіи, если такого дождется „Настольная книга“ въ доказательство того, что она удовлетворила существовавшую у нашихъ сельскихъ хозяевъ потребность.

Намъ остается просить у читателя снисхожденія къ встрѣчающимся въ книгѣ опечаткамъ, которыхъ тѣмъ труднѣе было избѣгнуть, что книга печаталась не въ мѣстожителствѣ составителей. Важнѣйшія изъ замѣченныхъ опечатокъ исправлены въ приложенныхъ къ каждому тому особыхъ спискахъ.

Москва,
1876 г., Января 25.

И. СТЕБУТЪ.
Н. ЧЕРНОПЯТОВЪ.
А. ФАДѢЕВЪ.

ОГЛАВЛЕНІЕ I-й ЧАСТИ.

	Стр.
ПРЕДИСЛОВІЕ.	
АРЕНДОВАНИЕ.	
ВИДЫ АРЕНДЫ.	1
НЕОБХОДИМЫЯ УСЛОВІЯ ВЫГОДНОСТИ АРЕНДОВАНІЯ	2
НЕОБХОДИМЫЯ ДЛЯ АРЕНДАТОРА СРЕДСТВА	5
КРЕДИТЪ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЪ	7
АРЕНДНЫЙ КОНТРАКТЪ	8
Первая часть контракта: предметы аренднаго контракта—вещественныя и невещественныя составныя части (9); срокъ аренды (14); арендная плата (15)	9
Вторая часть контракта: обояднія права и обязанности владѣльца и арендатора въ теченіи арендованія	19
Третья часть контракта: сдача имѣнія арендатору и обратная передача владѣльцу	24
Четвертая часть контракта: обезпеченіе исполненія взаимнопринятыхъ обязанностей сторонъ при арендѣ	31
ФОРМА ПРИМѢРНАГО КОНТРАКТА СОСТАВЛЕННАГО НА ОСНОВАНІИ ИЗЛОЖЕННЫХЪ ВЫШЕ НАЧАЛЪ: главныя основанія аренды (33); условія относительно правъ и обязанностей контрагентовъ въ продолженіи аренды (35); пріемъ и обратная сдача имѣнія (38); условія относительно обезпеченія взаимнопринятыхъ обязательствъ (43)	33
ЗАДАЧИ, ПРЕДСТОЯЩІЯ АРЕНДАТОРУ ПО ЗАКЛЮЧЕНІИ КОНТРАКТА.	45
ЦѢЛЬ АРЕНДАТОРА И ДОВОЛЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СОВѢТЪ ЕМУ	47
АРЕНДУЕМОЕ ИМѢНІЕ.	
ВЕЛИЧИНА И ПОЛОЖЕНІЕ ИМѢНІЯ. Объемъ имѣнія и зависящій отъ него способъ пользованія (51); отношеніе различныхъ угодій другъ къ другу (55); изслѣдованіе величинъ поверхности (56). Положеніе и климатъ (58). Политическія, общественныя и торговныя отношенія (60)	51

ЗЕМЛЯ И ПОЧВА.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТИХЪ ПОНЯТИЙ	Стр. 61
МЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗЪ ПОЧВЫ И ЕЯ СТРОЕНИЕ	63
ПРОИСХОЖДЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОЧВЫ: матеріалъ, изъ котораго образовалась почва (66); дѣтели механическаго вѣдимаго разрушенія горныхъ породъ, вывѣтриваніе горныхъ породъ (71); дѣтели размѣщенія продуктовъ разрушенія горныхъ породъ, почвы первичныя и наносныя (85).	65
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПОЧВЫ: образованіе сѣровыхъ (93) и торфяныхъ (94) почвъ	69
ГЛАВНЫЯ (БЛИЖАЙШИЯ) СОСТАВНЫЯ ЧАСТИ ПОЧВЫ.	98
ФИЗИЧЕСКІЯ СВОЙСТВА ПОЧВЫ: цвѣтъ (102); удѣльный и объемный вѣса (103); спѣзваніе (104); прилипаніе (105); влагоемкость, волосность и проницаемость (106); поглощеніе газовъ, гигроскопичность (107); вододерживающая сила, испареніе воды (109); уменьшеніе объема (110); теплоемкость, теплопроводность и теплоудерживающая сила (110); согрѣваніе и охлажденіе почвы, внутренняя роса (111); постоянныя и измѣняющіяся физическія свойства (112).	102
ЗАДЕРЖИВАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЧВЫ (113) и ея причины (114)	112
ХИМИЧЕСКІЯ СВОЙСТВА ПОЧВЫ (химическій составъ почвы)	117
ВЗАИМНЫЯ ОТНОШЕНІЯ ПОЧВЫ И РАСТЕНІЯ. БОГАТСТВО И ПЛОДОРОДІЕ ПОЧВЫ: что производятъ различныя растенія (120); чего требуютъ отъ почвы различныя растенія (123); что поступаетъ изъ почвы въ растеніе, вліяніе почвенной жидкости на растеніе (125); что доставляетъ почва растенію (127); плодородіе и богатство почвы (131)	120
ЖВѢТНЫИ ХАРАКТЕРЪ (ВѢТШНИЙ ИЛИ ЭНТОПИЧЕСКІЙ) ПОЧВЫ: слои почвы (134); вліяніе на почву: камней (136); горъ и гѣсовъ (137), водоемовъ (137), покатости положенія (138); обращенія къ странамъ свѣта (139); возвышенія надъ уровнемъ моря (141) и широты мѣста (142).	120
КЛАССИФИКАЦІЯ ПОЧВЪ И ПОЧВЕННЫЯ КАРТЫ: естественно научная, техническая и экономическая классификаціи (143); естественная и искусственная классификаціи (144); классификаціи: Теэра, измѣненная Шюблеромъ (144) и Фаллу (145); почвы: глинистыя и суглинистыя (146); песчано-суглинистыя, суглинисто-песчаныя и суглинныя (147); подзолистыя (148), песчаныя и хрящевыя (148), известковыя и мергельныя (148), перегнойныя и черноземныя (149) и торфяныя и вересково-перегнойныя (150); техническая полевая классификація Рунде (150); экономическая полевая классификація Саксонскаго кадастра (152); техническая луговая классификація Лангенталя (153); экономическая луговая классификація Саксонскаго кадастра (154). Классификація выгоновъ (155)	142
ИЗСЛѢДОВАНИЕ ПОЧВЫ И ОЦѢНКА ЗЕМЕЛЬНЫХЪ УГОДІЙ: опредѣленіе этихъ понятій (158); изслѣдованіе: количественнаго отношенія крупныхъ и мелкихъ частицъ (159), минералогическаго характера почвы (160), химическаго состава (161), физическихъ свойствъ (164) и вѣтшнихъ техническихъ свойствъ (166)	142

почвы; оцѣнка почвы по дѣлопроизрастающимъ (167) и воздѣлываемымъ (168) растеніямъ; изслѣдованіе экономическихъ условій почвы (168)	Стр. 158

СТРОЕНІЯ.

НОВЫЯ ПОСТРОЙКИ И ИСПРАВЛЕНІЕ СТАРЫХЪ (173). ОБЪЕМЪ ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ СТРОЕНІЙ (174)	173

ИНВЕНТАРЬ.

ИНВЕНТАРЬ ВЪ СКОТѢ (180). СКОТОВОДСТВО ВЪ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕГО ХОЗЯЙСТВА (182). ИНВЕНТАРЬ ВЪ ОРУДІЯХЪ (185). УМЕНЬШЕНІЕ ЦѢННОСТИ И РЕМОНТЪ (188)	180

ПЕРСОНАЛЪ ХОЗЯЙСТВА.

ОТНОШЕНІЕ ХОЗЯИНА БЪ ПЕРСОНАЛУ ИМѢНІЯ ВООБЩЕ.	193
НАЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ ДЛЯ УПРАВЛЕНІЯ И НАДЗОРА ЗА ХОЗЯЙСТВОМЪ: общія начала, относящіяся къ разрѣшенію вопроса о наличномъ составѣ персонала (195); устройство персонала для управленія хозяйствомъ въ частности (197)	195
РАБОЧИЯ СИЛЫ: постоянно работавшіе (203); поденныя и издѣльные рабочіе (212); выгоды и невыгоды поденной и издѣльной работы (215); средняя потребность въ поденщикахъ и издѣльныхъ рабочихъ, задѣльная плата (218)	203

СПОСОБЪ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕЙ.

РАЗЛИЧНЫЯ СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВА СЪ ОТНОСИМЫМИ БЪ НИМЪ СЪВООБОРОТАМИ: система хозяйства (223); водное хозяйство (225); выборъ наиболее соотвѣтственной системы (225); системы: нереложная (226), зерновая (227), улучшенная зерновая (228), плодосмѣнная (229) и выгонная (235)	223
ИЗСЛѢДОВАНИЕ ДОХОДНОСТИ СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВА И СЪВООБОРОТА	237
ВЫБОРЪ СЪВООБОРОТА И ВОЗДѢЛЫВАЕМЫХЪ РАСТЕНІЙ	243
ПРИМѢРЪ СМѢТНАГО ВЫЧИСЛЕНІЯ ДОХОДНОСТИ ВОСЬМИПольнаго СЪВООБОРОТА (249). Истощеніе сѣвооборотомъ (251). Изслѣдованіе массы корма (252)	249

ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНІЯ И ПОТРЕБНОСТЬ ВЪ НЕМЪ.

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ОПРЕДѢЛЕНІЯ КОЛИЧЕСТВА ПРОИЗВОДИМАГО НАВОЗНАГО УДОБРЕНІЯ	254
ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБЛЕНІЕ НАВОЗА ПРИ РАЗНЫХЪ СПОСОБАХЪ ХОЗЯЙСТВА (257). Статистика Набета (261)	257

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ.

ОРУДИЯ ОБРАБОТКИ И ИХЪ УПОТРЕБЛЕНІЕ	Стр. 266
Ручныя: заступы, вили, мотыки и кирки	267
Конныя	267
Однокорпусныя. Плугъ (269); выборъ плуга (270); плуги: передковые (274), полувисячіе (277) в висячіе (279); плужные салазки, тачки, вальны и вилы (282); загонные и оборотные плуги (283); окушники (283); подпочвенники или почвоуглубители (285); сохи, рала, литовская соха, косули, мекленбургское рало и богемское рухадло (287)	269
Многокорпусныя: дву- и трехкорпусные плуги (289); запашники (290); лущильные плуги (292); маркеры (294); эскитрипаторы, скоропашки, грубберы (294); скарификаторы (295); бороны (297); волокуши (303)	288
Катки	304
Орудія для обработки почвы между рядами растений	308
Выборъ орудій вообще	312
РАЗДѢЛКА НОВЫХЪ МѢСТЪ	317
Удаленіе воды (Спускъ водоемовъ. Осушеніе). Причины излишка воды въ почвѣ (317); тщательная вывѣдровка (320); возможность отвести воду (320); мѣры осушки: открытыя каналы (322), проведеніе канавъ (324), рытье канавъ и условія успѣшнаго дѣйствія ихъ (326), закрытыя каналы, дренаж: различное устройство и стоимость ихъ (323), дренажныя машины (331), достоинства и недостатки различныхъ дренажъ (333); различіе дренажъ по назначенію (333), глубина укладки трубъ и расстояніе между дренами (335), длина дрена и діаметръ трубъ (336), рытье дренажъ и укладка трубъ (337), стоимость дренажныхъ работъ (338), ангоды дренажной осушки (339)	317
Удаленіе камней (раздѣлка каменистыхъ почвъ)	340
Удаленіе дерна и дернинокъ (раздѣлка новыхъ мѣстъ изъ-подъ лѣса и паростыня): огнище или палю, дяло (343); поладокъ, сырость, валка дерешевъ и корчеваніе шней (344); древопалы (345); корчевальныя машины (347)	342
Удаленіе растений, образующихъ дернъ (раздѣлка задерѣжныхъ мѣстъ). Выжиганіе дерна: наѣзка дерна для выжиганія (351), сожиганіе дерна въ кучахъ—кубыши (353); сожиганіе дерна въ валкахъ (355); условія прижиганія выжиганія дерна (356); выжиганіе торфяныхъ болотъ (356); раздѣлка задерѣжныхъ мѣстъ безъ выжиганія (358)	350
КОРЕННЫЯ УЛУЧШЕНІЯ	360
Огораживаніе земельныхъ участковъ и защита ихъ отъ вѣтровъ. Деревянная изгородь (361). Проволочная изгородь (362). Каменная и земляная изгородь (363). Живая изгородь: выгоды (364); стоимость (365); выборъ растений (367); приготовленіе земли и временная изгородь (368); посадка растений (368); живая изгородь по валу (369); выращиваніе растений изъ сѣмянъ (371); размноженіе растений корневыми черенками и отпрысками, отводками и стеблевыми черенками (378); употребленіе дикорастущихъ растений (380); высота изгороди (381); ширина участка для обнесенія изгородію (381); уходъ за изгородью	

(381). Лѣсныя опушки (383); выборъ растений (385); подготовленіе почвы (387); посадка растений (388); уходъ за растениями (389)	Стр. 361
Укрѣпленіе летучихъ наносовъ: огораживаніе (391); прикрѣпленіе (392); растенія, пригодныя для укрѣпленія песковъ (393)	390
Навозка земель, наплавленіе, прудовое хозяйство, накопные пруды. Улучшеніе почвъ глубокой вспашкой (395). Улучшеніе почвъ навозкой землей (397); мергеля (398); торфа, болотнаго и луговаго чернозема и прудоваго ила (400), песку (401), глинѣ (402). Наплавленіе (403). Заилленіе (408). Прудовое хозяйство (410): качества прудовой воды (410) и прудовой почвы (411); глубина и положеніе пруда (412); устройство пруда (414) — прудовыя каналы (415), прудовое дно (416), прудовая плотина (417), водостокъ (420), плызы (424), перемычки (425), рѣшетки (426); пользованіе прудомъ — прудовый илъ (427), накопные пруды (428), засѣвъ пруда (428), пользованіе береговыми травой и деревьями и водными растениями (429)	395
Обжиганіе глинистыхъ почвъ (430). Навозка женой галпы (431)	430
Направленіе солончаковъ	433
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ	435
Обработка почвы (періодическая механическая обработка)	435
Спѣлость почвы	436
Задачи періодической механической обработки почвы	436
Приемы періодической механической обработки почвы	439
Обработка почвы отдельными орудіями (паханіе): загонное паханіе (440); паханіе въ гребни (441); паханіе въ балки (442); спланиваніе и распаханіе загонновъ (442); разбивка поля подъ вспашку въ загонъ (443); фигурное паханіе (444); спланиваніе паханіе (447); сравненіе различныхъ способовъ ровнаго паханія (447); недостатки и выгоды загоннаго паханія (449); случаи успѣшности загоннаго паханія (453); соединеніе загонновъ (453); требованія хорошей загонной вспашки (454); переходъ отъ загоннаго къ ровному паханію (455); обработка земли ручными орудіями: заступомъ и мотыкой (455); требованія хорошаго паханія вообще (456); условія правильнаго хода плуга (457); отношеніе ширины пласта къ его толщинѣ (460); взметъ, навозилъ, вспашка, двоеніе, мѣшаніе или троеніе, посѣвная вспашка (461); ширина и толщина пласта (462); глубина паханія (463); райольное и зопатное паханіе (466); направленіе и длина борозды (467); водосточныя борозды (468)	439
Обработка почвы безотдельными орудіями (эскитрипаторомъ, скоропашкой, скарификаторомъ)	472
Боронованіе (474) и употребленіе волокуши (479)	474
Укатываніе	480
Время посѣвъ и послѣдовательность примѣненія различныхъ приемовъ обработки почвы. Вліяніе на обработку почвы: влажности почвы (483); плотности почвы (483); засоренности почвы (486)—сорная трава одно-, дву- и многолѣтняя (486), причины засоренія и различныя мѣры очищенія почвы (489); климата — состоянія погоды и времени года (490); продолжительности времени, въ теченіи котораго можетъ обрабатываться почва и развиваться растенія	

(490); удобрения хлѣбнымъ навозомъ (491); растения (491) — чередование растений (491). Парь и различные виды его: зеленый, черный, занятый, полунарь и паровня растения (503); сравнение различныхъ видовъ наравъ между собой (506). Обработка земли при непосредственномъ слѣдованіи въ полѣ однихъ растений за другими (512); въ-подъ растений, почти неоставляющихъ почвѣ урожайныхъ остатковъ (513); въ-подъ растений, оставляющихъ живье (515) и въ-подъ многолетнихъ травъ (522); обработка почвы при удобрении ея хлѣбнымъ навозомъ (526), обработка земли въ пару (529); осенняя (529) и весенняя и лѣтняя (531) — призанатія паровыми растениями (531), въ занятыхъ (532), въ черномъ (534) въ полу (535) и зеленомъ (535) пару. Вліяніе обработки на очищеніе почвы отъ сорныхъ травъ (537)	483
Удобрение почвы (периодическая химическая обработка). Задача удобрения (538). Источеніе почвы (542) и различные виды его (543). Возстановленіе и усиленіе производительности почвы (544)	538
Удобрительныя вещества	546
Удобрительныя вещества царства минеральнаго: известняки (546); гипсъ (549); поваренная соль (550); съемочная соль (550); апатиты, фосфориты, самородъ (рогачъ, черный камень), остеолиты и конролиты (551) — измелеченіе ихъ (552), химическая обработка (553), суперфосфаты (554); чилийская селитра (556)	546
Удобрительныя вещества царства растительнаго: различные растительныя массы (солома, листья, морскія подорожки и т. д. (556), ихъ приготовленіе — тукъ Жоффре (557); живье (558); зеленое удобрение (558)	556
Удобрительныя вещества царства животнаго. Кости (560) — измелеченіе ихъ (561); поджариваніе и распариваніе (563), пережиганіе (565); костяная мука (565); сравненіе различныхъ способовъ подготовленія костей къ измелеченію (566); обработка костяной муки броженіемъ (566), кислотами — суперфосфатъ (567); разложеніе костей щелочами (570) и известью (572). Кровь (572); кровавые туки (574). Мясо (575); мясные туки (576); мясной порошокъ (576). Рыбное гуано (577). Гранатовое гуано (578). Морскія змѣды, раковины и майскіе жуки (579)	560
Отбросы	580
Изверженія животныхъ (581). Твердые и жидкія изверженія млекопитающихъ (581). Человѣческія изверженія — kloачныя воды, ночное золото и нудреты (583); очищеніе kloачныхъ водъ (587), орошеніе kloачными водами (590), фильтрація kloачныхъ водъ (592), недостатки водной канализаціи (593); пневматическая канализація (594); постоянныя ямы — ямная система (596); составъ (597) и количество (598) ночного золота; улучшеніе системы постоянныхъ ямъ — устройствомъ дна и стѣнокъ, употребленіемъ барометрическихъ бочекъ и насосовъ и дезинфицирующихъ средствъ — Сюверна (599) и раздѣленіемъ твердыхъ и жидкихъ изверженій (601); подвижныя ямы — бочечная, отвозная система (601); способы: Моссельмана	

Стр.

(603), Мюллера-Шюра (605), Генри Муле и Стандфорда (606); сравненіе стоимости различныхъ способовъ навозленія и удаленія человѣческихъ изверженій (606); Фламандскій тукъ (607); нудреть (609); компостъ (611). Изверженія птицъ и летучихъ мышей (612); гуано (613). Заводской и фабричной переработки. Животныхъ веществъ: костяной уголь (617); рога свина стружки (619); обрѣзки кожи (620); отбросы кожевенныхъ заводовъ (621); отбросы переработки шерсти: осадки промывныхъ водъ, шерстяная пыль, шерстяное тряпье (621); отбросы клееныхъ заводовъ: осажденная фосфорнокислая известь, клеевой тукъ, клеевая известь (623); шаварки (624); отбросы соленія сельдей (624) и приготовленія синильнаго кали (625)	581
Растительныхъ веществъ: отбросы маслобоенъ: жмыхи, грязный осадокъ и промывная жидкость (625), отбросы свеклосахарныхъ заводовъ: свекловичный жомъ, диффузионные остатки, меласса, мелассовая барда, патока, бардачный уголь, дефекационная грязь и осадки промывныхъ водъ (627); виноградыне, яблочные и оливковые жмыхи (628), кострики и мочильная вода (628); древесная опилки (629); соръ бумаго-прядильныхъ и табачныхъ фабрикъ (629); отбросъ приготовленія древесной уксусной кислоты (630)	617
Минеральныхъ веществъ: газовая вода и газовая известь (630); отбросы заведеній приготовленія искусственныхъ минеральныхъ водъ, содовыхъ заводовъ, известко-обжигательныхъ печей и солеварень, черновыя камни, — ялыга (631)	625
Разныя другія: зола — древесная, соломенная, княжковая, торфяная, бурого и каменнаго углей и сажы (632); подзолъ обыкновенный и вареконой соды или кална (632); дорожная грязь, шоссеиная пыль, прудовый илъ и мусоръ изъ помойныхъ ямъ (633)	630
Смѣшанные туки	632
Хлѣбной навозъ (636). Подстилочныя средства (636). Различіе хлѣбнаго навоза: по качеству изверженій — навозы крупнаго рогатаго скота, овечьи, конскіи и свиной (642); по качеству и количеству подстилочныхъ средствъ — соломенный навозъ (644); по времени, въ теченіи котораго навозъ накопляется, — навозъ: свѣжій, полунепрѣвѣвшій и непрѣвѣвшій (664); по способу накопленія и сохраненія хлѣбнаго навоза — въ хлѣвахъ подъ скотомъ, въ навозныхъ кучахъ или ямахъ (646); задача хорошаго сохраненія навоза (647); накопленіе навоза въ хлѣвахъ подъ скотомъ (648); накопленіе навоза въ гноищахъ: мѣсто для гноища (650), устройство гноища (651), уходъ за навозомъ въ гноищахъ (653); навозная жижа (653); сравненіе различныхъ способовъ сохраненія хлѣбнаго навоза (656)	636
Компостъ: компостные матеріалы (658); закладка компостныхъ кучъ (659); уходъ за компостными кучами (661)	636

Стр.

Дѣйствіе удобрительныхъ веществъ: постоянное (662); быстрота дѣйствія туковъ (664); измѣняющееся дѣйствіе туковъ (665)	Стр. 662
Способъ примѣненія туковъ (667); приготовленіе туковъ (668); время примѣненія туковъ (669); количество туковъ на десятину—интенсивность удобрения (673); глубина внесенія туковъ въ почву (675); толщина почвеннаго слоя, съ которымъ смѣшивается туки (676); распределеніе туковъ (676)—удобреніе соломою (684); смѣшеніе туковъ съ почвой (685); продолжительность дѣйствія туковъ и повтореніе удобрения (686)	667

УХОДЪ ЗА РАСТЕНІЯМИ.

УХОДЪ ЗА ПОЛЕВЫМИ РАСТЕНІЯМИ

Посѣвъ и посадка

Сѣмена (692). Вліяніе на проростаніе ихъ влажности, теплоты и кислорода (692); скорость проростанія (695). Развитие растенія изъ сѣмени (695); измѣненіе растенія подъ вліяніемъ вѣднѣхъ условій произрастанія (698) и культуры (700); видъ, полувидъ, разновидность, отродье, сортъ (701); качество сѣмени: происхожденіе (702); зрѣлость и скорость проростанія (703); продолжительность сохраненія сѣменемъ способности проростанія (704); вліяніе сѣменной массы на качество сѣмени (705); какъ средства опредѣленія качества сѣмени: вѣднѣе признаки (706), всхожесть (706), абсолютный вѣсъ (707), объемъ (708), удѣльный вѣсъ (709) и объемный вѣсъ ихъ (711); пурки (713). Качество сѣмянъ: вѣровность и чистота (714)	692
Полученіе хорошихъ сѣмянъ (717); у себя въ хозяйствѣ (717); отборъ изъ общаго урожая (717) и производство ихъ на особыхъ сѣменныхъ участкахъ (719); улучшеніе сѣмянъ искусственнымъ подборомъ и скрещиваніемъ (720); обновленіе сѣмянъ (720)	717
Приготовленіе сѣмянъ: намачиваніе (723), протравливаніе и удобреніе ихъ (724)	723
Время посѣва	724
Количество сѣмянъ на десятину	728
Выполненіе посѣва (730). Сѣялки: различныя системы (731), разбрасывающія сѣмя (735), рядовыя сѣялки (737), гнѣздовые сѣялки (739). Исполненіе посѣва съ разбросъ (742); прикрытіе посѣянныхъ въ разбросъ сѣмянъ (743); исполненіе рядоваго посѣва (746). Исполненіе гнѣздоваго посѣва—посадка (748). Чистый и смѣшанный посѣвъ (750). Подсѣвъ — покровное растеніе (751)	730
Разведеніе растеній рассадой — пересадка	752
Размноженіе растеній клубнями	754
Уходъ за растеніями во время произрастанія	755
Пріемы ухода. Увязываніе (755). Боронованіе (756). Мотыженіе (756). Окучиваніе (758). Поверхностное удобреніе (760). Орощеніе (760). Поддержка растеній — переніе (760). Продергиваніе, прорывка, изрѣживание (761). Подотье (762). Вырѣзываніе (763). Обкашивание, обрамиваніе и пасынкованіе растеній (763)	755

Стр.

Вредныя вліянія Погода—низкія температуры (765) частые рѣзкіе переходы отъ тепла къ холоду и обратно (766). Чрезмѣрно влажная погода (766), чрезмѣрно сухая погода (767), сильные дожди, сильные вѣтры и градъ (768). Несоотвѣтствующее состояніе почвы (768). Растенія — сорняки (769). Чужеродныя высшія растенія (771) и паразитныя грибы (771); головня (772), ржавчина (773), спорынья (774), мокрая гниль (774); обилие мѣры противъ паразитныхъ грибовъ (775). Вредныя животныя (776) и мѣры противъ нихъ (778)	765
Уборка растеній	783
Уборка срѣзываніемъ (784). Серпы (784). Косы — обыкновенная, съ лучкомъ, литовская (784). Гурбуша (785). Жатвенныя машины и косилки (786)	784
Уборка растеній срѣзкой осѣвъ наземныхъ частей	791
Уборка кормовыхъ травъ (791). Время уборки ихъ (791). Приготовленіе зеленого сѣна (793); сѣноворошители и копилы грабли (794); возы для сушки сѣна (796). Приготовленіе бурого сѣна (798). Приготовленіе квашеннаго корма (799)	791
Уборка зерновыхъ растеній	801
Время уборки	802
Длина оставляемаго жнивья	803
Различныя способы уборки и сравненіе ихъ между собой	804
Сушка убранныхъ растеній въ полѣ (805): вязка въ снопы (806) и складка: въ костры, крестцы, бабки — суслоны (807), шатры (808); сушка на острогахъ и озерекахъ (809); сушка безъ вязки въ снопы—въ бабкахъ (809) и одопкахъ (810)	805
Связка просушенныхъ растеній съ поля	810
Сушка свежихъ растеній въ овинахъ и ригахъ	811
Обмолотъ растеній: постоянный и временный токи (813); различныя способы обмолачиванія растеній: плунами, вытѣпываніемъ животными, телегами, катками и машинами и сравненіе ихъ между собой (814); молотилки продольныя и поперечныя (816); производительность различныхъ способовъ молотбы (817); различныя системы молотилокъ (817); вонные приводы (819); условія усиленнаго дѣйствія молотилокъ (821); соломотрясы (822); лучшія простыя молотилки (822)	813
Раздѣлка вороха: грохоченіе, вѣяніе, подсываніе, круженіе (823); очищеніе и сортированіе зеренъ (824); вѣялки, сортировки и зерноочистилки (825). Дальнѣйшее усовершенствованіе очищенія и сортированія зеренъ (828). Сложныя молотилки (830)	823
Уборка отдѣльныхъ частей растеній: плодовъ и плодорасположеній, цвѣтотъ и листьевъ	831
Уборка вырваніемъ съ корнемъ (теребленье)	833
Уборка выкапываніемъ. Время уборки (833). Картофелькочетомъ (834); корнеподъемники (835); связка корней и клубней (835)	833
Таблица съ данными относительно различныхъ полевыхъ растеній: продолжительность періода произрастанія, время высева или высадки въ поле, время уборки растеній, количество сѣ	

- мянъ на десятину при посѣвѣ въ разбросъ или рядами, средній хорошій урожай съ десятины, отношеніе между количествомъ зерна, клубней или корней съ одной и соломой и мякиной или ботвой съ другой стороны, вѣсъ четверника зеренъ, клубней или корней и число тысячъ зеренъ въ гарцѣ или фунтѣ 838
- Сохраненіе различнаго рода полевыхъ произведеній 836**
- Сохраненіе сноповаго хлѣба: въ скирдахъ — паздерны и подскирдыны (837); круглые и продолговато-четыреугольные скирды (842); кладка въ скирды (843); сохраненіе сноповаго хлѣба въ хлѣбныхъ сараяхъ, подъ навѣсами (845). Сохраненіе соломъ и мякины (846). Сохраненіе сѣна (847); прессованіе сѣна (848) 837
- Сохраненіе зерна: въ ямахъ (сидосахъ) (848). Сохраненіе зерна въ амбарахъ: амбары съ постоянными и переносными закромами (849); собственно закрома и сусѣки (849); сивалеровскія башни, закрома въ видѣ жалюзи, закрома съ отверстіями внизу (лотажи), выгребными ящиками или разборчатой стѣнкой (849); переносные закрома: снарядъ Валлери, безвоздушные цилиндры Лувеля, мѣшки, бочки и т. д. (851); расположеніе закрома въ амбарахъ и устройство самихъ амбаровъ (851). Чердаки для храненія кукурузныхъ початковъ (852). Уходъ за зерномъ въ амбарахъ (852). Потеря претерѣваемая зерномъ при храненіи (853). Сухка зерна (853). Зерносушильни различныя системы (854); сравненіе ихъ между собой (855) 848**
- Сохраненіе клубней и корней. Условія хорошаго сохраненія ихъ (856). Погреба, подвалы, лабазы, ямы и кучи (857). Устройство погребовъ, подваловъ и лабазовъ и сохраненіе въ нихъ корней и клубней (857). Ямы и кучи и сохраненіе въ нихъ клубней и корней (853). Квашеніе картофеля (862) 856**
- Бысады 862**
- УХОДЪ ЗА ЛУГОВЫМИ РАСТЕНІЯМИ (ЛУГАМИ).**
- Понятіе о лугѣ и выгонѣ. Качество луга опредѣляется качествомъ и количествомъ доставляемой имъ травы, сѣна, которое зависитъ: отъ рода произрастающихъ на лугу растеній (863) — характеристика главнѣйшихъ луговыхъ и выгонныхъ растеній изъ злаковыхъ, мотыльковыхъ и другихъ семействъ (864); отъ почвы, ея положенія и свойства ея поверхности (868); отъ климата (870) и отъ времени и способа уборки травы (870) 863
- Коренныя улучшенія луговъ: осушка болотистыхъ, мокрыхъ, излишне сырыхъ луговъ (870). Навозка земли, наплавленіе и заплывъ (870). Засыпка небольшихъ углубленій земель (870). Выравниваніе небольшихъ промозинъ, рывтинъ и ограниченіе обводовъ (870). Удаленіе кочекъ (871). Удаленіе кустарника и крупныхъ сорныхъ травъ (872). Увлажненіе луга (872): дѣйствіе воды, качество и количество ея, необходимыя для усиленнаго увлажненія луговъ (872); различныя системы увлажненія: затопленіе, подтопленіе и орошеніе одно- и двускатное — искусственныя и естественныя и орошеніе по системѣ Петерсена (873); условія прижитимости различныхъ способовъ увлажненія (878). Валоженіе повои или возобновленіе старой дернины: сплошное наложеніе дерна или пріяивка (879); засѣвъ луговыхъ травъ (880); примѣрная смѣсь травяныхъ сѣмянъ (882), травы для испытанія въ степныхъ мѣстностяхъ (881) 870**

Уходъ за лугами: проборнованіе луга (883); покосъ травъ (884); отомыка луга компостомъ (884); укатываніе луга (884); удобреніе луга (884); увлажненіе луга (885); выборъ времени для кошенія луга (886); пользованіе лугомъ (886); уничтоженіе протопивъ, сорныхъ травъ и кустарника (887); порешаніе луговъ (887) 883

ПОТРЕБНОСТЬ ХОЗЯЙСТВА ВЪ РАБОЧЕЙ СИЛѢ.

- ПОТРЕБНОСТЬ ВЪ РАБОЧЕМЪ СКОТѢ 888**
- Стоимость содержанія рабочаго скота. Расходъ на рабочихъ лошадей (891): годовая потребность въ кормѣ и подстилкѣ (891); стоимость годоваго содержанія одной рабочей лошади, не включая инвентаря и ухода (892); стоимость рабочаго инвентаря, рассчитаннаго на 4 лошадей (893); вся стоимость содержанія двухъ пароконныхъ упряжей, включая рабочихъ лошадей (893); полная стоимость одного рабочаго дня четырехъ, двухъ и одной лошади съ орудіемъ и рабочимъ (894). Расходъ на рабочихъ воловъ (894); стоимость годоваго содержанія пары воловъ (895).
- Урочное положеніе: для упряжныхъ работъ (896); дневная работа плуга (897); дневная работа экипировщиками, окучниками и прочими культиваторами (897); дневная работа сѣялокъ и жней (898); вычисленіе перевозочныхъ работъ (898); примѣрная смѣта потребныхъ въ хозяйствѣ упряжныхъ работъ (900). Для ручныхъ работъ (903) — при посѣвѣ, посадкѣ, уходѣ за растеніями во время произрастанія, при уборкѣ: кормовыхъ (903) и зерновыхъ растеній, льна (904) и корней и клубней, при молотьбѣ, при вѣяніи и очисткѣ зерна, при перекопкѣ земли, при удобреніи и при лядномъ хозяйствѣ (905). Потребность хозяйства въ пѣшихъ рабочихъ (905): работы по посѣву, по уборкѣ хлѣба, клевера, луговъ, корнеплодовъ и по удобренію (906) 896
- Затраты на упряжныхъ и ручныхъ работъ относительно ихъ распределенія между отдѣльными культурами (907). Картофель послѣ озимы; озимая пшеница послѣ рапса и пара (908); озимая рожь послѣ рапса и клевера; ячмень и овесъ послѣ корнеплодовъ (909); озимый рапсъ послѣ пара; вила на сѣно и зерно; клеверъ въ первомъ (910) и второмъ укосномъ году; луга (911). Паровая сила (912). Паровое наханіе по системѣ Фаулера съ двумя самокатами (912); данныя для учета его стоимости (913) 907

АРЕНДОВАНИЕ.

Виды аренды.

Арендованиемъ имѣнія называется опредѣленное договоромъ пользованіе чужой землею за извѣстное вознагражденіе' плательца условленною въ контрактѣ арендною платою.

По продолжительности срока пользованія арендуемымъ имѣніемъ различаютъ:

- 1) *Наслѣдственную аренду*, или пользованіе имѣніемъ неограниченное время, съ правомъ передачи его по наслѣдству.
- 2) *Срочную аренду*, или пользованіе имѣніемъ въ теченіе заранѣе опредѣляемаго, слѣдовательно ограниченаго времени, за условленную арендную плату.
- 3) *По жизненную аренду*—пользованіе имѣніемъ о смерти арендатора.

Первый и третій виды аренды въ договорахъ между частными лицами встрѣчаются какъ исключенія, а потому въ нижеслѣдующемъ будетъ идти рѣчь только о срочной арендѣ, которую для краткости мы будемъ называть просто «арендою».

Въ арендномъ договорѣ участвуютъ владѣлецъ имѣнія, сдающій его въ пользованіе, и арендаторъ. Взаимныя отношенія этихъ лицъ, а также ихъ отношенія къ имѣнію, опредѣляются договоромъ, называемымъ аренднымъ контрактомъ.

Цѣль владѣльца заключается въ обезпеченіи за собою опредѣленнаго ежегоднаго дохода, *рендты*, отъ имѣнія безъ затраты для этого собственнаго труда и отчасти капитала. Цѣлью арендатора служитъ добываніе, путемъ пользованія чужою землею, въ теченіе извѣстнаго срока сообразной своему труду и знаніямъ предприни-

мательской прибыли и соответственного процента на свой капиталъ, затрачиваемый на хозяйственное производство въ арендуемомъ имѣніи.

Арендаторъ долженъ вести хозяйство на основаніяхъ, определяющихъ вообще разумное производство, или промыселъ. Эта цѣль можетъ быть достигнута только при знаніи производства во всѣхъ его частяхъ и умѣнія практиковать его при всякихъ данныхъ мѣстныхъ обстоятельствахъ. Отдѣльныя части сельско-хозяйственнаго производства распадутся на земледѣліе, скотоводство, техническія производства и устройство всего хозяйства относительно организаціи его, веденія, управленія и контроля. Относящіяся сюда знанія, по скольку они основываются на научныхъ началахъ, приобретаются въ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ; по скольку же требуютъ опытности, они могутъ быть добыты путемъ самообученія.

Но мастерское *умѣнье* вести производство достигается только продолжительнымъ прилежнымъ практическимъ упражненіемъ во всѣхъ соответственныхъ сельско-хозяйственныхъ работахъ и операціяхъ. Лучшимъ средствомъ для пріобрѣтенія такой опытности и умѣнія можетъ служить болѣе или менѣе долгое пребываніе въ имѣніи хорошаго хозяина въ качествѣ волонтера, помощника или управляющаго, а также посѣщеніе лучшихъ хозяйствъ въ разныхъ мѣстностяхъ и странахъ, въ известной системѣ и при достаточной научной подготовкѣ.

Безъ этихъ условій выгодное веденіе сельско-хозяйственнаго производства невозможно. Обладаніе же ими и разумное ихъ примѣненіе составляютъ сущность понятія: «хорошій хозяинъ».

Такой хозяинъ возьметъ въ аренду лишь имѣніе, которое вполне соответствуетъ его тѣлеснымъ, духовнымъ и матеріальнымъ средствамъ, онъ извѣдуетъ выгоду этого имѣнія не только вообще, въ цифровомъ выраженіи, но въ особенности сопоставитъ еще вышеозначенныя *собственные средства* съ *посторонними силами*, которыя могутъ препятствовать развитію первыхъ. Къ такимъ препятствующимъ обстоятельствамъ могутъ быть отнесены: неблагоприятный климатъ, конкуренція арендаторовъ, наличный капиталъ, кредитъ, рабочія силы, не соответствующее характеру арендатора сельское населеніе, несходство характеровъ съ владѣльцемъ и т. под.

Необходимыя условія выгоды арендованія.

Одно изъ такихъ условій заключается въ непремѣнной обязанности арендующаго вычислять съ возможною точностью *чистый доходъ* отъ имѣнія, какъ при предположеніи *системы хозяйства*, кото-

рая велась *до него*, такъ и при той, которую онъ *намѣреается ввести* на будущее время. Первое даетъ основаніе для опредѣленія величины арендной платы, а второе — основанія для соображеній относительно величины процентовъ съ капитала, который арендаторъ желаетъ или можетъ затратить въ арендуемомъ имѣніи. Предпринимая такую работу арендующій хорошо сдѣлаетъ, если не будетъ полагаться на похвалы или порицанія *агентовъ*, которые преслѣдуютъ обыкновенно исключительно свои собственные выгоды. При вычисленіи чистаго дохода особенное вниманіе должно быть обращено на возможно вѣроятное опредѣленіе величины *среднихъ урожаевъ* всѣхъ растений, *приходовъ* отъ скота и *среднихъ цѣнъ* всѣхъ продуктовъ хозяйства. Основаніемъ для предположеній въ этомъ случаѣ служатъ главнымъ образомъ факты, сохранившіеся за предыдущіе годы въ счетоводствѣ имѣнія.

Но, еще не приступая къ вычисленію чистаго дохода, арендующій долженъ, съ описаніемъ имѣнія въ рукахъ, обозрѣть всѣ части хозяйства и обратить вниманіе на важнѣйшіе пункты.

Хозяйство представляетъ собою организмъ, котораго части тѣсно связаны другъ съ другомъ и должны находиться въ правильномъ между собою соотношеніи. Оно состоитъ обыкновенно изъ живыхъ помѣщеній для хозяина, лицъ для надзора и рабочихъ, изъ разныхъ хозяйственныхъ построекъ: скотныхъ дворовъ и хлѣбовъ, амбаровъ, сараевъ, кладовыхъ и пр. и изъ угодій разнаго назначенія: огородовъ, садовъ, полей, луговъ, выгоновъ, лѣса, древесныхъ насажденій, прудовъ и пр.

При обозрѣніи *строгой* для арендующаго имѣетъ меньшую важность ихъ капитальная цѣнность, нежели пригодность для тѣхъ назначеній, которыя требуются будущою системою хозяйства; главные вопросы съ этой точки зрѣнія заключаются въ томъ: *достаточно ли постройки по своимъ размѣрамъ и на сколько цѣлесообразно раздѣлено въ нихъ пространство*. Отсутствіе этихъ двухъ условій можетъ впоследствии давать себя чувствовать арендатору на каждомъ шагѣ: или невозможностью расширить ту или другую отрасль хозяйства (скота), или дурнымъ сохраненіемъ орудій и продуктовъ, частыми болѣзнями людей и животныхъ и т. под.

Но еще въ болѣе степени доходность хозяйства опредѣляется свойствами *земельныхъ угодій*; размѣры производства, къ которымъ способны послѣдніе, зависятъ отъ сдѣланныхъ обстоятельствъ:

1) *Величины пространства*, занимаемаго каждымъ видомъ угодій, которая видна изъ плановъ и картъ, находящихся въ документахъ имѣнія;

2) *Качества почвы*. О болѣе или менѣе плодородіи почвы можно отчасти судить по величинѣ урожаевъ за предшествующіе

годы; но одной этой точки опоры недостаточно, такъ какъ именно способъ хозяйства за прошедшіе годы оказываетъ большое вліяніе на урожай послѣдующихъ лѣтъ и притомъ тѣмъ большее, чѣмъ дольше продолжался первый и чѣмъ короче назначается срокъ аренды.

Поэтому, имѣя въ виду прошедшіе факты относительно урожая, арендующему необходимо произвести самому бопитиронку земель, причемъ его вниманіе должно быть обращено въ особенности на слѣдующіе пункты:

а) Расположеніе слоевъ земли, отношеніе почвы въ подпочвѣ; глубину почвеннаго слоя, присутствіе или отсутствіе въ подпочвѣ мергельныхъ слоевъ и пр.

б) Химическій составъ почвы, о которомъ можно судить по: 1) происхожденію почвы, 2) по исторіи воздѣлыванія тѣхъ или другихъ видовъ растений при извѣстномъ способѣ примѣненія удобренія, 3) по химическому анализу. Въ послѣднемъ впрочемъ, по его дороговизнѣ и недостаточности для практическихъ заключеній, можно со- штовать прибѣгать лишь въ томъ случаѣ, если наружные признаки даютъ поводъ предполагать въ почвѣ или подпочвѣ присутствіе въ большомъ количествѣ такихъ веществъ, которые опредѣляютъ *р- тительнымъ* образомъ свойства почвы, выборъ той или другой культуры, или удобрительныя средства хозяйства, какъ напри- мѣръ: известь, магнезія, мергель, желѣзо, поваренная соль, фосфораты, гипсъ и т. под.

с) Весьма важный, въ ряду другихъ, признаковъ для сужденія о почвѣ, представляетъ процентная доля въ послѣдней желкой земли, проходящей сѣнозъ сито; чѣмъ эта доля болѣе, тѣмъ болѣе основаній заключать о хорошемъ качествѣ почвы.

д) Хорошее стояніе культурныхъ растений на поляхъ;

е) Сильный ростъ деревьевъ и кустовъ, здоровая кора и крѣпкія вершины, а также роскошный ростъ дикихъ травъ на паровомъ полѣ, особенно травъ извѣстныхъ ботаническихъ видовъ.

ф) Соотношеніе въ почвѣ: глины, песка, извести и перегноя, и физическія свойства почвы, обуславливаемые этимъ соотношеніемъ.

3) Доходность имѣнія въ большой степени зависитъ также отъ расположенія земельныхъ угодій, относительно котораго арендующему необходимо обратить вниманіе на то: лежатъ ли угодія въ окружной междѣ, или разбросаны въ разныхъ мѣстахъ, пѣтъ ли череполосныхъ владѣній и въ какой степени это можетъ препятствовать педенію соответственной системы хозяйства, въ какомъ положеніи находится усадьба въ разныхъ видахъ угодій, лежатъ ли она посреди имѣнія, или на концѣ его.

4) Достаточны ли въ имѣніи источники воды.

5) На доходность имѣнія оказываетъ большое вліяніе его положеніе относительно рынка и путей сообщенія. Арендующій долженъ обратить вниманіе на разстояніе отъ ближайшаго пункта сбыта, на родъ и качество путей сообщенія, ведущихъ къ послѣднему и стоимость доставки къ нему продуктовъ хозяйства; на присутствіе или отсутствіе вблизи фабрикъ и заводовъ, близость скотопрогонныхъ трактовъ, которые могутъ быть причиною распространенія чумы рогатаго скота, на сервитуды, если они есть, и на многія другія, относящіяся сюда обстоятельства.

6) Наконецъ, чрезвычайно важное значеніе для хозяйства имѣетъ большая или меньшая населенность мѣстности, число и близость соседнихъ деревень, обезпеченность ихъ собственною землею и предположеніе рабочихъ рукъ—абсолютное и по разнымъ временамъ года.

Необходимыя для арендатора средства.

Арендующій не долженъ думать, чтобы для успѣшнаго арендованія было достаточно одного желанія, соединеннаго даже съ нужными сельско-хозяйственными знаніями. Для этого необходимы еще *деньги*, которыя должны находиться въ распоряженіи ранѣе, нежели начинается арендованіе. Требуемое *количество денегъ* въ каждомъ частномъ случаѣ должно быть точно опредѣлено вычисленіемъ суммъ, которыя потребуются: а) при самомъ пріемѣ арендуемаго имѣнія (см. контрактъ), б) для обезпеченія владѣльца залогомъ, с) для взноса арендной платы владѣльцу и д) для затраты капиталовъ въ попомъ хозяйства и педеніи послѣднего.

При подобныхъ вычисленіяхъ, можно со штовать арендующему предполагать ожидаемые приходы денегъ нѣсколько преувеличенными, а расходы—преуменьченными. Общаго правила для назначенія опредѣленной денежной суммы, потребной для арендованія, не можетъ быть установлено по самому существу дѣла, по разнообразію условій, въ которыхъ можетъ находиться имѣніе одного и того же размѣра, а потому на нижеслѣдующую норму, выработанную опытомъ странъ съ развитою арендною системою, должно смотрѣть лишь какъ на приблизительную точку опоры для соображеній арендатора въ его вычисленіяхъ.

Обыкновенно полагаютъ, что при долгосрочной арендѣ денежная сумма, которою долженъ располагать арендаторъ, превышаетъ въ 7—9 разъ величину арендной годовой платы; слѣдовательно, если послѣдняя = 1,000 руб., то арендаторъ долженъ имѣть для оборотнаго капитала 7,000—9,000 руб. Полагаютъ, что лишь при такихъ денежныхъ средствахъ арендаторъ можетъ разсчитывать на полученіе съ своего капитала большаго процента, нежели отъ обезпечен-

ныхъ государственныхъ и общественныхъ процентныхъ бумагъ. При краткосрочной арендѣ эта сумма должна быть еще болѣе.

Способъ выраженія величины потребной суммы отношеніемъ ея къ арендной платѣ принять потому, что величина послѣдней опредѣляетъ степень интензивности *) хозяйства болѣе всѣхъ другихъ условій, а степень интензивности, въ свою очередь, обуславливаетъ размѣръ, въ которомъ должны примѣняться въ хозяйствѣ трудъ и капиталъ.

Арендующій не долженъ опускать изъ вида, что для веденія хозяйства *при арендѣ* требуется болѣе капиталъ, нежели при собственномъ хозяйствѣ владѣльца, уже потому, что послѣдній *ренту* считаетъ своимъ доходомъ, которая для арендатора, напротивъ, составляетъ часть издержекъ производства. Какъ бы плодородна ни была почва, но безъ достаточнаго *инвентаря* она не можетъ давать соответственнаго дохода—и этотъ инвентарь долженъ быть заведенъ немедленно при началѣ аренды, такъ какъ каждый годъ промедленія будетъ влѣсть на уменьшеніе доходовъ въ теченіе всего срока аренды (амортизація оборотнаго капитала).

Еще важнѣе инвентаря для арендующаго обладаніе достаточнымъ капиталомъ для *текущихъ расходовъ* по веденію хозяйства: покупки сѣмянъ, найма рабочихъ силъ и т. под. При недостаткѣ капитала вообще, лучше нѣсколько сократить затрату на инвентарь, нежели нужную сумму для веденія хозяйства. Величина этой суммы зависить, конечно, отъ величины инвентаря, который приводится первою въ дѣйствіе. Въ видѣ приблизительной нормы можно положить, что денежная сумма, потребная для веденія хозяйства и текущихъ расходовъ, должна составлять около $\frac{1}{3}$ части величины капитала въ мертвомъ и живомъ инвентарѣ, взятыхъ вмѣстѣ. Если арендаторъ не обладаетъ указанными средствами и благополучно ведетъ свое дѣло, то это можетъ быть объяснено лишь крайне низкою арендною платою, причемъ арендаторъ пользуется частью ренты, которая должна была бы принадлежать владѣльцу.

Чрезмѣрно большой капиталъ требуется при арендованіи совершенно разстроенныхъ имѣній, не имѣющихъ ни строеній, ни инвентаря. Единственнымъ ручательствомъ выгодности арендованія, при подобныхъ условіяхъ, можетъ быть лишь весьма долгій срокъ аренды, который былъ бы достаточенъ для погашенія долгодѣйствующихъ капиталовъ и вознагражденія за чрезмѣрные затраты въ началѣ аренды возвышенными доходами будущихъ лѣтъ.

*) Хозяйство тѣмъ интензивнѣе, чѣмъ болѣе, и тѣмъ экстензивнѣе, чѣмъ меньше, труда и капитала затрачивается на единицу пространства (десятины). Поэтому понятія объ интензивномъ и экстензивномъ хозяйствѣ суть понятія относительныя.

Кредитъ и пользованіе имъ.

Кредитъ, которымъ можетъ пользоваться земледѣльческая промышленность, бываетъ двоякого рода: долго—и краткосрочный. Первый имѣетъ мѣсто лишь при залогѣ земли въ кредитныя ипотечныя учрежденія (товарищества взаимнаго поземельнаго кредита и поземельные банки) и поэтому доступенъ только землевладѣльцамъ. Арендаторъ же имѣетъ возможность пользоваться только краткосрочнымъ кредитомъ, который, въ свою очередь, имѣетъ двѣ формы: кредитъ личный и вещественный, смотря потому, обезпечивается ли взятая ссуда личными свойствами должника, или же денежнымъ имуществомъ его.

Перѣдки случаи, въ которыхъ арендаторъ, при недостаткѣ денежныхъ средствъ для *снятія имѣнія въ аренду и веденія новаго хозяйства*, прибѣгаетъ къ займу. Подобное пользованіе кредитомъ по большей части сопровождается весьма дурными послѣдствіями, потому что относительно высокіе проценты, при краткосрочномъ кредитѣ, поглощаютъ большую часть предпринимательскаго дохода арендатора. Арендваніе и веденіе хозяйства на занятый капиталъ можетъ быть выгоднымъ только въ исключительныхъ, рѣдкихъ случаяхъ: или когда землевладѣлецъ соглашается брать ренту, меньшую истинной, или если арендатору, по личнымъ условіямъ, удастся сдѣлать заемъ за ненормально низкіе проценты, или же, наконецъ, въ случаѣ особыхъ выгодныхъ комбинацій для хозяйства, наступающихъ послѣ снятія аренды и значительно возвышающихъ доходъ даннаго имѣнія.

Но если хозяйство снято и ведется на собственный капиталъ, то *временное пользованіе недорогимъ* кредитомъ можетъ быть не только безопаснымъ, но даже въ высокой степени выгоднымъ для арендатора, особенно въ тѣхъ многочисленныхъ хозяйственныхъ операціяхъ, въ которыхъ прѣменный заемъ избавляетъ отъ необходимости производить продажу продуктовъ въ невыгодное время, или же даетъ возможность воспользоваться какимъ либо благоприятнымъ сочетаніемъ обстоятельствъ для осуществленія того или другаго предпріятія. Но, чѣмъ *большимъ* кредитомъ пользуется арендаторъ въ подобныхъ случаяхъ, тѣмъ болѣе обязательно для него осторожное пользованіе этимъ орудіемъ, тѣмъ опаснѣе неправильное его примѣненіе. Во-первыхъ, размѣры пользованія кредитомъ не должны превосходить возможности для арендатора уплаты долга по всякое время съ помощію одного собственного имущества; съ другой же стороны, операція, для которыхъ совершается заемъ, должны приносить непременно болѣе проценты, нежели тѣ, которые слѣдуютъ въ уплату по сдѣланному займу. Въ обратномъ случаѣ, какъ бы ни были низки проценты по займу, послѣдній всегда будетъ слиш-

вомъ дорогимъ и невыгоднымъ. Арендаторъ долженъ всегда помнить основной законъ, что кредитъ, самъ по себѣ, не создаетъ никакихъ новыхъ капиталовъ, и что онъ лишь служитъ посредникомъ для пользованія ими.

При займѣ подъ вексель (способъ, которымъ арендатору приходится пользоваться всего чаще), слѣдуетъ считать конечно правиломъ полное знакомство со свойствомъ этого документа и тѣмъ законодательствомъ, которое существуетъ въ странѣ по вексельному праву.

Въ большей части случаевъ, арендаторъ долженъ прибѣгать къ *личному кредиту*, при которомъ ссуда обеспечивается его личными свойствами и между ними особенно: его интеллигенціей, рабочею способностью и честностью. Какъ ни развиты эти качества въ арендаторѣ, однако подобныя гарантіи всегда слабѣе вещественной и уже по одному этому процентъ по такимъ займамъ всегда относительно высокъ. Но онъ возвышается еще тѣмъ, что въ большинствѣ случаевъ арендаторъ не можетъ занимать деньги на очень короткий срокъ, какъ это бываетъ въ фабричномъ и торговомъ промыслѣ; большая часть сельско-хозяйственныхъ операций требуютъ значительнаго срока (иногда нѣсколькихъ лѣтъ) для того, чтобы принести окончательные результаты и возратить затраченный капиталъ съ соотвѣстной прибылью. При такихъ свойствахъ кредита, тѣмъ болѣе необходимо, при каждомъ займѣ, весьма точное вычисленіе доходности операций, для которой предназначается этотъ заемъ.

Выгоды пользованія кредитомъ значительно увеличиваются, если въ странѣ, вблизи отъ хозяевъ, имѣются особые кредитныя учрежденія, предназначенныя удовлетворять потребностямъ сельскаго хозяйства въ краткосрочномъ кредитѣ. Будучи устроены въ расчетѣ на сельско-хозяйственныя отношенія, такія учрежденія могутъ регулировать условія ссудъ — съ тѣми цѣлями, для которыхъ они служатъ хозяевамъ, имѣютъ возможность близко узнавать промышленное положеніе и свойства заемщиковъ и въ то же время могутъ довольствоваться меньшимъ процентомъ, нежели кредиторы — частныя лица.

Арендный контрактъ.

Такъ какъ всѣ отношенія между арендаторомъ и владѣльцемъ должны быть опредѣлены съ ясностью въ арендномъ контрактѣ, то изслѣдованіе составныхъ частей послѣдняго исчерпываетъ большую часть вопросовъ объ арендѣ. Въ первой изъ четырехъ частей контракта, должны быть опредѣлены основанія аренды, заключающіяся: 1) въ обозначеніи предметовъ договора, 2) опредѣленіи срока арендованія и 3) величины арендной платы.

ЧАСТЬ I.

I. Предметы аренднаго контракта.

Въ аренду почти никогда не отдается все имѣніе со всѣми его принадлежностями; всегда нѣкоторые предметы *устраиваются* со всѣмъ изъ аренды, другіе *продаются* арендатору и наконецъ, нѣкоторые предоставляются въ арендное пользованіе, какъ *железныя инвентарь*. Отсюда вытекаетъ необходимость точнаго перечисленія въ контрактъ всѣхъ составныхъ частей имѣнія и условій, на которыхъ сдается арендатору каждая изъ нихъ. Слѣдующая классификація составныхъ частей имѣнія можетъ быть рекомендована, какъ весьма удобная.

A. Вещественныя составныя части.

- 1) *Недвижимыя*: земельныя угодія, дороги, воды, строенія, мосты, плодовые сады и т. д.
- 2) *Движимыя*: а) мертвый инвентарь машинъ, орудій и утвари и б) живой инвентарь: рабочаго и продуктивнаго скота *).
- 3) Составныя части имѣнія, которыя въ теченіе извѣстнаго времени бываютъ соединены съ недвижимыми, но:
 - а) Могутъ быть отдѣлены отъ нихъ для какаго-либо иного пользованія и переходить въ разрядъ движимыхъ: напр. полевой инвентарь, лѣсныя деревья.
 - б) Остающіяся при употребленіи соединенными съ недвижимыми составными частями, но которыя могутъ быть безъ измѣненія вещества отдѣлены отъ послѣднихъ, перенесены и, слѣдовательно, стать движимыми: напр. приспособленія для отопленія печей.

B. Невещественныя составныя части.

- 1) *Права имѣнія*.
- 2) *Обязанности*, или повинности, лежащія на имѣніи.

Всѣ перечисленныя составныя части имѣнія должны быть описаны въ контрактѣ съ возможною точностью. Такое описаніе имѣнія служитъ первымъ основаніемъ контракта. Затѣмъ, долженъ быть рѣшенъ вопросъ о формѣ сдачи каждой составной части въ пользованіе арендатору. Этихъ формъ четыре: 1) сдача въ пользованіе

*. *Продуктивнымъ* или *пользовательнымъ* скотомъ называются всѣ виды скота за исключеніемъ рабочихъ лошадей и воловъ.

(аренда въ тѣсномъ смыслѣ), 2) сдача какъ желѣзнаго инвентаря *), 3) продажа арендатору и 4) уступка арендатору безвозмездно съ обязательствомъ при обратной сдачѣ замѣнить подобными же предметами. Относительно удобства той или другой формы сдачи разныхъ составныхъ частей имѣнія, опытъ странъ съ развитою арендною системою приводитъ къ слѣдующимъ заключеніямъ.

Изъ *недвижимыхъ составныхъ частей* имѣнія только немногія не могутъ быть передаваемы арендатору въ пользованіе (1 форма), а именно такія, пользованіе которыми можетъ повести къ ихъ уничтоженію (каменоломни, торфяники), а также такія, пользованіе которыми совершается въ *большіе промежутки времени и постоянное* пользованіе возможно только въ томъ случаѣ, если мѣра пользованія *каждый отдѣльный разъ* ограничивается опредѣленною величиной: напр. средне-и высокоствольные лѣса; низкоствольные же, съ короткимъ оборотомъ рубки, могутъ, безъ вреда для владѣльца, сдаваться въ пользованіе. За этими исключеніями, всѣ земельныя угодія и строенія правильнѣе сдавать въ аренду, или пользованіе. Плодовые деревья удобнѣе для обѣихъ сторонъ сдавать на условіи желѣзнаго инвентаря.

Движимыя составныя части имѣнія отличаются тѣмъ, что всѣ они при пользованіи *потребляются*: нѣкоторые, какъ запасы пищи, удобренія, сѣмена и т. под. въ теченіе одного года, или даже одного раза употребленія; другія, какъ мертвый и живой инвентарь — въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, въ большинствѣ случаевъ, еще до истеченія аренднаго срока. Если, не смотря на потребленіе самаго вещества движимыхъ предметовъ, они все-таки сдаются въ арендное пользованіе (ф. 1), то при этомъ требуется съ одной стороны огражденіе арендатора въ случаѣ, если порча или потеря происходитъ не по его винѣ, а съ другой стороны еще болѣе необходимы въ контрактѣ мѣры обезпеченія владѣльца въ обратномъ полученіи всѣхъ этихъ предметовъ въ состояніи цѣности при началѣ аренды. Такія мѣры чрезвычайно стѣсняютъ арендатора, такъ какъ онъ совершенно связанъ полученнымъ инвентаремъ, не можетъ его измѣнять, когда этого потребуютъ обстоятельства, по неволѣ долженъ вести извѣстную отрасль скотоводства и т. под. Поэтому, въ настоящее время въ арендахъ западной Европы считается условіемъ необходимости, чтобы на всѣ *движимыя составныя части имѣнія* арендаторъ получалъ *право собственности*. На практикѣ это достигается или предоставленіемъ арендатору права сдавать обратно другой

*) Подъ именемъ желѣзнаго инвентаря разумѣютъ обозначеніе такихъ предметовъ, которые при сдачѣ оцѣняются и предоставляются для пользованія арендатору на условіи по окончаніи аренднаго срока возратить владѣльцу каждую вещь той же доброты, или же за каждую уплатить оцѣночную сумму.

инвентарь и движимости вообще (а не полученный въ началѣ аренды) съ доплатою разности въ цѣности, или, что предпочитается, путемъ полной продажи инвентаря арендатору при началѣ аренды, или соединеніемъ обоихъ названныхъ способовъ, причемъ часть инвентаря передается по первому способу, а другая — по второму. Всѣ движимости, по отношенію къ формѣ сдачи, могутъ быть раздѣлены на двѣ категоріи: 1) имѣющія опредѣленную цѣнность — рыночную, или такую, которую легко вычислить (напр. по стоимости произвѣстна), и 2) не имѣющія опредѣленной цѣны. Предметы первой категоріи удобнѣе для обѣихъ сторонъ передавать арендатору прямою продажей; сюда относятся: роды скота, машины, орудія и утварь. Ко второй категоріи принадлежатъ: сѣно, солома и удобреніе. Уже одно опредѣленіе ихъ количества представляетъ не мало трудностей; они не имѣютъ по большей части рыночной цѣны, эта послѣдняя еще чаще не соответствуетъ цѣности употребленія такихъ предметовъ въ хозяйствѣ; послѣднюю же цѣнность опредѣлить или чрезвычайно трудно, или невозможно въ практической сдѣлкѣ. Поэтому можно рекомендовать: сѣно, солому, навозное удобреніе, и вообще предметы, не имѣющіе рыночной цѣны — сдавать безъ всякаго одновременнаго денежнаго вознагражденія со стороны арендатора, но съ обязательствомъ послѣдняго при обратной сдачѣ имѣнія представить, приблизительно, равныя количества означенныхъ предметовъ или нѣсколько меньшія, при чемъ разность въ количествѣ можетъ быть доплачена деньгами по обратной оцѣнкѣ, что не можетъ имѣть особенныхъ неудобствъ при небольшихъ количествахъ. Для владѣльца такое условіе представляетъ ту выгоду, что оно ограничиваетъ арендатора въ его стремленіи производить въ послѣдніе два года аренды менѣе сѣна, соломы и навоза; но въ тоже время стѣсняетъ его весьма мало, такъ какъ названные предметы требуются въ большинствѣ системъ хозяйства.

Затѣмъ, въ вышеприведенной классификаціи слѣдуетъ 3-я группа составныхъ частей имѣнія: а) падающихъ въ соединеніи съ недвижимыми частями имѣнія, но которыя могутъ быть отдѣлены отъ послѣднихъ; сюда принадлежатъ: такъ называемый, *полевой инвентарь*, т. е. хлѣбъ, корнеплоды и др. растенія, еще неубранныя во время вступленія арендатора. Эти продукты принадлежатъ, очевидно, предыдущему хозяину и слѣдовательно возникаетъ вопросъ, на какихъ условіяхъ должны они передаваться арендатору: сдачею въ пользованіе, эквивалентною замѣною при обратной сдачѣ аренды натурою, или отчужденіемъ.

Сдача въ пользованіе (т. е. безъ особой уплаты при вступленіи въ аренду) не можетъ быть рекомендована потому, что эта форма предполагаетъ при обратной передачѣ имѣнія владѣльцу полное воз-

вращение всѣхъ продуктовъ патурою, которые стояли на корню, или находились въ землѣ при вступленіи арендатора. Но это значило бы принудить послѣдняго въ теченіе цѣлыхъ двухъ, трехъ послѣднихъ лѣтъ аренды вести ту систему хозяйства, которая существовала при началѣ аренды; между тѣмъ какъ перѣдко вси года арендатора состоитъ въ измѣненіи старой системы хозяйства.

Слѣдовательно, остается выборъ между двумя формами продажи и эквивалентнымъ замѣщеніемъ принятаго урожая въ концѣ аренды, не обращая вниманія на родъ продуктовъ. Первый способъ невозможенъ въ странахъ съ не очень богатымъ состояніемъ арендаторовъ и вообще бѣдной капиталами. Слѣдовательно, остается послѣдній способъ, который распадается на двѣ формы:

1) Всѣ продукты, снятые съ земли и передаваемые арендатору, оцѣниваются на корню по вѣроятности урожая и цѣны; полученная сумма считается отданною въ кредитъ арендатору; въ концѣ аренды дѣлается такая же таксація на поляхъ арендатора, передаваемыхъ владѣльцу; разность между обѣими суммами выплачивается деньгами. Сверхъ того, арендаторъ уплачиваетъ проценты съ полученной суммы — всей, или опредѣленной ея части.

2) При сдачѣ и обратной передачѣ имѣнія дѣлается оцѣнка всѣхъ издержекъ производства, по условленнымъ цѣнамъ (на 1 дес. ржи: на удобреніе=9 р., посѣвъ 4 р., обработка=3 р.=16 р.) съ даннаго пространства. При сдачѣ и обратной передачѣ, противная сторона уплачиваетъ другой за принимаемая культуры по стоимости производства ихъ съ даннаго пространства. Эта стоимость производства условливается заранѣе къ контрактѣ. Послѣдняя форма представляется наиболѣе удобною также для передаваемыхъ арендатору *воздѣланныхъ огородовъ* съ неснытыми продуктами. *Плодовые деревья*, относящіяся также къ рассматриваемой группѣ, лучше сдать по оцѣнкѣ съ обязательствомъ арендатора при обратной сдачѣ имѣть такую же цѣнность въ общей суммѣ деревьевъ, а разность доплачивать деньгами. Тоже относится къ сдаваемымъ древеснымъ питомникамъ и отдѣльнымъ деревьямъ, или группамъ послѣднихъ, стоящимъ на арендуемой землѣ.

Второй отдѣлъ третьей группы составныхъ частей имѣнія составляютъ предметы, соединенные съ недвижимыми частями, которые хотя и могутъ быть отдѣлены отъ послѣднихъ, но ими можно пользоваться только пока они соединены съ первыми. Сюда относятся въ особенности разныя принадлежности строеній: печи, очаги, каменные непереносныя корыта и т. под. Такъ какъ эти предметы могутъ служить хозяйству только когда они находятся въ нормальномъ состояніи и такъ какъ цѣнность ихъ не подвержена значительнымъ измѣненіямъ, то лучшая форма сдачи для нихъ служить пе-

редача на основаніяхъ желѣзнаго инвентаря, т. е. съ обязательствомъ сдать по первоначальной цѣнности.

Послѣднюю группу составныхъ частей имѣнія, подлежащихъ арендѣ, составляютъ *права и обязанности*. Права имѣнія хозяйственнаго характера, какъ напр. пользованіе выгономъ на чужой землѣ, пользованіе естественными водами и т. под. должны быть, конечно, передаваемы *въ пользованіе*. Права же пехозяйственныя, какъ напр. полученіе оброка съ крестьянъ, могутъ быть передаваемы въ пользованіе или исключены изъ аренднаго условія, смотря по обоюдному удобству. *Обязательства*, лежащія на имѣніи, по отношенію къ арендному договору, могутъ быть двоякаго рода: 1) права пользованія въ арендуемомъ имѣніи со стороны другихъ лицъ, какъ напр. сервитуды, прогоны скота и т. под.; натуральныя повинности, какъ подводная, постояная, пожарная и т. под. Всѣ подобныя обязательства должны быть переданы арендатору, такъ какъ они могутъ выполняться только *хозяйствомъ* въ данной мѣстности; 2) обязательства, состоящія въ ежегодныхъ денежныхъ взносахъ, каковы государственныя и земскія налоги. Характерное качество этихъ обязательствъ относительно аренды состоитъ въ непостоянствѣ ихъ величины. Такъ какъ они, по большей части, относятся къ владѣнію землей и имѣютъ источникомъ земельную ренту, то можно считать справедливымъ справедливости, чтобы арендаторъ принималъ на себя нѣзъ обязательствъ, которые могутъ выполняться съ равнымъ удобствомъ также и владѣльцемъ, лишь такія, которые *ограничены* по своему размѣру и могутъ быть *извѣстны* арендатору. Такъ напр., арендаторъ можетъ принять на себя государственныя поземельныя налоги, если они не подвержены измѣненіямъ. Наибольшее затрудненіе представляютъ для аренды земскія повинности, такъ какъ обязательство взноса ихъ равно неудобно для обѣихъ сторонъ: для владѣльца потому, что эти взносы дѣлаются небольшими суммами и перѣдко въ неопредѣленные сроки; для арендатора, потому что величина ихъ чрезвычайно колеблется. Эти неудобства въ значительной степени устраняются при слѣдующемъ условіи. Въ контрактѣ опредѣляется извѣстная наибольшая сумма, до которой арендаторъ обязывается вносить подобнаго рода налоги; эта сумма должна быть рассчитана въ предположеніи, что налоги постепенно возвышаются. Если же потомъ окажется, что сумма вычислена ошибочно и арендаторъ платилъ ежегодно болѣе, то можетъ быть поставлено условіе, по которому владѣлецъ, по окончаніи аренды, возвращаетъ арендатору или сумму всѣхъ переплаченныхъ послѣднимъ излишковъ, или же извѣстную долю этой суммы.

По рѣшеніи всѣхъ поставленныхъ выше вопросовъ въ арендномъ договорѣ утверждается:

II. Сро́къ аренды.

Начало аренды, или *вступленіе* арендатора въ хозяйство, должно совпадать съ началомъ хозяйственного года.

Началомъ года считается тотъ періодъ въ хозяйствѣ, когда продукты предъидущаго года, въ большей части своей, потреблены или вышли изъ хозяйства, вслѣдствіе продажи, и когда продукты новаго года еще не получены. Этотъ періодъ совпадаетъ съ временемъ между окончаніемъ весеннихъ полевыхъ работъ подъ яровыя растенія и началомъ уборки; слѣдовательно, около 1 июля. Въ это время въ хозяйствѣ находится наименьшее количество запасовъ продуктовъ, облегчающее отъѣзду и передачу имѣнія арендатору. Такимъ образомъ, 1 июля можно считать удобѣйшимъ срокомъ для вступленія въ аренду.

Относительно *продолжительности* аренды всѣ сельско-хозяйственные писатели высказываются за *долгосрочную* аренду и притомъ — тѣмъ болѣе продолжительную, чѣмъ менѣе устроено арендуемое имѣніе. Наиболее распространенный въ Германіи срокъ аренды — 12-лѣтній; рѣдко 9 — и весьма часто — 18-лѣтній. Опредѣленіе *числа лѣтъ* прежде было подчинено правилу, чтобы оно было кратное 3-хъ, такъ какъ всюду велась 3-хъ польная система и считалось правиломъ, чтобы арендаторъ могъ воспользоваться полнымъ сѣвооборотомъ. Въ настоящее время соображеніе числа лѣтъ аренды съ числомъ лѣтъ сѣвооборота считается совершенно излишнимъ, такъ какъ почти всегда арендаторъ ведетъ не одинъ, но два и три различныхъ сѣвооборота, смотря по качеству земли. Слѣдовательно, число лѣтъ, соображенное съ однимъ сѣвооборотомъ, не совпадаетъ бы съ другимъ, и пр. Поэтому, число лѣтъ аренды, при условіи ея долгосрочности, можетъ быть выбрано произвольное.

Опредѣленный въ контрактѣ срокъ аренды можетъ быть, по требованію обстоятельствъ, *сокращаемъ* и *продолжаемъ*. Первое можетъ происходить по *предуведомленію* о превращеніи договора со стороны владѣльца, или арендатора; вслѣдствіе *продажи* имѣнія; или же *въ случаѣ смерти* владѣльца или арендатора; второе — на основаніи договора о продолженіи контракта далѣе установленнаго срока. *Сокращеніе* установленнаго срока аренды по произвольному *предуведомленію* съ той или другой стороны (обыкновенно за годъ), вводимое въ контрактъ, какъ правило, равно невыгодно для арендатора и владѣльца; для пернаго потому, что связываетъ его по всѣмъ долгосрочнымъ капитальнымъ затратамъ, владѣльца потому, что можетъ разстроить всѣ его планы, рассчитанные на свободу отъ занятія своимъ имѣніемъ, въ теченіе времени аренды. Поэтому, обоюдное право прекращать договоръ ранѣе установленнаго въ контрактѣ

срока можетъ быть допущено лишь въ видахъ охраненія интересовъ одной стороны отъ злоупотребленія другой, или же на случай необыкновенныхъ событий. Напр. въ Пруссіи арендаторъ имѣетъ право прекратить аренду въ случаѣ войны и мобилизаціи всей арміи; владѣлецъ можетъ прекратить аренду въ случаѣ неуплаты ренты арендаторомъ, конкурса надъ имуществомъ послѣдняго и т. п.

Случай продажи имѣнія долженъ быть специально оговоренъ въ контрактѣ по отношенію къ продолженію аренды; лучше всего — оставить за владѣльцемъ право прекращать при этомъ аренду, но съ непремѣннымъ условіемъ вознагражденія арендатора, какъ за сдѣланныя затраты, которыми онъ не успѣлъ воспользоваться, такъ и за тѣ выгоды, которыхъ онъ лишается, вслѣдствіе уменьшенія срока пользованія своимъ капиталомъ, въ арендуемомъ имѣніи.

Относительно *случая смерти арендатора* для него выгоднѣе имѣть право удержать аренду за своими послѣдниками; такъ какъ только при такомъ условіи онъ можетъ рассчитывать передать своимъ роднымъ плоды своего труда и капитала; въ противномъ случаѣ, предположеніе возможности смерти, будетъ останавливать арендатора отъ затратъ, перѣдко необходимыхъ. Но для обезпеченія отъ нѣкоторыхъ неудобствъ при этомъ владѣльца, право продолженія аренды послѣдниками можетъ быть ограничиваемо въ контрактѣ извѣстными (конечно легко исполнимыми) условіями: напр. при малолѣтствѣ дѣтей — право владѣльца соглашаться или нѣтъ на веденіе аренды тѣмъ или другимъ лицомъ, заступающимъ мѣсто опекуна. Въ *случаѣ смерти владѣльца*, аренда превращается, если владѣніе было пожизненное; при наследственномъ же владѣніи требуется въ контрактѣ специальное соглашеніе относительно того, прекращается ли аренда со смертію владѣльца, или наследники обязываются оставить аренду до установленнаго срока. Припудительное *право продолженія* аренды далѣе контрактнаго срока въ хозяйственномъ отношеніи равно предно, дается ли оно владѣльцу, или арендатору. Самымъ лучшимъ условіемъ можетъ быть рекомендовано ясное обозначеніе въ контрактѣ, что продолженіе аренды можетъ имѣть мѣсто лишь въ случаѣ новаго письменнаго соглашенія передъ наступленіемъ окончанія аренднаго срока.

III. Арендная плата.

Можетъ состоять изъ:

1) *Деньгахъ*: а) опредѣляется постоянная ежегодная сумма въ деньгахъ на все время аренды, б) денежная арендная плата въ теченіе аренды ежегодно возвышается въ степеняхъ, указанныхъ въ контрактѣ.

состоитъ въ самомъ способѣ ея вычисления, который заключается въ слѣдующемъ: опредѣляется валовой доходъ отъ хозяйства и издержки производства; разность составляетъ *чистый доходъ*. Въ этомъ послѣднемъ заключаются: 1) проценты съ капиталовъ, затраченныхъ въ хозяйство, 2) вознаграждение за трудъ хозяина по веденію производства и 3) рента. Последняя можетъ быть опредѣлена только вычитаніемъ изъ чистаго дохода первыхъ двухъ величинъ, изъ которыхъ первая можетъ быть вычислена безъ затрудненія, но вторая—должна быть назначена совершенно произвольно, такъ какъ трудно оцѣнить личную дѣятельность хозяина. Арендаторъ желаетъ назначить ее возможно большею, а владѣлецъ, напротивъ, по возможности—уменьшить. Вопросъ можетъ быть рѣшенъ только конкуренціею и взаимнымъ соглашеніемъ. При вычисленіи чистаго дохода отъ хозяйства, въ основаніе оцѣнки всѣхъ видовъ валоваго дохода и издержекъ производства, конечно, должны быть положены средніе цѣны за послѣднее 10-лѣтіе съ опущеніемъ двухъ наибольшихъ и двухъ наименьшихъ, а также среднія величины для ожидаемыхъ урожаевъ и приходовъ во всѣхъ частяхъ валоваго дохода. Такимъ только образомъ можетъ быть опредѣленъ *средній чистый доходъ*, а слѣдовательно и *средняя рента*. Въ контрактѣ должна быть точно означена какъ самая величина арендной платы, такъ и способъ ея уплаты.

Уменьшеніе арендной платы въ теченіе аренды. Не смотря на самое точное вычисленіе соответственной арендной платы, въ теченіе арендованія могутъ произойти такіе несчастныя событія въ хозяйствѣ, послѣ которыхъ арендаторъ не можетъ оправиться. Поэтому арендаторы обыкновенно требуютъ, чтобы часть потери отъ *несчастныхъ случаевъ* принималъ на себя владѣлецъ путемъ уступки известной части установленной арендной платы. Если на такое условіе владѣлецъ согласится, то въ контрактѣ опредѣляются слѣдующіе пункты: 1) какинъ неблагоприятныя событія должны считаться (пожаръ, чума, градобитіе, вредъ отъ нашествій); 2) при какой степени нанесеннаго несчастнымъ случаемъ вреда арендаторъ можетъ требовать соучастія владѣльца (при какой долѣ выбитаго градомъ пространства подъ хлѣбомъ; при какомъ процентѣ вынавшаго скота и т. д.); 3) кѣмъ, когда и по какому способу совершается оцѣнка потери; 4) въ какой мѣрѣ потеря раздѣляется между арендаторомъ и владѣльцемъ и 5) какинъ образомъ помѣняются установленныя въ контрактѣ условія относительно сроковъ и количества вносовъ арендной платы послѣ несчастныхъ случаевъ.

Но спорить много о томъ, полезно ли вообще вводить въ контрактъ подобное обязательство владѣльца, которое ведетъ за собою

на практикѣ, при разрѣшеніи поставленныхъ вопросовъ, чрезвычайныя затрудненія. Большая часть писателей раздѣляетъ мнѣніе, что въ странахъ съ развитою культурою, гдѣ повсемѣстно распространены общества страхованія отъ огня, града, падежей и т. д., гдѣ притомъ системы хозяйства ведутся не по шаблону для обширныхъ мѣстностей, но отличаются чрезвычайнымъ разнообразіемъ на малыхъ пространствахъ, гдѣ индивидуальному развитію талантовъ хозяина ничто не препятствуетъ, тамъ обязательство владѣльца участвовать въ потеряхъ арендатора не должно имѣть мѣста, такъ какъ, путемъ страхованія, кредита и комбинаціи культуръ, арендаторъ достаточно можетъ обезопасить себя отъ разоренія. Исключенія могутъ представить только случаи: войны или чрезвычайнаго наводненія, требующіе спеціальнаго условія. Но тѣ же писатели для странъ съ неразвитою культурою и слабымъ обращеніемъ рекомендуютъ необходимость подобныхъ условій въ контрактѣ. Здѣсь число обществъ страхованія, даже отъ огня, весьма ограничено и они не распространены повсемѣстно, для индивидуальной энергіи хозяина нѣтъ того простора въ выборѣ культуръ и отраслей производства; нѣрѣдко $\frac{3}{4}$ его валоваго дохода состоятъ въ зерновомъ хлѣбѣ. Здѣсь, при чрезвычайномъ градобитіи, большомъ падежѣ скота, или пожарѣ, и пр., арендаторъ можетъ понести такіе потери, отъ которыхъ можетъ оправиться лишь при условіи обладанія запаснымъ капиталомъ, въ 3—4 раза большимъ, нежели требуемый арендуемымъ имѣніемъ для нормальнаго производства. Такъ какъ въ подобной странѣ *такіе* арендаторы могутъ быть исключеніемъ, то для развитія арендаторства вышепоставленныя условія обоюднаго участія въ чрезвычайныхъ потеряхъ должны здѣсь имѣть мѣсто и представляють необходимую составную часть контракта.

ЧАСТЬ II.

Обоюдныя права и обязанности владѣльца и арендатора въ теченіе арендованія.

Права и обязанности сторонъ должны быть установлены въ контрактѣ такимъ образомъ, чтобы арендаторъ имѣлъ возможность извлекать изъ пользованія имѣніемъ наивысшую выгоду, а владѣлецъ не терять отъ этого никакого ущерба.

1. *Спросилъ.* Арендаторъ обязывается употребить ихъ для тѣхъ цѣлей, для которыхъ они предназначены. Наибольшія затрудненія представляетъ вопросъ о взаимныхъ обязанностяхъ владѣльца

и арендатора относительно *содержанія строеній въ исправномъ видѣ*, такъ какъ интересы обонхъ въ этомъ пунктѣ могутъ значительно расходиться: владѣлецъ желаетъ, чтобы строенія служили гораздо долѣе аренднаго срока; для арендатора достаточно, если они послужатъ только въ теченіе послѣдняго. Договоръ, который соединялъ бы эти интересы сторонъ съ требованіями справедливости, долженъ удовлетворять слѣдующимъ условіямъ:

а) Чтобы владѣлецъ могъ съ точностью рассчитывать на хорошее содержаніе строеній, не будучи принужденъ для этого вести постоянный контроль и не неся расходовъ болѣе того, сколько потребовалось бы при собственномъ веденіи хозяйства.

б) Чтобы арендаторъ съ возможною точностью могъ оцѣнить размѣръ принятой обязанности по содержанію строеній и былъ обезпеченъ отъ несправедливыхъ домогательствъ владѣльца.

в) Чтобы между сторонами не могло происходить разногласій.

Эти условія достигаются наиболее, если арендаторъ будетъ контрактомъ поставленъ въ такое положеніе, что для него нѣтъ интереса уклоняться отъ исправленія строеній въ большей мѣрѣ, нежели это целесообразно, а съ другой стороны—если для него нѣтъ побужденій принуждать владѣльца въ производствѣ большихъ исправленій, нежели требуется необходимостью. Такимъ условіемъ можетъ удовлетворять слѣдующая форма договора: арендаторъ принимаетъ на себя все исправленія находящихся въ имѣніи строеній (за исключеніемъ случаевъ пожара, для чего необходима отдѣльная оговорка въ контрактѣ). Владѣлецъ имѣетъ право въ началѣ каждаго хозяйственнаго года производить ревизію и указывать, какія исправленія должны быть произведены въ слѣдующемъ году. Если изъ этого права владѣлецъ не дѣлаетъ употребленія, то вопросъ предоставляется усмотрѣнію арендатора. Устанавливается наименьшая сумма, которую арендаторъ обязанъ употребить на исправленіе строеній *среднимъ числомъ ежегодно* безъ обязательства употребить ее въ томъ, или другомъ году, если этого не потребуетъ владѣлецъ при ревизіи. Этотъ минимум, помноженный, на число лѣтъ аренды, даетъ минимальную сумму для исправленія строеній въ теченіе всего періода аренды. Арендаторъ обязывается давать безвозмездно подводы (не далѣе условленнаго разстоянія) и солому, не входящую въ счетъ минимальной суммы. Стоимость исправленій въ концѣ каждаго года представляется арендаторомъ владѣльцу, который утверждаетъ ея действительность. Если при обратной передачѣ имѣнія владѣльцу, изъ ежегодныхъ вычисленій окажется, что въ теченіе всего періода аренды минимальная сумма не израсходована, то недостающая разность доплачивается арендаторомъ. Если действительно истраченная сумма превосходитъ минимальную, но не достигаетъ *до особо*

устанавливаемой известной *максимальной* суммы, то владѣлецъ уплачиваетъ арендатору половину разницы между действительно истраченной и минимальной суммами. Если, наконецъ, затрата превосходитъ и максимальную сумму, то владѣлецъ возвращаетъ арендатору весь излишекъ надъ послѣднею и половину разности между максимальной и минимальной суммами. Если въ какомъ либо отдѣльномъ году аренды, вследствие усиленныхъ исправленій, сумма затраты превосходитъ, на опредѣляемый особо *излишекъ*, величину *средней годовой максимальной суммы* (получаемой раздѣленіемъ вышеприведенной максимальной суммы на число лѣтъ аренды), то каждый изъ контрагентовъ имѣетъ право въ началѣ слѣдующаго года сдѣлать за *прошедшій годъ* уравнивательный расчетъ по описанному способу и разницу немедленно уплатить деньгами.

Кромѣ условій относительно содержанія строеній, въ контрактѣ долженъ быть предвидѣнъ случай *новой постройки, перестройки и капитальныхъ измѣненій* старыхъ строеній. По отношенію къ этому вопросу могутъ быть два главныхъ случая: 1) владѣлецъ *обязывается* передъ арендаторомъ произвести подобную работу и 2) арендаторъ можетъ изъяснить во время аренды основательное *желаніе* относительно постройки, перестройки и т. д., вследствие измѣненія хозяйственной системы. Въ большинствѣ лучшихъ контрактовъ по этому предмету принято слѣдующее отношеніе между сторонами. Стоимость новыхъ построекъ, къ производству которыхъ обязывается владѣлецъ, принимается на себя послѣдній; арендаторъ доставляетъ подводы (на известное разстояніе). Арендная плата увеличивается на проценты со стоимости новой постройки. Строенія, сооружаемыя вновь для хозяйственныхъ цѣлей арендатора, строятся на его счетъ; въ арендномъ контрактѣ опредѣляется особымъ условіемъ вопросъ относительно величины амортизаціи (погашенія) затраченнаго арендаторомъ капитала и раздѣленія уплаты этой величины между сторонами.

2. *Земельныя угодія.* Сады и огороды сдаются безъ всякихъ указаній относительно способа пользованія, такъ какъ въ интересахъ обонхъ сторонъ воздѣлывать этотъ видъ угодій возможно интензивнѣе.

Поля сдавались въ арендахъ Западной Европы въ прежнее время, по большей части, съ большими ограниченіями, которыя были направлены къ общей цѣли предохранить землю отъ истощенія арендаторомъ. Такія мѣры выражались въ контрактѣ въ обязательствѣ арендатора вести опредѣленную систему хозяйства, даже опредѣленный сѣвооборотъ, съ установленнымъ отношеніемъ между пространствами подъ тѣми или другими видами культуръ. Установленію этого обычая весьма много содѣйствовала известная *гумусовая* теорія пи-

танія растений, по которой они раздѣляются на истощающія, сохраняющія и обогащающія плодородіе почвы. Учрежденіемъ сѣвооборота, предписаннаго въ контрактъ, съ соответственнымъ отношеніемъ между пространствами подъ обогащающими и истощающими растениями, предполагали возможнымъ оградить почву вполнѣ отъ истощенія. Въ настоящее время эта теорія признается ложною, всѣ растения истощаютъ почву и притомъ тѣ, которыя считались обогащающими, выносятъ изъ почвы болѣе питательныхъ веществъ, нежели другія.

Поэтому нѣтъ системы хозяйства, основанной на производствѣ своего собственнаго удобренія, которая бы не истощала почвы. Чѣмъ система интензивнѣе, тѣмъ болѣе снимаемые урожаи, тѣмъ сильнѣе истощеніе. Есть два пути уменьшить послѣднее: 1) вести болѣе экстензивное хозяйство и 2) покупать искусственные туки. На первое ограниченіе ни одинъ разумный арендаторъ не можетъ согласиться, такъ какъ главный источникъ его заработка состоитъ въ веденіи *собственной системы* хозяйства, обыкновенно болѣе интензивной, нежели бывшая въ имѣніи до аренды. На покупку же и примѣненіе искусственныхъ туковъ арендаторъ можетъ согласиться въ одномъ случаѣ, если они окупаются. Въ настоящее время можно считать рациональнымъ правиломъ — не связывать арендатора никакими условіями относительно системы полеводства; прямо вреда арендатору, эти стѣсненія совершенно бесполезны и для владѣльца: во 1-хъ — потому, что уменьшаютъ арендную плату и во 2-хъ — потому, что *при долгосрочной арендѣ* поддержаніе плодородія почвы лежитъ настолько же въ интересѣ арендатора, какъ и владѣльца; въ короткій же срокъ послѣднихъ двухъ, трехъ лѣтъ аренды, арендаторъ, если бы и захотѣлъ истощить поля, то не въ силахъ былъ бы этого сдѣлать.

Луга. По отношенію къ лугамъ, нѣнія хозяевъ развиты весьма мало. Арендаторъ обязывается содержать ихъ въ исправномъ видѣ, очищая отъ кустарника, кротовыхъ и муравьиныхъ кучъ, мха и пр. Такъ какъ это лежитъ и въ интересѣ арендатора, то контрактное опредѣленіе такихъ обязанностей не представляетъ большой важности.

Арендатору запрещается продавать сѣно и траву, такъ какъ они составляютъ основаніе плодородія полей. Запрещается также поднимать луга и обращать ихъ въ постоянныя пашни. Первое изъ послѣднихъ двухъ ограниченій вполнѣ рационально. Но второе не безусловно полезно; оно можетъ быть рекомендовано, если луга *хороши* (напр. заливные) и нѣтъ — если они дурны. Но арендатору должно быть также предоставлено право распахать и подобающе луга на 1—2 года подъ посѣвы хлѣба съ цѣлю ихъ улучшенія, которое даже необходимо въ случаяхъ сильнаго оплотнѣнія почвы и задерживости ея.

Хорошіе луга составляютъ основу хозяйства по двумъ причинамъ: 1) доставляя превосходный, въ своемъ родѣ незаменимый кормъ, котораго количество, при *заливныхъ и влажныхъ* лугахъ, колеблется *меньше*, нежели полевые урожаи, почему луга даютъ наиболѣе обезпеченную опору скотоводству и 2) удобреніе съ луговъ есть главная опора *полеводства*; луга даютъ полямъ возмѣщеніе питательныхъ веществъ, отчуждаемыхъ въ продаваемыхъ продуктахъ. Но плохіе луга, особенно суходольные, не имѣютъ такого значенія и такъ какъ ихъ урожаи незначительны, то весьма часто расчетъ показываетъ болѣе выгоднымъ пользованіе ими, какъ полями.

Поэтому можно совѣтовать, по отношенію къ такимъ лугамъ, предоставлять арендатору полную свободу способа пользованія. Также излишне запрещеніе арендатору пастбы скота на лугахъ; при быстрой вліяніи неправильной пастбы скота на качество луговъ, послѣдніи противна интересамъ арендатора, а при правильномъ пользованіи луга не терпятъ никакого вреда отъ выгона.

Постоянные выгоны рѣдко сдаются съ какими либо ограниченіями. Но такъ какъ хорошіе выгоны представляютъ, подобно лугамъ, опору для плодородія полей (хотя и въ меньшей мѣрѣ), то пока владѣлецъ находитъ ихъ необходимыми, онъ вполнѣ рационально можетъ ввести въ контрактъ запрещеніе обращенія ихъ въ постоянныя полевые угодія, допуская однако временную распапку, если она необходима для улучшенія качества выгона.

Дороги, воды, мосты, колодцы, и пр. требуютъ специальныхъ обсужденій въ каждомъ частномъ случаѣ относительно содержанія и пользованія ими. Еще болѣе specialнаго разсмотрѣнія требуетъ пользованіе находящимися въ имѣніи: дренажемъ, открытыми канавами для осушки, сооруженіями для орошенія и т. под. учрежденіями, соединенными съ земельными угодьями.

3. *Железный инвентарь.* Плодовые деревья арендаторъ обязывается подсаживать по мѣрѣ уничтоженія старыхъ, также какъ деревья и кусты въ питомникахъ, паркахъ и пр.; принадлежности недвижимыхъ частей имѣнія, сдаваемые на основаніи желѣзнаго инвентаря, обязывается поддерживать въ ихъ видѣ и въ случаѣ уничтоженія замѣнять новыми равной цѣнности.

4. Всѣ *дожимые* предметы, какъ живой и жертвы инвентарь, которыми арендаторъ распоряжается на правахъ собственника, не требуютъ никакихъ особыхъ условій.

5. Налоги, подати и вообще неимущественныя обязанности, принятыя арендаторомъ, требуютъ условія своевременности ихъ выполненія.

Если въ имѣніи нѣтъ заводскихъ производствъ, то въ контрактѣ являється, что арендаторъ не имѣетъ права учреждать ихъ безъ

особаго согласія владѣльца. Если же они имѣются, то въ этомъ мѣстѣ контракта опредѣляются условія сдачи ихъ и взаимныя права и обязанности сторонъ.

ЧАСТЬ III.

Сдача имѣнія арендатору и обратная передача владѣльцу.

Обиця опредѣленія въ контрактѣ, относящіяся сюда, имѣютъ предметомъ: время, исполненіе, объекты передачи, способъ изслѣдованія цѣнъ, заключеніе дѣла и распределеніе расходовъ. *Спеціальныя* опредѣленія обуславливаютъ способъ передачи каждой составной части имѣнія, или каждой группы однородныхъ предметовъ.

Обиця опредѣленія. Время. Въ германскихъ арендахъ договорахъ обыкновенно владѣлецъ обязывается сдать имѣніе въ теченіе восьми дней передъ, или послѣ, установленнаго въ контрактѣ дня вступленія въ аренду. Общее правило требуетъ, конечно, возможнаго совпаденія времени сдачи съ началомъ арендованія, а также опредѣленнаго срока для выполненія послѣдней.

Выполненіе передачи можетъ производиться или уполномоченнымъ владѣльцемъ, или же избранною комиссіею. Въ обоихъ случаяхъ, однако, при встрѣтившемся разногласіи (напр. въ оцѣнкѣ) съ арендаторомъ споръ не можетъ быть рѣшенъ тотчасъ же и если самъ владѣлецъ поддерживаетъ его, то рѣшеніе, при заключенномъ контрактѣ, можетъ быть сдѣлано только судомъ. Такъ какъ это можетъ повести къ неисчислимымъ невыгодамъ, то въ практикѣ странъ съ выработанною арендою примѣняется слѣдующее средство: все дѣло передачи имѣнія арендатору ведется особо избранною третейскою комиссіею, въ которой одинъ членъ избирается владѣльцемъ, другой арендаторомъ, а третій—назначается обоими сторонами или ближайшимъ судомъ, мировымъ судьей и т. под. Очень полезно, если въ комиссія есть членъ съ юридическими свѣдѣніями. Въ случаѣ спора какой либо стороны комиссія имѣетъ право рѣшать вопросъ окончательно, если не будетъ сдѣлано оговорки въ пользу какихъ либо исключеній.

Предметы передачи. Въ контрактѣ долженъ быть предусмотрѣнъ и разрѣшенъ вопросъ о томъ, обязаны ли владѣлецъ и арендаторъ принимать другъ отъ друга (куплею), при сдачѣ и передачѣ имѣнія, находящійся живой и мертвый инвентарь, или же это предостав-

ляется ихъ взаимному соглашенію. Большая часть германскихъ контрактовъ рѣшаютъ, что такая передача и приемъ обязательны для обоихъ сторонъ (само собою разумѣется, что при обязательствѣ одной только стороны—это можетъ вести къ злоупотребленіямъ). Такое рѣшеніе основывается на томъ, что въ противномъ случаѣ оба стороны теряютъ уже на транспортѣ этихъ предметовъ для покупки и продажи ихъ. Но особенно это важно для обезпеченія арендатора отъ необходимости продавать почти съ молотка свой инвентарь и скотъ, если владѣлецъ не желаетъ принять ихъ въ концѣ аренды по оцѣнкѣ. Потеря можетъ быть весьма велика, если хозяйство велось интенсивно. Но, съ другой стороны, нельзя и устанавливать вышеуказаннаго обязательства безусловно, такъ какъ мертвый инвентарь и особенно скотъ могутъ быть подготовлены ко времени сдачи такимъ образомъ (перемѣною посредствомъ продажи и покупки), что обязательное принятіе ихъ слѣдующимъ хозяиномъ будетъ для него положительно невыгодно, а слѣдовательно и несправедливо. А потому въ контрактѣ оговаривается, что слѣдующій хозяинъ (арендаторъ при сдачѣ, владѣлецъ—при обратной передачѣ) обязывается принять лишь тѣ части мертваго и живаго инвентаря, которые: во 1-хъ, находятся въ *годномъ состояніи* для употребленія и во 2-хъ, которымъ *неизлѣчимы* для производства. Но такъ какъ сужденіе о годности и полезности для производства того или другаго предмета не легко и зависитъ, между прочимъ, отъ личнаго взгляда хозяина, то окончательное разрѣшеніе разногласій въ этомъ вопросѣ между сторонами всего удобнѣе предоставлять третейской комиссіи, ведущей самое дѣло сдачи, или передачи.

Способъ оцѣнки. Если всѣ составныя части имѣнія, передаваемыя обоими сторонами (при сдачѣ и обратной передачѣ) другъ другу въ полное право собственности, должны быть обязательно приняты ими, то отсюда вытекаетъ необходимость установить въ контрактѣ *способъ оцѣнки* этихъ предметовъ, къ которому стороны будутъ прибѣгать конечно лишь въ томъ случаѣ, если при фактической передачѣ оцѣнка не достигнута путемъ взаимнаго согласія. Въ Германіи такая оцѣнка предметовъ при сдачѣ и передачѣ производится обыкновенно специально избранною *оцѣночною комиссіею*, въ которой одинъ членъ—отъ владѣльца, другой—отъ арендатора, а третій назначается съ обща или же тою комиссіею, которая ведетъ сдачу имѣнія. Оцѣнка производится только двумя первыми членами, а третій призывается въ случаѣ спора, который разрѣшается его голосомъ окончательно. Само собою разумѣется, что члены комиссіи должны быть компетентны въ дѣлѣ оцѣнки. Иногда же, по обоюдному согласію сторонъ, передающая комиссія беретъ на себя и оцѣнку.

Ведение хозяйства до конца сдачи лежитъ на обязанности выступающаго хозяина. Онъ же получаетъ за это время доходы и ведетъ расходы до окончательнаго разсчета.

Окончаніе передачи имѣнія начинается съ полной расплаты по взаимнымъ обязательствамъ и полученію соответственныхъ квитанцій.

Расходы по веденію передачи имѣнія справедливость требуетъ раздѣлять по ровну между владѣльцемъ и арендаторомъ.

Спеціальныя контрактныя замѣчанія относительно сдачи отдѣльных частей имѣнія. Строенія. При неясномъ договорѣ въ контрактѣ относительно взаимныхъ обязанностей сторонъ по содержанію строеній въ исправномъ видѣ, при обратной сдачѣ имѣнія, возникаютъ, по большей части, большія разногласія относительно качества содержанія строеній въ теченіе аренды. Но выше рекомендованныя условія въ этомъ отношеніи представляютъ достаточную гарантію въ томъ, что подобныя споры будутъ устранены. Чрезвычайныя же порчи, также какъ нарушенія контрактныхъ условій относительно:

Земельныхъ угодій, плодовыхъ деревьевъ и жезлзнаго инвентаря, предъявляются сдающей комиссіей, которая утверждаетъ достовѣрность порчи и ея размѣры. Число и виды случаевъ порчи этихъ предметовъ такъ обширны и разнообразны, что весьма трудно перечислить и систематизировать ихъ въ контрактѣ. Съ другой стороны, случаи разногласій въ этомъ пунктѣ относительно рѣдки.

Живой и мертвый инвентарь требуютъ особеннаго вниманія, если при сдачѣ ихъ обязывается принимать вступающій хозяинъ отъ выходящаго (обязаннаго сдавать). Выше было замѣчено, что передача этихъ предметовъ (скотъ, машины, орудія, утварь) производится, если не послѣдуетъ соглашенія, посредствомъ оцѣнки передающею или спеціальною комиссіей.

Такая оцѣнка представляетъ чрезвычайныя неудобства, такъ какъ дѣло идетъ о предметахъ не новыхъ, но бывшихъ въ употребленіи, которыхъ покупная цѣна нѣрѣдко неизвѣстна, а продажная въ данную минуту можетъ быть опредѣлена только съ вѣроятностью. Можно утвердительно сказать, что оцѣнка одного и того же инвентаря двумя комиссіями специалистовъ никогда не дастъ въ результатѣ одной и той же величины. Поэтому, соглашеніе представляется самою желательною формою оцѣнки инвентаря при сдачѣ. Но недостаточно того, чтобы она была только желательна; раціональный контрактъ долженъ содержать въ себѣ такіа условія, которыя бы служили для обѣихъ сторонъ и *побужденіемъ* къ рѣшенію вопроса объ оцѣнкѣ взаимнымъ соглашеніемъ.

Если арендаторъ передаетъ владѣльцу свой инвентарь продажно, то онъ, конечно, долженъ знать цѣнность этого инвентаря. Слѣдовательно, въ контрактѣ ничто не препятствуетъ обязывать аренда-

тора производствомъ оцѣнки его инвентаря передъ обратною сдачею имѣнія владѣльцу, притомъ нѣсколько ранѣе срока. За 14 дней до послѣдняго арендаторъ обязывается представить владѣльцу:

- 1) полный реестръ всѣмъ видамъ скота;
- 2) такой же реестръ мертваго инвентаря.

При каждомъ отдѣльномъ предметѣ обѣихъ реестровъ должна быть выставлена его стоимость по оцѣнкѣ арендатора. Владѣльцу предоставляется право осмотрѣть по реестрамъ весь инвентарь, подлежащій передачѣ. Этими условіями дается первая возможность къ соглашенію. Но затѣмъ возникаетъ главное затрудненіе: арендаторъ будетъ цѣнить возможно выше, владѣлецъ, на оборотъ, возможно ниже; хотя это разногласіе до нѣкоторой степени умѣряется предстоящею неизвѣстностью результата при оцѣнкѣ комиссіей и сопряженными съ этимъ расходами для обѣихъ сторонъ, но недостаточно, и во всякомъ случаѣ желательны въ контрактѣ условія, болѣе побуждательныя для соглашенія. Такимъ условіемъ можетъ служить слѣдующій способъ: предметы, съ оцѣнкою которыхъ въ реестрѣ не согласенъ владѣлецъ, выдѣляются для отдѣльной оцѣнки посредствомъ комиссіи; напр. относительно поставленныхъ цѣнъ рогатаго скота можетъ послѣдовать соглашеніе, а относительно овецъ — нѣтъ. Однако право владѣльца выдѣленія предметовъ не должно распространяться на отдѣльныя мелочи, или штуки; но должно быть ограничено цѣлыми разрядами предметовъ (напр. овцы, свиньи, рогатый скотъ, плуги и т. д.), или по крайней мѣрѣ извѣстною стоимостью (10, 25, 50 р. и др.). Въ противномъ случаѣ, предлагаемое условіе можетъ имѣть обратныя послѣдствія: арендаторъ будетъ цѣнить *всѣ* предметы слишкомъ высоко изъ боязни потерять на *тихъ*, которые оцѣнены низко, такъ какъ право владѣльца выдѣлѣть для особой оцѣнки оцѣненные высоко предметы лишаетъ арендатора надежды на уравнительное вознагражденіе хорошими цѣнами послѣднихъ. Можно придумать, конечно, кромѣ предлагаемаго способа, мѣры болѣе принудительныя къ соглашенію, но они всегда имѣютъ слѣдствіемъ дурныя отношенія и споры, которые должны, по возможности, устраняться контрактомъ.

Между предметами инвентаря особой оговорки требуютъ овцы въ вопросѣ объ оцѣнкѣ. 1 іюли, принятый срокъ для начала аренды, совпадаетъ съ тѣмъ періодомъ, когда овцы острижены и могутъ быть оцѣниваемы весьма неточно. Поэтому можно требовать въ контрактѣ обязательства арендатора оставить извѣстное число овецъ нестриженными до передачи имѣнія, хотя эта мѣра можетъ повести къ высокой оцѣнкѣ, такъ какъ арендатору выгодно выбрать самыхъ лучшихъ экземпляровъ животныхъ.

Относительно передачи установленных въ контрактъ *запаса* обуславливается: для *зерна*—обязательство сдать ихъ въ чистомъ видѣ, годномъ для рынка, о чемъ рѣшеніе предоставляется передающей комиссіи; для *сѣна* и *соломы* годность къ употребленію; цѣны на передаваемые запасы *продовольствія* людей условливаются существующія на ближайшемъ рынкѣ, на случай, если бы относительно пріема ихъ не послѣдовало соглашенія.

Наиболѣе затрудненій при сдачѣ и обратной передачѣ представляетъ *полевой инвентарь*, т. е. воздѣланные растенія, передаваемые на корню. Они оцѣняются, какъ было выше описано, двумя способами:

1) Оцѣнкою на корню—на глазъ;

2) Цѣнностью стоящаго на корню урожая принимаются сдѣланные издержки производства для этого урожая до дня передачи. Для арендатора, передающаго владѣльцу хозяйство съ воздѣланными растеніями, чрезвычайно важно быть увѣреннымъ, что за свой трудъ и расходы по этому предмету онъ получитъ соответственное вознагражденіе. Разсмотримъ, на сколько удовлетворяетъ этому второй, наиболѣе употребительный въ практикѣ, способъ. Между издержками производства весьма небольшая доля состоитъ изъ уплаты наличными деньгами; большая же часть ихъ приходится на затраты натурою: посѣвъ, удобреніе и упряжные рабочія силы. Изъ послѣднихъ затратъ не трудно опредѣлить стоимость посѣвныхъ сѣмянъ по послѣдней рыночной цѣнѣ. Уже значительно труднѣе опредѣлить цѣнность упряжной работы: результатъ оцѣнки рабочего дня можетъ быть весьма различенъ, смотря по цѣнамъ, которыя принимаются для кормовъ, неимѣющихъ рыночной цѣны, и для навоза. Поэтому, въ подобныхъ оцѣнкахъ предпочитаютъ принимать за основаніе не оцѣнку рабочего дня въ хозяйствѣ, но ходячія цѣны на упряжную работу въ мѣстности. Притомъ, стоимость разныхъ работъ (паханіе, борьба, свозка и т. п.) вычисляютъ на десятину и утверждаютъ опредѣленными цѣнами въ контрактъ. Но всего труднѣе опредѣлить цѣнность навоза, стоимость производства котораго чрезвычайно колеблется въ разные годы, смотря по приходамъ скотоводства. Въ большей части случаевъ, въ практикѣ устанавливаютъ для навоза *произвольную цѣну*, которая утверждается въ контрактъ.

Изложенное показываетъ, что оцѣнка издержекъ производства всегда произвольна и арендаторъ, при тщательномъ воздѣлываніи передаваемыхъ растеній, никогда не можетъ быть увѣренъ въ полномъ вознагражденіи, а слѣдовательно будетъ имѣть побужденіе къ небрежному воздѣлыванію растеній, лишь бы сумма работъ, за которыя слѣдуетъ по контракту вознагражденіе, была больше. Это ведетъ къ необходимости вводить въ контрактъ принудительныя усло-

вія, которыя состоятъ въ правѣ владѣльца въ послѣдніе два, три года аренды слѣдить за составомъ инвентаря арендатора, а въ послѣднемъ году—даже устанавливать, по своему усмотрѣнію, воздѣлываніе разныхъ растеній. Такая мѣра, будучи необходимою для обезпеченія владѣльца, въ высшей степени стѣснительна для арендатора, такъ какъ послѣдній въ одинъ годъ долженъ ввести быть можетъ совершенно новую систему культуры, на которую не рассчитаны его орудія производства. Общій результатъ описываемаго способа, слѣдовательно, состоитъ въ томъ, что арендаторъ можетъ лишиться вознагражденія за свои затраты, а при принудительныхъ правахъ владѣльца можетъ понести чрезвычайныя потери.

Другой способъ опредѣленія цѣнности полевого инвентаря—*оцѣнка на корню*. Притомъ всѣ растенія оцѣняются таксаторами (оцѣночной комиссіей): зерно по четвертямъ, свекловица—поберновцамъ, сѣно—по пудамъ и т. д. Урожаи берутся предположительно, смотря по виду полей, а способъ опредѣленія цѣны устанавливается контрактомъ. Изъ найденной суммы цѣнности опредѣленная часть сдается арендатору въ кредитъ съ платою условленнаго процента, а другая часть (гораздо меньшая) отдается за немедленную уплату деньгами. При обратной передачѣ ивѣнія дѣлается тоже самое на поляхъ арендатора и разница между найденною суммою и выше опредѣленною доплачивается деньгами тою или другою стороною.

Въ этомъ способѣ главную роль играетъ *величина предполагаемыхъ урожаевъ*. Это обстоятельство, конечно, побуждаетъ арендатора къ возможно лучшему воздѣлыванію и если урожаи будутъ хороши, то его усилія могутъ быть вознаграждены съ избыткомъ. Но надежда на хорошій урожай можетъ при всемъ томъ—*не осуществиться* и всѣ усилія и расходы могутъ погибнуть непроизводительно *при дурной погодѣ* послѣдняго года. Неурожаемъ можетъ имѣть слѣдствіемъ чрезвычайные убытки: во 1-хъ потому, что не вознаградятся издержки производства и во 2-хъ, вѣдствие уплаты владѣльцу большой разницы. Если прибавить къ этому еще, что опредѣленіе урожаевъ на корню можетъ быть весьма ошибочно, то понятно, почему этотъ способъ принимается контрактами весьма рѣдко; такимъ образомъ, оба способа представляютъ большія невыгоды и особенно оцѣнка на корню. Но такъ какъ иного средства нѣтъ, то, по необходимости, надо принять способъ оцѣнки по стоимости производства. Главное неудобство его состоитъ въ привлеченіи владѣльца къ вмѣшательству въ хозяйство арендатора въ послѣднемъ году. Для уменьшенія такого неудобства можетъ быть рекомендовано слѣдующее улучшеніе этого способа передачи.

Издержки производства, которыя должны быть вознаграждены владѣльцемъ, состоятъ изъ: 1) цѣнности удобрения, 2) посѣва и 3)

стоимости разныхъ ручныхъ и упряжныхъ работъ по обработкѣ и воздѣлыванію. Какъ было замѣчено, большая часть этихъ затратъ можетъ быть оценѣна только посредствомъ произвольно установленнаго цѣна. Нѣтъ никакой причины, которая бы препятствовала установленію въ контрактѣ не цѣнъ за отдѣльныя работы, а огульныхъ цѣнъ за воздѣланное пространство каждаго отдѣльнаго растенія, напр. за 1 десятину ржи, клевера, картофеля и т. д. Притомъ, чтобы ввести въ оценку удобреніе, одно и тоже растеніе должно быть оценываемо различно, смотря потому, какъ далеко отстоитъ оно отъ удобренія. При заключеніи контракта дѣлается по этому предмету соглашеніе, на основаніи котораго вырабатывается таблица съ таксами за 1 дес. каждаго вида растеній при разныхъ положеніяхъ послѣднихъ въ сѣвооборотѣ относительно удобренія и предшествующаго растенія. Уже посредствомъ назначенія болѣе или менѣе высокихъ таксъ на отдѣльные виды культуръ, при разныхъ условіяхъ ихъ воздѣлыванія, владѣлецъ получаетъ значительную возможность вліять на составъ полевого инвентаря при обратномъ полученіи имѣнія. Такъ напр., если за свекловицу по свѣжему удобренію такса назначена въ 25 р. за десятину, а за свекловицу на 2-й годъ послѣ удобренія 8 р., то арендатору конечно выгодно въ послѣднемъ году воздѣлывать свекловицу по свѣжему удобренію. Такою мѣрою устраняется необходимость привлеченія владѣльца къ внимательству въ хозяйство арендатора, если и не вполне, то въ значительной степени. Но ею не устраняется другое обстоятельство. Арендаторъ ничѣмъ не побуждается къ *тщательности* воздѣлыванія; онъ не получаетъ вознагражденія *соразмѣрно съ своими усиліями* и будетъ заботиться лишь о томъ, чтобы помѣстить всѣ растенія въ выгоднѣйшія мѣста сѣвооборота, указываемыя таксами контрактной таблицы. Даже прямой интересъ арендатора требуетъ, по возможности, сэкономить въ расходахъ по обработкѣ, такъ какъ число работъ и качество ихъ не оценываются отдѣльно.

Поэтому, весьма полезно включать въ контрактъ условіе, которое бы имѣло слѣдствіемъ побужденіе арендатора къ тщательному воздѣлыванію растеній въ послѣднемъ году аренды. Такимъ условіемъ можетъ служить нѣкоторое измѣненіе вышеуказанной таблицы. А именно, въ послѣдней, вмѣсто опредѣленныхъ цѣнъ, назначаются *наибольшія и наименьшія* цѣны за десятину каждаго растенія, причемъ оговаривается въ контрактѣ, что арендаторъ за каждое передаваемое растеніе получаетъ съ 1 десятины сумму между установленными *минимумъ и максимумъ*, сообразно и по *мѣрѣ тщательности* каждой культуры (напр. за 1 дес. ржи между 10 и 15 р. и т. под.). Примѣненіе этой таблицы при передачѣ требуетъ, конечно, *оцѣнки* культуръ, т. е. рѣшенія, въ какой мѣрѣ арендаторъ заслуживаетъ той

или другой суммы. Такая оцѣнка не представляетъ большой трудности, потому что дѣло идетъ объ опредѣленіи величины, лежащей между довольно близкими границами. Рѣшеніе вопроса зависитъ отъ коммиссіи, передающей имѣніе, или можетъ быть предоставлено специальной оцѣночной коммиссіи. Главныя преимущества описаннаго способа состоятъ въ томъ, что онъ даетъ возможность полного вознагражденія арендатора за его расходъ и труды, обуславливаетъ выгодный для владѣльца составъ полевого инвентаря при обратномъ полученіи имѣнія, предохраняетъ арендатора отъ возможности чрезвычайнаго убытка и дѣлаетъ излишнимъ внимательство владѣльца въ хозяйство арендатора.

Относительно растеній, которыя могутъ быть съпаты до передачи (1 июля) имѣнія, какъ напр. рапса, оговаривается, что арендатору уплачиваются деньгами расходы по уборкѣ. Тоже относится къ споспелому сѣну.

ЧАСТЬ IV.

Обезпеченіе исполненія взаимнопринятыхъ обязанностей сторонъ при арендѣ.

Общая условія. Отношенія между сторонами, созданныя контрактомъ, въ высшей степени сложны. Съ другой стороны, по самой сущности сельско-хозяйственнаго производства, нѣтъ возможности выработать такой контрактъ, который бы устраивалъ всякія разногласія. Многія условія въ контрактѣ могутъ допускать разное толкованіе и поселить недоразумѣнія; съ той или другой стороны могутъ быть предъявлены требованія, повидимому даже основательныя; наконецъ, въ теченіе арендованія, вѣрнѣе возникаютъ вопросы, которые непредусмотрѣны контрактомъ и требуютъ разрѣшенія. Едва ли нужно объяснять, что для обѣихъ сторонъ было бы самымъ невыгоднымъ способомъ разрѣшать подобныя недоумѣнія путемъ оффиціальнаго судебного разбирательства. При первомъ же процессѣ начнется внутреннее разложеніе отношеній между контрагентами, которое въ короткое время сдѣлаетъ обоюдное положеніе непереносимымъ.

Есть два способа устранить такіе неудобства. Первый состоитъ въ приведеніи арендатора въ *полную зависимость* отъ владѣльца, который рѣшаетъ всѣ недоразумѣнія. Вторымъ путемъ — рѣшеніе разногласій посредствомъ частнаго *третейскаго суда*, что, конечно, справедливѣе и должно быть абсолютно предпочтительно первому способу.

Въ контрактѣ дѣлается условіе, что въ случай возникновенія разногласій между владѣльцемъ и арендаторомъ (а также его наслѣдниками), они разрѣшаются не судебнымъ разбирательствомъ, но особо избираемымъ каждый разъ третейскимъ судомъ.

Владѣлецъ и арендаторъ избираютъ въ судьи по одному члену (которыми должны быть, по возможности, понимающіе дѣло хозяева); послѣдніе выбираютъ третьяго, который председательствуетъ при разбирании дѣла. Каждая сторона, по требованію другой, обязана въ теченіе известнаго срока (напр. 14 дней) избрать третейскаго судью; при неисполненіи этого, противная сторона получаетъ право назначенія *обоихъ* судей. Вопросы рѣшаются большинствомъ голосовъ. Винованна сторона несетъ расходы по разбирательству; въ случаѣ мира — расходы дѣлятся пополамъ.

Къ суду необходимо обращаться только въ случаяхъ крайнихъ: неуплата аренды, или при отказѣ рѣшить дѣло со стороны третейскаго суда.

Спеціальныя условія. Обезпеченіе арендатора. Арендаторъ безъ сомнѣнія долженъ имѣть право требовать, чтобы всѣ арендуемые имъ составныя части имѣнія *существовали въ действительности и оставались въ имѣніи.*

Поэтому владѣлецъ долженъ въ контрактѣ выразить *ручательство* въ нахожденіи на лицѣ всѣхъ сданныхъ предметовъ: пространства разныхъ видовъ угодій, строеній и пр., словомъ всѣхъ тѣхъ предметовъ, которые описаны въ контрактѣ.

Другая мѣра обезпеченія арендатора, которая должна быть обусловлена въ контрактѣ, заключается въ подробномъ изложеніи случаевъ, въ которыхъ арендатору дается право оставлять аренду по предварительному предупредженію; такими случаями могутъ быть: война съ полною мобилизаціей армій при общей воинской повинности, чрезвычайное наводненіе, уничтожившее строенія, обязательное размежеваніе, соединенное съ обмѣномъ частей земли и пр.

Обезпеченіе владѣльца. Въ Западной Европѣ оно почти во всѣхъ контрактахъ достигается *залогомъ* бумажныхъ цѣнностей, но большей части, въ размѣрѣ годовой арендной платы. Арендаторъ, конечно, можетъ пользоваться купонами съ заложенныхъ бумагъ. Кроме этого, общаго пѣска, средства обезпеченія, въ разныхъ контрактахъ встрѣчаются еще разнообразныя условія, направленные къ обезпеченію владѣльца, какъ напр.:

Арендаторъ отвѣчаетъ за всякій вредъ, нанесенный частямъ имѣнія по винѣ его, или семейства; обязывается жить въ имѣніи и лично вести хозяйство; ему воспрещается имѣть подарендаторовъ (изъ вторыхъ рукъ), за исключеніемъ вознагражденія рабочихъ участками земли; не позволяется снимать въ аренду другія имѣнія, дежа-

ция въ сосѣдствѣ (обыкновенно не ближе 20 верстъ); арендаторъ обязывается страховать строенія и во многихъ контрактахъ — также страховать отъ градобитій масличныя, стручковые и колосовыя растенія. Запрещается продажа сѣна, соломы и навоза. Всѣ эти мѣры обезпеченія интересовъ владѣльца болѣе или менѣе основательны и могутъ быть рекомендованы, какъ заслуживающія подробнаго разсмотрѣнія при заключеніи контрактовъ.

Наконецъ, большая часть контрактовъ предоставляютъ владѣльцу нѣкоторые особые права, какъ напр.:

Право ревизіи имѣнія, лично или черезъ уполномоченнаго, во всякое время. Это право, конечно, необходимо, какъ единственное средство для владѣльца судить о положеніи имѣнія.

Право въ нѣкоторыхъ случаяхъ, напр. при неуплатѣ ренты, брать известную долю, или весь, *залогъ* арендатора. По послѣднему должно быть предоставлено право апелляціи къ третейскому суду.

Право прекращенія контракта по предварительному увѣдомленію арендатора, или даже немедленно. Такое право за владѣльцемъ можетъ быть оправдано для слѣдующихъ случаевъ: конкурса надъ имуществомъ арендатора, при невзносѣ арендной платы за два срока, непредставленія арендаторомъ по требованію владѣльца книгъ относительно натуральнаго хозяйства въ имѣніи, при лишеніи личной свободы арендатора долѣе известнаго срока по суду, или при лишеніи известныхъ гражданскихъ правъ. Послѣдствіемъ права прекращенія аренды должно быть, конечно, признано за владѣльцемъ и *право удаленія* арендатора изъ имѣнія въ случаѣ окончанія арендованія.

Форма примѣрнаго контракта, составленнаго на основаніи изложенныхъ выше началъ.

Между владѣльцемъ N и арендаторомъ M заключенъ нижеслѣдующій контрактъ на арендованіе имѣнія, находящагося и пр.

ЧАСТЬ I.

Главныя основанія аренды.

A. Предметъ аренды.

§ 1. Изъ составныхъ частей имѣнія, описанныхъ въ приложеніи къ контракту, передаются арендатору въ пользованіе и именно:

I. Только въ пользованіе:

- 1) *Строенія* съ прилежащими дворами (описаніе въ приложеніи).
- 2) *Части земли*: а) садовъ = 00 дес., огородовъ, полей, луговъ, выгоновъ, подъ дорогами, подъ водою.
- 3) *Сооруженія* въ поляхъ, садахъ, на дворахъ, 4) *права*, соединенныя съ хозяйственнымъ пользованіемъ земли (выгонъ, прогоны скота, рыбная ловля, охота и пр.).

II. На основаніи *железнаго инвентаря* (съ обязательствомъ возврата въ состояніи прежней цѣнности):

- 1) *Плодовые деревья*, оцененныя въ 00 рублей.
- 2) *Принадлежности* недвижимыхъ составныхъ частей имѣнія (прилож. № 0).

III. *Продажею*:

Живой инвентарь: рабочий и продуктивный скотъ (прил. № 0).

Мертвый инвентарь: (прил.).

Запасы зерна и провизіи, перечисленные въ приложеніи.

Полесой инвентарь (описаніе въ прил.).

IV. *Отчужденіемъ безденежно*:

Солома, сѣно, навозъ.

§ 2. Всѣ обязательства, лежащія на имѣніи, принимаетъ на себя арендаторъ, за исключеніемъ *измѣняющихся* денежныхъ повинностей, изъ которыхъ арендаторъ обязывается ежегодно уплачивать не болѣе 300 р.

§ 3. Исключаются изъ арендованія и сохраняются для владѣльца:

- 1) верхній этажъ жилого дома.
- 2) лѣса.
- 3) каменные ломки.
- 4) древесныя насажденія.
- 5) почетныя права (описаніе въ приложеніи подъ №№ 0 и 00).

B. *Начало и конецъ аренды.*

§ 4. Арендваніе начинается съ 1 іюля 1874 г. и продолжается 12 лѣтъ, до 1 іюля 1886 г.

§ 5. 1) Объявленіе о прекращеніи аренды до срока допускается лишь въ случаяхъ, определенныхъ въ договоръ.

2) Прописываются случаи, дающіе право владѣльцу и арендатору прекращать аренду и условія вознагражденія той, или другой стороны, а также срокъ между объявленіемъ о намереніи прекращенія аренды и дѣйствительнымъ прекращеніемъ (случай смерти владѣльца или арендатора, отношеніе наследниковъ; случай продажи имѣнія).

§ 6. Продолженіе аренды по окончаніи срока контракта можетъ имѣть мѣсто только на основаніи новаго письменнаго соглашенія.

C. *Арендная плата.*

§ 7. Ежегодная арендная плата составляетъ: (сумма—прописью). Эта сумма выплачивается арендаторомъ владѣльцу ежегодно въ 4 срока: 4 іюля, 1 октября, 1 января и 1 апрѣля кредитными билетами Г. К. Если, на основаніи контракта, арендная плата какого-либо года должна быть уменьшена, или увеличена, то такое измѣненіе должно падать на ту долю арендной платы, которая выплачивается 1 іюля; остальные три доли должны выплачиваться въ неизмѣняемыхъ количествахъ.

§ 8. Въ какихъ несчастныхъ случаяхъ уменьшается арендная плата.

ЧАСТЬ II.

Условія относительно правъ и обязанностей контрагентовъ въ продолженіе аренды.

A. *Относительно составныхъ частей имѣнія, переданныхъ только въ пользованіе.*

§ 9. Арендаторъ обязывается употребить предметы по назначенію, предохранять отъ порчи вещь, предметъ и возмѣщать всенный причиненный вредъ.

§ 10. Арендаторъ обязывается производить всѣ исправленія принятыхъ строеній и ихъ принадлежностей первоначально на свой счетъ, за исключеніемъ только поврежденій, причиненныхъ *пожаромъ*.

Владѣлецъ имѣетъ право въ началѣ каждаго хозяйственнаго года ревизовать строенія и указывать требующіеся исправленія.

Арендаторъ обязывается употребить на исправленія строеній ежегодно 240 рублей среднимъ числомъ; слѣдовательно въ 12 лѣтъ аренды 2,880 р. с. Притомъ, въ эту сумму не включаются подводы въ разстояніи 15 верстъ, солома и другіе матеріалы, находящіеся въ имѣніи и употребленные для исправленія строеній. Если по окончаніи аренды окажется, что дѣйствительные расходы менѣе 2,880 р., то недостающее арендаторъ выплачиваетъ владѣльцу деньгами. Если затрата превышаетъ 2,880, но не достигаетъ 3,600 р., то въ концѣ аренды владѣлецъ выплачиваетъ арендатору половину разности между этими двумя суммами. Если же затрата превосходитъ и максимальную сумму 3,600 р., то въ концѣ аренды владѣлецъ уплачиваетъ арендатору: 1) половину разности между наибольшею и наименьшею суммами = 360 р. и сверхъ того— всю сумму, израсходованную свыше 3,600 р.

Если въ какомъ-либо году аренды, вслѣдствіе скопленія значительныхъ исправленій, истрачено будетъ арендаторомъ болѣе 300 р. (устанавливаемый особо maximum) и притомъ на известную величину, напр. на 100 р., то въ июль слѣдующаго года дѣлается подобный вышеописанному расчетъ по отношенію къ одному этому году и разности выплачиваются описаннымъ образомъ немедленно.

Такой же расчетъ дѣлается при прекращеніи аренды ранѣе срока.

Къ 15 іюля каждаго года арендаторъ представляетъ владѣльцу счетъ сдѣланныхъ исправленій, который долженъ быть подписанъ владѣльцемъ; если этого не послѣдуетъ въ теченіи 8 недѣль, то счетъ считается утвержденнымъ.

§ 11. Арендаторъ имѣетъ право предпринимать новыя постройки, или перестройки старыхъ строеній, лишь на столько, сколько это дозволяется контрактомъ.

Въ противномъ случаѣ, владѣлецъ можетъ требовать возстановленія строеній въ прежнемъ видѣ на счетъ арендатора.

При разрушеніи строеній пожаромъ принимаются условія, выраженные въ § 20.

Если строеніе, по отзыву архитекторовъ, уже не можетъ быть поддерживаемо ремонтомъ, то владѣлецъ обязывается возвести новую постройку по собственному плану и на собственный счетъ, причемъ:

- 1) Арендаторъ обязывается: доставлять безвозмездно подводы на разстояніи 00 верстъ,
- 2) Доставлять безвозмездно потребное количество соломъ и строительные матеріалы, находящіеся въ землѣ имѣнія;
- 3) Мѣсто для складки матеріаловъ для постройки;
- 4) Не требовать особаго вознагражденія за нечистоту, засореніе и очистку мѣста.

Остатки строительныхъ матеріаловъ предоставляются арендатору.

Время постройки, по утвержденіи ея плана, опредѣляется арендаторомъ. Владѣлецъ, однако, можетъ воспрепятствовать постройку въ періодъ между 15 ноября и 1 апрѣля.

Новыя постройки и перестройки, которыя желательны по хозяйственнымъ соображеніямъ арендатора, производятся послѣднимъ (съ разрѣшеніемъ владѣльца) на собственный счетъ; при этомъ до начала постройки должно быть сдѣлано между контрагентами соглашеніе относительно срока погашенія стоимости постройки и той доли послѣдняго, которую владѣлецъ выплачиваетъ арендатору въ концѣ срока аренды.

§ 12. Земельныя угодія должны находиться въ томъ пользованіи, для котораго они предназначены. Границы и межевы знаки должны поддерживаться и возстановляться безъ замедленія; луга и выгоны не могутъ быть обращены въ поля; дороги, колодцы и пруды должны быть поддерживаемы въ своемъ первоначальномъ состояніи.

§ 13. Всѣ сооруженія въ поляхъ, садахъ и на дворахъ, арендаторъ обязывается поддерживать въ первоначальномъ состояніи на собственный счетъ.

Новыя каналы могутъ быть пролагаемы только съ согласія владѣльца; въ противномъ случаѣ арендаторъ долженъ, по требованію владѣльца, возстановить прежнее состояніе земли.

(Въ этомъ же параграфѣ опредѣляются взаимныя отношенія контрагентовъ по вопросамъ: поддержанія, или проведенія вновь, дренажа, сооруженій для орошенія, поддержанія мостовъ, простыхъ и живыхъ изгородей и всякихъ капитальныхъ улучшеній).

§ 14. Арендаторъ обязывается охранять права, соединенныя съ имѣніемъ, и въ случаяхъ нарушенія, обязывается немедленно принимать соотвѣтственныя мѣры. Расходы по веденію судебныхъ процессовъ беретъ на себя владѣлецъ имѣнія.

В. Относительно предметовъ, сдаваемыхъ на основаніи желѣзнаго инвентаря.

§ 15. Принятые плодовые деревья арендаторъ обязывается тщательно сохранить, какъ относительно числа, такъ и качества, а портящіеся экземпляры замѣнять посадкою новыхъ, наблюдая, чтобы цѣнность всей суммы плодовыхъ деревьевъ сохранилась въ принятой величинѣ, равной = 00 руб. сер.

Пользованіе древесною массою выбывающихъ деревьевъ предоставляется арендатору; ему дается также право сдавать плодовые сады другимъ лицамъ.

§ 16. Арендаторъ долженъ поддерживать въ первоначальномъ состояніи всѣ (отдѣлимые) принадлежности недвижимыхъ составныхъ частей имѣнія; въ случаѣ порчи—немедленно возстановлять ихъ въ прежнемъ видѣ (описаніе въ прилож. № 00).

С. Относительно предметовъ, принимаемыхъ арендаторомъ покупкою.

§ 17. Арендаторъ обязывается къ постоянному содержанію соотвѣтственнаго хозяйственному положенію имѣнія живаго и мертваго инвентаря.

D. Относительно принимаемых повинностей, налогов и податей.

§ 18. Все принятые на себя налоги и повинности (указанные в § 2), арендатор обязывается вносить согласно требованию закона в надлежащие сроки.

К 15 июля каждого года арендатор представить владельцу счет уплаченных *переменных налогов*, по которому владелец обязывается возмещать арендатору весь излишек свыше 300 р.

Все личные подати вносить за себя арендатор.

E. Относительно частей имения, исключенных из аренды.

§ 19. В отсутствие владельца, арендатор принимает на себя высший надзор за *лѣсами и насаждениями*; онъ представляет владельцу к 15 июля каждого года расчет бывшего хозяйства и получает за трудъ 5% чистого дохода. При употреблении для *лѣсовъ* подводъ арендатора, онъ получает за каждую по оценке рабочего дня в 00 коп.

F. Случаи необыкновенных несчастий.

§ 20. В случае уничтожения строений пожаромъ, не по вине арендатора, владелец обязывается возстановить ихъ, по возможности, в течение годового срока; арендатор долженъ доставить потребное количество соломы за вознаграждение по 00 коп. за пудъ и подводъ на расстоянии 00 верстъ, за что получаетъ излишекъ, остающийся за всеми расходами, изъ суммы, полученной отъ страхового общества.

Планъ и устройство строений определяется однимъ владельцемъ.

(Въ этомъ же параграфѣ устанавливаются условія относительно случаевъ: наводнения, градобитія, падежа скота, войны и т. п.).

G. Относительно техническихъ производствъ.

§ 21. Они могутъ быть учреждаемы не иначе, какъ на основаніи спеціальнаго письменнаго соглашения съ владельцемъ.

ЧАСТЬ III.

Пріемъ и обратная сдача имѣнія.

A. Общія условія.

§ 22. Владелецъ можетъ назначить сдачу имѣнія 8 дней раньше, или позже 1 июля текущего года.

Выполнение сдачи производится *передаточною комиссіей*, назначаемою сторонами заблаговременно (обозначается способъ назначения трехъ членовъ комисіи). По мѣрѣ сдачи ведется работамъ комисіи протоколъ, подписываемый всеми членами. Спорные пункты рѣшаются большинствомъ голосовъ. Каждый изъ сторонъ имѣетъ право заявить въ протоколъ несогласіе съ рѣшеніемъ комисіи и намереніе обратиться къ суду. Если этого не послѣдуетъ в течение 4 недѣль, то рѣшеніе комисіи остается окончательнымъ.

Все, находящіяся въ описаніи (прилож.) имѣнія, составныя части его должны быть выступающимъ изъ хозяйства сданы, а вступающимъ—приняты. Исключеніемъ могутъ быть:

- a) изъ живаго инвентаря: *отъ больныхъ животныхъ*;
- b) *весь живой инвентарь*, или его часть, въ томъ случаѣ, если обнаружена со стороны передающаго попытка измѣнить составъ стада для спекуляціи при передачѣ имѣнія;
- c) *негодные, излишніе, или служащіе цѣлямъ роскоши предметы*.

Если между выступающимъ и вступающимъ въ имѣніе возникаетъ разногласіе относительно цѣнности предметовъ, передаваемыхъ продажей, то принимается слѣдующій путь соглашенія:

- a) каждый изъ контрагентовъ выбирать по одному таксатору, которые представляются сдающей комиссіи;
- b) приглашеніе третьяго таксатора имѣетъ мѣсто въ томъ случаѣ, если первые два не достигнутъ соглашенія; третій таксаторъ назначается передающею комиссіей. Рѣшеніе такимъ путемъ считается окончательнымъ, если не оговаривается спеціально право обращения къ суду.

До конца передачи веденіе хозяйства лежитъ на обязанности выступающей стороны.

Сдача считается *оконченною*, когда заключены протоколы передаточной комисіи и сданы все уплаты сторонами другъ другу.

Издержки по операціи передачи имѣнія раздѣляются между сторонами по ровну.

B. Спеціальныя условія.

§ 23. 1) *Строенія*. На основаніи имѣющихсѣ, признанныхъ владельцемъ, счетовъ (согласно §§ 10 и 11) передаточная комиссія вычисляетъ сумму, подлежащую къ уплатѣ со стороны владельца или арендатора.

2) *Относительно земельныхъ угодій* §§ 12—13 контракта считаются выполненными, если со стороны владельца нѣтъ возраженій; въ противномъ случаѣ, послѣднія разрѣшаются комиссіей.

3) *Плодовые деревья* считаются и сортируются приглашаемымъ садовникомъ по слѣдующей схемѣ: А) *Зерновые плоды*: 1) ряз-

рядъ: привитыя молодыя деревья до 3 лѣтнаго возраста, числомъ 00 за экземпляръ = 00 копѣекъ; 2) разрады: до 6 года, числомъ 00, по 00 за штуку; 3) разрады: возрастъ... число... цѣна экземпляра и т. д. В) *Косточковые плоды*; С) *Другіе виды плодовъ* — по вышеприведенной схемѣ. Вычисленная такимъ образомъ цѣнность сравнивается съ опредѣленною, подобнымъ же способомъ, при пріемѣ имѣнія и разность выплачивается тою стороною, на которой находится *минус*. Владелецъ уплачиваетъ разность, конечно, лишь въ томъ случаѣ, если оказавшееся увеличеніе числа плодовыхъ деревьевъ произведено арендаторомъ съ обоюднаго согласія.

4) Прочіе предметы *железнаго инвентаря* сдаются и принимаются по описанію имѣнія и по оцѣнкѣ при посредствѣ, въ случаѣ необходимости, экспертовъ (печника и т. п.). Разница въ цѣнности выплачивается только владельцу.

5) *Хозяйственный инвентарь* доставляется выступающимъ хозяиномъ въ потребномъ размѣрѣ и хорошемъ состояніи.

Таксация инвентаря предпринимается лишь въ случаѣ, если не послѣдуетъ добровольнаго соглашенія относительно продажной цѣны. Для достиженія такого соглашенія выступающій обязывается представить вступающему за 15 дней до начала передачи:

а) *реестръ наличнаго скота*;

б) *реестръ предметовъ мертваго инвентаря* — тотъ и другой съ подробнымъ обозначеніемъ цѣны, по которой каждый предметъ долженъ быть купленъ вступающимъ хозяиномъ.

Вступающій имѣетъ право требовать, чтобы въ назначенный день ему были показаны всѣ предметы инвентаря. Если не послѣдуетъ соглашенія, то онъ можетъ требовать таксаци:

а) для каждаго вида скота, но не для какой либо отдѣльной штуки;

б) относительно *мертваго инвентаря* — для отдѣльныхъ видовъ орудій, или же для всѣхъ предметовъ, оцѣненныхъ въ реестрѣ выше напр. 5 руб.

Относительно покупной цѣны овецъ соглашеніе дѣлается, по возможности, *до стрижки*; если же это не состоялось, то арендаторъ при передачѣ имѣнія обязывается оставить нестриженными 25—30 овецъ разнаго возраста, чтобы сохранить основаніе для оцѣнки.

6) Выступающій обязывается доставить вступающему, по крайней мѣрѣ, тѣ *запасы*, которые обозначены въ описаніи:

а) *Зерна* должны быть доброкачественны и годны для рынка. Передающая коммиссія можетъ исключать дурныя зерна и требовать замѣны другими. Большіе, противъ указанныхъ въ описаніи, запасы зерна вступающій принимать не обязанъ. Оцѣнка зерна производится по послѣдней рыночной цѣнѣ города N.

б) Запасы *соломы и сухаго корма* (лугового и клевернаго сѣна, отрубей, мякны) доставляются выступающимъ безвозмездно, въ

количество, означенномъ въ описаніи, и того *качества*, которымъ вообще должны обладать подобные предметы при добычаніи ихъ въ хозяйствѣ съ достаточною тщательностью.

в) За клеверное и луговое сѣно *новаго укоса* (до іюля) выступающій получаетъ стоимость уборки и свозки, полагая по 00 коп. съ воза вѣсомъ въ 00 пудовъ.

д) Находящіеся запасы *удобрѣнія*: навоза, жижи, компоста, передаются безвозмездно въ количествѣ, указанномъ въ описаніи имѣнія.

е) Запасы древесной массы передаются покупкою вступающимъ по цѣнѣ пріобрѣтенія выступающимъ хозяиномъ. Стоимость привоза вычисляется, полагая за рабочій день подводы 00 коп.

ф) Изъ запасовъ для домашняго обихода должны быть сдаваемы и принимаемы тѣ и въ такихъ количествахъ, которые обозначены въ описаніи. Они принимаются по оцѣнкѣ на основаніи цѣнъ соседняго рынка.

г) Выступающій обязывается доставить передаточной коммиссіи въ первый же день сдачи имѣнія точное описаніе *воздѣлыванія полей* по той формѣ, которая установлена для этой цѣли въ приложеніи.

7) Выступающій долженъ передать воздѣланныя поля въ такомъ состояніи, которое условливается веденію имъ полевою системою, т. е. къ моменту сдачи должно быть сдѣлано все, что требуется хозяйственными основаніями, чтобы обезпечить успѣхъ слѣдующей жатвы. Вознагражденіе за полевой инвентарь выступающій получаетъ по тѣмъ цѣнамъ, которыя установлены въ таблицѣ, находящейся въ приложеніи къ контракту.

Если состояніе полевой культуры будетъ признано только *нормальнымъ*, то арендаторъ получаетъ за каждое растеніе, по числу десятинъ, вознагражденіе по *средней цѣнѣ*, между *максимумомъ* и *минимумомъ*, установленными въ вышеупомянутой таблицѣ. Если культура будетъ признана коммиссіей выше нормальной, то она поручаетъ таксаторамъ рѣшить слѣдующіе вопросы относительно лучшихъ полей:

1) должно ли приписать хорошее состояніе полей особымъ заботамъ арендатора?

2) Въ случаѣ утвердительнаго рѣшенія: на сколько арендаторъ заслуживаетъ вознагражденія за десятину свыше средняго, не переступая однако установленнаго въ таблицѣ *максимума*?

Въ обратномъ случаѣ таксаторы рѣшаютъ: 1) должно ли приписать дурное состояніе той или другой культуры небрежности арендатора? и 2) если да, то послѣдній получаетъ вознагражденіе по установленному *минимуму*.

Если *ранецъ* или *сурьница* уже сняты (къ 1 іюля), то выступающій получаетъ стоимость уборки и своза, оцѣняя упряжнѣй день въ 00 к.

На *клеверныхъ* поляхъ выступающій получаетъ вознагражденіе лишь за ту поверхность, на которой еще стоитъ первый укосъ, или же имѣется на лицо скошенное сѣно; въ случаѣ же употребленія перваго укоса на сѣно, или для пастбы, вступающій освобождается отъ всякаго вознагражденія выступающаго хозяина.

8) За *траву*, стоящую на *лугахъ*, выступающій ничего не получаетъ. Выгонъ на луга, въ послѣднемъ году аренды, допускается лишь до 23 апрѣля (или другаго числа).

9) *Огороды* должны быть сданы въ обработанномъ видѣ, сообразно потребностямъ домашняго хозяйства.

Всѣ расходы, сдѣланные на этотъ предметъ наличными деньгами, выступающій получаетъ обратно отъ вступающаго.

10) Налоги и повинности выступающій уплачиваетъ сполна по 1 июля; недоимки должны быть внесены немедленно.

11) Арендаторъ обязывается, если не послѣдуетъ особаго договора, въ послѣднемъ году аренды заключить такіе условія съ важнѣйшими рабочими, чтобы владѣлецъ имѣлъ возможность при вступленіи въ имѣніе располагать необходимыми рабочими силами.

12) Исходными пунктами для расчетовъ и уплатъ по всемъ *уравнительнымъ счетамъ*, относительно которыхъ имѣтъ спеціальныхъ указаній въ контрактѣ, назначаются 1 июля года начала и года конца арендованія. Исключенія суть:

а) Уплаченная выступающимъ страховая премія отъ градобитія возвращается послѣднему сполна вступающимъ, взамѣнъ чего послѣдній получаетъ страховой полнѣе.

Если поля были побиты градомъ до дня передачи имѣнія, то выданная страховымъ обществомъ сумма передается вступающему.

б) Наемная плата за участки земли, отданные крестьянамъ или рабочимъ, поступаетъ также вступающему хозяину.

в) Приходы молока и масла идутъ въ пользу выступающаго по день окончанія передачи имѣнія. Взамѣнъ того, сдающій хозяинъ обязывается содержать до того же срока на свой счетъ всѣхъ служащихъ лицъ въ хозяйствѣ.

г) Работы по воздѣлыванію полей производитъ выступающій по день изслѣдованія цѣнности полеваго инвентаря.

ЧАСТЬ IV.

Условія относительно обезпеченія взаимно-принятыхъ обязательствъ.

А. Общія для обоихъ контрагентовъ.

§ 24. При возникновеніи несогласій между владѣльцемъ и арендаторомъ, они разрѣшаются не обыкновеннымъ судебнымъ порядкомъ, но *третейскими судами*. Обѣ стороны избираютъ по одному члену суда, которые выбираютъ третьяго, служащаго председателемъ. Рѣшенія этого суда признаются окончательными. Неправая сторона уплачиваетъ расходы; въ случаѣ же соглашенія, послѣдніе дѣлятся пополамъ. При сдачѣ и передачѣ имѣнія, третейскій судъ поручается передающей комиссіи. Право обращенія къ суду сохраняется для слѣдующихъ случаевъ: а) которые указаны спеціально въ контрактѣ, б) при не внось арендной платы, в) когда третейскій судъ самъ будетъ рекомендовать этотъ путь разрѣшенія спорнаго вопроса.

В. Для обезпеченія арендатора.

§ 25. Владѣлецъ *ручается*, что всѣ передаваемые части имѣнія и сопряженные съ нимъ права существуютъ дѣйствительно въ томъ объемѣ, въ какомъ они описаны въ прилагаемомъ описаніи имѣнія.

Но за *доходность* частей имѣнія владѣлецъ не даетъ никакого ручательства.

§ 26. Прописываются случаи, когда арендаторъ имѣетъ право прекратить арендованіе ранѣе срока съ предувѣдомленіемъ о томъ заблаговременно.

С. Для обезпеченія владѣльца.

§ 27. Въ видѣ ручательства за выполненіе всѣхъ изложенныхъ въ контрактѣ обязательствъ, арендаторъ представляетъ залогъ . . . на сумму процентными бумагами. . . . ; залогъ передается владѣльцу передъ сдачею имѣнія по заключеніи контракта. Арендаторъ пользуется процентами съ заложенныхъ бумагъ.

§ 28. *Особенныя обязанности арендатора.*

1) Арендаторъ обязывается возмѣщать всакій ущербъ, причиненный въ имѣніи по его винѣ, вслѣдствіе невыполненія контрактныхъ обязательствъ, недосмотра и т. п.

2) Обязывается жить въ имѣніи и лично заведывать хозяйствомъ.
3) Въ разстояніи 25 верстъ кругомъ, арендаторъ не имѣетъ права покушать, арендовать или управлять какимъ либо другимъ хозяйствомъ.

4) Всѣ требованія, возникающія по отношенію къ владѣльцу въ течение года, представляются послѣднему арендаторомъ къ 1 числу ближайшаго августа мѣсяца.

5) Арендаторъ обязывается, по востребованію владѣльца, страховать отъ огня всѣ строения съ ихъ принадлежностями. Страховая сумма определяется по взаимному соглашенію.

6) О страхованіи отъ града и надежей.

7) Арендатору воспрещается продажа изъ хозяйства: травъ, сѣна, соломы, толоки, навоза и урожая въ на корню. Продажа картофеля и свеклы дозволяется при обязательствѣ восполненія въ томъ же году отчужденнаго количества фосфорной кислоты и кали посредствомъ ввоза въ имѣніе остатковъ отъ техническихъ производствъ, или соотвѣстныхъ удобреній.

8) Арендаторъ обязывается вести постоянное счетоводство относительно *свооборота, удобренія и урожая* для каждой части земли, а также относительно прибыли и убыли скота, удоевъ и пр. Всѣ книги при обратной сдачѣ остаются въ имѣніи.

§ 29. *Особенныя права владѣльца.*

1) Владѣлецъ имѣетъ право во всякое время, лично или чрезъ уполномоченнаго, предпринять *ревизію хозяйства*; арендаторъ обязанъ при этомъ доставлять всѣ книги по счетоводству и давать всѣ требующія свидѣнія по хозяйству.

2) Владѣлецъ, въ случаѣ невноса арендаторомъ какихъ-либо слѣдующихъ по контракту платежей, имѣетъ право брать соотвѣстственную сумму изъ залога. Арендатору предоставляется въ такихъ случаяхъ обращаться къ третейскому суду.

3) Владѣлецъ имѣетъ право прекращать аренду раньше срока, если:

- будетъ назначенъ конкурсъ надъ имуществомъ арендатора;
- не будетъ внесена арендная плата въ теченіе двухъ сроковъ;
- арендаторъ отказывается предъявить счета или книги по движенію и состоянію въ хозяйствѣ предметовъ натурою;
- арендаторъ будетъ подвергнутъ продолжительному (срокъ) аресту, или по суду лишится лично и по состоянію присвоенныхъ правъ;
- арендаторъ будетъ вести очевидно неразумное хозяйство, уничтожить инвентарь, скотъ и т. п.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ арендатору предоставляется право требовать третейскаго суда. Если по какой-либо изъ названныхъ

причинъ арендаторъ признается виновнымъ, то онъ обязывается уплатить арендную плату по 1 іюля, хотя бы арендованіе было прекращено ранѣе.

4) По прекращеніи арендованія, владѣлецъ имѣетъ право немедленно удалить арендатора изъ имѣнія.

§ 30. Расходы по заключенію контракта законнымъ путемъ раздѣляются пополамъ между владѣльцемъ и арендаторомъ.

§ 31. При контрактѣ находится приложение по описанію имѣнія, ссылки на которое въ контрактѣ имѣютъ обязательную силу для обоихъ контрагентовъ.

Задачи, предстоящія арендатору по заключенію контракта.

Первою работою арендатора должно быть изученіе имѣнія во всѣхъ его деталяхъ и *составленіе организационнаго плана для будущаго веденія хозяйства*. Главнымъ основаніемъ для проэкта служатъ опыты предъидущихъ лѣтъ въ хозяйствѣ относительно обработки, удобренія, воздѣлыванія разныхъ растений и содержанія скота, опыты, которые арендатору необходимо сопоставить съ своими теоретическими заключеніями объ устройствѣ будущаго хозяйства. Если прежняя система хозяйства, при такомъ изслѣдованіи, окажется несоотвѣтствующею, то значительныя измѣненія должны быть предприняемы не вдругъ, и притомъ тѣмъ осторожнѣе, чѣмъ менѣе знакомъ арендаторъ съ мѣстностью и ея хозяйственными условіями. Легко *измѣнить старую* систему, но гораздо труднѣе *вести соотвѣстственную новую* форму хозяйства.

Во всякомъ случаѣ можно совѣтовать новому хозяину держаться первые два года преимущественно прежней системы и вводить измѣненія *не сразу*, но постепенно, приучая къ нимъ мало по малу находящійся въ имѣніи персоналъ помощниковъ и рабочихъ. Если же коренное измѣненіе хозяйства окажется абсолютно необходимымъ, то главное вниманіе должно быть обращено на богатство и плодородіе почвы и средства, которыми располагаетъ арендаторъ. Если почва богата и средства достаточны, то быстрый переходъ къ новому хозяйству можетъ быть осуществленъ при помощи покупки кормовыхъ средствъ и удобренія, увеличенія инвентаря и рабочихъ силъ; но не слѣдуетъ при этомъ забывать, что подобныя мѣры требуютъ чрезвычайныхъ затратъ, которыя вознаграждаются только въ послѣдующіе годы. При посредственной почвѣ и умѣренныхъ средствахъ арендатора, въ первые годы необходимо ограничиваться тщательною обработкой пара, зеленымъ удобреніемъ, воздѣлываніемъ *хлѣбовъ*, дающихъ много соломы, и только постепенно, уве-

личивая полевое травостойние и воздѣлываніе корнеплодовъ, переходить къ болѣе интензивной системѣ.

Само собою разумѣется, что измѣненія, подобныя выбору системы хозяйства и рода культуръ, сѣвообороту и вытекающимъ отсюда размѣрамъ инвентаря въ орудіяхъ, рабочемъ и пользовательномъ скотѣ, могутъ быть вводимы не иначе, какъ результатъ тщательно взвѣшенныхъ окружающихъ обстоятельствъ и точнаго, рационально сдѣланнаго *вычисленія*. Ни въ какомъ случаѣ арендаторомъ не должны руководить пристрастіе или охота къ какой либо системѣ, сѣвообороту, виду скота, или породѣ; онъ долженъ предпочитать тѣ систему, сѣвооборотъ, или отрасль хозяйства, которые, по расчету, обѣщаютъ болѣе чистый доходъ.

По отношенію къ скоту, прежде всего должно быть обращено вниманіе на число и доброту рабочихъ животныхъ; число ихъ должно быть достаточно для хорошаго выполненія всѣхъ, предполагаемыхъ системой, работъ и въ тоже время оно не должно быть слишкомъ велико, чтобы не расходовать безплодно въ періоды неработы большихъ количествъ корма. При выборѣ видовъ продуктивнаго скота (лошади, рогатый скотъ, овцы, свиньи) и способовъ пользованія (молоко, откармливаніе, выращиваніе и пр.) вопросъ рѣшается вычисленіемъ, во сколько каждая изъ названныхъ отраслей скотоводства оплачиваетъ равное количество корма.

При такомъ вычисленіи надо постоянно помнить, что только при хорошемъ кормленіи скотъ оплачиваетъ соответственнымъ образомъ свое содержаніе и даетъ цѣнное удобреніе, что поэтому всегда выгоднѣе держать меньшее число, но хорошо содержимаго скота, нежели большое при дурномъ кормленіи; надо помнить также, что не существуетъ такой породы, которая бы была выгодна *сама по себѣ*, но каждая изъ нихъ можетъ быть доходною лишь при соответственныхъ обстоятельствахъ; наконецъ, не слѣдуетъ задаваться мыслію, что скотъ держится для полей, или обратно, но что скотъ и поля существуютъ для того, чтобы доставлять *доходъ* арендатору, а потому тотъ родъ хозяйствованія, который наиболѣе достигаетъ такой цѣли, есть самый правильный и целесообразный.

Далѣе, арендатору предстоитъ сообразить, есть ли возможность, при помощи той или другой *меліорации* (капитальнаго улучшенія), возвысить доходъ отъ хозяйства въ той степени, чтобы въ теченіе аренднаго срока могъ быть погашенъ затраченный капиталъ и выручены еще соответственные проценты. Въ противномъ случаѣ, арендатору нѣтъ расчета производить подобныя улучшенія, хотя бы они были даже необходимы и въ абсолютномъ смыслѣ выгодны.

При условіи возможности погашенія выгодно-дѣйствующихъ улучшеній, или если владѣлецъ соглашается уплатить въ концѣ арендованія непогашенную часть капитала, арендатору выгоднѣе не отлагать исполненіе подобныхъ мѣръ, но производить ихъ немедленно, такъ какъ чрезъ это увеличивается *срокъ*, въ теченіе котораго меліорация приноситъ доходъ. Весьма понятно, что о долгосрочныхъ затратахъ можетъ идти рѣчь лишь при условіи продолжительной аренды.

Тѣ улучшенія, которыя окунаются относительно скоро и могутъ быть производимы за *собственный* счетъ арендатора, должны имѣть предметомъ: болѣе глубокую и совершенную обработку, тщательное воздѣлываніе растений, обильное удобреніе, проведеніе осушительныхъ канавъ, небольшія выравниванія мѣста, обѣсъ пустыхъ мѣстъ на лугахъ, боронованіе ихъ, приспособленіе дождевой и снѣговой воды для орошенія, выжиганіе болотистыхъ или торфяныхъ мѣстъ и т. п.

Долго дѣйствующія улучшенія, какъ напримѣръ сооруженія для орошенія или подземной осушки (дренажъ), которыя хотя и приносятъ доходъ во время аренды, но въ которыхъ *часть* затраченнаго капитала въ концѣ арендованія остается непогашенною, могутъ быть выполняемы лишь при согласіи владѣльца уплатить арендатору въ концѣ арендованія непогашенную часть затраченнаго на улучшеніе капитала. Если подобная меліорация производится вся на счетъ владѣльца, то арендаторъ долженъ платить за это въ арендной платѣ проценты съ затраченнаго капитала и ежегодную долю погашенія до конца срока аренды.

Цѣль арендатора и доброжелательный совѣтъ ему.

Со вступленіемъ въ хозяйство начинается для арендатора напряженная сельско-хозяйственная дѣятельность. Хотя послѣдняя по существу и мало отличается отъ работы хозяина владѣльца, или хозяина управляющаго, но здѣсь уже собственный интересъ требуетъ, чтобы дѣятельность была усердна и исполнена энергія и предпримчивости. Землевладѣлецъ, котораго собственность заключена въ имѣніи, работаетъ преимущественно въ томъ направленіи, чтобы этотъ фундаментъ его имуществу не потерпѣлъ уменьшенія въ своей капитальной цѣнности; управляющій заботится главнымъ образомъ о выполненіи воли владѣльца, у котораго онъ служитъ; арендаторъ же о томъ, какимъ образомъ онъ можетъ въ опредѣленный, относительно короткий, срокъ возратить обратно затраченный имъ капиталъ съ прибавкою *соответственнаго дохода*.

Быстрое и доходное производственно есть цѣль, къ которой онъ долженъ стремиться при помощи всѣхъ средствъ, ведущихъ къ тому

вернымъ путемъ. Арендаторъ, который, быть можетъ, прежде находился на службѣ, долженъ не забывать, что хотя онъ теперь уже и не служитъ другому, но собственный интересъ его обязываетъ еще въ большей степени посвящать хозяйству *все свое время*.

Хотя и должно предполагать, что всякій арендующій знаетъ свои обязанности, но тѣмъ не менѣе не бесполезно, если онъ почаще будетъ продумывать ихъ во взаимной связи, для чего слѣдующіе совѣты могутъ дать нѣкоторымъ точки опоры.

Если хозяйство столь значительнаго объема, что арендаторъ не въ состояніи вести его одинъ, то ему необходимо избрать себѣ хорошаго помощника, который долженъ обладать тѣмъ болѣею опытностью, чѣмъ менѣе ея у самаго арендатора. Въ хозяйствѣ съ самаго начала долженъ быть водворенъ строгій порядокъ, примѣръ которому долженъ подавать самъ арендаторъ. Каковъ господинъ, таковы и слуга. Онъ долженъ вставать *ранѣе* и ложиться *позже* всѣхъ. Только тогда ему будутъ подражать его рабочіе, которые ничего не терпятъ, если имѣютъ возможность лишняго отдыха. Осмотръ стойлъ, кормленія, чистки скота и забота о томъ, чтобы рабочій скотъ отправлялся на работу въ надлежащее время и хорошо выкормленнымъ, открываютъ начало дневной работы.

Потребныя для этого распоряженія должны быть сдѣланы накануне и измѣняемы сообразно состоянію погоды. Такимъ же образомъ дается направленіе и для ручной работы. Каждый рабочій еще накануне долженъ знать — что, гдѣ и сколько ему слѣдуетъ сдѣлать въ предстоящій день. Чѣмъ разнообразнѣе хозяйство, тѣмъ многочисленнѣе и разнообразнѣе работы, тѣмъ болѣе требуется обдуманности и системы въ ихъ производствѣ и направленіи. Это облегчается предварительною смѣтою всѣхъ предстоящихъ работъ въ началѣ каждой недѣли, причемъ обращается достаточное вниманіе на случайности, которыя могутъ измѣнить планъ и сдѣлать необходимымъ въ немъ то или другое измѣненіе, которое должно быть предвидѣно заранее. Арендаторъ долженъ знать всегда, что сдѣлано, что предстоитъ сдѣлать и особенно въ самомъ ближайшемъ времени.

Рабочіе должны быть подъ постояннымъ наблюдениемъ. Относительно постоянныхъ и поденныхъ рабочихъ это наблюдение имѣетъ въ виду преимущественно непрерывность и количество работы, а по отношенію къ издѣльнымъ работамъ — ея качество. Въ послѣднемъ случаѣ рабочій долженъ зарабатывать болѣе, нежели поденщикъ, а хозяину работа должна обходиться дешевле, нежели поденная. При возможности такихъ свойствъ, издѣльная работа можетъ быть гораздо выгоднѣе поденной, но, въ сожалѣнію, она можетъ имѣть мѣсто лишь въ извѣстныхъ работахъ, которыя опредѣляются въ каждомъ частномъ случаѣ особо, смотри по обстоятельствамъ и

обычаю. Количество произведенной ежедневно работы поденными и издѣльными рабочими отмѣчается въ спискахъ и журналахъ, что даетъ основаніе для наряда на работы въ слѣдующій день.

Подобно пшѣннымъ работамъ, необходимо удѣлять достаточное вниманіе и работамъ внутреннимъ, въ усадьбѣ, которыя находятся всегда въ связи и взаимодействіи съ первыми. Предметъ главнѣйшихъ заботъ — скотоводство. Нѣтъ ничего неосновательнѣе, какъ это иногда дѣлается, передавать все веденіе скотоводства въ женскія руки. Какъ бы ни была опытна и трудолюбива заведующая скотомъ женщина, она не можетъ знать, какой родъ кормленія и способъ пользованія *представляютъ наиболѣе выгоды въ связи со всею организацией хозяйства*. Рѣшенія подобныхъ вопросовъ, и систематизація скотоводства въ зависимости отъ этихъ рѣшеній, могутъ исходить лишь отъ *того лица*, которое организовало хозяйство и въ состояніи обзрѣть его въ цѣломъ, какъ организмъ, состоящій изъ частей, родъ, размѣры и свойства которыхъ обуславливаютъ другъ друга и находятся въ нормальномъ соотношеніи. Такимъ лицомъ долженъ быть, конечно, самъ арендаторъ. Притомъ, при надзорѣ за содержаніемъ скота, хозяинъ можетъ приобрести достаточный авторитетъ въ глазахъ рабочихъ лишь тогда, если онъ обнаруживаетъ *познанія* относительно состоянія и качества своихъ животныхъ; а такіе познанія могутъ быть приобретены *только* изъ личнаго наблюденія. Важнѣйшіе и въ тоже время самые интересныя предметы дѣятельности арендатора, относительно скотоводства, заключаются: въ рѣшеніи вопроса о назначеніи стойлового или выгонаго содержанія скота, назначенія и помеченія ихъ о пастбищахъ, обезпеченія скота, при стойловомъ содержаніи въ теченіи всего лѣта, достаточнымъ количествомъ зеленого корма во всѣ періоды лѣтнаго кормленія, вычисленія и обезпеченія потребнымъ количествомъ корма для всей зимы, въ рѣшеніяхъ относительно снабженія и сохраненія запасовъ соломы, сѣна, корнеплодныхъ и клубневыхъ растений для зимняго кормленія, опредѣленія продолжительности разныхъ періодовъ кормленія и соображенія съ ними кормовыхъ запасовъ, въ обзорѣннѣйшій послѣднихъ по ихъ количеству и составу и сравненіи послѣднихъ съ тѣмъ составомъ, который требуется на основаніи нормальныхъ дачъ при той или другой пастбищной содержанія скота.

Во всѣхъ перечисленныхъ расчетахъ и соображеніяхъ, хозяинъ долженъ руководиться тѣмъ положеніемъ, что ни въ какомъ случаѣ онъ не долженъ держать скота болѣе, нежели сколько онъ можетъ прокормить его сообразно массѣ кормовъ, производимыхъ въ хозяйствѣ и приобретаемыхъ *дешевой* покупкой, что гораздо выгоднѣе содержать менѣе скота, во кормить его изобильно, нежели много, но при дурномъ кормленіи, что, наконецъ, это положеніе опытомъ всѣхъ

мѣсть и время достигло значенія закона, нарушение котораго всегда сопровождается убыткомъ.

Постоянныя наблюденія, расчетъ и сравненія сельско-хозяйственныхъ фактовъ могутъ привести арендатора съ теченіемъ времени въ искусство проектировать такіе опыты, которые могутъ осуществиться, при выполненіи, съ математическою точностью въ данномъ хозяйствѣ. Конечно, это возможно, если такія наблюденія отбѣчаются на бумагѣ и не исчезаютъ изъ памяти.

Вспомогательными книжками при наблюденіяхъ и расчетахъ всякаго рода могутъ служить съ большою пользою такъ называемые сельско-хозяйственные календари, между которыми лучшіе на нѣмецкомъ языкѣ издаются: Менцелемъ, Комерсомъ, граф. Липпе и Лебе. (Mentzel, Komers, Lippe und Löbe), а на русскомъ: сельско-хозяйственный календарь Спасскаго и календарь русскаго сельскаго хозяина изданіе Девриена.

Достигается ли хозяйственнымъ производствомъ, въ цѣломъ, благоприятный или отрицательный результатъ, это обнаруживается для арендатора весьма скоро на состояніи его кассы, на уменьшеніи или увеличеніи запасовъ разнаго рода; но почему происходитъ то или другое измѣненіе въ капиталѣ, какимъ образомъ можно исправить дурной, или еще болѣе возвысить благоприятный, результатъ, представляютъ ли замѣченные измѣненія доходности преходящее явленіе, или грозятъ сдѣлаться постоянными, всѣ эти вопросы могутъ быть разрѣшены *точно* и *иначе*, какъ при условіи постоянного веденія *точного* и *аккуратнаго* счетоводства, которое составляетъ въ настоящее время неизбежную необходимость каждаго рациональнаго хозяйства. Тѣмъ болѣе счетоводство необходимо для арендатора, такъ какъ его ошибки наказываются строже и для исправленія ихъ предлежитъ менышій срокъ, нежели для хозяина владѣльца. Только при помощи счетоводства, арендаторъ можетъ *быстро* опредѣлять причины и источники дохода или убытка, увеличенія или уменьшенія его капитала. Такія задачи притомъ могутъ быть выполнены только при помощи *двойнаго счетоводства*, такъ какъ только при этой формѣ бухгалтеріи можетъ быть *ирико* опредѣленъ доходъ или убытокъ отъ разныхъ отраслей хозяйства и слѣдовательно указанъ путь къ тому направленію хозяйства, которое, при данныхъ условіяхъ, представляетъ наиболѣе выгоды.

АРЕНДУЕМОЕ ИМѢНІЕ.

Величина и положеніе имѣнія.

Объемъ имѣнія и зависящій отъ него способъ пользованія.

Первые вопросы, которые задаетъ себѣ арендаторъ относительно сдаваемого кѣмъ-либо въ аренду имѣнія заключаются въ томъ, какъ велико это имѣніе? Каково его положеніе? И въ самомъ дѣлѣ, это самые главные и рѣшающіе вопросы. Величина имѣнія даетъ тотчасъ же точку опоры арендатору, если онъ знакомъ съ мѣстностью, гдѣ находится имѣніе, для сужденія о томъ, соответствуетъ ли оно его знаніямъ, матеріальнымъ средствамъ и желаніямъ. Знаніе же положенія имѣнія, при достаточныхъ свѣдѣніяхъ о его величинѣ и мѣстности приводитъ къ общему представленію о родѣ и формѣ сельско-хозяйственнаго производства, которому арендаторъ будетъ посвящать свою дѣятельность.

Способъ пользованія землею, по скольку онъ опредѣляется величиною имѣнія, движется въ предѣлахъ нижеслѣдующихъ формъ, въ которыхъ указаны лишь самыя общія и характерныя черты.

При большомъ имѣніи, особенно если оно не лежитъ въ одной окружной мѣстѣ, во вѣкоторыя части его разбросаны, производство принимаетъ слѣдующее направленіе: ведется по возможности простая, легкая для обзорѣнія и контроля, система хозяйства, болѣе экстензивная, весьма часто съ учрежденіемъ внутреннихъ и въѣзныхъ полей, при разныхъ сѣвооборотахъ на тѣхъ и другихъ. Болѣе удаленныя части земли здѣсь назначаются подъ выгоны, или сдаются въ пользованіе сосѣднимъ крестьянамъ, или другимъ владѣль-

цамъ. Въ такихъ имѣніяхъ, по большей части, производится *собственное* выращиваніе главнѣйшихъ видовъ домашнего скота: лошадей, рогатого скота и овецъ; нерѣдко эти три вида скота держатся въ *разныхъ* размѣрахъ; свиноводство часто бываетъ также обширно; птицеводство здѣсь не имѣетъ значенія; садоводство и огородничество весьма ограничены и не составляютъ существенной отрасли хозяйства. Технические производства, перерабатывающія сырые продукты земледѣлія, или совсѣмъ *отсутствуютъ*, или же, напротивъ, ведутся въ *большомъ* видѣ. Технические же производства, доставляющія топливо и строительный матеріалъ, а также обрабатывающія зерно, почти всегда учреждаются въ большихъ имѣніяхъ, какъ напр. кирпичные и дренажные заводы, обжиганіе извести, добыча торфа, приготовленіе кизяка, мельницы, маслобойные заводы для добыванія растительныхъ маселъ и т. п. Въ большихъ хозяйствахъ выгодно примѣненіе большихъ машинъ: жатвенныхъ, сѣнокосилекъ, радовыхъ сѣялокъ, молотилокъ и т. д., выгодно примѣненіе пара, какъ движителя. При большомъ примѣненіи машинъ, здѣсь нерѣдко необходимо учрежденіе собственной механической мастерской для починокъ разнаго рода и изготовленія орудій для собственнаго употребленія и продажи.

Арендаторъ въ такомъ хозяйствѣ есть главнымъ образомъ организаторъ и управлюющій; онъ держитъ опытныхъ и самостоятельныхъ помощниковъ, дѣлаетъ капиталныя затраты и въ нужныхъ случаяхъ—даже на собственный рискъ.

При средней величинѣ имѣнія и въ обыкновенныхъ условіяхъ, арендаторъ избираетъ: болѣе интенсивную форму хозяйства *безъ* или съ *ограниченіемъ* пространства подъ чернымъ паромъ; воздѣлываніе кормовыхъ растений, относительно хлѣбныхъ, здѣсь должно быть усилено, сравнительно съ большими имѣніями; пространства подъ кормовыми растениями и хлѣбными, нерѣдко равны, часто кормовыя занимаютъ даже большую поверхность. Вводятся паровыя, особенно масличныя и прядильныя растенія, занимающія впрочемъ ограниченное пространство $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{16}$ полей. Обработка полей производится тщательно, особенное вниманіе обращается на углубленіе пахатнаго слоя; примѣняются въ большей мѣрѣ подсобныя къ навозу удобрения. Изъ видовъ скотоводства преобладаетъ рогатый скотъ; овиноводство, напротивъ, незначительно, по крайней мѣрѣ количественно; качественно же—оно можетъ стоять весьма высоко, при содержаніи отличнаго племяннаго стада для шерсти, или при содержаніи хорошихъ породъ мясныхъ овецъ. Вообще такіа хозяйства во всѣхъ отрасляхъ скотоводства заботятся болѣе о качествѣ, нежели количествѣ скота и продуктовъ его. Выращиваніе всѣхъ видовъ молодаго скота здѣсь можетъ быть выгодно только при

производствѣ породистыхъ животныхъ, годныхъ къ сбыту, какъ племянной скотъ. Въ противномъ случаѣ, выращиваніе обыкновенно невыгодно. Можетъ быть выгоднымъ птицеводство, огородничество и при благоприятныхъ (хотя рѣдко) обстоятельствахъ—даже садоводство. Технические производства здѣсь, какъ винокуреніе, добычаніе растительныхъ маселъ, крахмальное и пр., стоятъ въ тѣсной связи съ хозяйствомъ, приварованы къ цѣлямъ послѣдняго и основаны на сыромъ продуктѣ собственнаго производства; технические производства, не дающія полезныхъ для хозяйства остатковъ, имѣютъ подчиненное значеніе и болѣею частью совсѣмъ отсутствуютъ.

Примѣненіе машинъ и ихъ выборъ опредѣляется преимущественно животною движущею силою, такъ какъ примѣненіе пара возможно только путемъ ассоціаціи нѣсколькихъ такихъ хозяйствъ. Арендаторъ здѣсь не только организаторъ, но и главный исполнитель организаціоннаго плана; на немъ лежатъ также главныя работы по надзору и контролю рабочихъ; для помощи ему здѣсь могутъ служить уже *несамостоятельные* помощники, которыми онъ имѣетъ возможность руководить. Значительныя улучшенія въ такихъ имѣніяхъ арендаторъ не въ силахъ взять на свой рискъ, а потому они производятся владѣльцемъ при условіи вознагражденія послѣдняго соотвѣтственными процентами съ затраченнаго капитала.

При маломъ имѣніи, арендатору болѣе выгодно: нести сложное или вольное хозяйство, не связанное никакою предвзятою системою, но ежегодно разсчитываемое на состояніе ближайшаго рынка. Здѣсь необходимы глубокая и тщательная обработка; все, что воздѣлывается, отчуждается изъ хозяйства продажей; удобреніе примѣняется часто и въ большихъ размѣрахъ. Скотъ или отсутствуетъ совершенно, или держится въ маломъ количествѣ, но при особенно тщательномъ уходѣ и высокаго качества; это дѣлаетъ необходимымъ приобрѣтеніе большаго количества удобрения со стороны покупкою; въ другихъ случаяхъ, такимъ хозяйствамъ можетъ быть выгодно, обратно, содержаніе, несоразмѣрно съ пространствомъ, большаго количества скота при покупкѣ значительной массы кормовыхъ средствъ со стороны. Между отраслями скотоводства, здѣсь выращиваніе не можетъ имѣть мѣста; выгоднѣйшія вѣтви скотоводства: молочный скотъ и откармливаемая свинья. Въ малыхъ имѣніяхъ можетъ быть очень выгоднымъ птицеводство, также огородничество и садоводство, рѣдко—техническія производства и притомъ только въ размѣрахъ ремесла. Изъ машинъ могутъ найти примѣненіе только ручныя; услугами большихъ машинъ подобныя хозяйства пользуются, если представляется случай, посредствомъ найма на требуемое время. Арендаторъ малаго имѣнія есть первый между своими рабочими; онъ надзираетъ за ихъ работою лично и

нерѣдко принимаетъ самъ участіе въ послѣдней. Его помощниками могутъ быть только члены его собственнаго семейства.

Арендаторъ долженъ помнить, что объемъ и размѣры имѣнія до известной степени полагаютъ границы для его дѣятельности и что эти границы не могутъ быть переступаемы безнаказанно. Если хозяинъ развиваетъ размѣры своего производства выше, нежели это соответствуетъ величинѣ имѣнія, то результатомъ бываетъ всегда или превышеніе расходовъ надъ доходами, или менѣе выгодное отношеніе первыхъ къ послѣднимъ; въ обратномъ случаѣ, если дѣятельность хозяина стоитъ ниже размѣровъ имѣнія, онъ не извлечетъ изъ него той выгоды, которая возможна, и нерѣдко не въ состояніи уплатить той арендной платы, которая опредѣлена контрактомъ.

Отношеніе различныхъ угодій другъ къ другу.

Для арендатора вопросъ объ отношеніи другъ къ другу пространствъ подъ полями, лугами, выгонами, усадьбою и прудами (лѣса рѣдко бываютъ предметомъ аренды) имѣетъ большее значеніе, нежели для владѣльца, который можетъ измѣнять это отношеніе по произволу, между тѣмъ какъ арендатору такое право предоставляется весьма рѣдко. Онъ получаетъ угодія уже въ опредѣленныхъ размѣрахъ и отношеніяхъ, представляющихъ величины, которыя такъ сказать уже даны.

Если имѣніе обладаетъ большимъ пространствомъ луговъ и выгоновъ, то тѣмъ большая часть полей можетъ быть назначена подъ производство: хлѣбныхъ, торговыхъ (масличныхъ, крахмальныхъ и пр.) и корнеплодныхъ растений, если по условіямъ цѣны воздѣлываніе этихъ растений выгоднѣе, нежели назначеніе полей для скотоводства; значительныя пространства выгоновъ дѣлаютъ необходимыми для арендатора (если онъ по контракту не имѣетъ права превращать выгоны въ луга, или поля) вести лѣтнее содержаніе скота на выгонахъ вполнѣ, или въ теченіе части лѣта. При недостаткѣ луговъ, напротивъ, тѣмъ большая часть полей должна быть назначена подъ воздѣлываніе кормовыхъ травъ, соответствующихъ климату и почвѣ, притомъ тѣмъ большая, чѣмъ менѣе плодородна почва для хлѣбовъ и вообще продажныхъ растений, съ одной стороны, и чѣмъ большую выгоду представляетъ скотоводство — съ другой. Въ первомъ случаѣ травосѣяніе доставляетъ большую массу навоза, а во второмъ — оно позволяетъ расширять отрасль скотоводства, если послѣдняя непосредственно доходна. Такое же значеніе для хозяйства пріобрѣтаетъ, при недостаткѣ луговъ, учрежденіе техническихъ производствъ, фабрики которыхъ, удаляемые изъ хозяйства, не содержатъ въ себѣ минеральныхъ питательныхъ ве-

ществъ, и отъ которыхъ въ тоже время получаютъ въ хозяйствѣ остатки, годные для корма скота, какъ винная барда, масляные выжимки и пр. Такимъ путемъ уменьшается истощеніе полей, увеличивается запасъ кормовыхъ средствъ для скота, а слѣдовательно — и масса навознаго удобренія. Между нѣмнѣ, относящимися сюда, техническими производствами первостепенное значеніе имѣетъ винокуреніе. Въ германской сельско-хозяйственной практикѣ принимаютъ, на основаніи опыта, что въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ хозяйство основано на производствѣ зерновыхъ растений и гдѣ скотоводство не представляетъ особенныхъ выгодъ, изъ всей удобной земли хозяйства (включая въ нее поля, луга и выгоны) должны быть посвящены слѣдующія доли поверхности подъ воздѣлываніе кормовыхъ растений (травъ и корнеплодныхъ).

при очень хорошей почвѣ.	30—45%
• средн. качества	45—55 .
• плохой	55—75 .

Если же скотоводство даетъ большій доходъ, нежели зерно, тогда очевидно, хозяину выгоднѣе отводить подъ кормовыя растения возможно большую часть земли, границы которой опредѣляются здѣсь потребностью въ подстилкѣ и въ такихъ кормахъ (какъ напр. зерно, выжимки), которые, будучи скармливаемы съ производимыми въ хозяйствѣ сѣномъ и корнеплодами, условливаютъ болѣе рациональный составъ *всей массы* кормовыхъ запасовъ, смотря по ея назначенію для той или другой отрасли скотоводства. Во всѣхъ приведенныхъ случаяхъ, однако, правильное соотношеніе между площадями подъ продажными и кормовыми растениями можетъ быть найдено не иначе, какъ съ помощію точнаго цѣнаго учета, который опредѣляется: доходность производствъ продажныхъ (прим. зерновыхъ) растений, доходность скотоводства, потребность хозяйства въ удобреніи и стоимость производства послѣдняго.

Поля, луга и выгоны, по большей части, встрѣчаются раздѣленными разными естественными признаками (живыми урочищами), какъ напримѣръ: рѣкою, ручьемъ, оврагомъ, перелѣскомъ и т. под., на доли и части разной величины. Это естественное раздѣленіе имѣетъ особую важность по отношенію къ полямъ и культурамъ, которыя на нихъ ведутся.

А именно, это раздѣленіе вліяетъ въ большой степени на число влизовъ сѣвооборота, на подраздѣленіе cadaго отдѣльнаго клна, а слѣдовательно и на всю форму сѣвооборота; такъ напр., отъ естественнаго раздѣленія земли зависитъ рѣшеніе вопроса, организовать ли сѣвооборотъ съ равными или неравными, цѣльными или подраздѣленными на части клнами, а также и вопроса о томъ, не лучше

ли, вместо одного, учредить два параллельные сѣвооборота, дополняющіе другъ друга; последнее можетъ быть даже положительною необходимостью, если разныя части полей имѣютъ слишкомъ разную почву, притомъ на такихъ значительныхъ пространствахъ, которыя не менѣе цѣлаго клена. Отдѣльные, изолированные куски полевой земли, очень разнѣющиеся по величинѣ, предпочитаютъ обыкновенно назначать или подъ многолѣтнія травы, или же на нихъ ведется вольное хозяйство, не подчиненное опредѣленному сѣвообороту. При очень различной величинѣ раздѣленныхъ частей полевой земли и неодинаковой поверхности отдѣльныхъ клѣнѣвъ, слѣдуетъ въ особенности остерегаться, чтобы въ какомъ-либо году сѣвооборота не оказалось чрезвычайно малаго или большаго производства главныхъ видовъ культуръ: хлѣбныхъ растений, кормовыхъ травъ и корнеплодовъ; другими словами, слѣдуетъ сообразовать раздѣленіе земли съ культурами такъ, чтобы главные изъ послѣднихъ производились ежегодно въ приблизительно одинаковомъ взаимномъ соотношеніи. Въ особенности опаснымъ можетъ быть уменьшеніе въ нормальномъ производствѣ кормовыхъ средствъ (въ году, когда воздѣлываніе ихъ придется на наименьшемъ по величинѣ клѣнѣ).

Наконецъ, раздѣленіе частей земли и различіе въ величинѣ ихъ должны быть принимаемы во вниманіе при назначеніи системы надзора, контроля надъ работами и самой обработки.

Исследование величины поверхности.

Мѣра поверхности, принимаемая за единицу для измѣренія пространства земли, различна въ разныхъ странахъ и мѣстностяхъ. Такъ, во Франціи эта мѣра — гектаръ, въ Пруссіи — моргенъ, Австріи — юхъ, Англіи — акръ (экръ), въ Россіи десятина; казенная мѣра для такъ называемой указной десятины принята 2,400 кв. сажень; но во многихъ мѣстностяхъ Россіи въ практикѣ употребляется еще такъ называемая хозяйственная или экономическая десятина, содержащая 3,200 кв. саж. Хозяинъ въ большинствѣ случаевъ не можетъ выбирать ту или другую мѣру, но долженъ держаться по необходимости общепринятой въ мѣстности, такъ какъ съ нею соображено раздѣленіе частей земли, отдѣленіе ихъ искусственными признаками (столбы, межины и пр.), къ ней привыкли рабочіе и пр. Въ подлежащей книгѣ вездѣ приняты: мѣрою поверхности указная десятина = 2,400 кв. саж., а мѣрою длины — сажени, футы, дюймы и линіи. Въ концѣ книги приложена таблица для переводовъ мѣръ поверхности и протяженія, употребляемыхъ въ разныхъ странахъ Европы.

Въ планѣ имѣнія арендаторъ всегда найдетъ данныя относительно величины поверхности земли, такъ какъ межеваніе произведено почти повсюду.

Но эти данныя весьма часто недостаточны для сельско-хозяйственныхъ цѣлей. Такъ напримѣръ, въ нихъ нерѣдко поверхности земли, нераздѣленной *чужою* землей, показываются общимъ итогомъ, между тѣмъ какъ для хозяина представляется надобность въ знаніи поверхности отдѣльныхъ частей такого итога, или въ новомъ раздѣленіи общей поверхности на части различной величины, какъ напр. при учрежденіи новаго сѣвооборота съ инымъ раздѣленіемъ на клѣнныя и съ другою величиною послѣднихъ, при разсчисленіи количества удобреній на данное пространство, обсадахъ живою изгородью или деревьями и т. п. Въ такихъ случаяхъ для хозяина весьма полезно примѣнять легко исполнимые и недорогіе способы измѣренія, не прибѣгая къ помощи геодезіи. Подобными средствами обладаетъ каждый, кто владѣетъ хотя нѣкоторыми знаніями въ математикѣ; при отсутствіи же послѣднихъ, хозяину можно рекомендовать сельско-хозяйственные календари (Ленгерке, Девриена), въ которыхъ излагаются простѣйшія и общедоступныя средства для измѣренія и вычисленія поверхностей, не требующія предварительныхъ познаній въ математикѣ и выполняемыя при помощи вѣхъ, кольевъ и цѣпи, или веревки.

Въ случаяхъ, когда есть возможность удовлетвориться еще меньшею точностью, можно прибѣгнуть даже къ измѣренію земли шагами, способу весьма быстрому и не требующему никакой затраты кромѣ времени. При употребленіи этого способа слѣдуетъ предварительно сдѣлать опытъ надъ собою, т. е. пройдя ровною обыкновенною походкой извѣстное пространство, сосчитать число употребленныхъ шаговъ и потомъ измѣрить пройденную длину линіи. Зная, какое число шаговъ соответствуетъ тому или другому протяженію, нѣтъ ничего легче измѣрять правильныя фигуры посредствомъ прохожденій по длинѣ и ширинѣ ихъ и помноженія найденныхъ протяженій двухъ сторонъ другъ на друга. Конечно, результатъ получается точнѣе, если измѣреніе производится посредствомъ цѣпи, или мѣрвой веревки.

Неправильныя фигуры измѣряются предварительною разбивкою на трехъ или четырехъ угольники, для чего указанія можно найти въ упомянутыхъ выше календаряхъ.

Наконецъ, если бы и этотъ способъ оказался труднымъ, то ничего не остается болѣе, какъ измѣреніе поверхности отдѣльными небольшими частями и складываніе получаемыхъ площадей въ общую сумму.

Положеніє и климатъ.

(ихъ вліяніє ввообще.)

Положеніє и климатическія условія мѣстности оказываютъ рѣшительное вліяніє на организацію сѣльско-хозяйственнаго производства. Что касается перваго, то оно обуславливаетъ, своимъ *геогностическимъ и топографическимъ* характеромъ, важнѣйшія свойства почвы. Этотъ предметъ будетъ изложенъ подробно въ слѣдующемъ отдѣлѣ. Не менѣе важно и дѣйствіє климатическихъ условій.

Климатомъ опредѣляются: 1) возможность или невозможность воздѣлыванія разныхъ растений, 2) большая или меньшая урожайность тѣхъ или другихъ растений и относительная успѣшность разныхъ отраслей скотоводства, 3) величина издержекъ на рабочія силы, инвентарь орудій и рабочій скотъ въ зависимости отъ болѣе или менѣе продолжительнаго періода, въ теченіе котораго возможно производство работъ, 4) величина издержекъ на строенія, массивность которыхъ и цѣнность возрастаютъ съ увеличеніемъ суровости зимы.

Климатъ вліяетъ посредственнымъ образомъ и на самыя свойства почвы, которая, при одномъ и томъ же составѣ и грунтѣ послѣдней, имѣютъ для растительности неодинаковое значеніе, смотря по климату, въ сочетаніи съ которымъ является почва (песчаная почва въ сыромъ или сухомъ климатѣ). При обсужденіи вліянія климата, необходимо обратить вниманіе на среднюю годовую температуру мѣстности, ходъ температуры въ главнѣйшія фазы роста (всходы, прѣтвеніе, созрѣваніе) и особенно на крайнія отклоненія ея въ періодъ перваго роста и созрѣванія, а для озимыхъ растений — на ходъ температуры зимы, крайности низкой температуры и продолжительность дѣйствія послѣднихъ; далѣе, должны быть обсуждены: отношенія влажности климата, которыя выражаются въ средней величинѣ водныхъ осадковъ въ теченіе года и отдѣльныхъ его періодовъ, господствующее направленіе вѣтровъ и ихъ свойства относительно влажности и температуры, болѣе или менѣе частыя градобитія и пр. Кромѣ метеорологическихъ данныхъ, выражающихъ свойства климата страны, гдѣ находится имѣніе, хозяину полезно принять въ соображеніе также топографическое положеніе имѣнія, которое нерѣдко обуславливаетъ особенности *мѣстнаго* (частнаго) климата въ томъ или другомъ отношеніи; таковы напр.: присутствіе или отсутствіе горъ и ихъ направленіе, видоизмѣняющія дѣйствіє вѣтровъ и испаденіе водныхъ осадковъ; содѣйствіе значительныхъ лѣсовъ, дѣйствующихъ подобнымъ же образомъ, озеръ,

большихъ рѣкъ, болотъ и пр., словомъ всѣхъ условій, оказывающихъ вліяніє на климатъ.

Климатъ и положеніє даютъ главное направленіє формъ сѣльско-хозяйственнаго производства. Такъ напр. въ горныхъ странахъ на извѣстныхъ высотахъ, или въ равнинныхъ мѣстностяхъ съ низменнымъ положеніємъ, въ содѣйствіє съ значительными водоемами, гдѣ условія благопріятствуютъ росту травъ, гдѣ послѣднія быстро вырастаютъ послѣ стравливанія скотомъ, основаніємъ хозяйства дѣлается выгонная система; напротивъ, на возвышенныхъ равнинахъ, при континентальномъ климатѣ, гораздо вѣрнѣе родится хлѣба, пропашество которыхъ и должно быть основою хозяйства. Гдѣ находятся значительныя части земли по берегу рѣки, заливаемые весною водою, тамъ естественно преобладаетъ луговое хозяйство съ продажою сѣна или значительнымъ скотоводствомъ.

При защищенномъ отъ вѣтровъ положеніи можетъ быть очень успѣшно садоводство. Условія положенія опредѣляютъ въ особенности относительную выгодность разныхъ отраслей скотоводства: коневодства, разведенія рогатаго скота, тонкоруннаго, грубошерстнаго или мяснаго овцеводства, разведенія свиней и сочетаній тѣхъ или другихъ отраслей одновременно. Отъ положенія и климата зависятъ также характеръ обработки почвы: болѣе или менѣе глубокое паханіе, болѣе или менѣе высокіе загоны, ихъ ширина, проведеніе водосточныхъ бороздъ и пр. Въ предлагаемой книгѣ, по ея характеру, не можетъ имѣть мѣста ни перечисленіе *всѣхъ* вліяющихъ, относящихся сюда, обстоятельствъ, ни описаніе того, въ чемъ состоитъ это вліяніє. Требуемая для этого, слишкомъ обширная, свѣдѣнія можно найти въ сѣльско-хозяйственныхъ учебникахъ и руководствахъ.

Но *здесь* должно быть обращено вниманіє на слѣдующее обстоятельство. Если арендаторъ начинаетъ свое дѣло въ мѣстности, съ особенностями которой онъ не вполне знакомъ, если при этомъ онъ находитъ тѣ или другія нормы въ разныхъ случаяхъ хозяйства, тѣ или другіє способы воздѣлыванія, какъ *общепринятые приемы*, которые онъ, по своимъ знаніямъ и опыту, не признаетъ рациональными, то проектируя планы измѣненія онъ долженъ всегда исходить изъ убѣжденія, что общіє приемы культуры въ мѣстности почти всегда имѣютъ какое-либо *естественное* основаніє, которое нерѣдко безсознательно, помимо размышленія хозяевъ, приводитъ ихъ путемъ опыта къ приспособленію формы хозяйства и культурныхъ приемовъ къ мѣстнымъ условіямъ. Благоразуміє требуетъ и со стороны арендатора, особенно на первое время, не пренебрегать, но руководствоваться указаніями мѣстнаго опыта.

Политическія, общественныя и торговыя отношенія.

Подобно вышеизложеннымъ условіямъ, на хозяйственную дѣятельность и производство имѣютъ вліяніе также политическія отношенія страны, ея законодательство, сила, прилежаніе, родъ занятій и нравы населенія. Какъ они дѣйствуютъ, это можетъ быть опредѣлено лишь специально въ опредѣленномъ случаѣ; для новаго арендатора необходимо, по возможности, быстрѣе ознакомиться съ названными отношеніями, сознательно примкнуть къ нимъ и *присоблажаться*, но не противиться силою тому, что создано исторіей и можетъ быть измѣнено только въ теченіе долгихъ періодовъ. Особеннаго вниманія заслуживаютъ въ этомъ отношеніи народныя нравы, обычаи и релігіозныя вѣрованія, неуваженіе которыхъ рѣдко проходитъ безнаказанно, особенно для иностранца, не имѣющаго племеннаго родства съ населеніемъ.

Еще большее вниманіе арендатора должно быть обращено на торговыя отношенія мѣстности, которыя опредѣляютъ непосредственно направленіе производства. Такъ, *простыя хозяйственныя формы* производства встрѣчаются при *недостаточномъ обращеніи* и недостаткѣ рабочихъ рукъ, но въ тоже время они могутъ имѣть мѣсто также и при *высокомъ промышленномъ* состояніи мѣстности, если въ ней рабочія руки отвлекаются фабриками, а растенія, требующія *высокой культуры*, могутъ быть *дешевле* добываемы изъ болѣе отдаленныхъ мѣстностей, почему *большій* доходъ достигается производствомъ зерна и животныхъ продуктовъ, менѣе выгодно относящихся къ далекому транспорту. Устройство интензивнаго хозяйства, основаннаго на земледѣліи, скотоводствѣ и обыкновенныхъ техническихъ производствахъ, имѣетъ мѣсто при развитомъ торговомъ обращеніи съ значительною промышленностью, но въ тоже время при чисто сельско-хозяйственномъ характерѣ страны съ хорошимъ земледѣльческимъ населеніемъ и достаточнымъ предложеніемъ рабочихъ рукъ. Самое интензивное хозяйство, съ *огородною* обработкой небольшихъ пространствъ, или съ *машиннымъ производствомъ* при значительной величинѣ хозяйства, рассчитываемое на продажу почти всѣхъ производимыхъ продуктовъ, при спекулятивно быстромъ оборотѣ капитала, можетъ быть выгоднымъ лишь при большой населенности страны, близости желѣзныхъ дорогъ, служащихъ для *большаго обращенія* и особенно по близости *такихъ* большихъ городовъ, которыя имѣютъ значеніе узловыхъ пунктовъ во всемірной торговлѣ. Что хорошіе или дурные пути сообщенія и дороги, а также ихъ большее или меньшее число и распространеніе, оказываютъ рѣшительное влія-

ніе на все хозяйственное производство, особенно на количество и родъ упряжнаго скота, инвентаря и введеніе сложныхъ машинъ, это должно быть извѣстно каждому хозяину.

Въ какой степени подобныя обстоятельства возвышаютъ или уменьшаютъ доходность имѣнія, представляются ли они преходящими, или же будутъ дѣйствовать въ продолженіе всего срока арендованія, эти вопросы должны быть рассмотрѣны и рѣшены равнѣ заключенія аренднаго условія. Но, вступивъ въ аренду, арендатору необходимо сообразовать съ ними все свое хозяйственное производство, независимо отъ того, какую бы ни вносила онъ арендную плату.

ЗЕМЛЯ И ПОЧВА.

Определение этихъ понятій.

Земля составляетъ существенную принадлежность *сельскохозяйственнаго промысла*; основу, на которой зиждется все *хозяйственное* зданіе, и большую частію главную, самую цѣнную часть *имѣнія*.

Она необходима сельскому хозяину въ сравнительно небольшомъ количествѣ для возведенія на ней хозяйственныхъ построекъ и въ сравнительно весьма значительномъ количествѣ для произведенія различныхъ растений: травянистыхъ — огородныхъ, полевыхъ, луговыхъ, выгонныхъ, и древесныхъ — садовыхъ и лѣсныхъ. Земля, входящая въ постройки и огородами (*огородами*) и садовыми (*садами*) растеніями, называется обыкновенно *усадебной*; подъ полевыми — *полевой* или *полемъ*; подъ луговыми — *луговой* или *лугомъ*; подъ выгонными — *выгонной* или *выгономъ*; подъ лѣсными — *лѣсной* или *лѣсомъ*. Кромѣ такой *удобной* для хозяйственныхъ цѣлей земли, можетъ находиться въ данное время въ составѣ имѣнія и *неудобная* для этихъ цѣлей земля: болотистая, каменистая и т. д., которою можно иногда пользоваться, однако, для другихъ цѣлей, напр. торфяноболотистой — для добыванія торфа, какъ топлива, удобрительнаго вещества или подстилочнаго средства; или которая можетъ быть иногда превращена въ удобную, если экономическій расчетъ позволяетъ, иначе если выгодно сдѣлать необходимыя для этого затраты, напр. болотистая земля можетъ быть превращена въ полевую, луговую или выгонную помощью осушки, выжиганія и т. д.; или которая, наконецъ, не можетъ быть превращена въ удобную безъ затратъ, немислимыхъ въ настоящее время. Въ

земельному пространству имѣнія причисляются также: земля, находящаяся подъ дорогами, живыми изгородями и т. д., равно какъ и пространство воды: озеръ, прудовъ, рѣкъ.

Земля, образующая такіа *земельныя угодія*, какъ: огородъ, садъ, поле, лугъ, выгонъ, лѣсъ, получаетъ свое значеніе, главнымъ образомъ, отъ верхняго своего слоя, въ которомъ преимущественно развиваются подземныя части (корни) растений и который называется собственно *почвой* или *растительнымъ слоемъ*; и затѣмъ отъ находящагося подъ нимъ слоя земли, такъ называемой *подпочвы*, отличающейся отъ почвы болѣе свѣтлымъ цвѣтомъ.

Механический анализъ почвы и ея строеніе.

Поверхностное разсмотрѣніе почвы показываетъ уже, что она состоитъ изъ частицъ различной крупности; для того же, чтобы полнѣе убѣдиться въ этомъ и даже приблизительно точно опредѣлить по вѣсу, сколько и какой крупности частицъ находится въ ней, можно поступить такъ: сперва протереть почву (въ количествѣ 12 золотн. или 50 граммовъ), хорошо разболтанную въ водѣ, черезъ металлическое сито съ отверстіями 0,2 миллиметра (0,08 линій) въ діаметрѣ помощью небольшой кисти (0,5 дюйма въ діаметрѣ) изъ щетины; затѣмъ ту часть почвы, которая останется на ситѣ, послѣ тщательной промывки ея подъ тонкой струей воды, просушить и просѣять послѣдовательно: черезъ металлическое сито съ отверстіями 0,5 миллиметра (0,2 линія) въ діаметрѣ и черезъ три металлическихъ же рѣшета съ отверстіями 1 (0,4), 2 (0,8) и 4 миллиметра (1,6 линія) въ діаметрѣ; наконецъ, ту часть почвы, которая прошла черезъ сито съ отверстіями 0,2 миллиметра въ діаметрѣ вмѣстѣ съ водой, раздѣлить на двѣ части и для этого влить ее въ цилиндръ, вышиной нѣсколько болѣе 4,5 дециметр. (около 1½ фут.) и 5 сантиметровъ (2 дюйм.) въ діаметрѣ, съ четырьмя боковыми круглыми отверстіями, изъ которыхъ нижнее отстоитъ отъ дна на 5 сантиметр. (2 дюйм.), а остальные на 1 дециметръ (4 дюйм.) одно отъ другаго; въ отверстія вставлены стекляныя трубки съ краями. Если влитая въ цилиндръ жидкость не выполняетъ цилиндра до высоты 1 дециметра (4 дюйм.) выше верхняго отверстія, то необходимо долить воды столько, чтобы поверхность жидкости въ цилиндрѣ находилась на этой высотѣ; затѣмъ слѣдуетъ взболтать все хорошенько, дать потомъ 5 минутъ постоять и тогда открыть верхній кранъ, черезъ который стечетъ часть мутной жидкости; послѣ новыхъ 5 минутъ покоя, открыть второй кранъ, черезъ который снова стечетъ часть мутной жидкости и, наконецъ, послѣ третьихъ 5 минутъ покоя, открыть третій кранъ, черезъ который стечетъ еще

часть мутной жидкости. После этого повторяется взбалтывание тѣмъ же порядкомъ съ количествами воды, приливаемыми каждый разъ вновь до первоначальной высоты, до тѣхъ поръ, пока стекающая черезъ краны жидкость не осветлится совершенно; тогда, по открытіи третьяго крана, даютъ осѣсть твердымъ частямъ и затѣмъ, когда эти послѣднія осадутъ, спускаютъ воду съ осадка черезъ четвертый кранъ. Всю мутную воду, собранную въ чашку, поставленную подъ краны, оставляютъ въ покое до тѣхъ поръ, пока вода надъ осадкомъ изъ нихъ не осветлится совершенно; тогда осадокъ переносится на фильтръ и высушивается, если бы желательно было опредѣлить количество этихъ самыхъ мелкихъ частицъ прямо, а не изъ разности между вѣсовыми количествами съ одной стороны первоначально взятой почвы, съ другой — частей почвы, полученныхъ при просѣиваніи черезъ сита и рѣшета, и части ея, осѣвшей на дно цилиндра, которая взвѣшивается по надлежащей ей просушкѣ.

Посредствомъ такого *механическаго* анализа почвы, т. е. просѣиванія ея черезъ сита и рѣшета съ отверстіями различной величины, и *отмучиванія*, какъ называютъ раздѣленіе почвы помощью воды на части, состоящія изъ частицъ различной формы, величины и вѣскости, можно раздѣлить почву на слѣдующія части:

1) Камни и камешки, которые остаются на рѣшетѣ съ отверстіями 4 миллиметра въ діаметрѣ.

2) Хрящъ: *крупный*, который не проходитъ черезъ рѣшето съ отверстіями 2 миллиметр. въ діаметрѣ; *средній*, который остается на рѣшетѣ съ отверстіями 1 миллиметр. въ діаметрѣ, и *мелкій*, который остается на рѣшетѣ съ отверстіями 0,5 миллиметра въ діаметрѣ.

3) Песокъ: *грубый*, который остается на ситѣ съ отверстіями 0,2 миллиметра въ діаметрѣ, и *мелкій*, который, при отмучиваніи того, что проходитъ сквозь сито съ отверстіями 0,2 миллиметра въ діаметрѣ, осаждается изъ воды и представляетъ частицы, примѣрно, крупнѣе 0,08 миллиметра (0,04 линіи) въ діаметрѣ, и

4) Илъ, который, при томъ же отмучиваніи, остается взмученнымъ въ водѣ и представляетъ частицы, приблизительно, мельче 0,08 миллиметра въ діаметрѣ.

При ближайшемъ разсмотрѣніи различной крупности частицъ почвы: камней, камешковъ, хряща простымъ глазомъ, грубаго песка — помощью лупы (увеличительнаго стекла), мелкаго же песка и ила — помощью микроскопа: перваго при увеличеніи въ 70, а втораго, по крайней мѣрѣ, въ 90—140 разъ, оказывается, что эти частицы различны не только по величинѣ, но и

1) по формѣ; причемъ края, ребра ихъ могутъ быть болѣе или менѣе заостренные, болѣе или менѣе округленные.

2) по веществу: однѣ изъ нихъ представляютъ обломки горнокаменныхъ породъ (напр. гранита, глинистаго сланца, известняка, песчаника и т. д.) или минераловъ (напр. кварца, полевыхъ шпатовъ, слюды и т. д.), слѣдовательно частицы минеральнаго происхождения; другія же — болѣе или менѣе разнообразныя растительные (и животные) остатки, слѣдовательно частицы органическаго происхождения. Различеніе частицъ по ихъ природѣ, какъ минеральныхъ и органическихъ, такъ и различныхъ минеральныхъ между собой, становится тѣмъ затруднительнѣе, чѣмъ мельче онѣ; такъ что для ближайшаго опредѣленія ихъ природы и въ особенности количества участка различныхъ частицъ въ составѣ почвы, изслѣдованіе ихъ простымъ или даже вооруженнымъ глазомъ дѣлается недостаточнымъ.

Частицы почвы различной крупности и формы, соединенныя въ почвенную массу, не прилегаютъ плотно одна къ другой; но оставляютъ между собой промежутки, большіе, конечно, если онѣ болѣе крупны, меньшіе, если онѣ менѣе крупны. Однако, общее пространство промежутковъ будетъ болѣе въ послѣднемъ, чѣмъ въ первомъ случаѣ. Присутствіе въ каждой почвѣ промежутковъ составляетъ свойство почвы, называемое *сквозностью*. Промежутки образуютъ большаго или меньшаго діаметра волосныя трубки, которыя, какъ извѣстно, обладаютъ свойствомъ поднимать воду тѣмъ выше, чѣмъ меньше ихъ діаметръ, и поднимаютъ ее уже очень слабо при діаметрѣ ихъ въ 10 миллиметровъ (4 линіи). Въ почвѣ на полѣ, если только эта почва не летучій песокъ, который почти вовсе не содержитъ хлопчатыхъ частицъ, и не совершенно суха, частицы почвы, за исключеніемъ, можетъ быть, болѣе крупной части очень крупныхъ, напр. камешковъ, крупнаго хряща, соединяющихся въ почву, такъ сказать, непосредственно, соединяются предварительно болѣе тѣсно въ части почвы, комки или комочки, въ силу большаго сцепленія между одними изъ нихъ, нежели между другими, при дѣйствіи на нихъ влажности и растительности, какъ мы увидимъ ниже; и, затѣмъ, уже комочки образуютъ почву съ промежутками между собой большими обыкновенно тѣхъ, которые остаются частицами при ихъ соединеніи въ комочки.

Происхожденіе минеральной части почвы.

Мы видѣли, что въ каждой почвѣ находятся обломки горнокаменныхъ породъ. Мы можемъ далѣе пойти не мало почвъ, въ которыхъ сверху внизъ увеличивается содержаніе этихъ обломковъ; причемъ эти послѣдніе дѣлаются все крупнѣе и крупнѣе, пока наконецъ на некоторой, обыкновенно небольшой глубинѣ, почва переходитъ

въ хрищъ, дрсеву, а затѣмъ въ сплошную горнокаменную породу, которой принадлежатъ заключающіеся въ ней обломки (гранитныя почвы Финляндіи). Эти факты убѣждаютъ насъ въ томъ, что наши почвы образовались изъ горнокаменныхъ породъ; вопросъ лишь въ томъ, какимъ образомъ?

Наблюденія различныхъ явленій природы, равно какъ и опыты въ малыхъ размѣрахъ показываютъ, что почвы образовались изъ горнокаменныхъ породъ путемъ механическаго и химическаго разрушенія ихъ и перемѣщенія большей части продуктовъ такого разрушенія съ одного мѣста на другое.

Поэтому, чтобы ближе знать почву, необходимо знать матеріалъ, изъ котораго она образовалась и образуется, знать дѣятелей, разрушившихъ и разрушающихъ этотъ матеріалъ и, наконецъ, силы, которыми продукты этого разрушенія размѣщались и размѣщаются по земной поверхности.

а) Материалъ, изъ котораго образовалась почва.

Материалъ, т. е. горнокаменные породы, изъ которыхъ образовались почвы, весьма разнообразны, какъ этому учитъ насъ геотектонія, хотя число такихъ, которыя, выходя на поверхность земной коры, занимаютъ болѣе обширныя площади, не такъ велико. Всѣ горнокаменные породы можно различить на

1) породы *плутоническія*, вулканическаго, огненнаго происхожденія, всегда кристаллическія во всей своей массѣ, иначе называемыя массивными, такъ какъ не образуютъ пластовъ или слоевъ; или первозданными, такъ какъ изъ нихъ уже образовались

2) *осадочныя* породы воднаго, неплутоническаго происхожденія некристаллическія въ главной своей массѣ, иначе называемыя пластовыми, такъ какъ въ земной корѣ располагаются пластами. Изъ нихъ, а частью изъ плутоническихъ породъ особыми процессами, въ разсмотрѣніе которыхъ мы не можемъ входить здѣсь, образовались

3) *метаморфическія* породы; болѣею частью кристаллическія и болѣею частью имѣющія слоистое сложеніе.

Плутоническія (гранитъ, сіенитъ, гнейсъ, трахитъ, порфиръ, серпентинъ-змѣвикъ, базальтъ) и метаморфическія (сланецъ, гнейсъ, хлоритовый сланецъ) породы состоятъ, главнымъ образомъ, изъ кремневой кислоты, свободной, въ видѣ минерала *кварца*, или соединенной съ основаніями: щелочами (кали, натромъ и литіемъ), щелочными землями (известью и магнезіей), землями (глиноземомъ) и окислами тяжелыхъ металловъ (железа и марганца), въ видѣ различныхъ минераловъ, называемыхъ *силикатами*. Эти силикаты мы должны различить на несодержащіе воды и содержащіе ее; первые различаются далѣе потому, содержатъ ли они болѣе или

менѣе кремневой кислоты, а между основаніями, соединенными съ этой послѣдней, содержатъ ли они о-бокъ съ глиноземомъ болѣе щелочей или же болѣе щелочныхъ земель и окисловъ тяжелыхъ металловъ.

Къ силикатамъ, содержащимъ болѣе кремневой кислоты и между основаніями о-бокъ съ глиноземомъ болѣе щелочей, принадлежатъ *полевые шпаты* (ортоклазъ, сандинъ, олигоклазъ, альбитъ и т. д.), въ которыхъ содержится: кремневой кислоты отъ 62 до 69%, глинозема отъ 17 до 24%, щелочей (кали или натра, или обоихъ вмѣстѣ) отъ 6 до 13%. Изъ полевыхъ шпатовъ составляется какъ бы исключеніе, по своему составу, известковый полевой шпатъ (лабрадоръ) съ 53% кремневой кислоты, 28% глинозема и 10% приблизительно извести.

Къ силикатамъ, содержащимъ менѣе кремневой кислоты и между основаніями о-бокъ съ глиноземомъ преимущественно известъ, магнезію и окислы железа, принадлежатъ минералы (авгитъ, роговая обманка, гранатъ), въ которыхъ содержится: кремневой кислоты отъ 37 до 52%, глинозема отъ $\frac{1}{2}$ до 22%, извести отъ 3 до 21%, магнезіи отъ 12 до 21%, закиси железа отъ 8 до 34% и окиси железа отъ 0 до 26%. Переходъ къ этимъ минераламъ отъ полевыхъ шпатовъ составляетъ слюда, которая содержитъ кремневой кислоты отъ 36 до 71%, глинозема отъ 6 до 38%, закиси и окиси железа отъ 0 до 36%, магнезіи отъ 0 до 29% (магнезіальная), кали отъ 2 до 14% (калиевая) и литія отъ 0 до 6% (литіевая слюда).

Въ содержащихъ воду силикатахъ, кремневая кислота соединена или исключительно съ магнезіей (талькъ, серпентинъ-змѣвикъ), или съ глиноземомъ, магнезіей и закисью железа (хлоритъ) или, наконецъ, съ глиноземомъ и известью или щелочами (цеолиты).

Смотря потому, которые изъ приведенныхъ минераловъ и въ какомъ отношеніи между собой количества входятъ въ составъ той или другой изъ плутоническихъ и метаморфическихъ породъ, можно эти послѣднія различить на *богатыя* и *бѣдыя* кремневой кислотой и щелочами, на *кремнисто-глиноземно-щелочныя* и *кремнисто-железисто-известковыя*, или разсматривать первыя какъ *кислотныя* силикаты, по сравнительно большому содержанию въ нихъ кислоты (кремневой), а вторыя какъ *основныя* силикаты, въ виду сравнительно большаго содержанія въ нихъ оснований. Къ тому же въ породахъ послѣдней группы кремневая кислота никогда не является характерной составной частью въ видѣ свободной, кристаллически выдѣленной кремневой кислоты—кварца, характеризующаго составъ породъ первой группы.

Химическій составъ горнокаменныхъ породъ этихъ двухъ группъ найдетъ въ слѣдующихъ характерныхъ для нихъ предѣлахъ:

	въ горючихъ породахъ	
	1-ой группы.	2-ой группы
кремневой кислоты	54,0—79,0%	42,0—63,0%
глинозема	10,0—23,0%	10,0—21,0%
окиси (- закиси) желѣза	0,8—7,0%	4,0—17,0%
закиси марганца	0,0—0,5%	0,0—0,5%
известн	0,1—4,0%	1,8—15,0%
магnezин	0,1—1,5%	1,1—11,0%
каль	1,3—8,0%	0,1—8,0%
натра	0,4—9,0%	0,2—8,0%
воды	0,4—1,5%	0,2—3,3%

Изъ принадлежащихъ къ первой группѣ плутоническихъ и метаморфическихъ породъ, наибольшую площадь занимаютъ, выходя на поверхность земли (напр. въ Финляндіи): *гранитъ, гнейсъ и слюдяной сланецъ*, въ особенности послѣдніа двѣ. Первые двѣ состоятъ, главнымъ образомъ, изъ трехъ минераловъ: полевого шпата (преимущественно калиеваго—ортоклаза, но также и натроваго олигоклаза), кварца и слюды (преимущественно калиевой, но также и магнезидной); при чемъ въ гнейсѣ сланцеватаго сложения нѣсколько меньше полевого шпата, чѣмъ въ гранитѣ. Слюдяной же сланецъ состоитъ только или почти только изъ двухъ послѣднихъ названныхъ минераловъ съ небольшою лишь примѣсью, въ послѣднемъ случаѣ, перваго. На значительно меньшихъ пространствахъ и рѣже выходятъ на поверхность (Финляндія, Уралъ) *порфиръ и трахитъ*, которые, въ главной своей массѣ, представляютъ: первый весьма тѣсную смѣсь калиеваго полевого шпата (ортоклаза) и кварца, а второй—калиевый полевой шпатъ (санидинъ) одинъ или въ смѣси съ натровымъ полевымъ шпатомъ (олигоклазомъ). Кроме того изъ главной массы у обихъ породъ выделяются кристаллы или зерна: у первой—калиеваго полевого шпата (ортоклаза) и кварца, иногда же и натроваго полевого шпата (олигоклаза) или слюды; у второй же—калиеваго полевого шпата (санидина), роговой обманки или слюды.

Изъ принадлежащихъ ко второй группѣ плутоническихъ и метаморфическихъ породъ, встречающихся рѣже и занимающихъ меньшія пространства земной поверхности чѣмъ гранитъ, гнейсъ или слюдяной сланецъ, нѣсколько распространены: *сиенитъ*, состоящій въ главной массѣ изъ калиеваго (ортоклаза) или натроваго (олигоклаза) полевого шпата и роговой обманки, и въ особенности *базальтъ*, который, главнымъ образомъ, состоитъ изъ самыхъ мелкихъ кристалловъ известковаго полевого шпата (лабрадора) и авгита; менѣе же распространены (напр. въ Финляндіи, на Уралѣ): *грюнштейны*—зеленые камни (диоритъ, гиперитъ), состоящіе изъ известковаго (лабрадора) или натроваго (олигоклаза) полевого шпата и роговой обманки, и *хлоритовый сланецъ*, представляющій

смѣсь, главнымъ образомъ, изъ хлорита, кварца и калиеваго полевого шпата (ортоклаза), къ которымъ примѣшиваются иногда слюда и талькъ.

Въ составъ осадочныхъ породъ входятъ кромѣ минераловъ, образующихъ плутоническія и метаморфическія породы, т. е. кварца и разныхъ силикатовъ, главнымъ образомъ слѣдующіе еще минералы: *известковый шпатъ* (углекислая известь), *доломитъ* или горный шпатъ (углекислая известь 55—63% и углекислая магнезія 33—47%) и *глина* (главнымъ образомъ, водный кремнекислый глиноземъ).

По участию и преобладанію въ осадочныхъ породахъ тѣхъ или другихъ изъ названныхъ частей, мы можемъ различить между ними.

1) *Известняки* (оолитовый, битуминозный, кремнистый, глинистый известняки, мѣлъ, известковый туфъ) весьма разнообразнаго строенія пластовыя породы, состоящія, главнымъ образомъ, изъ известковаго шпата, къ которому примѣшиваются: доломитъ, желѣзистый шпатъ (углекислая закись желѣза), глина, а иногда и разнаго рода песчинки.

2) *Доломиты*, состоящіе иногда изъ чистаго доломита, т. е. углекислой извести и углекислой магнезии, но часто съ примѣсью известковаго и желѣзнаго шпатовъ, бураго желѣзняка или органическаго вещества.

3) *Глинистыя породы* (глина, сланцевал глина, глинистый и кварцевый сланцы), состоящія, главнымъ образомъ, изъ глины, т. е. воднаго кремнекислаго глинозема, къ которому примѣшиваются зерна: полевого шпата, слюды, кварца, углекислая известь, бурый желѣзнякъ, углестыя вещества.

4) *Мергели* (глинистый, известковый, доломитовый) содержатъ, главнымъ образомъ, составныя части известковыхъ породъ съ примѣсью большаго или меньшаго количества углекислой извести и углекислой магнезии.

5) *Песчаники* (кристаллическій—кварцитъ, кремнистый, глинистый, мергелистый, известковый, желѣзистый песчаники, сврвакковый сланецъ), состоящіе изъ мелкихъ, иногда едва замѣтныхъ зеренъ, преимущественно кварца, между которыми блестятъ иногда листочки слюды и попадаются зерна другихъ силикатовъ и горючихъ породъ и которыхъ сплочены въ одну болѣе или менѣе плотную массу различными цементомъ: кремнистымъ, глинистымъ, известковымъ, мергелистымъ, желѣзистымъ или, какъ напр. въ нашемъ курскомъ самородѣ, фосфорнокислымъ известковымъ.

Слѣдующая таблица анализовъ ближе характеризуетъ химическій составъ этихъ породъ:

Въ	Равнинный	Деревенскъ	Глинный	Глинистый	Глинистый
	изъ	изъ	изъ	изъ	изъ
	Швабин.	Нассу.	Гарца.	Швабин.	Швабин.
Кремневой кислоты..	3,1%	0,41 (глины и песок)	61,7%	40,7% (песку)	97,0
Глинозема	1,4%		19,8%	32,0%	3,0
Окисъ желѣза		0,22 (углек. окисъ желѣза)	10,1%	8,9%	
Углекислой извести..	77,9%	54,9%	0,8% (извести)	9,5%	—
Углекислой магнези.	16,6%	44,5%	3,0%	2,2%	—
Кали	—	—	2,0%	—	—
Натра	—	—	1,3%	—	—
Фосфорной кислоты..	0,1%	—	—	—	—
Воды и потери отъ про-	—	—	1,0%	6,7%	0,1
каливанія	—	—			

Изъ выходящихъ на поверхность земли осадочныхъ породъ наибольшія площади занимаютъ глинистыя сланцы (напр. въ Финляндіи, на Уралѣ и на Кавказѣ), известняки (напр. силзургійскіе въ Финляндіи, Эстляндіи), затѣмъ песчаники, наконецъ мергели и доломиты.

Въ приведенныхъ горнокаменныхъ породахъ, кромѣ указанныхъ главныхъ составныхъ частей, всегда еще встрѣчаются различныя примѣси, менѣе значительныя по количеству, чѣмъ названныя нами въ некоторыхъ породахъ выше, не характерныя для содержащихъ ихъ породъ, но тѣмъ не менѣе важныя, какъ составныя части почвообразовательнаго матеріала. Между этими примѣсами часто встрѣчаются тѣ или другіе изъ названныхъ уже минераловъ, изъ которыхъ важны по ихъ быстрой разложимости, упомянутые нами выше *цеолиты* (водные силикаты), встрѣчающіеся преимущественно въ базальтахъ. Но, кромѣ названныхъ уже, мы должны привести здѣсь еще нѣкоторые минералы, между которыми первое мѣсто принадлежитъ *апатиту* (фосфорнокислой извести преимущественно), въ видѣ котораго, по всей вѣроятности, содержится фосфорная кислота во многихъ горныхъ породахъ (гранитахъ, гнейсахъ, сіенитахъ, базальтахъ, порфирѣ), и даже въ минералѣ полево́мъ шпатѣ, гдѣ она найдена въ количествѣ отъ 0,18%, въ одномъ изъ саксонскихъ сіенитовъ, до 1,70% въ полево́мъ шпатѣ изъ Роксбурга. Послѣ апатита слѣдуетъ назвать еще весьма распространенные въ составѣ различныхъ горныхъ породъ: *пирита* (сѣрнистое желѣзо) и въ особенности *магнитный желѣзнякъ* (закись-окисъ желѣза), которыхъ присутствіе въ горныхъ породахъ важно потому, что они служатъ, такъ сказать, проводниками разрушенія въ горныя породы; при чемъ первый снабжаетъ продукты разрушенія заключающихъ его горныхъ породъ сѣрою.

Для полноты обзора почвообразовательнаго матеріала, мы должны указать въ заключеніе еще на три простыя горныя породы, уча-

ствующія въ строеніи нашей земной коры; *ангидрита* (безводную) и *гипса* (водную сернокислую известь) и *поваренную соль* (хлористый натрій), которыя принадлежатъ ближе невулканическимъ воднымъ образованиямъ земной коры, къ тому же, въ особенности послѣднія двѣ, встрѣчаются, преимущественно въ сравнительно новой части коры; въ самой же древней части ея онѣ очень рѣдки.

б) *Дѣтели механическаго и химическаго разрушенія горныхъ породъ. Выстигиваніе горныхъ породъ.*

Таковъ почвообразовательный матеріалъ! Если сопоставить главную часть его, состоящую изъ такихъ твердыхъ породъ, какъ напр. многіе известняки, песчаники, граниты, базальты, и т. д., съ почвами, между которыми многія, какъ напр. у насъ, состоятъ почти исключительно изъ такихъ мелкихъ минеральныхъ частицъ, которыя нельзя рассмотреть хорошо простымъ глазомъ, невольно является представленіе о тѣхъ великанахъ - дѣтеляхъ, которыя должны были превратить первыя въ послѣднія; между тѣмъ мы увидимъ сейчасъ въ числѣ совершавшихъ это дѣло дѣтелей столь слабыхъ, что результаты ихъ дѣйствія становятся понятными лишь въ виду того времени, которое было потрачено ими на достиженіе такихъ результатовъ.

Силы, разрушающія горныя породы, разрушаютъ ихъ *механически* или *химически*.

Механически разрушаютъ ихъ:

Теплота, которая различно сильно и скоро нагреваетъ различныя тѣла, въ зависимости отъ свойствъ поверхности и плотности (рѣскости, удѣльнаго вѣса) тѣла; болѣе плотныя тѣла съ болѣе темной и шероховатой поверхностью нагреваются скорѣе и сильнее, чѣмъ тѣла менѣе плотныя съ болѣе свѣтлой и гладкой поверхностью. Въ точно такой же зависимости и отъ того же находится и охлажденіе различныхъ тѣлъ. А такъ какъ горныя породы представляютъ болѣе или менѣе тѣсную смѣсь различныхъ матеріаловъ, то, конечно, онѣ должны нагреваться и охлаждаться неравномерно въ своихъ различныхъ частяхъ, и тѣмъ болѣе неравномерно, чѣмъ менѣе тѣсна смѣсь и чѣмъ менѣе сходны въ сказанныхъ отношеніяхъ составляющіе смѣсь минералы. Неравномерныя же нагреванія и охлажденія и, вслѣдствіе этого, не одинаковыя увеличенія въ первомъ и уменьшенія объема во второмъ случаѣ, служатъ причиною того, что горныя породы, отъ переходовъ отъ тепла къ холоду и обратно получаютъ трещины; грубозерныя породы, напр. долеритъ—болѣе и скорѣе, чѣмъ мелкозерныя, напр. базальтъ, хотя обѣ приведенныя въ примѣръ горныя породы состоятъ изъ однихъ и тѣхъ же минераловъ: сѣраго лабрадора и чернаго авгита.

Растворенныя въ водѣ вещества составляютъ весьма сильныхъ дѣтелей выветриванія горныхъ породъ, тѣмъ болѣе сильныхъ, что химически чистой воды въ природѣ не встрѣчается. Наиболѣе чистой, т. е. приближающейся къ составу химически чистой воды изъ водорода и кислорода, представляется вода атмосферическихъ испареній (метеорная вода): дождевая, снѣговая, туманная и росная; да и та содержитъ растворенныя вещества въ большемъ или меньшемъ количествѣ, въ зависимости отъ времени года и времени дня выпаденія, отъ времени, спустя которое (для снѣга, росы и тумана), мѣста, на которомъ (въ городѣ или деревнѣ) и возвышеніи надъ поверхностью земли (для дождевой воды), на которомъ бралась вода для изслѣдованія. Такъ, найдено въ 1000 литрахъ (1000 кружкахъ).

Азотной кислоты *). Амміака **).
Наименьшее. Наибольшее. Наименьшее. Наибольшее.
Граммовъ (золотниковъ).

Дождевой воды . . .	0,37(0,107)	16,00(4,613)	0,044(0,013)	3,646(2,781)
Снѣговой „ . . .	0,32(0,092)	4,00(1,153)	0,000(0,000)	10,340(2,981)
Туманной „ . . .	0,39(0,112)	138,00(39,785)	2,560(0,738)	137,850(39,742)
Росной „ . . .	0,05(0,014)	1,12(0,323)	1,020(0,294)	6,200(1,788)

Кромѣ азотной кислоты и амміака, метеорная вода содержитъ всѣ тѣ вещества, которые захватываются и уносятся вѣтрами съ морей, рѣкъ, земли и т. д., и всѣ тѣ газы, которые составляютъ воздушную смѣсь, какъ-то: азотъ, кислородъ, угольную кислоту и т. д. Такъ, напр., въ одномъ случаѣ дождевая вода содержала на 1 миллионъ частей 24,6 частей по вѣсу твердыхъ составныхъ частей, которые содержали на 100 частей:

Хлористаго натрія . . .	17,9 частей.	Сѣрноокислаго натра. . .	4,0 частей
„ калия . . .	3,9 „	„ кали . . .	3,8 „
„ магнезія . . .	1,2 „	Сѣрноокислой извести . . .	3,0 „
„ вальдія . . .	1,4 „	„ магнезія . . .	2,6 „

и сверхъ того неопредѣленныя, но весьма значительныя количества угольной извести и органическихъ веществъ.

Воды же: ключевая, рѣчная, озерная и морская значительно богаче твердыми составными частями, какъ это показываетъ слѣдующая таблица.

*) Въ видѣ азотноокислаго амміака.

**) Въ видѣ угольной извести.

1000 частей воды содержали частей:	Рѣчной воды изъ				Озерной и морской изъ		
	Доары у Органа.	Темъ у Тыжен- гана.	Великой у Пскова.	Эмбаха выше Дергата.	Поллуса	Ваттиса- го моря.	Атлант. ок. ш. 18° 38' 38"
Всѣхъ твердыхъ составныхъ частей .	0,8651	0,1346	0,32136	0,22652	0,19586	0,13529	38,422
Бромневой кислоты . . .	0,0070	0,0406	0,00390	0,00134	0,00669	0,00083	—
Гипозема . . .	—	0,0071	сѣды	—	—	—	—
Окиси желѣза . . .	0,4370	0,0055	сѣды	—	—	—	—
Углекислой извести . . .	0,1267	0,0481	0,18226	0,11862*	0,12657*	0,09630*	0,07*
„ магнезии . . .	—	0,0061	0,01467	0,07432*	0,04123*	0,02342*	0,01*
„ закиси желѣза . . .	0,0177	—	—	0,00029*	0,00123*	0,00039*	—
Сѣрноокислой извести . . .	0,0381	—	0,00644	0,01083	0,00277	0,00092	0,02
„ магнези . . .	—	—	—	—	—	0,88	1,066
Хлористаго калия . . .	—	—	0,02500	—	—	—	—
„ магнези . . .	0,0083	—	—	—	—	—	—
„ кали . . .	0,1753	0,0048	—	0,01041	0,00099	0,00315	1,72
Бромистаго натрія . . .	0,0252	—	—	0,00612	0,00670	0,00418	14,99
Другаго окислаго натра . . .	—	—	—	—	—	сѣды	—
„ амміака . . .	—	0,0146**	—	0,00365	0,00695	0,00486	0,500
Сѣрноокислаго натра . . .	—	—	—	0,00027	0,00094	0,00043	—
„ кали . . .	—	0,0034	0,02857	—	—	—	—
Азотноокислаго натра . . .	0,0296	—	0,00954	—	—	—	—
Кремневистаго кали . . .	—	—	—	0,00340	0,00096	0,00068	1,499
Фосфорно-кислой извести . . .	—	0,0044	—	0,00017	0,00077	0,00015	—

Примечаніе. Въ видѣ * азотноокислаго и ** угольной соли.

1000 частей воды содержали частей:

Въ другихъ случаяхъ найдены слѣдующія крайнія числа весьма различнаго содержанія азотной кислоты *) и амміака, въ подобныхъ же водахъ, въ зависимости отъ мѣста взятія образца и времени года:

1000 литровъ (1000 пружекъ) воды.	Содержали граммовъ (золотниковъ).		Амміака.	
	Азотной кислоты. Наименьшее.	Наибольшее.	Наименьшее.	Наибольшее.
Ключевой	0,011(0,003)	824,946(237,812)	0,00(0,00)	33,86(9,76)
Рѣчной	0,008(0,002)	8,775(2,530)	0,00(0,00)	2,61(0,76)
Озерной	0,037(0,011)	0,053(0,015)	—	—
Прудовой	—	—	1,00(0,29)	2,05(0,60)
Морской	—	—	0,20(0,06)	0,57(0,16)

Кромѣ того всѣ эти воды содержатъ въ растворѣ большее или меньшее количество газовъ; къ тому же, за исключеніемъ водъ нѣкоторыхъ минеральныхъ ключей, газовъ преимущественно составляющихъ воздушную смѣсь: азота, кислорода, углекислоты. Особенно богата растворенными газами ключевая вода. Такъ какъ въ водѣ углекислота растворима кислорода, а этотъ послѣдній растворяетъ азота, то, сравнительно съ воздушной смѣсью газовъ, смѣсь газовъ, растворенныхъ въ водахъ, обыкновенно богаче углекислотой и кислородомъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ ключевыхъ, такъ называемыхъ минеральныхъ водъ, въ которыхъ растворенная смѣсь газовъ, при содержаніи особенно большаго количества углекислоты, бѣднѣе кислородомъ, чѣмъ воздушная смѣсь. Это послѣднее происходитъ, конечно, вслѣдствіе того, что кислородъ, растворенный въ метеорныхъ водахъ, переходящихъ въ ключевую воду, на пути прохожденія своего по различнымъ слоямъ земной коры, потребляется въ большомъ количествѣ для окисленія различныхъ встречаемыхъ имъ соединений напр. сѣрнистаго желѣза въ сѣрнокислую закись желѣза и сѣрную кислоту; но пополняется въ тоже время изъ воздуха, какъ это происходитъ въ водахъ: рѣчной, озерной, морской, которые постоянно соприкасаются значительной поверхностью съ воздухомъ; такъ что въ нихъ изъ этого послѣдняго легко можетъ пополняться кислородъ, потребляемый происходящими въ нихъ процессами окисленія преимущественно органическихъ веществъ. Кромѣ того въ водахъ, обитаемыхъ растениями, эти послѣднія, разлагая углекислоту подъ выдѣленіемъ кислорода, обогащаютъ воду кислородомъ.

Вода, представляющая въ природѣ такой болѣе или менѣе густой растворъ различныхъ твердыхъ веществъ и газовъ, дѣйствуетъ на горнокаменные породы: атмосферная вода, выпадала на скалы, мор-

*) Въ видѣ азотнокислыхъ: кали, натра, извести и магнезій.

ская, озерная и рѣчная воды, омывая скалы, ключевая вода, проникая въ трещины скалъ; при чемъ растворяетъ растворимыя въ такихъ растворахъ и чистой водѣ составныя части скалъ (углекислоту, известъ, фосфорнокислую известъ, гипсъ, поваренную соль и т. д.), а въ нерастворимыхъ частяхъ (силикатахъ) скалъ вызываетъ такіе химическіе процессы, вслѣдствіе которыхъ, какъ показываютъ опыты, растворяются въ чистой водѣ или дѣлаются растворимыми въ водѣ, подкисленной соляной кислотой, значительныя количества кали, натра, магнезій, извести, кремневой кислоты; такъ, при опытѣ, продолжавшемся три года, изъ 1 миллиона миллиграммовъ (234,4 золотника) базальта, облиатаго 2 литрами (122,1 куб. дюйма = 1,6 кружк.) воды, въ которой было растворено 3,2 грамма (0,75 золотн.) азотнокислаго амміака, растворилось въ чистой водѣ и въ водѣ, подкисленной соляной кислотой, 4041 миллиграммъ (0,95 золотн.) всѣхъ минеральныхъ веществъ, въ томъ числѣ: кали—135 (0,032), натра—195 (0,046), магнезій—495 (0,116), извести—2696 (0,632) и кремневой кислоты—520 миллиграммовъ (0,122 золотн.).

Воздухъ, какъ смѣсь 23 частей кислорода и 77 азота по вѣсу (21 части перваго и 79 частей втораго по объему), къ которой примѣшиваются: постоянно на 10,000 вѣсовыхъ частей ея 6,4 частей углекислоты (или на 10,000 частей первой 4,15 частей второй по объему) и менѣе постоянно или даже случайно весьма незначительное количество другихъ газовъ, какъ-то: амміака, сѣрнистаго и фосфористаго водородовъ и т. д., разрушаетъ химически горныя породы, преимущественно, дѣйствіемъ на нихъ *кислорода* и *углекислоты*.

Кислородъ дѣйствуетъ *непосредственно*, окисляя: а) сѣрнистые металлы, преимущественно сѣрнистое желѣзо (пиритъ) въ сѣрнокислую закись желѣза и сѣрную кислоту; б) закись желѣза, соединенную съ углекислотой въ желѣзномъ шпатѣ или съ кремневой кислотой въ силикатахъ, въ окись желѣза; при чемъ эти кислоты, не имѣя средствъ съ окисью желѣза, дѣлаются свободными, а окись желѣза превращается даже въ водную окись желѣза (гидратъ-окру); и в) углеродъ, содержащійся въ углеводородахъ и органическихъ веществахъ, причемъ образуется углекислота. *Посредствомъ* продуктовъ такого окисленія: сѣрнокислой закиси желѣза, сѣрной и угольной кислотъ, кислородъ можетъ разрушать горныя породы даже. Сѣрнокислая закись желѣза, равно какъ и сѣрная кислота дѣйствуетъ на углекислыя и кремнекислыя соли щелочей (кали и натра) и щелочныхъ земель (извести и магнезій), на фосфорнокислую известъ и поваренную соль; при чемъ сѣрнокислая закись желѣза образуетъ съ одной стороны сѣрнокислыя соли щелочей и щелочныхъ земель, съ другой стороны не прочныя соединенія: углекис-

слой, кремнекислой и фосфорнокислой закиси желѣза и хлористаго желѣза, превращающіяся: первыя два, съ освобожденіемъ кислотъ, въ водную окись желѣза, а послѣднія два постепенно въ фосфорнокислую окись желѣза и хлорное желѣзо, которое, при встрѣчѣ съ углекислыми известью и магнезійю, образуетъ даже хлористыя кальцій и магній и водную окись желѣза. Свѣтлая же кислота съ одной стороны образуетъ тѣже соединенія, что и свѣтлая закись желѣза, съ другой выделяетъ свободныя кислоты: угольную, которая улетучивается, кремневую кислоту, которая дѣлается растворимой, и соляную кислоту, которая разлагаетъ въ свою очередь углекислыя, фосфорнокислыя и нѣкоторыя кремнекислыя соли (водныхъ силикатовъ), образуя хлористыя: известъ, магнезію и т. д.

Угольная кислота, какъ продуктъ окисленія веществъ, содержащихъ углеродъ, равно какъ и содержащаяся въ воздухѣ, дѣйствуетъ на выветриваніе горныхъ породъ многообразно. Растворенная въ водѣ, она: а) дѣлаетъ растворимыми въ водѣ нерастворимыя въ этой послѣдней фосфорнокислую известъ и углекислыя соли: известъ, магнезію и закиси желѣза, превращая эти послѣднія въ двууглекислыя соли; б) побуждаетъ къ окисленію простые металлы, каковы: желѣзо, мѣдь, и затѣмъ соединяется съ окислами этихъ послѣднихъ, образуя углекислыя: закись желѣза (желѣзный шпатъ) или окись мѣди (малахитъ); в) разлагаетъ силикаты, которые, по крайней мѣрѣ, наиболее интересны для селскаго хозяйства, состоятъ съ одной стороны изъ кремнекислаго глинозема (также окисей желѣза и марганца), съ другой изъ кремнекислыхъ кали, натра, известъ, магнезію, закиси желѣза и марганца. Углекислота, растворенная въ водѣ, дѣйствуетъ на эту вторую, послѣднюю часть: или растворяя кремнекислую соль сперва безъ разложенія ея, а затѣмъ разлагая ее съ образованіемъ соответствующей углекислой соли и выдѣленіемъ кремневой кислоты, которая растворяется въ водѣ, содержащей углекислоту; или же, выдѣляя изъ кремнекислой соли только основаніе, особенно легко известъ, съ образованіемъ углекислой соли и выдѣленіемъ кремневой кислоты, которая какъ и углекислая соль растворяется въ водѣ, содержащей углекислоту. Растворъ углекислыхъ солей, въ особенности углекислыхъ щелочей, оставаясь въ соприкосновеніи съ неразложившимся еще силикатомъ, можетъ усиленно и ускоренно продолжать разложеніе этого послѣдняго, начатое растворенной въ водѣ углекислотой.

Вслѣдствіе такого дѣйствія углекислоты на силикаты, отъ этихъ послѣднихъ можетъ остаться, наконецъ, не болѣе какъ, такъ называемый, *каолинъ* или почти чистая глина, т. е. кремнекислый глиноземъ первой части силиката въ соединеніи съ нѣкоторымъ количествомъ кремневой кислоты второй части и водой, если только об-

разующіяся при этомъ, растворимыя въ чистой водѣ: углекислыя кали, натръ, или растворимыя въ водѣ, содержащей углекислоту (углекислой водѣ), углекислыя: известъ, магнезію и закись желѣза, кремнекислыя щелочи и кремневая кислота уносятся водой. Если же эти послѣднія не уносятся водой, то каолинъ пропитывается растворомъ этихъ веществъ, причемъ вещества, находившіяся въ растворѣ лишь при содѣйствіи углекислоты, вслѣдствіе улетучиванія этой послѣдней въ воздухъ или разложенія ею кремнекислыхъ щелочей, выделяются изъ раствора въ видѣ кремневой кислоты, нерастворимыхъ, болѣе богатыхъ кремневой кислотой кремнекислыхъ щелочей, углекислыхъ известъ и магнезію и водной окисей желѣза, которыя примѣшиваются къ каолину въ весьма мелкораздѣленномъ, некристаллическомъ состояніи и смѣшиваются съ нимъ весьма тѣсно и равномерно. Такъ, каолинъ съ примѣсью некристаллической, порошкообразной кремневой кислоты *) и водной окиси желѣза, образуетъ *простую глину* (10—12% первой и 2—5% второй) и *суглинокъ* (болѣе 15% первой и 7—60% второй). Глина, если къ ней примѣшивается болѣе количество водной окиси желѣза (15—20%) образуетъ *желѣзистую глину*; если къ ней примѣшивается углекислая известъ въ различныхъ количествахъ (5—10%, 15—25%, 25—50%, 50—90% и болѣе 90%), образуетъ *мергелистую глину*, *глинистый мергель*, *обыкновенный мергель*, *известковый мергель* и *глинистую известъ*; и, наконецъ, если къ ней примѣшивается углекислая известъ (10—30%) и углекислая магнезію (10—40%), даетъ *магнезіальный* или *доломитовый мергель*. Суглинокъ съ примѣсью углекислой известъ (15—25%) образуетъ *суглинистый мергель*. Конечно, эти различныя массы, кромѣ приведенныхъ главныхъ характерныхъ составныхъ частей, содержатъ еще много нехарактерныхъ для нихъ примѣсей, какъ-то: кремнекислыя щелочи, гипсъ и т. д.

Образованіе того или другаго рода глинистаго продукта будетъ зависеть, слѣдовательно, отъ состава силиката, подвергающагося выветриванію, и отъ того, будутъ ли растворимы продукты выветриванія тотчасъ же удалиться или они будутъ оставаться болѣе или менѣе долгое время въ соприкосновеніи съ нерастворимымъ остаткомъ выветриванія силиката. Такъ, напр., продуктъ выветриванія калиеваго (ортоклаза) или натроваго (альбита) полеваго шпата можетъ быть болѣе или менѣе чистый каолинъ, если только первый не содержитъ закиси желѣза и щелочи ихъ въполнѣ выщелачиваются изъ нихъ, известковаго полеваго шпата (лабрадора) — каолинъ, глина, суглинокъ или мергель; калиевой слюды — слабо желѣзистая глина;

*) Которая, по Зеноту, растворяется изъ глинъ только въ водѣ щелочью.

ибищаются легче ихъ вывѣтривающіеся водные силикаты (цеолиты), дающіе въ продуктахъ своего разрушенія углекислыя известь и натръ, ускоряющіе разрушеніе авгита.

Ходъ вывѣтриванія горной породы, какъ смѣси различныхъ минераловъ, имѣющей известное строеніе и положеніе и находящейся въ тѣхъ или другихъ климатическихъ условіяхъ, зависитъ отъ:

а) рода ея составныхъ частей. Породы, содержащія полевые шпаты вывѣтриваются быстрее, чѣмъ не содержащие ихъ. Вывѣтриваніе первыхъ происходитъ скорѣе, если онѣ состоятъ изъ полевыхъ шпатовъ, болѣе бѣдныхъ кремневой кислотой и кали и болѣе богатыхъ известью; если въ составѣ ихъ находится слюда, такъ какъ эта послѣдняя усиливаетъ дѣйствіе на содержащую ее горную породу переходовъ температуры; если въ нихъ находятся богатые известью: полевые шпаты и известковая роговая обманка, чѣмъ въ противоположныхъ вѣѣхъ этимъ случаямъ; наконецъ скорѣе, если въ нихъ содержится богатый известью авгитъ, чѣмъ, если въ нихъ содержится известковая роговая обманка. Изъ числа вторыхъ, т. е. горныхъ породъ, не содержащихъ полевыхъ шпатовъ, наиболѣе скоро вывѣтриваются содержащія слюду, къ тому же содержащія магнезіальную, скорѣе содержащихъ калиевую слюду; менѣе скоро хлористовыя еще медленнѣе тальковыя и особенно медленно серпентиновые породы.

б) отъ строенія горной породы. Наиболѣе скоро вывѣтриваются горныя породы съ зернистымъ строеніемъ, къ тому же съ крупно-зернистымъ скорѣе, чѣмъ съ мелкозернистымъ; медленнѣе сланцевыя породы, въ особенности съ ровной и гладкой поверхностью сланецъ; еще медленнѣе порфировыя горныя породы, особенно если главная масса ихъ очень плотна, а число и величина выдѣляющихся изъ этой массы кристалловъ невелики; наиболѣе же медленно—горныя породы плотнаго строенія во всей своей массѣ, въ особенности же стекловидныя и содержащія мало вкрапленныхъ въ нихъ кристалловъ.

в) отъ положенія горной породы самой по себѣ и по отношенію къ другой, соприкасающейся съ ней горной породы. Въ первомъ отношеніи, чѣмъ болѣе въ породѣ трещинъ, въ особенности вертикальныхъ, которыя бы, какъ напр., у базальта, проводили въ нее дѣйствіе разрушенія, тѣмъ легче порода вывѣтривается. Поэтому же самому вывѣтриваніе сланцевой породы замедляется тѣмъ болѣе, чѣмъ горизонтальнѣе положеніе ея сланецъ. Во второмъ отношеніи, вывѣтриваніе трудновывѣтривающейся горной породы ускоряется тѣмъ ея положеніемъ, при которомъ она приходитъ въ соприкосновеніе съ болѣе легко вывѣтривающейся горной породой, доставляю-

щей въ продуктахъ своего разрушенія новыхъ, довольно сильныхъ дѣятелей вывѣтриванія.

г) отъ климата. Вывѣтриваніе, какъ механическій и какъ химическій процессы, находится въ зависимости отъ степени теплоты и влажности и отъ переходовъ въ состояніи теплоты и влажности, опредѣляемыхъ климатомъ. Чѣмъ рѣзче эти переходы, чѣмъ сильнѣе тепло и обильнѣе въ тѣ тоже время влажность, тѣмъ быстрее происходитъ разрушеніе горной породы. Такъ, вслѣдствіе перваго особенно быстро разрушаются горныя породы механически на сѣверѣ; вслѣдствіе же втораго—химически въ тропическихъ странахъ.

Вслѣдствіе того, что горныя породы состоятъ обыкновенно изъ нѣсколькихъ минераловъ различнаго, какъ мы видѣли, состава, различно быстро вывѣтривающихся и даже отчасти неразрушающихся химически, что механическое и химическое разрушенія горной породы происходятъ почти одновременно, и что разрушается горная порода не вдругъ во всей своей массѣ, а постепенно; вслѣдствіе всего этого, въ результатъ разрушенія горной породы въ известное время получается приблизительно такая смѣсь, съ какой мы познакомились при механическомъ анализѣ почвы: во первыхъ, изъ продуктовъ механическаго разрушенія горной породы, болѣе или менѣе крупныхъ обломковъ ея и составляющихъ ея минераловъ,—хрища и песка различной крупности; во вторыхъ, изъ продуктовъ химическаго разрушенія горной породы: весьма мелкихъ, пылеватыхъ, иловатыхъ частицъ глины, осадившейся изъ раствора кремневой кислоты *), водной окиси желѣза (охры) и растворимыхъ частицъ, какъ-то: углекислыхъ извести и магнезій, гипса, которыя однако не растворены лишь по недостатку необходимой для ихъ растворенія чистой воды или воды, содержащей углекислоту. Такимъ образомъ, несправедливо называть эти мелкія частицы глинистыми, какъ это дѣлаютъ очень обыкновенно, такъ какъ между ними иногда можетъ быть весьма много неглинистыхъ, а вѣрнѣе называть иловатыми, понимая подъ этимъ самыя мелкія частицы, которыя остаются очень долго взмученными въ водѣ и которыя, по химической природѣ ихъ, могутъ быть различны. Между хрищевыми и песчаными частицами можно различить собственно двѣ части: одну *неизмѣняющуюся, постоянную*, а именно кварцевые обломки и зерна, которые способны разрушаться только механически, но не химически, и другую—*измѣняющуюся, непостоянную*, состоящую изъ обломковъ и зеренъ силикатовъ, известковаго шпата, гипса и т. д.; которыя могутъ разрушаться даже не только механически, но и химически и продуктами послѣдняго измѣненія увеличивать иловатую часть почвы.

*) Извлекаемой цеолочью.

Здесь, мы опять встречаемся съ нерѣдко дѣлаемой ошибкой отождествленія песчаныхъ частицъ съ кварцевыми, тогда какъ кварцъ (кристаллическая кремневая кислота), правда, принадлежитъ всегда песчаной части продуктовъ выветриванія горной породы; но, наоборотъ, песчанныя частицы не всегда кварцевыя частицы. Нѣкоторая часть продуктовъ механическаго разрушенія горной породы, именно крайне измельченныя частицы, состоящія преимущественно изъ кварца, который какъ разъ, вслѣдствіе своей трудной химической измѣняемости, способенъ къ такому крайнему измельченію, достигаютъ иногда такой малой величины, что частію трудно отдѣляются отъ иловатыхъ частицъ помощью механическаго анализа, — не иначе какъ послѣ продолжительнаго кипяченія съ водой; частію же вовсе неотдѣляются отъ этихъ послѣднихъ. Такая примѣсь къ иловатой части мелкихъ песчаныхъ частицъ встрѣчается во всѣхъ глинистыхъ массахъ, но она особенно характерна для суглинка, въ которомъ достигаетъ 15%. Кроме этихъ мелкихъ частицъ, болѣе тѣсно смѣшивающихся съ иловатыми частицами, въ этомъ послѣднемъ примѣшиваются и болѣе крупныя частицы, обломки еще неразрушенной горной породы составляющихъ ее минераловъ, изъ которыхъ путемъ химическаго разрушенія произошла иловатая часть. Эта послѣдняя примѣсь также довольно значительна у суглинка.

Понятно послѣ этого, какъ разнообразны должны быть продукты выветриванія кристаллическихъ и метаморфическихъ породъ. Изъ этихъ породъ: 1) богатыя содержаніемъ калиевыхъ (ортоклаза) и натровыхъ (олитоклаза, альбита) полевыхъ шпатовъ, какъ напр. гранитъ, порфиръ, трахитъ, даютъ въ продуктъ своего выветриванія, главнымъ образомъ каолинъ; затѣмъ жирную глину *), кварцевый песокъ и большія количества калиевыхъ солей; 2) состоящія въ значительной своей части изъ роговой обманки или авгита, какъ-то: сіенитъ, грюнштейны, базальтъ даютъ тощую глину **), суглинокъ и мергель, но не даютъ кварцеваго песка, и 3) сланцевыя породы, изобилующія въ своемъ составѣ слюдой, даютъ, смотря потому изобилуютъ ли калиевой или магнезіальной слюдой, продукты: въ первомъ случаѣ, приближающіеся къ продуктамъ выветриванія первыхъ, а во второмъ, приближающіеся къ продуктамъ выветриванія вторыхъ изъ выше приведенныхъ только что горныхъ породъ.

*) Каолинъ съ большимъ количествомъ постороннихъ примѣсей: водной окиси желѣза, извлекаемой щелочью кремневой кислоты, мелкаго песка, отмучивающагося лишь послѣ кипяченія съ водой.

**) Съ еще большимъ количествомъ постороннихъ примѣсей, чѣмъ жирная глина, но меньшимъ чѣмъ суглинокъ.

в) *Дѣтели размѣщенія продуктовъ разрушенія горныхъ породъ почвы первичныя и наносныя.*

Первая кора нашей земли, представлявшей первоначально, какъ предполагаютъ, одну расплавленную массу, состояла изъ кристаллической породы, на которую весьма рано начали дѣйствовать дѣтели выветриванія; къ тому же несравненно болѣе сильныя, чѣмъ теперь: атмосфера, окружающая землю въ то время была во много разъ богаче настоящей водяными парами и углекислотой и дѣйствовали на земную кору при гораздо болѣе высокой, чѣмъ теперь, температурѣ и гораздо болѣе высокомъ своемъ давленіи на землю, чѣмъ теперь. Продукты перваго разрушенія первой кристаллической породы такими сильными дѣтелями, равно какъ и продукты позднѣйшаго разрушенія позже *) явившихся въ составѣ земной коры кристаллическихъ породъ мало по малу ослобѣжавшими дѣтелями выветриванія, — вслѣдствіе охлажденія нашей планеты, выдѣленія изъ атмосферы части водяныхъ паровъ и углекислоты въ составѣ земной коры (образованія водъ и углекислыхъ солей) и уменьшенія вслѣдствіе этого атмосфернаго давленія, — сравнительно рѣдко оставались и остаются на мѣстѣ своего образованія, покрывая ту горную породу, изъ которой они образовались; болѣе же частію свосются, перемѣщаются различными дѣтелями въ мѣста болѣе или менѣе удаленныя отъ мѣстъ ихъ образованія.

Главнѣйшимъ изъ дѣтелей размѣщенія продуктовъ выветриванія, который дѣйствуетъ непрерывно, а иногда и весьма сильно, является вода. Она, достигая земной поверхности въ видѣ атмосферическихъ испаденій, главнымъ образомъ дождя и снѣга, образуетъ капельно жидкія (горныя потоки, водопады, ручьи, рѣчки, рѣки, озера и моря) и полужидкія, полутвердыя (ледники) массы, движущіяся отъ болѣе возвышенныхъ къ менѣе возвышеннымъ надъ уровнемъ моря мѣстамъ, къ морямъ и переносящія продукты разрушенія горныхъ породъ *нерастворенными* или *растворенными* въ водѣ. Нерастворенныя въ водѣ части могутъ быть весьма различной величины: отъ большихъ камней до мелкихъ, взмученныхъ въ водѣ частицъ. Вода поднимаетъ и увлекаетъ ихъ на болѣе или менѣе далекое разстояніе, смотря потому, какъ быстро она течетъ и какъ въски эти части, т. е. каковъ ихъ удѣльный вѣсъ **). Теченіе воды въ

*) Прежде являлись: гранитъ, порфиръ, сіенитъ, грюнштейны; позже — трахитъ, базальтъ.

**) Удѣльный вѣсъ: кварца — 2,65; ортоклаза — 2,55; олигоклаза — 2,65; лабрадора — 2,7; слюды — 2,8—3,1; авгита — 2,9—3,5; роговой обманки — 2,9—3,4; известковаго шпата — 2,7; доломита — 2,8—2,9; глинны, высуш. при 100° — 2,5; каолина — 2,2; гипса — 2,36—2,4.

рѣкахъ, главныхъ разносинахъ продуктовъ разрушенія, отъ истока къ устью становится все медленнѣе и медленнѣе, вслѣдствіе того что уменьшается паденіе, наклонъ и увеличивается ширина русла, по которому течетъ рѣка; такъ что эта послѣдняя, образуемая нерѣдко въ верхнихъ своихъ частяхъ грозные подоплады, сохраняетъ къ устью едва замѣтное движеніе. Кромѣ того движеніе воды въ рѣкахъ можетъ замедляться иногда впадающими въ рѣки притоками, особенно если эти послѣдніе впадаютъ въ рѣку подъ менѣе острымъ угломъ, или даже движеніемъ воды, противоположнымъ движенію воды въ рѣкѣ, какъ это бываетъ при впаденіи рѣки въ море, гдѣ рѣчная вода, въ своемъ движеніи къ морю, встрѣчается съ морскимъ приливомъ, который гонитъ воду въ рѣку. Поэтому, если мы въ томъ же направленіи, т. е. отъ истоковъ къ устьямъ, прослѣдимъ рѣчные осадки и наносы, то они будутъ представляться намъ все болѣе и болѣе измельченными: отъ большихъ камней и крупныхъ глыбъ, нагроможденныхъ у горныхъ рѣкъ, по берегамъ съ петоковъ, до самыхъ мелкихъ частицъ, съ трудомъ, осаждающихся изъ воды у устья рѣки, при впаденіи ея въ море. Между растворенными частями, переносимыми водой, слѣдуетъ различить такіе, которые растворены въ водѣ безъ содѣйствія, и такіе, которые растворены въ ней при содѣйствіи другихъ растворенныхъ въ ней веществъ; такъ что, съ выдѣленіемъ изъ воды этихъ послѣднихъ, выдѣляются изъ ней и растворенныя при ихъ содѣйствіи вещества. Такъ, съ улетученіемъ изъ воды, остающейся долгое время въ соприкосновеніи съ воздухомъ, какъ-то: рѣчной, озерной, морской, большаго или меньшаго количества углекислоты, выдѣляются изъ воды также бывшія растворенными въ ней при содѣйствіи углекислоты углекислыя: известь, магнезія, закись желѣза. Вещества же, растворенныя въ водѣ безъ содѣйствія другихъ растворенныхъ веществъ, выдѣляются изъ воды только при испареніи самой воды: и, конечно, прежде всего выдѣляются при этомъ тѣ изъ нихъ, которые наимѣнѣе въ ней растворимы; такъ, гинсъ раньше поваренной соли *). Морскія и озерныя волны, надвигаясь на берегъ и отодвигаясь отъ него, перемѣщаютъ также продукты разрушенія береговой горной породы; при чемъ песчаная болѣе крупная части оставляются ближе къ берегу, болѣе же мелкія, взмученныя и растворенныя части уносятся далѣе въ море. Волна, разрушающая берегъ въ одномъ мѣстѣ, намываетъ продукты разрушенія въ другомъ мѣстѣ, большаго затишья, причемъ въ началѣ отлагаетъ болѣе крупныя части, а потомъ, съ возвышеніемъ наноса, болѣе мелкія частицы. Ледники, какъ

*) Одна часть гипса требуетъ для своего растворенія 400, а одна часть поваренной соли только 2,75 частей холодной воды.

извѣстно, переносятъ на своей поверхности значительные обломки, камни въ видѣ такъ называемыхъ моренъ.

Вотъ, такому перемѣщенію водой продуктовъ разрушенія кристаллическихъ горныхъ породъ, направляемому неровностями, которыя представляла земная поверхность въ различные времена своего существованія, обязаны своимъ происхожденіемъ непутичскія, водныя, пластовыя горныя породы, представляющія, какъ мы видѣли, глинныя, песчаныя, известковыя осадки. Онѣ образовывались въ теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго времени, на днѣ болѣе или менѣе глубокихъ водъ, сплотившись давленіемъ большихъ или меньшихъ массъ воды и поднимались со дна водъ, вслѣдствіе новыхъ измѣненій въ неровностяхъ земной поверхности.

Происхожденіе и измѣненіе неровностей земной поверхности зависятъ отъ болѣе или менѣе быстрыхъ поднятій одѣхъ частей ея и соответствующихъ опущеній другихъ ея частей при участіи *вулканизма*, еще однаго весьма сильнаго дѣтели перемѣщенія продуктовъ разрушенія горныхъ породъ.

Водныя, пластовыя горныя породы, разъ явившіеся въ составѣ земной коры, раздѣляютъ, затѣмъ, участь кристаллическихъ массовыхъ горныхъ породъ; онѣ подпадаютъ вліянію тѣхъ же дѣтелей вывѣтриванія, которыя справляются съ ними также различно скоро, смотря по роду ихъ составныхъ частей, по плотности ихъ строенія, по положенію ихъ и климатическимъ условіямъ. Такъ, напр., плотный песчаникъ съ связывающимъ его зерна кремнистымъ цементомъ, вывѣтривается весьма трудно, труднѣе песчаника съ связывающимъ его зерна глинистымъ или известковымъ цементомъ, который сравнительно легко разлагается или вымывается водой, чистой или содержащей углекислоту. Продукты разрушенія этихъ породъ, конечно, весьма различны въ зависимости отъ состава горной породы и отъ большой или меньшей легкости, съ которой вывѣтриваются составныя части ея; они могутъ содержать въ данное время болѣе или менѣе пловатыхъ частей, болѣе или менѣе песку, хряща и т. д. Къ тому же, пловатая часть можетъ содержать большее или меньшее количество глинистыхъ частей, осадившейся изъ раствора кремневой кислоты, водной окиси желѣза, углекислыхъ извести и магнезій; а песчаная или хрящевая—большее или меньшее количество постоянныхъ, неизмѣняющихся, и непостоянныхъ, измѣняющихся частицъ.

Вода, дѣйствуя на въкоторыя горныя породы, которыя въ своемъ составѣ содержатъ глину, размягчаетъ эту послѣднюю и вымываетъ ее постепенно пазъ соединенія съ другими составными частями горной породы, такъ что эти послѣднія, лишенные взаимной связи, образуютъ кучи камней, глыбъ, песку; или же, размягчая такіе глинистыя массы и дѣлая ихъ скользкими, она обуславливаетъ сползаніе

слоевъ, которыми глинистыя слои служили опорой и которые, потерявъ эту опору, обрываются въ пропасти и долины; или, наконецъ, выщелочивая такія растворимыя вещества, какъ гипсъ, поваренную соль, встрѣчающіеся въ земной корѣ въ довольно значительныхъ скопленіяхъ, образуетъ пещеры, пронасти, въ которыя обрушиваются горныя массы, лишенныя своей опоры. Такое перемѣщеніе продуктовъ разрушенія горныхъ породъ, подготовленное водой, выполняетъ *сила тяжести*, которая, такимъ образомъ, является также въ числѣ дѣйтелей перемѣщенія продуктовъ вывѣтриванія горныхъ породъ.

Наконецъ, въ числѣ этихъ послѣднихъ слѣдуетъ назвать воздухъ въ движеніи — *ветеръ*, перемѣщающій не только самыя мелкія частицы въ видѣ пыли, но и болѣе крупныя частицы продуктовъ разрушенія горныхъ породъ, какъ напр. песокъ дюнъ.

Такимъ образомъ, продукты разрушенія горной породы въ зависимости отъ большаго или меньшаго наклона поверхности вывѣтривающейся горной породы и силы дѣйствія на нее вѣтра и движущейся воды, или остаются въ болѣе или меньшей своей части на мѣстѣ своего образованія, покрывая горную породу, изъ которой они образовались; или же сносятся вполнѣ или отчасти, преимущественно иловатыя ихъ части, главнымъ образомъ водой въ болѣе низменныя мѣста, болѣе или менѣе далеко отъ мѣста своего образованія. Въ первомъ случаѣ они образуютъ такъ называемыя *первичныя* почвы, во второмъ — *наносныя*. Образование первыхъ началось раньше вторыхъ, но продолжается затѣмъ, одновременно съ послѣдними. Хрящевыя и песчаныя части первыхъ съ болѣе или менѣе острыми гранями, вторыхъ — болѣе или менѣе округлены, какъ это мы видѣли при разсмотрѣніи продуктовъ механическаго анализа почвы. Первые сравнительно со вторыми бѣдны иловатыми частями; залегая на горной породѣ, изъ которой онѣ образовались, онѣ обыкновенно представляютъ, не глубокой, въ нѣсколько футовъ слой, въ которомъ сверху внизъ все увеличивается число крупныхъ частей, и который переходитъ, наконецъ, въ сплошную горную породу. Вторыя залегаютъ на горныхъ породахъ, которыя не принимали участія въ образованіи ихъ главной массы, но которыя могутъ принимать въ нихъ небольшое количество продуктовъ своего разрушенія, особенно въ нижнихъ частяхъ наноснаго, часто весьма значительной толщины слоя. Наносныя почвы могутъ даже перекрывать другъ друга, образуя въ такомъ случаѣ наносныя массы въ нѣсколько саженъ толщины.

Изъ предыдущаго разсмотрѣнія слѣдуетъ, что земная кора постоянно перестраивалась, между прочимъ, вслѣдствіе образованія все новыхъ и новыхъ наносовъ, которыя, уплотняясь, превраща-

лись въ горныя породы (водныя, пластовыя), подвергавшіяся въ свою очередь разрушенію и съ одной стороны производившія первичныя почвы, съ другой доставлявшія матеріалъ для новыхъ наносовъ. Такъ, что въ наноснымъ почвамъ въ настоящее время мы приписываемъ все малооплотнившіеся, болѣе старыя *дилювіальныя* наносы, которые образовались съ того времени, какъ значительная часть Европейскаго материка, преимущественно сѣверная, покрывалась въ послѣдній разъ водой — дилювіальнымъ моремъ, и болѣе новыя, *аллювіальныя*, образовавшіеся и образующіеся дѣйствіемъ настоящихъ водъ, послѣ освобожденія изъ подъ воды дилювіальныхъ слоевъ, изъ этихъ послѣднихъ, равно какъ изъ предшествовавшихъ имъ во времени образованія пластовыхъ и кристаллическихъ горныхъ породъ.

Происхожденіе органической части почвы.

Наблюденіе показываетъ, что уже голыя скалы, въ особенности известковыя, даже съ гладкой поверхностью, повидимому, нетронутой еще вывѣтриваніемъ, покрываются растеніями. Правда, это низшія растенія, различныя микроскопически малые лишайи, которые представляются невооруженному глазу пылеватой массой чернубаго, желтаго, буровато-краснаго, сѣровато-зеленаго цвѣта. Какъ не малы эти растенія, все-же они играютъ весьма важную роль въ разрушеніи горныхъ породъ.

При жизни они дѣлаютъ гладкую поверхность горной породы, на которой поселились, шероховатой; такъ что горная порода, послѣ этого быстрее охлаждается, вслѣдствіе лучеиспусканія, сильнѣе сгущаетъ на своей поверхности водяныя пары изъ воздуха и лучше задерживаетъ влагу, въ которой обыкновенно растворены, какъ мы видѣли, кислородъ и углекислота. Кромѣ того зеленыя растенія разлагаютъ днемъ углекислоту подъ выдѣленіемъ кислорода, а ночью выдѣляютъ углекислоту. Такимъ образомъ, горная порода, покрывшись лишайями, подвергается усиленному дѣйствію переходовъ температуры, влаги, кислорода, углекислоты и, можетъ быть, еще какой либо кислоты, выдѣляемой самими лишайями; вслѣдствіе чего лишайи получаютъ необходимыя для нихъ каліи и извѣсть; а горная порода разрушается, прорѣзываясь безчисленнымъ множествомъ трещинъ.

Послѣ смерти лишая, растительная масса его, состоящая изъ углерода, водорода, кислорода, азота и сѣры (фосфора?), образующихъ органическую часть ея, и зольныхъ составныхъ частей, т. е. такихъ, которыя остаются послѣ полнаго сжиганія растительнаго вещества сама подпадаетъ дѣйствію воздуха (кислорода), влажности

и теплоты и постепенно разлагается—сотлбвастъ или согниваетъ. При этомъ, смотря потому, происходитъ ли разложение при большей или меньшей степени влажности, подъ водой или нѣтъ и, вълѣдствіе этого, при полномъ, затрудненномъ или даже ограниченномъ доступѣ воздуха и болѣе или менѣе высокой температурѣ, изъ органической части отжившей растительной массы образуются различные вещества, извѣстные подъ общимъ названіемъ *перегнойныхъ, перегнойа*. Между ними различаютъ такіа, которыя неимѣютъ ни кислотныхъ, ни основныхъ свойствъ и не растворяются ни въ водѣ, ни въ щелочахъ,—*гумина, ульмина и геина* *), но которыя дѣйствіемъ амміака и другихъ щелочей превращаются въ соответствующія вещества кислотныхъ свойствъ: *гуминовую, ульминовую и геиновую* кислоты. Геиновая кислота растворима въ водѣ и растворяетъ ея окрашиваетъ голубую лакмусовую бумажку въ красный цвѣтъ, разъѣдаетъ кожу и вредно дѣйствуетъ на жизнь многихъ растений. Гуминовая же и ульминовая кислоты нерастворимы въ водѣ, но образуютъ съ щелочами растворимыя въ водѣ соли, а съ щелочными землями—соли растворимыя въ растворахъ амміачныхъ солей этихъ кислотъ съ образованіемъ двойныхъ солей или солей съ двумя основаніями, изъ коихъ одно амміакъ, такъ напр., гуминово-кислой амміакъ-извести. Ульминовая кислота, окисляясь на воздухѣ, переходитъ въ гуминовую, а эта послѣдняя, окисляясь дальше, превращается въ *клическую* съ большимъ и въ *клическоосадоочную* кислоту съ меньшимъ содержаніемъ кислорода. Эти двѣ послѣднія кислоты растворяются въ водѣ, образуя растворы: первая—золотисто желтого, вторая—желтого цвѣта; первая изъ нихъ образуетъ растворимыя соли со всеми основаніями, а вторая только съ щелочами и щелочными землями; амміачная соль первой образуетъ весьма легко соли съ четырьмя, а амміачная соль второй даже съ пятью основаніями, но эти соли, въ особенности соли послѣдней кислоты, разлагаются весьма скоро съ переходомъ этихъ кислотъ въ *углекислоту*—конечный продуктъ разложениа перегнойныхъ веществъ. Всѣ эти кислоты имѣютъ большое сродство съ амміакомъ, который даже неотдѣлимъ отъ нихъ совершенно, хотя перегнойныя вещества, по теоретическому ихъ составу, не должны содержать вовсе азота. Амміакъ перегнойно кислыхъ солей происходитъ изъ азота расти-

*. При полномъ доступѣ воздуха и обыкновенной температурѣ (въ верхнихъ слояхъ почвы обыкновенной влажности), образуется свѣтло или темно бурое землястое вещество — *гумина*; при затрудненномъ доступѣ воздуха и нѣсколько болѣе влажности (на глубинѣ сыроватыхъ, вязкихъ почвъ) образуется желтого бурой, рассыпчатая масса—*ульмина*; при весьма ограниченномъ доступѣ воздуха, почти въ отсутствіи его и при болѣе влажности (на днѣ стоячихъ водъ) образуется черная иловатая масса—*геина*.

тельной массы, которая, разлагаясь такимъ образомъ, даетъ въ конечныхъ продуктахъ своего разложениа: воду, углекислоту, амміакъ или азотную кислоту, сѣрнистый и фосфористый водороды или сѣрную и фосфорную кислоты; при чемъ кислоты, въ томъ числѣ и кремневая, находявшаяся уже такой въ растительной массѣ, получаютъ соединенными съ основаніями зольной части растений (каліи, натромъ, известью, магнезіей) въ углекислыя, сѣрнокислыя, фосфорнокислыя, азотнокислыя и частью кремнекислыя соли.

Опытъ показываетъ далѣе, что растительная масса разлагается сворѣе, если она сочна, богата азотомъ, щелочами и бѣдна кремневой кислотой, смолистыми, жирными, восковыми и дубильными веществами; но все же она разлагается не вдругъ, а постепенно; такъ что въ данное время она можетъ представлять смѣсь *) еще почти нетронутыхъ частей своихъ, сохраняющихъ еще свою форму, съ частями ея, находящимися на различныхъ ступеняхъ разложениа, съ различными продуктами ея разложениа.

Эти продукты разложениа растительной массы, не говоря уже объ углекислотѣ, о которой мы говорили выше, весьма важны для разрушенія горныхъ породъ. Щелочныя соли, въ особенности же амміачная соль перегнойныхъ кислотъ, растворяютъ безъ разложениа нерастворимыя сами по себѣ минеральныя соли (напр. фосфорнокислыя) или отнимаютъ у этихъ послѣднихъ основанія для образованія солей съ нѣсколькими основаніями. Этимъ послѣднимъ путемъ онѣ разлагаютъ силикаты. Образующіяся при разложени растительной массы: азотная, сѣрная и фосфорная кислоты и щелочныя соли составляютъ, какъ мы видѣли выше, весьма сильныхъ дѣателей вывѣтриванія горныхъ породъ, наконецъ, въ случаѣ недостаточнаго доступа воздуха, перегнойныя вещества могутъ для своего окисленія отнимать кислородъ у окисловъ металловъ и сѣрнокислыхъ солей, превращая первыя въ низшія степени окисленія, а вторыя — въ сѣрнистые металлы.

Слѣдовательно, разлагаясь, отжившая растительная масса лишавъ можетъ продолжать разрушеніе горныхъ породъ, начатое лишавми при жизни, тѣмъ болѣе что она, въ этомъ состояніи разложениа, обладаетъ большою способностью сгущать въ себѣ водяные пары и газы и задерживать капельно жидкую воду. Такой процессъ вывѣтриванія горной породы, усиливаемый дѣйствіемъ живой и разлагающейся растительной массы, подготавливаетъ постепенно и послѣдовательно въ продуктахъ разложениа горной породы среду, пригодную для развитія растений все болѣе и болѣе высокой организаціи: мховъ, злаковъ, кустарниковъ, деревьевъ. Эти растения, дѣйствуютъ

*) Называемую также *перегноемъ* въ болѣе обширномъ смыслѣ.

на горнокаменную породу подобно лишаймъ, прибавляя въ этому дѣйствию, въ зависимости отъ большаго или меньшаго развитія ихъ корней еще и разрушительное дѣйствіе этихъ послѣднихъ на горную массу. Корни этихъ растений, проникая въ щели горной породы, дѣйствуютъ на эту послѣднюю какъ клинья, раздвигая ея части и открывая доступъ въ расширяемыя ими щели водѣ и воздуху. Такое дѣйствіе корней еще усиливается послѣ смерти растений, когда масса ихъ, проникающая горную породу, вбираетъ сильно воду, разбухаетъ, въ особенности сильно при замерзаніи вбранной воды.

Такимъ образомъ сама растительность подготавливаетъ изъ голыхъ скалъ среду, которая могла бы служить не только для укрѣпленія растений, но изъ которой эти послѣдніе могли бы также получать пищу. И, конечно, съ тѣхъ поръ, какъ явились на землѣ условія, сдѣлавшія возможнымъ произрастаніе растений, т. е. атмосфера освободилась отъ углекислоты и водяныхъ паровъ до того, что стала свободна пропускать лучи солнца, давление ея уменьшилось и понизилась температура воздуха и земной коры; съ тѣхъ поръ разрушеніе горнокаменныхъ породъ происходитъ при большемъ или меньшемъ участіи растений, какъ это доказываютъ, между прочимъ, каменноугольныя слои, слои бураго угля, нахожденіе такъ называемаго битума, смолистаго вещества растительнаго происхожденія во многихъ горныхъ породахъ водной части земной коры. Тѣмъ не менѣе вѣрно и то, что продукты разрушенія горныхъ породъ, образовавшіеся безъ содѣйствія растений въ видѣ первичной или наносной почвы, представляютъ среду годную для произрастанія растений даже болѣе высокой организаціи чѣмъ лишай, поселяющіеся на голыхъ скалахъ.

Скала или продукты ея разрушенія, давъ пріютъ растениямъ и производя въ теченіи долгаго времени, изъ году въ годъ смѣняющіяся поколѣнія ихъ, обогащаются растительными остатками, которые, примѣшиваясь къ минеральнымъ продуктамъ разрушенія, частью сохраняющими еще свои растительныя формы, частью утрачившими ихъ, въ различномъ состояніи разложенія, образуютъ почву въ томъ видѣ, въ какомъ мы познакомились, съ ней при механическомъ ея анализѣ.

Этимъ, однако, не исчерпывается еще участіе растений въ образованіи почвы. Если въ большей части почвъ и большая часть содержащагося въ почвѣ перегноя имѣетъ такое происхожденіе, какъ мы только что указали, то въ нѣкоторыхъ почвахъ происхожденіе его, по крайней мѣрѣ, ближайшее можетъ быть отчасти иное. Первичная или наносная почва, разъ образовавшаяся изъ продуктовъ разрушенія горныхъ породъ и растительныхъ остатковъ, непред-

ставляетъ чего либо постояннаго, неизмѣняющагося, но измѣняется и перемѣщается тѣми же дѣятелями, которые трудились надъ ея образованіемъ. Теплота, вода съ растворенными въ ней веществами, воздухъ (кислородъ, углекислота и аммиакъ) и растенія продолжаютъ разрушеніе еще неподвергшихся химическому разрушенію минеральныхъ частей почвы и измѣненіе и раствореніе продуктовъ химическаго разрушенія. Теплота, вода, воздухъ и химическіе продукты продолжаютъ механическое измельченіе частей еще недоступныхъ предѣла такого измельченія, вода и вѣтеръ продолжаютъ перемѣщать частицы почвы. Вода сноситъ частицы почвы и, конечно, прежде всего мелкія, взмучивающіяся въ ней, состояція преимущественно изъ продуктовъ химическаго разрушенія горныхъ породъ: глины, осадившейся изъ раствора кремневой кислоты, водной окиси желѣза, углекислыхъ извести и магнезій и продуктовъ разложенія растительныхъ остатковъ — нерастворимыхъ перегнойныхъ кислотъ и ихъ солей. Рѣчная, озерная, морская вода, при известной быстротѣ теченія, силѣ движенія воды, всегда двигаетъ большее или меньшее количество болѣе или менѣе крупнаго песка, хряща о бокъ съ взмученными частями и растительностію населяющей воду, въ особенности морскую, и осаждастъ ихъ тамъ, гдѣ замедляется теченіе, ослабляется движеніе; такъ, напр., рѣчная вода осаждастъ въ развѣхъ заливахъ, у береговъ, въ особенности у вогнутой части берега при заворотѣ рѣки, въ устьѣ при впаденіи рѣки въ море, а морская — при впаденіи рѣки въ море, въ болѣе или менѣе глубокихъ береговыхъ бухтахъ и т. д. При этомъ осаждаются въ этихъ мѣстахъ сперва болѣе крупныя части: хрящъ, песокъ; а затѣмъ, наконецъ, возвысившійся на столько, что вода покрываетъ его очень мелко, начинаетъ покрываться болѣе мелкими, иловатыми частями, между которыми можетъ быть весьма значительное количество перегнойныхъ веществъ, возвышается, вслѣдствіе этого, даже до того, что не затопляется болѣе постоянно водой, а покрывается ею лишь периодически: рѣчной во время половодій, а морской — во время приливовъ, и, потому, заселяется, наконецъ, растительностію; эта же послѣдняя, пока наносъ вообще еще покрывается водой, периодически заносится осаждающимися изъ воды иломъ, и, погибая подъ нимъ въ нѣкоторой своей части, примѣшивается къ наносимымъ водой минеральнымъ и органическимъ частямъ еще продукты своего разложенія. Наростая такимъ образомъ, дажде, наносъ, по теченіи нѣкотораго времени, перестаетъ совсѣмъ покрываться водой. Такіе наносы образуютъ часто весьма плодородныя *согфы, согровыя почвы*, которые различаются: 1) по мѣсту ихъ образованія, на *морскія* (образующіяся у береговъ или при впаденіи рѣки), *рѣчныя, озерныя* и *прудовыя*, и 2) по матеріалу, участвовавшему въ ихъ образованіи,

который может быть преимущественно: песчанистый, глинистый, суглинистый, мергелистый, известковый или даже перегибный. Хотя согровая почва, отличающаяся, преимущественно, способом, своего образования, может и не содержать перегноя, тѣмъ не менее это название присвоивается, главнымъ образомъ, почвамъ, содержащимъ перегной (5—10%). Чисто перегибныя согровыя почвы весьма рѣдки и встрѣчаются на небольшихъ протяженіяхъ какъ прудовыя согры, образовавшіяся въ маленькихъ прудахъ, постепенно наполнившихся листьями, которые сплосились въ нихъ водой.

Но, если между согровыми почвами вѣтъ почвъ, состоящихъ исключительно или преимущественно изъ перегибныхъ веществъ; то все же имѣются почвы, состоящія преимущественно изъ растительной массы — *торфяныя* почвы, которыя образуются въ болѣе сѣверныхъ странахъ или на высокихъ горахъ, гдѣ, вслѣдствіе недостатка теплоты, замедляются процессы разложенія. Они образуются, дайте, въ стоячихъ водахъ или же на мѣстахъ непокрытыхъ водой, но съ постоянно влажной почвой. На мѣстахъ покрытыхъ нѣсколько глубже водой, несодержащей извести, образование торфа начинается водорослями (нитчатками), которыми зацѣпляетъ вода и которыя, отживая, опускаются на дно водъ, гдѣ образуютъ землистый торфъ. Въ болѣе мелкихъ водахъ или у береговъ болѣе глубокихъ водъ, на отмеляхъ, которыя образованы наносами или землистымъ торфомъ, починъ въ образованіи торфа принимаютъ на себя водные мхи, преимущественно: турфаникъ и кукушкинъ ленъ; они, разрастаясь не только къ берегу, но и въ срединѣ озера, образуютъ моховыя массы, которыя вмѣстѣ съ водорослями периодически появляются на водѣ въ видѣ плавающихъ массъ и, затѣмъ, опускаются на дно воды; такимъ образомъ, по истеченіи болѣе или менѣе продолжительнаго времени на мѣстѣ воды является пропитанная этой послѣдней, непокрытая ею моховая масса, способная производить растенія любящія сырость, напр. осоки, верескъ, багульникъ, клюкву, голубику, пушицу, а также иву, ольху, березу, карликовую сосну, которыя, отживая ежегодно въ извѣстной части, довершаютъ образование торфяной массы. Въ водахъ, содержащихъ извести, въ образованіи торфа вмѣсто водяныхъ мховъ участвуютъ злаковыя и плавающія водяныя водорастенія. Отъ береговъ, гдѣ вода мельче, озеро начинаетъ заростать нынѣ злаками (манникомъ, вѣвникомъ), рогозомъ, аиромъ, касатиономъ; когда же растенія повысятъ нѣсколько дно массой отжившихъ растеній, тогда являются плавающія растенія (уруть, болотникъ, хвостникъ, лютикъ), за которыми, возвышенное этили послѣдними растеніями дно заселяется ежеголовкой, частухомъ, стрѣлолистомъ, камышами и, наконецъ, съ новымъ еще возвышеніемъ дна, появляются осока и пушица, которыя оканчиваютъ образование

торфяной массы, подвигающееся въ томъ же порядкѣ въ срединѣ озера и, наконецъ, затягивающее его совершенно.

На мѣстахъ непокрытыхъ такими растеніями, какъ верескъ, бѣлоустъ, водяные мхи (турфаникъ), стелющаяся по землѣ карликовая сосна, и др. которыя, заселяя большія пространства сплошь, образуютъ далеко распространяющіяся корневые развѣтвленія, или своими стеблями, вѣтвями и листьями до того укрываютъ почву, что въ этой послѣдней совершенно преграждается доступъ согревающихъ солнечныхъ лучей; вслѣдствіе же этого вода, поглощаемая сильно такимъ растительнымъ покровомъ, удерживается также сильно этимъ послѣднимъ и почвой. Поглощеніе и задержаніе воды увеличивается, по мѣрѣ накопленія продуктовъ разложенія отживающихъ растений и опадающихъ частей растенія. Съ накопленіемъ влаги въ избытокъ усиливаются условія благоприятныя для произрастанія торфяныхъ растеній, а вмѣстѣ съ тѣмъ обезпечиваются образованіе и накопленіе торфа.

Смотря по преобладанію въ торфяной растительности ситовико-выхъ растеній или водяныхъ мховъ, вереска и брусничныхъ растеній между торфяными болотами различаютъ: *зеленый* (дубовый) и собственно *торфяной* (иначе: моховый, вересковый, глубокий). Первые съ менѣе глубокой торфяной массой, иногда даже походящей болѣе на плавотый перегной, встрѣчаются по берегамъ или въ ближайшемъ соседствѣ съ водами, содержащими углекислую извести, и образуются обыкновенно въ широкихъ, часто заливаемыхъ водой рѣчныхъ долинахъ или низменностяхъ съ песчавой или хрящавой подпочвой, постоянно пропитываемой рѣчной или озерной водой, а иногда въ озерахъ. Окончательно образовавшіяся, они главнымъ образомъ производятъ осоки, къ которымъ лишь въ небольшомъ количествѣ примѣшиваются: пушица, мытникъ, камышъ, ситники, манникъ обыкновенный, ятрышникъ болотный, хвощъ вѣтвистый; но турфаника (водянаго мха) не встрѣчается на нихъ; вмѣсто же него они нѣрѣдко затгиваются между осоками сучиковыми мхами. Вторые, собственно торфяныя болота образуются, главнымъ образомъ, въ котловинныхъ долинахъ, провалахъ и старыхъ кратерахъ, какъ гористыхъ, такъ и низменныхъ странъ. Дно ихъ глина или хрящъ и песокъ, подъ которыми залегаетъ глина. Они обыкновенно далеки отъ углекислой извести. Воду они получаютъ изъ атмосферы или ключей; она протекаетъ въ нихъ издалека или же поднимается съ глинистаго дна и собирается въ срединѣ котловины, откуда, и начинается обыкновенно разрастаніе торфяныхъ растеній между которыми первыми являются водяные мхи, а за ними слѣдуютъ уже другія растенія въ объясненномъ выше порядкѣ.

Разложениіе торфяныхъ растений начинается при полномъ доступѣ воздуха и обыкновенной температурѣ, на поверхности воды; но, когда они опускаются подъ воду, то оно продолжается при ограниченномъ доступѣ воздуха, даже въ отсутствіи его, подъ значительнымъ давленіемъ водяной массы и, вслѣдствіе того, при содѣйствіи возвышенной температуры; такъ что растительная масса отчасти обуславливается и образуетъ, наконецъ, *торфъ* — углистую массу, проникнутую смолистымъ веществомъ (*батуменомъ*).

При превращеніи растительной массы въ *торфъ* образуется весьма сходная съ геиновой *торфяная кислота*. Растительная масса превращается въ совершенную торфяную массу не вдругъ, а постепенно, и потому имѣется на различныхъ ступеняхъ превращенія въ настоящую торфяную массу.

Смотря по болѣе или менѣе совершенному превращенію растительной массы въ *торфъ*, по внѣшнему виду и строенію торфяной массы и, наконецъ, по роду растений послужившихъ, главнымъ образомъ, къ образованію торфяной массы, различаютъ слѣдующіе виды этой послѣдней: *моховой, луговой, вересковой, листовой или лѣсной, и морской или изъ одорослей торфы*, въ которыхъ болѣе или менѣе различимы еще растительные остатки, и *пылеватый, смолистый, иловатый (баггерторфъ торфы), торфяной смолистый уголь и купоросный торфъ*, въ которыхъ растительные остатки уже болѣе не различимы.

Торфяныя массы нерѣдко заключаютъ *сѣрнистое желѣзо*, какъ продуктъ раскисленія разлагающагося растительной массой заключающагося въ торфяной же массѣ, иногда въ весьма большомъ количествѣ (*купоросный торфъ*), *желѣзнаго купороса, гипса, глауберовую соль, квасцы, горькую соль* — все сѣрнокислыя соли, образующіяся изъ сѣрной кислоты, какъ продукта окисленія сѣрнистаго желѣза и извести, магнезій, натра, кали, приносимыхъ къ торфяникамъ водой, *фосфорнокислую закись-окись желѣза и углекислую известь*, выдѣляющуюся мѣстами весьма обильно изъ водъ, притекающихъ въ торфяники.

Картина участія растенія въ образованіи почвы была бы неполна, если бы мы не упомянули здѣсь еще объ *охраняющемъ дѣйствіи* растительности въ отношеніи почвы. Растенія какъ травянистыя, такъ и деревнистыя, въ особенности же первые, связываютъ своими корнями мелкія земляныя части, препятствуя такимъ образомъ перемѣщенію ихъ водой и вѣтромъ, какъ это такъ наглядно доказываютъ гористыя мѣстности, въ которыхъ почва, лишенная такой защиты, сносится съ возвышенныхъ и покатыхъ мѣстъ водой (размывается) и вѣтромъ. Растенія, покрывающія почву, значительно умѣряютъ удары выпадающей дождевой воды и, въ особенности древесныя (лѣса), задерживаютъ движеніе воды и вѣтры.

Съ появленіемъ растений на землѣ сдѣлалась возможной животная жизнь; въ растительной массѣ явившееся на землѣ вслѣдъ за растеніемъ животное нашло пищу, и тѣмъ судьба его тѣсно связалась съ почвой, производящей растенія. Но животное, поставленное въ зависимость отъ почвы черезъ посредство растенія, неосталось и неостается само безъ вліянія на почву. Во время жизни, многія изъ животныхъ, напр. кроль, личинки и гусеницы насекомыхъ, дѣлаютъ ходы въ землѣ, слѣдовательно открываютъ почву болѣе доступу воздуха и воды. Кроме того животныя принимаютъ къ почвѣ свои изверженія и другія отбрасываемыя ими части своего организма, какъ напр. кожицы, волоса, рога и т. д.

Но, еще болѣе органическаго вещества принимаютъ животныя къ почвѣ послѣ своей смерти, когда цѣлые организмы ихъ дѣлаются почвообразовательнымъ матеріаломъ. И въ этомъ отношеніи болѣе важны какъ разъ самыя малыя животныя, такъ называемыя наливочныя (инфузоріи), которыя образовали въ прежнее время цѣлыя горныя породы — *мѣлъ*; въ настоящее же время принимаютъ особенное участіе въ образованіи *согрь* при впаденіи рѣкъ съ прѣсной водой въ моря съ соленой водой. Отъ смѣшенія этихъ водъ одинаково терпятся условія, благоприятныя для жизни какъ морскихъ, такъ и рѣчныхъ животныхъ, съ временными (діатомей) и известковыми (политаламій) панцирями, которыя, при своей микроскопической величинѣ, массами примѣшиваются къ воднымъ осадкамъ этихъ мѣлъ въ видѣ иловатыхъ частей. За наливочными животными слѣдуютъ раковины и кораллы, которые въ прежнее время принимали весьма сильное участіе въ образованіи почвы, какъ свидѣлствуютъ многія водныя горныя породы, напр. пласты раковиннаго известняка; въ настоящее же время это участіе слабѣе, но тѣмъ не менѣе весьма значительно, если мы примемъ во вниманіе коралловые острова, морскіе и береговые намывы, состоящіе преимущественно изъ обломковъ раковинъ, какъ напр. на Арбатской стрѣлкѣ со стороны Азовскаго моря и т. д.

Животные организмы, какъ почвообразовательный матеріалъ, доставляютъ: во-первыхъ, — органическое вещество, сравнительно болѣе богатое азотомъ, чѣмъ растительное, а потому разлагающееся, при равенствѣ всѣхъ другихъ условій, скорѣе, чѣмъ послѣднее, хотя и въ конечныхъ продуктахъ разложенія дающее, какъ и растительное, углекислоту, воду и амміакъ или азотную кислоту. Во-вторыхъ — зольныя составныя части, которыя образуютъ, главнымъ образомъ, костякъ вышшихъ животныхъ и раковины, панцири (скорлупа) низшихъ животныхъ, и которыя, смотря поэтому различію ихъ происхожденія, состоятъ, главнымъ образомъ, или изъ фосфорнокислой извести (кости вышшихъ животныхъ) или изъ углекислой извести

(раковины и панцири некоторых низших животных — политалий) или, наконец, из кремнезема (панцири других низших животных — диатомей). Такъ, большая часть фосфорнокислой извести многих пластовых породъ, напр. нашего саморода, весьма вероятно, происходитъ изъ костяковъ жившихъ въ прежнее время животныхъ и погибшихъ, при переворотахъ, постигавшихъ нашу планету. Участіе, которое могутъ принимать животныя органическія вещества, образующія въ различномъ состояніи своего разложенія также перегной, въ разрушеніи горныхъ породъ, а слѣдовательно и въ измѣненіяхъ почвы, явствуетъ изъ того, что мы сказали объ этомъ по поводу растительнаго органическаго вещества.

Въ животныхъ и растеніяхъ дано было пищевое условіе человѣческой жизни. Животныя и растенія связали явившагося на землѣ за ними человѣка неразрывной цѣпью съ почвой, которую человѣкъ сталъ перемѣщать, выравнивая ее подъ свои дороги, добывая изъ недръ земли, напр., бурый уголь, сталъ раздѣлывать, освобождая ее отъ покрывающихъ ее воды, камней, растеній; сталъ измѣнять осушквой, примѣсью къ ней различныхъ веществъ, удобреніемъ и обработкой. Такимъ образомъ, человѣкъ какъ бы завершаетъ дѣло образования почвы, которая, вѣдь уже измѣняется мало замѣтнымъ образомъ въ теченіи человѣческой жизни.

Главные (ближайшія) составныя части почвы.

Разсмотрѣніе образованія почвы позволяетъ намъ указать на слѣдующія главные составныя части почвы, опредѣляющія вмѣстѣ съ строеніемъ почвы физическія свойства этой послѣдней.

I. Частицы крупнѣе иловатыхъ (преимущественно продукты механическаго разрушенія).

A. Минеральныя (камни, камешки, христы, песокъ).

1) Неизмѣняющіяся химически (кварцевыя).

2) Измѣняющіеся химически:

a) обломки сложныхъ горныхъ породъ:

a' — болѣе богатыхъ кремневой кислотой (гранита, трахита и т. д.);

b' — менѣе богатыхъ кремневой кислотой (базальта, гнейса и т. д.);

б) обломки простыхъ горныхъ породъ и минераловъ:

a' — силикатовыхъ и силикатовъ;

a'' — болѣе богатыхъ кремнеземомъ (полевыхъ шпатовъ, слюды и т. д.).

б'' — менѣе богатыхъ кремнеземомъ (роговой обманки, авгита и т. д.).

б' — углекислыхъ солей (известняка, известкового шпата, доломита, желѣзнаго шпата);

б'' — другихъ минераловъ (гипса, апатита, и т. д.).

B. Растительныя и животныя остатки, неутратившіе еще своихъ организованныхъ формъ.

II. Иловатая часть (преимущественно продукты химическаго разрушенія).

A. Нерастворимыя въ водѣ:

1) Минеральныя: глина, осадившаяся изъ раствора некристаллическаго кремнезема, кремневая кислота, водная окись желѣза, углекислыя: известъ и магнезіа, фосфорнокислая известъ, фосфорнокислая окись желѣза и глиноземъ;

2) Перегнойныя вещества; частію перегнойныя соли со многими основаніями: амміака, извести, глинозема и т. д.

B. Вещества растворимыя, и бывшія въ растворѣ, но осадившіяся изъ раствора и нерастворенныя по недостатку воды (гипсъ и другія соли).

Между болѣе крупными и иловатыми частицами, какъ мы уже видали, нѣтъ рѣзкой границы: самыя мелкіе продукты механическаго разрушенія горныхъ породъ и минераловъ, преимущественно кварца, примѣшиваются къ иловатымъ, отъ которыхъ отдѣленіе первыхъ механически весьма трудно, даже невозможно. Различеніе всѣхъ названныхъ составныхъ частей почвы даже вооруженнымъ глазомъ простирается не далѣе отдѣлимыхъ отъ иловатой части отлучиваніемъ; между тѣмъ какъ для опредѣленія различныхъ свойствъ почвы весьма важно знать, какой химической природы вещества и въ какомъ количествѣ участвуютъ въ составѣ иловатой части, такъ какъ этимъ въ значительной степени опредѣляется вліяніе этой части на свойства почвы, въ противоположность болѣе крупнымъ частицамъ, которыхъ вліяніе на свойства почвы опредѣляется, главнымъ образомъ, ихъ величиной.

Болѣе важно опредѣленіе количества органическихъ (перегнойныхъ) веществъ, окисловъ желѣза и марганца, углекислыхъ извести и магнезіи и осадившейся изъ раствора (некристаллической) кремневой кислоты, какъ въ почвѣ вообще, такъ въ иловатой части въ особенности.

О присутствіи органическихъ частицъ въ почвѣ можно еще судить до известной степени по цвѣту почвы, которая тѣмъ темнѣе, чѣмъ больше такихъ веществъ въ почвѣ. Для опредѣленія же вѣсваго ихъ количества въ почвѣ, необходимо проклатить предварительно сильно просушенную почву (напр. въ количествѣ 100 граммовъ или 20 золотниковъ) на углѣхъ въ глиняномъ или желѣзномъ сосудѣ въ теченіи часа; при чемъ органическія вещества сгораютъ.

Но, вмѣстѣ съ исчезновеніемъ органическихъ веществъ выделяется изъ почвы и вода. Бывшая въ ней въ химическомъ соединеніи съ нѣкоторыми веществами (напр. въ водныхъ силикатахъ, едвойной окиси желѣза, водномъ глиноземѣ, гипсѣ, и т. д.) и углекислота углекислыхъ извести и магнезій, если онѣ также находятся въ почвѣ; а потому потеря, которую претерпѣваетъ почва при прокаливаніи, являющаяся съ высочайшимъ количествомъ содержащихся въ почвѣ органическихъ веществъ, не всегда болѣе или менѣе превосходить его. Тѣмъ не менѣе въ виду затруднительности болѣе точнаго опредѣленія содержанія органическихъ веществъ въ почвѣ, достигаемаго только для болѣе точнаго химическаго анализа, можно довольствоваться указаннымъ способомъ для приблизительнаго опредѣленія ихъ содержанія, тѣмъ болѣе что, какъ мы увидимъ ниже, химически соединенная вода, по отношенію къ нѣкоторымъ весьма важнымъ свойствамъ почвы, имѣетъ отчасти одинаковое значеніе съ органическими веществами, а углекислыхъ солей извести и магнезій въ почвѣ большей частью не много. Потера въ 2,5 грамма ($\frac{1}{2}$ золоти.), при прокаливаніи 100 грамм. (20 золоти.) почвы, показываетъ слабое въ 2—2½%, въ 5 грамм. (1 золоти.)—среднее въ 4—5% и въ 10 грамм. (2 золоти.)—богатое въ 8—10% содержаніе въ почвѣ органическихъ веществъ. Впрочемъ, эта потеря бываетъ въ нашихъ черноземныхъ почвахъ въ 20%, при чемъ, однако, около $\frac{1}{3}$ этого количества и болѣе принадлежитъ химически соединенной водѣ.

Все количество органическихъ веществъ, находящееся въ почвѣ, распределяется различно въ различныхъ почвахъ между частицами различной крупности. Наибольшая часть ихъ, однако, находится болѣе обыкновенно между иловатыми частями.

Послѣ прокаливанія, почвы получаютъ, большей частью, красно-, ржаво-, буровато-красное окрашиваніе, происходящее отъ содержанія въ нихъ, въ особенности же между иловатыми частицами ихъ, различныхъ окисловъ желѣза и марганца въ различныхъ количествахъ: болѣе темное окрашиваніе—при содержаніи меньшаго количества окисловъ желѣза или большаго—окисловъ марганца. Количественное опредѣленіе различныхъ окисловъ этихъ металловъ въ почвѣ представляетъ задачу неразрѣшенную еще даже точнымъ химическимъ анализомъ.

Если 20 грамм. (или 2 лота) сухой почвы смочить такимъ количествомъ воды, чтобы изъ смеси вышла жидкая капля и прибавить, затѣмъ, къ этой послѣдней 5 грамм. ($\frac{1}{2}$ лота или полъ столовой ложки) соляной кислоты, то потому, произойдетъ ли при этомъ замѣтное вскипаніе или нѣтъ, можно судить о томъ, содержитъ ли почва известъ или нѣтъ. Почва, вскипающая при этомъ, содержитъ, по крайней мѣрѣ, 1% извести въ видѣ углекислой соли. Послѣ этого,

чтобы точнѣе судить о количествѣ содержащейся въ почвѣ извести, необходимо прибавить еще нѣсколько воды и поставить смесь на $\frac{1}{2}$ часа въ теплое мѣсто, а за тѣмъ небольшими количествами приливать къ ней нашатырнаго спирта до тѣхъ поръ, пока масса, послѣ сильнаго взмѣшанія, не обнаружитъ непроходящаго пролипающаго запаха. Тогда выливаютъ все это на фильтръ изъ пропускной (печатной) бумаги и къ прошедшей сквозь фильтръ свѣтлой жидкости, которая содержитъ въ растворѣ все количество находившихся въ почвѣ извести и магнезій въ видѣ углекислыхъ солей, приливаютъ немного раствора поташа (углекислаго кали), отъ котораго жидкость мутнѣетъ и выделяетъ бѣлый иловатый осадокъ. Въ большей части случаевъ, особенно же для опредѣленія относительнаго содержанія извести и магнезій въ различныхъ почвенныхъ образцахъ, достаточно дать отстояться мутнымъ жидкостямъ и затѣмъ сравнить на глазъ между собой количества образовавшихся осадковъ. Для опредѣленія же количества извести и магнезій, содержащихся въ данномъ почвенномъ образцѣ, необходимо собрать образовавшійся осадокъ на фильтръ, промыть его, высушить и взвѣсить.

Еслибы нужно было опредѣлить порознь количества содержащихся въ почвѣ извести и магнезій, то вмѣсто раствора поташа приливаютъ къ свѣтлой жидкости, прошедшей сквозь фильтръ послѣ прибавленія нашатырнаго спирта, растворъ щавельной кислоты, которая осаждаетъ одну только известъ. Въ свѣтлой же жидкости, сѣженной съ щавельнокисло-известковаго осадка, можно опредѣлить магнезій прибавленіемъ нѣсколькихъ капель раствора фосфорно-кислаго амміака или фосфорнокислаго натра и сильнымъ затѣмъ встряхиваніемъ; если при этомъ сейчасъ же образуется сѣроватобѣлый осадокъ, то магнезій содержится въ изслѣдуемомъ образцѣ въ большомъ количествѣ; въ небольшомъ же—, если муть появляется лишь спустя долгое время и послѣ нѣсколько разъ повтореннаго встряхиванія. Известъ и магнезій находятся въ почвѣ въ весьма различныхъ количествахъ между частицами различной крупности; между болѣе крупными въ видѣ песка или хряца—обломковъ известниковъ, коралловъ, известковаго шпата, доломита, между мелкими; иловатыми частицами—въ видѣ весьма мелко раздѣленной углекислой извести или магнезій, примѣрно въ состояніи просушеннаго осадка, который образуется при прибавленіи раствора поташа и о которомъ мы говорили выше.

Осадившуюся изъ раствора, некристаллическую кремневую кислоту можно опредѣлить, если 10—15 грамм. (около 1 лота) хорошо промытаго и просушеннаго остатка почвы, послѣ обработки ея соляной кислотой, прокипятить въ теченіи $\frac{1}{2}$ часа съ довольно крѣпкимъ растворомъ углекислаго натра съ прибавленіемъ небольшого

ности, будетъ чрезвычайно различенъ; онъ будетъ тѣмъ больше, чѣмъ больше почва содержитъ минеральныхъ частицъ и между этими послѣдними песчаныхъ (силикатовыхъ, доломитовыхъ, известково-вошпатовыхъ, кварцевыхъ). Почва, при удѣльномъ вѣсѣ ея свыше 2,5—содержитъ много хрящевыхъ, песчаныхъ частицъ, отъ 2 до 2,5—много иловатыхъ и между ними глинистыхъ частицъ, и менѣе 2,0—много перегнойныхъ частицъ.

Но, если взять кубическій футъ почвы удѣльнаго вѣса, напр., 2,512, то онъ будетъ вѣсить не 173,7 фунта или въ 2,512 раза больше чѣмъ куб. футъ воды, а всего напр. 73,3 при рыхлой или 96,5 фунт. при плотной насыпкѣ почвы въ мѣру; что происходитъ отъ того, что почва не выполняетъ вполне занимаемаго ею объема, но, по причинѣ своей скважности, какъ мы видѣли, образуетъ промежутки между частицами. По этому действительный *объемный весъ* почвы будетъ различенъ тѣмъ болѣе отъ того, который бы имѣлъ объемъ почвы, наполненный частицами почвы безъ промежутковъ между ними, чѣмъ болѣе пространство промежутковъ, а это послѣднее тѣмъ болѣе, чѣмъ мельче и круглѣе частицы и чѣмъ плотнѣе онѣ лежатъ; такъ что одно и то же вѣсовое количество одной и той же почвы можетъ занимать болѣе или менѣе объемъ, смотря потому будутъ ли частицы этой почвы лежать рыхлѣе или плотнѣе, какъ это показываетъ замѣчаемое уплотненіе разрыхленной почвы или, какъ въ этомъ можно убѣдиться, взвѣсивъ почву, насыпанную въ одинъ и тотъ же объемъ болѣе или менѣе рыхло. Количество почвы, которое было бы необходимо для выполненія скважинъ, оставляемыхъ почвой въ единицѣ объема напр. въ куб. футѣ, будучи выражено въ процентахъ абсолютнаго вѣса почвы, который выполнялъ бы тотъ же объемъ безъ скважинъ, даетъ мѣру скважности почвы.

Величина и форма (строеніе почвы), удѣльный вѣсъ и цвѣтъ частицъ вмѣстѣ съ химической природой ихъ, преимущественно же иловатыхъ, опредѣляютъ, главнымъ образомъ, другія физическія свойства почвы или *отношеніе* почвы къ обработкѣ ея орудіями въ водѣ, газамъ и теплотѣ.

Частицы почвы пристають одна къ другой болѣе или менѣе сильно въ зависимости отъ величины, формы и химической природы ихъ; такъ что нужно большее или меньшее усиліе, чтобы оторвать ихъ одна отъ другой. *Сцепленіе* почвы (обыкновенно хотя и невѣрно называемое плотностью) измѣняется усиліемъ, которое необходимо для разведенія частицъ ея, напримѣръ грузомъ, который действуя на одинъ конецъ рычага, вращающагося другимъ концемъ около неподвижной оси, заставляетъ долотце, увѣренное въ рычагѣ на шарнирѣ, ближе къ вращающемуся на оси концу, раздавить опредѣленныхъ размѣровъ кирпичекъ, сдѣланный изъ почвы. Сцеп-

леніе почвы тѣмъ менѣе, чѣмъ мельче ея частицы; чѣмъ болѣе удаляются они отъ шарообразной формы и приближаются къ пластинчатой, чѣмъ болѣе между ними глинистыхъ и чѣмъ меньше перегнойныхъ, известковыхъ и въ особенности песчаныхъ частицъ. Сцепленіе увеличивается съ увеличеніемъ влажности почвы; вода какъ бы склеиваетъ частицы почвы, къ тому же, какъ можно думать наиболѣе сильно глинистыя, гораздо слабѣе известковыя, еще слабѣе перегнойныя и наиболѣе слабо песчанныя.

Частицы почвы прилипають не только одна къ другой, но и къ другимъ твердымъ тѣламъ, напримѣръ дереву и желѣзу. *Прилипаніе* почвы, какъ называютъ это свойство почвы, измѣняется грузомъ, который, будучи положенъ на одну чашку вѣсовъ, отрываетъ опредѣленной поверхности деревянную или желѣзную пластинку, подвѣшенную къ другой чашкѣ вѣсовъ, отъ поверхности смоченной почвы. Почва прилипаетъ сильнѣе къ дереву, чѣмъ къ желѣзу, въ особенности полированному, и прилипаетъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ влажнѣе она, чѣмъ мельче ея частицы и чѣмъ болѣе между этими послѣдними глинистыхъ, а послѣ нихъ известковыхъ и перегнойныхъ, и чѣмъ меньше песчаныхъ.

Сцепленіе и прилипаніе почвы весьма важны для хозяина, потому что ими опредѣляются различныя количества животной силы, которыя необходимы для одинаковой обработки разныхъ почвъ; послѣднимъ же изъ нихъ обуславливается преимущество металлическихъ действующихъ частей орудія передъ деревянными.

Сила притяженія действуетъ не только между частицами почвы и между ними и твердыми тѣлами, но и между ними и капельножидкими и газообразными тѣлами. Почва приходитъ въ соприкосновеніе съ капельножидкой водой двоякимъ образомъ: или сверху или снизу. Въ первомъ случаѣ, вода, проникая въ почву, опускается по скважинамъ, увлекаемая силой тяжести, сравнительно быстро по тѣмъ изъ нихъ, которыя крупнѣе волосныхъ трубокъ и могутъ быть названы скорѣе щелями, и сравнительно медленнѣе по тѣмъ, которыя имѣя разныя волосныхъ трубокъ *), задерживають въ себѣ воду. Во второмъ случаѣ вода, проникая въ почву, поднимается въ ней, различно быстро, но только по скважинамъ, имѣющимъ разныя волосныхъ трубокъ. Вода, поднявшая разъ въ волосныя скважины почвы, можетъ удалиться изъ нея: совсѣмъ не иначе, какъ вслѣдствіе испаренія; отчасти же внѣшнимъ давленіемъ, вслѣдствіе котораго пространство волосныхъ скважинъ уменьшается до того, что не въ состояніи болѣе выщипать прежнее количество воды, почему часть

*) Пространства между частицами почвы, конечно, не образуютъ правильныхъ, цилиндрическихъ волосныхъ трубокъ.

этой последней должна выступить изъ почвы. Такъ это бываетъ при промерзании влажной почвы, когда вода, наполняющая скважины почвы, замерзая и увеличиваясь въ объемѣ, производитъ давленіе на окололежащія части почвы, въ которыхъ частицы, вслѣдствіе этого, сближаются между собой до того, что почва, послѣ оттаиванія, не впитываетъ въ себя уже болѣе того количества воды, которое вмѣстало до замерзання, и часть заключавшейся въ ней воды выдѣляется изъ нея. Свойство почвы задерживать въ своихъ волосныхъ скважинахъ известное количество воды называется *влагоемкостью* (капиллярностью) почвы и выражается числомъ, которое показываетъ, сколько процентовъ вѣса сухой почвы составляетъ наибольшее количество воды, которое можетъ задержать почва въ своихъ волосныхъ скважинахъ. Вода же, задержанная въ волосныхъ скважинахъ почвы, называется *волосной* (капиллярной). Свойство почвы принимать въ себя и пропускать сквозь себя болѣе или менѣе быстро воду называется *проницаемостью* почвы, а свойство почвы поднимать воду болѣе или менѣе высоко съ той или другой быстротой отличаютъ названіемъ собственно *волосности* (капиллярности) почвы, которая измѣряется наибольшей высотой, на которую поднимается волосная вода въ почвѣ. На эти свойства почвы имѣютъ влияние, главнымъ образомъ, общее пространство скважинъ и ихъ размѣры; такъ что влагоемкость почвы будетъ тѣмъ больше и почва будетъ тѣмъ выше поднимать волосную воду, чѣмъ болѣе въ почвѣ волосныхъ скважинъ, другими словами, чѣмъ болѣе въ ней мелкихъ частицъ; къ тому же—чѣмъ болѣе размѣра волосныя скважины, иначе чѣмъ рыхлѣе лежатъ частицы почвы въ первомъ и, напротивъ, чѣмъ меньшаго размѣра волосныя скважины почвы, иначе чѣмъ плотнѣе лежатъ частицы почвы во второмъ случаѣ. Свойство же быстро проникаться водой и пропускать ее сквозь себя тѣмъ болѣе у почвы, чѣмъ болѣе въ ней неволосныхъ скважинъ, иначе чѣмъ болѣе въ ней песчаныхъ и хрящевыхъ частицъ; свойство же быстро поднимать волосную воду тѣмъ сильнѣе у почвы, чѣмъ менѣе въ ней неволосныхъ скважинъ, иначе чѣмъ болѣе въ ней мелкихъ частицъ; оба же свойства тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе размѣры волосныхъ скважинъ, иначе чѣмъ рыхлѣе лежатъ мелкія частицы. Какое влияние на эти свойства имѣетъ химическая природа частицъ пока еще неясно; известно лишь, что почва съ увеличеніемъ содержанія въ ней перегной, землистой углекислой извести, глины, гидрата окиси желѣза, растворимой въ углекисломъ натрѣ кремневой кислоты, съ одной стороны пріобрѣтаетъ большую влагоемкость и выше поднимаетъ волосную воду, съ другой—труднѣе проникается водой и медленнѣе поднимаетъ волосную воду. При низкой температурѣ почва, весьма вѣроятно, поднимаетъ волосную воду выше, хотя въ то же время медленнѣе, чѣмъ при высокой.

Силою волосности вода можетъ подниматься только въ волосныхъ скважинахъ почвы; въ неволосныхъ же она поднимается только давленіемъ снизу, при стремленіи воды подняться въ почвѣ на такую же высоту, съ какой она притекаетъ въ нижнія части почвы, по закону уровней жидкости въ сообщающихся сосудахъ. Такая вода, удерживающаяся въ неволосныхъ скважинахъ почвы давленіемъ снизу, называется *нажимной* (гидростатической) водой. Вода, поднимавшаяся въ почвѣ до известной высоты какъ нажимная, можетъ подниматься выше волосностию какъ волосная вода.

Въ силу притяженія газовъ частицами почвы, первые сгущаются на поверхности послѣднихъ и сгущаются тѣмъ въ большемъ количествѣ, чѣмъ болѣе эта поверхность. Общая же поверхность частицъ тѣмъ болѣе, чѣмъ скважистѣе почва, чѣмъ меньше ея частицы; по этому свойство *поглощать газы и сгущать ихъ* наиболѣе сильно у наиболѣе скважистыхъ почвъ. При такомъ сгущеніи газы занимаютъ иногда, весьма вѣроятно, во много разъ (въ 50 разъ) меньшіе противъ прежнихъ объемы и находятся въ состояніи, которое намъ ближе неизвѣстно, но въ которомъ они должны весьма усиленно дѣйствовать на разрушеніе, выветриваніе частицъ почвы, особенно при содѣйствіи теплоты, развивающейся въ довольно значительной степени при такомъ сгущеніи ихъ; такъ, при одномъ наблюденіи поглощенія водянаго газа почвой, которая содержала много перегнойныхъ веществъ, замѣчено было повышеніе температуры почвы съ 20 на 30° Ц. въ теченіи нѣсколькихъ минутъ. Кромѣ мелкости частицъ, поглощеніе газовъ почвой, т. е. количество того или другаго газа, которое поглощается почвой, зависитъ: а) отъ химической природы газа и частицъ почвы, такъ какъ поглощеніе газовъ почвой есть слѣдствіе не только поверхностнаго притяженія частицъ почвы къ газамъ, но и химическаго соединенія газовъ съ частицами почвы, напр. кислорода съ способными къ дальнѣйшему окисленію закисными тяжелыхъ металловъ или перегнойными веществами, амміака съ перегнойными кислотами и т. д. б) Отъ состоянія влажности почвы; газы поглощаются весьма слабо почвой, если эта послѣдняя совершенно суха или вполнѣ насыщена влагой. Вода (1 объемъ) сама по себѣ растворяетъ газы, въ особенности сильно амміакъ (300 объемъ.), затѣмъ углекислоту (1), кислородъ (0,037), азотъ (0,018); да кромѣ того ея присутствіе необходимо для процессовъ окисленія; при совершенномъ же выполненіи ею скважинъ почвы, она препятствуетъ болѣе полному доступу газовъ къ почвеннымъ частицамъ. в) Отъ температуры почвы; поглощеніе усиливается съ пониженіемъ температуры. Этими, можетъ быть, отчасти объясняется благотворное влияние на почву холоднаго времени.

Свойство почвы поглощать водяной газъ, водяные пары отли-

тѣмъ въ объемѣ значительно меньше глины. Изъ такого различнаго, отношенія землистой углекислой извести и глины къ водѣ объясняется, почему мергель—глина, содержащая большее или меньшее количество извести, распадается на воздухъ при высыхании. Уменьшеніемъ объема почвы при высыхании объясняется, почему глинистыя и черноземныя почвы образуютъ трещины при высыхании. Свойство почвы *уменьшать объемъ*, вслѣдствіе высыхания, выражается числомъ, которое показываетъ, на сколько процентовъ уменьшился при высыхании первоначальный объемъ влажной почвы.

Наконецъ, отношеніе почвы къ теплотѣ опредѣляется, главнымъ образомъ, свойствомъ поверхности ея: цвѣтомъ, гладкостью и удѣльнымъ вѣсомъ ея частицъ. Чѣмъ темнѣе цвѣтъ почвы и чѣмъ шероховатѣе поверхность почвы, тѣмъ сильнѣе поглощаются этой послѣдней солнечныя лучи; чѣмъ больше въ почвѣ частицъ большаго удѣльнаго вѣса, тѣмъ скорѣе нагревается почва, иначе—тѣмъ болѣе ея *теплоемкость*, тѣмъ скорѣе проводитъ она тепло отъ поверхности въ глубь, иначе—тѣмъ болѣе ея *теплопроводность*. Первое свойство почвы выражается числомъ, которое показываетъ, по сколько разъ меньше единицъ тепла требуетъ почва сравнительно съ водою, при одномъ и томъ же вѣсѣ, для того чтобы нагрѣться отъ 0° до 100°. Второе выражается числомъ, которое показываетъ, черезъ какое время почва, нагреваемая у поверхности, повышаетъ температуру до известной степени на известной глубинѣ. Такъ какъ всякая почва содержитъ въ своихъ скважинахъ въ значительномъ количествѣ воздухъ, а нерѣдко и воду, которыхъ теплоемкость и теплопроводность весьма малы, то теплоемкость и теплопроводность почвы въ значительной степени будутъ опредѣляться количествами содержащихся въ нихъ воздуха и воды. Поэтому, чѣмъ болѣе воздуха содержитъ почва, иначе, чѣмъ скважистѣе она, слѣдовательно чѣмъ мельче частицы, изъ которыхъ она состоитъ, и чѣмъ влажнѣе она, тѣмъ труднѣе она нагревается, тѣмъ труднѣе проводитъ она теплоту въ глубь. Разъ поглощенная почвой теплота теряется ею снова, если она находится въ соприкосновеніи съ воздухомъ менѣе ея теплымъ; и теряется тѣмъ скорѣе, удерживается ею тѣмъ труднѣе, почва охлаждается тѣмъ скорѣе или *теплоудерживающая сила* почвы тѣмъ меньше, чѣмъ меньше теплоемкость и чѣмъ болѣе теплопроводность почвы или ея частицъ. Изъ этихъ же послѣднихъ (считая между ними воздухъ и воду) наибольшую теплоемкость и наименьшую теплопроводность имѣетъ воздухъ съ наименьшей плотностью, затѣмъ вода, перегной, землистая углекислая известь, глина и, наконецъ, наименьшую теплоемкость и наибольшую теплопроводность—песчанныя частицы наибольшаго удѣльнаго вѣса. Разницы въ согрѣваніи почвъ, происходящія отъ состоянія ихъ влажности и

поверхности, какъ показываютъ прямыя опыты, гораздо значительнѣе разницъ въ согрѣваніи ихъ, вслѣдствіе различной химической природы собственно ихъ частицъ.

Какъ согрѣваніе такъ и охлажденіе почвъ находится кромѣ того въ зависимости: а) отъ угла, подъ которымъ солнечныя лучи достигаютъ поверхности почвы и который существенно опредѣляется положеніемъ земнаго шара къ солнцу и, въ извѣстной меньшей степени, наклоненіемъ почвенной поверхности къ горизонту. Чѣмъ отвѣснѣе лучи солнца падаютъ на поверхность почвы, тѣмъ сильнѣе должны они согрѣвать эту послѣднюю; б) отъ температуры воздуха *) въ данное время; чѣмъ она выше или ниже сравнительно съ температурой почвы, тѣмъ почва скорѣе нагревается или охлаждается; в) отъ влажности почвы; чѣмъ влажнѣе почва, тѣмъ медленнѣе она будетъ обогрѣваться и не только вслѣдствіе большой теплоемкости воды, но и вслѣдствіе того, что вода испаряется и, испаряясь, поглощаетъ большое количество теплоты; г) отъ движенія воздуха—болѣе теплымъ нежели почва или болѣе холоднымъ, нежели она, токи воздуха согрѣваютъ (первыя) и охлаждаютъ (вторыя) почвы гораздо скорѣе, нежели воздухъ такой же температуры въ сравнительно покойномъ состояніи, потому что приводитъ въ соприкосновеніе съ почвой постоянно новыя массы болѣе теплаго или болѣе холоднаго воздуха; д) отъ состоянія неба; сильное при ясномъ небѣ излученіе теплоты ослабляется значительно облаками; е) отъ покрытія почвы дурными проводниками, напр. сѣномъ, подъ которымъ почва сохраняется болѣе теплой, чѣмъ безъ такого покрова.

Согрѣваніе и охлажденіе почвы оказываетъ значительное вліяніе на почву. Какъ первое ускоряетъ, такъ второе ослабляетъ химическіе процессы въ почвѣ и испареніе воды изъ почвы. Охлажденіе почвы можетъ вызвать ступеніе газообразной воды въ почвѣ въ капельножидкую, иначе образованіе *оутренней росы*, преимущественно въ верхнихъ слояхъ почвы, гдѣ происходятъ наибольшія колебанія температуры, въ особенности въ жаркомъ и сухомъ климатѣ, каковъ климатъ нашихъ степей, съ значительной разницей между температурой дня и ночи. Пониженіе температуры ниже нуля, заставляя замерзать воду, находящуюся въ скважинахъ почвы, и при этомъ расширять объемъ, способствуетъ разрыхленію плотныхъ глинистыхъ почвъ.

Если съ одной стороны согрѣваніе почвы имѣетъ вліяніе на ходъ химическихъ процессовъ въ почвѣ, то въ этихъ послѣднихъ, пре-

*) Температура воздуха сама зависитъ отъ температуры почвы, такъ какъ воздухъ согрѣвается весьма слабо непосредственно солнечными лучами; значительнѣе онъ нагревается лишь излучаемой изъ почвы теплотой.

преимущественно въ окисленіи перегнойныхъ веществъ, сторанин угле-
рода — главной составной части перегнойныхъ веществъ, почва
имѣетъ свой весьма значительный источникъ теплоты для своего
нагрѣванія. Перегной, содержащійся въ почвѣ только въ количествѣ
5% и разлагающійся ежегодно только въ $\frac{1}{10}$ своей части, въ со-
стояніи доставляетъ одной десятинѣ почвы, приблизительно, такое ко-
личество теплоты, котораго достаточно для того, чтобы нагрѣть
287000 фунтовъ воды отъ 0° до 100°. Отношенія почвы къ свѣту и
электричеству намъ мало известны.

Физическія свойства почвы могутъ быть *постоянными*, по кото-
рымъ различаются между собой различныя почвы, находящіяся въ
одинаковыхъ условіяхъ, или *измѣняющимися*, которыя можетъ имѣть
одна и таже почва, находясь въ различныхъ условіяхъ. Такъ, сѣпле-
ніе и влагоемкость глинистой почвы превосходятъ сѣпление и
влагоемкость песчаной почвы; это постоянныя сѣпление и влагоем-
кость глинистой и песчаной почвъ. Но сѣпление равно какъ и вла-
гоемкость глинистой почвы могутъ быть различны, смотря по со-
стоянію рыхлости и влажности глинистой почвы: излишне влажная
глинистая почва представляетъ большее сѣпление частицъ, чѣмъ
умѣренно влажная, а разрыхленная глинистая почва можетъ задер-
жать больше волосной воды, чѣмъ не разрыхленная; это измѣняю-
щіеся сѣпление и влагоемкость глинистой почвы.

Точно также, свойства почвы: задерживать столько-то волосной
или гигроскопической воды, поглощать сильно тотъ или другой
газъ, скоро нагрѣваться, не влекуть за собой необходимо того, что-
бы почва дѣйствительно содержала то количество воды, которое мо-
жетъ задержать по своей влагоемкости или гигроскопичности, чтобы
она дѣйствительно поглотила то количество газа, которое можетъ
поглотить, или дѣйствительно имѣла известную температуру. Физиче-
скія свойства, какъ мы видѣли, зависятъ отъ строенія почвы и ве-
личины, физическихъ и химическихъ свойствъ частицъ почвы; дѣй-
ствительное же состояніе почвы находится въ зависимости отъ раз-
личныхъ внѣшнихъ условій.

Слѣдующая таблица представляетъ числа, которыми выражаются
физическія свойства вышеприведенныхъ шести почвъ (см. стр. 114
и 115).

Задерживательная способность почвы.

Почва, приходя въ соприкосновеніе съ растворами различныхъ
солей, задерживаетъ изъ нихъ или кислоту и основаніе этой соли
вмѣстѣ, или только одно основаніе; изслѣдованіе этой весьма важной,
какъ мы увидимъ, способности почвы, названной *задерживательной*,

показала, что всѣ почвы: 1) въ меньшей или большей степени за-
держиваютъ основанія: кали, натръ, амміакъ, известь, магнезію, вы-
дѣляя изъ себя, на мѣсто задержанныхъ, другія основанія; такъ
напр. при задержаніи кали, выдѣляютъ на мѣсто его известь, маг-
незію и натръ; 2) различныя основанія задерживаются неодинаково
сильно почвой; такъ кали задерживается сильнѣе натра, извести или
магнезіи; почему, при болѣе сильномъ задержаніи кали, на мѣсто
его выдѣляется наиболѣе извести и магнезіи, менѣе натра; при бо-
лѣе слабымъ же задержаніи извести, на оборотъ на мѣсто ея
выдѣляется пѣз почвы наименѣе кали, болѣе магнезіи натра; 3) ко-
личество выдѣляемыхъ почвой основаній почти равно по хими-
ческому дѣйствию количеству задержаннаго вмѣсто ихъ основаній;
4) одно и то же основаніе задерживается ими неодинаково сильно изъ
соединенія съ различными кислотами; такъ, при одномъ изслѣдова-
ніи, наибольшее количество кали поглощено изъ соединенія его съ
фосфорной кислотой, за которой слѣдуютъ: углекислота, азотная
кислота, сѣрная кислота и наконецъ хлоръ; изъ соединенія съ этимъ
последнимъ поглощено наименьшее количество кали; 5) Основанія
никогда не задерживаются до совершеннаго поглощенія ихъ изъ
растворовъ; 6) изъ болѣе крѣпкихъ растворовъ почвы задержи-
ваютъ абсолютно больше, но процентно меньше, чѣмъ изъ болѣе сла-
быхъ растворовъ; иначе, послѣдніе растворы истощаются почвами
гораздо сильнѣе, чѣмъ первые; 7) изъ большого количества раство-
ра почва задерживаетъ основанія абсолютно больше, но процентно
меньше, чѣмъ изъ меньшаго количества раствора одинаковой крѣ-
пости; 8) почва, задержавшая нѣкоторое количество основанія изъ
раствора известной крѣпости, будучи приведена въ соприкоснове-
ніе съ болѣе крѣпкимъ, чѣмъ предыдущій, растворомъ того же осно-
ванія, задерживаетъ новыя количества этого послѣдняго; 9) задер-
жаніе основанія происходитъ такъ быстро, что продолжительность
соприкосновенія почвы съ растворомъ оказывается мало существен-
ной для задержанія; 10) изъ кислотъ почвы задерживаютъ фосфорную
и кремневую; сѣрной же и азотной кислотъ, равно какъ и хлора не
задерживаютъ; 11) въ отношеніи задержанія фосфорной кислоты
сохраняетъ полную силу сказанное относительно основаній въ 5,
6 и 9.

Задержанныя почвой основанія и кислоты могутъ быть снова
извлечены изъ почвы: даже чистой водой, хотя очень трудно, но го-
раздо легче водой, содержащей въ растворѣ углекислоту, или нѣко-
торыя соли, преимущественно амміачныя (сѣрноокислый амміакъ)
азотнокислый (азотнокислый натръ—чильскую селитру), поварен-
ную соль (хлористый натрій), а также перегнойнокислыя соли и т. д.
Къ тому же, при каждомъ послѣдовательномъ выщелачиваніи почвы,

Механический анализ почвъ.					Удельный вѣсъ почв.	Объемный вѣсъ (1 литра въ граммахъ) почвъ.		Связность почв. Количество воды, необходимое для полного смачивания, выраженное въ процентахъ абсолютнаго вѣса воды, который всасывается въ эту массу безъ сжатия.	
Какая почва.	100 частей почвы содержатъ частицъ.					Въ разломѣ состоянн.	Въ уплотненномъ состоянн.		
	Камней и валуновъ.	Грубого и средняго хвоща.	Песчаныхъ частицъ и мелкихъ хвоща.	Иловатыхъ частицъ.			Въ разломѣ состоянн.	Въ уплотненномъ состоянн.	Привъ уплотненномъ состоянн.
Черноземная	—	—	7,0	93,0	2,512	1060	1400	0,58	0,44
Подзолосуглинистая	—	—	1,5	91,8	2,577	960	1310	0,62	0,49
Подзолистая	—	—	0,1	18,8	2,604	1080	1400	0,59	0,47
Суглинистая	1,6	0,4	22,0	76,0	2,554	980	1330	0,61	0,48
Супесчаная	3,3	4,0	50,6	42,1	2,617	1200	1580	0,54	0,40
Песчаная	0,6	1,3	86,0	12,1	2,610	1430	1870	0,45	0,28

содержащей задержанныя вещества, всегда извлекается еще нѣкоторое количество этихъ послѣднихъ. Доказывающіе это опыты показываютъ въ тоже время, что если прилитіемъ воды или, что тоже, отнятіемъ части раствореннаго вещества разжидать растворъ той крѣпости, которую онъ имѣетъ послѣ задержанія изъ него известнаго количества раствореннаго вещества почвой, находящейся съ нимъ въ соприкосновеніи, то эта послѣдняя отдастъ раствору снова нѣкоторое количество задержаннаго вещества.

Почва задерживаетъ сказанныя основанія и кислоты главнымъ образомъ химически: основанія помощью водныхъ силикатовъ (цеолитовой части почвы) и перегнойныхъ кислотъ; фосфорную кислоту помощью окиси желѣза, глинозема, магнезій и извести, и кремневую кислоту помощью извести и глинозема. Водные силикаты (цеолиты) представляютъ собой двойныя кремнекислые соли изъ кремнекислаго глинозема съ одной и кремнекислыхъ: кали, натра, извести или магнезій и т. д. съ другой стороны, которые, при задержаніи почвой какаго либо основанія, принимаютъ это послѣднее во вторую свою часть на мѣсто другаго основанія, выступающаго изъ этой части цеолита въ растворъ и соединяющагося съ кислотой, при-

Степень почв. Для разн. при площади въ 1 кв. сантиметр, необходимо 0,10 граммовъ. Влагомкость почв. 100 въсовыхъ частей почвы удерживаютъ воды:	Волокнистость почв.					Гигроскопичность почв. 100 частей поч. въ поглотили				Уменьшеніе объема почв. при высыханіи. 100 объемовъ при высыханіи уменьшаются на	Темп- ер- ность почв.	
	Высота въ сантиметрахъ, на которую поднимается вода вслѣдствіе волокнистости почв.											
	черезъ.					черезъ.						
	6	12	24	48	72	6	12	24	48			
	Ча-	Ча-	Ча-	Ча-	Ча-	Ча-	Ча-	Ча-	Ча-			
	совъ.	совъ.	са.	совъ.	са.	совъ.	совъ.	са.	совъ.			
380	55,7	16,5	20,0	27,5	37,5	44,0	2,22	2,91	3,60	4,29	15,5	0,1870
170	52,8	18,0	22,0	29,0	39,0	46,0	1,52	2,03	2,54	3,05	4,0	0,1585
105	51,0	34,0	39,5	51,0	65,0	74,0	1,50	1,69	1,98	2,43	5,5	0,1467
120	48,4	21,0	25,5	34,0	43,0	49,0	1,26	1,68	2,10	2,52	7,3	0,1628
72	38,0	25,0	32,0	41,0	51,0	57,0	1,19	1,44	1,69	1,69	5,6	0,1246
20	33,2	27,0	30,0	35,0	39,0	41,0	0,34	0,34	0,34	0,34	0,7	0,1364

надлежащей задержанію основанію. Цеолитъ, содержащій, напр., во второй части кремнекислую известь, при задержаніи почвой кали изъ хлористаго кали, превращается въ цеолитъ съ кремнекислыми кали и известью во второй части, а въ растворъ на мѣсто задержаннаго кали переходитъ известь, соединяющаяся съ хлоромъ въ хлористую известь.

Перегнойныя кислоты (см. стр. 90) образуютъ нерастворимыя соединенія со многими основаніями, въ число которыхъ могутъ вступать задерживаемыя основанія на мѣсто другихъ, выделяющихся въ растворъ, такъ, напр. кали и амміакъ на мѣсто извести и магнезій. Впрочемъ, перегнойныя вещества участвуютъ въ задержаніи основаній сравнительно слабо, потому что ихъ содержится въ почвѣ обыкновенно не много. Фосфорная кислота образуетъ съ окисью желѣза, окисью глинозема, амміакомъ и магнезій вмѣстѣ и известью нерастворимыя въ водѣ соли фосфорнокислые: окись желѣза, глиноземъ, амміакъ-магнезію и известь точно также, какъ кремневая кислота съ известью и глиноземомъ, которые, въ случаѣ присутствія въ почвѣ въ достаточномъ количествѣ перегнойныхъ кислотъ, соединяются съ этими послѣдними предпочтительно предъ

кремневой кислотой; а потому чѣмъ больше почва содержитъ перегнойныхъ веществъ (торфяныя почвы), тѣмъ слабѣе задерживаетъ она кремневую кислоту.

Но кромѣ химическаго почва можетъ задерживать вещества изъ растворовъ и механическимъ путемъ, вслѣдствіе поверхностнаго притяженія частицъ ея къ раствореннымъ веществамъ. Такимъ образомъ могутъ задерживаться почвой вещества, вовсе незадерживаемыя ею химически, напр. хлоръ, серная кислота; хотя количества задерживаемыхъ такимъ образомъ веществъ сравнительно весьма малы.

Такъ какъ цеолиты, перегнойныя кислоты, окиси желѣза, глиноземъ, землистыя углекислыя известь и магнезія находятся преимущественно между мелкими частями, то понятно, что способность почвы задерживать вещества изъ растворовъ должна находиться въ некоторой зависимости отъ содержанія въ почвѣ мелкихъ, преимущественно иловатыхъ частей, хотя здѣсь, очевидно, нельзя ожидать полного соответствія, такъ какъ мелкія, иловатыя части могутъ быть, какъ мы видѣли, весьма различны по ихъ химической природѣ.

Слѣдующая таблица въ числахъ, относящихся къ известнымъ намъ уже шести почвамъ, дѣлаетъ еще болѣе наглядной задерживательную способность почвы.

100 граммовъ почвы:	П О Г Л О щ А Ю Т Ъ							
	Изъ 400 куб. сантим. раствора содержащаго 2,98 грм. $\text{KCl}^{*)}$ ($\frac{1}{10}$). K_2O .		Изъ 400 куб. сантим. раствора содержащаго 2,14 грм. NH_4Cl ($\frac{1}{10}$). NH_3 .		Изъ 400 куб. сантим. раствора содержащаго 4,88 грм. Na_2SiO_3 ($\frac{1}{10}$). SiO_2 .		Изъ 400 куб. сантим. раствора содержащаго 5,68 грм. Na_2HPO_4 ($\frac{1}{10}$). P_2O_5 .	
	Грам.	Проц.	Грам.	Проц.	Грам.	Проц.	Грам.	Проц.
Черноземной	0,4305	22,9	0,1643	24,0	1,02	42,50	0,478	17,07
Подзолосуглинистой .	0,2272	12,68	0,0544	8,0	0,60	25,00	0,240	17,14
Подзолистой	0,1520	8,10	0,0408	6,0	0,42	17,50	0,132	4,71
Суглинистой	0,2305	12,25	0,0680	10,0	0,62	25,83	0,210	15,00
Супесчаной	0,0364	1,94	0,0544	8,0	0,32	13,33	0,056	2,00
Песчаной	слѣ	ды	слѣ	ды	0,09	3,75	0,082	2,93

*) KCl —хлористый калий, K_2O —каль, NH_4Cl —хлористый аммоній, NH_3 —аммиакъ, Na_2SiO_3 —кремнекислый натръ, SiO_2 —кремневая кислота, Na_2HPO_4 —фосфорнокислый натръ и P_2O_5 —фосфорная кислота.

100 граммовъ суглинистой почвы поглощаютъ изъ раствора въ 1 литрѣ воды.							
$\frac{1}{10}$ вѣса атома соли K_2O .		$\frac{1}{10}$ вѣса атома соли K_2O .		$\frac{1}{20}$ вѣса атома соли K_2O .		$\frac{1}{10}$ вѣса атома соли K_2O .	
Грам.	Проц.	Грам.	Проц.	Грам.	Проц.	Грам.	Проц.
Изъ раствора углекислого калия . . .	—	—	0,6528	21,0	—	—	—
Изъ раствора сернокислого калия . . .	—	—	0,3520	19,36	—	—	—
Изъ раствора хлористого калия . . .	0,240	6,5	0,2305	12,25	0,1944	20,7	0,156
Изъ раствора азотнокислого калия . .	—	—	0,1920	10,67	—	—	—

Химическія свойства почвы.

Химическій анализъ, требующій специальныхъ химическихъ свѣдѣній, открываетъ въ составѣ почвы весьма много элементовъ (I группа *), соединенные, въ большей части случаевъ, съ однимъ изъ числа ихъ—кислородомъ, въ различные окислы (II группа), которые, затѣмъ, по невозможности дознать этого фактически, представляются, съ большей или меньшей вѣроятностію, соединенными между собой въ тѣ или другія соли (III группа), на основаніи известныхъ свойствъ элементовъ, окисловъ ихъ и солей, на основаніи свойствъ минераловъ и органическихъ веществъ, изъ которыхъ образуется почва, и на основаніи задерживательной способности почвы, изученной нѣсколько ближе лишь въ послѣднее время.

Вотъ болѣе важные элементы, открываемые химическимъ анализомъ въ составѣ собственно почвы и воды и воздуха, наполняющихъ скважины почвы, равно какъ предполагаемые въ этомъ же составѣ окислы и соли.

I. Элементы.	II. Соединенія элементовъ съ кислородомъ и другими элементами **).	III. Соли.
1) Металлы а) щелочей: Калий.	1) Основанія Калий.	Въ соединеніи съ кислотами: кремневой (кремнекислосое кали въ силикатахъ) обломковъ минераловъ и

*) Простыми тѣла, пока еще неразложенныя химически на дальнѣйшія составныя части.

**) Кислородъ не обозначенъ, другіе же элементы поименованы въ каждомъ частномъ случаѣ.

Натрій. б) щелочныхъ земель: Кальцій.	Натръ. Окись кальція (бѣлая известь).	горныхъ породъ, неолитахъ), перегнойными, соляной (хлористый натрій), стѣрной (стѣрнобислая кали) и угольной (углекислая кали — поташъ). кремневой (кремнекислый натръ въ силикатахъ обломковъ минераловъ и горныхъ породъ, цеолитахъ), перегнойными, соляной (хлористый натрій — поваренная соль), стѣрной (стѣрнобислый натръ — глауберова соль) и угольной (углекислый натръ — сода).
Магній. в) земель: Алюминій.	Окись магнія (бѣлая магнезія). Глиноземъ.	угольной (углекислая известь въ обломкахъ известняковъ и мергелей и въ землистомъ видѣ), стѣрной (стѣрнобислая известь въ обломкахъ гипса), кремневой (кремнекислая известь въ силикатахъ обломковъ минераловъ и горныхъ породъ, цеолитахъ), перегнойными, фосфорной (фосфорнокислая известь въ обломкахъ апатита и землистомъ видѣ) и соляной (хлористый кальцій). угольной (углекислая магнезія въ обломкахъ доломитовъ, известняковъ и мергелей и въ землистомъ видѣ), кремневой (кремнекислая магнезія въ силикатахъ обломковъ минераловъ и горныхъ породъ, цеолитахъ), перегнойными, фосфорной (фосфорнокислая магнезія), стѣрной (стѣрнобислая магнезія — английская, горькая соль), и соляной (хлористый магній).
а) тяжелые: Желѣзо.	а) Зависъ. б) Окись.	кремневой (кремнекислый глиноземъ въ глинахъ и силикатахъ обломковъ минераловъ и горныхъ породъ, цеолитахъ), перегнойными и фосфорной (фосфорнокислый глиноземъ). кремневой (кремнекислая въ силикатахъ обломковъ минераловъ и горныхъ породъ, цеолитахъ), перегнойными, стѣрной (стѣрнобислая закись желѣза, желѣзистый купоросъ), угольной (углекислая закись желѣза — желѣзистый шпатъ) и окисью желѣза (магнитный желѣзнякъ). перегнойными, фосфорной (фосфорнокислая окись желѣза) и кремневой (кремнекислая окись желѣза въ силикатахъ обломковъ минераловъ и горныхъ породъ, а также водой въ видѣ гидрата окиси желѣза).

Марганецъ. 2) Неметаллы: Бромій.	Зависъ и окись. 2) Кислоты. Бромная (кремнеземъ).	сопровождать большей частью желѣзо въ подобныхъ же соединеніяхъ какъ и желѣзо. въ соединеніи съ основаніями: поименованными выше въ силикатахъ обломковъ минераловъ и горныхъ породъ, цеолитахъ; или свободной въ кристаллическомъ (кварцъ) и не кристаллическомъ (аморфномъ), растворимомъ въ водныхъ растворахъ щелочей, состояніи.
Сѣра. Фосфоръ.	Сѣрная. Фосфорная.	поименованными выше; въ незначительныхъ, весьма рѣдкихъ случаяхъ свободной. поименованными выше, преимущественно: окисью желѣза, глиноземомъ, известью, а также, можетъ быть амміакомъ и магнезіей (фосфорнокислая амміакъ-магнезія).
Хлоръ. Углеродъ.	Хлористо-водородн. (соляная) — съ водородомъ. а) Угольная (какъ одинъ изъ конечныхъ продуктовъ разложения перегной).	поименованными выше, но преимущественно натромъ въ видѣ поваренной соли. поименованными выше, преимущественно же известью и магнезіей; но также въ свободномъ состояніи, растворенной въ воздухѣ и водѣ, наполняющихъ скважины почвы.
Азотъ.	б) Перегнойныя кислоты — съ кислородомъ и водородомъ. в) Другія перегнойныя вещества, состояція изъ тѣхъ же элементовъ какъ и перегнойныя кислоты, въ видѣ находящихся въ разложеніи органическихъ остатковъ. а) Свободный, въ механической смѣси съ кислородомъ въ почвенномъ воздухѣ б) Азотная кислота въ соединеніи съ известью, магнезіей, натромъ, кали и амміакомъ. в) Амміакъ — съ водородомъ.	поименованными выше амміакомъ. а) Въ соединеніи съ кислотами: перегнойными, стѣрной, соляной, фосфорной, угольной. б) Въ соединеніи съ глиной и окисью желѣза.
Водородъ.	г) Перегнойныя вещества, какъ входящіе въ разложеніи органическіе остатки, содержатъ также и азотъ. а) Вода.	Свободная, наполняющая скважины почвы въ видѣ гигроскопической, волосной или нажимной воды; или хл-

Кислородъ.

мически соединенна съ окислами (гидраты окиси желѣза и глинозема) или солями (водные силикаты, глина, гипсъ).
 б) Въ перегнойныхъ веществахъ, какъ мы сказали выше.
 Въ воздухѣ свободнымъ, въ водѣ съ водородомъ, въ окислахъ и кислотахъ съ другими элементами, въ перегнойныхъ веществахъ съ углеродомъ, водородомъ и азотомъ и т. д.

Соединенія, въ которыхъ находятся элементы въ почвѣ, не представляютъ чего либо постояннаго; они измѣняются болѣе или менѣе быстро подъ влияніемъ газовъ, составляющихъ атмосферную и почвенную воздушныя смѣсь, воды съ растворенными въ ней веществами и теплоты, съ дѣйствіемъ которыхъ на составныя части почвы мы познакомились выше (см. стр. 71—78). При этомъ первыми поддаются влиянію этихъ преобразователей органическіе остатки почвы, перегнойныя вещества, доставляющія въ конечныхъ продуктахъ своего разложенія: угольной кислоты, водѣ, амміакъ и азотной кислоты весьма сильныхъ преобразователей почвы. Такимъ образомъ химическія силы постоянно въ дѣйствіи въ почвѣ, разрушая прежнія и создавая новыя соединенія, при одномъ лишь постоянномъ свидѣлѣ этихъ преобразованій въ почвѣ, почти неизмѣняющемся химически — кварцѣ.

Взаимныя отношенія почвы и растений. Богатство и плодородіе почвы.

Почва нужна сельскому хозяину для производства растений, а потому, чтобы судить о пригодности ея для этихъ послѣднихъ, необходимо знать требованія, предъявляемыя растеніемъ почвѣ.

Растеніе состоитъ изъ мельчайшихъ основныхъ, элементарныхъ органовъ, имѣющихъ подобіе замѣнутыхъ мѣшечковъ различнаго вида и величины, называемыхъ клеточками. Однородныя и разнородныя клеточки соединяются въ ткани; ткани, въ свою очередь образуютъ растеніе съ болѣе или менѣе разнообразными органами: корнемъ, стеблемъ и листьями (цвѣтами и плодами). Стебель съ листьями растеніе развиваетъ въ воздухѣ, корень же въ землѣ. Изъ углекислоты, которая берется листьями изъ воздуха, и амміака (азотной кислоты) воды и сѣрной кислоты, которыя берутся корнями почти исключительно изъ почвы, растеніе образуетъ составляющія его съгораемую часть, извѣстныя органическія вещества, содержащія азотъ (бѣлковыя) и несодержащія его (углеводы—крахмалъ, клетчатку, сахаръ и камедь, жиры, кислоты и т. д.), при извѣстномъ выполненіи условій влажности, теплоты, свѣта и электричества и при содѣйствіи нѣкоторыхъ минеральныхъ веществъ, которыя мы находимъ

въ несгораемой части растенія—золѣ; а именно: кали, натръ (?), извести, магnezинъ, желѣза, фосфорной, сѣрной и кремневой кислоты и хлора (?), и которыя растеніе черпаетъ изъ почвы корнями. Растеніе нуждается въ водѣ не только для образованія органическихъ веществъ, но и для растворенія веществъ поступающихъ въ растеніе и передвигающихся въ немъ; для поддержанія въ тканяхъ растенія извѣстной упругости, и, наконецъ, для пополненія того громаднаго количества воды, которое испаряется растеніемъ. Какъ тѣ вещества, изъ которыхъ, такъ и тѣ, при содѣйствіи которыхъ растеніе образуетъ органическія вещества, свою растительную массу мы называемъ *питательными веществами* растенія.

Корень растенія принимаетъ питательныя вещества изъ почвы не всей своей поверхностью; это выполняютъ лишь мочки или волоски, которые принадлежатъ верхней ткани, покрывающей главный корень и его развѣтвленія, и находятся на болѣе молодыхъ частяхъ корня и его развѣтвленій, т. е. нѣсколько выше ихъ оконечностей, покрытыхъ такъ называемымъ корневымъ чехликомъ; на болѣе старыхъ, верхнихъ частяхъ корня мочки исчезаютъ. Поэтому, *поверхность корня, принимающая* питательныя вещества изъ почвы, можетъ быть болѣе или менѣе сравнительно со всей массой растенія и составляетъ болѣею частью лишь весьма незначительную часть общей поверхности корневой части растенія: болѣею у нѣкоторыхъ растеній, напр., злаковъ, бобовыхъ; меньшую—у крестоцвѣтныхъ масличныхъ и весьма малую у такъ называемыхъ корнеплодныхъ растеній: свекловицы, рѣпы, моркови и т. д.

Различныя растенія:

1) Производятъ неодинаковое количество растительной массы, къ тому же неодинаковаго состава. Такъ, напр., на одной десятинкѣ, при среднемъ хорошемъ урожаѣ, производятъ фунтовъ:

	растительной массы соед. водѣ.	въ ней:			въ этомъ послѣднемъ:					
		водѣ.	сухого вещества.	бѣловыхъ веществъ.	въ нихъ: азота.	жирнаго масса.	безазотистыхъ и экстрактивныхъ веществъ.	въ нихъ: крахмала или сахара.	дресины.	золы.
озимая рожь .	12000	1716	10284	600	96	192	5488	1852	3508	400
горохъ. . . .	12000	1672	10328	1480	236	280	4688	(крахмала) 1480	3392	444
яровой рапсъ. .	8600	1387	7213	684	110	1260	2189	(крахмала) —	2660	341
сахарная свекл.	60000	49800	10200	744	119	60	7896	4800	852	564
								(сахара)		

2) Въ равно длинныя періоды времени производятъ различныя количества растительной массы: Такъ напр.,

	содня высвѣдо- стигаетъ полной зрѣлости въ те- ченіи	при этомъ произва- днть среднимъ чис- ломъ въ недѣлю су- хаго растительнаго вещества
озимая рожь	41 недѣля	205 фунтовъ
кормовая свекла	24 "	624 "
горохъ	18 "	574 "
ячмень мелкій	12 "	714 "

3) Въ различные періоды своего развитія производятъ количе-ства растительной массы вообще и отдѣльных составныхъ частей ея, непропорціональныя продолжительности этихъ періодовъ. Такъ, напр., овесъ изъ всего количества сухаго вещества и составныхъ частей его, который онъ производитъ ко времени полной своей зрѣлости, образуетъ:

въ періо- дъ *)	продолжав- шея	сухаго вещества	бѣловыхъ веществъ	жирнаго масла	безазотистыхъ веществъ	древесины
I	—	19 проц.	27 проц.	20 проц.	15 проц.	18 проц.
II	12 дней	37 "	18 "	30 "	32 "	63 "
III	10 "	21 "	12 "	35 "	23 "	19 "
IV	11 "	18 "	33 "	15 "	22 "	0 "
V	10 "	5 "	10 "	0 "	6 "	0 "
	100	100	100	100	100	100

Впрочемъ, одно и то же растение въ различныхъ мѣстностяхъ и въ различные годы, пользуясь неодинаковой почвой и въ неодинаковой мѣрѣ свѣтомъ, теплотой и влажностью, производитъ также неодинаковое количество растительной массы, къ тому же не совсѣмъ одинаковаго состава. Это подтверждается извѣстными каждому различіемъ въ силѣ развитія, отчасти же и различіемъ въ урожайности одного и того же растения и измѣняемымъ составомъ различныхъ растительныхъ массъ въ различныхъ случаяхъ. Такъ, составъ пшеничнаго зерна можетъ колебаться между 10,7 и 21,5 проц. бѣловыхъ веществъ (1,75—3,5 проц. азота), 53,4 и 64,4 проц. крахмала, 1,4 и 7,9 проц. камеди и сахара, 1,0 и 2,6 проц. жирнаго масла, 1,7 и 8,3 проц. древесины, 1,4 и 1,9 проц. золы и 10,8 и 15,6 проц. воды; или содержаніе сухаго вещества и крахмала въ картофелѣ одного и того же сорта въ различныхъ мѣстностяхъ и въ одной и той же мѣстности въ различные годы можетъ колебаться между 21,2 и 26,0 проц. сухаго вещества и 15,0 и 19,3% крахмала въ первомъ и 25,0 и 28,2 проц. сухаго вещества и 16,4 и 23,6 проц. крахмала во второмъ случаѣ.

Сообразно этому различныя растенія:

*) I-й періодъ закончился 18 іюня, когда растеніе имѣло три нижніе листика; II-й 30 іюня передъ самымъ колосненіемъ; III-й 10 іюля, сейчасъ послѣ цвѣтенія; IV-й 21 іюля, при начинавшемся созрѣваніи; и V-й 31 іюля въ полной зрѣлости.

1) Требуютъ отъ почвы и берутъ изъ нея неодинаковыя количества воды, азота и зольныхъ питательныхъ веществъ какъ вообще, такъ каждаго изъ этихъ послѣднихъ въ отдѣльности для образованія одного и того же количества сухаго растительнаго вещества. Относительно воды и азота это слѣдуетъ и изъ вышеприведенныхъ чиселъ, показывающихъ образованіе содержащей воду растительной массы, сухаго вещества и бѣловыхъ веществъ; относительно же зольныхъ питательныхъ веществъ въ этомъ убѣждаетъ то, напр., что на 100 частей сухаго вещества, среднимъ числомъ, пшеница содержитъ въ зернахъ 2,0 проц. и въ соломѣ 5,4 проц., конскіе бобы—въ зернахъ 3,6 проц. и въ соломѣ 6,1 проц., картофель—въ клубняхъ 3,7 проц. и въ ботвѣ 8,58 проц. золы; равно какъ и слѣдующая таблица, которая показываетъ средній процентный составъ золы различныхъ растеній по группамъ:

Растенія:	цѣлой (ка- ли и натр.)	магнѣзіи	известки	фосфорной кислоты	бромной кислоты	сѣрной ки- слоты	хлора
зерновые злаковыя (пшеница, рожь, просо и т. д.)	30	12	3	46	20	2,5	
ниже, рожь, просо и т. д.)	13—27	9	7	5	50—70	2,5	
зерновые бобовыя (горохъ, чечевица, вика и т. д.)	44	7	5	35	1	4	2
рохъ, чечевица, вика и т. д.)	27—41	7	25	39	8	5	2—6
зерновые масличныя (въ зернахъ)	25	12	15	45	—	2,5	0,2
(ранетъ, ленъ, макъ и т. д.)	40	6	25	10	5	7	4—8
илугополовныя клубне (въ клубняхъ)	60	5	3	15	10		
выя (картофель)	25	3	40	3	20	5—13	3—9
плугонъ, коренья (свекла, морковь, репа и т. д.)	50	3	10	10	5	6—13	5—17
ла, морковь, репа и т. д.)	40	10	20	5	10		
травы (злаковыя растенія)	33	4	8	8	35	4	5

2) Въ равно длинныя періоды времени требуютъ и берутъ изъ почвы неодинаковыя количества воды, азота и зольныхъ питательныхъ веществъ вообще и каждаго въ отдѣльности для произведенія средняго хорошаго урожая. Такъ, напр., для этого послѣдняго требуютъ среднимъ числомъ въ недѣлю фунтовъ:

	золы вообще	каліи	магнѣзіи	известки	фосфор. кислоты	сѣрной кислоты	азота
озимая рожь	9,8	2,1	0,75	0,42	1,25	0,25	2,34
кормовая свекла	54,0	23,3	3,63	3,25	3,50	2,13	11,58
горохъ	24,7	6,7	7,50	1,94	3,44	1,39	13,11
ячмень мелкій	27,3	6,7	1,75	1,17	3,50	0,92	7,75

3) Въ различные періоды своего развитія требуютъ и берутъ изъ почвы количества воды, азота и зольныхъ питательныхъ веществъ вообще и каждаго въ отдѣльности, непропорціональныя продолжительности періодовъ. Такъ, напр., овесъ изъ всего количества азота, воды и составныхъ частей ея, котораго требуетъ отъ почвы для полнаго своего развитія, беретъ:

въ пері- одъ *)	азота	зола нообще	каль	магнѣзіи	известіи	фосфорн.	сѣрной	кремн.
I	27 проц.	29 проц.	39 проц.	24 проц.	30 проц.	23 проц.	20 проц.	18 проц.
II	18 "	26 "	31 "	16 "	28 "	19 "	32 "	23 "
III	12 "	24 "	21 "	16 "	21 "	31 "	0 "	29 "
IV	33 "	16 "	9 "	26 "	20 "	18 "	38 "	23 "
V	10 "	5 "	0 "	16 "	1 "	9 "	10 "	7 "

Что касается воды, то она требуется и принимается растениями въ течение всей жизни; но количество ея, принимаемое растениями въ различные періоды ихъ развитія, повидимому, уменьшаются постепенно отъ перваго періода къ послѣднему.

Наконецъ, одно и тоже растение, въ зависимости отъ того, въ какой мѣрѣ оно пользуется другими условіями произрастанія, беретъ изъ почвы неодинаковыя количества зольныхъ составныхъ частей какъ всѣхъ вообще, такъ и каждая въ отдѣльности, для образованія одного и того же количества сухаго вещества. Такъ, напр., въ различные годы и въ различныхъ мѣстностяхъ на 100 част. сухаго вещества содержится у:

	зола вообще	которая можетъ состоять во 100 частяхъ въ:							хлора
		каль	натр	магнѣзіи	известіи	окиси желѣза	фосфорной кислоты	сѣрной кис- лоты	
пшеничныхъ (наибольш.)	2,46	36,60	9,07	16,26	8,20	2,99	52,62	2,22	5,91
зеренъ (наименьш.)	1,58	23,18	0,00	9,10	0,90	0,00	39,20	0,00	0,00
пшеничной (наибольш.)	7,00	27,38	7,28	5,18	8,86	1,22	8,90	5,59	72,46
соломы (наименьш.)	4,46	9,47	0,00	1,25	2,65	0,06	2,21	0,74	49,58
картофельн. (наибольш.)	5,80	73,61	16,93	13,58	6,23	7,18	27,14	14,89	8,11
клубней (наименьш.)	2,20	43,95	0,00	1,32	0,51	0,04	8,39	0,44	0,00
картофельн. (наибольш.)	12,89	42,78	7,44	28,47	46,70	4,32	12,14	7,93	9,40
ботвы (наименьш.)	5,16	6,38	0,00	6,98	16,12	1,82	2,60	4,90	1,93
корней кор- (наибольш.)	13,97	62,63	20,71	6,41	15,90	2,85	18,94	18,07	7,96
моной рбы (наименьш.)	4,89	26,55	0,00	1,61	5,47	0,19	5,48	2,62	0,00

Къ этому слѣдуетъ замѣтить, что нѣкоторые изъ зольныхъ питательныхъ веществъ растения могутъ, по всей вѣроятности, въ нѣкоторой части замѣняться одно другимъ, напр. каль известію.

Растение, какъ мы сказали выше, беретъ питательныя вещества изъ почвы помощью корневыхъ мочекъ, которыя приходятъ въ непосредственное соприкосновеніе: отчасти съ частицами почвы, прилегающей къ этимъ послѣднимъ стѣнками своихъ клѣточекъ, проникаемыми для заключающейся въ этихъ послѣднихъ жидкости, а потому смоченными на поверхности соприкосновенія ихъ съ почвой; отчасти съ почвенной жидкостью — воднымъ растворомъ различныхъ веществъ, которая, задерживаясь волосою въ сѣткахъ почвы,

*) Періоды и продолжительность ихъ та же, что и выше.

отдѣляетъ стѣнки мочечныхъ клѣточекъ отъ частицъ почвы болѣе или менѣе толстымъ слоемъ раствора. Жидкость внутри мочечной клѣточки черезъ невидимыя связанны клѣточной стѣнки находится съ одной стороны въ общеніи съ жидкостями другихъ клѣточекъ растения, съ другой съ почвенной жидкостью или съ частицами почвы. Наблюдения показываютъ, что растворы, раздѣленные перепонкой, размыиваются растворенными веществами, для которыхъ проницаема перепонка и къ которымъ принадлежатъ питательныя вещества растения, до тѣхъ поръ пока растворъ по обѣ стороны перепонки не будетъ представлять себѣ одинаково крѣпкимъ въ отношеніи каждого раствореннаго вещества, проникающаго въ то же время черезъ перепонку. А потому, если мы представимъ себѣ, что въ какой либо клѣточкѣ растения, вслѣдствіе проекающаго тамъ образованія органическихъ веществъ, будетъ выдѣлено изъ раствора въ клѣточномъ сокѣ (жидкости) какое либо растворенное вещество, то разжиженіе сока этой клѣточки въ отношеніи выдѣленнаго вещества отразится на другихъ клѣточкахъ и, наконецъ, на клѣточкѣ корневой мочки. Вслѣдствіе этого крѣпость сока мочечной клѣточки не будетъ уже болѣе равна крѣпости почвенной жидкости въ отношеніи выдѣленнаго вещества и нѣкоторое количество этого послѣдняго должно будетъ перейти изъ почвенной жидкости, гдѣ оно находится въ растворѣ, или изъ частицы почвы, растворяясь въ клѣточной жидкости, смачивающей наружную поверхность мочечной стѣнки, сперва въ мочечную, а затѣмъ и въ другія клѣточки, пока не достигнетъ той, въ которой оно было выдѣлено изъ раствора процессомъ образованія органическаго вещества. Такое движеніе должно будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока крѣпость растворовъ всѣхъ клѣточекъ, находящихся между собой въ общеніи, невыравнивается съ крѣпостью раствора почвенной жидкости.

Изъ этого слѣдуетъ: 1) что въ растение поступаютъ только растворенныя вещества и, слѣдовательно, питательныя вещества только въ тѣхъ соединеніяхъ, въ которыхъ (см. стр. 117—120) они могутъ находиться растворенными въ почвенной жидкости, содержащей кромѣ углеводородовъ и нѣкоторыя соли, усиливающія растворяющую силу этой жидкости; 2) что въ растение поступаютъ всѣ растворенныя въ почвенной жидкости вещества, для которыхъ проницаема стѣнка растительной клѣочки и съ которыми приходитъ въ соприкосновеніе эта послѣдняя, безъ различія того, нужны ли они для жизненныхъ отправленій растения или нѣтъ. Разница въ томъ только, что поступающее въ растение количество ихъ зависитъ въ послѣднемъ случаѣ исключительно отъ того, въ какомъ количествѣ растворены они въ почвенной жидкости; въ первомъ же случаѣ сверхъ того и отъ количества, въ которомъ требуетъ ихъ растение; 3) что, при известной

крѣпости поченной жидкости, въ растеніє поступають какъ нужныя, такъ и ненужныя для него растворенныя въ этой жидкости вещества въ количествѣ, которое превосходитъ не только количество, въ которомъ требуетъ ихъ растеніє, но даже и то, въ которомъ она сноситъ ихъ безъ вреда для своихъ жизненныхъ отправленій. Въ послѣднемъ случаѣ растеніє или неразвивается вовсе на почвѣ съ такой поченной жидкостью, или погибаетъ; въ первомъ же можетъ утрачивать нѣкоторыя свои качества. Во всякомъ же случаѣ зода растенія, произрастающаго при такихъ поченныхъ условіяхъ, будетъ заключать ненужныя для растенія вещества, а нужныя въ излишкѣ сравнительно съ тѣмъ, въ чемъ нуждалось растеніє. Вотъ почему качественныи и количественныи составы зоды растеній нехарактеризуютъ вполнѣ потребности растеній, но за то характеризуютъ отчасти почву, на которой произрастало такое растеніє. Точно также растеніє или вовсе не въ состояніи развиваться или развивается слабо, если, вслѣдствіе недостаточной крѣпости поченной жидкости, въ растеніє переходитъ недостаточное количество необходимыхъ для него питательныхъ веществъ. Однимъ словомъ, растенія, для своего успѣшнаго развитія, требуютъ извѣстныхъ, ближе неопредѣлимыхъ пока предѣловъ крѣпости раствора, изъ котораго они берутъ питательныя вещества, какъ въ отношеніи растворенныхъ веществъ вообще, такъ и въ отношеніи каждаго питательнаго вещества въ отдѣльности. Въ этихъ предѣлахъ чѣмъ крѣпче растворъ, тѣмъ быстрее и сильнѣе, и чѣмъ слабѣе онъ, тѣмъ слабѣе и медленнѣе развивается растеніє. Къ тому же большая крѣпость поченной жидкости значительно ослабляетъ испареніе воды растеніемъ, которое, вслѣдствіе этого довольствуется меньшимъ количествомъ воды. Растенія, повсей вѣроятности, требуютъ тѣмъ болѣе крѣпкихъ растворовъ питательныхъ веществъ, чѣмъ короче періодъ времени, въ теченіи котораго они совершаютъ свое развитіе, и чѣмъ меньше приѣмлющая корневая поверхность ихъ сравнительно со всей ихъ корневой поверхностью и съ образуемой ими растительной массой (см. стр. 121) Что же касается благопріятнаго для развитія растенія количественнаго отношенія между отдѣльными питательными веществами въ растворѣ, то оно различно для различныхъ растеній и, повидному, особенно важно между азотистыми соединеніями, амміакомъ или азотной кислотой, и зольными питательными веществами. Чрезмѣрное увеличеніе первыхъ уменьшаетъ величину растенія, замедляетъ его развитіе, лишаетъ его способности образовывать сѣмена; чрезмѣрное же увеличеніе послѣднихъ усиливаетъ сначала развитіе растенія, которое начинаетъ сильно вѣтвиться, но въ то же время блѣднѣетъ, тернеть постоянно вновь образующіяся вѣтви и наконецъ недостигаетъ точно также полнаго образованія сѣмянъ.

Въ удовлетвореніе такихъ требованій растеній почва:

1) Представляетъ мѣсто для укорененія растеній—различно скважистую массу, въ которой могутъ распространяться корни растеній тѣмъ легче, чѣмъ крупнѣе поченныя сваяжины и чѣмъ менѣе сдѣпленіе поченныхъ частицъ между собой въ предѣлахъ, однако, сохранения почвой необходимой въ другихъ отношеніяхъ связности частицъ ея.

2) Представляетъ массу извѣстнаго строенія, обладающую извѣстными физическими свойствами въ зависимости отъ этого, принимаемую болѣе или менѣе для воздуха, способную быть въ извѣстной степени влажною и теплою; слѣдовательно, заключающую въ себѣ болѣе или менѣе благопріятныя условія доступа воздуха, влажности и теплоты какъ для происходящихъ въ ней химическихъ процессовъ, такъ вмѣстѣ съ этими послѣдними и для произрастанія на ней растеній.

3) Доставляетъ опускающимся въ нее корнямъ растеній необходимый для развитія растеній кислородъ въ составѣ выполняющаго ея скважины воздуха.

4) Доставляетъ растеніямъ воду. Вода, находящаяся въ почвѣ въ состояніи гипоскопической воды, не въ состояніи удовлетворить потребность растеній въ водѣ; эта послѣдняя удовлетворяется, главнымъ образомъ, волосной водою, которой, при обыкновенныхъ условіяхъ, содержится въ почвѣ, смотря по ея водоудерживающей силѣ и сухости воздуха, отъ $\frac{1}{10}$ до $\frac{1}{2}$ количества воды, выполняющаго всѣ волосныя скважины почвы. Количество волосной воды, которымъ довольствуются различные растенія, различно; но можно считать, что большая часть воздѣлываемыхъ нами въ полѣ растеній въ состояніи произрастать еще, если болѣе песчаная почва содержитъ не менѣе $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{5}$, а болѣе глинистая не менѣе $\frac{1}{10}$ того количества воды, которое эти почвы могутъ задержать въ своихъ скважинахъ. Излишекъ волосной воды, а тѣмъ болѣе нажимной воды, дѣлаетъ почву непригодной для всѣхъ почти нашихъ воздѣлываемыхъ въ полѣ растеній (за исключеніемъ риса), потому что, закупоривая скважины почвы, затрудняетъ доступъ въ почву воздуха, а слѣдовательно и необходимаго для корней растенія кислорода, разжижаетъ поченную жидкость въ отношеніи питательныхъ веществъ, уводитъ, въ особенности нажимная вода, эти послѣднія даже изъ слоевъ достижимыхъ для корней растеній и, наконецъ, холодитъ почву. Почва болѣе песчаная перестаетъ быть пригодной для большей части воздѣлываемыхъ въ полѣ растеній, если содержитъ болѣе $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$, а болѣе глинистая, если содержитъ болѣе $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ того количества воды, которое она можетъ задержать въ своихъ волосныхъ скважинахъ. Иначе, почва вполнѣ благопріятна для воздѣлываемыхъ въ полѣ растеній,

если она, въ лѣтнее время, спустя 2—3 дня послѣ самыхъ сильныхъ дождей, не удерживаетъ воды болѣе $\frac{1}{2}$ того количества, которое можетъ задержать въ своихъ волосныхъ скважинахъ, и, спустя 8—10 дней засухи, содержитъ воды еще $\frac{1}{10}$ своего вѣса. Почва, содержащая обыкновенно на глубинѣ 15—16 дюйм. $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{4}$ своего вѣса воды, можетъ называться *снѣжей*, *потной*; содержащая же воды на этой глубинѣ не болѣе $\frac{1}{10}$ своего вѣса — *сухой*. Излишекъ волосной воды и нажимная вода, вредныя для растеній, если онѣ находятся въ томъ слой почвы, въ которомъ развиваются корни, могутъ быть полезными, если онѣ находятся въ почвѣ ниже этого слоя и, испаряясь, поднимаются къ поверхности почвы въ видѣ водяныхъ паровъ, которые здѣсь, при пониженіяхъ температуры, напр. къ ночи, переходятъ въ капельножидкое состояніе, образуя такъ называемую *внутреннюю росу* — явленіе особенно свойственное сухимъ климатамъ. (см. стр. 111) съ значительными разницями въ лѣтнее время между дневной и ночной температурами, и особенно важное для этихъ климатовъ.

5) Доставляетъ питательныя вещества а) *растворенныя* въ водѣ, которая наполняетъ въ большей или меньшей степени скважины почвы, содержитъ всегда въ растворѣ углекислоту и различныя соли, увеличивающія ея растворяющую силу, и образуетъ то, что мы назвали выше почвенной жидкостью: б) *растворимыя* питательныя вещества, не растворенныя по недостатку растворителей; между ними мы должны различить *легче* растворимыя, какъ напр. гипсъ, углекислую известь, *труднѣе* растворимыя, *задержанныя* водными силикатами, перегнойными кислотами, окисями желѣза и глинозема и т. д., изъ нихъ первыя растворяются, если не всегда скорѣе, то въ большемъ количествѣ, чѣмъ послѣднія. Растворимыя, но не растворенныя питательныя вещества мы можемъ себѣ представить какъ бы облегающими поверхность мало тронутыхъ или вовсе еще не тронутыхъ вывѣтриваніемъ минеральныхъ и органическихъ частицъ почвы; такъ какъ задерживающіе силикаты образуются вывѣтриваніемъ изъ невывѣтрившихся еще минеральныхъ частицъ и прежде всего на поверхности этихъ послѣднихъ, какъ болѣе доступной для дѣятелей вывѣтриванія, а выдѣляющіяся изъ раствора вещества притягиваются поверхностью почвенныхъ частицъ. в) *Нерастворенныя* по крайней мѣрѣ въ почвенной жидкости питательныя вещества, заключающіяся въ мало тронутыхъ вывѣтриваніемъ или еще вовсе не тронутыхъ ими минералахъ и органическихъ остаткахъ. Эти три состоянія питательныхъ веществъ растенія въ почвѣ характеризуются отношеніемъ этихъ послѣднихъ къ растворяющимъ средствамъ: чѣмъ больше питательныхъ веществъ растворяется изъ почвы чистой водой, водой, содержащей углекислоту, и холодной соляной кислотой (уд. в. 1,15),

тѣмъ болѣе содержится въ почвѣ растворенныхъ и растворимыхъ въ почвенной жидкости, а слѣдовательно и болѣе доступныхъ для растенія питательныхъ веществъ. Питательныя вещества неостаются въ почвѣ всегда въ томъ же состояніи, въ какомъ находятъ ихъ изслѣдованіе или растеніе въ извѣстное время; напротивъ, они его мѣняютъ, особенно въ направленіи отъ нерастворимыхъ къ растворимымъ и раствореннымъ веществамъ. Неподвергшіяся еще вывѣтриванію минеральныя частицы и органическіе остатки, вывѣтриваясь, какъ мы видѣли дають съ одной стороны болѣе или менѣе легко растворимыя вещества (кремнекислыя, углекислыя, сѣрниокислыя соли, кремневую кислоту), которыя, растворяясь въ почвенной жидкости, увеличиваютъ ея крѣпость; съ другой — задерживающія вещества (водные силикаты, перегнойныя кислоты, гидраты окиси желѣза и глинозема и т. д.), которыя усиливаютъ задерживательную способность почвы и въ то же время количество задержанныхъ веществъ вновь задержанными въ почвенной жидкости, сдѣлавшейся въ тому же болѣе крѣпкой. Растворимыя вещества переходятъ въ растворенныя или вслѣдствіе образованія новыхъ усиливающихъ раствореніе средствъ (углекислоты, амміачныхъ солей и т. д.), какъ продукты преимущественно разложенія органическихъ остатковъ, или вслѣдствіе разжиженія почвенной жидкости, когда увеличивается въ почвѣ содержаніе воды (ключевой, дождевой) или когда убываютъ изъ почвы растворенныя вещества при переходѣ въ растенія. На оборотъ, растворенныя вещества могутъ переходить въ растворимыя т. е. выдѣляться изъ раствора или задерживаться, когда почвенная жидкость станетъ крѣпче, вслѣдствіе испаренія изъ почвы воды или же вслѣдствіе прибыла въ почвѣ растворенныхъ веществъ (удобреніе). Этимъ собственно заканчивается измѣненіе состоянія питательныхъ веществъ въ направленіи отъ растворенныхъ къ растворимымъ; хотя извѣстны случаи перехода въ почвѣ растворенныхъ и растворимыхъ веществъ въ нерастворимыя, напр. въ почвахъ содержащихъ много перегнойныхъ веществъ, на глубинѣ 2—4 фут. отъ поверхности земли, образуются; при участіи кремниевой кислоты, глинозема, извести, окисловъ желѣза, каменныя соль, препятствующіе прониканію вглубь почвы воздуха, воды и даже корней; по это мало касается питательныхъ веществъ растенія.

Быстрота, съ которой вывѣтриваются минеральныя и органическія составныя части почвы и съ которой, слѣдовательно, нерастворимыя вещества переходятъ въ растворимыя, зависятъ отъ химическаго состава этихъ веществъ (см. стр. 80—91), отъ силы, съ которой дѣйствуютъ дѣятели вывѣтриванія вообще и которая опирается физическими свойствами почвы, и отъ облія дѣятелей вывѣтриванія, образующихся въ самой почвѣ. Слѣдовательно, этотъ

переходъ не всегда будетъ скорѣе въ песчаной почвѣ, хотя и болѣе доступной для воздуха, чѣмъ въ глинистой, въ которой между нерастворимыми веществами находится обыкновенно болѣе веществъ, переходящихъ въ растворенныя и задержанныя, и въ тому же въ состояніи такого уже механическаго и отчасти химическаго разрушенія, которое облегчаетъ имъ переходъ въ этомъ направленіи. Переходъ же растворимыхъ веществъ въ растворъ будетъ зависеть отъ присутствія въ большемъ или меньшемъ количествѣ задерживающихъ веществъ и растворяющихъ средствъ; первыхъ болѣе въ болѣе глинистыхъ, и вторыхъ въ болѣе песчаныхъ почвахъ; поэтому, при одинаковомъ достаткѣ воды въ обѣихъ почвахъ, въ послѣднихъ этотъ переходъ будетъ всегда быстрѣе, чѣмъ въ первыхъ.

Подобно тому какъ газообразныя вещества, составляющія почвенный воздухъ, перемѣщаются въ почвѣ въ стремленіи равномерно смѣшаться между собой во всѣхъ частяхъ почвеннаго воздуха, вслѣдствіе взаимнаго притяженія частицъ ихъ, такъ и растворяющіяся въ почвенной жидкости вещества стремятся равномерно распределиться во всей массѣ почвенной жидкости, вслѣдствіе притяженія ихъ частицъ къ частицамъ воды и другихъ растворенныхъ въ водѣ веществъ. Но, такъ какъ при обыкновенномъ содержаніи воды въ почвѣ, въ $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{3}$ полного насыщенія почвы волосной водой, почвенная жидкость въ почвѣ представляетъ не одну сплошную массу воды, выполняющей скважины почвы, но нѣсколько отдѣльныхъ, различной величины массъ, разбѣдненныхъ между собой скважинами, невыполненными водой, выполненными воздухомъ, то распространеніе въ почвѣ вещества, растворяющагося въ какомъ либо мѣстѣ почвенной жидкости, происходитъ чрезвычайно медленно; тѣмъ медленнѣе еще, что, по мѣрѣ того какъ оно растворяется и распространяется, оно задерживается въ то же время въ большей или меньшей степени почвой. Поэтому передвиженіе въ почвѣ растворенныхъ веществъ тѣмъ быстрѣе, чѣмъ болѣе почва насыщена водой и чѣмъ меньше ея задерживательная способность. Растворенныя вещества перемѣщаются въ почвѣ не только въ водѣ, но и съ водой. Такъ, вода, поднимаемая въ почвѣ волосностью или нажимомъ, несетъ съ собой вверхъ и растворенныя въ ней вещества, которые отчасти задерживаются на пути почвой, отчасти, достигая верхняго слоя, выдѣляются тамъ изъ раствора, вслѣдствіе испаренія воды. Точно также вода, движущаяся внизъ, перемѣщаетъ растворенныя вещества внизъ, на сколько они не задерживаются почвой, выводитъ ихъ даже изъ слоевъ, достижимыхъ для корней растений.

Растеніе беретъ питательныя вещества изъ почвенной жидкости или задержанныя, которые растворяются въ жидкости, смѣ-

чивающей клеточную стѣнку мочки; или растворенныя въ почвенной жидкости. Чтобы растеніе могло произрастать успѣшно, почва должна: 1) содержать достаточное количество растворенныхъ и растворимыхъ питательныхъ веществъ, при чемъ почвенная жидкость должна представлять надлежащей крѣпости растворъ въ отношеніи какъ растворенныхъ веществъ вообще, такъ и каждаго изъ нихъ въ отдѣльности (см. стр. 126); 2) пополнять съ надлежащей быстротой убыль растворенныхъ веществъ, поступающихъ въ растеніе изъ растворимыхъ. Почва, которая выполняетъ эти требованія на столько полно, что производить урожай, которыхъ цѣнность превышаетъ издержки ихъ производства, принадлежитъ къ числу болѣе или менѣе *плодородныхъ* почвъ, смотря потому на сколько первая превышаетъ вторую. Если же почва, кромѣ того, содержитъ значительные запасы питательныхъ веществъ въ нерастворимомъ состояніи, такъ что этими послѣдними можетъ пополняться болѣе или менѣе быстро убыль питательныхъ веществъ въ растворенномъ и растворимомъ состояніи и обезпечиваться полученіе урожая, оплачивающихъ съ избыткомъ издержки ихъ производства, въ теченіи долгаго времени, то такая почва принадлежитъ въ то же время къ числу *богатыхъ* почвъ. Понятно, что почва богатая можетъ и не быть плодородной, если при значительномъ запасѣ питательныхъ веществъ въ нерастворимомъ состояніи, она будетъ содержать малое количество растворенныхъ и растворимыхъ веществъ доступныхъ для растенія въ данное время. Наши черноземныя почвы болѣе частью почвы, отличающіяся своимъ плодородіемъ, но не богатствомъ, потому что находящіяся въ нихъ питательныя вещества находятся въ легко доступномъ для растеній состояніи, но сравнительно не въ особенно большихъ количествахъ. На оборотъ, наши нечерноземныя почвы болѣе частью мало плодородны, трудно отдають растеніямъ находящіяся въ нихъ питательныя вещества, хотя содержатъ этихъ послѣднихъ не рѣдко не менѣе, а иногда даже болѣе чѣмъ черноземныя.

Слѣдующая таблица *) дѣлаетъ эти выводы еще болѣе наглядными въ числахъ, показывающихъ процентный составъ растворимой въ холодной соляной кислотѣ и нерастворимой въ ней частей двухъ черноземныхъ и двухъ нечерноземныхъ почвъ, и абсолютное количество какъ растворимыхъ, такъ и нерастворимыхъ съ соляной кислотѣ составныхъ частей, которое содержится въ почвѣ на пространствѣ 1 десятины, въ слое толщиной въ 1 футъ, или полагая въсь куб. сажени почвы, приблизительно въ 800 пудовъ, въ 274400 пудахъ почвы круглымъ числомъ.

*) Анализъ этихъ почвъ произведенъ въ химической лабораторіи Петровской Земледѣльческой и Лѣсной академіи.

	Червоземныя почвы.				Нечервоземныя почвы.			
	Тульской губ. Новосильскаго уѣзда.		Бессарабской губ. близъ Кишинева съ табачной плантаціи.		Псковской губ. Новорязскаго уѣзда.		Московской губ. и уѣзда, омытаго поля Печерской владѣнія.	
	Процентный составъ.	Абсолютное количество солей въ граммахъ.	Процентный составъ.	Абсолютное количество солей въ граммахъ.	Процентный составъ.	Абсолютное количество солей въ граммахъ.	Процентный составъ.	Абсолютное количество солей въ граммахъ.
I. Растворимыхъ въ холодной соляной кислотѣ (уд. вѣсъ 1,15) частей	65,6	18000	52,0	14269	44,7	12266	51,1	14022
II. Нерастворимыхъ въ такой кислотѣ частей	934,4	256400	948,0	260131	955,3	262134	948,9	260378
I. Въ числѣ растворимыхъ.								
Кремневой кислоты	0,275	75	0,15	41	0,36	99	0,180	49
Сѣрной "	1,005	276	0,21	58	0,57	154	0,300	82
Фосфорной "	0,745	204	0,37	102	1,04	285	0,975	268
Угльной "	0,414	114	0,79	217	0,55	211	0,135	37
Хлора	0,040	11	—	—	0,11	30	0,145	40
Окиси желѣза	14,550	3992	4,37	1199	13,46	3693	12,207	3350
" марганца	0,910	250	—	—	2,96	812	1,250	343
" алюминія	16,110	4421	8,38	2299	7,77	2132	12,133	3320
Извести	7,560	2074	10,94	3002	1,47	403	2,455	674
Магnezія	3,910	1073	6,76	1856	1,99	546	1,675	460
Кали	0,770	211	0,50	137	0,64	176	0,370	102
Натра	0,695	191	1,25	343	0,30	82	0,350	95
Органическихъ веществъ и химическихъ соединений воды	18,616	5108	18,16	4983	13,60	3732	18,925	5193
II. Въ числѣ нерастворимыхъ.								
Кремневой кислоты:								
а) Растворимой въ углекисломъ натрѣ	40,000	10976	32,70	8973	13,57	3724	25,000	6860
б) Нерастворимой въ углекисломъ натрѣ	693,450	190283	722,04	198128	786,37	275780	741,425	203447
Окиси желѣза	16,268	4464	15,49	4250	12,49	3427	15,010	4119
" марганца	77,588	21290	48,32	19259	0,87	239	—	—
" алюминія	3,754	1030	11,15	3060	7,17	1967	5,400	1482

Магnezія	5,105	1401	9,67	2653	8,13	2231	0,545	150
Кали	22,345	6132	23,27	6385	11,60	3183	11,360	3117
Натра	30,750	8438	18,11	10969	5,77	1583	15,535	4263
Органическихъ веществъ	45,140	12386	—	—	29,85	8191	38,900	10674
Убыли при прозаливаніи	63,756	17495	62,86	17849	43,40	11909	57,825	15867
Углерода	21,355	5860	—	—	7,90	2168	20,800	5708
Водорода	4,176	1146	—	—	1,90	521	3,925	1077
Азота	0,215	59	—	—	0,90	246	0,252	69

Растеніе, котораго развитіе находится въ такой большой зависимости отъ почвы, само оказываетъ не малое вліяніе на почву тѣмъ, что: 1) отгнѣяетъ ее тѣмъ силѣе, чѣмъ обильнѣе его листья; вслѣдствіе же этого ослабляется нагрѣвъ почвы солнечными лучами, которые падаютъ при этомъ не на почву, а на растеніи, содержащія много воды и потому поглощающія такъ много тепла, что далеко не отдають его почвѣ въ полученномъ ими отъ солнечныхъ лучей количествѣ; далѣе уменьшается излученіе теплоты и непосредственное испареніе воды изъ почвы и, наконецъ, поддерживается въ рыхломъ состояніи, слѣдовательно, легко проникаемомъ для воздуха, поверхность почвы, защищаемая листовой отъ уплотняющаго дѣйствія непосредственно выпадающей на нее дождевой воды, 2) какъ доказываются прямыми наблюденіями, засушиваетъ почву на той глубинѣ, на которую развѣиваются его корни, такъ какъ, испаряя громадные количества воды, выбираетъ ихъ корнями изъ почвы; 3) само перемѣщаетъ питательныя вещества въ почвѣ, выбирая ихъ корнями изъ болѣе глубокихъ слоевъ и переводя въ высшіе, гдѣ, по уборкѣ его, они остаются съ урожайными остатками.

Мѣстный характеръ почвы.

(Вѣтшій или започиселій.)

Одна и та же почва, по своимъ *внутреннимъ* свойствамъ (физическимъ и химическимъ, по происхожденію тѣмъ или другимъ образомъ изъ тѣхъ или другихъ горнокаменныхъ породъ и минераловъ) можетъ весьма различно относиться къ произрастающимъ на ней растеніямъ: въ одномъ случаѣ благопріятно, въ другомъ — неблагопріятно, смотря по мѣстнымъ условіямъ, въ которыхъ она находится, иначе — по *внѣшнимъ* ея свойствамъ, т. е. смотря потому, какой слой ея мѣтѣе или болѣе толстъ; какой толщины и каковаго рода слой залегаетъ подъ ней; будетъ ли она покрыта болѣе или меньшей величинами камнями, окружена горами и лѣсами и находится вблизи или вдали отъ болѣе или меньшей величины водныхъ пространствъ; будетъ ли она имѣть болѣе или мѣтѣе горизонтальное, болѣе или ме-

нѣе покатое положеніе; къ которой странѣ свѣта будетъ обращена она при покатомъ положеніи; какъ высоко будетъ находится она надъ уровнемъ моря и подъ какимъ градусомъ широты.

Твердая скалистая оболочка нашей планеты, за исключеніемъ своей сравнительно небольшой части, выходящей на поверхность земли, покрыта большей (въ низменностяхъ, глубокихъ равнинахъ) или меньшей (на возвышенностяхъ) толщины, болѣе или менѣе рыхлыми отложеніями (почвой въ болѣе обширномъ смыслѣ), которыя содержатъ болѣе или менѣе мелкихъ землястыхъ частицъ и дѣлятся на болѣе или менѣе число слоевъ весьма отличнаго другъ отъ друга характера; такъ, напр., въ такомъ порядкѣ снизу вверхъ: песчаный слой, перекрывающій отчасти сѣпнитоую, отчасти мергелистую скалу, суглинистый мергель и суглинокъ. Самый верхній слой рыхлой, землястой части земной коры можетъ быть болѣе или менѣе толстъ; его толщина бываетъ нерѣдко такъ велика (напр. отъ 5 до 20 фут.), что лишь нѣкоторая часть его проникается главной массой корней, образуя собственно *почву* или *растительный слой* (см. стр. 63) и потому слой, лежащій непосредственно подъ почвеннымъ или, такъ называемымъ, *подпочва* принадлежитъ тому же слою рыхлой части земной коры. Иногда же верхній землястой слой такъ тонокъ, что его едва лишь хватаетъ или даже не хватаетъ для развитія главной массы корней, такъ что подпочва или даже часть самой почвы принадлежитъ уже слѣдующему землястому слою. Такъ, напр., у нашихъ черноземныхъ почвъ, при значительной толщинѣ чернозема *), въ аршинѣ и болѣе, почва и подпочва принадлежатъ чернозему; при меньшей же толщинѣ его, въ 3—4 вершка, подпочва уже не принадлежитъ чернозему и даже множество корней воздушныхъ растений проникаетъ въ подчерноземный слой. У первичныхъ почвъ, при малости вывѣтривающагося слоя, можетъ и совсѣмъ не быть собственно подпочвы, если почва лежитъ прямо на скалѣ. Если почва принадлежитъ полю или огороду, такъ что она обрабатывается орудіями, то обрабатываемый орудіями или *пахатный слой* совпадаетъ съ растительнымъ, такъ какъ главная масса корней развивается преимущественно въ разрыхленномъ слое; здѣсь граница между почвой и подпочвой рѣзче, чѣмъ на дугу или на выгонѣ, гдѣ почва не обрабатывается орудіями и потому пахатнаго слоя нѣтъ. Если почва захватываетъ нѣсколько слѣдующаго за верхнимъ землястаго слоя и принадлежитъ такому уголку, которое обрабатывается,

*) Нашъ черноземъ образовался главнымъ образомъ изъ верхняго землястаго слоя земной коры, въ которому въ теченіи вѣковъ приѣхивались остатки отживавшихъ растений. Онъ самъ растительный слой, который, однако теперь въ отношеніи воздушныхъ намъ растений представляетъ верхній землястый слой земной коры.

то, конечно, эти два слоя такъ перемѣшиваются между собой въ почвѣ, что становятся уже болѣе неразличимыми.

Почва, какъ мѣсто укорененія растений и источникъ питательныхъ веществъ для нихъ, при своихъ соответствующихъ растенію физическихъ и химическихъ свойствахъ, тѣмъ лучше, чѣмъ она глубже; потому что тѣмъ болѣе пространство, въ которомъ могутъ распространяться корни, изъ котораго растенія могутъ брать пищу и въ которомъ можетъ распространяться пропикающая въ почву влага. Это же послѣднее представляетъ ту выгоду, что влага, въ случаѣ ея избытка, менѣе вредитъ растеніямъ, въ случаѣ же ея недостатка, опускается глубже въ почву, такъ что лучше сохраняется отъ испаренія. Главная масса корней развивается въ почвѣ, но нѣкоторая часть ихъ, большая или меньшая, смотря по роду растенія, глубинѣ почвы и свойствамъ подпочвы, проникаетъ въ эту послѣднюю. Поэтому подпочва имѣетъ тѣмъ болѣе вліяніе на растенія, чѣмъ мельче почва и чѣмъ болѣе она сама, по своимъ свойствамъ, восполняется и увеличиваетъ, такъ сказать, вышеприведенное дѣйствіе глубины почвы. При одинаковыхъ съ почвой свойствахъ, подпочва оказываетъ различное вліяніе на растенія, смотря по тому благоприятны или неблагоприятны для растеній свойства почвы. Въ первомъ случаѣ она дѣйствуетъ благоприятно, увеличивая болѣе или менѣе глубину почвы; во второмъ—неблагоприятно, усиливая неблагоприятное вліяніе на растенія почвы. Такъ, глинистая подпочва удерживая сильно воду, можетъ быть причиной излишней сырости плотной, глинистой же почвы, а песчаная, пропуская быстро воду, можетъ обусловить излишнюю сухость песчаной же почвы. При неодинаковыхъ съ почвой свойствахъ, подпочва оказываетъ на растенія благоприятное или неблагоприятное вліяніе. Первое, если свойства подпочвы ослабляютъ дѣйствіе дурныхъ или усиливаютъ дѣйствіе на растенія хорошихъ свойствъ почвы; такъ, напр., нѣсколько болѣе связанная суглинистая, богатая подпочва можетъ значительно ослабить вредное дѣйствіе излишней рыхлой, бѣдной песчаной почвы. Второе, если свойства подпочвы усиливаютъ дѣйствіе дурныхъ и ослабляютъ дѣйствіе на растенія хорошихъ свойствъ почвы; такъ, напр., торфяная, бѣдная питательными веществами подпочва, вбирая въ себя большое количество воды и удерживая ее очень долго, вредно дѣйствуетъ на вѣзкія почвы, дѣлая ихъ излишне влажными въ дождливыхъ мѣстностяхъ.

Подпочва, равно какъ и ниже ея лежащая, ближайшія къ ней части земной коры особенно важны потому, что онѣ, въ зависимости отъ своей большей или меньшей пропикаемости для воды, отъ своего взаимнаго положенія и своего положенія относительно горизонта, опредѣляютъ присутствіе и высоту поднятія грунтовой (пахатной)

воды въ подпочвѣ и почвѣ. Непропускающими воды можно считать: глину, мелкій мергель и самый мелкій песокъ, хрящъ содержащій много глины и желѣза и скалы, за исключеніемъ сваяжистыхъ (раковистаго известняка, мѣла) или расчлененныхъ; въ пропускающихъ же воду слояхъ можно отнести тощій суглинокъ, мергель, грубый песокъ, въ особенности хрящъ. Вода, проникая сввозъ пропускающихъ ее слоев, достигаетъ непронускающаго ее слоя и поднимается въ пропускающихъ ее слояхъ снова вверхъ, если, вслѣдствіе совершеннаго горизонтальнаго или вѣтвистаго положенія непронускающаго ее слоя, не находитъ себѣ другаго выхода; или, при наклонномъ положеніи непронускающаго слоя, двигается по нему, направляемая его паденіемъ, въ пропускающемъ ее слое до тѣхъ поръ, пока не встрѣтитъ препятствія движенію внизъ въ новомъ поднятіи непронускающаго ее слоя; тогда вода снова поднимается въ пропускающихъ ее слояхъ до тѣхъ поръ, пока не найдетъ себѣ стока или неподнимается до высоты, соответствующей высотѣ, съ которой она протекаетъ въ почву (опредѣляемой закономъ уровней жидкости въ сообщающихся сосудахъ.) Такимъ образомъ, грунтовая вода можетъ подниматься болѣе или менѣе высоко въ подпочвѣ и почвѣ, можетъ достигать поверхности земли и даже выступать на нее въ болотистыхъ почвахъ. Въ слой, котораго скважины закупорены нажимной водой, доступъ воздуха, а слѣдовательно и кислорода крайне затрудненъ; а потому находящіеся въ немъ органическія вещества для своего окисленія отнимаютъ у другихъ кислородныхъ соединений, напр., у окиси желѣза, превращая ее въ низшую степень окисленія—зависъ желѣза, которая, растворяясь въ водѣ, поднимается съ волосной водой въ тотъ слой, въ которомъ не всѣ скважины закупорены водой и въ который свободнѣе проникаетъ воздухъ, и здѣсь можетъ снова окислиться въ окисъ желѣза и выдѣлиться изъ раствора въ видѣ гидрата окиси желѣза. Первый слой—слой *разкисленія* неблагоприятный для растительности; второй—слой *окисленія*, благоприятный для растительности, тѣмъ толще чѣмъ ниже уровень грунтовой воды въ почвѣ.

Поверхность почвъ, даже наносныхъ, покрыта иногда *камнями*, нерѣдко весьма значительной величины, входящими даже довольно глубоко въ землю. Такъ, напр., въ Псковской, Новгородской, Тверской, Смоленской, Витебской губ. встрѣчаются почвы, покрытыя въ большомъ количествѣ разной величины валунами. Такия камни затрудняютъ обработку почвы и отнимаютъ пространство у воздѣлываемыхъ растений; но въ то же время они рыхлятъ глинистую почву и защищаютъ песчаную отъ переувлажненія ея частицъ вѣтрами, а, по своей малой теплоемкости и большой теплопроводности, содѣйствуютъ обогрѣванію первой и сохраненію подъ ними влаги въ послѣдней.

Горы и лѣса удерживаютъ вѣтры, а потому они вліяютъ на защищаемую ими почву, на почву долинъ различно, смотря по тому, защищаютъ ли они рыхлую или плотную, сухую или влажную почву отъ холодныхъ или теплыхъ, влажныхъ или сухихъ вѣтровъ (см. стр. 111). Они оказываютъ напр. хорошее вліяніе на сухую песчаную почву и дурное на влажную глинистую, если защищаютъ ихъ отъ теплаго и сухаго вѣтра. Защищая почву отъ вѣтра, лѣса и горы защищаютъ ее въ тоже время отъ переувлажненія ея частицъ вѣтрами, отъ сдуванія съ нея снѣга, который, какъ худой проводникъ тепла, защищаетъ, въ странахъ съ суровыми зимами, озимые посѣвы отъ поврежденія ихъ холодами. Этія объясняются, почему напр., у насъ оз. пшеница, разводима мѣстами съ успѣхомъ даже въ сѣверной, но лѣсной Олонецкой губ., не можетъ быть разводима въ южныхъ и юго-восточныхъ, но безлѣсныхъ степныхъ губерніяхъ. Подобно лѣсамъ и горамъ, хотя сравнительно слабѣ ихъ, дѣйствуютъ въ этомъ отношеніи меньшей величины возвышенности: холмы, земляные валы, живыя изгороди, даже покрывающіе почву камни, ит. д. Подъ защитой ихъ, съ сѣверной стороны ихъ долѣе держится обыкновенно снѣгъ.

Лѣсъ, покрывающій возвышенности, предупреждаетъ паводченія, такъ какъ лѣсная почва, покрытая весьма обильно растительными остатками, вбирая въ себя быстро и много воды, собираетъ выпадающую на вершины воду въ ключи, ручьи, которые, затѣмъ, постепенно питаютъ рѣки. Въ отсутствіе же лѣса на возвышенностяхъ, дождевая вода, незадерживаемая лѣсной почвой, при сильныхъ дождяхъ быстро стекаетъ съ высотъ большими массами въ рѣки, заставляя эти послѣднія выступать изъ береговъ. Кроме того, лѣсъ, съ одной стороны удерживая сильно влагу въ своей почвѣ, съ другой испаряя большое количество влаги изъ своей почвы непосредственно и чрезъ растенія, обуславливаетъ прохладу и влажность лѣснаго воздуха, который, подъ образованіемъ мѣстнаго теченія, разливается на сосѣдственныхъ съ лѣсомъ, сильно нагрѣтыхъ поляхъ. Вслѣдствіе же этого, воздушныя теченія, протекающія надъ лѣсомъ, охлаждаются и становятся влажными; а если они, при довольно высокой температурѣ ихъ, до того уже содержали довольно большое количество влаги, то, охлаждаясь надъ лѣсомъ, особенно покрывающимъ значительныя возвышенности, весьма легко разрѣшаются дождемъ, распространяющимся, чаще у небольшихъ лѣсовъ, за предѣлы лѣсной площади. Почва въ сосѣдствѣ лѣса обыкновенно влажна и потому засоряется любящими влажностью растеніями (напр. на поляхъ метлицей); а воздѣлываемыя на ней растенія подвергаются, вредному для нихъ затѣненію съ сѣверной и западной сторонъ лѣса и повреждаются улитками и птицами.

Вслѣдствіе большой теплоемкости воды, *водоемы*, находящіеся

въ сосѣдствѣ съ почвой, оказываютъ на эту послѣднюю значительное, хотя и весьма различное вліяніе, смотря по тому, какъ они велики и замерзаютъ ли зимой ихъ поверхность или нѣтъ. Такъ, приморскія страны (Западная Европа) имѣютъ влажный и умеренный климатъ съ большимъ числомъ, хотя и менѣе сильныхъ дождей, съ большимъ числомъ пасмурныхъ дней, уменьшающихъ пользованіе для растений свѣтомъ, съ умеренно теплымъ лѣтомъ и умеренно холодной зимой; тогда какъ удаленныя отъ моря, континентальныя страны (Россія) отличаются, чѣмъ дальше отъ моря, тѣмъ болѣе сухимъ и суровымъ климатомъ съ меньшимъ числомъ, хотя часто весьма обильныхъ дождей (снѣговъ), съ большимъ числомъ ясныхъ дней, отчего усиливается для растений пользованіе свѣтомъ, съ болѣе жаркимъ лѣтомъ и холодной зимой. Почвы морскаго побережья находятся втеченіе ночи, часто же и всей зимы, подъ постояннымъ вліяніемъ мѣстнаго влажнаго вѣтра съ моря. Впрочемъ, каждый вѣтеръ, достигающій почвы непосредственно по проходѣ надъ водоемомъ, достигаетъ ея съ содержаніемъ влаги въ воздухѣ, увеличившимся болѣе или менѣе, смотря по длинѣ пройденнаго имъ надъ водой пути. Близость такихъ водяныхъ пространствъ, какъ внутреннія озера, рѣки, болота, которые замерзаютъ на зиму, имѣетъ иное вліяніе на климатъ, а слѣдовательно и на почву; они умеряютъ лѣтніе жары, но не зимніе холода. При большой влажности и умеренности климата выигрываетъ сухая песчаная и теряетъ влажная глинистая почва. Наконецъ, близость водоемовъ можетъ имѣть вліяніе на содержаніе въ почвѣ нажимной воды: если пропускающіе воду слои будутъ открываться въ берегъ водоема, то, въ случаѣ находящійся подъ ними непроникающій воды слой будетъ лежать выше уровня воды въ водоемѣ и имѣть покатость въ сторону этого послѣдняго, проникающая до него въ почву вода будетъ стекать въ водоемъ; въ случаѣ же онъ будетъ лежать ниже уровня воды въ водоемѣ, вода изъ этого послѣдняго, напротивъ, будетъ проникать въ пропускающіе воду слои и подниматься въ нихъ до высоты, отстоящей отъ уровня воды въ водоемѣ.

Почва можетъ имѣть болѣе или менѣе *горизонтальное*, болѣе или менѣе *покатое положеніе*. Пригоризонтальномъ положеніи, она обыкновенно глубже и богаче мелкими частями, такъ какъ въ этомъ положеніи эти послѣднія не удаляются изъ нея водными потоками; напротивъ, количество ихъ въ почвѣ при такомъ условіи можетъ даже увеличиваться наносомъ ихъ сюда водой съ болѣе возвышенныхъ мѣстъ, если такіе имѣются вблизи почвы съ горизонтальнымъ положеніемъ. Обработка горизонтальной почвы легче и возможна въ различныхъ направленіяхъ; движеніе по ней съ нагруженными возами незатруднительно. Но за то, почва, при горизонтальномъ по-

женіи, легче можетъ страдать отъ излишка воды, хотя этотъ послѣдній большей частью можетъ быть устраненъ осушкой. Почва, имѣющая покатое положеніе, теряетъ мелкія частицы, уносимыя водой; а потому она большей частью мелка и бѣдна мелкими частицами; обработка ея затруднительна, въ особенности въ различныхъ направленіяхъ, равно какъ затруднительно движеніе по ней нагруженныхъ повозокъ. Но, зато, она рѣже страдаетъ отъ избытка влаги, чаще же отъ засухъ, даже иногда при большей ея плотности, такъ какъ вода, прежде нежели проникаетъ въ нее, стекаетъ съ ея поверхности. Впрочемъ, на покатой почвѣ легче можно примѣнить орошеніе. Въ затрудненіи покатого положенія, почти несуществующія при пезначительности угла наклоненія къ горизонту, увеличиваются съ увеличеніемъ этого угла, такъ что, при величинѣ его въ 30° , обработка почвы плугомъ и бороной дѣлается невозможной; въ $30-40^\circ$, почва должна быть обращена подъ лугъ, такъ какъ разрыхленіе ея обработкой влекло бы за собой сносъ частицъ ея, размывъ ея водой; выше $40-50^\circ$, почва теряетъ даже песчанія частицы, увлекаемыя внизъ уже собственной ихъ тяжестью, а потому пригодна лишь для разведенія лѣса; впрочемъ, террасовка въ этомъ случаѣ, которая уменьшаетъ покатость отдѣльныхъ площадокъ, позволяетъ пользоваться ими для луга, даже для поля съ ручной обработкой земли; преимущественно же для разведенія плодовыхъ деревьевъ и въ особенности винограда; наконецъ, при величинѣ угла наклоненія къ горизонту въ $50-60^\circ$, о почвѣ собственно и рѣчи быть не можетъ, такъ какъ такая покатость представляетъ лишь голую скалу, въ трещинахъ и углубленіяхъ которой можетъ корениться лишь уродливая сосна или береза. Покатая площадь, конечно, больше горизонтальной ея проекціи и потому представляетъ больше мѣста для развѣтлѣнія растений, чѣмъ эта послѣдняя. Различіе же въ нагрѣваніи покатой и горизонтальной почвъ солнечными лучами, вслѣдствіе различія въ величинѣ угла, подъ которымъ солнечные лучи падаютъ на покатую и горизонтальную почвы въ различные времена года и дни, исчезающе мало, какъ показываютъ прямыя наблюденія надъ температурой почвы въ томъ и другомъ положеніи при одинаковыхъ остальныхъ условіяхъ.

Гораздо сильнѣе вліяніе покатости почвы въ зависимости отъ *страны свѣта, къ которой она обращена*; такъ какъ этимъ обусловливается различіе въ количествахъ свѣта, теплоты и влаги, получаемыхъ почвой, а слѣдовательно и занимающимъ ее растеніемъ. На покатости, обращенной къ В. почва пользуется солнечнымъ освѣщеніемъ съ утра и до полудни; при чемъ она, а слѣдовательно и воздухъ нагрѣваются весьма сильно, такъ какъ освѣщеніе постоянно усиливается: еще сильнѣе нагрѣвается почва на покатости, обра-

щенной къ Ю. В., и наиболѣе сильно — на покатоcти, обращенной къ Ю., гдѣ она освѣщается цѣлый день. Нагрѣваніе почвы слабѣетъ на покатоcти, обращенной къ ЮЗ., въ особенности къ З., такъ какъ здѣсь, хотя и достигаютъ еще почвы горячіе полуденные солнечные лучи, но они достигаютъ ея тогда, когда она еще холодна, и когда сила ихъ затѣмъ начинаетъ постоянно слабѣть. На покатоcтихъ, обращенныхъ къ СЗ., С и СВ., почва пользуется уже только мало согрѣвающими ея утренними и вечерними солнечными лучами. Точно также различны и вѣтры, которымъ отирается почва на покатоcтихъ, обращенныхъ къ той или другой сторонѣ свѣта, хотя вѣтеръ, въ отношеніи температуры и влажности приносимаго имъ воздуха, весьма различенъ; смотри по свойствамъ мѣстностей, черезъ которыя онъ проходитъ; тѣмъ не менѣе, говоря вообще, можно сказать, что у насъ сѣверные и сѣверовосточные и восточные скаты открыты холоднымъ и сухимъ, юговосточные и южные — теплымъ и сухимъ, югозападные и западные — теплымъ и влажнымъ, а сѣверо-западные — холоднымъ и влажнымъ вѣтрамъ; западные и сѣверо-западные, сверхъ того, особенно сильными вѣтрамъ. Вліяніе обращенія ската къ той или другой сторонѣ свѣта тѣмъ сильнѣе, чѣмъ выше, и тѣмъ слабѣе, чѣмъ ниже возвышенность, образующая скаты, и чѣмъ болѣе — въ первомъ и чѣмъ менѣе обширна площадь ската во второмъ случаѣ. Понятно, что сухая и рыхлая почва будетъ выигрывать, а влажная и плотная терять отъ положенія на скатъ, который подпергаетъ ихъ нестоль сильному нагрѣву и открываетъ ихъ нестоль сильнымъ, теплымъ и сухимъ вѣтрамъ. На сѣверныхъ скатахъ растенія найдутъ болѣе короткий періодъ времени, благоприятнаго для ихъ развитія, такъ какъ, при продолжительности здѣсь зимы, весна открывается поздно; на южныхъ же на оборотъ. Не смотря на это преимущество южныхъ и юговосточныхъ скатовъ, они представляютъ два весьма важныя неудобства для растеній, а именно: вслѣдствіе ранняго стаиванія снѣга и оттаиванія почвы, здѣсь усиливается вредъ, замѣчаемый впрочемъ, и на равнинахъ, но въ меньшей степени, и причиняемый замерзаніемъ вновь оттаившей почвы при ночныхъ морозахъ. Такъ какъ это повторится нѣсколько разъ и при этомъ каждый разъ почва попеременно то раздается, то сжимается, то изъ нея выдергиваются, обнажаются и разрываются даже корни молодыхъ озимыхъ растеній, которые, вслѣдствіе этого, легко погибаютъ. Но, гораздо существеннѣе, можетъ быть, другое неудобство въ особенности восточнаго, юговосточнаго отчасти же и южнаго скатовъ, которое заключается въ томъ, что растенія, захваченныя утреннимъ, подвергаются здѣсь непосредственно сильному нагрѣву утреннихъ солнечныхъ лучей, и черезъ то погибаютъ; такъ какъ растенія погибаютъ нестолько отъ замерзанія, сколько отъ быстрого вслѣдъ затѣмъ оттаиванія подъ вліяніемъ солнечнаго освѣщенія.

Возвышеніе надъ уровнемъ моря *) имѣетъ значительное вліяніе на свойства почвы и значительно измѣняетъ вліяніе почвы на растеніе. Съ возвышеніемъ надъ уровнемъ моря, на каждыя 600 фут. подъема, средняя годовая температура понижается приблизительно на 1° Ц., вслѣдствіе, главнымъ образомъ, уменьшающейся плотности и увеличивающейся вслѣдствіе этого теплоемкости воздуха въ высшихъ частяхъ атмосферы. Вслѣдствіе же, главнымъ образомъ, значительнаго излученія теплоты на высотахъ, дневныя и годичныя колебанія температуры воздуха и почвы гораздо значительнѣе на возвышенныхъ, чѣмъ въ болѣе низменныхъ мѣстахъ. На плоскихъ возвышенностяхъ и въ особенности въ срединѣ ихъ, при значительномъ ихъ протяженіи, температура гораздо выше, чѣмъ на горныхъ вершинахъ, при одинаковомъ возвышеніи надъ уровнемъ моря тѣхъ и другихъ; это обуславливается главнымъ образомъ, тѣмъ, что на плоскихъ возвышенностяхъ воздухъ нагрѣвается сильнѣе, чѣмъ на горныхъ вершинахъ, вслѣдствіе того, что онъ остается здѣсь долѣе въ соприкосновеніи съ нагрѣтой почвой, чѣмъ на послѣднихъ. Что касается условій влажности, то на высотахъ испареніе воды съ одной стороны ослабляется вслѣдствіе болѣе низкой температуры, съ другой усиливается вслѣдствіе меньшаго давленія воздушнаго столба; сравнительно же холодный воздухъ на возвышенностяхъ скорѣе насыщается водяными парами. Поэтому, въ зависимости отъ температуры воздуха на возвышенностяхъ, при болѣе низкой температурѣ на горныхъ вершинахъ, почва будетъ здѣсь влажнѣе вслѣдствіе большаго обилія дождей и меньшаго испаренія влаги изъ нея. При болѣе же высокой температурѣ на плоскихъ возвышенностяхъ, она будетъ суше вслѣдствіе усиленнаго испаренія воды изъ нея; но она можетъ получать здѣсь влагу въ видѣ росы, которой образованіе здѣсь можетъ быть весьма значительно при значительныхъ колебаніяхъ въ температурѣ. Въ первыхъ условіяхъ будутъ имѣть преимущество почвы сухія и рыхлыя, во вторыхъ — почвы болѣе вязкія, сильнѣе удерживающія воду. Собственный источникъ теплоты у почвъ на возвышенностяхъ довольно слабъ, такъ какъ разложеніе перегноя происходитъ здѣсь весьма слабо, вслѣдствіе недостатка теплоты. Условія температуры и влажности въ долинахъ опредѣляются также возвышеніемъ надъ уровнемъ моря, но еще болѣе вѣтрами, для которыхъ онѣ открываются и отъ которыхъ онѣ защищаются окружающими ихъ горами (см. стр. 137). На возвышенностяхъ (выше 1000 фут., надъ

*) Оно опредѣляетъ низменныя и возвышенныя мѣста; какъ та, такъ и другія могутъ представлять значительныя равнины, называемыя въ первомъ случаѣ глубокими равнинами или низменностями, во второмъ высокими равнинами или плоскими возвышенностями. Меньшаго размѣра низменныя мѣста, заключенныя между горъ, образуютъ долины, котловины, меньшаго размѣра возвышенности — острогогія или горныя вершины.

уровнемъ моря — для Германіи) преобладаютъ болѣе мелкія, бѣдныя мелкими частицами первичныя почвы, въ низменностяхъ (ниже 600 фут.) болѣе глубокія, болѣе богатые мелкими частицами наносныя почвы. Съ возвышеніемъ надъ уровнемъ моря уменьшается толща земной части земной коры, которая въ низменностяхъ достигаетъ иногда сотней футовъ. Наконецъ, на возвышенностяхъ почва подвергается болѣе сносу своихъ частей водой и вѣтрами, въ долинахъ — въ особенности наводненіямъ, которыя заносятъ ее болѣе или менѣе крупными частями; на открытыхъ, обширныхъ равнинахъ — перемѣщенію вѣтрами (дюны), выдуванію мелкихъ ея частицъ (наши легкія черноземныя почвы).

Шифта мѣста, въ связи съ большимъ или меньшимъ удаленіемъ отъ моря, опредѣляетъ главнымъ образомъ различныя условія температуры и влажности низменностей, обширныхъ глубокихъ равнинъ, а, слѣдовательно — и различное отношеніе находящихся здѣсь почвъ къ растенію. Континентальный или морской климатъ (см. стр. 138) дѣлается вообще суровѣе въ большихъ широтахъ.

Классификація почвъ и почвенныя карты.

Почву можно разсматривать какъ естественное тѣло, независимо отъ значенія, которое она имѣетъ для растеній и человека, производящаго растенія. Какъ такое, она представляетъ массу съ извѣстными физическими свойствами, извѣстнаго химическаго состава, образовавшуюся изъ тѣхъ или другихъ минераловъ и горнокаменныхъ породъ, тѣмъ или другимъ образомъ. Но, отношеніе почвы къ растенію опредѣляется не одними внутренними свойствами, но и вѣшными, т. е. мѣстными условіями, въ которыхъ она находится; которыя опредѣляютъ не только возможное, но и дѣйствительное ея состояніе, не только, напр., влагоемкость — способность ея задерживать то или другое количество воды, но и дѣйствительное содержаніе въ ней воды — ея влажность; которыми, слѣдовательно рѣшается ея пригодность для воздѣлыванія того или другаго растенія и которыя, поэтому, могутъ быть названы *техническими* свойствами почвы. Почва, въ глазахъ человека, воздѣлывающаго на ней растенія, имѣетъ еще другое свойство — производить то или другое растеніе болѣе или менѣе выгодно для него, съ большимъ или меньшимъ избыткомъ валоваго сбора ея произведеній надъ затратами, которыя сдѣланы имъ для ихъ полученія. Такое свойство опредѣляется положеніемъ почвы въ извѣстномъ отдаленіи отъ мѣста сбыта произведеній, отъ мѣста полученія рабочихъ, строительныхъ матеріаловъ, матеріаловъ для улучшенія почвы, отъ путей сообщенія, отъ состоянія государственнаго хозяйства страны и т. д. Эти свойства почвы суть также вѣшныя ея свойства, но въ отличіе отъ техниче-

скихъ мы назовемъ ихъ *экономическими*, такъ какъ они опредѣляютъ цѣнность почвы въ зависимости отъ доставляемаго ею чистаго дохода. Понятно, что экономическая цѣнность почвы зависитъ много отъ ея технической пригодности, которая въ свою очередь зависитъ отъ внутреннихъ свойствъ почвы, но обратной зависимости нѣтъ.

Классификація почвъ, какъ и другихъ предметовъ, имѣетъ цѣлю доставить возможность указаніемъ мѣста, которое занимаетъ въ ней та или другая почва, составить себѣ возможно полное понятіе о почвѣ, т. е. ея признакахъ или свойствахъ, и чтобы имѣть возможность лучше обнять все разнообразіе существующихъ почвъ. Слѣдовательно, та классификація, которая будетъ давать понятіе о почвѣ, какъ о естественномъ тѣлѣ, будетъ классификаціей *естественно-научной* или просто *научной*; та, которая будетъ давать понятіе о технической пригодности почвы, будетъ классификаціей *технической* и, наконецъ, она будетъ *экономической*, если по мѣсту, занимаемому въ ней почвой, можно судить о доходности почвы. Послѣ сказаннаго выше ясно, что послѣдняя классификація должна вытекать изъ второй, какъ вторая изъ первой; что техническая и экономическая классификаціи, принимающія во вниманіе мѣстныя условія, не могутъ имѣть той общности, той повсемѣстной примѣняемости, какъ классификація научная, и что экономическая, принимающая во вниманіе, такъ сказать, еще болѣе мѣстныя условія, чѣмъ техническая, имѣетъ и еще болѣе мѣстный характеръ чѣмъ эта послѣдняя.

Каждая классификація соединяетъ отдѣльные предметы, по степени сходства между ними, сперва въ меньшія группы, изъ которыхъ, затѣмъ, образуетъ большія, изъ этихъ же послѣднихъ еще большія и т. д. Степень же сходства предметовъ опредѣляется числомъ и существенностью для предметовъ одинаковыхъ у нихъ признаковъ. Чѣмъ болѣе у предметовъ одинаковыхъ признаковъ, къ тому же чѣмъ болѣе въ числѣ этихъ послѣднихъ, кромѣ болѣе существенныхъ, еще и менѣе существенныхъ для нихъ, тѣмъ болѣе сходства между предметами. Признаки же тѣмъ существеннѣе для предмета, чѣмъ тѣснѣе связаны они съ его существованіемъ, чѣмъ болѣе зависятъ отъ нихъ другихъ признаковъ; а у почвы, постоянно претерпѣвающей измѣненія, чѣмъ болѣе постоянны они сверхъ того. По этому, чѣмъ болѣе группа, тѣмъ существеннѣе должны быть признаки, по которымъ соединяются въ нихъ предметы. У почвы наиболѣе существенны геологическіе признаки, которые сообщаютъ ей ея происхожденіе тѣмъ или другимъ образомъ; за ними слѣдуютъ: геогностическіе и минералогическіе, которые она заимствуетъ отъ горныхъ породъ и минераловъ, изъ которыхъ образовалась затѣмъ физическіе, которые въ значительной степени зависятъ и отъ образа происхожденія почвы и отъ матеріала, изъ котораго она образо-

вадась, и, наконец, химические, которые зависят весьма значительно от предыдущих признаков, но сами почти не определяют их, к тому же они наименее постоянны и наименее разнообразны.

Въ природѣ, можно сказать, нѣтъ границъ; и, конечно, всѣ границы, устанавливаемые ограниченнымъ пониманіемъ человека, болѣе или менѣе искусственны; а потому всякая классификація, на сколько она имѣетъ задачей установить границы, искусственна, и тѣмъ болѣе искусственна, чѣмъ болѣе искусственны эти границы. Поэтому, въ относительномъ смыслѣ можно различать *естественную* и *искусственную* классификаціи. Въ первыхъ предметы получаютъ свои мѣста на основаніи болѣе существенныхъ для нихъ признаковъ; во вторыхъ же—на основаніи мало существенныхъ и даже часто во все несущественныхъ для самаго предмета признаковъ, если только эти послѣдніе существенны для человека, пользующагося этими предметомъ, или же, по крайней мѣрѣ, наиболѣе разнообразными для человека. Понятно, что основаніи для размѣщенія предметовъ въ естественной классификаціи требуютъ болѣе полного знанія предметовъ, знанія большого числа признаковъ и отношеній между ними; размѣщеніе же предметовъ въ искусственной классификаціи не требуетъ этого въ такой степени, и потому классификаціи вначалѣ искусственныя, становятся тѣмъ болѣе естественными, чѣмъ болѣе расширяется знаніе предметовъ.

Какъ примѣръ *искусственной научной* классификаціи почвъ можно привести классификацію *Фаллу*, измѣненную *Шюблеромъ*, по которой всѣ почвы дѣлятся на восемь классовъ, а именно:

классы: почвы: содержатъ:

I	Глини- стая	болѣе 50% глины
II	Суглин- стая	отъ 30 до 50% "
III	Песчаносу- глинистая	" 20 " 30% "
IV	Суглинесто- песчаная	" 10 " 20% "
V	Песчаная	" 0 " 10% "

каждый изъ этихъ классовъ дѣлится на два порядка почвъ, содержащихъ извести и содержащихъ ихъ отъ 0,5 до 5%; каждый же порядокъ на три разряда почвъ:

бѣдныхъ, содержащихъ перегной отъ 0,0 до 0,5%
достаточныхъ, " " " 0,5 " 1,0%
богатыхъ, " " " 1,5 " 5,5%

каждый изъ этихъ классовъ дѣлится на пять порядковъ почвъ: мергелисто- и известково-

глини-
стыхъ, съ болѣе 50% глины
сугли-
нисто-
стыхъ, " 30 до 50% "

бѣд-
ныхъ, съ 0,0—0,5% пере-
гноя

доста-
точ-
ныхъ, " 0,5—1,5% "

бѣд-
ныхъ, " 1,5—5,5% "

мергелистыхъ съ болѣе 5% перегноя и дѣлящихся на три разряда: глинистыхъ съ болѣе 50%, суглинистыхъ съ 30—50% и песчаныхъ съ 20—30% глины.

VI	Мергели- стая	" 5 " 20% извести
VII	Извест- ковая	болѣе 20% "

VIII *Перегнойная* болѣе 5% перегноя, которая дѣлится, по качеству заключающагося въ ней перегноя, на три разряда почвъ, содержащихъ *хороший* перегной, *хлѣбный* перегной и *малоразложившіеся растительные остатки* (торфяная почва). Первые же два разряда дѣлятся каждый на три разряда почвъ: *глинистыхъ* съ болѣе 50%, *суглинистыхъ* съ 30—50% и *песчаныхъ* съ 20—30% глины.

Остальное содержаніе всѣхъ почвъ, за исключеніемъ глины, извести и перегноя, составляетъ песокъ. Всѣхъ классовъ 8, порядковъ 23 и разрядовъ 67.

Какъ примѣръ *естественной научной* классификаціи почвъ можно привести классификацію *Фаллу*, который дѣлитъ всѣ почвы, по образу ихъ происхожденія, на два класса почвъ: *первичныя* и *вторичныя*. Между *первичными* онъ различаетъ шесть родовъ почвъ, по происхожденію ихъ изъ горныхъ породъ съ тѣми или другими характерными составными частями, а именно:

роды:	почвы образованія изъ горныхъ породъ:	въ составѣ которыхъ характерны:	сколько видовъ въ родѣ.
I	кварцевыхъ	кремнеземъ	8.
II	глинистыхъ	кремнеземъ, глина	4.
III	слюдяныхъ	магнезія, глина, кремнеземъ	4.
IV	полевикамистыхъ	глина, кали, кремнеземъ	6.
V	известковыхъ и известково-магнезиальныхъ	известъ и известъ и магнезія	2.
VI	автотомыхъ и родо-обмываемыхъ	известъ, магнезія, глина, желѣзо, кремнеземъ.	3.

Нѣкоторые виды имѣютъ разности. Какъ виды, такъ и разности представляютъ дальнѣйшее различеніе почвъ одного и того же рода по принадлежності горной породы, изъ которой образовалась почва, тому или другому члену водной или вулканической части земной коры. Такъ напр. въ I родѣ почвъ различаются почвы, образовавшіяся изъ: *глинистаго камня* или *порфироваго туфа*, *глинистаго сланца*, *сыроватковаго сланца* и *глинисто-мергелеваго сланца* съ разностью почвъ, образовавшихся изъ нѣсколько отличной отъ послѣдней горной породы—*сланцевой глины*. Или, въ IV родѣ различаются почвы, образовавшіяся изъ *гранита*, *гранулита* (разность: изъ *фелзитоваго шейса*), *сикити*, *порфира*, *туркити* и *фонолита*.

Между *вторичными* почвами *Фаллу* различаетъ только четыре рода почвъ, по характернымъ химическимъ составнымъ частямъ:

I	<i>Кремнистыхъ</i> ,	характеризующихся содержаніемъ кремнезема, съ 3 видами: <i>силикатовыхъ</i> , содержащихъ почти исключительно кварцевый (неизмѣняющійся) и <i>силикатовыхъ</i> , содержащихъ обильно съ кварцевымъ и силикатовымъ (измѣняющійся) песокъ; послѣдніе могутъ быть совершенно <i>бесвязны</i> (разности: <i>хрящевая</i> , <i>раковинная</i> , <i>голышная</i>) и нѣсколько <i>связны</i> (разность: <i>связная хрящевая</i>).
II	<i>Мергелистыхъ</i> ,	характеризующихся содержаніемъ извести и глины, съ 4 видами: <i>известково-глинисто-песчаной</i> (разность: <i>хрящевая</i>) и <i>магнезиально-глинисто-песчаной</i> (разность: <i>хрящевая</i>).

- III *Суглинистые*, характеризующихся содержанием кремнезема, глины и гидрата окиси железа в 2 видах: обыкновенных суглинистых (разности: глинисто- и слюдяно-суглинистых) и подзоло-суглинистых почв.
- IV *Болотно-черноземных (согровых)* характеризующихся содержанием перегнойной глины извести и кремнезема в 4 видах: глинистых, суглинисто-песчаных, известковых (разности: с большим содержанием железа кварцевых зерен и доломита) и песчаных согровых почв.

Къ этимъ 40 видамъ почвъ Фаллу присоединяетъ еще особый отдѣлъ изъ 4-хъ видовъ почвъ, которыя не могли быть помѣщены въ предшествующіе роды, именно: почвы образуемыя вулканическими шлаками и золой, нагроможденіями заносныхъ (эриатическихъ) камней, нагроможденіями рыхлыхъ валуновъ и торфяными болотами.

Научныя классификаціи почвъ имѣютъ еще много недостаточнаго, хотя послѣднія изъ приведенныхъ двухъ представляетъ значительный успѣхъ. А потому здѣсь было бы неумѣстно болѣе подробное разсмотрѣніе ихъ съ ихъ достоинствами и недостатками, представляющее весьма много интереснаго въ научныхъ, но пока мало непосредственно интереснаго въ практическомъ отношеніи. Тѣмъ не менѣе мы должны разсмотрѣть здѣсь ближе свойства пяти главныхъ группъ почвъ, а именно: глинистыхъ, суглинистыхъ, песчаныхъ, известковыхъ и перегнойныхъ, которыхъ различіе встрѣчается такъ или иначе въ каждой научной классификаціи и переходитъ отсюда во всѣ техническія и экономическія классификаціи.

Глинистыя и *суглинистыя* болѣе связныя почвы, которыхъ свойства зависятъ отъ значительнаго содержанія иловатыхъ частицъ и, между этими послѣдними, главнымъ образомъ, глины, и затѣмъ некристаллической кремневой кислоты и гидрата окиси железа (см. стр. 57); песчаная же часть ихъ состоитъ изъ весьма различной величины частицъ, отъ такого мелкаго песка, который отдѣляется лишь при продолжительномъ кипяченіи почвы съ водою, до хрипелыхъ обломковъ горнокаменныхъ породъ. Суглинистыя почвы, сравнительно съ глинистыми, содержатъ не всегда менѣе иловатыхъ и болѣе песчаныхъ частицъ, но всегда между иловатыми болѣе некристаллической кремневой кислоты и гидрата окиси железа, а между песчаными болѣе крупныхъ песчаныхъ и хрипелыхъ частицъ; а потому онѣ всегда рыхлѣе глинистыхъ. *)

Глинистыя почвы имѣютъ сравнительно небольшой удѣльный, объемный вѣсъ, но зато представляютъ весьма значительное сдѣле-

*) Нѣкоторые (Фаллу) вовсе не различаютъ между неопсыными почвами глинистыхъ и суглинистыхъ почвъ, вслѣдствіе малой характерной между ними разницы и, оставляя за болѣе плотными наносными почвами названіе суглинистыхъ, присовокупляютъ названіе глинистыхъ только перичнымъ почвамъ, образовавшимся изъ глинистыхъ горныхъ породъ (родъ 2 I класса, классъ Фаллу).

ніе частицъ, сильно прилипаютъ къ орудіямъ и потому трудно обрабатываются и, въ этомъ послѣднемъ отношеніи, называются *тяжелыми* почвами. Онѣ весьма влагоемки—задерживаютъ водосной воды 70—80% своего вѣса, поднимаютъ ее высоко, но медленно, равно какъ медленно пропускаютъ воду, и насыщенныя водой дѣлаются вязкими, почти непроницаемыми для воды и амміака, трудно отдають разъ принятую ими воду—иначе, медленно просыхаютъ; при высыханіи же образуютъ трещины и чрезвычайно твердѣютъ. Вслѣдствіе содержанія въ нихъ большаго количества иловатыхъ частицъ, эти послѣднія, при сильныхъ дождяхъ, взмучиваясь въ дождевой водѣ, проникаютъ въ болѣе крупныя скважины почвы и закупориваютъ почву съ поверхности; отчего глинистыя почвы какъ говорятъ, *заплываютъ*, а при просыханіи, образуютъ такъ называемую *кору*. Онѣ нагреваются медленно, особенно при содержаніи большаго количества воды, но охлаждаются сравнительно быстро подъ вліяніемъ своего болѣе темнаго цвѣта; почему называются *холодными* почвами. При затруднительномъ доступѣ въ нихъ воздуха и сравнительно низкой температурѣ ихъ, особенно если онѣ содержатъ въ избыткѣ воду, органическія остатки разлагаются въ нихъ очень медленно и потому перегной накапливается въ нихъ сравнительно легко. Глинистыя почвы задерживаютъ весьма сильно растворенныя вещества изъ растворовъ, и потому выщелачиваются весьма трудно, а почвенная жидкость ихъ представляетъ сравнительно слабый растворъ. Наконецъ, глинистыя почвы, которыхъ глинистая часть происходитъ изъ минераловъ, богатыхъ щелочами и щелочными землями, представляютъ почвы болѣею частью *богатыя*, такъ какъ содержатъ обыкновенно въ большомъ количествѣ обокъ съ невыщипанными еще обломками этихъ минераловъ, тронутыхъ уже выщипываніемъ части ихъ и сильно задерживаемыхъ почвой продукты ихъ выщипыванія.

Суглинистыя почвы, по своимъ свойствамъ, какъ и по своему составу, составляютъ переходъ отъ глинистыхъ почвъ къ песчанымъ, стоя, однако, ближе къ первымъ и оставая на пути къ песчанымъ мѣсто для почвъ, изъ которыхъ иногда образуютъ еще двѣ группы почвъ: *песчано-суглинистыхъ* и *суглинисто-песчаныхъ*, иногда же одну *супесчаныхъ*. Сюда же, къ этому промежутку, относятся весьма распространенныя у насъ (Могилевская губ. Горечій уѣздъ, напр.) почвы, которыя содержатъ большое количество чрезвычайно мелкаго кварца, при сравнительно небольшомъ даже содержаніи глинистыхъ или вообще иловатыхъ частицъ; онѣ отлчаются болѣею сравнительно съ песчаными почвами связностію; потому сѣрымъ или сѣроватымъ цвѣтомъ, вслѣдствіе содержанія въ нихъ въ большомъ

количество безцветных кварцевых зерен и въ небольшомъ—окисловъ желѣза и органическихъ остатковъ, почему называются *подзолисто-суглинистыми* или *подзолистыми*, смотря по меньшему или большому содержанию въ нихъ такого мелкаго кварца; наконецъ, *припадливостью*, какъ называютъ свойство этихъ почвъ уплотняться въ самомъ верхнемъ своемъ слое при сильныхъ дождяхъ, вслѣдствіе опусканія удобоподвижныхъ и въскныхъ кварцевыхъ частицъ при содѣйствіи воды.

2) *Песчаная и хрящевая* болѣе легкія почвы, состоящая преимущественно изъ песчаныхъ или хрящевыхъ частицъ, между которыми преобладаютъ кварцевыя зерна, но содержатся также и довольно часто въ нѣсколько большемъ количествѣ обломки другихъ минераловъ и горныхъ породъ (полевого шпата, слюды, роговой обманки, сіенита, известняка). Пока эти послѣдніе сохраняются въ своемъ первоначальномъ видѣ минерала или горной породы, они играютъ въ нѣ роль кварцеваго песка. Но, дѣйствіемъ выветриванія, они могутъ въ теченіи времени измѣниться и образовать глинистыя части (см. стр. 79—84), которые могутъ сообщить почвѣ нѣкоторую связность.

Песчаная почва, въ противоположность глинистымъ, имѣютъ довольно большой удѣльный, объемный вѣсъ, но за то весьма малое сѣщленіе частицъ и не прилипаютъ къ орудіямъ, почему легко обрабатываются орудіями и въ этомъ смыслѣ называются *легкими* почвами. Онѣ мало влагоемки—задерживаютъ волосной воды не болѣе 20—30% своего вѣса, поднимаютъ волосную воду невысоко, но скоро, равно какъ скоро пропускаютъ ее сквозь себя, и насыщенныя водой, представляютъ нѣкоторую связность только при большой влажности зерна, а потому проицаемы для воды и не мажутся. Газы онѣ поглощаютъ весьма слабо; разъ принятую воду отдаютъ легко—иначе, просыхаютъ быстро и, при просыханіи, не образуютъ трещинъ и не твердѣютъ. Онѣ нагреваются скоро и удерживаютъ теплоту долго подъ вліяніемъ большей частию сѣтлаго ихъ цвѣта; поэтому называются *теплыми*. При легкомъ доступѣ въ нихъ воздуха, высокой сравнительно температурѣ ихъ, органическіе остатки разлагаются въ нихъ довольно скоро; а потому перегной накапливается въ нихъ сравнительно трудно. Песчаная почва слабо задерживаетъ растворенныя вещества изъ растворовъ и потому легко выщелачиваются, а почвенная жидкость въ нихъ представляетъ сравнительно вѣршій растворъ. Наконецъ, песчаная почва большей частию почвы *бѣдная*, потому что содержатъ много кварца, обломки же другихъ минераловъ большей частию въ невыветрившемся состояніи и слабо задерживаютъ продукты выветриванія.

Известковая и мергельная, въ особенности послѣдняя почва весьма различна, смотря потому, къ чему и въ какомъ состояніи при-

мѣшивается углекислая известь. Въ мелкомъ земляномъ состояніи, она, примѣшиваясь въ меньшемъ количествѣ (отъ 5 до 20%) образуетъ различныя (отъ песчаныхъ до глинистыхъ) *мергельныя* почвы; въ большемъ же количествѣ (свыше 20%)—различныя *известковыя* почвы. *Песчано-известковыя* почвы она образуетъ тогда, если содержится въ почвѣ въ состояніи песчаныхъ или хрящевыхъ обломковъ, известковыхъ силикатовъ или горныхъ породъ. Эти послѣднія почвы, по своимъ свойствамъ, подходятъ къ песчанымъ почвамъ, хотя еще менѣе этихъ послѣднихъ благоприятны для растений. Въ мелкомъ земляномъ состояніи, въ какомъ известь встрѣчается въ мергельныхъ, въ мѣловыхъ или въ почвахъ, образуемыхъ вполне выветрившимися известняками, она представляетъ благо или сѣтлаго цвѣта тощую массу, которая по своимъ свойствамъ, занимаетъ средину между глиной и пескомъ. Подобно глинѣ, она задерживаетъ большія количества волосной воды; но насыщенная водой не дѣлается непроницаемой для воды и скорѣе глины пропускаетъ сквозь себя и испаряетъ воду. Она имѣетъ большую связность частицъ чѣмъ песокъ, но меньшую чѣмъ глина и гораздо меньше этой послѣдней уменьшается въ объемѣ при высыханіи. Она нагревается весьма медленно, но за то при своемъ цвѣтѣ и охлаждается весьма медленно; сѣтдовательно *тепла*; она быстро разлагаетъ органическія вещества, посему препятствуетъ накопленію въ почвѣ перегной, и гораздо слабѣе глины и перегной поглощаетъ газы и задерживаетъ растворенныя вещества изъ растворовъ. Поэтому, примѣшиваясь къ тяжелымъ почвамъ въ нѣсколько большемъ количествѣ, она дѣлаетъ ихъ болѣе рыхлыми, менѣе связными, открываетъ ихъ для доступа воды, воздуха и теплоты; а, примѣшиваясь къ оочвамъ легкимъ и богатымъ перегноемъ въ нѣсколько меньшемъ количествѣ, въ особенности къ первымъ, она сообщаетъ нѣкоторую связность первымъ, а въ послѣднихъ она способствуетъ разложенію перегной и превращенію кислыхъ его свойствъ въ хорошія. Глинисто-и суглинисто-мергельныя почвы, въ сильной степени склонны къ заплыванію и образованию коры.

Перегнойными и черноземными называются почвы, которая, въ отличіе отъ другихъ почвъ, содержащихъ всегда нѣсколько (1—5%) хорошаго перегной, содержатъ этаго послѣдняго обыкновенно гораздо больше (5—20%) и представляютъ весьма различныя свойства, принадлежащая главнымъ образомъ тѣмъ почвамъ (песчанымъ, суглинистымъ, глинистымъ и мергельнымъ), къ которымъ примѣшивается перегной, и только частию самому перегною. Этотъ послѣдній, сравнительно съ минеральными частицами почвы, представляетъ весьма малаго удѣльнаго и объемнаго вѣса, сѣпжистую рыхлую массу, обладающую тѣмъ не менѣе довольно значительнымъ сѣщленіемъ частицъ.

Волосной воды перегной задерживает гораздо больше и поднимает ее гораздо выше, чем глина; насыщенный водой, он размягчается, разбухает, однако не терпит при этом проницаемости для воды и не дѣлается клейким или вязким; принятую воду терпит очень медленно. Въ силу этихъ свойствъ, онъ дѣлается плотнымъ, вязкимъ, непроницаемымъ для воды почвы болѣе рыхлыми, проницаемыми; и наоборотъ, болѣе легкими, рыхлыми, сухія почвы болѣе связными, влажными, способными принимать болѣе влаги и болѣе удерживать ее. Перегной, по своему черному цвѣту, нагревается сильнѣе болѣе свѣтлыхъ его галны, песка и извести, да кромя того, разлагаясь, самъ развиваетъ теплоту; такъ что съ увеличеніемъ содержанія перегноя въ почвѣ, эта послѣдняя дѣлается теплѣе. Наконецъ, перегной обладаетъ наибольшой изъ всѣхъ составныхъ частей почвы способностью поглощать водяной и другіе газы, и весьма значительно задерживаетъ растворенныя вещества изъ растворовъ; почему способствуетъ выщелачиванію почвы и задержанію въ почвѣ продуктовъ выщелачиванія, за исключеніемъ кремневой кислоты.

Почвы, которыя содержатъ, главнымъ образомъ, перегной или, вѣрнѣе сказать, органическіе (растительные) остатки, весьма отличны отъ только что описанныхъ; потому что растительные остатки находятся въ нихъ болѣею частью не въ видѣ перегноя, а въ состояніи мало разложившейся, рыхлой, сухой, легко проницаемой массы. Къ такимъ почвамъ принадлежатъ: *торфяная* и *сересково-перегнойная*, отличающіяся бѣдымъ содержаніемъ минеральныхъ веществъ и кислыми свойствами перегноя. Съ образованіемъ первой мы познакомились уже (стр. 94—96); вторая же образуется въ бѣдныхъ, сухихъ, песчаныхъ мѣстностяхъ изъ произрастающаго здѣсь персика и опадающихъ ежегодно частей дѣсныхъ деревъ (дѣснаго сора). Эти почвы улучшаются лишь смѣшеніемъ ихъ съ известью, пескомъ, суглинкомъ и продолжительнымъ дѣйствіемъ на нихъ воздуха, отчего перегной ихъ теряетъ кислыя свойства и превращается въ хорошій перегной.

Переходя затѣмъ къ *техническимъ* и *экономическимъ* классификаціямъ почвъ, имѣющимъ въ виду пригодность почвъ для воздѣлыванія тѣхъ или другихъ растений, мы должны привести примѣры ихъ отдѣльно для полевыхъ, луговыхъ и выгонныхъ угодій.

Въ примѣръ *технической* классификаціи *полевыхъ* почвъ приведемъ классификацію *Рунде*, составленную имъ для Саксенъ-Альтенбургскаго Герцогства, а въ примѣръ *экономической полевой* классификаціи, классификацію, составленную для кадастровой *) оцѣнки земель въ Саксоніи (королевствѣ). Обѣ классификаціи, несмотря на свою давность,

остаются поныѣ лучшими и, хотя вполне применимы лишь въ мѣстностяхъ, для которыхъ онѣ составлены, тѣмъ не менѣе могутъ служить хорошимъ руководствомъ при составленіи такихъ же классификацій и въ другихъ мѣстностяхъ.

По Рунде, всѣ почвы распределяются на 20 классовъ, составляющихъ 4 отдѣла:

Первый отдѣлъ. Плотная (глинистая) почвы.

1 классъ: глубокая глинистая почва съ большимъ содержаніемъ перегноя и пропускающей воду подпочвой (на ней хорошо родятся: пшеница, рожь, сахарная свекловица).

2 классъ: богатая глинистая съ большимъ содержаніемъ песка и подпочвой, годной для углубленія пахаты (рожь, пшеница, овесъ).

3 классъ: достаточная глинисто-суглинистая почва съ плотной подпочвой (клеверъ, рожь, пшеница).

4 классъ: бѣдная суглинисто-глинистая почва съ глинистой подпочвой (овесъ, пшеница).

5 классъ: тощая, влажная, холодная глинистая почва съ непроницающей воды подпочвой (пастбище).

Второй отдѣлъ. Средняя (суглинистая) почвы.

1 классъ: глубокая, средней вязкости суглинистая почва съ большимъ содержаніемъ перегноя и такой же подпочвой (рожь, пшеница, ячмень, рѣпа).

2 классъ: теплая, богатая, суглинистая почва съ большимъ содержаніемъ песка и нѣсколько отличающейся отъ почвы, но все же годной для углубленія пахаты подпочвой (рожь, ячмень, рѣпа, картофель).

3 классъ: средней вязкости, достаточная суглинистая почва съ непроницающей воду подпочвой (клеверъ, овесъ, пшеница).

4 классъ: бѣдная, песчано-суглинистая почва съ хрящевой подпочвой (картофель, рожь).

5 классъ: тощая, пливучая суглинистая почва съ влажной, холодной, вязкой, непроницающей воды подпочвой (пастбище).

Третій отдѣлъ. Легкія (песчаная) почвы.

1 классъ: богатая, песчаная почва съ большимъ содержаніемъ перегноя и съ такой же подпочвой, всегда влажной на глубинѣ (рожь, ячмень, рѣпа).

2 классъ: мелко-зернистая, суглинисто-песчаная почва съ подпочвой, нѣсколько сходной съ почвой (рожь, шпигель).

3 классъ: влажная, пливучая или иловатая песчаная почва съ влажной, холодной, содержащей желѣзо подпочвой (овесъ, вика).

4 классъ: сухая, бѣдная грубо-зернистая песчаная почва съ сухой, пропускающей воду подпочвой (гречиха, рожь, картофель).

5 классъ: хрящеватая, содержащая желѣзо, песчаная и хрящевая почва, равно летучій песокъ и летучая торфяная почва (пастбище).

Четвертый отдѣлъ. Мергельная и известковая почва.

1 классъ: богатая, глинисто-мергельная почва съ большимъ содержаніемъ перегноя и такой же подпочвой (пшеница и конскіе бобы).

2 классъ: достаточная содержащая известъ суглинистая почва съ рыхлой подпочвой (эснарцетъ, пшеница, ячмень).

3 классъ: содержащая известъ, глинистая почва съ такой же подпочвой, въ которой заложено много камней (овесъ, пшеница, горохъ).

4 классъ: песчано-суглинистая мергельная почва съ очень каменной подпочвой (овесъ, пшеница, эснарцетъ).

*) Оцѣнка земель съ цѣлю обложенія ихъ подоходнымъ налогомъ.

5 классъ: бѣдная, сухая, рыхлая песчано-мергельная почва съ такой же подпочвой (пастбище, овесъ).

По классификаціи Саксонскаго кадастра всѣ почвы распредѣляются въ слѣдующія 12 классовъ.

Чистый доходъ съ десятины въ четвертикахъ ржи, смотря по возвышенію надъ уровнемъ моря.

I. Глинистая рѣчныхъ долинъ, превосходная пшеничная почва, не выше 900 фут. надъ уровнемъ моря.	отъ 54,82 до 48,21
II. Очень глубокая, богатая, средней плотности, превосходная ячменная почва.	" 48,88 " 26,75
III. Тяжелая глинистая или суглинистая почва хомовъ, хорошая пшеничная почва.	" 41,99 " 19,20
IV. Глубокая, средней плотности, содержащая песокъ суглинистая, хорошая ячменная почва.	" 38,16 " 19,78
V. Влажная, средней плотности, холодная, суглинистая, невѣрная ячменная почва.	" 28,57 " 9,62
VI. Глинистая и тощая плотная суглинистая, хорошая овсяная почва.	" 22,26 " 6,18
VII. Легкая, средней плотности, бѣдная песчано-суглинистая, слабая ячменная почва.	" 20,30 " 8,02
VIII. Достаточная суглинисто-песчаная, двухлѣтняя ржаная почва (производитъ два года сряду рожь).	" 18,85 " 4,02
IX. Вязкая горная, тощая глинистая или суглинистая, влажная овсяная почва.	" 7,79 " 2,65
X. Обыкновенная песчаная, гречневая земля.	" 7,12 " 3,54
XI. Бѣдная песчаная и хрящевая, шестилѣтняя ржаная почва (производитъ одинъ урожай ржи послѣ шести лѣтъ отдыха).	" 3,42 " 1,80
XII. Дурная, дикая почва, нестоящая воздѣлыванія на ней хлебовъ и годная лишь подъ пастбище.	" 1,54 " 0,93

Такимъ образомъ: классы I, III, VI и IX этой классификаціи обнимаютъ собой глинистыя почвы, II, IV, V и VII — суглинистыя VIII, X, и XI — песчаные и XII — всѣ нестоящія воздѣлыванія на нихъ каковаго либо зерноваго хлѣба. Порядкомъ, въ которомъ эти почвы слѣдуютъ въ классификаціи, опредѣляется величиной даваемого ими чистаго дохода, выраженного въ четвертикахъ ржи съ десятины. При опредѣленіи же урожайности почвы, опредѣляющей, между прочимъ, величину чистаго дохода, приняты во вниманіе свойства почвы, глубина ея, свойства ея подпочвы, положеніе ея и климатическія условія, въ которыхъ она находится.

Каждый изъ указанныхъ классовъ имѣетъ извѣстныя климатическія степени, которыя, смотря по большому или меньшему возвышенію поля надъ уровнемъ моря, опредѣляются такъ: до 500 фут. возвышенія простирается первая степень или районъ теплаго климата; съ возвышенія въ 2401 фут. начинается послѣдняя степень или самый пышій районъ холоднаго климата. Между этими предѣлами, полагая 100 фут. возвышенія на степень, принимается 19 степеней

возвышенія, какъ переходы отъ теплаго къ умеренному, суровому и холодному климату, такъ что всѣхъ климатическихъ степеней 21. Съ отнесеніемъ почвы одного изъ двѣнадцати классовъ къ менѣе благоприятной климатической степени, численный отъ этой почвы первой климатической степени чистый доходъ уменьшается соответственно нормѣ, заранее определенной для почвы каждаго класса, смотря по большому или меньшему вліянію на него различныхъ климатическихъ степеней. Кроме того исчисленный чистый доходъ уменьшается, однако не болѣе чѣмъ на 3%, въ тѣхъ случаяхъ, если мѣстныя условія, наприм. положеніе открытое вреднымъ вѣтрамъ, близость большихъ лѣсовъ и водъ, покатость къ сѣверу и т. д., въ которыхъ находится извѣстная почва, имѣютъ несомнѣнно неблагоприятное вліяніе на растительность этой почвы сравнительно съ соотвѣстными, на столько же возвышенными почвами, но неиспытывающими на себя вліянія подобныхъ мѣстныхъ обстоятельствъ.

Эта классификація, кромѣ 12 главныхъ классовъ, различаетъ еще въ извѣстныхъ случаяхъ *междуклассы* и *подклассы* почвъ. Главные классы представляютъ собой главные виды почвъ, имѣющіе въ извѣстныхъ условіяхъ извѣстную доходность; междуклассы же выражаютъ встрѣчающіяся и имѣющіе вліяніе на доходность почвы переходы отъ свойствъ почвы одного главнаго класса къ свойствамъ почвы другаго ближайшаго къ первому по его свойствамъ главнаго класса. Такъ междуклассы имѣются между I и III, III и VI, VI и IX, VIII и IX, II и IV, IV и V, V и VII, VII и VIII и VIII и X и обозначаются такъ $\frac{I+III}{2}$ и т. д. Подклассъ обозначаетъ существованіе мѣстныхъ, вѣннихъ обстоятельствъ, какъ напр. ключей, большаго или меньшаго содержанія камней, склона и т. д., дѣйствующихъ вредно на доходность почвы того или другаго главнаго класса или междукласса.

Чистый доходъ отъ каковаго-либо междукласса опредѣляется средней величиной чистыхъ доходовъ отъ почвъ двухъ соотвѣствующихъ мѣстныхъ классовъ; чистый же доходъ отъ почвы подкласса — средней величиной чистыхъ доходовъ отъ почвъ двухъ соотвѣствующихъ смежныхъ климатическихъ степеней того же главнаго класса или междукласса.

Въ примѣръ *технической* и *экономической* классификацій луговыхъ почвъ или луговъ, приведемъ довольно простую классификацію *Лангсхалла*, вполне достаточную для обыкновенно встрѣчающихся обстоятельствъ и классификацію, примѣняющуюся въ Саксоніи съ той же цѣлью какъ и приведенная выше классификація полевыхъ почвъ.

Первая из них различает 5 классов луговъ, по степени ихъ влажности, какъ главному условию ихъ производительности, а именно: *свожие* луга пользующіеся въ должной мѣрѣ влагой даже въ теченіи лѣта и производящіе на десятины 325 пуд. сѣна и болѣе; *сухие* луга, которыхъ почва не сохраняетъ такъ долго влаги и которые производятъ меньшее количество сѣна; *сырые* луга, которыхъ почва содержитъ влагу въ избыткѣ только весной и которыхъ урожайность часто обманчива, такъ какъ на нихъ весьма скудный подсеѣвъ и накошенная съ нихъ трава значительно уменьшается въ объемѣ при сушкѣ; *страдающіе отъ засухи* луга, которымъ уже весной недостаетъ влаги и которые не даютъ болѣе одного укоса; и *мокрые* луга, которыхъ почва еще ко времени уборки сѣна до того пропитана (какъ губка) влагой, что въ нее врѣзаются колеса тележки, и которыхъ растительность состоитъ изъ однихъ лишь высокорослыхъ травъ, дающихъ лишь одинъ укосъ въ годъ. Затѣмъ луга различаются, по качеству производимой ими травы, въ слѣдующихъ пяти отношеніяхъ:

I	трава ихъ можетъ состоять изъ	1 сладкихъ	2 смѣшанныхъ	3 кислыхъ злаковъ.
II	" " содержатъ	1 много	2 мало	3 вовсе не-содержатъ клеверныхъ растений.
III	" " "	1 хорошія	2 грубая	3 очень грубо-стебельная растенія другихъ семействъ кромѣ злаковыхъ и бобовыхъ.
IV	" " быть	1 тонкая	2 массивная	3 грубая.
V	" " "	1 нѣжная	2 жесткая	3 остростебельная

Качество травы въ каждомъ изъ пяти отношеній имѣетъ три степени, различаемыя цифрами 1 (высшая), 2 и 3 (низшая); степень же качества травы вообще по всѣмъ отношеніямъ выражается суммой цифръ, обозначающихъ ея качество въ каждомъ отношеніи отдѣльно. Такъ, степень качества травы выразится цифрою 6, если эта трава по роду образующихъ ее злаковъ, по содержанію клеверныхъ растений, по тонкости и нѣжности будетъ 1-й, а по содержанію растеній другихъ семействъ 2-й степени. Отсюда слѣдуетъ, что низшая сумма 5 должна выражать наивысшее, а высшая 15 наинизшее качество травы вообще; въ классификаціи же принимается пять степеней качества травы вообще, при чемъ первой степени считается трава, которой качество выражается цифрами 5 или 6, второй—7 или 8, третьей—9 или 11, четвертой—12 или 13, и пятой—14 или 15.

По Сиксонской классификаціи луга распределяются въ 11 главныхъ классовъ, которые обозначаются по положенію и другимъ существеннымъ свойствамъ луговъ и слѣдуютъ въ порядкѣ урожай-

ности луговъ. Между главными классами ближайшими одинъ къ другому по состоянію ихъ влажности, имѣется 9 между классовъ, которые, по урожайности отнесенныхъ къ нимъ луговъ, занимаютъ среднее мѣсто между соответствующими главными классами. Чистый доходъ выраженъ также въ цѣнности ржи.

Главные классы:

	При числѣ укосовъ въ годъ,	Даютъ сѣна и отавы на десятины въ пудахъ **),	Степень качества сѣна.	Чистый доходъ съ десятины въ чет. вершкахъ ржи.
1. Лучшие, безъ всякаго порока низменные, прирпчные, заливные луга.	2—3	327	1	79,95
2. Хорошіе, но не вполне безпорочные, прирпчные заливные луга . . .	2—3	261	1 и 2	55,64
3. Лучшие, безъ всякаго порока полевые и долинные луга *)	2	208	1	47,70
4. Порочные низменные и прирпчные, заливные луга	2	234	3	30,26
5. Хорошіе полевые и долинные луга.	2	163	2	27,40
6. Средніе полевые и долинные луга .	2	130	2 и 3	17,11
7. Сухіе, хорошіе горные и возвышенные луга	1	91	2	17,21
8. Ключевые, болотистые полевые и долинные луга	2	117	3	8,83
9. Бѣдные полевые и лѣсные луга . .	1—2	104	3	7,26
10. Дурные съ холодной почвой луга .	1	78	4	3,44
11. Очень дурные, болотистые и сухіе луга съ хрящевато-песчаной почвой.	1	73	4	1,54

Луга, которые даютъ на десятину только 65 пуд. сѣна, относятся къ послѣднему классу полевой земли, какъ годныя лишь для пастбища.

Между классы: $\frac{1+2}{2}$, $\frac{2+4}{2}$, $\frac{3+5}{2}$, $\frac{4+6}{2}$, $\frac{5+7}{2}$, $\frac{6+8}{2}$, $\frac{7+9}{2}$ и $\frac{8+9}{2}$.

Лучшіе два и трехукосные луга могутъ давать сѣна отъ 520 до 650 пуд. и очень хорошіе отъ 390 до 520 пуд. на десятины.

Наконецъ, что касается *выгоновъ*, то они дѣлятся на *постоянные*, находящіеся постоянно подъ естественнымъ дерномъ, и *перемѣнные*, которыми только временно пользуются подъ пастбища, потому что болѣе или менѣе часто и продолжительно они занимаютъ подъ полевыхъ растеній. При исчисленіи цѣнности различныхъ выгоновъ, различные роды животныхъ приравняются какому либо одному, причемъ за единицу мѣры принимается взрослое животное этого послѣдняго рода, обыкновенно крупнаго рогатаго скота. Такое приравненіе сохраняетъ для практическаго хозяина свое зна-

*) Луга, лежащіе между полей, въ балкахъ, топкахъ и т. д.
**) Въ круглыхъ числахъ.

Находясь въ мѣстности почвенныя различія, равно какъ техническія и экономическія различія полевыхъ, луговыхъ и пашенныхъ угодій, опредѣленные по составленнымъ классификаціямъ, могутъ быть нанесены условными знаками на карту мѣстности. Но если бы всѣ эти различія нанести на одну и ту-же карту, то эта послѣдняя вышла бы слишкомъ нестрой и неясной, даже при весьма значительномъ ея масштабѣ; а потому эти различія наносятся на отдѣльныя карты; а именно на *общую почвенную*—почвенныя различія по внутреннимъ свойствамъ почвъ; на *частную почвенную*—почвен-

ныя различія по техническимъ свойствамъ почвы, и на *экономическую* почвенную карту—почвенныя различія по экономическимъ свойствамъ почвы. Первые карты могутъ обнимать болѣе обширную, вторыя—меньшую, третьи должны обнимать еще меньшую мѣстность.

Исследование почвы и оцѣнка земельныхъ угодій.

Хозяину необходимо знать свою почву обстоятельно. Чѣмъ лучше онъ ее знаетъ, тѣмъ вѣрнѣе могутъ быть принимаемы имъ мѣры ея улучшенія и применяемые имъ приемы воздѣлыванія на ней различныхъ растений. Для того же, что бы знать свою почву, еще неопредѣленную, какъ на прим. у насъ, ни по какой классификаціи, необходимо хозяину самому исследовать почву и чѣмъ полнѣе будетъ это исследование, тѣмъ лучше. Но полное исследование почвы рѣдко по силамъ самому хозяину, такъ какъ ему недостаетъ болѣе частію необходимыхъ для этого специальныхъ свѣдѣній, да и многіе приемы исследования довольно сложны и требуютъ такихъ приспособленій, которыми обыкновенно не располагаетъ хозяинъ; такъ напр. полный химическій анализъ почвы и полное исследование физическихъ свойствъ почвы. Правда, сельскій хозяинъ, располагающій средствами, можетъ поручить специалисту исследование своей почвы, повѣривъ мѣръ въ тѣхъ отношеніяхъ, въ которыхъ это недоступно для него самого, напр. исследование болѣе или менѣе полное химическаго состава почвы и физическихъ свойствъ почвы; но такое исследование можетъ быть полезно лишь въ томъ случаѣ, если химическій анализъ почвы не ограничивается однимъ опредѣленіемъ количественнаго участія въ составѣ почвы, того или другаго элемента: калия, натрия, фосфора или даже окисловъ ихъ, но показывать и тѣ соединенія, въ которыхъ эти элементы или окислы ихъ находятся въ почвѣ; показываетъ ихъ, если и не вполне, не совсемъ опредѣленно, такъ какъ онъ не можетъ еще сдѣлать этого, то, по крайней мѣрѣ настолько, чтобы можно было судить объ отношеніи этихъ соединений въ растворяющимъ средствамъ; показываетъ, на сколько эти соединения растворимы въ холодной соляной кислотѣ, на сколько нѣтъ; на сколько, слѣдовательно, питательныя вещества растения находятся въ почвѣ въ болѣе или менѣе доступной для растения формѣ. Въ крайнемъ случаѣ можно ограничиться исследованиемъ состава только той части почвы, которая растворима въ холодной соляной кислотѣ, какъ заключающей питательныя вещества растения въ наиболѣе доступной для этого послѣдней формѣ. Но и на основаніи самаго полного химическаго анализа и исследования физическихъ свойствъ данной почвы мы можемъ оцѣнить эту послѣднюю только относительно другихъ почвъ, находящихся въ по-

добныхъ же оцѣниваемой почвѣ мѣстныхъ условійхъ, если намъ извѣстны съ одной стороны производительность, съ другой—химическій составъ и физическія свойства ихъ. Имѣя въ виду какъ это, такъ и то, что многіе приемы исследования физическихъ свойствъ почвы, въ особенности сѣпленія, и что многія исследования, особенно въ виду малой точности ихъ приемовъ, даже излишни, потому что о результатахъ ихъ можно съ нѣкоторой точностію судить по результатамъ другихъ изысканій, напр. о теплоемкости почвы по ея пивту, имѣя въ виду все это, мы укажемъ хоть только на доступныя и болѣе важныя для хозяина исследования почвы.

Оцѣнка почвы въ отношеніи ея внутреннихъ и отчасти внѣшнихъ техническихъ свойствъ называется *бонитировкой* или *оцѣнкой* почвы; оцѣнка же ея въ отношеніи экономическихъ условій—оцѣнка даваемого ею чистаго дохода—*оцѣнкой земельныхъ угодій*.

Для первой оцѣнки хозяинъ можетъ весьма простыми, однако достаточно точными для его цѣлей способами исследовать:

1. *Количественное отношеніе крупныхъ и мелкихъ частицъ въ почвѣ*; для этого, равно какъ и для другихъ исследований образцовъ почвы берется не съ одного, а съ нѣсколькихъ мѣстъ участка, имѣющаго по видимому совершенно одинаковую почву; затѣмъ взятые съ разныхъ мѣстъ образцы тщательно перемѣшиваются между собой и отъ этой смѣси уже берется образецъ для важнаго отдѣльнаго исследования. Такъ слѣдуетъ поступать для того, чтобы избѣжать вліянія на результаты исследований случайныхъ различій одной и той же почвы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, вовсе нехарактерныхъ для почвы на всемъ занимаемомъ ею пространствѣ.

Имѣя взятый такимъ образомъ и просушенный вслѣдъ затѣмъ образецъ почвы, берутъ, примерно $\frac{1}{4}$ фунта сухой почвы и кипятятъ ее въ теченіи 5 минутъ съ $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ кружки воды. Послѣ этого прокипяченную земляную массу растираютъ хорошенъко деревяннымъ пестомъ, пока всѣ комки и комочки не распустятся въ одну однородную массу, и разбавляютъ ее затѣмъ, еще небольшимъ количествомъ воды. Послѣ непродолжительнаго времени покоя, въ которомъ оставляютъ массу, сливаютъ мутную жидкость съ осторожностью, однако, чтобы вмѣстѣ съ нею не стекло бы нѣсколько песка, который, по своей болѣе вѣскости, осаждается первымъ на дно. Осадокъ, оставшійся по слитіи мутной жидкости, взбалтывается съ новымъ количествомъ свѣжей воды, которая, по осажденіи песка на дно, снова сливается. Такое попеременное взливаніе и сливаніе воды продолжается до тѣхъ поръ, пока не вымоются изъ песка и хряща всѣ глинистыя и другія мелкія части. Вслѣдъ затѣмъ песокъ, по совершенной просушкѣ его тотчасъ же въ тепломъ мѣстѣ, взвѣши-

вается; причем недостающее до $\frac{1}{4}$ фунта представляет въсь мелкихъ частицъ, въ числѣ которыхъ находятся не только различные иловатые части (глинистыя, известковыя, перегнойныя и т. д.), но и самыя мелкія песчаные частицы. Чтобы узнать ближе природу этихъ мелкихъ частицъ, можно дать имъ осѣсть изъ воды и, по слитіи съ нихъ осветлившейся воды и просушивъ ихъ, подвергнуть ихъ исследованію въ отношеніи содержанія перегноя, извести, магнезін, желѣза и некристаллической кремневой кислоты по способамъ, указаннымъ на стр. 99—101; или ограничиться наблюденіемъ ихъ въ различныхъ стадіяхъ просыханія, относительно связности, уменьшенія объема и т. д.

2) *Минералогическій характеръ почвы.* Для этого исследованія могутъ годиться полученныя при предыдущемъ исследованіи «песчаные и хрящевыя частицы». Помощію простаго увеличительнаго стекла (лупы), еслибы недостаточно было невооруженнаго глаза, можно въ большей части случаевъ различить природу и форму болѣе крупныхъ частицъ почвы. Конечно, для данной минуты имѣетъ большаго значенія, состоятъ ли болѣе крупныя частицы почвы только изъ кварцевыхъ зеренъ или къ этимъ послѣднимъ присоединяются еще въ большемъ или меньшемъ количествѣ обломки полевого шпата, слюды, извести, базальта, порфира, глинистаго сланца и т. д.; но для будущаго это имѣетъ большое значеніе, такъ какъ, не кварцевыя части, выветриваясь, даютъ растворимыя вещества. Если сказанныя обломки, при ближайшемъ разсмотрѣніи ихъ, окажутся имѣющими острые края и одинаковыми съ горной породой на которой залегаетъ исследуемая почва, то эту послѣднюю слѣдуетъ считать *первичной*; если же обломки представляются округленными, обшлагованными и принадлежать различнымъ горнымъ породамъ, къ тому же не находящимся вовсе въ слояхъ, на которыхъ залегаетъ исследуемая почва, то эта послѣдняя есть *наносная* почва. Часть песка можетъ быть облита равными количествами воды и соляной кислоты. Если между песчаными частицами находятся обломки известняка, то они растворятся при этомъ въ кислотѣ, вскипающая—подъ выдѣленіемъ углекислоты; если же облиты такимъ образомъ песчаные части оставятъ на нѣсколько болѣе продолжительное время въ теплотѣ мѣсть, то въ кислотѣ растворяется облекающая часто песчаные частицы, но нерастворимая въ водѣ желѣзная ржавчина; такъ что песчаные частицы послѣ промывки ихъ затѣмъ водой дѣлаются болѣе удоборазличными.

3) *Химическій составъ почвы.* На стр. 104 указано, на сколько цвѣтъ почвы позволяетъ судить о составныхъ частяхъ ея. На стр. же 99—101, были приведены довольно простые способы опредѣленія перегноя, извести, магнезін, окисловъ желѣза и некристаллической

кремневой кислоты. Къ этимъ исследованиямъ можно присоединить еще дознаніе въ почвѣ свободной кислоты и между растворимыми въ водѣ веществами гипса, поваренной соли, окисла желѣза и т. д. Для першаго стоитъ только обнажить на короткое время полоску голубой или красной лакмусовой бумажки въ массу, которая получается при вымачиваніи почвы съ водой для исследованія напр. количественнаго отношенія крупныхъ и мелкихъ частицъ въ почвѣ. Если голубая бумажка краснѣетъ, то почва содержитъ свободную кислоту и по всей вѣроятности, можетъ улучшиться отъ удобренія ея известью или мергелемъ. Если же голубая бумажка остается голубой, то это хорошій признакъ; но еще лучший,—если красная бумажка окрашивается въ голубой цвѣтъ, что показываетъ присутствіе въ почвѣ сильно щелочной соли (напр. углекислаго амміака).

Для втораго взбалтываютъ 1 часть почвы съ 3 част. воды по объему и, спустя 24 часа, сливаютъ отстоявшуюся надъ почвой жидкость, если она осветляется сама по себѣ къ этому времени, или свѣживаютъ ее, если она остается еще въ это время мутной. Въ полученной такимъ образомъ жидкости можно окрыть нѣкоторые растворимыя въ водѣ составныя части почвы, если, разливъ ее въ рюмки и приливъ къ ней въ каждую рюмку немного уксуса, прибавить по нѣсколько капель слѣдующихъ водныхъ растворовъ: а) въ одну рюмку—раствора *хлористаго боріа*; появляющаяся въ слѣдствіе этого бѣлая муть указываетъ на присутствіе *сильной кислоты*, б) въ другую—раствора *шавельной кислоты* и *нашатырнаго спирта*; появляющаяся въ слѣдствіе этого бѣлая муть показываетъ присутствіе *извести*. Поэтому, появленіе бѣлой мути въ обоихъ рюмкахъ показываетъ присутствіе *гипса*, в) въ третью—раствора *азотно-кислаго серебра* (адскаго камня); появленіе въ слѣдствіе этого бѣлой мути указываетъ присутствіе *хлора* (соляной кислоты), который, при большемъ содержаніи его въ почвѣ, обыкновенно находится въ послѣдней соединеннымъ съ натріемъ, т. е. въ видѣ *поваренной соли*. Большее количество поваренной соли содержится въ такъ называемыхъ *солонцевыхъ* почвахъ *). Если въ сказанныхъ случаяхъ не образуется мути, то это обозначаетъ, что соответствующія вещества находятся въ почвѣ въ самыхъ ничтожныхъ количествахъ, и что можно

* Солоновыя почвы или солончаки представляютъ болѣею частью почвы плотныя, иловатыя, лежащая часто ниже окружающихъ ихъ мѣсть и проникаемыхъ, если не въ теченіи цѣлаго года, то весной, грунтовою водою, богатой содержаніемъ соли; съ грунтовою водою соль поднимается въ верхніе слои почвы и, во испареніи воды, нередко выцвѣтаетъ здѣсь на поверхности почвы. Поваренная соль сопровождается здѣсь часто другими растворенными солями: хлористыми известью и магнезій, сульфатными: натріемъ, известью и магнезій. Въ некоторыхъ мѣстахъ изъ почвы выдѣляется сода (углекислый натрій) или сези́тра (азотно-кислый натрій).

ожидать благоприятных результатов от удобрения такой почвы гипсом или поваренной солью. Наконец г) в четвертую—раствора *железо-синеродного кали* (красной кровянощелочной соли), и если жидкость при этом окрашивается в синий цвет, то это показывает присутствие в почве растворимого соединения железа,—признак нехороший, указывающий хозяину на необходимость удобрения известью или осушение.

Полный химический анализ затруднителен; результатов его недостаточно для оценки почвы, главным образом потому, что мы незнаем во первых, тех соединений, в которых питательные вещества растений с одной стороны находятся в почве, с другой—требуются растениями; во вторых тех количествах, в которых питательные вещества должны находиться в почве для произведения изобильного урожая. В виду этого, сельский хозяин в большей части случаев, может от самой почвы получить весьма удовлетворительный для его практических целей ответ на вопрос: какого из питательных для растений веществ недостает его почве? если он неустрашится труда произвести на каждой из испытываемых у него различных почв, с каждым из воздвигаемых на них растений, несколько простых *сельскохозяйственных опытов*, которые покажут ему наглядно, на урожай обнаруживает увеличение содержания в его почве того или другого питательного вещества растений.

Для выбора такого рода опытов можно предложить следующие: (названия, заключенные в скобки, показывают главную составную часть тех веществ, которые должны быть прибавлены к почве.)

Вещества, которые должны быть прибавлены к почве и количество их на 3 квадрат. сажени.

- 1) Поташа $\frac{1}{2}$ фунта (каль).
- 2) Калиевого жидкого стекла 1 фунт. (каль и кремневая кислота).
- 3) Поташа $\frac{1}{2}$ фунт. и мелкой женойкости $\frac{1}{2}$ фунт. (каль, известь и фосфорная кислота).
- 4) Древесной золы 3 фунт. (каль, кремневая кислота и фосфорная кислота).
- 5) Перуанского гуано $\frac{1}{2}$ фунт. (азот и фосфорная кислота).
- 6) Тоже что 5 и поташа $\frac{1}{2}$ фунт. (азот, фосфорная кислота и каль).
- 7) Тоже что 6 и калиевого жидкого стекла $\frac{3}{4}$ фунт. (азот, фосфорная кислота, каль и кремневая кислота).
- 8) Гашеной извести 3 фунт. (известь).
- 9) Гашеной доломитовой извести 3 фунт. (известь и магнезия).
- 10) Гашеной извести 2 фунт., древесной золы 2 фунт. (известь, каль, кремневая кислота и фосфорная кислота).

11) Тоже, что 10 и чилийской селитры $\frac{1}{4}$ фунт. (известь, каль, кремневая и фосфорная кислоты, азот и натр).

12) Гашеной извести 2 фунт., чилийской селитры $\frac{1}{4}$ фунта (известь, азот и натр).

13) Чилийской селитры $\frac{1}{4}$ фунт. (азот и натр).

14) Суперфосфата 1 фунт. (фосфорная кислота и гипс).

15) Тоже, что 14 и $\frac{1}{2}$ фунт. перуанского гуано (фосфорная кислота, гипс и азот).

16) Гипса 1 фунт. (серная кислота и известь).

17) Гипса 1 фунт. и чилийской селитры $\frac{1}{4}$ фунт. (серная кислота, известь, азот и натр).

18) Гипса 1 фунт. и гуано $\frac{1}{2}$ фунт. (серная кислота, известь, азот и фосфорная кислота).

19) Поваренной соли $\frac{1}{2}$ фунт. (хлор и натр).

20) Поваренной соли $\frac{1}{2}$ фунт. и чилийской селитры $\frac{1}{4}$ фунт. (хлор, азот и натр).

21) Поваренной соли $\frac{1}{2}$ фунт. и гуано $\frac{1}{2}$ фунт. (хлор, азот, фосфорная кислота, натр).

Если хозяин в каждом из своих полевых клинов отведет для таких опытов несколько грядок, и во время роста будет прилежно сравнивать развитие растительности с одной стороны на грядах, на которых к почве прибавлены те или другие вещества, с другой на грядах, на которых почва осталась без всякого прибавления, то во многих случаях уже его глаз укажет ему те вещества, которые он должен будет прибавить на этой почве в обыкновенно употребляемому им удобрению или навозом, чтобы возвысить действие этого последнего.

Наконец, исследование почвы в отношении воздвигавшихся на ней растений, употребившихся для ее удобрения веществ, величина на ней урожая различных растений в течение более или менее продолжительного времени, признавая того, что берет у почвы урожай того или другого растения*), что возвращают ей те или другие питательные вещества,—может доставить данные для того, чтобы судить о том, каких питательных веществ недостает почве вовсе или, по крайней мере, в доступном для растений виде в данное время для произведения ею удовлетворительных урожаев. Так, если известная почва производит хорошие постоянные или даже все увеличивающиеся урожан хлебных злаков, трав, картофеля, свекловичи, льна и т. д. в течение известного числа лет, то

*) Для чего могут служить, напр., раскрашенные урожайные таблицы Шмидта, показывающие, какое из растений сколько отнимает питательных веществ у почвы. Изд. Тов. Общ. Пользы ч. 1 р. 50 к. вк. за 2 фунт.

мы вправе заключить, что она содержит все питательные вещества растений в достатке; но что тем не менее она ежегодно беднеет на то количество питательных веществ, которое отнимается у нее урожаем растений, и беднеет, напр: преимущественно в отношении фосфорной кислоты, если, как у нас с ней снимаются преимущественно урожан хлебных злаков; или, преимущественно в отношении кали, если с нее снимаются часто урожан таких растений, как: свекловича, картофеля, травы, льна, гречиха. При таких условиях, конечно, в редких исключительных случаях, почва может сохранять свою производительность, не получая ничего в возмездие отнимаемого у нее урожая; обыкновенно же она уменьшает свою производительность; и, если она при этом, уменьшает свою производительность напр. в отношении гречихи, как это так часто замечается у нас, производя в тоже время еще сносные урожан хлебных злаков, то это значит ей начинает не доставать кали; в хозяйстве, которое при трех полях, как это встречается, напр. весьма часто у нас, имеет не более 1 десятигу, производящего около 75 пуд. сена, на 2 десяти пашни, воздвывает исключительно зерновые хлеба, продает зерно и молоко на сторону, не прикупая никаких кормов, и не употребляет другого удобрения поля как хлывным навозом, почва перестает давать удовлетворительные урожан, то значит ей начинает не доставать фосфорной кислоты; если тоже замечается в хозяйстве, которое в тех же остальных условиях как и предыдущее, имеет лугов меньше 1 десяти. на 5 десяти. пашни или воздвывает кроме колосовых хлебов еще такие растения, как картофель, лен, гречиха, которые требуют кали гораздо больше чем колосовые хлеба, то это значит что почва такого хозяйства страдает, повсей вероятности, не только недостатком фосфорной кислоты, но и кали; такая ситуация, при имении достаточных для них данных, в совокупности с другими доступными для хозяина исследованиями почвы, могут привести не редко к довольно верной оценке почвы, в отношении содержания в ней питательных веществ для растений и вида, в котором они там находятся.

4) *Физические свойства почвы.* Из этих свойств особенно важно определение влагоемкости и сцепления частиц почвы между собой, так как определение их довольно просто, так как от этих свойств можно заключить во многом другим свойствам почвы: гигроскопичности, задерживательной способности относительно газов и растворенных веществ, водоудерживающей сил, уменьшению объема при высыхании, и так как ими, наконец, определяется отношение почвы к обработке, весьма важное для хозяина, как по количеству упругой силы, которая ему необходима для

обработки, так и по наиболее удобному времени для обработки почвы.

Для определения влагоемкости, можно взять 10 лотов сухой, растертой земли, насыпать в стакан, взвесить и облить ее таким количеством воды, чтобы эта полбидная покрывала ее. После 24 часов покоя, в продолжении которого почва набирается воды, наклоняют осторожно стакан, дают стечь покрывающей почву воду и взвешивают, как только вода перестанет стекать. Прибыль в весе покажет количество воды задержанной почвою. Легкие земли увеличивают свой вес в притоке испытании на $2\frac{1}{2}$ —3 (25—30%), тяжелые или очень богатые перегноем—на 6—7 лотов (60—70%) и даже больше.

Для определения сцепления частиц почвы между собой можно довольствоваться приготовлением из земли, размягченной водой, шарика, примерно 1 дюйма в диаметре, который просушивается на солнце или на печке. Затем, смотря потому, с какой легкостью изгибается шарик и какое усилие необходимо для того, чтобы раздавить его (раздавливается больше или меньше легко между пальцами или может быть разбит только больше или меньше легко молотком), можно, при некотором навыке, с большой уверенностью определить характер почвы, определяемый сцеплением ее частиц. Чем труднее изгибается шарик и чем легче он раздавливается, тем больше содержит почва крупных частиц, а между мелкими мелкими песчаных частиц, и на оборот. У очень песчаных и легких почв шарик разсыпается при самом слабом давлении и даже сам собой. У супесчаных и более легких суглинистых почв его можно раздавить между пальцами с большим или меньшим усилием; от легкого же удара молотком он разсыпается тотчас же. У более тяжелых суглинистых и глинистых почв его нельзя раздавить между пальцами, да и удар молотком должен быть уже значительно силен, чтобы разбить его на несколько частей. Если же провадить просушенный шарик в красноватом жире и, дав ему охладить, бросить его в воду, то у первых почв он распадается мгновенно; у богатых известью распускается медленно и требует иногда усилия для своего раздробления; у последних же—не только сохраняет свою форму, но дается еще тверже, чем был до каления.

Впрочем, и поведение почвы 1) при обработке ее в различных состояниях влажности—сохраняют ли пласты, отворачиваемые орудием, при средней влажности, свою форму, связны ли они или более или менее округляют свои ребра, рассыпаются; мажется ли почва, ложится ли пласты на отрезанной поверхности, при вспашке почвы в несколько более влажном состоянии или нет? 2) после дождей—мед-

ленно или скоро вбирается в почву вода, застывает ли она на поверхности или нет, скоро ли почва просыхает или нет, образует ли она, при просыхании, большей или меньшей величины трещины или нет?—может дать также указания относительно того, в какой степени почва богата мелкими, пловатыми, глинистыми частицами.

б) *Внешние технические свойства почвы*, между которыми первое место занимает толщина почвенного слоя и свойства подпочвы, которые могут быть исследованы удобно в тех же отношениях, как и почва, и теми же способами, если только имеется образец подпочвы; добыть же образец подпочвы можно буром^{*)}, причем исследование может быть определена и толщина почвенного слоя. Лучше, однако, для этой цели прорыть совершенно узкой (14 дюйм. верхней ширины) и суживающейся внизу продольной канавы, в 4 фута глубины и несколько саженей длины, так как при этом возможно обозреть подпочву на гораздо большем пространстве и точнее и с меньшими даже издержками исследовать ее, чем при бурении или при употреблении до сих пор вырытых дыр. Такую канаву можно будет прорыть, средним числом, коп. за 7 саженей и дешевле, так что за 1 рубль можно прорыть около 15 саженей такой канавы. Как не дорого может обойтись исследование, столь важное для хозяина исследование подпочвы даже при значительных размерах земельных угодий! Для исследования подпочвы совершенно достаточно такой глубины канавы но, если бы дело шло об определении положения проводящих воду слоев или об отыскании мергеля и т. д. то может понадобиться и более глубокая канавка.

После глубины почвенного слоя и свойств подпочвы весьма важную роль играть исследование высоты уровня грунтовой воды, которую можно определить, наблюдая накопление воды, особенно в сухое время, в ямах, вырытых для этого в нескольких местах участка. Об избытке влаги в почве, о застои воды в почве, если бы вода не выступала прямо на поверхность, можно заключить по желвастым осадкам, которые встречаются в таком случае как в почвенном слое, так и в подпочве, в виде красноватых, коричневатых и темноватых точек и полосок. Почва, в которой застывает вода, холодна и влажна на ощупь.

Наконец, о внутренних и внешних свойствах почвы как в отдельности, так и в совокупности можно судить по растениям, произрастающим на ней дико и возделываемым на ней с выгодой.

*) Удобные бураны—палки изготавливаются в мастерских Имп. Московск. Технич. Училища в Москве, Немецкая улица Дежартовск. части. по 8 руб. за штуку.

Из дико произрастающих растений характеризуют 1) избыток влаги в почве: хвощ болотный (*Equisetum palustre*), тростники обыкновенный (Очеретъ—*Phragmites communis*), пушицы: влагалищная, широколистная и узколистная (*Eriophorum: vaginatum, latifolium и angustifolium*), вахта трилистная (*Menyanthes trifoliata*), ольха лиловая или черная (*Alnus glutinosa*), гречиш: почечуйная трава и земноводная (*Polygonum persicaria и amphibium*), сушеница токая (*Gnaphalium uliginosum*), лютики: прыщинец и ядовитый (*Ranunculus flammula и sceleratus*), калужница болотная (*Caltha palustris*), разнотравья: осок (carex), ситники (*Juncus*), камыши (*Scirpus*), погозы (Turba), плевель оняняющий (*Lolium temulentum*) и костер ртанный (*Bromus secalinus*), из которых первые пять родов указывают на ключевое место, а последние два рода встречаются на влажных полях. 2) Недостаток влаги—сухость почвы: мелкоцветный эдкий (*Erigeron acris*), ястребинка волосатая (*Hieracium pilosella*), лен слабительный (*Linum catharticum*), колокольчик круглолистный (*Campanula rotundifolia*), в особенности же: тымьян богородская трава (*Thymus serpyllum*), сушеница кошачья лапка (*Gnaphalium dioicum*). 3) Песчанная почва: овсяница овечья (*Festuca ovina*), полевица ползучая (*Agrostis vulgaris*), костер кровельный (*Bromus tectorum*), камелина рыжик (*Camelina sativa*), гвоздика песчаная (*Dianthus arenarius*), сушеница песчаная (*Gnaphalium arenarium*), метлица полевая (*Apera spica venti*), коровяк медвежье ухо (*Verbascum thapsus*), торня нашенная (*Spergula arvensis*), сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris*), в особенности же: колосняк песчаный (*Elymus arenarius*), осока песчаная (*Carex arenaria*), попутник песчаный (*Plantago arenaria*), тростник песчаный (*Arundo arenaria*). 4) Глинистая почва: батлачик луговой (*Alopecurus pratensis*), аржанец тимфева трава (*Phleum pratense*), ежа обыкновенная (*Dactylis glomerata*), овсяница луговая (*Festuca pratensis*), костер мягкий (*Bromus mollis*), дуб длинноцветный (*Quercus pedunculata*), поповник нинчик (*Chrysanthemum segetum*), ромашка обыкновенная (*Matricaria chamomilla*), маргаритка многолетняя (*Bellis perennis*), чертополох кивающий (*Carduus nutans*), серпуха красильная (*Serratula tinctoria*), цикорий обыкновенный (*Cichorium intybus*), одуванчик аптечный (*Taraxacum officinale*), осоты: огородный и полевой (*Sonchus oleraceus и arvensis*) и мак самосейка (*Papaver rhoeas*). 5) Известковая и мергельная почва: первая—коротконожка перистая (*Brachypodium pinnatum*), гребенчик синий (*Sesleria coerulea*), шалфей луговой (*Salvia pratensis*), медунки: серповидная и хмельная (*Medicago falcata и lupulina*), трилистники (клевер) альпийский и горный (*Trifolium alpestre и montanum*), эспарцет кормовой (*Onobrychis sativa*), астрагалы: хлонуец и солодколистный (*Astragalus cicer и glycyphyllos*), чернотоловка крупноцветная (*Prunella grandiflora*), бедренец каменоломка (*Pimpinella saxifraga*), ясень высокий (*Fraxinus excelsior*); вторая—малина ежевика (*Rubus caesius*), горичник латный (*Adonis aestivalis*), бурачник (*Alyssum calycinum*) и мать и мачиха обыкновенная (*Russilago Farfara*); кроме некоторых еще растений известковых и глинистых почв. 6) Почва, содержащая гипс: кажим стбиной (*Gypsophyla thralia*), впрочем не точно. 7) Почва богата перегноем, вообще плодородная: шенница пырей (*Triticum repens*), крапива жгучая (*Urtica urens*), амарант жинда (*Amaranthus blitum*), разные виды родов: мари (*Cheopodium*), лебеды (*Atriplex*) и ясогки (*Lamium*); бурачник огуречная трава (*Borago officinalis*), крестовник обыкновенный (*Senecio vulgaris*), арутка полевая (*Thlaspi arvense*), сумочник пастуший (*Capsella bursa pastoris*), звездчатка мокричичник (*Stellaria media*), дымянка лекарственная (*Fumaria officinalis*), липа мелколистная (*Lilja parvifolia*) и другие; 8) торфяная почва см. стр. 94—96 и растения характеризующие избыток влаги в почве, и наконец 9) солон-

появля почвы; большей частью растенія, произрастающія по морскимъ берегамъ, а именно: ячмень морской (*Hordeum maritimum*), камышъ морской (*Scirpus maritimus*), ситники: морской и балтійскій (*Juncus maritimus* и *balticus*), триостренный морской (*Triglochin maritimum*), лебеда береговая (*Atriplex litoralis*), марь морская (*Chenopodium maritimum*), содеросъ травянистый (*Salicornia herbacea*), попутникъ морской (*Plantago maritima*), полынь морская (*Artemisia maritima*), синеголовникъ морской (*Elyngium maritimum*), сельдерей обыкновенный (*Arium graveolens*), песчанка морская (*Arenaria marina*) и другія.

Изъ воздѣлываемыхъ растеній характеризуютъ: глинистыя почвы—успѣшное произрастаніе пшеницы и конскихъ бобовъ; средней влажности почвы—ячмени, гороха, клевера, люцерны, свекловицы рапса; легкія песчаныя почвы—ржи, гречихи, чечвицы, люпина торницы; известковыя почвы, въ особенности известковатую подпочву—вспаршета.

Всѣ эти изслѣдованія почвы, въ соединеніи съ изслѣдованіями положенія поля на скатѣ, обращенномъ въ ту или другую сторону и климатическихъ условій, которыя опредѣляются возвышеніемъ надъ уровнемъ моря, широтой, близостью моря, озеръ, горъ, лѣсовъ и т. д.—придаютъ хозяину къ рѣшенію вопроса, какія изъ растеній онъ можетъ разводить на почвѣ въ данной мѣстности или какихъ улучшеній и измѣненій требуетъ почва, чтобы производить тѣ или другія растенія. Какія же изъ этихъ растеній онъ долженъ разводить, долженъ ли онъ предпринимать извѣстныя измѣненія и улучшенія своей почвы или нѣтъ и, если долженъ, то какія для разведенія того или другаго растенія, какую часть земли долженъ онъ оставить подъ полевые, какую подъ луговые и какую подъ выгонныя растенія,—рѣшается *изслѣдованіемъ экономическихъ условій* почвы, *чистаго дохода*, который можно ожидать отъ занятія почвы той или другой культурой.

Подъ *естественнымъ выгономъ* арендаторъ оставитъ, конечно, только тѣя мѣста арендуемаго имъ имѣнія, изъ которыхъ онъ, по условіямъ ли арендаго контракта или же по мѣстнымъ условіямъ, не въ состояніи извлечь большей выгоды другимъ какимъ либо образомъ. Къ такимъ условіямъ относятся: очень бѣдная, тощая песчаная почва, которую нестоитъ перепашивать и которая не можетъ быть увлажнена приводомъ къ ней воды; болотная почва, которая не можетъ быть осушена арендаторомъ съ расчетомъ на оплату этого расхода въ теченіи арендаго срока, а между тѣмъ допускаетъ выгонъ на нее скота; почва, по своему положенію, подвергавшаяся короткимъ, но сильнымъ наводненіямъ въ средніе лѣта; слишкомъ возвышенное положеніе, недопускающее уже выгоднаго воздѣлыванія полевыхъ растеній; крутые скаты; наконецъ излишекъ земли, который, при воздѣлываніи его, отвѣдалъ бы удобрение, рабочія

руки и капиталъ отъ земель, которыхъ воздѣлываніе представляетъ больше выгоды, въ особенности если излишняя земля слишкомъ удалена отъ усадьбы, а между тѣмъ не можетъ быть сдана или передана въ аренду. Совершенно другое и часто очень выгодное дѣло представляютъ *искусственные* выгоны, которые заводятся въ приморскихъ странахъ, на островахъ или на континентѣ въ рѣчныхъ долинахъ, большей частью для использованія ихъ крупнымъ рогатымъ скотомъ, и на обширныхъ континентальныхъ равнинахъ для пастбы лошадей и овецъ.

Хозяинъ, въ видахъ возможно полнаго использованія выгоновъ, долженъ назначать ихъ такимъ животнымъ, для которыхъ они производятъ наиболѣе соответствующія растенія, и къ главному роду животныхъ присоединить въ меньшемъ числѣ еще другой родъ животныхъ, который потребляетъ меньше корма или другія растенія, чѣмъ первый; такъ, напр., къ лошадямъ—крупный рогатый скотъ, а къ этому послѣднему овецъ. Далѣе хозяинъ долженъ остерегаться отъ назначенія чрезмѣрнаго большаго числа животныхъ на данное пространство выгона, стараться устроить зимнее корытце такъ, чтобы не быть вынужденнымъ выгнать скотъ слишкомъ рано весной или оставлять его на выгонѣ слишкомъ поздно осенью, и распределить пользованіе выгономъ такъ, чтобы каждая часть выгона оставалась въ теченіи лѣта на нѣкоторое время не занятой животными. Если бы хозяинъ завелъ у себя постоянное стойловое корытце въ теченіи цѣлаго года, то все же ему необходимо озаботиться мѣстомъ для выпуска на прогулку всѣхъ молодыхъ животныхъ, по возможности вблизи двора, а, при заведеніи животныхъ такихъ породъ, которыя привыкли уже прежде къ выгону, обратить вниманіе на то, чтобы какъ эти животныя, такъ и ихъ потомки, по крайней мѣрѣ въ первые годы, могли пользоваться хотя отчасти лѣтнимъ выгономъ, такъ какъ въ противномъ случаѣ, какъ показывается опытомъ, производительность такихъ животныхъ уменьшается.

Въ отношеніи отвода *луговыхъ* пространствъ слѣдуетъ сказать то же что и въ отношеніи отвода выгоновъ, т. е. что всѣ земли, которыя, при естественномъ заростаніи ихъ травой, не могутъ дать большихъ выгодъ, чѣмъ при занятіи ихъ подъ воздѣлываніе полевыхъ растеній, или по крайней мѣрѣ одинаковыхъ, какъ и въ этомъ послѣднемъ случаѣ, должны быть обращены подъ поле и цѣлѣны какъ поле, если только положеніе и свойства ихъ вообще допускаютъ такое обращеніе. Въ противномъ случаѣ ихъ слѣдуетъ оставить подъ лугами.

Арендаторъ, какъ уже было сказано, не можетъ поступить въ этомъ отношеніи произвольно, и, прежде нежели сдѣлаетъ такого рода предложеніе владѣльцу, долженъ основательно обдумать, вѣрны

ли выгоды такого обращенія и воспользуется ли онъ ими? Въ большей части случаевъ онъ поступитъ лучше, если оставитъ безъ измѣненія найденное имъ луговое пространство, но постарается принять его въ расчетъ при набраніи сѣвооборота въ устраиваемомъ хозяйствѣ, довести дуга тщательнымъ уходомъ за ними до возможно высокой урожайности и употребить ихъ урожанъ наиболѣе цѣлесообразно и съ наибольшей выгодой въ хозяйствѣ.

Луга, которые хозяинъ имѣетъ въ хозяйствѣ, могутъ быть естественные или искусственные. Первые различаются, большей частью по положенію и по обуславливаемому этимъ послѣднимъ роскошью и быстрому росту травы, который дѣлаетъ необходимымъ косить ее одинъ, два или нѣсколько разъ. Послѣдніе, смотря по роду увлажнения ихъ и устройству ихъ поверхности, могутъ быть *наводняемые или орошаемые (односкатные, двухскатные съ узкими или широкими грядами и смѣшанные)* луга.

При оцѣнкѣ доброты луговъ, должны быть приняты во вниманіе: свойства почвы и подпочвы, много зависящія отъ богатства содержанія въ нихъ хорошаго или кислаго перегноя. Затѣмъ положеніе—горизонтально ли оно или покато, круто, поддержано ли наводненіемъ или защищено отъ нихъ; далѣе, свойство поверхности—равна она или волниста, холмиста, покрыта порослью или свободна отъ нея, представляетъ болотистыя мѣста или ключи, открыта или окружена тѣнистыми лѣсами; наконецъ, характеръ главныхъ злаковъ и ихъ примѣсей, степень сочности травы и качество лугового корма вообще.

При устройствѣ хозяйства, хозяинъ долженъ рѣшить сперва, какую часть потребности въ объемистомъ кормѣ въ состояніи покрыть луга и какую часть этой потребности, затѣмъ, останется покрыть производствомъ на поляхъ другихъ кормовыхъ растений и соломы. Онъ долженъ сообразить, далѣе, какимъ образомъ, безъ употребленія навоза, поднять урожайность луговъ постепеннымъ уплотненіемъ ковылей и поросли, прочисткой старыхъ и проведеніемъ новыхъ осушительныхъ канавъ, удобреніемъ ихъ землей, полученной при прочисткѣ канавъ, компостомъ, золой, партофельной ботвой, быть можетъ также навозной жижей, и въ какой послѣдовательности должно происходить это на различныхъ луговыхъ участкахъ. Онъ долженъ изслѣдовать качество сѣна съ своихъ различныхъ луговыхъ участковъ и, затѣмъ, опредѣлить, какому животному оподолжно быть назначено въ кормъ; при этомъ, соображаясь съ мѣстными почвенными и климатическими условіями и возможностью хорошей уборки, рѣшить, который изъ укосовъ, первый (сѣно) или второй (отаву) слѣдуетъ считать питательнѣе и полезнѣе для той или другой цѣли кормленія. Въ болѣе сѣверныхъ, ровныхъ странахъ, съ болѣе влаж-

ными и теплыми весной и лѣтомъ, но болѣе холодной и суровой осенью, слѣдуетъ считать болѣе питательнымъ сѣно; въ странахъ же, которые, хотя и лежатъ южнѣе, но въ которыхъ весна, вслѣдствіе близости покрытыхъ сѣнгомъ горъ, отличается еще часто суровыми бурями и полповодіемъ, лѣтомъ же—сухью, между тѣмъ какъ осень умеренна, влажна и тепла, должна быть питательнѣе отава. Сообразно этому должно быть и употребленіе лугового корма: хорошее сѣно пригодно для всѣхъ родовъ и возрастовъ травоядныхъ животныхъ; хорошая же отава, напротивъ, пригодна только для коровъ, телятъ, овецъ и въ особенности откармливающимся животнымъ; непригодна же, особенно въ сѣвѣе состояніи, лошадямъ, менѣе всего молодымъ лошадямъ и молодому рогатому скоту. Въ отношеніи распределенія сѣна и отавы, главной заботой хозяина долженъ быть назначить животнымъ тотъ объемистый грубый кормъ съ своихъ луговъ, который животныя наилучше могутъ использовать, а слѣдовательно и наилучше оплатить.

Наконецъ, хозяинъ долженъ избрать тотъ или другой способъ сушки корма. Въ ровныхъ, болѣе сухихъ мѣстностяхъ съ продолжающимися иногда весьма долгое время сухими вѣтерами и вѣтрами, слѣдуетъ отдать предпочтеніе просушкѣ травы на воздухѣ, приготовленію зеленого сѣна, особенно при достаткѣ рабочихъ рукъ; въ мѣстностяхъ же съ обильными атмосферическими ниспаденіями, съ росами, которые долго остаются утромъ и рано возвращаются вечеромъ, съ сильными, внезапными ливнями, которые затрудняютъ сушку, слѣдуетъ отдать предпочтеніе приготовленію бурого сѣна, тѣмъ болѣе, чѣмъ менѣе рабочихъ рукъ для сушки сѣна помощію раструски и сгребанія. Нельзя достаточно рекомендовать употребленія конныхъ граблей и сѣноворошилокъ, въ особенности первыхъ для сушки сѣна на большихъ луговыхъ пространствахъ, съ неслишкомъ влажной и неровной почвой.

Для правительнаго соображенія прироста травы, можно привести слѣдующія заимствуемыя изъ англійскихъ наблюденій числа. Если принять все количество убираемой съ дуга травы равнымъ 100, то изъ этого количества травы вырастаетъ:

отъ начала въ теченіи	роста мал	до конца мѣсяца	апрѣля	2 части или %.
"	юни	"	"	20
"	юля	"	"	35
"	августа	"	"	20
"	сентября	"	"	10
"	октября	"	"	8
"	ноября и вообще до конца роста	"	"	4
"	"	"	"	1

То, что еще отрастаетъ травы послѣ отавы, ставляется скоту на кормъ—употребляется подъ выгоны скота.

Пространство земли, остающееся за выдѣломъ луговыхъ и выгонныхъ участковъ, обращается подъ *поле*, объ устройствѣ котораго говорится ниже.

Что касается вычисления чистого дохода отъ выгоновъ, луговъ и полей, то оно можетъ имѣть цѣлю или хозяйственную оцѣнку т. е. устройство хозяйства, при которомъ, слѣдовательно, подъ каждое угодіе оставляется та земля, которая—и въ томъ количествѣ, при которомъ она можетъ давать наибольшій чистый доходъ; или кадастровую оцѣнку—обложение земли подоходной податью. Въ первомъ случаѣ, оцѣнка по среднимъ за послѣдніе десять лѣтъ цѣнамъ все то, что доставляетъ известное угодіе, а именно: выгонъ—подножный кормъ для скота, лугъ—сѣно и подножный кормъ; поле—зерно, мякнну, солому, клубни, корни, ботву, сѣно, подножный кормъ (въ пару, по жнивью и т. д.), вычисляютъ изъ цѣнности полученнаго такимъ образомъ валового дохода издержки его получения, т. е. земельную ренту, расходы на администрацію, погашеніе, ремонтъ и страховую премию такихъ капиталовъ какъ постройки, коренныя улучшения, инвентарь (орудій, машинъ, рабочаго скота), расходы на удобрение и рабочую силу, вознагражденіе предпринимателя, въ доль причитающейся на каждое угодіе въ отдѣльности, въ остаткѣ получаютъ чистый доходъ. Такой способъ вычисления чистого дохода требуетъ весьма труднаго опредѣленія въ точности предпринимательскаго вознагражденія; иначе это послѣднее или часть его легко могутъ быть причислены къ чистому доходу и тѣмъ легче, чѣмъ больше предпринимательское вознагражденіе въ связи съ знаніемъ; такъ что, въ случаѣ обложения чистого дохода податью, легко могли бы при такомъ способѣ вычисления его, облагаться податью а слѣдовательно и угнетаться предпринимательское вознагражденіе, а съ нимъ и знаніе. Вотъ почему для обложения податью для кадастровой оцѣнки вычисляется не дѣйствительный чистый доходъ, а тотъ чистый доходъ, который могло бы давать угодіе съ почвой известныхъ свойствъ, находящуюся въ известныхъ условіяхъ, при общепринятомъ въ данное время способѣ веденія хозяйства въ странѣ и среднихъ пормахъ урожая и издержекъ.

Эти послѣднія нечаяются Пабстомъ для Германіи въ слѣдующихъ процентахъ валового дохода, различныхъ для различныхъ почвъ:

	издержки составля- ють %	остается въ чистый доходъ %
валового дохода.		
На хорошей пшеаничной и ячменной почвахъ	60—70	30—40.
» средней " "	65—75	25—33.
» дурной " "	70—78	22—30.
» хорошей овсяной почвъ	75—80	20—25.
» дурной овсяной, хорошей ржаной почвахъ	78—84	16—22.
» ржаной и самой дурной овсяной	80—84	16—20.
» 3-хъ лѣтней ржаной безъ удобрения.	75	25.

СТРОЕНІЯ

Новыя постройки и исправленія старыхъ.

Строенія, подобно почвѣ, арендаторъ принимаетъ отъ владѣльца какъ данную сельскохозяйственную величину. Поэтому, для него главный вопросъ заключается болѣе въ выгодномъ пользованіи тѣмъ, что уже находится въ хозяйствѣ, нежели въ преобразованіяхъ, которыя можно было бы сдѣлать при владѣніи имѣніемъ. Каковы бы ни были условія контракта относительно ремонта строеній, арендаторъ въ собственномъ интересѣ долженъ слѣдить за тѣмъ, чтобы мелкія поврежденія исправлялись своевременно, потому что только такимъ путемъ можно избѣгнуть наступленія попрежденій капитальныхъ, могущихъ затруднить весь ходъ хозяйства или какой либо важной отрасли его. Но, съ другой стороны, ему можно совѣтовать остерегаться, безъ крайней нужды, отъ возведенія новыхъ построекъ. При производствѣ ихъ на счетъ владѣльца, арендаторъ всетаки обязывается давать подводы и лично руководить выполненіемъ работъ; такія обязательства не маловажны и должны быть ранѣе взвѣшены и сопоставлены съ ожидаемою выгодною отъ новой постройки. Даже если арендаторъ предпринимаетъ небольшія измѣненія въ постройкахъ, то и они должны производиться только при условіяхъ выгоды и не иначе, какъ съ разрѣшенія владѣльца. Въ подобныхъ случаяхъ, арендаторъ одинъ несетъ издержки по сооруженію и риску, при окончаніи срока контракта онъ не получаетъ никакого вознагражденія отъ владѣльца и, при всемъ томъ, еще можетъ быть принужденъ послѣднимъ къ приведенію строеній въ прежній видъ. Но если, не смотря на эти предостерегающія условія, арендаторъ

всетаки находить выгодным постройку, или перестройку, то он должен по крайней мере поступать как промышленник, имея в виду удовлетворение требований данного короткого времени аренды и употреблять для построек дешевые строительные материалы, как например, легкие сортименты дерева, тонкие стены из легкого кирпича, дражковые или толевые крыши и т. п.

Объем хозяйственных строений.

Молотильный и сноповый сарай.

Размеры этого сарая определяются:

- 1) площадью, которую должен занимать молотильный ток, — и
- 2) количеством снопового хлеба, который желательно сохранить не в скирдах, а в сарае. Высота такова сарая должна быть от 14—16 футов; *длина* — определяется количеством сохраняемого снопового хлеба (а частью еще и сена) и числом рабочих, производящих одновременно молотью, а *ширина* — способом производства молотьи.

Вот данные для определения ширины и длины сарая, на сколько та и другая зависят от площади, занимаемой токком.

При молотье цынами.

16×10 футов	— для одного молотильщика, обходящего хлеб.
7×14 "	— для одного молотильщика, работающего с одного конца.
10×14 "	— для двух молотильщиков, стоящих лицом друг к другу.
14×14 "	— для двух и трех молотильщиков, обходящих хлеб.
18×18 "	— для четырех и пяти молотильщиков.

При молотье большим числом людей, ширину сарая не изменяют, но увеличивают соответственно длину его.

При машинной молотье — требуемое пространство в сарае определяется величиною машины, привода, локомотива и при употреблении разных машин — весьма различно. Наиболее распространенные молотилки бывают шириною от 7—9 фт. и длиною от 9—12—20 ф. Вокруг машины, для удобного при ней действия, оставляется свободное пространство, ширина которого, с той стороны, где собирают вымолоченное зерно, до 3½ ф., а с противоположной, при которой подается в машину хлеб и принимается выбитая солома, 8—10—16 ф.; одною из таковых сторон машина

приставляется к стене сарая, а с другой — оставляется проход в 3½—7 ф. шириною. Сторона хлеба под конный манеж получается, если в удвоенной длине водить прибавить 3½ фута.

Для сохранения снопового хлеба и сена сарай должен иметь в ширину от 20 до 42 ф., высоту — 8—14 ф., а длину — соответственную количеству хлеба и сена, которое предназначается к сохранению. Под в сарае (также как и молотильный ток) надо возвышать над местным горизонтом на высоту 1—1½ ф. Ниже следуют данные, определяющие количество снопового хлеба и сена, которое может быть помещено в данном объеме сарая.

Сена, если при складке утаптывают его ногами, помещается в кубической сажени 36—40 пудов; если же сено сдвинуто гидравлическим прессом, то в той же кубической сажени его доходит до 400 пудов.

Снопового хлеба в 1 кубич. сажени помещается пудов:

Пшеницы и ржи:

Хорошо уродившихся	15
Спутанных	13—14
Тонкосоломистых	16—17
Тонкосоломистых, слежавшихся в снопах	18

Ячменя и овса:

Хорошо уродившихся	16—17
Спутанных	15
Тонкосоломистых	18

Соломы помещается в 1 кубич. саж.

пудов: пшеничной и ржаной:

Длинной	13—14
Неровной, перебитой	8—10
Овсяной	11—12
Ячменной	7—8

Скирды, адоны, стога служат для складки хлеба, соломы и сена при недостатке крытых помещений. Они бывают весьма разнообразной формы, смотря по местному обычаю: многоугольные, круглые, цилиндрические, шарообразные, прямоугольные или квадратные и пр.

Какая бы ни была форма кладки, скирды и стога не только не должны лежать непосредственно на земле, но даже недостаточно, если они кладутся на утрамбованной насыпи земли или слое хвороста; всего лучше устраивать возвышенное деревянное или железное подвое, лежащее на прочных столбах. Его польза состоит в том, что хлеб предохраняется от доступа сырости, поднимается циркулирует воздух и уменьшается опасность отсырения и прелости.

Столбы, на которых лежат подножия скирдовъ, полезны дѣлать каменные, такъ какъ чугунные легко разбиваются, а кирпичные выветриваются. Ихъ полезно снабжать устройствомъ, препятствующимъ доступу къ хлѣбу мышей. При чугунныхъ столбахъ это производится наложеніемъ на верхній конецъ ихъ колоколообразной чугунной крышки, обращенной краями внизъ. Солидные чугунныя подножия стоятъ однако не дешево: при поверхности въ 30—40 кв. и 10—15 столбахъ, они обходятся отъ 35 до 60 руб. сер.

Верхняя, заостренная часть скирдовъ должна быть безусловно покрываема достаточною соломенною покрывшою; боковые же стороны требуютъ этого лишь при не особенно тщательной укладкѣ и слишкомъ неровной поверхности, образуемой обращенными наружу комлями сноповъ. Весьма удобны постоянныя крыши для скирдовъ, которыя можно опускать по мѣрѣ уменьшенія скирда при молотбѣ, но они требуютъ и большаго расхода.

При кладкѣ круглыхъ адоуевъ можно принять, что при величинѣ ихъ, вмѣщающей 60 сноповъ (въ 52 двадцати фунтовыхъ снопа каждый) озимаго хлѣба хорошаго урожая, основаніе должно имѣть около 50 футовъ въ диаметръ.

Размеры *навесовъ и сараевъ* для храненія *повозокъ, орудій и машинъ* опредѣляются по среднему пространству, занимаемому подобными предметами. Слѣдующія данныя показываютъ эти пространства, предполагая, что экипажи и орудія вывозятся изъ сараевъ, при надобности, людьми:

Для помѣщенія 1: четырехколесной телеги, саней, насоса, выезднаго экипажа. требуется	150—200 кв. фут.
Для большой машины, какъ рядовая сѣлка, сѣноворошилка и проч.	130—170 "
Для 2-хъ колесной телеги.	120—160 "
" 1-го плуга	40—50 "
" 1-й бороны	30—40 "
" 1-го экскаватора	50—60 "
" 1-го ватка	80—120 "

Полевые орудія, какъ напр. бороны, которыя можно вѣшать, могутъ быть помѣщаемы на стѣнахъ сарая, или (во время зимы) на чердакахъ, подвѣшенныхъ къ стропильнымъ связямъ. Пространство сарая, конечно, должно быть болѣе абсолютно требуемаго по числу и мѣсту, занимаемому орудіями и повозками; чѣмъ оно больше, тѣмъ легче обращеніе съ орудіями и хорошее ихъ сохраненіе.

Величина *дровяныхъ сараевъ* опредѣляется по количеству сохраняемыхъ дровъ, по длинѣ послѣднихъ и высотѣ владѣи. Нужныя при этомъ данныя показаны въ послѣднемъ отдѣлѣ (см. древесныя мѣры). Для раскладки дровъ требуется въ сарай пространство въ 75—100 кв. фут.

Размеры *амбаровъ* опредѣляются количествомъ сохраняемаго хлѣба, которое въ свою очередь зависитъ отъ: величины урожая, продолжительности и сроковъ молотбы и времени продажи всего хлѣба, или извѣстныхъ партій послѣдняго. Всѣ эти моменты весьма измѣнчивы по мѣстностямъ и даже отдѣльнымъ хозяйствамъ, почему не могутъ быть предложены общія нормы для размѣровъ амбаровъ относительно размѣровъ хозяйства. Но если хозяину извѣстно, сколько онъ долженъ сохранить зерна или другихъ продуктовъ въ амбарахъ, тогда размѣры послѣднихъ могутъ быть основаны на слѣдующихъ данныхъ: въ 1 куб. сажени помѣщается:

ржаной муки	75 пуд.
отрубей	65 "
масляныхъ жмыхъ	60 "
солода	35 "
мякны, смѣшанной съ коло- сомъ	12 "

Одна четверть зерноваго хлѣба занимаетъ объемъ въ $6\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$ кубич. футовъ.

Мука и крупа хранятся въ кулахъ, длиною въ $1\frac{1}{4}$, среднюю шириною въ 1 и толщиною въ $\frac{3}{4}$ аршина, считая на каждыя 12 четвертей около 1 кв. саж. пространства. При достаточномъ мѣстѣ, кули укладываются въ ширину рядами въ 2, а въ высоту до 13 кулей; между рядами оставляется проходъ въ $1\frac{3}{4}$ аршина. Высота ваядаго этажа амбаровъ дѣлается до 8 фут.; они должны быть снабжены достаточнымъ для вентиляціи числомъ оконъ, которыя дѣлаются на соответственной высотѣ величиною въ $1\frac{1}{2}$ —3 фут. ширины и 1 ф. высоты.

Пространства для помѣщенія скота.

1. Лошадей.

Длина стойла для рабочей лошади средней величины	$8\frac{1}{2}$ — $9\frac{1}{2}$ футовъ.
Съ причисленіемъ пространства для яслей	10—11 "
Ширина стойла	5—6 "
Ширина стойла для жеребца и сужеребой кобылы	7—8 "
Высота яслей надъ поломъ для лошади средняго роста	4 "
Высота рѣшетки надъ яслями	$1\frac{1}{2}$ "
Проходъ сзади лошадей	5—6 "
Проходъ между двумя рядами стойлъ	8 "
Пространство для каждаго непривязаннаго жеребенка	40—60 "
Для непривязанной лошади	80—100 "
Для племянной кобылы	130—150 "
Длина стойла для 4 лошадей	20 "
Ширина его	16 "
Высота стойла не менѣе 10 фут., но лучше, особенно при большомъ числѣ лошадей, до	15 "
Паденіе пола на всю длину стойла	8 дюйм.

вы, свиньи, необходимо заботиться, чтобы, по мѣрѣ уменьшенія способности къ главному назначенію этихъ животныхъ, возрастала ихъ цѣнность въ другомъ направленіи; такъ, по мѣрѣ уменьшенія цѣнности рабочаго вола можетъ возрастать его цѣнность, какъ откармливаемого мяснаго животнаго и пр.

Уменьшеніе цѣнности рабочей лошади, вслѣдствіе потребленія ея силъ работою, считаютъ среднимъ числомъ въ 10% ежегодно со стоимости при началѣ службы. Данные относительно уменьшенія цѣнности исключительно племенныхъ животныхъ, съ одной стороны, весьма малочисленны, а съ другой, онѣ и не могутъ быть предложены, какъ общія нормы, потому что производительная способность слишкомъ зависитъ отъ индивидуальныхъ свойствъ животнаго. Поэтому, ограничиваемся показаніемъ возраста, въ которомъ разные животныя способны къ производству потомства:

Жеребецъ, начиная съ	5	и до 15—20 лѣтъ
Кобыла	4	— 12
Быкъ	2	— 7
Корова	1½	— 8
Баранъ	2	— 6
Овца	2	— 8
Боровъ	1	— 3, много до 4.
Свинья	¾	много 8

Свинья, при долгомъ періодѣ употребленія на племя, тернеть слишкомъ много въ цѣнности, какъ откармливаемый скотъ. Отдѣльныя животныя нерѣдко обладаютъ даже въ старости отличною производительною способностью, почему могутъ служить долѣе нормальнаго времени. Но и для нихъ конечная цѣль все таки бойня, для которой они должны быть по крайней мѣрѣ пригодными.

Скотоводство въ организаціи всего хозяйства.

Содержаніемъ скота сельскій хозяинъ имѣетъ въ виду достиженіе двухъ цѣлей:

- 1) выполненія такъ называемыхъ упряжныхъ работъ и
- 2) выгоднаго оплачиванія корма посредствомъ различныхъ животныхъ продуктовъ: молока, масла, сыра, мяса, шерсти, удобренья и проч.

Скотъ, удовлетворяющій первой цѣли, называется *рабочимъ*, а второй—продуктивнымъ или *пользовательнымъ*.

Обѣ цѣли достигаются тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ соответственнѣе избраны виды содержимаго скота, способы пользованія имъ и веденіе производства.

Рабочій скотъ составляетъ необходимую принадлежность каждаго хорошо устроеннаго хозяйства, такъ какъ лишь при условіи его

присутствія возможно рассчитывать на своевременное исполненіе всѣхъ работъ, опредѣляемыхъ принятою системою хозяйства. О потребномъ количествѣ рабочаго скота и обуславливающихъ его моментахъ изложено ниже въ специальной статьѣ.

Пользовательный скотъ относится къ общему строю хозяйства весьма различно, смотря по основнымъ причинамъ, вызывающимъ его содержаніе. Въ этомъ отношеніи слѣдуетъ различать три категоріи случаевъ:

1) если расчетъ, основанный на точныхъ правилахъ сельскохозяйственныхъ учетовъ, показываетъ, что 1 дес. подъ непосредственно-продажными растеніями (главнымъ образомъ хлѣбами) даетъ болѣе чистый доходъ, нежели 1 десятина подъ производствомъ животныхъ продуктовъ, если притомъ почва еще такъ плодородна, что навозное удобреніе не должно быть примѣняемо, потому что оно не окупается, то хозяйство или совсѣмъ не содержитъ пользовательнаго скота, или послѣдній заводится въ немъ лишь въ тѣхъ размѣрахъ, которые опредѣляются пространствомъ свободной земли, не поступившей еще подъ плугъ, по недостатку предложенія рабочихъ силъ въ мѣстности.

2) Если подобный же расчетъ обнаруживаетъ, что 1 дес. подъ производствомъ животныхъ продуктовъ, не считая въ приходѣ отъ скота цѣнности навоза и отбывая въ расходъ кормовыя средства по рыночнымъ цѣнамъ, даетъ болѣе чистый доходъ, нежели 1 дес. подъ непосредственно продажными растеніями, то хозяйство будетъ стремиться отвести подъ скотоводство *возможно большую часть* своей земли, оставляя подъ хлѣба лишь необходимое пространство, величина котораго въ этомъ случаѣ опредѣляется:

а) техникою воздѣлыванія кормовыхъ травъ, которыя по болѣе части, не давая въ годъ по два укоса, должны быть подсѣваемы къ какому либо хлѣбу.

б) Надобностью хозяйства въ соломенной подстилкѣ, которая по ея громоздкости и малочисленности не можетъ быть добываема издалека, но должна производиться въ собственномъ хозяйствѣ.

в) Необходимостью для хозяйства имѣть въ общей массѣ кормовъ извѣстное соотношеніе между питательными веществами и между объемами разныхъ кормовъ для составленія правильныхъ дачъ, удовлетворяющихъ требованіямъ рациональнаго кормленія. Зерновой кормъ составляетъ для этой цѣли необходимое условіе и если не можетъ быть выгодно приобретаемъ покупкою, то долженъ производиться въ собственномъ хозяйствѣ.

г) Наконецъ, весьма трудно составить хорошій сѣвооборотъ, исключивъ изъ него зерновой хлѣбъ.

Всѣ приведенные четыре момента опредѣляютъ *наименьшее* про-

странство, которое въ разсматриваемой категоріи должно быть отводимо подъ хлѣба и вообще зерновыя растенія.

3) Если расчетъ показываетъ, что при мѣстныхъ данныхъ условіяхъ 1 дес. подъ хлѣбомъ даетъ чистый доходъ, но недостаточный относительно высоты мѣстной ренты, а 1 десят. подъ животными продуктами, если не считать въ приходъ отъ скота цѣнности навоза, даетъ убытокъ при условіи оцѣнки кормовыхъ средствъ въ расходъ на скотоводство по рыночной цѣнѣ ихъ, то хозяйство будетъ учреждать пользовательное скотоводство въ размѣрахъ, *которые определяются надобностью хозяйства въ навозномъ удобрѣніи для увеличенія урожая зерноваго хлѣба до той высоты, которая соответствуетъ величинѣ земельной ренты въ данной мѣстности, или при которой получается наибольшій чистый доходъ отъ всей земли даннаго имѣнія.* Въ этой категоріи хозяйствъ, нѣрѣдко хозяева смотрятъ на скотоводство, какъ на орудіе производства для главной отрасли—воздѣлыванія хлѣба, на скотъ—какъ на машину, предназначенную для переработки корма въ навозъ, на послѣдній—какъ на главный, а на молоко, масло, мясо и пр.—какъ побочные продукты скотоводства. Изъ такого взгляда, между прочимъ, возникло предубѣжденіе противъ скотоводства и названіе его «необходимымъ зломъ», а это въ свою очередь во многихъ случаяхъ даетъ поводъ многимъ хозяевамъ, уже по принципу, не заботиться о хорошемъ кормленіи и содержаніи скота въ хозяйствахъ, относящихся къ разсматриваемой категоріи. Подобный взглядъ и вытекающія изъ него наваившія слѣдствія основаны на заблужденіи и неясномъ пониманіи экономическаго соотношенія скотоводства и производства непосредственно продажныхъ растеній. Пользовательное скотоводство въ разсматриваемомъ случаѣ приноситъ убытокъ лишь кажущійся и условный, вслѣдствіе того, что:

а) въ учетъ прихода отъ скота хозяинъ не считаетъ цѣнности навоза и

б) скотоводство условно разсматривается, какъ отдѣльное производство, какъ бы вырванное изъ общаго организма хозяйства.

Но если поставить въ приходъ отъ скота цѣнность навоза, равною цѣнности того увеличенія урожая зерна, которое онъ производитъ на хлѣбныхъ поляхъ, то непременно окажется: 1) что скотоводство даетъ и въ этой категоріи чистый доходъ и 2) что чистый доходъ отъ *всего хозяйства* при скотоводствѣ получается высшій, нежели получался бы безъ него, вслѣдствіе полученія въ послѣднемъ случаѣ меньшихъ урожаевъ хлѣба и другихъ растеній.

Если такимъ образомъ неітрѣнъ основной взглядъ на положеніе скотоводства, вызываемаго потребностью хозяйства въ навозѣ, то тѣмъ болѣе ложно слѣдствіе его, ведущее къ дурному кормленію и

содержанію подобнаго скота. Для хозяйства всякое скотоводство тѣмъ выгоднѣе, чѣмъ выше то *чистое оплачиваніе* единицы корма, которое оно доставляетъ. При скотоводствѣ, непосредственно доходномъ (2 категоріи), вслѣдствіе высокаго оплачиванія корма, чистый доходъ отъ всего хозяйства увеличивается непосредственно, а при скотоводствѣ, содержимомъ для производства удобрѣнія, высокое оплачиваніе корма ведетъ къ уменьшенію стоимости производства навоза и слѣдовательно косвенно—тоже къ возвышенію чистаго дохода отъ всего хозяйства, такъ какъ, по мѣрѣ уменьшенія стоимости производства навоза, въ той же степени понижаются издержки производства для воздѣлыванія зерна и вообще непосредственно продажныхъ растеній.

Поэтому, первымъ правиломъ рациональной организаціи всякаго пользовательнаго скотоводства должно быть такое устройство послѣдняго, при которомъ достигается *возможно высшее въ данной мѣстности чистое оплачиваніе единицы корма.* Эта цѣль достигается соответственнымъ выборомъ:

1) вида содержимыхъ домашнихъ животныхъ;

2) направленія, или способа пользованія и

3) рациональнаго устройства и правильнаго веденія производства въ каждой избранной отрасли.

Всѣ вопросы, относящіеся къ этимъ тремъ пунктамъ, могутъ быть удовлетворительно разрѣшены лишь на основаніи *точныхъ сравнительныхъ учетовъ*, причемъ должны быть приняты во вниманіе: система хозяйства, которая ведется въ имѣніи, количество и родъ производимыхъ кормовыхъ средствъ, условія сбыта и цѣны, капиталъ, имѣющійся въ распоряженіи, познанія и опытность хозяина и пр. Потребныя для этого точки опоры изложены въ спеціальномъ отдѣлѣ о скотоводствѣ.

Инвентарь въ орудіяхъ.

Виды его, качество, размѣры и цѣнность. Всѣ орудія и машины, потребныя для веденія хозяйства, составляютъ то, что называется *мертвымъ инвентаремъ*. Присутствіе его въ хозяйствѣ столь же необходимо и вызывается тою же причиною, какъ и содержаніе собственнаго рабочаго скота: безъ этого условія невозможно выполнить съ успѣхомъ, дешево и своевременно, ручныя и упряжныя работы, предписываемыя системою хозяйства, а слѣдовательно нельзя осуществить планъ рациональной организаціи хозяйства.

Первая задача хозяина по отношенію къ инвентарю орудій заключается въ опредѣленіи его *состава и размѣровъ*. Рѣшеніе обоихъ вопросовъ вытекаетъ изъ системы хозяйства, принятой въ имѣніи,

и наближе изъ количества ручныхъ и упряжныхъ рабочихъ силъ, опредѣляемыхъ этою системою. Такъ какъ системы хозяйства безконечно различны, то и нельзя предложить общей нормы для размѣровъ мертвца инвентаря, которою могли бы руководствоваться хозяева; тѣмъ не менѣе однако, многіе авторитетные германскіе хозяева полагаютъ, что капиталъ въ мертвомъ инвентарѣ составляетъ приблизительно, если отсутствуютъ крупныя машины, около $\frac{1}{6}$ части всего оборотнаго капитала (арендаторскаго), при интенсивномъ хозяйствѣ—болѣе; но эта норма слишкомъ непостоянна, чтобы могла служить практическимъ руководствомъ. Поэтому въ каждомъ частномъ случаѣ размѣры инвентаря должны подлежать спеціальному опредѣленію хозяина. При подобныхъ вычисленіяхъ слѣдуетъ предварительно, на основаніи системы хозяйства, опредѣлить число потребныхъ рабочихъ силъ, а по послѣднему уже размѣры мертвца инвентаря.

Вотъ данныя, которыя могутъ служить точками опоры при такихъ вычисленіяхъ.

На 2 упряжи 3 плуга или 3 сохи.

" 4	" 5	" "	" "
" 5	" 6	" "	" "

(Если орудіе одноконное, то и упряжь подразумевается одноконная, при пароконныхъ орудіяхъ—пароконныя упряжи). Число одноконныхъ боронъ должно быть равно числу сохъ; при употребленіи пароконныхъ плуговъ, число боронъ пароконныхъ должно быть равно числу плуговъ; но при употребленіи плуговъ и одноконныхъ боронъ, число послѣднихъ можетъ быть въ $1\frac{1}{2}$ —2 раза болѣе числа плуговъ, такъ какъ послѣдніе приводятся въ дѣйствіе двумя животными. Число катковъ, экстирпаторовъ, скарификаторовъ, окучниковъ, почвоуглубителей и мотыгъ зависитъ отъ степени, въ какой примѣняются эти орудія. Число телегъ или равно числу упряжей, или нѣсколько болѣе послѣдняго, напр. на 3—4 упряжи—4—5 телегъ, такъ какъ при этомъ доставляется возможность, при перевозочныхъ работахъ (навозъ, сѣно), работать на перемѣнныхъ телегахъ (пока привезенный возъ разгружается, лошади отправляется за новымъ возомъ).

Число крупныхъ машинъ, если предварительный расчетъ показалъ выгоду ихъ введенія, можетъ быть опредѣлено только на основаніи спеціального вычисленія. Такъ напр., для опредѣленія числа рядовыхъ сѣялокъ этотъ расчетъ дѣлается на основаніи: 1) засѣваемого сѣянкою въ день пространства, 2) пространства земли въ хозяйствѣ, предназначеннаго къ рядовому посѣву и 3) по числу дѣйствительныхъ дней сѣва въ теченіе нормальнаго для данной мѣстности періода посѣва. Подобнымъ же образомъ можетъ

быть вычислено число потребныхъ молотилокъ того или другаго размѣра, жатвенныхъ машинъ и пр. Но, выгодно или нѣтъ введеніе подобныхъ машинъ, это должно быть рѣшено предварительно, на основаніи сравненія стоимости одного и того же количества полезной хозяйственной работы машиннымъ или другимъ способомъ, который можетъ быть противопоставленъ послѣднему. Наконецъ, утварь, необходимая для скотоводства, опредѣляется родомъ и цѣлью содержанія скота, а ручные инструменты, какъ: серпы, косы, вилы, и пр.—числомъ людей, работающихъ въ хозяйствѣ даннымъ видомъ инструмента одновременно, а также и тѣмъ, работаютъ ли поденщики хозяйскими, или своими инструментами.

Большая часть сѣялокъ въ разбросъ, сѣноворошилки и конныя грабли требуютъ при дѣйствіи одну лошадь; рядовыя сѣялки, конныя мотыги, сѣнокосилки и жатвенныя машины—двухъ лошадей; конныя молотилки, смотря по размѣрамъ, 2—6 лошадей, или половъ. При большихъ размѣрахъ болѣею частію выгодно уже паровыя молотилки.

Такимъ образомъ, на основаніи системы хозяйства и количества рабочихъ силъ, хозяинъ рѣшаетъ вычисленіемъ: *какія орудія и въ какомъ числѣ* должны находиться въ хозяйствѣ. Но прежде нежели привести въ исполненіе новое положеніе инвентаря, арендаторъ долженъ подвергнуть критическому обзору тотъ инвентарь, который онъ получилъ отъ владѣльца, изслѣдуя: на сколько онъ удовлетворяетъ по качеству новой системѣ хозяйства и достаточенъ ли по числу орудій и ихъ составу. Сопоставленіемъ результатовъ такого обзора съ нормальною силой достигается окончательное заключеніе о количествѣ и родѣ инвентаря, который долженъ быть заведенъ вновь. Такъ какъ обзоръ инвентаря распространяется на весьма большое число разнообразныхъ предметовъ, то для облегченія его необходимо вести *реестръ инвентаря*, въ формѣ соотвѣтственной таблицы. Основаніемъ классификаціи орудій и машинъ, или группировки ихъ въ реестрѣ, можетъ быть избранъ произвольный признакъ, смотря по удобству его для памяти хозяина. Такъ, можно распредѣлять орудія въ группы по ихъ назначенію (пахатныя, для посѣва, ухода, уборки и пр.), по мѣсту употребленія (полевая, луговая, скотнаго двора и пр.), по матеріалу, мѣсту храненія и пр. Какъ примѣръ надобнаго реестра можно предложить слѣдующій.

1) *Полевая, луговая и сѣножатная орудія*, съ отдѣльными горизонтальными строками для: а) плуговъ, б) сохъ, в) боронъ, г) катковъ, д) экстирпаторовъ и скарификаторовъ, е) рядовыхъ пропашниковъ и мотыгъ, ж) одноконныхъ и пароконныхъ телегъ и фуръ.

2) *Крупныя машины*: сѣялки, жатвенныя, молотилки, вѣялки, сортировки и пр., за исключеніемъ машинъ для скотнаго двора.

3) *Мелкія земледѣльческія орудія*: косы, серпы, вилы, лопаты, цѣпы, мѣшки, мѣрные сосуды и т. под.

4) *Предметы скотнаго двора*: ясли, колоды, скребницы, щетки, корне—и соломорѣзки, паровые котлы, зернодробилки, навозный насосъ и т. под.

5) *Приборы молочки и сыроварни.*

6) *Предметы мастерской, столярныя, слесарныя и пр.*

Такой, или подобный реестръ обрабатывается въ формѣ таблицы, въ которой для каждаго вида орудій должны быть вертикальныя графы, въ которыя вносятся: 1) число штукъ, 2) цѣнность, 3) стоимость ежегодныхъ расходовъ на ремонтъ и возобновленіе, 4) какой отрасли принадлежит орудіе, а слѣдовательно и расходъ на него.

Уменьшеніе цѣнности и ремонтъ.

Установленный на основаніи правильнаго расчета инвентаря представляетъ собою необходимое орудіе производства, которое должно существовать въ хозяйствѣ въ постоянныхъ размѣрахъ до тѣхъ поръ, пока не измѣнится система хозяйства, опредѣлявшая собою послѣдніе.

Но орудія отъ употребленія подвержены: 1) порчѣ, поломкамъ и 2) постоянному потребленію, или изнашиванію, которое ведетъ съ теченіемъ времени къ полной негодности для употребленія. Первое требуетъ отъ хозяина постоянныхъ затратъ на починку орудій или ихъ *ремонтъ*, а второе—имѣетъ слѣдствіемъ ежегодную затрату извѣстной суммы на покупку нѣкотораго числа новыхъ орудій, взаимѣя тѣхъ, которыя достигли состоянія негодности къ употребленію. Сумма этихъ двухъ затратъ: на *ремонтъ* и *возобновленіе*, составляетъ ежегодный расходъ всякаго хозяина на содержаніе мертваго инвентаря, какъ орудія производства. Величина обѣихъ затратъ весьма непостоянна, такъ какъ порча и потребленіе орудій и машинъ зависятъ отъ весьма большаго числа обстоятельствъ, дѣйствіе которыхъ не можетъ быть измѣрено количественно; таковы напр. чисто мѣстныя условія: состояніе дорогъ, грунтъ почвы, матеріалъ, изъ котораго сдѣлано орудіе, присутствіе мастерскихъ для починки, умѣнье рабочихъ и пр. А потому, въ каждомъ частномъ случаѣ хозяинъ опредѣляетъ величину расхода на ремонтъ на основаніи дѣйствительной стоимости починки, а величину расхода на потребленіе—приблизительно, на основаніи мѣстнаго (если еще нѣтъ собственнаго) опыта. При полномъ же отсутствіи послѣдняго, пособіемъ для хозяина въ его смѣтахъ могутъ служить нижеприводимыя общія нормы, извлеченныя изъ многолѣтняго опыта германскаго хо-

зяйства. Въ первой вертикальной графѣ показанъ приблизительный расходъ на ремонтъ, а во второй—на возобновленіе. Такъ какъ величина послѣдняго равна величинѣ потребленія орудій, то она показываетъ въ тоже время продолжительность службы разнаго рода орудій въ хозяйствѣ. Оба расхода выражены въ % отношеніи къ стоимости орудій при началѣ службы.

	Расходъ на ремонтъ. Въ процентахъ первоначальной стоимости.	Расходъ на возобновленіе. Въ процентахъ первоначальной стоимости.	Сумма всего расходъ. Въ крѣп.
Плуги	20 проц.	5 проц.	25 крѣп.
Почвоуглубители	25 "	8 "	33 "
Бороны деревянные	40 "	10 "	50 "
Бороны желѣзныя	15 "	6 "	21 "
Катки деревянные	12 "	6 "	18 "
Маркеры	10 "	6 "	16 "
Окучники	25 "	8 "	33 "
Стѣлки	10 "	5 "	15 "
Телеги, фуры	10 "	5 "	15 "
Сани деревянные	10 "	5 "	15 "
Конская сбруя	25 "	6 "	31 "
Воловыя ярма	30 "	10 "	40 "
Соломорѣзки	10 "	6 "	16 "
Корнерѣзки	10 "	6 "	16 "
Конныя молотилки	15 "	6 "	21 "
Зерночистилки	10 "	6 "	16 "

Такъ какъ приведенныя данныя взяты въ % отношеніи цѣны, по которой орудія приобретаются, то величина абсолютнаго расхода на содержаніе мертваго инвентаря можетъ колебаться въ большихъ предѣлахъ въ зависимости отъ цѣнности орудій. Послѣдняя можетъ быть опредѣлена лишь для каждой мѣстности или страны спеціально. Относящіяся сюда данныя изложены въ концѣ книги. Второй вертикальный столбецъ вышеприведенныхъ чиселъ можетъ служить основаніемъ также и для оцѣнки *тарифа*, принимаемыхъ арендаторомъ орудій; для этого опредѣляется ихъ стоимость въ новомъ видѣ и изъ послѣдней складывается извѣстная процентная доля, соответствующая числу лѣтъ, прослуженныхъ орудіемъ.

Домашняя утварь. Арендаторъ весьма рѣдко находитъ въ хозяйствѣ относящіяся сюда предметы и болѣею частью долженъ заводить ихъ вновь.

Вся составная части домашней утвари изнашиваются весьма быстро, такъ какъ находятся въ повседнежномъ употребленіи рабочихъ, которые рѣдко заботятся объ ихъ сохраненіи. Сюда относятся: принадлежности кухни и отопленія рабочихъ жидыхъ помѣщеній; предметы для стирки и катанья бѣлья; предметы жилыхъ

выхъ средствъ величина расхода извлекается изъ имѣющихся въ хозяйствѣ таблицъ смѣтъ нормальнаго кормленія каждаго вида скота.

Расходъ зерна, муки и отрубей, потребляемыхъ въ хозяйствѣ, вычисляется частью изъ тѣхъ же смѣтъ кормленія скота, а частью изъ смѣтъ продовольствія постоянныхъ рабочихъ и лицъ, составляющихъ персоналъ для управленія имѣніемъ. Наконецъ, въ составъ расхода должны быть рубрики и для такихъ матеріаловъ и продуктовъ, которые приобретаются хозяйствомъ покупкою, каковы напр.: соль, масло, мазь для смазки колесъ, масло, желѣзо и т. под. Сопоставленіе приходовъ и расходовъ всѣхъ одноименныхъ продуктовъ обнаруживаетъ относительно однихъ избытокъ (какъ напр. для зерна), относительно другихъ недостатокъ. Въ послѣднемъ случаѣ хозяинъ разсматриваетъ вопросъ о способѣ полученія недостающаго предмета: а) покупкою, б) производствомъ въ собственномъ хозяйствѣ, в) замѣною суррогатомъ, приобретаемымъ въ хозяйствѣ, или покупкою. Относительно же предметовъ, доставляющихъ избытокъ прихода надъ расходомъ, хозяину предстоитъ разрѣшить вопросъ о выгодѣ ихъ употребленія, которое можетъ состоять въ: а) непосредственной продажѣ, б) въ переработкѣ въ животныя и в) въ техническіе продукты: спиртъ, сахаръ, масло и пр. Каждый подобный вопросъ требуетъ спеціальнаго и весьма точнаго учета.

ПЕРСОНАЛЪ ХОЗЯЙСТВА.

Отношеніе хозяина къ персоналу имѣнія вообще.

Естественныя силы природы, содѣйствующія созиданію сельскохозяйственныхъ цѣнностей, а также капиталы, вкладываемые для этого въ производство, могутъ приносить соответственные плоды лишь при посредствѣ *труда* — цѣлесообразнаго и направляемаго ясною, сознательною мыслью. Виды сельскохозяйственныхъ работъ такъ многочисленны и разнообразны, что уже съ древнѣйшихъ временъ признается польза примѣненія въ хозяйственномъ производствѣ *раздѣленія труда*, которое становится болѣе и болѣе необходимымъ по мѣрѣ возрастанія культуры вообще. Въ хозяйствѣ нѣтъ работы, которая не требовала бы физическаго труда; но даже въ тѣхъ случаяхъ, когда работа состоитъ преимущественно, и даже повидимому исключительно, изъ послѣдняго, она будетъ бесполезна, если выполняется безсмысленно и безъ всякаго плана; послѣдній поденщикъ долженъ работать съ полнымъ сознаніемъ цѣли своего труда, такъ какъ только при этомъ условіи онъ можетъ работать производительно. Поэтому каждый хозяинъ, въ собственномъ интересѣ, долженъ объяснить подчиненнымъ ему высшимъ и низшимъ рабочимъ цѣль ихъ работы; долженъ стремиться къ образованію персонала, состоящаго изъ самостоятельно мыслящихъ и производительныхъ работниковъ; онъ долженъ, словомъ и дѣломъ, внушать имъ убѣжденіе, что прибыль и убытокъ работодателя и рабочаго обуславливаютъ другъ друга взаимно и что онъ смотритъ на нихъ не какъ на орудія достиженія только своей выгоды, но какъ на прілежныхъ помощниковъ, имѣющихъ естественное право на участіе въ доходахъ, добываемыхъ общими усиліями. Вся учрежденія (шхо-

лы, больницы, ссудосберегательныя кассы и т. п.), устраиваемыя общими заботами хозяевъ и рабочихъ, имѣющія цѣлю поднятіе тѣлеснаго, духовнаго и нравственнаго благосостоянія рабочихъ, если только они соответствуютъ мѣстнымъ условіямъ, потребностямъ и средствамъ, всегда имѣютъ слѣдствіемъ обоюдную пользу работодателей и рабочихъ и едва-ли гдѣ либо выполнение человѣческихъ обязанностей къ себѣ и своему ближнему вознаграждается такъ хорошо, какъ въ этомъ случаѣ. Подобныя учрежденія дѣйствуютъ тѣмъ плодотворнѣе, чѣмъ въ большей мѣрѣ они устроены не одною стороною, но *совокупными* усиліями работниковъ и хозяина; лучше всѣхъ другихъ средствъ, они содѣйствуютъ къ искорененію столь распространеннаго взгляда работодателей на рабочихъ, какъ на толпу зависящихъ людей, обязанныхъ работать не для себя, но для хозяина; рабочихъ же подобныя учрежденія приучаютъ смотреть на себя, какъ на свободныхъ, самостоятельныхъ людей, сознающихъ себя ответственными за качество своего труда и умѣющихъ, въ моменты несчастій, искать исхода не въ преступленіи или нищенствѣ, но въ развитіи личной энергіи и въ самопомощи.

Совокупность всѣхъ условій, связанныхъ съ содержаніемъ въ хозяйствѣ необходимаго личнаго состава, нерѣдко называютъ внутреннимъ хозяйствомъ или домохозяйствомъ, домоустройствомъ, противопоставляя этотъ элементъ хозяйства другимъ крупнымъ составнымъ частямъ послѣдняго — полеводству и скотоводству. При этомъ, на внутреннее хозяйство смотрятъ весьма часто, какъ на отрасль, состоящую почти исключительно изъ однихъ издержекъ, между тѣмъ какъ земледѣіе и скотоводство разсматриваются, какъ отрасли, доставляющія доходъ. Изъ такого взгляда вытекаетъ обыкновенно слишкомъ небрежное отношеніе хозяина къ условіямъ, окружающимъ содержаніе личнаго состава, находящагося въ имѣніи. Едва-ли нужно доказывать, что подобный взглядъ нецѣленъ. Если полеводство и скотоводство, съ ихъ развитіями, суть тѣ отрасли хозяйства, посредствомъ которыхъ хозяинъ *добываетъ* богатство, то домоустройство, съ своей стороны, представляетъ ту составную часть хозяйства, при помощи которой хозяинъ добытое *сохраняетъ, собираетъ и переводитъ* опять въ тѣ отрасли хозяйства, которыя производятъ непосредственно. Весь хозяйственный персоналъ имѣнія можно раздѣлить на двѣ категоріи лицъ: 1) для управленія, надзора и веденія хозяйства, или высшихъ служащихъ и 2) для выполнения всѣхъ механическихъ работъ въ хозяйствѣ, или рабочихъ въ тѣсномъ смыслѣ слова.

I. Наличный составъ для управленія и надзора за хозяйствомъ.

Вниманіе хозяина по отношенію къ лицамъ этой категоріи должно быть сосредоточено на обсужденіи слѣдующихъ вопросовъ: 1) опредѣленія рода и числа необходимыхъ для даннаго имѣнія лицъ; 2) назначенія соответственнаго содержанія для каждаго отдѣльнаго лица; 3) назначенія рода занятій и способа выполненія ихъ для каждаго лица и 4) вычисленія общей суммы, которая должна ежегодно расходоваться на содержаніе всѣхъ лицъ этой категоріи.

Къ составу персонала для управленія и надзора принадлежать всѣ лица, занятія которыхъ состоятъ въ: веденіи хозяйства, контролѣ, счетоводствѣ, полученіи и выдачѣ денегъ, сохраненіи предметовъ и надзорѣ. По роду занятій и положенію, лицъ этого разряда можно подраздѣлять въ свою очередь на два разряда: а) лицъ для управленія хозяйствомъ въ тѣсномъ смыслѣ, каковы: управляющіе, ихъ помощники, кассиры, бухгалтеры, волонтеры, практиканты и б) лицъ исключительно для надзора, какъ: главные скотники, садовники, ключники, полевые надсмотрщики и пр. Послѣдняя категорія лицъ переходитъ незамѣтнымъ образомъ къ состоянію простыхъ работниковъ, а потому въ нижеслѣдующемъ подразумѣваются лишь тѣ лица для надзора, которыя почти не занимаются механическимъ трудомъ.

Общая начала, относящіяся къ разрѣшенію вопроса о наличномъ составѣ персонала.

Число лицъ для управленія и надзора, а слѣдовательно и число *мѣстъ*, учреждаемыхъ для этого въ штатѣ хозяйства, не можетъ быть выражено общимъ нормальнымъ числомъ, такъ какъ оно зависитъ отъ слишкомъ переменныхъ условій: величины хозяйства, интенсивности его, разнообразія отраслей и пр. Оно должно быть достаточно, согласно потребности; если оно болѣе этого, то хозяинъ несетъ лишний расходъ, если менѣе, то нѣкоторые лица обременяются слишкомъ большимъ трудомъ и при разнообразіи послѣдняго не успѣваютъ слѣдить за правильнымъ ходомъ той или другой отрасли. Единственнымъ теоретическимъ масштабомъ въ этомъ случаѣ можно принять только время работы, а именно: наличный составъ можетъ считаться достаточнымъ, если, при 8—10 часовой работѣ въ день каждаго отдѣльнаго лица, всѣ работы, требуемыя по управленію и надзору, выполняются вполне удовлетворительно.

При *выборѣ* лицъ на учрежденныя мѣста хозяинъ долженъ соображаться съ одной стороны съ знаніемъ ими дѣла, а съ другой съ свойствами ихъ характера, между которыми особенно дороги: вѣр-

ность своему долгу, честность и любовь къ избранному призванію. Если подобными чертами характера обладают лица, уже служившія въ хозяйствѣ до вступленія новаго хозяина, то они должны быть безусловно предпочитаемы новичкамъ, такъ какъ соединяютъ въ себѣ еще и мѣстный опытъ, который дается нелегкою затратою многихъ лѣтъ дѣятельности.

Каждый членъ управленія и надзора по хозяйству долженъ исполнѣть точно знать *кругъ своей дѣятельности* и своихъ обязанностей; только при этомъ условіи возможно, съ другой стороны, возложить на каждое лицо соответствующую степень *ответственности* за неуспѣшность той или другой части въ хозяйствѣ. Общ. задачи въ хорошо организованныхъ хозяйствахъ достигаются посредствомъ *спеціальныхъ письменныхъ инструкцій*, которыми снабжаются лица по управленію; при этомъ однако необходимо выражать, что отвѣтственность старшаго не уменьшается отвѣтственностью подчиненнаго ему лица. При большомъ имѣніи весьма полезна *главная общіяя инструкція*, въ которой ясно и недвусмысленно *установлены отношенія между лицами всего персонала*, степень ихъ самостоятельности и подчиненности другъ другу и т. д. Здѣсь необходимо припомнить каждому хозяину, что нѣтъ ничего вреднѣе для дѣла, нѣтъ ничего болѣе затрудняющаго пріобрѣтеніе (или воспитаніе въ хозяйствѣ) хорошаго управляющаго, какъ нерѣдко учреждаемое ложное отношеніе къ послѣднему подчиненныхъ лицъ, когда какое-либо изъ нихъ, будучи оффиціально подчинено управляющему, неоффиціально пользуется у владѣльца не только равнымъ, но даже большимъ вліяніемъ, или какъ говорятъ — большою силою. При назначеніи круга обязанностей лицъ весьма важно обратить вниманіе также на соответствующую *спеціализацію* занятій и особенно на распредѣленіе ихъ, сообразно способностямъ, познаніямъ и отчасти склонности каждого, между отдѣльными лицами. Что значать въ сельскомъ хозяйствѣ упражненіе въ извѣстномъ дѣлѣ, пріобрѣтеніе навыка и опытности, это доказываютъ результаты, добытые такимъ путемъ въ области скотоводства Беккуземъ и др. Но само собою разумѣется, что подобное раздѣленіе труда можетъ быть допущено лишь на столько, на сколько та или другая данная отрасль въ состояніи занять производительно *все оземь* назначаемого для нея спеціалиста.

Отъ всѣхъ лицъ управленія хозяйствомъ требуются: знанія, напряженіе всѣхъ силъ человѣка, твердость, вѣрность и преданность дѣлу; взаимно этого, хозяинъ долженъ съ своей стороны доставить имъ соответствующее *вознагражденіе*, величина котораго условливается главнымъ образомъ: степенью познаній и образованія лица, размѣромъ и родомъ лежащихъ на немъ обязанностей и обществен-

нымъ его положеніемъ. Эти условія измѣняются съ каждою страной и съ каждымъ имѣніемъ, а потому величина вознагражденія не можетъ быть выражена общими нормами. Часть вознагражденія въ сельскомъ хозяйствѣ обыкновенно состоитъ изъ опредѣленнаго жалованья деньгами, а часть — $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{3}$ годоваго общаго содержанія — изъ предметовъ натурою. Въ высшей степени полезно примѣненіе къ вознагражденію лицъ разсматриваемой категоріи принципа участія ихъ въ додѣ чистаго дохода отъ всего хозяйства, или для лицъ, работающихъ въ извѣстной отрасли, участія въ додѣ чистаго дохода, приносимаго послѣднею. Въ этомъ случаѣ интересы хозяина и служащаго совпадаютъ и служатъ лучшимъ побужденіемъ къ напряженію энергій каждаго лица. Подобное же значеніе имѣетъ также учрежденіе пенсій для служащихъ, если имѣетъ достаточную величину для подобнаго предпріятія. Въ послѣднемъ случаѣ фондъ для уплаты пенсій составляется изъ ежегодныхъ вычетовъ изъ жалованья, составляющихъ опредѣленный (обыкновенно не болѣе 30%) процентъ послѣдняго.

Устройство персонала для управленія хозяйствомъ въ частности.

Составъ персонала. Въ каждомъ самостоятельномъ хозяйствѣ, по роду происходящихъ въ немъ занятій, требуются лица: А) для управленія въ тѣсномъ смыслѣ, а именно: 1) для веденія всего хозяйства; сюда относятся: заведывающій хозяйствомъ и его помощники; 2) счетоводства и отчетности; сюда относятся: бухгалтеры, кассеры, конторщики и пр. Б) *Для надзора*, куда относятся лица: 1) для надзора надъ всѣми ручными и упряжными работами въ полѣ, а также надъ содержаніемъ рабочаго скота, скотнымъ дворомъ и рабочими на послѣднемъ; 2) для надзора за молочнымъ скотомъ, молочной комнатою и женскою прислугою по молочному хозяйству; 3) овчары разнаго значенія, смотря по объему овцеводства; 4) надсмотрщики надъ лугами (если есть на послѣднихъ сооруженія по осушкѣ и орошенію); 5) надъ отдѣльными техническими производствами: крахмальнымъ, маслобойнымъ и пр.; 6) надъ ригею, овинами, сараями, подвалами и амбарами, а также содержащимися въ нихъ запасами корма, зерна и пр.; 7) для надзора надъ садами, огородами и питомниками.

Число лицъ всѣхъ перечисленныхъ назначеній зависить отъ размѣровъ хозяйства и разнообразія его отраслей, а потому должно быть опредѣляемо въ каждомъ частномъ случаѣ спеціально. При большихъ размѣрахъ хозяйства, для одного и того же назначенія, нерѣдко необходимо имѣть нѣсколько лицъ; въ обратномъ случаѣ,

одно и тоже лицо должно выполнять два и болѣе назначеній. При систематической организаціи хозяйства, по опредѣленіи числа служащихъ лицъ, слѣдуетъ составить таблицу нормальнаго штата по слѣдующимъ.

Занятія по управленію и надзору и ихъ распределение между лицами. Распределение занятій между многими лицами имѣетъ цѣлью установленіе аккуратности, порядка и цѣлесообразности въ исполненіи всѣхъ работъ по хозяйству. Но, такое раздѣленіе труда не должно вредить единству общаго стремленія всѣхъ къ главной цѣли производства — добыванію наибольшаго чистаго дохода. Это достигается: точнымъ опредѣленіемъ обязанностей каждаго инструкціею, знаніемъ лицъ значенія, въ общемъ планѣ хозяйства, порученной каждому изъ нихъ части и въ особенности — соединеніемъ общаго управленія и власти въ одномъ лицѣ, которому поручено завѣдываніе хозяйствомъ. Занятія по управленію хозяйствомъ состоятъ въ: 1) веденіи производства и управленіи персоналомъ, 2) въ счетоводствѣ, ревизіи и контролѣ и 3) въ надзорѣ. Для каждаго изъ нихъ главнымъ хозяиномъ долженъ быть установленъ *порядокъ работы* относительно: способа, времени и мѣста выполненія, а для занятій лицъ, работы которыхъ находятся въ связи, порядокъ сношенія и взаимныхъ отношеній ихъ другъ къ другу. Такая задача можетъ быть выполнена лучше всего при помощи письменныхъ, главной и спеціальныхъ, инструкцій, которыми снабжаются всѣ лица наличнаго состава.

1) *Веденіе хозяйства* и управленіе личнымъ составомъ послѣдняго должно быть всегда сосредоточено въ одномъ лицѣ, отъ котораго исходитъ общее руководство и на которомъ лежитъ главная отвѣтственность за ходъ всего хозяйства и дѣятельность всѣхъ подчиненныхъ лицъ. Только такимъ путемъ можетъ быть достигнуто единство дѣйствій всѣхъ служащихъ лицъ. Главныя обязанности завѣдывающаго (имъ можетъ быть владѣлецъ, арендаторъ, или управляющій) хозяйствомъ заключаются въ: а) составленіи и добросовѣстномъ выполненіи общаго плана организаціи хозяйства для добыванія соответственнаго валоваго и чистаго дохода и регулированія издержекъ производства въ хозяйственныхъ границахъ; б) въ поощреніяхъ и поддержаніи всѣхъ видовъ капитала въ потребныхъ размѣрахъ и состояніи постоянной цѣнности; в) присмотрѣ за дѣятельностью подчиненныхъ относительно исполненія ихъ обязанностей; г) разумномъ веденіи всѣхъ работъ: въ полѣ, на скотномъ дворѣ, лугахъ, заводахъ и пр.; е) распределеніи занятій между служащими лицами, нарядахъ на работы, контролѣ и ревизіи всѣхъ частей хозяйства; ф) распоряженіяхъ по покупкѣ и продажѣ всѣхъ продуктовъ и матеріаловъ, обращающихся въ хозяйствѣ; г) назначеніи для хо-

зяйства соответственной формы счетоводства и постоянномъ контролѣ правильности его веденія, ревизіи состоянія кассы и пр.; h) веденіи всей переписки, относящейся къ дѣламъ имѣнія.

2) *Занятія по счетоводству* заключаются во внесеніи всѣхъ важныхъ измѣненій по хозяйству въ постоянныя (памятныя) книги, ежедневныхъ записяхъ (въ вѣдомостяхъ и журналахъ) всѣхъ текущихъ измѣненій по движенію въ хозяйствѣ всякаго рода цѣнностей, приготовленіи чрезъ извѣстные сроки выборокъ изъ журналовъ и вѣдомостей для опредѣленія недѣльных и мѣсячныхъ итоговъ относительно состоянія извѣстныхъ однородныхъ предметовъ въ хозяйствѣ и наконецъ — въ опредѣленіи въ концѣ года чистаго дохода, доставленнаго всѣмъ хозяйствомъ по отдѣльнымъ его отраслямъ, или въ составленіи *главной книги* по системѣ двойнаго счетоводства, какъ единственной формы, дающей возможность опредѣленія доходности каждой отдѣльной отрасли хозяйства. Ведущій счетоводство обязанъ, по требованію управляющаго, въ каждый данный моментъ, составить тотъ или другой учетъ, выборку, вѣдомость и пр., которые могутъ понадобиться для обзоранія состоянія разныхъ капиталовъ хозяйства, или для хозяйственныхъ соображеній. Если имѣніе состоитъ изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ хозяйствъ (хуторы, фольварки, экономіи), то каждое изъ послѣднихъ должно вести собственное счетоводство и разсматривать предметы, приобретаемые или передаваемые другимъ хозяйствамъ того же владѣнія, какъ покупаемые или отчуждаемые на сторону. Въ главномъ управленіи ведется общее счетоводство и въ концѣ года опредѣляется общій чистый доходъ отъ всего владѣнія.

3) Работы по *надзору* за разными частями хозяйства относятся, хотя и косвеннымъ образомъ, также къ управленію. Занятія ими лица (бурмистры, скотники, ключники, полевые надсмотрщики и пр.) суть исполнительные органы управленія и имѣютъ назначеніемъ: сохраненіе порученныхъ имъ капиталовъ, непосредственное руководство всякими механическими работами, точное выполненіе приказаній управленія и побужденіе рабочихъ къ дѣятельности; имъ поручается прямая забота о томъ, чтобы всѣ работы выполнялись въ свое время, дешево и рационально въ техническомъ отношеніи; эти лица по большей части ведутъ также первоначальныя записи количества произведенныхъ ежедневно работъ и поступленій или выдачъ предметовъ изъ мѣстъ храненія; такія записи въ концѣ каждаго дня передаются въ контору и служатъ здѣсь исходною точкою отправленія для дальнѣйшаго счетоводства.

При значительныхъ размѣрахъ имѣнія черезъ лицъ этой категоріи дѣлаются ежедневныя наряды на работы по всѣмъ частямъ хозяйства. При такомъ назначеніи лицъ по надзору, они очевидно

должны быть хорошо знакомы съ способомъ производства, условіями техническаго совершенства и потребнымъ временемъ для выполнения всѣхъ работъ, поручаемыхъ ихъ надзору и непосредственной критикѣ, а будучи поставлены въ прямые постоянныя отношенія съ рабочими, служа для послѣднихъ примѣромъ, они должны обладать значительною опытностью и тактомъ, которымъ наиболее определяется уваженіе и послушаніе работника.

Вознаграждение и содержаніе. Содержаніе персонала по управленію хозяйствомъ составляетъ значительную часть общей суммы издержекъ производства и должно быть опредѣлено впередъ каждымъ хозяиномъ, приступающимъ къ устройству хозяйства, какъ отдѣльная составная часть всѣхъ расходовъ послѣдняго. Содержаніе должно быть справедливо и достаточно, такъ какъ этимъ путемъ всего скорѣе можно побудить служащихъ къ усиленной дѣятельности, честности и продолжительности службы въ хозяйствѣ. Съ другой стороны, оно не должно быть слишкомъ велико и должно находиться въ соотвѣтственности съ величиною получаемого дохода отъ имѣнія. Точками исхода въ этомъ случаѣ служатъ размѣры и доходность послѣдняго и требуемая отъ лица образованіе и знаніе, а рѣшается вопросъ мѣстнымъ опытомъ, который вездѣ выработалъ уже въ этомъ отношеніи болѣе или менѣе нормальныя величины.

Опредѣленное для каждаго лица годовое содержаніе заключается въ: 1) постоянной денежной суммѣ (жалованье), 2) извѣстномъ количествѣ разныхъ предметовъ потребленія натурою (пашекъ, содержаніе въ тѣсномъ смыслѣ слова) и иногда сверхъ того еще въ 3) условленной, выраженной въ процентахъ, доль чистаго дохода, или увеличенія послѣдняго выше средняго. Предметы, доставляемые натурою, состоятъ обыкновенно изъ зерна разнаго рода, крупы, муки, мяса, топлива, также помѣщенія и прислуги. Въ каждомъ частномъ случаѣ всѣ эти предметы вычисляются для каждаго лица, на основаніи годовой нормальной потребности, и полученныя количества выражаются деньгами по оцѣнкѣ, основанной на среднихъ цѣнахъ въ теченіи послѣднихъ 5 лѣтъ. Отношеніе между величиною денежнаго жалованья и содержаніемъ натурою весьма различно, смотря по мѣстности и положенію лица въ общей іерархіи личнаго состава управленія. Чѣмъ дешевле въ данной мѣстности земледѣльческіе продукты, тѣмъ меньшую долю общаго содержанія должны составлять, по цѣнности, предметы, выдаваемые натурою, также какъ и обратно. Въ содержаніи высшихъ лицъ по управленію денежное жалованье должно составлять большую долю относительно цѣнности натуральнаго содержанія, нежели въ содержаніи лицъ низшихъ и среднихъ, что обуславливается различіемъ въ потребностяхъ тѣхъ и другихъ. Въ германскихъ хозяйствахъ полагаютъ цѣнность возна-

гражденія натурою равною для высшихъ лицъ управленія $\frac{2}{5}$ — $\frac{1}{2}$ стоимости всего годоваго содержанія, для лицъ среднихъ $\frac{1}{2}$, а низшихъ $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$. При условіяхъ цѣнъ на продукты въ Россіи денежное вознагражденіе должно составлять, особенно для высшихъ лицъ, относительно большую часть всего содержанія.

Вознагражденіе изъ доли чистаго дохода, или его приращенія, составляетъ обыкновенно только часть всего содержанія, какъ экстренная прибавка къ послѣднему. Распространеніе примѣненія этого способа вознагражденія заслуживаетъ всевозможнаго поощренія, такъ какъ для большинства среднихъ людей высшимъ побужденіемъ къ дѣятельности служить всегда собственный интересъ, который въ этомъ случаѣ вполне совпадаетъ съ интересами владѣльца. Но, вводя такой способъ вознагражденія, необходимо принять во вниманіе, что при назначеніи вознагражденія изъ доли чистаго дохода, послѣдній долженъ быть изслѣдованъ точно и правильно, а это можетъ имѣть мѣсто только при существованіи въ хозяйствѣ раціональнаго счетоводства. Въ противномъ случаѣ, особенно при недобросовѣстности управляющаго, владѣлецъ можетъ понести чрезвычайныя потери, протекующія изъ самаго способа вычисленія величины чистаго дохода, при которомъ принимаются въ расчетъ только: денежные расходы и поступления, но не опредѣляется величина ежегоднаго уменьшенія цѣнности, лежащей во всѣхъ капиталахъ имѣнія: строеніяхъ, скотѣ, орудіяхъ и пр. Вычисляя подобнымъ образомъ величину чистаго дохода отъ имѣнія, недобросовѣстный управляющій, получающій процентное вознагражденіе, можетъ при значительномъ хозяйствѣ составить въ 5—8 лѣтъ большой капиталъ и передать владѣльцу имѣніе въ такомъ состояніи, при которомъ потребуются заводить вновь и сразу большую часть капиталовъ. Если счетоводство ведется правильно и хозяинъ учреждаетъ систему вознагражденія (или его части) изъ доли чистаго дохода, то величина послѣдней и способъ вычисленія опредѣляются: существомъ отраслей, приносящихъ доходъ, степенью возможности возвышенія доходности данной отрасли посредствомъ усиленной энергіи, знаній и прилежанія управляющихъ лицъ, а также тѣмъ, въ какой степени та или другая отрасль имѣетъ значеніе въ общей организациіи хозяйства и на сколько она заслуживаетъ поощренія въ виду общаго направленія, которое хозяинъ желаетъ придать своему производству. Относительно способа вычисленія доли изъ дохода существуютъ различныя системы въ практикѣ, смотря потому, съ какою величиною назначаются проценты. Самую несовершенную форму представляетъ назначеніе процентнаго вознагражденія съ величины валоваго дохода, или съ приращенія послѣдняго выше средняго, такъ какъ это можетъ служить побужденіемъ къ

роскошной, но невыгодной, тратѣ орудій производства (корма, удобрѣнія, работы и пр.); болѣе цѣлесообразно брать за основаніе опредѣленія вознагражденія величину чистаго дохода; но и при этомъ способѣ цѣль хозяина достигается не вполне, такъ какъ при большомъ процентѣ со всего чистаго дохода—лица управленія могутъ удовлетворяться обыкновенною его величиною и слѣдовательно не имѣютъ чрезвычайнаго побужденія къ дѣятельности, а при маломъ — абсолютная величина, получаемая ими съ того приращенія дохода, которое произведено ихъ *особенными* усиліями, слишкомъ незначительна, чтобы имѣть большое вліяніе. Наиболѣе удовлетворяетъ цѣли вознагражденія назначеніемъ извѣстнаго процента съ *увеличенія чистаго* дохода выше условленнаго впередъ средняго, притомъ въ восходящей степени, напр. съ 1-ой—1000 р., составляющей избытокъ чистаго дохода надъ среднимъ, назначается 5%, со 2-ой—1000 р.—7%, съ 3-й — 10% и т. д. Подобная форма вознагражденія можетъ быть примѣнена какъ къ цѣлому хозяйству, такъ и отдѣльнымъ его отраслямъ (молочное скотоводство, сыродѣліе, овцеводство и пр.). Въ первомъ случаѣ вычисленная въ концѣ года величина всего вознагражденія изъ доли дохода распределяется между всеми лицами, подлежащими поощренію, для чего устанавливается иногда постоянныя процентныя части всей суммы вознагражденія, назначаемыя отдѣльнымъ лицамъ по управленію; напр. управляющій получаетъ 70% этой суммы, бухгалтеръ 10%, овецоводъ 10%, полевой надсмотрщикъ 5% и главный скотникъ 5%.

Когда, при организаціи хозяйства въ частномъ случаѣ, изслѣдованы всѣ вышеизложенные вопросы: назначены число, родъ занятій и вознагражденіе для всѣхъ лицъ по управленію и надзору, хозяинъ долженъ обработать общую *таблицу штата всего персонала* съ показаніемъ въ ней величины всего содержанія для каждаго лица: а) деньгами, б) натурою и в) общею суммою. Въ эту таблицу не можетъ быть включено вознагражденіе изъ дохода, такъ какъ оно можетъ быть извѣстно лишь по окончаніи года. Для облегченія счетоводства, въ этой же таблицѣ, при отдѣльныхъ лицахъ, должно быть показано—какой отрасли хозяйства пойдетъ въ расходъ ихъ содержаніе; расходъ же на лицъ, служащихъ для всего хозяйства, распределяется между всеми отраслями послѣдняго и показывается въ счетоводствѣ—въ счетѣ общаго управленія. Весьма трудно предложить какую либо норму для величины всего расхода на управленіе хозяйствомъ въ составѣ общихъ издержекъ производства; особенно для русскихъ условій, гдѣ, при недавнемъ уничтоженіи крѣпостнаго натуральнаго хозяйства, опытъ не выработалъ еще въ этомъ отношеніи достаточной традиціи и не успѣли возникнуть прочныя отношенія спроса и предложенія на услуги людей съ сельскохозяйствен-

ными образованіемъ. Въ Германіи, гдѣ эти условія уже выработаны долгимъ опытомъ, расходы по управленію и надзору полагаютъ равными 6—7% валоваго дохода, а именно: 3—5% на управленіе, 2—5%—надзоръ; при выраженіи же этого расхода долей чистаго дохода, его полагаютъ = 10—20%, послѣдняго; само собою разумѣется, что при этомъ имѣется въ виду такая величина чистаго и валоваго дохода, которая вполне соответствуетъ экономическимъ условіямъ мѣстности, такъ какъ было бы большою ошибкою ставить величину затратъ на управленіе хозяйствомъ въ зависимость отъ размѣровъ несоответственной величины валоваго и чистаго дохода.

II. Рабочія силы.

Рабочія силы, употребляемыя въ хозяйствѣ, принято раздѣлять на: ручныя (человѣческія) и упряжныя (животныя). Въ нижеслѣдующемъ имѣются въ виду только ручныя человѣческія рабочія силы. По способу найма и вознагражденія, они въ свою очередь могутъ быть раздѣлены на: постоянныхъ, поденныхъ и издѣльныхъ рабочихъ.

Постоянные работники.

Число ихъ, потребное съ хозяйствомъ. Постоянные рабочіе составляютъ непосредственный переходъ отъ лицъ надзора къ поденщикамъ. Число рабочихъ этого разряда опредѣляется въ хозяйствѣ въ зависимости отъ величины и состава его, числа и рода отраслей, требующихъ работы постоянного работника, особенно отъ размѣровъ и вида скотоводства, интенсивности веденія производства вообще и степени, въ какой возможно въ данной мѣстности пріобрѣтать въ разные времена года хорошихъ поденщиковъ, или отъ предложенія поденной и издѣльной работы вообще.

Надо замѣтить, что выполненіе работъ постоянными рабочими, которые круглый годъ получаютъ опредѣленное жалованье и содержаніе, обходится по большей части дороже, нежели посредствомъ поденщиковъ или издѣльныхъ работниковъ; но въ хозяйствѣ, съ одной стороны, всегда есть множество мелкихъ, разнородныхъ работъ, которые производятся урывками и повторяются ежедневно въ разные часы; подобныя работы не могутъ быть выполнены поденщиками или издѣльными рабочими; съ другой стороны, въ хозяйствѣ есть работы, въ которыхъ рабочему поручается извѣстный капиталъ, сохраненіе потѣраго требуетъ со стороны работника особеннаго вниманія и любви къ дѣлу, которая можетъ быть воспитана въ немъ лишь при условіи постоянной жизни въ имѣніи, развиваю-

щей привычку къ мѣсту, охоту къ своему занятію и взглядъ на общность собственныхъ интересовъ съ выгодною хозяина.

Это условіе имѣетъ особую важность въ отрасляхъ скотоводства, гдѣ состояніе животныхъ въ высшей степени можетъ быть улучшено, если животныя и работники не только привыкаютъ другъ къ другу, но между ними устанавливается даже нѣкоторый родъ взаимной привязанности. Поэтому размѣры, въ которыхъ хозяйство держитъ постоянныхъ рабочихъ, зависятъ, болѣе нежели отъ всякихъ другихъ обстоятельствъ, отъ объема и рода скотоводства. Небезъ вліянія въ этомъ случаѣ также и то, поручается ли въ данной мѣстности уходъ за скотомъ мужчинамъ или женщинамъ. Упряжный рабочий скотъ почти вездѣ поручается работникамъ, которые обыкновенно въ тоже время работаютъ на немъ; мужчинамъ же болѣею частью поручается уходъ и кормленіе всякаго крупнаго скота и овецъ; уходъ за свиньями и птицами производится обыкновенно женщинами; но въ этомъ вопросѣ полезно слѣдовать вообще мѣстному обычаю, который развиваетъ навыкъ въ тѣхъ рабочихъ, которые постоянно обращаются со скотомъ. При назначеніи числа постоянныхъ рабочихъ для ухода за скотомъ, точками опоры могутъ служить нижеслѣдующія нормальныя числа.

На: 2—4 лошадей 1 рабочий.

• 2—6 воловъ 1 рабочий.

• 12—20 сѣвнящихся при работѣ воловъ 1 пастухъ.

• 15—20 коровъ 1 рабочий, который одновременно выполняетъ всѣ работы, требуемыя при доеніи и въ молочной комнатѣ.

• 10—12 коровъ 1 женщина, исполняющая доеніе и всѣ работы въ молочной.

• 15—20 штукъ молодаго рогатаго скота старше 1 года — 1 женщина.

• 10—15 штукъ молодаго рогатаго скота моложе 1 года — 1 женщина.

• 25—30 коровъ на выгонѣ — 1 пастухъ.

• 15—25 коровъ на выгонѣ — 1 женщина для доенія и работы въ молочной.

• 10—12 откармливаемыхъ воловъ 1 рабочий.

• 30—50 свиней разнаго возраста 1 женщина, но когда не

производится *разведение* свиней, а только кормленіе и откармливаніе, то уходъ за свиньями поручается одной изъ скотницъ молочнаго хозяйства, или кухаркѣ для рабочихъ. Въ послѣднемъ случаѣ полагаютъ 1 кухарку на 10—15 человекъ.

На число рабочихъ, потребныхъ для *овцеводства*, имѣютъ вліяніе:

отдаленность, положеніе и округленность выгоновъ, составъ стада и особенно соимѣстная или отдѣльная пастба животныхъ разныхъ классовъ возраста и пола; послѣднее тѣмъ необходимѣе, чѣмъ болѣе высокіе сорта шерсти составляютъ цѣль производства. Вообще полагаютъ, при тонкорунномъ овцеводствѣ, на 300—400 штукъ овецъ 1 пастуха. Кромѣ рабочихъ для скотоводства, въ хозяйствѣ содержится, смотря по его размѣрамъ, еще большее или меньшее число постоянныхъ рабочихъ для разныхъ работъ на дворѣ и въ полѣ, напр. для очистки стойлъ отъ навоза и обращенія съ послѣднимъ на мѣстахъ его храненія, полевые и дворные сторожа и пр. Въ сторожа, особенно ночные, не слѣдуетъ назначать рабочихъ, утомленныхъ дневною работою, а также очень молодыхъ работниковъ, полныхъ силы, которые могутъ исполнять болѣе трудныя и прямо производительныя работы. Число подобныхъ рабочихъ, завися отъ размѣровъ хозяйства и его состава, не можетъ быть опредѣлено въ видѣ нормы; во всякомъ случаѣ оно должно быть таково, чтобы каждый работникъ былъ постоянно занятъ работою въ теченіе круглаго года. Возможность къ этому доставляется въ особенности учрежденіемъ техническихъ производствъ, воздѣлываніемъ льна, конопли и пр., могущихъ наполнить время работника въ теченіе зимы, когда такъ мало работъ специально земледѣльческихъ.

По сроку найма, различаютъ постоянныхъ годовыхъ и лѣтныхъ работниковъ; при продолжительной зимѣ число рабочихъ, потребныхъ для лѣтныхъ работъ, гораздо болѣе, нежели для зимнихъ, а потому въ хозяйствахъ по болѣе части въ помощь постояннымъ годовымъ работникамъ нанимается еще известное число рабочихъ только на лѣто; число ихъ опредѣляется преимущественно потребностью хозяйства въ упряжныхъ работахъ для обработки и совершенія яровыхъ посѣвовъ, такъ какъ число содержащихся въ хозяйствѣ однихъ годовыхъ рабочихъ обыкновенно недостаточно для этой цѣли.

Стоимость содержанія постоянныхъ рабочихъ. При опредѣленіи, во что обходится содержаніе каждаго постоянного работника, должны быть учтены слѣдующія величины:

1) Плата чистыми деньгами въ видѣ постоянного жалованья, обыкновенныхъ подарковъ, иногда уплаты хозяиномъ податей и проч.

2) Подарки разныхъ предметовъ, принятые обычаемъ, какъ напримѣръ, передъ большими праздниками (холстъ, ситецъ, предметы одежды вообще и проч.).

3) Стоимость харчей.

4) Приходящаяся на каждаго работника доля расходовъ по отопленію, освѣщенію и ремонту рабочаго дома и кухни.

5) Такая же доля по содержанию кухонной утвари, посуды и инвентаря рабочего дома.

6) Приходящаяся на работника доля стоимости содержания кухни для всех рабочих.

7) Риск в случае болезни и других происшествий.

8) Обыкновенные проценты со всех капиталов, предназначенных для содержания всех рабочих (вычисляется доля, причитающаяся на каждого работника).

Величина всех перечисленных расходов весьма изысканна для различных местностей, смотря по ценности денег и потребных продуктов, в особенности пищи, а также по степени образования, потребностей и привычек рабочего класса. В общей сумме стоимости содержания рабочих, ценность харчей, помещения, отопления, освещения и вообще предметов, доставляемых натурою, составляет почти всегда большую часть, нежели денежное вознаграждение, а именно: в Германии полагают, что для низших рабочих первая величина относится ко второй, как 7: 2, а для высших, получающих обыкновенно одинаковое с первыми содержание, но большее жалованье, как 7: 4. Величина годового *денежного жалованья* постоянного работника, живущего на хозяйских харчах, в Германии колеблется между 20 и 60 талерами (22—65 руб. сер.), в разных губерниях России—между 40—100 руб.; для работницы—в Германии 12—35 талер. и в России от 12—50 р. с. Денежное жалованье *дѣтних* рабочих (за дѣто) колеблется в разных губерниях между 15 и 70 руб. При работѣ на своих харчах величина денежного жалованья увеличивается на 3—5 р. с. в мѣсяцъ. Стоимость зимних постоянных рабочих значительно меньше. Что касается до рангов рабочих по получаемому жалованью, то в этом отношении лучшим руководством служить классификация по местному обычаю; несколько более других получают рабочие, от которых требуются некоторые знания или умѣнье, как напр. главные конюхи и скотники, пчеловоды, овчары и т. п. В хозяйствѣ должна быть ведена особая книга, в которой для каждого постоянного (годового, дѣтняго или зимняго) работника открывается особый листъ; в заголовкѣ его обозначаются договорныя условія вознаграждения, а затѣмъ вносятся въ двухъ отдѣльных рубрикахъ всѣ дѣйствительныя выдачи: а) деньгами и б) натурою; если при каждом получении рабочий росписывается, то книга может служить въ то же время юридическимъ документомъ. В концѣ года, для опредѣленія стоимости содержания одного постоянного работника, въ листѣ каждого отмѣчается причитающаяся доля изъ тѣхъ предметовъ, которые расходуются натурою одновременно на всехъ рабочихъ (общій столъ, освѣщеніе, помѣщеніе и пр.).

Весьма трудно опредѣлить въ видѣ нормы, какую долю *общаго содержанія натурою* составляютъ предметы отдѣльных потребностей работника, такъ какъ количественное соотношеніе между ними зависитъ отъ слишкомъ большаго числа непостоянныхъ обстоятельствъ, между которыми наибольшее вліяніе имѣютъ уровень образованія рабочихъ и отношеніе между цѣнами на разные предметы потребленія. Вѣ Германии полагаютъ, что изъ общей суммы цѣнностей, потребляемыхъ рабочими, около 50% идетъ на пищу, 16% одежду, 7 $\frac{1}{2}$ % жилище, 8 $\frac{1}{2}$ % освѣщеніе и отопленіе, 8 $\frac{1}{2}$ % кормъ скоту, 3% на домашнюю утварь; остальное на разные малые расходы.

Пища рабочихъ составляетъ такимъ образомъ наибольшую часть натуральныхъ издержекъ и потому пропитаніе рабочихъ должно составлять предметъ тщательнаго заботливаго соображенія для каждого хозяина. Главный пунктъ, на который въ этомъ отношеніи должно быть обращено вниманіе, состоитъ въ разумномъ выборѣ и соответственномъ распредѣленіи предметовъ пищи, т. е. въ такомъ сочетаніи пищевыхъ средствъ, при которомъ возможно большая часть содержащихся въ нихъ питательныхъ веществъ достигаютъ усвоенія; въ дешевомъ *приобрѣтеніи* предметовъ пищи посредствомъ покупки оптомъ и въ выгодное время, дешевизнѣ способа *приготовленія* пищи и въ устраненіи всѣхъ поводовъ къ непроизводительной потерѣ. *Наиболѣе питательные* предметы пищи суть въ то же время по большей части и *самые дешевые для хозяина*; пищевыя средства, содержащія мало *питательныхъ веществъ* и дурно приготовленныя, суть въ то же время и самыя *дорогія*. При напряженной работѣ (а всякая другая въ рациональномъ хозяйствѣ должна быть отрицаема, какъ невыгодная) дневная пища взрослого работника должна содержать слѣдующія количества главныхъ питательныхъ веществъ: $\frac{4}{10}$ фунта протеиновыхъ веществъ, 1 $\frac{3}{10}$ ф. углеводовъ и $\frac{1}{3}$ ф. жира; если пища содержитъ питательныхъ веществъ меньше, то рабочий, *если бы и желалъ, то не можетъ работать нормально*, такъ какъ сила создается питательными веществами; эту истину долженъ помнить каждый хозяинъ; она вполнѣ объясняетъ, почему хорошее питаніе работника есть въ то же время и самое выгодное. При назначеніи предметовъ для пищи, необходимо обратить вниманіе на мѣстные привычки въ этомъ отношеніи населенія и рѣзкія измѣненія вводить лишь мало по малу, привыкая къ нимъ исподоволь рабочихъ.

Изобильное содержаніе рабочихъ, кромѣ вышепомянутыхъ непосредственныхъ выгодъ, приноситъ еще косвенную пользу, значеніе которой особенно велико въ русскомъ хозяйствѣ, гдѣ такъ часто раздаются сѣтованія на недостатокъ рабочихъ руль: къ хозяину,

дающему хорошее содержание, рабочие нанимаются всегда охотнее. Вот общее заключение, къ которому въ этомъ отношеніи пришла Высочайше Учр. Комм. (стр. 25 доклада) для изслѣдованія сельскаго хозяйства въ Россіи: «тамъ, гдѣ они (рабочіе) рассчитываются аккуратно, гдѣ имъ не приходится ходить за получениемъ отработанныхъ денегъ по нѣскольку разъ и гдѣ ихъ хорошо кормятъ, тамъ они работаютъ охотнѣе, менѣе часто бросаютъ работу и на слѣдующій годъ большую часть снова приходятъ къ тѣмъ же хозяевамъ». Это уваженіе заслуживаетъ тѣмъ большаго вниманія хозяевъ, что оно сдѣлано на основаніи изслѣдованія весьма большаго числа фактовъ.

Если во всякомъ рациональномъ хозяйствѣ считается правиломъ составлять на годъ впередъ смѣту кормленія скота, то конечно подобная работа еще болѣе необходима относительно годоваго пропитанія постоянныхъ рабочихъ. Для этой цѣли, послѣ уборки, въ октябрѣ мѣсяцѣ, когда уже представляется возможность обзорнаго собранія запасовъ и существующихъ цѣнъ на жизненные средства, хозяинъ долженъ выработать смѣту наилучшаго состава пищи, со включеніемъ всѣхъ главныхъ предметовъ ея и приварка, произведя расчетъ ежедневнаго рациона на нѣкоторое число людей, напр. на 10 человѣкъ. Дѣлая въ такой смѣтѣ (по составу ежедневнаго завтрака, обѣда и ужина), сообразно отношенію цѣнъ и качеству пищевыхъ средствъ, соответственныя замѣщенія и измѣненія, хозяинъ достигаетъ составленія наиболее нормальной смѣты съ наилучшимъ сочетаніемъ составныхъ частей пищи при относительно наибольшей дешевизнѣ последней; само собою разумѣется, что при этомъ должны быть приняты во вниманіе вкусы рабочихъ и разныя соображенія мѣстнаго характера. Выработанная окончательно смѣта служитъ основаніемъ для опредѣленія годоваго количества требуемыхъ продуктовъ и соответственныхъ оптовыхъ закупокъ. Для ближайшаго наставленія въ разработку подобной смѣты, въ приложеніи, въ концѣ книги помѣщена таблица г. Штехера, въ которой показаны количества и цѣны разныхъ предметовъ пищи, которою продовольствовались постоянные рабочіе въ одномъ саксонскомъ имѣніи; приведенныя въ ней количества и составъ пищи могутъ быть рекомендованы въ тоже время, какъ заслуживающія обсужденія для руководства; (надо замѣтить впрочемъ, что показанныя въ таблицѣ цѣны совершенно другія, нежели въ Россіи).

Главный предметъ пищи рабочихъ составляетъ *хлѣбъ*, порція котораго должна быть приблизительно въ 2 ф. въ день на взрослаго работника, или въ годъ около 730 ф. Это количество приготавливается изъ 550—560 ф. ржаной муки. При вычисленіи большими количествами можно полагать, что изъ 3 ф. муки выходитъ 4 ф. хлѣба; 100 ф. пшеничной муки даютъ 125—126 ф. хлѣба (100 ф. ржаной муки—

130—132 ф.). При употребленіи болѣе сухой муки, съ механическихъ мельницъ *), выходы хлѣба конечно нѣсколько болѣе.

Далѣе можно принять, что 100 ф. ржаной муки даютъ 150—160 ф. тѣста, которое теряетъ при печеніи хлѣба 20—25 ф. воды, вследствие испаренія. Рѣшетные мука и хлѣбъ содержатъ болѣе белковаго вещества (азотъ), нежели ситные, въ которыхъ за то болѣе процентное содержаніе крахмала; перые поэтому питательнѣе, но за то менѣе удобоваримы.

Проросшее зерно, которое нѣрѣдко получается при уборкѣ, сопряженной продолжительной дождливою погодой, даетъ очень дурной хлѣбъ, такъ какъ клейковина такого зерна размягчается и не можетъ придать хлѣбу необходимой рыхлости и порозности. Въ настоящее время однако, въ поваренной соли нашли средство, помощью котораго можно возратить клейковинѣ ея плотность. По изслѣдованію Лемана, изъ муки проросшей ржи можно приготовить удовлетворительный хлѣбъ, прибавляя на каждые 3 ф. муки около 2 лотовъ соли; послѣдняя предохраняетъ такой хлѣбъ также отъ плѣсени. Въ странахъ и мѣстностяхъ съ высокимъ развитіемъ промышленности хозяева находятъ болѣе выгоднымъ, вмѣсто собственнаго печенія хлѣба, покупать его, мѣнясь съ пекарнями зерномъ или мукою на готовый хлѣбъ; при этомъ, за 100 ф. доставленнаго ржаного зерна получаютъ обыкновенно 100 ф. ржаного хлѣба.

При перемолѣ на муку, за 3 ф. последней получаютъ 4 ф. хлѣба и приплачиваютъ деньгами за стоимость перепеченія. Хозяева практики согласно утверждаютъ, что пріобрѣтеніе такимъ путемъ хлѣба обходится дешевле, нежели при собственномъ печеніи, конечно при

*) При перемолѣ, на количество и качество получаемыхъ продуктовъ оказываютъ весьма большое вліяніе качество хлѣбнаго зерна и способъ помола. Такъ, въ Саксоніи многочисленные опыты надъ перемоломъ на одной и той же мельницѣ америкаской конструкціи показали, что изъ 100 ф. ржи получается:

	При тяжеломъ зернѣ.	При легковѣсномъ зернѣ.
Тонкой муки	73%	63%
Грубой муки	4%	6%
Огрубей	17%	24%
Потери испарившейся воды .	5%	5 1/2%
Потери на россыль	1%	1 1/2%
	100	100

Въ полученной мукѣ содержалось 14% воды. Отсюда видно, что обыкновенно приводимая норма, по которой изъ 100 ф. зерна получается среднимъ числомъ 75—85 ф. муки и 8—12 ф. огрубей, справедлива только для тяжелаго и тонкожестятаго зерна, между тѣмъ какъ при легковѣсномъ и толстожестистомъ количество отрубей можетъ достигать при перемолѣ до 1/4 вѣса зерна, соответственно чему должно уменьшаться процентное количество выходящей муки.

условіи нахождения въ мѣстности значительныхъ хлѣбопекарень. Наибольше соответственный видъ мяса для рабочихъ—говядина рогатого скота. Можно считать правиломъ, чтобы рабочіе въ мясобдѣ получали ежедневно говядину въ количествѣ по крайней мѣрѣ $\frac{1}{2}$ ф. (до $\frac{3}{4}$ ф.) въ день; во время постовъ мясо замѣняется рыбою. Приблизительно около половины годовой порціи мяса можетъ быть выдаваемо въ видѣ солонны, для приготовления которой требуется на 100 ф. говядины 5 ф. соли и $2\frac{1}{2}$ —10 лотовъ селитры. Потребленіе молока на рабочаго въ годъ въ Германіи считается малымъ, если оно = 8—10 ведрамъ, болышимъ въ = 20—23 ведра; годовое количество *коровьяго масла* считается тамъ же при обильныхъ порціонахъ мяса въ 15—18 ф., при среднихъ — въ 20—27 ф., при преобладаніи же въ пищѣ картофеля, муки и крупы — въ 32—50 ф.; годовую потребность *картофеля* на рабочаго считают малою въ 1 четверть, высокою — въ 4 четверти; при большомъ употребленіи кислой *капусты*, годовое количество ея можно положить въ 60 вилковъ на человека (и болѣе), соли 20—25 ф., *уксуса* 5—13 кружекъ (или $\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{10}$ ведра); *перца* и *пряностей* на 25—30 копѣекъ въ годъ; *водки*, если она дается ежедневно, 2—4 ведеръ на человека. Само собою разумеется, что установленіе количества того или другаго изъ вышеприведенныхъ пищевыхъ средствъ зависитъ отъ того, какія изъ нихъ преобладаютъ въ пищѣ, такъ какъ одни могутъ до известной степени замѣнять другія. Въ этомъ отношеніи особеннаго вниманія заслуживаютъ посты. Вотъ нѣсколько данныхъ, заимствованныхъ изъ русской практики и собранныхъ В. Учр. Коммиссіей для насл. с.-хоз. въ Россіи, относящихся къ продовольствію постоянныхъ рабочихъ.

По свидѣнію изъ Тверской губ., на рабочаго полагается въ день $\frac{1}{2}$ ф. мяса, гречневой крупы $\frac{3}{4}$ ф., льнянаго масла $\frac{1}{10}$ ф., хлѣба и квасу сколько потребуется. Изъ Смоленской г.; на рабочаго въ мѣсяцъ: 1 п. 30 ф. ржаной муки, 2 гарнца гречневой крупы, 2 ф. сала или 2 ф. постнаго масла (смотря потому, мясобдѣ или постъ), $2\frac{1}{2}$ ф. соли и мясо въ разныхъ количествахъ. Изъ Сибирской г.; на рабочаго въ день: $\frac{1}{2}$ ф. мяса, 2 ф. муки (часть пшеничной), $\frac{1}{3}$ ф. пшена для каши, $\frac{1}{10}$ ф. коноплянаго масла и капусты по надобности. Гродненской г.; на рабочаго въ мѣсяцъ: ржи 14 гарнцевъ, пшеницы $\frac{1}{2}$ гарнца, ячменя $4\frac{1}{2}$ гарнца, гречихи 2 гарнца, гороха 1 гарнецъ, картофеля 12 г., мяса 10 ф., сала 3 ф., соли 3 ф.; въ постъ сало замѣняется 2 ф. постнаго масла. Стоимость харчей колеблется въ разныхъ губерніяхъ между 3 и 5 руб. въ мѣсяцъ. При содержаніи очень большаго числа постоянныхъ рабочихъ въ Германскихъ хозяйствахъ приставляется особый надиратель, специальное занятіе котораго состоитъ въ попеченіи о правильномъ ходѣ продовольствія рабочихъ. Годовую стоимость пропитанія рабочихъ въ Герма-

ни считаютъ, при посредственныхъ харчахъ и дешевыхъ цѣнахъ, въ 65 руб. сер., при обратныхъ условіяхъ до 80—110 руб. сер., считая въ этой суммѣ также стоимость напитковъ: пива, плодоваго вина и водки, составляющихъ обыкновенно расходъ въ 3—12 руб. сер. въ годъ.

Отопленіе, освѣщеніе и пр. Количество древесной массы, потребной для отопленія, весьма различно, смотря по климату и устройству печей. Въ сѣверной Германіи годовую потребность въ топливѣ считаютъ въ $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$ кубической сажени дровъ, или соответственные количества другаго топлива на каждого постоянного работника; эта норма для сѣверной Россіи должна быть нѣсколько увеличена, а для южной уменьшена, хотя въ обоихъ случаяхъ разница въ нашихъ климатическихъ условіяхъ значительно уравнивается несравненно болѣею экономіей, соблюдаемой въ Германіи при употребленіи топлива.

Этотъ расходъ на отопленіе, однако, ни въ какомъ случаѣ не долженъ быть относимъ всецѣло на счетъ постоянныхъ рабочихъ, такъ какъ въ жилыхъ рабочихъ помѣщеніяхъ производится многія работы во время зимы (напр. мятье, тренаніе и чесаніе льна, столярная работа и пр.), которыя должны принимать на себя (т. е. на отрасль, къ которой относится работа) часть расхода на топливо и освѣщеніе. При расчетахъ въ большихъ размѣрахъ, въ сѣверной Германіи полагаютъ, что простое хозяйство безъ техническихъ производствъ, величиною въ 125 десятинъ полей и луговъ, потребляетъ въ годъ 17—20 куб. сажень дровъ; при нѣмныхъ болѣе величины потребности въ дровахъ увеличивается, но относительно въ меньшей степени (при большомъ употребленіи теплаго пойда и паренаго корма скоту, считаютъ въ зиму на 15—20 штукъ крупнаго скота около $\frac{1}{3}$ куб. саж. еловыхъ дровъ). Количество *масла* для *освѣщенія* рабочаго дома можно положить въ 18—24 ф. на лампу въ годъ при ежедневномъ горѣніи въ теченіе 3— $3\frac{1}{2}$ часовъ (исключая лѣто). Годовая стоимость освѣщенія, приходящаяся на долю одного рабочаго, составляетъ примѣрно отъ 40 до 75 коп., а общая сумма расхода по отопленію, освѣщенію и поддержанію жилого дома въ годномъ состояніи не должна превосходить приблизительной нормы въ 2 р. 50 к.—4 руб. на человека.

Прочіе расходы по содержанію постоянныхъ рабочихъ могутъ быть примѣрно положены въ годъ на человека:

на галляшную, мѣдную, жестианную посуду, желѣзо	1 р. 50 к.
„ постели, простыни, подушки и пр.	„ 75 „
„ мебель и домашнюю утварь	„ 60 „
„ стирку всякаго бѣлья	1 „ 15 „
„ мыла по 2 ф. на человека	„ 20 „

Расходы по уходу за жильными помещеніями, больными и проценты (5%) со всѣхъ капиталовъ, предназначенныхъ исключительно для содержанія рабочихъ, составляютъ приблизительно отъ 5 до 10 руб. сер. въ годъ на человека.

Основываясь на представленныхъ нормальныхъ данныхъ, можно принять стоимость всего *натуральнаго* и *денежнаго* содержанія одного годоваго работника приблизительно — 100—130 руб., стоимость содержанія годовою работницы на 20—25 руб. меньше. Ниже слѣдующая примѣрная смета можетъ служить для облегченія *обозрѣнія составныхъ частей всего расхода* на содержаніе 1 годоваго работника.

Наемъ квартиры на годъ	1 р.		
Жалованье деньгами	36 "		39 р. 50 к.
Подарки къ Рождеству и Пасхѣ	2 "	50 к.	
<i>Продовольствіе:</i>			
а) 2½ четверти ржи на хлѣбъ	10 "		
б) 1 четверть пшеницы на печенія	1 "		
с) 2 четверти ячменя на крупу	1 "	25 "	
д) 2 четверти гороха или гречи	1 "		
е) 4 четверти картофеля	6 "		
ф) 2 пуда говядины (или частью рыбы)	5 "		44 р. 50 к.
г) 18 ведеръ молока	3 "	75 "	
и) 50 ф. масла (частью коровьяго, частью постнаго)	10 "		
і) 15 ф сала	1 "	50 "	
к) огородныхъ овощей на	2 "		
л) соли, уксуса, приностей	1 "		
м) спиртныхъ напитков	2 "		
Доля, причитающаяся по отопленію и освѣщенію рабочаго дома, а также по мелкому ремонту его	3 "	50 "	
Доля на поддержаніе посуды и утвари	3 "		
Содержаніе постелей, бѣлье, мыло, стирка	3 "		
Доля на содержаніе кухарки и прислуги для ухода за рабочими помѣщеніями	5 "		18 р.
Рискъ въ несчастныхъ случаяхъ, болѣзни и пр.	2 "	25 "	
Доля обыкновенныхъ процентовъ съ капиталовъ	1 "	25 "	
Итого 102 руб. сер.			

Поденщики и издѣльные рабочіе.

Значеніе ручной работы, управленіе ею и надзоръ.

Какъ ни высока степень, въ которой сельско-хозяйственная промышленность способна къ развитію, какъ ни могущественны средства, доставляемыя ей болѣе и болѣе механикою для выполненія разныхъ хозяйственныхъ работъ, тѣмъ не менѣе однако сельское хозяйство, прямо или косвенно (именно для управленія механическими

вспомогательными средствами), всегда будетъ имѣть такую потребность въ искусныхъ, приспособляющихся къ разнымъ случаямъ работы, рукахъ, которая не можетъ быть устранена, или даже значительно сокращена, обширнымъ примѣненіемъ машинъ; и именно это относится къ сельскому хозяйству въ большей мѣрѣ, нежели ко всѣмъ другимъ производствамъ, такъ какъ въ первомъ, при выполненіи даже самыхъ простыхъ работъ, требуется постоянное видоизмѣненіе способа ихъ выполненія въ зависимости отъ безчисленныхъ условій, имѣющихъ временное или мѣстное вліяніе и препятствующихъ постоянно одинаковому, стереотипному способу производства работы, какъ это имѣетъ мѣсто въ заводской и фабричной промышленности. Какъ ни обширно иногда употребленіе силъ вѣтра или воды для цѣлей хозяйства, но пользованіе ею возможно не всегда и лишь въ определенныхъ, ограничивающихъ условіяхъ; тоже относится и къ примѣненію силы пара, хотя пользованіе ею ограничено менѣе, нежели первыми двумя двигателями. Но даже и тамъ, гдѣ размѣры производства допускаютъ употребленіе паровыхъ машинъ, послѣднія сокращаютъ почти всегда потребность хозяйства только въ рабочемъ скотѣ (иногда на $\frac{1}{2}$), но не въ рабочихъ рукахъ; даже напротивъ, нерѣдко нужда въ нихъ чрезъ это возрастаетъ; уже гораздо обширнѣе кругъ примѣненія въ хозяйствѣ силы животныхъ, какъ по свойству хозяйственныхъ работъ (обработка земли, перевозъ), такъ и особенно потому, что въ приобретеніи и увеличеніи количества этой силы хозяинъ несравненно болѣе независимъ и менѣе ограниченъ, нежели при пользованіи выше названными двигателями. Но гораздо многостороннѣе, по результатамъ своимъ важнѣе и по размѣру затраты обширнѣе—употребленіе человеческого труда. По отношенію къ послѣднему, каждый хозяинъ имѣетъ въ виду достиженіе прежде всего двухъ ближайшихъ цѣлей: производительнаго примѣненія имѣющихся рукъ и приобретение послѣднихъ при недостаткѣ ихъ. Разрѣшеніе первой задачи находится въ волѣ хозяина и зависитъ отъ его качества; но вторая нерѣдко разрѣшается съ большимъ трудомъ и невольнѣ, такъ какъ условія, опредѣляющія недостатокъ рабочихъ рукъ, по большей части независимы отъ хозяина; даже надо сознаться, что и тѣ средства, которыя предлагаются современною наукою для устраненія недостатка рабочихъ рукъ, не могутъ быть отнесены къ разряду такихъ, примѣненіе которыхъ обѣщало бы частному хозяину немедленное и быстрое измѣненіе условій; между такими средствами обыкновенно предлагаются: возвышеніе задѣльной платы, обезпеченіе поденнымъ рабочимъ большаго количества работы, большее примѣненіе вознагражденія издѣльно, сочетая его разнымъ образомъ съ подевною платой, усиленіе артельного начала при заключеніи кон-

трактовъ съ артелями рабочихъ, устройство въ имѣннѣхъ казармъ для совместнаго помѣщенія большаго числа рабочихъ, и особенно—устройство отдѣльныхъ помѣщеній для семейныхъ рабочихъ при снабженіи ихъ за опредѣленную арендную плату извѣстнымъ количествомъ земли; выборъ и способъ примѣненія перечисленныхъ средствъ зависятъ отъ такого обширнаго круга различныхъ (между прочимъ: государственныхъ и социальныхъ) обстоятельствъ, что обсужденіе ихъ можетъ имѣть мѣсто лишь для конкретныхъ случаевъ и потому должно быть предоставлено частному хозяину; здѣсь можно упомянуть лишь, что послѣднее изъ перечисленныхъ средствъ многими рекомендуется, какъ заслуживающее вниманія для южно-русскаго хозяйства.

Но приступая къ примѣненію подобныхъ средствъ, начинающій хозяинъ долженъ остерегаться отъ рѣзкихъ переѣвъ того строя условій, который выработанъ мѣстнымъ опытомъ, и дѣйствовать не вліяніемъ матеріальной силы, находящейся въ его рукахъ, но убѣжденіемъ рабочихъ *на томъ*, что данное измѣненіе въ вознагражденіи, или условіяхъ найма вообще, имѣетъ послѣдствіемъ выгоду для обѣихъ сторонъ.

Изобиліе или недостатокъ рабочихъ въ мѣстности, по своему вліянію на техническую сторону хозяйства и его организацию, выражается: въ степени интенсивности производства, избираемой хозяиномъ (при недостаткѣ рукъ—хозяйство должно быть экстенсивнѣе), исполненіи большей части работъ постоянными или поденными и издѣльными рабочими (при недостаткѣ предложенія поденной работы соответственно увеличивается въ хозяйствѣ число постоянныхъ рабочихъ) и въ большемъ или меньшемъ примѣненіи машинъ, особенно: молотиловъ, сѣнокосильныхъ и жатвенныхъ.

Просторъ для таланта хозяина гораздо обширнѣе въ вопросѣ о рациональномъ пользованіи тою рабочей силою, которою располагаетъ хозяйство, такъ какъ эта сила направляется къ общей цѣли его мыслию и его волею. Бережливость въ тратѣ труда составляетъ одно изъ главныхъ условій, опредѣляющихъ его производительность. Но эта бережливость отнюдь не должна состоять (какъ это думаютъ иногда) въ ничтожной рабочей платѣ, такъ какъ подобное средство ведетъ всегда къ обратнымъ послѣдствіямъ: недостатку рабочихъ и дурному исполненію работъ; истинная бережливость при употребленіи труда заключается съ одной стороны въ достаточной, соответственной труду, рабочей платѣ и пунктуальной выдачѣ ея въ условленные сроки, а съ другой: въ постоянномъ *надзорѣ* за *хорошими* по качеству, *современными* и *прилежными* исполненіемъ каждой работы, въ разумномъ распредѣленіи работы между рабочими и въ правильномъ сочетаніи отдѣльныхъ работъ между собою.

Слѣдовательно, въ этомъ отношеніи бережливымъ хозяиномъ можно назвать не того, кто въ течение года выдалъ наименьшую сумму въ видѣ рабочей платѣ, но того, кто при прочихъ равныхъ условіяхъ на каждый, истраченный на работу, рубль, произвелъ большую сумму цѣнностей и слѣдовательно выручилъ большій процентъ съ капитала.

Выгоды и невыгоды поденной и издѣльной работы.

Поденщики обыкновенно не живутъ въ хозяйствѣ, а нанимаются только въ извѣстные, болѣе или менѣе короткіе сроки, когда предстоитъ такое количество работы (въ сѣнокосѣ, уборкѣ), которое не можетъ быть выполнено имѣющимися въ хозяйствѣ постоянными годовыми или лѣтними работниками—въ течение того періода, который въ данной мѣстности составляетъ нормальное время для совершения данной работы (напр. сѣнокосѣ и уборкѣ должны быть выполнены въ опредѣленный срокъ). Поденные рабочіе обязываются работать опредѣленное число часовъ въ день и во всякое время, даже среди рабочаго дня (напр. при худой погодѣ), могутъ быть разсчитаны и отпущены хозяиномъ. Вознагражденіе поденщиковъ получаютъ лишь за тѣ дни и часы, въ которые они дѣйствительно работали; плата разсчитывается по договору за 1 рабочий день съ опредѣленнымъ числомъ часовъ работы съ принятіемъ въ разсчетъ и дробей этой единицы: $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ дня. Рабочіе часы въ день опредѣляются обыкновенно: лѣтомъ отъ 5½ или 6 ч. утра до 11 ч. и потомъ отъ 12½—1 ч. по полудни до 6—7 ч. вечера, слѣдовательно отъ 10 до 12 часовъ въ сутки.

Зимой поденщики обыкновенно работаютъ отъ разсвѣта до 11 часовъ и отъ 12½ до сумерекъ, что составляетъ въ разные времена зимы отъ 6 до 8 часовъ работы въ день.

Съ другой стороны, сами поденные рабочіе незарисимы и могутъ во всякое время потребовать разсчета. Рабочая плата поденщиковъ состоитъ болѣею частью только изъ денегъ, такъ какъ при наймѣ имѣемъ, нѣрѣдко съ каждымъ днемъ, числѣ такихъ рабочихъ, было бы невыгодно и затруднительно продовольствовать ихъ хозяйскими харчами.

Главныя выгоды рабочихъ этого разряда состоятъ въ томъ, что ихъ можно во всякое время, сообразно измѣненію обстоятельствъ и особенно погоды, переводить съ одной работы, продолженіе которой почему нибудь неудобно, на другую, чего иногда нельзя сдѣлать относительно издѣльныхъ рабочихъ, нанимающихся для производства опредѣленныхъ работъ. Другое, еще болѣе важное, условіе необходимости этого вида рабочихъ заключается въ непостоянствѣ количества потребныхъ рукъ въ хозяйствѣ въ извѣстные сроки; намъ на условія поденной платы дать въ этомъ отношеніи (если достаточно

предложение работы) наибольший простор хозяину, который может во всякое время увеличивать и уменьшать количество рабочих, не подвергая себя в последнем случае непроизводительной трате на содержание рабочих, которых нельзя занять работою. Но будущи необходимо, особенно для странъ съ продолжительною зимой и однообразною культурой, поденная работа имѣетъ всеми признанныя важныя невыгоды, на возможное уменьшеніе которыхъ должно быть обращено вниманіе каждаго хозяина. Главныя изъ нихъ суть: 1) медленность производства работы, такъ какъ рабочій, получая плату за время работы, ничѣмъ не побуждается къ ускоренію ея хода; эта сторона невыгодъ поденной работы имѣетъ конечно особое значеніе въ работахъ, которые должны быть окончены въ теченіе извѣстнаго срока, какъ напр. уборка зерновыхъ растений, снокошь и уборка сѣна и пр., 2) въ рабочихъ воспитывается привычка и даже искусство прикидываться прилежными въ работѣ, чѣмъ развиваются лѣнь и недобросовѣстность и 3) со стороны хозяина требуется болѣе надзоръ, нежели за всеми другими рабочими, притомъ самый несприятный надзоръ именно за прилежаніемъ работника, такъ какъ, не имѣя побужденій снискать въ работѣ, послѣдній не имѣетъ также и особой выгоды въ дурномъ исполненіи ея относительно качества; такой характеръ надзора относится уже не къ умѣнью работника, но къ его нравственнымъ качествамъ; въ глазахъ рабочаго подобный надзоръ имѣетъ нерѣдко оскорбительный видъ и ведетъ къ установленію дурныхъ отношеній между хозяиномъ и рабочими. Вообще, нужно предполагать въ рабочемъ очень большую степень честности, любви къ труду и твердости, чтобы противостоять естественной склонности къ лѣни, когда онъ видитъ, что работающій подлѣ него плохой и лѣнливый работникъ вознаграждается одинаково, несмотря на большую разницу въ трудѣ обоихъ. Большая часть разсмотрѣнныхъ невыгодъ устраняются при способѣ вознагражденія рабочихъ *поштучно*, или *издѣльно*.

Издѣльные, или урочные рабочіе получаютъ вознагражденіе (деньгами, или долею урожая, обмолоченнаго хлѣба, словомъ натурою) за исполненіе опредѣленной работы. Время и качество выполненія послѣдней или подразумеваются сами собою, или тоже опредѣляются по договору; въ последнемъ случаѣ, очевидно, рабочая плата должна соотвѣтственно быть болѣе; при вознагражденіи натурою (долею продукта издѣльной работы), своевременность и качество работы обезпечиваются уже собственнымъ интересомъ рабочихъ. Число рабочихъ часовъ въ день по большей части предоставляется усмотрѣнію рабочихъ. Эта форма вознагражденія для рабочаго имѣетъ ту выгоду, что при ней прилежаніе и особыя усилія работника всегда вознаграждаются; прилежный работникъ, при такомъ спо-

собѣ найма, въ одно и тоже время, можетъ заработать вдвое болѣе нежели другой. Для хозяина издѣльная работа имѣетъ слѣдующія преимущества: 1) всякая данная работа обходится дешевле (напр. екошь десятины), такъ какъ рабочіе стараются исполнить возможно большее количество работы въ данное время, а величину рабочей платы при договорѣ соразмѣряютъ обыкновенно съ нормальнымъ временемъ, нужнымъ для произведенія работы; 2) работы исполняются быстрее, что имѣетъ особое значеніе въ работахъ, требующихъ своевременности (уборка); 3) для хозяина не представляется большой надобности въ надзорѣ за прилежаніемъ рабочихъ, а надсмотръ за хорошимъ качествомъ исполненія не оскорбителенъ для нихъ, почему здѣсь гораздо менѣе поводовъ къ взаимнымъ дурнымъ отношеніямъ съ рабочими; 4) облегчается веденіе счетоводства, потому что нѣтъ надобности въ учетѣ числа рабочихъ дней (какъ это необходимо при поденной работѣ), приходящихся на долю данной работы, такъ какъ ея цѣнность здѣсь представляетъ уже извѣстную изъ договора величину; 5) сознавая, что заработокъ зависитъ всего болѣе отъ собственного прилежанія и умѣнья, издѣльный работникъ побуждается этимъ къ самоусовершенствованію въ работѣ и во всякомъ случаѣ затрачиваетъ гораздо болѣе умственного труда, нежели поденщикъ. Хорошій издѣльный рабочій, упражняя свое искусство и приучаясь оцѣнивать работу другихъ, можетъ разсчитывать сдѣлаться предпринимателемъ, устроить артель и производить при помощи послѣдней работы въ значительныхъ размѣрахъ: уборку сѣна и хлѣба на большихъ пространствахъ, осушку и пр. Все эти выгоды такъ значительны, что въ настоящее время большая часть компетентныхъ въ этомъ предметѣ писателей рекомендуютъ расширеніе примѣненія издѣльнаго труда въ сельскомъ хозяйствѣ, какъ наиболее доступное и дѣйствительное средство для приобрѣтенія производительной работы и въ тоже время для поднятія нравственнаго уровня рабочихъ классовъ, въ которыхъ воспитывается прилежаніе, энергія и умственная дѣятельность. Но издѣльная работа не лишена нѣкоторыхъ невыгодъ, хотя послѣднія ни въ какомъ случаѣ не перевѣшиваютъ разсмотрѣнныхъ выше условій ея выгодности. Эти невыгоды могутъ быть сведены къ слѣдующимъ пунктамъ: 1) рабочіе снискать окончаніемъ работы, что иногда вредитъ технически—хорошему выполненію ея, почему здѣсь необходимъ присмотръ за качествомъ производства работы. Поэтому, примѣненіе издѣльнаго труда имѣетъ безусловныя удобства только въ такихъ работахъ, которыя легко и безспорно контролируются *счетомъ* или *мѣрою*, напр. прорытіе канавъ, стрижка овецъ, молотьба, снокошеніе, (работы перевозочныя на лошадяхъ рабочихъ) и т. п.; напротивъ, контроль качества исполненія представляетъ большія трудности въ

такихъ работахъ, какъ паханіе, бороньба, задѣлка сѣмянъ, распределение по полю удобренья, полотье и пр., такъ какъ въ этихъ случаяхъ невозможно выразить при договорѣ требуемое отъ работы качество такими ясными признаками, которые бы устраняли всякій споръ при послѣдующемъ контролѣ выполненія работы въ техническомъ отношеніи. 2) По той же причинѣ, издѣльный трудъ невыгоденъ при производствѣ упряжныхъ работъ на хозяйскомъ рабочемъ скотѣ; имѣя интересъ въ спѣшности окончанія работы, издѣльный рабочій мало обращаетъ вниманія на утомленіе скота, который можетъ быть надорванъ работою; въ этомъ случаѣ, даже поденный рабочій имѣетъ преимущество передъ издѣльнымъ. 3) Въ нѣкоторыхъ работахъ, время выполненія которыхъ не можетъ быть заранее опредѣлено въ точности, обѣ стороны подвергаютъ себя случайному риску, такъ какъ при этомъ всегда одна сторона терять, а другая выигрываетъ. Напр. при уборкѣ сѣна въ хорошую погоду—выигрываютъ издѣльные рабочіе и проигрываетъ хозяинъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ уборка поденщиками обходится обыкновенно дешевле; напротивъ, при дурной погодѣ, проигрываютъ рабочіе, которые по нѣсколькимъ дней должны оставаться въ бездѣйствіи, въ ожиданіи хорошей погоды, если хозяинъ не находитъ возможнымъ занять ихъ въ такое время поденною работою. 4) Съ другой стороны, хозяинъ, безъ согласія рабочихъ, не имѣетъ права отрывать ихъ отъ договоренной работы и переводить на другую при встрѣтившейся надобности, какъ это дѣлается при поденщикахъ.

При рѣшеніи вопроса о выборѣ и размѣрахъ примѣненія поденной и издѣльной работы, хозяинъ долженъ тщательно взвѣсить всѣ представленныя выше соображенія съ своими мѣстными условіями и отыскать наиболѣе выгодное рѣшеніе; число дѣйствующихъ здѣсь, какъ и въ большей части сложнаго хозяйственнаго производства, обстоятельства такъ велико, что наставленіе общаго характера не можетъ идти далѣе.

Средняя потребность въ поденщикахъ и издѣльныхъ рабочихъ; задѣльная плата.

Потребное въ хозяйствѣ число поденщиковъ и издѣльныхъ рабочихъ опредѣляется многими мѣстными и временными условіями, между которыми болѣе существенны по своему вліянію: климатъ, почва и положеніе нѣтъ, система хозяйства и сѣвооборотъ, качество рабочихъ, обиліе или недостатокъ ихъ и въ особенности—число содержимыхъ въ хозяйствѣ постоянныхъ рабочихъ, такъ какъ послѣдніе, по окончаніи упряжныхъ, могутъ исполнять также и всѣ ручныя или пѣшія работы, уменьшая чрезъ это надобность въ поденщикахъ. Поэтому, въ каждомъ частномъ случаѣ, только точный

учетъ, основанный на опредѣленіи количества всѣхъ работъ въ хозяйствѣ и нормальнаго періода производства каждой изъ нихъ, можетъ привести въ точному рѣшенію вопроса о количествѣ потребныхъ въ хозяйствѣ поденщиковъ; предлагаемыя же ниже общія данныя должны имѣть въ глазахъ хозяина лишь значеніе исходныхъ точекъ опоры при самостоятельныхъ вычисленіяхъ. Наибольшее число поденщиковъ требуется во время сѣнокоса, уборки хлѣбовъ и корнеплодовъ и, при ранней продажѣ хлѣба,—во время молотьбы; а потому, при сѣтахъ потребности въ рабочихъ рукахъ, хозяинъ прежде всего долженъ опредѣлить нормальный срокъ, въ теченіе котораго должны быть, по мѣстнымъ отношеніямъ, выполнены названныя работы и затѣмъ, основываясь, съ одной стороны, на размѣрахъ своего производства, а съ другой на урочномъ положеніи для мѣры совершенія однимъ человекомъ каждой работы въ день, вычислить число потребныхъ въ данномъ періодѣ рабочихъ; изъ полученнаго числа вычитается число содержимыхъ въ хозяйствѣ постоянныхъ рабочихъ, а разность показываетъ, сколько хозяйство въ каждомъ періодѣ усиленныхъ работъ должно принаимать поденщиковъ, или издѣльныхъ рабочихъ. Весьма трудно выразить число потребныхъ рабочихъ въ зависимости отъ системы хозяйства, такъ какъ въ настоящее время прежде бывшіе типы хозяйственныхъ формъ все болѣе утрачиваютъ ясность своего очертанія и незамѣтно переходятъ другъ къ другу рядомъ безчисленныхъ промежуточныхъ ступеней. Говоря вообще, можно замѣтить лишь, что наименѣе требуется рабочихъ рукъ при преобладаніи пользованія землею, какъ пастбищемъ (системы переложныя и экстензивныя выгоны), болѣе при господствѣ хлѣбной культуры, и именно въ періодѣ уборки, и всего болѣе при значительномъ воздѣлываніи торговыхъ и корнеплодныхъ растеній, маломъ пространствѣ подъ паромъ и постоянными выгонами и содержаніи скота въ стойлахъ въ теченіи круглаго года. Но за то въ послѣднемъ случаѣ увеличеніе абсолютной затраты труда вознаграждается въ значительной мѣрѣ болѣе равномернымъ распределеніемъ работъ по всѣмъ временамъ года, позволяющимъ держать въ хозяйствѣ большее число постоянныхъ рабочихъ; послѣднее же обстоятельство имѣетъ слѣдствіемъ, что хозяйство избавляется отъ необходимости нанимать на короткіе періоды усиленныхъ работъ относительно огромное число поденщиковъ и платить несообразно высокую поденную плату, которая въ такіе періоды чрезвычайно возвышается большымъ мѣстнымъ спросомъ. Это обстоятельство составляетъ одну изъ причинъ, почему общія абсолютная годовая цѣнность работы въ интенсивныхъ хозяйствахъ съ корнеплодами и торговыми растеніями нѣрѣдко бываетъ немногимъ болѣе, нежели въ значительно менѣе интенсивныхъ хозяйствахъ съ одно-

стороннюю культуру хлебных растений. В большом среднем выводе, при предположении, что хозяйство содержит умеренное количество постоянных рабочих, поденщиков принимает въ известные периоды всегда, а издѣльных рабочих только для уборочныхъ и земляныхъ работъ, на каждыя 25 десятинъ всей земли можно положить приблизительно слѣдующія количества рабочихъ въ—годъ:

1) При экстензивно—выгонномъ хозяйствѣ: 3 поденныхъ (мужскихъ и женскихъ вмѣстѣ) и одинъ постоянный работникъ, всего 4 человека.

2) При 3-хъ полномъ хозяйствѣ: $3\frac{1}{2}$ до 5 поденщиковъ (муж. и женщ. вмѣстѣ), $1\frac{1}{2}$ до 2 постоянныхъ, всего 5—7 рабочихъ.

3) При улучшенной 3-хъ полной и не очень интенсивной плодотворной системѣ: $4\frac{1}{2}$ до 7 поденныхъ (мужч. и женщ.), $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ постоянныхъ всего 7— $10\frac{1}{2}$.

4) При весьма интенсивномъ хозяйствѣ, съ обширною культурой корнеплодныхъ и торговыхъ растений: 7—10 поденныхъ (муж. и женщ.), $3\frac{1}{2}$ до 5 постоянныхъ, всего $10\frac{1}{2}$ до 15 рабочихъ.

Слѣдовательно, въ круглыхъ общихъ числахъ, можно считать всю потребность хозяйства въ рабочихъ малою при 3—4 человекахъ на 25 десятинъ всей земли, большою 8—10 и болѣе. Отношение работниковъ къ работникамъ зависитъ отъ количества легкихъ работъ въ хозяйствѣ; число женскихъ рабочихъ дней считаютъ, смотря по этому, отъ $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ общей суммы рабочихъ дней, расходуемыхъ въ хозяйствѣ. При вычисленіи числа потребныхъ въ каждомъ данномъ періодѣ (времени года, мѣсяцъ или его части) рабочихъ необходимо знать слѣдующія величины: 1) количество работъ, которое есть величина, данная размѣрами хозяйства и системою его, 2) періодъ, въ теченіе котораго каждая данная работа должна быть совершена по ея существу, 3) количество работъ, которое исполняется среднимъ числомъ въ день 1 рабочимъ и 4) число дней дѣйствительной работы рабочего въ томъ періодѣ времени, въ которомъ должна быть исполнена работа. Между этими величинами особеннаго вниманія заслуживаетъ 4-я, такъ какъ ея количественное вліяніе весьма велико, а съ другой стороны, потому что она опредѣляется нерѣдко предразсудками, съ которыми приходится бороться хозяину. Въ Германіи считаютъ число дней дѣйствительной работы въ 250 до 300 въ годъ; въ протестантскихъ странахъ болѣе, въ католическихъ (болѣе праздниковъ) менѣе. Эти дни распределяются слѣдующимъ образомъ по временамъ года:

	въ тепломъ климатѣ.	въ сѣверномъ и суровомъ горномъ климатѣ.
въ весеннемъ періодѣ	53—65	19—21
„ лѣтнемъ „	73—83	99—114
„ осеннемъ „	76—88	32—42
„ зимнемъ „	48—62	100—121

Подобное же распределение рабочихъ дней можетъ быть принято и для Россіи, и именно показанное въ первомъ столбцѣ для южной, а во второмъ для средней полосы, съ тою только разницею, что число дней дѣйствительной работы въ Россіи во все периоды менѣе, нежели въ Германіи, влѣдствіе большаго числа праздниковъ и слѣдующихъ за ними прогуловъ. Такъ какъ послѣдніе условливаются въ особенности мѣстными праздниками, то количество теряемаго времени различно по отдѣльнымъ губерніямъ. Вотъ нѣсколько данныхъ по этому предмету, заимствуемыхъ изъ «Доклада В. У. К.» (т. 1 стр. 201—224). По свѣдѣніямъ изъ Новгородской губ.: число прогульныхъ дней въ году (считая все праздники) до 120; изъ Тверской г.: прогульные дни въ помѣщичьихъ имѣніяхъ относятся къ рабочимъ 1:6, а въ крестьянскихъ хозяйствахъ, какъ 3:4; изъ Псковской губ.: число дней дѣйствительной работы въ году не болѣе 210; изъ Смоленской губ.: въ годъ празднуютъ 100 дней, не считая слѣдующихъ за каждымъ праздникомъ прогуловъ; за исключеніемъ однихъ праздниковъ, въ важнѣйшіе мѣсяцы имѣется рабочихъ дней: въ іюль 21, августъ 20 и сентябрь 22; изъ Нижегородской г.: прогульныхъ дней 148, изъ которыхъ: 52 воскр., 51 праздн. и 45 базарныхъ дней; изъ Тамбовской губ.: отношеніе рабочего времени къ прогулу, какъ $3\frac{1}{2}$: 1; изъ Екатеринославской губ.: нерабочихъ дней 126.

Величина *затѣльной платы* управляется общими экономическими законами: издержками производства труда, или стоимостью содержанія рабочаго, спросомъ и предложениемъ. Въ Германіи поденная плата колеблется обыкновенно на наши деньги (1 талеръ = 1 р. 10 к.) около нижеслѣдующихъ величинъ:

	Лѣтомъ.		Зимомъ.		Средняя въ годъ	
	Мужчинъ.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщинъ.
Низкая	37 к.	30 к.	23 к.	20 к.	30 к.	23 к.
Средняя	55 „	44 „	37 „	25 „	45 „	35 „
Высокая	75 „	63 „	55 „	44 „	65 „	55 „

Величина *поденной* платы безъ харчей въ Россіи, по свѣдѣніямъ В. У. Ком., въ разныхъ губерніяхъ слѣдующая:

Губерніи:	Мужчина.		Женщина.			
	Лѣтомъ; зимомъ		въ отношеніи и уборку.		Лѣтомъ; зимомъ; въ отношеніи и уборку.	
	коп.	коп.	коп.	коп.	коп.	коп.
Новгородская	25—40	20	50—75	15—20	10—15	25—40
Московская	50	„	75—1р.	20—25	„	50—60
Ярославская	30	„	40—70	„	„	40—70
Тульская	45—60	„	60—1р.	20—30	„	30—70
Екатеринослав.	40—60	„	75—2р.	25—35	„	60—1р. 20

При *издѣльномъ наймѣ*, приблизительныя цѣны за разныя работы въ средней полосѣ Россіи колеблются около нижеслѣдующихъ величинъ: за взметъ 1 десятины по ржи сохою или косулей 1 р. 50—1 р. 75 к., по 2 лѣтнему клеверу 2—2 р. 50 коп.; по яровому осенью 1 р. 50 коп.; по яровому весною—до 2 р.; за вывозъ на 1 дес. навоза и разбивку его 2 р.—2 р. 50 к.; за посѣвную вспашку 1 дес. и бороньбу 3 р.; за бороньбу деревянною бороной—50 к.; за уборку 1 дес. клевера 3—6 р., 1 дес. лугового сѣна 2 р. 50—3 р., сжать и сложить въ снопы рожь съ 1 дес. 3 р.; тоже—овесъ 2 р. 50 к.—3 р.; перевозку убранный ржи съ 1 дес. 1 р.—1 50 к.; за молотьбу хозяйскими лошадьми съ 1 четверти ржи—25—30 к., овса 15—20 коп. Само собою разумѣется, что въ отдѣльных случаяхъ и въ разныя времена, цѣны могутъ отклоняться значительно отъ представленныхъ приблизительныхъ нормъ.

СПОСОБЪ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕЮ.

УСТРОЙСТВО ПОЛЕВАГО ХОЗЯЙСТВА

(въ связи съ другими угодіями: лугами и пашонами.)

Различныя системы хозяйства съ относящимися къ нимъ сѣвооборотами.

Сельскій хозяинъ не можетъ работать безъ земли и капитала, не можетъ примѣнять послѣдняго безъ содѣйствія первой, не можетъ наконецъ пользоваться землею безъ труда и капитала. Всѣ три фактора необходимы одновременно для веденія производства, но не *всегда* въ равной степени. Одинъ и тотъ же чистый доходъ достигается съ 1 дес. въ одномъ случаѣ при затратѣ 10 единицъ работы и 20 капитала, въ другомъ — при затратѣ 10 единицъ капитала и 20 труда; въ одномъ случаѣ одинъ и тотъ же чистый доходъ получается съ 1 десят. при затратѣ на нее 20 единицъ труда и капитала, взятыхъ въ суммѣ, въ другомъ при затратѣ 10, а въ 3-мъ быть можетъ 100 единицъ. Родъ и способъ соединенія, количественно и качественно, труда, капитала и земли, для полученія возможно большаго чистаго дохода отъ даннаго пространства послѣдней, называется *системою хозяйства*. Послѣдняя *внѣшнимъ образомъ* выражается въ томъ *видѣ* пользованія, который назначается для *всѣхъ частей земли*, составляющихъ территорію сельско-хозяйственнаго организма, называемаго *имѣніемъ*. Понятіе «система хозяйства» (или система земледѣлія) должно быть строго отличаемо отъ нерѣдко смѣшиваемыхъ съ нимъ понятій, выражаемыхъ терминами: «*система полеводства*» (полевое хозяйство) и «*сѣвооборотъ*». Системою полеводства называется способъ пользованія только *частью* терри-

тории ивния, обнимающего *одни полевые* угодья, причем главными признаками различия полевых хозяйств принимаются: большее или меньшее назначение полевой земли: подъ парь, подъ кормовых трав, корнеплодных, хлебных и торговых растений, или, что тоже, виды полевого хозяйства различаются, смотря по процентной доле полевых угодий, которая назначается для воздѣлыванія названных групп растений. Подъ именем же сѣвооборота слѣдуетъ подразумевать *раздѣленіе* полей на то или другое число приблизительно равныхъ частей, называемыхъ *клинками* (также «полями», но въ тѣсномъ условномъ смыслѣ), соединенное съ опредѣленнымъ *чередованіемъ отдельныхъ растений* (но не группъ послѣднихъ) другъ за другомъ въ течение установленнаго ряда лѣтъ, называемаго *оборотомъ* сѣвооборота. Изъ приведенныхъ опредѣленій видно, что при одной и той же системѣ хозяйство можетъ вести различное полевое хозяйство и сѣвооборотъ, также какъ и обратно, при одинаковомъ полевомъ хозяйствѣ и сѣвооборотѣ два хозяйства могутъ вести совершенно различную систему (напр. въ одномъ луга и выгоны составляютъ 25%, а въ другомъ 50% *всей* земли); но въ большинствѣ случаевъ, однако, сѣвооборотъ и полевое хозяйство вообще составляютъ, въ ряду другихъ, *наиболее важный* внѣшній признакъ, которымъ отличаются системы одна отъ другой; это составляетъ причину, почему въ сельскохозяйственной литературѣ утвердилась одноименная номенклатура для обозначенія полевого хозяйства и сѣвооборота съ одной стороны и системъ хозяйства вообще — съ другой. Въ нижеслѣдующемъ эта номенклатура удерживается по ея общепринятости. *Выгоды воеденія системы* хозяйства, т. е. учрежденіе извѣстнаго способа соединенія земли, труда и капитала на опредѣленное число лѣтъ, состоятъ въ слѣдующемъ: а) оно даетъ возможность къ распредѣленію всѣхъ сельскохозяйственныхъ операций на цѣлый годъ впередъ и содѣйствуетъ къ цѣлесообразному раздѣленію труда, б) даетъ возможность къ систематическому поддержанію плодородія всѣхъ частей земли, в) предохраняетъ отъ чрезмѣрныхъ непредвидѣнныхъ затратъ капитала, д) облегчаетъ установленіе выгоднѣйшаго соотношенія между валовымъ доходомъ и издержками производства, е) облегчаетъ надзоръ и управленіе хозяйствомъ.

Невыгоды введенія точно опредѣленной системы состоятъ въ томъ, что хозяйствъ при этомъ на нѣсколько лѣтъ связанъ заведеннымъ ходомъ хозяйства и вѣрѣю не можетъ отнѣять его въ короткое время, не смотря на то, если бы даже въ этомъ представлялась необходимость, вслѣдствіе измѣненія положенія рынка и цѣнъ на продукты. Поэтому, гдѣ представляется къ тому возможность, хозяйство стремится не связывать себя системою на нѣсколько лѣтъ и ведетъ такъ называемое:

Вольное хозяйство, которое можетъ имѣть мѣсто только при слѣдующихъ условіяхъ: а) если хозяйствъ можетъ имѣть по произволу во всякое время необходимыя рабочія силы, какъ напр. въблизи большихъ городовъ, фабричныхъ мѣстностей, или при очень маломъ размѣрѣ хозяйства; б) можетъ приобретать со стороны по дешевой цѣнѣ удобреніе въ произвольномъ количествѣ; в) если въ странѣ вообще и у хозяйствъ въ частности нѣтъ недостатка въ капиталахъ (малый %), д) гдѣ при этомъ всѣ сельскохозяйственные продукты имѣютъ легкій и выгодный сбытъ во всякое время. Такъ какъ всѣ эти условія совпадаютъ весьма рѣдко, то вольное хозяйство можетъ имѣть только ограниченное распространеніе. Сущность его состоитъ въ томъ, что хозяйствъ ежегодно можетъ измѣнять способъ пользованія разными частями земли, смотря потому, какой продуктъ обѣщаетъ въ данномъ году вышій чистый доходъ; выгодное веденіе этого хозяйства требуетъ составленія плана организаціи хозяйства въ началѣ каждаго года и слѣдовательно — болѣе труда отъ хозяйствъ, нежели тамъ, гдѣ такой планъ составляется въ главныхъ чертахъ разъ на нѣсколько лѣтъ, т. е. когда ведется опредѣленная система хозяйства.

Выборъ наиболее соответственной системы хозяйства опредѣляется слѣдующими главнѣйшими условіями: 1) соотношеніемъ между цѣною труда и капитала съ одной стороны и цѣною земли — съ другой; чѣмъ послѣдняя ниже, а первая двѣ выше, тѣмъ выгоднѣе система болѣе интензивная, въ обратномъ случаѣ — экстензивная; чѣмъ выше рабочая плата и ниже ростъ (%) съ капиталовъ, тѣмъ выгоднѣе избраніе такихъ отраслей, которыя требуютъ большей затраты капитала (напр. скотоводство), нежели труда; въ обратномъ случаѣ — наоборотъ (торговля растеніями, хлебъ); 2) соотношеніемъ цѣнъ на растительные (особенно хлебъ, какъ регуляторъ цѣнъ) и животные продукты; 3) плодородіемъ почвы, которое требуется: или поддерживать *statu quo*, увеличивать, или уменьшать, т. е. воздѣлывать большую долю земли безъ удобрения, какъ это можетъ имѣть мѣсто въ южной Россіи при переложномъ хозяйствѣ; 4) естественными условіями, которыя благоприятствуютъ росту тѣхъ или другихъ растений; климатомъ, почвою, природными свойствами растеній, особенно такъ называемою прихотливостью послѣднихъ относительно плодородія почвы.

Между всѣми естественными условіями рѣшающее вліяніе принадлежитъ въ особенности тѣмъ, которыя опредѣляютъ собою роскошное произрастеніе травъ и, какъ слѣдствіе послѣдняго, выгодность скотоводства; 5) присутствіемъ въ хозяйствѣ большаго или меньшаго пространства такихъ угодій, которыя по своему положенію и качеству должны быть безусловно назначены подъ постоян-

ные луга или выгоны; чѣмъ болѣе хорошихъ луговъ, тѣмъ меньше должны быть размѣры полевого воздѣлыванія кормовыхъ растений и наоборотъ; 6) округленность и фигура территоріи имѣнія; напр. при череполосномъ владѣніи невозможно полевое травосѣяніе или выгонная система.

Такъ какъ всѣ приведенныя условія временно и мѣстно чрезвычайно различны, а сочетанія между ними (благопріятныя или противодѣйствующія) безконечны, то само собою понятно, что не можетъ существовать абсолютно лучшей системы для всѣхъ мѣстностей и временъ; подобная система можетъ быть учреждена только: для извѣстной *мѣстности*, при сочетаніи *данныхъ условий* и въ теченіе *опредѣленнаго времени*.

Признаки, на основаніи которыхъ *классифицируются системы* въ извѣстныя группы, состоятъ въ: а) болшей или меньшей степени интенсивности хозяйства; б) пространствѣ земли подъ плугомъ (полями) относительно поверхности подъ постоянными лугами и выгонами; в) сравнительной величинѣ поверхности всей хозяйственной территоріи подъ непосредственно-продажными растениями (хлѣбомъ и торговыми) и кормовыми, или подъ скотоводствомъ, а также въ соотношеніи между этими двумя пространствами на поляхъ; г) въ способѣ веденія полевого хозяйства относительно: раздѣленія полей на то или другое число клиньевъ, вида, числа и чередованія избранныхъ растений и большаго или меньшаго пространства подъ паромъ и полевыми выгонными клиньями; е) въ способѣ лѣтняго содержанія скота: въ стойлахъ, или на выгонѣ.

Смотря потому, какими образомъ эти признаки сочетаются между собою, различаютъ слѣдующія системы хозяйства: 1) переложныя, 2) зерновыя, 3) улучшенныя зерновыя, 4) перемежныя-выгонныя и 5) перемежныя—плодосѣбныя.

1) *Переложною системою* называется такое пользованіе землею, при которомъ нѣтъ яснаго раздѣленія послѣдней на поля, луга и выгоны; только извѣстная, относительно небольшая, часть земли назначается подъ воздѣлываніе хлѣба и, въ малой мѣрѣ, другихъ зерновыхъ растений; остальная земля лежитъ много лѣтъ подъ залежью и служитъ для (преимущественно выгоннаго) содержанія скота. Когда урожаи на обрабатываемой части понижаются отъ истощенія почвы, вслѣдствіе снятія урожая въ теченіе 5—10 лѣтъ, тогда переводятъ воздѣлываніе на другую, равную съ первою, часть залежи, а прежде бывшую подъ хлѣбомъ оставляютъ подъ залежью, поступая такимъ образомъ до тѣхъ поръ, пока не подвергнутся послѣдовательной обработкѣ всѣ части земли; тогда начинается тотъ же оборотъ культуры опять съ перваго перелога. Величина обрабатываемой части земли опредѣляется при этой системѣ мѣстными пред-

ложеніемъ рабочихъ рукъ и цѣною труда вообще, а пространство подъ залежью (а слѣдовательно и размѣры скотоводства) избыткомъ въ хозяйствѣ земли, остающейся сверхъ обрабатываемой; послѣдняя составляетъ относительно малую долю всей земли. Такое хозяйство можетъ имѣть мѣсто лишь при низкихъ цѣнахъ на продукты и землю, высокихъ цѣнахъ на трудъ и высокомъ процентѣ съ капиталовъ, т. е. при условіяхъ, совпадающихъ съ малою населенностью страны. Валовой доходъ, получаемый отъ всего хозяйства, весьма малъ, такъ какъ большая часть земли находится подъ залежью, дающею незначительные урожаи травъ или сѣна. При избыткѣ незанятой обработкою земли, послѣдняя еще мало истощена, почему при переложной системѣ удобреніе не примѣняется, а урожайность почвы поддерживается вывѣтриваніемъ ея въ теченіи того времени, которое она находится въ залежи.

2) *Зерновыя системы* (также «полевая») хозяйства отличаются тѣмъ, что въ нихъ существуетъ опредѣленное раздѣленіе всей земли на три вида угодій: поля, луга и выгоны; притомъ, всѣ три угодія служатъ *постоянно* для одного и того же назначенія, почему луга и выгоны называются обыкновенно постоянными лугами и постоянными выгонами. Луга предназначены для зимняго кормленія скота, выгоны — для лѣтняго, а поля — для воздѣлыванія преимущественно, а часто даже исключительно, хлѣбныхъ растений. Смотря по числу клиньевъ, на которое дѣлятся поля, система получаетъ названія: 2-хъ, 3-хъ, 4-хъ и 5-ти полевой зерновой; въ первомъ случаѣ сѣвооборотъ на каждомъ клинѣ слѣдующій: 1-й годъ — паръ, 2-й годъ — хлѣбъ; въ 3-хъ полевой системѣ: 1 г. паръ, 2 г. озимый хлѣбъ, 3 г. яровой хлѣбъ; 4-хъ полевой: 1 г. паръ, 2 г. озимъ, 3 г. ярь, 4 г. ярь; 5-ти полевой: 1 г. паръ, 2 г. озимъ, 3 г. ярь, 4 г. ярь, 5 г. ярь. Изъ этихъ четырехъ системъ наиболее распространена 3-хъ полевая, потому что при 2-хъ полевой теряется непроизводителью слишкомъ большое пространство подъ паромъ ($\frac{1}{2}$ полей), а при 4—5 полевыхъ, напротивъ, слишкомъ велико истощеніе почвы, такъ какъ здѣсь отчуждается ежегодно хлѣбъ съ $\frac{3}{4}$ — $\frac{4}{5}$ всего пространства полей, а механическое обработкою пара питательныя вещества заготавливаются не на два урожая, какъ въ 3-хъ полевой системѣ, но на 3 и 4, что можетъ поддерживать хорошіе урожаи хлѣба только при очень плодородной почвѣ. Зерновыя системы (и именно 3-хъ полевая) могутъ быть цѣлесообразны при слѣдующихъ условіяхъ: если хозяйство обладаетъ достаточнымъ пространствомъ естественныхъ выгоновъ и особенно луговъ для корма и производства навоза, хлѣбъ составляетъ наиболее выгодный продуктъ сбыта, а черный паръ необходимъ вслѣдствіе сильнаго засоренія полей сорными травами и суровости климата. Первые два

условія съ развитіемъ экономической жизни претерпѣваютъ измѣненія, которыя съ теченіемъ времени дѣлають въ большей части равнинныхъ континентальныхъ странъ зерновыя системы несоотвѣтственною формою хозяйства. Такія измѣненія усложняются тѣмъ, что съ увеличеніемъ народонаселенія и возвышеніемъ цѣнъ на хлѣбъ болѣе и болѣе распахиваются и обращаются въ поля бывшіе постоянные выгоны и луга, за исключеніемъ только тѣхъ изъ нихъ, которые должны быть безусловно выгонами (очень отдаленные, гористые, слишкомъ сухіе песчаные участки), или безусловно лугами (заливные или слишкомъ низменные и сырые участки). Обращеніе части луговъ и выгоновъ въ полевые угодія имѣетъ слѣдствіемъ совершенное измѣненіе соотношенія между пространствами, съ одной стороны полей, а съ другой—луговъ и выгоновъ, которое прежде всего выражается въ недостаткѣ кормовыхъ средствъ для скота и чрезмѣрномъ преобладаніи соломы въ общемъ составѣ корма; это явленіе, въ свою очередь, имѣетъ слѣдствіемъ: 1) недостаточность производимаго количества навоза и бѣдность его состава по отношенію къ увеличившемуся пространству полей и 2) дороговизну производства навоза, которая происходитъ отъ скуднаго кормленія, слишкомъ малаго количества животныхъ продуктовъ, получаемыхъ изъ даннаго количества корма и язкаго оплачиванія послѣдняго скотомъ. Недостаточность производства навоза и усиленіе истощенія полей, вслѣдствіе отчужденія изъ хозяйства хлѣба *съ большей доли всей земли*, приводятъ наконецъ къ такому пониженію урожая зерна, при которомъ хозяйство не можетъ добывать чистый доходъ, соотвѣтственный по величинѣ мѣстной земельной рентѣ, и принуждено измѣнять зерновую систему въ одну изъ нижеслѣдующихъ, направляя весь строй хозяйства къ устраненію вышеприведенныхъ причинъ, вызывающихъ неспособность разсмотрѣнной системы а именно: къ возможно большому производству въ хозяйствѣ кормовыхъ средствъ и навознаго удобренія, причемъ первое имѣетъ слѣдствіемъ удешевленіе стоимости производства навоза (хорошимъ кормленіемъ и высокимъ оплачиваніемъ корма), а второе — прямое увеличеніе урожая хлѣба съ даннаго пространства.

3) *Улучшенная зерновая*, или наиболѣе распространенная между ними—*улучшенная 3-хъ полевая*—системы представляютъ собою переходную форму хозяйства между предыдущею и плодосмѣнною системою; сущность этой системы состоитъ въ занятіи всего, или части, чорнаго пара 3-хъ полевой системы воздѣлываніемъ кормовыхъ растений: травъ и корнеплодовъ, преимущественно первыхъ. Занятіе кормовыми травами пара въ 3-хъ полевой системѣ имѣетъ большія неудобства, состояція въ томъ, что: послѣ травъ, отъ которыхъ берется одинъ укосъ, остается слишкомъ короткий

промежутковъ времени для обработки земли подъ слѣдующую озимь, мотыльковыя травы (особенно клеверъ) требуютъ при повтореніи ихъ воздѣлыванія на томъ же клнѣ промежутка времени не менѣе 5—6 лѣтъ, наконецъ—при однократномъ укосѣ травъ слишкомъ значительенъ расходъ на сѣмена ихъ. Поэтому, при переходѣ отъ 3-хъ полевой къ улучшенной системѣ обыкновенно раздѣляютъ каждый изъ бывшихъ трехъ клнѣвъ на 2—4 клна и получаютъ такимъ образомъ 6—9 или 12 полевое улучшенное зерновое хозяйство съ различными сѣвооборотами, типическими примѣрами которыхъ могутъ служить слѣдующіе. *Шестипольное* улучш.—зернов. хозяйство: 1-й годъ паръ, 2) озимь, 3) ярь, 4) клеверъ, 5) озимь 6) ярь. *9-ти полевое*: 1) паръ, 2) озимь, 3) ярь, 4) клеверъ, 5) озимь, 6) ярь, 7) корнеплоды, 8) озимь, 9) ярь. *12-ти полевое*: 1) паръ, 2) озимь, 3) ярь, 4) клеверъ, 5) озимь, 6) ярь, 7) паръ, 8) озимь, 9) ярь, 10) корнеплоды, 11) озимь, 12) ярь. Посредствомъ введенія торговыхъ растений, увеличенія числа клнѣвъ подъ кормовыми растениями и сокращенія пара, приведенные сѣвообороты незамѣтно переходятъ въ плодосмѣнные. При улучшенныхъ зерновыхъ системахъ въ хозяйствѣ все еще находится значительное пространство подъ выгонами, почему скотъ, если не все, то значительную часть лѣта содержится на выгонахъ. Но по мѣрѣ того, какъ послѣдніе распахиваются болѣе и болѣе, хозяйство по необходимости должно обращаться къ лѣтнему содержанію скота въ стойлахъ, которое сопровождается всегда слѣдующую:

4) *Плодосмѣнную систему* хозяйства. Эта форма хозяйства, смѣняющая собою съ теченіемъ времени зерновыя системы въ большей части континентальной Европы, получила свое названіе отъ Тэсера, который охарактеризовалъ ее слѣдующими признаками: 1) исключается черный паръ, вмѣсто котораго вводится плугополольные растения, преимущественно корнеплоды; 2) послѣ плугополольныхъ растений всегда слѣдуютъ яровые хлѣба, 3) зерновые хлѣба не разводятся два года сряду, за исключеніемъ только послѣднихъ двухъ лѣтъ сѣвооборота, когда это допускается въ виду того, что слѣдующія за тѣмъ плугополольныя растенія уничтожатъ засореніе полей, сопровождающее обыкновенно двухлѣтнее воздѣлываніе хлѣба; 4) клеверъ, главный кормовое растение плодосмѣнной системы, долженъ воздѣлываться на чистой отъ сорныхъ травъ и истощенной почвѣ; 5) наиболѣе сильное удобреніе въ сѣвооборотѣ должны получать плугополольныя растенія, второе мѣсто за ними въ этомъ отношеніи занимаютъ кормовыя травы и послѣднее—хлѣба; 6) около половины *всей земли хозяйства* назначается подъ кормовыя и половина подъ непосредственно—продажныя растенія. Въ настоящее время эта характеристика плодосмѣнной системы должна быть измѣнена, частью

потому, что она упускаетъ изъ вида нѣкоторыя существенныя черты хозяйства, частью потому, что нѣкоторыя изъ правилъ, учрежденныхъ Тэеромъ, въ настоящее время, вслѣдствіе опыта, потеряли абсолютность своего значенія. Съ современнымъ понятіемъ плодосмѣнной системы соединяются слѣдующія черты: а) въ хозяйствѣ почти совершенно отсутствуютъ постоянные выгоны, почему: б) скотъ содержится круглый годъ въ стойлахъ, что: в) дѣлаетъ необходимымъ разнообразіе воздѣлыванія кормовыхъ травъ на поляхъ для обезпеченія скота въ теченіе всего лѣта достаточнымъ зеленымъ кормомъ; д) подъ постоянными дугами остаются только отличныя поемныя или слишкомъ сырыя низменныя мѣста; все плохое и посредственное суходольные дуга обращаются въ поля, почему: е) большая часть *всей земли въ хозяйствѣ состоитъ изъ полей*; если въ извѣстнѣи совсѣмъ нѣтъ поемныхъ и сырыхъ мѣстъ, то *вся земля состоитъ изъ однихъ только полей*; подобныя хозяйства называются *независимыми*; ф) на одной и той же землѣ (поляхъ) воздѣлываются зерновыя и кормовыя растенія попеременно (отличіе отъ зерновыхъ системъ); г) кормовыя растенія всегда воздѣлываются искусственно и на поляхъ нѣтъ выгонныхъ клиньевъ (отличіе отъ выгонныхъ системъ); б) число клиньевъ на поляхъ не менѣе 4-хъ (потому что равнѣ клеверъ не долженъ возвращаться на то же мѣсто) и весьма рѣдко болѣе 12; и) пространство подъ паромъ или уничтожено, или сокращено до minimum, который опредѣляется преимущественно суровостью климата и засоренностью полей; к) соотношеніе между пространствами, занятыми въ хозяйствѣ, изъ *всей его земли*, съ одной стороны—непосредственно продажными растеніями (пріемъ. хлѣбами), а съ другой кормовыми (травами и корнеплодами всмѣстѣ), опредѣляется главнымъ образомъ двумя условіями: 1) плодородіемъ почвы и 2) цѣнами на животныя продукты. Чѣмъ богаче почва и ниже цѣны животныхъ продуктовъ, тѣмъ меньшая доля всей земли должна быть назначена подъ кормовыя растенія; чѣмъ бѣднѣе почва и выше цѣны животныхъ продуктовъ, тѣмъ большая часть земли должна находиться подъ кормовыми растеніями; при полномъ отсутствіи въ хозяйствѣ постоянныхъ луговъ, смотря по отношенію названныхъ двухъ условій, въ практикѣ полагаютъ, что подъ кормовыми растеніями въ плодосмѣнной системѣ должно быть отъ $\frac{1}{3}$ до $\frac{2}{3}$ *всѣхъ полей*; если нѣются хорошіе постоянные дуга, то пространство подъ кормовыми растеніями на поляхъ можетъ быть соотвѣтственно уменьшено.

Условія, при которыхъ плодосмѣнная система можетъ имѣть мѣсто, суть: 1) высокая цѣна земли, относительно дешевый трудъ и низкій ростъ съ капиталовъ, 2) достаточный оборотный капиталъ и познаніе хозяина, 3) хороший сбытъ, въ особенности для животныхъ

продуктовъ, 4) малое пространство въ хозяйствѣ хорошихъ постоянныхъ луговъ, 5) благоприятныя условія почвы и климата для произрастанія кормовыхъ растеній, а въ умѣренной полосѣ въ особенности для краснаго клевера, 6) не слишкомъ сухая разсыпчатая почва, такъ какъ послѣдняя требуетъ время отъ времени назначенія подъ выгоны. Если все эти условія существуютъ, то учрежденіе плодосмѣнной системы доставляетъ слѣдующія выгоды: а) чередованіемъ растеній разнаго количественнаго химическаго состава доставляется возможность лучшаго пользованія однимъ и тѣмъ же запасомъ питательныхъ веществъ въ почвѣ, нежели при однообразной хлѣбной культурѣ, б) работы распределяются въ хозяйствѣ гораздо равномернѣе по разнымъ временамъ года, почему можно держать болѣе постоянныхъ рабочихъ и въ меньшей мѣрѣ прибѣгать къ поденному найму, в) травы, виды рѣпы, бобы, вики, рапсъ, картофель удаются по сѣвѣму удобренію гораздо лучше, нежели хлѣба, д) вслѣдствіе частой обработки и воздѣлыванія широкколистныхъ и корнеплодныхъ растеній уничтожаются сорныя травы, во главное—е) въ хозяйствѣ производятся большія массы навоза, увеличивающія урожай всѣхъ растеній и доставляющія болѣе свободы въ выборѣ всякихъ культуръ, которыя въ данное время могутъ быть выгодны по обстоятельствамъ рынка, а также большая доля всей земли можетъ служить для производства зерновыхъ растеній, нежели при зерновыхъ системахъ, въ которыхъ большія пространства земли теряются подъ чернымъ паромъ, постоянными выгонами и дугами *).

Наиболѣе сомнѣній при введеніи плодосмѣнной системы возбуждаютъ обыкновенно два вопроса: 1) цѣлесообразность уничтоженія или сокращенія чернаго пара и 2) введенія лѣтнаго стойловаго содержанія скота. Оба вопроса могутъ быть разрѣшены въ каждомъ частномъ случаѣ лишь сравнительною *количественною* оцѣнкою выгодъ и невыгодъ обоихъ пріемовъ въ данныхъ конкретныхъ мѣстныхъ обстоятельствахъ. Общее же обсужденіе вопроса до-

*) Знаменитый практическій хозяинъ и ученый Шверцъ, на основаніи эмпирическихъ наблюденій надъ существующими системами хозяйства, потребности и производствомъ въ послѣднихъ навоза, полагаетъ, что для поддержанія выгодныхъ урожаевъ непосредственно продажныхъ растеній *вся земля* хозяйства должна быть распределена по назначенію слѣд. образомъ:

	Процентное пространство подъ:		
	продажныхъ растеніями.	кормовыми растеніями.	паромъ.
при 3-хъ польовой системѣ	28	58	14
выгонной голыштинской	34	58	8
выгонной мекленбургской	38	50	12
плодосмѣнной безъ пара	50	50	0
плодосмѣнной съ паромъ	45	55	0

пускается только разсмотрѣніе *качественной* стороны этихъ выгодъ и невыгодъ, которая можетъ быть выражена въ слѣдующихъ главныхъ чертахъ.

По отношенію къ пару. Невыгоды чернаго пара состоятъ въ потерѣ земельной ренты съ находящагося подъ нимъ пространства; эта потеря тѣмъ болѣе, чѣмъ выше въ странѣ земельная рента вообще, слѣдовательно въ странахъ густо населенныхъ болѣе, нежели при рѣдкомъ населеніи. *Выгоды* чернаго пара состоятъ въ: а) возможности хорошаго разрыхленія почвы, что имѣетъ особое значеніе при плотныхъ глинистыхъ почвахъ и суровомъ климатѣ, требующемъ ранняго посѣва озимыхъ хлѣбовъ и своевременной обработки подъ нихъ; б) уничтоженіе многолѣтнихъ травъ съ глубокими корнями лучше всего достигается при черномъ парѣ; в) паровая обработка содѣйствуетъ выветриванію и заготовленію въ почвѣ растворимыхъ питательныхъ веществъ; г) черный паръ представляетъ лучшее мѣсто на поляхъ для примѣненія удобрень, особенно такихъ, какъ значительное известкованіе или навозка мергеля, торфа и пр., требующихъ тщательнаго перемѣшиванія съ почвою; е) паровая обработка совпадаетъ съ тѣмъ періодомъ въ хозяйствѣ (между яровымъ сѣвомъ и уборкою), когда въ немъ наименѣе работы, чѣмъ достигается равномерность распределенія послѣдней. Будучи вполнѣ справедливы, эти выгоды, въ странахъ съ значительною рентою, достигаются однако съ меньшими жертвами посредствомъ другихъ приемовъ, а именно: 1) культуры плугополозныхъ растений (паровыхъ), 2) воздѣлыванія на бывшемъ парѣ рано снимаемыхъ растений, своевременно освобождающихъ землю подъ слѣдующую озимь (если только послѣдняя не рансь), 3) усиленнаго примѣненія удобрень и 4) особенно — посредствомъ полевого травосѣянія и плодосѣйности. Поэтому полное уничтоженіе пара можетъ быть затруднительнымъ только при очень суровомъ климатѣ, слишкомъ большомъ засореніи почвы многолѣтними сорными травами и при воздѣлываніи озимаго рапса, который высѣвается слишкомъ рано. Надобность же въ уничтоженіи пара нисколько тѣмъ менѣе, чѣмъ ниже земельная рента.

По отношенію къ лѣтнему содержанію скота въ стойлахъ. Невыгоды его, на которыя обыкновенно указываютъ, суть: а) при неурожаѣ зеленого корма достаточное кормленіе скота встрѣчается болѣе затрудненія, б) ежедневная косьба и перевозъ зеленого корма на скотный дворъ значительно увеличиваютъ сумму упряжныхъ работъ въ хозяйствѣ, в) помѣщеніе зеленого корма требуетъ увеличенія размѣра строеній, г) уходъ за скотомъ увеличиваетъ ручныя работы, е) стойла, а слѣдовательно и строенія, должны быть просторнѣе, нежели при стойловомъ содержаніи скота только зимою. *Выгоды* лѣтнаго стойловаго содержанія скота могутъ быть сведены

къ слѣдующимъ пунктамъ: 1) при немъ, для кормленія одного и того же числа скота требуется меньшее пространство земли, такъ какъ искусственное травосѣяніе даетъ болѣе урожанъ корма съ 1 десяти., нежели естественный выгонъ (за исключеніемъ приморскихъ странъ); 2) въ усадьбѣ собирается гораздо болѣе навоза, который можетъ весь поступать на поля, гдѣ онъ болѣе необходимъ, нежели на выгонѣ; 3) кормленіе скота можетъ быть болѣе равномернымъ въ теченіе круглаго года, а кормовыя дачи и лѣтомъ зависятъ отъ произвола хозяина, почему возможно рациональное управленіе кормленіемъ.

Исходный пунктъ рѣшенія вопроса о выгонномъ или стойловомъ лѣтнемъ кормленіи, однако, лежитъ не въ приведенныхъ обстоятельствахъ, но въ тѣхъ болѣе крупныхъ экономическихъ причинахъ, которыя опредѣляютъ вообще выборъ системы хозяйства. При обширныхъ пространствахъ естественныхъ выгоновъ въ странахъ господства зерновыхъ системъ, или при роскошномъ ростѣ дикорастущихъ травъ въ странахъ приморскихъ (выгонныя системы; см. ниже) выгонное содержаніе скота, какъ бы не велики были его невыгоды, является совершенною необходимостью, также какъ и обратно, при господствѣ плодосѣйной системы выгонное содержаніе становится невозможнымъ, а стойловое, напротивъ — неизбѣжнымъ, такъ какъ не существуетъ болѣе угодій подъ постоянными выгонами.

Сѣвообороты, относящіеся къ плодосѣйной системѣ, различаютъ, смотря по: преобладанію въ нихъ культуры кормовыхъ или продажныхъ растений, обширности воздѣлыванія корнеплодовъ и промышленно — торговыхъ растений. Въ нижеслѣдующемъ приводятся примѣры плодосѣйныхъ сѣвооборотовъ, имѣющіе цѣлю дать понятіе о нихъ, но отнюдь не предназначенные для непосредственнаго примѣненія, такъ какъ выборъ соответственнаго сѣвооборота представляетъ собою мѣстный вопросъ, разрѣшаемый мѣстными данными. При растеніяхъ, подъ которыя кладется удобреніе, поставлена буква у.

Плодосѣйные сѣвообороты съ нѣкоторымъ преобладаніемъ воздѣлыванія хлѣбовъ.

1. Плугополозные у.	1. Рансь у.	1. Озимая пшеница у.
2. Яровой хлѣбъ.	2. Озимая рожь.	2. Картофель.
3. Клеверъ и стручковые.	3. Кормовая капуста у.	3. Овесь.
4. Озимый хлѣбъ $\frac{1}{2}$ у.	4. Озимая пшеница или ячмень.	4. Викария смѣсь $\frac{1}{2}$ у.
	5. Красный клеверъ.	5. Озимая рожь.
		6. Клеверъ.
1. Конскіе бобы у.	1. Красный клеверъ.	1. Озимая рожь у.
2. Озимая рожь.	2. Озимая рожь.	2. Картофель.
3. Картофель.	3. Картофель.	(съ уд. извѣстью).
4. Ячмень и овесъ.	4. Овесь.	3. Яровой хлѣбъ.
(по толокнѣ).	5. Горохъ.	4. Бѣлый клеверъ смѣсь

5. Красный клеверъ.
6. Озимая рожь.
7. Овесъ и гречиха.

6. Озимая рожь у.
7. Картофель.
8. Ячмень.

- си съ травами.
5. Озимая рожь у.
6. Овесъ.
7. Горохъ $\frac{1}{2}$ у.
8. Озимая рожь у.
9. Красный клеверъ.

1. Белый клеверъ въ смѣси съ травами.
2. Рапсъ у.
3. Озимая пшеница.
4. Горохъ и сурѣница.
5. Озимая рожь.
6. Красный клеверъ.
7. Озимая рожь у.
8. Картофель.
9. Ячмень.
10. Овесъ.

1. Плугонолозные у.
2. Яровой хлѣбъ.
3. Красный клеверъ.
4. Клеверъ.
5. Озимый хлѣбъ и ма-
сличный р. у.
6. Яровой хлѣбъ и озимый хлѣбъ.
7. Плугонолозные и
стручковые.
8. Яр. и озим. хлѣбъ.
9. Озимый хлѣбъ.
10. Яровой хлѣбъ.
11. Яровой хлѣбъ.

1. Рапсъ у.
2. Пшеница озимая.
3. Горохъ.
4. Озимая рожь $\frac{1}{4}$ у.
5. Клеверъ.
6. Озимый хлѣбъ.
7. Картофель.
8. Овесъ.
9. Плугонолозные у.
10. Ячмень.
11. Клеверъ.
12. Клеверъ.

Сѣвооборотъ съ преобладаніемъ воздѣлыванія зеленого корма.

1. Картофель.
2. Яровой хлѣбъ.
3. Паръ.
4. Рапсъ.
5. Озимый хлѣбъ.
6. Стручковые.
7. Озимый хлѣбъ у.
8. Плугонолозные.

9. Яровой хлѣбъ.
- 10.
- 11.
12. Люцерна.
- 13.
- 14.

1. Картофель.
2. Овесъ.
3. Паръ или стручковые у.
4. Рапсъ и вико.
5. Вика и яровой хлѣбъ.
- 6.
- 7.
8. Эснарцетъ.
- 9.
- 10.

Сѣвооборотъ съ усиленнымъ воздѣлываніемъ плугонолозныхъ растений.

1. Картофель у.
2. Озимъ.
3. Картофель $\frac{1}{2}$ у.
4. Яр.
5. Горохъ и вико.
6. Озимъ у.
7. Картофель.
8. Яр.
9. Клеверъ.
10. Ячмень.

1. Картофель у.
2. Картофель.
3. Горохъ.
4. Озимая рожь.
5. Картофель у.
6. Картофель.
7. Ячмень.
8. Клеверъ.
9. Клеверъ.
10. Паръ.
11. Озимая рожь.

1. Сахарн. свекловица у.
2. Ячмень.
3. Сахарная свекловица.
4. Ячмень.
5. Клеверъ.

Сѣвооборотъ съ преобладаніемъ хлѣбовъ и воздѣлываніемъ двухъ растений въ одномъ и томъ же году.

1. Шпиргель.
2. Озимая рожь у. и послѣ нея шпиргель въ то же лѣто.

3. Озимая рожь и за нею рѣпа.
4. Озимая рожь у.
5. Гречиха.

6. Озимая рожь у. и послѣ нея шпиргель.
7. Озимая рожь.
8. Ленъ у.

9. Рожь у. и послѣ нея рѣпа.
10. Рожь у.
11. Картофель.
12. Яровой хлѣбъ.

Подобные этому сѣвообороты распространены въ Бельгій и сѣверной Франціи и могутъ имѣть мѣсто только при тепломъ климатѣ и обильныхъ источникахъ искусственныхъ удобреній, дополняющихъ навозное.

5) *Выгонная система хозяйства* характеризуется тѣмъ, что въ ней хлѣбъ и кормовыя растения воздѣлываются *попеременно на одной и той же землѣ* — поляхъ; это составляетъ главное отличие выгоннаго хозяйства отъ зерноваго; отъ плодосмѣнной же системы выгонная отличается слѣдующими признаками: 1) смѣна на поляхъ хлѣба и кормовыхъ растений производится не изъ году въ годъ, какъ въ плодосмѣнной, но за воздѣлываніемъ, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ сряду, хлѣба на одномъ и томъ же клнѣ, послѣдній поступаетъ подъ многолѣтній выгонъ, 2) кормовыя травы на выгонныхъ клнѣхъ производятся въ большей мѣрѣ дѣйствіемъ естественныхъ условий, почвы и климата, нежели посредствомъ искусственнаго травостая; послѣднее ограничивается большею частью только *подсѣваніемъ* на выгонныхъ клнѣхъ мотыльковыхъ травъ для улучшенія естественнаго состава дикой флоры и 3) скотъ при выгонной системѣ содержится лѣтомъ не въ стойлахъ, но на пастбищѣ, которыми служатъ полевые выгонные клнѣи.

Также какъ въ плодосмѣнной, при выгонной системѣ уничтожаются постоянные выгоны и луга, за исключеніемъ безусловно выгонныхъ и луговыхъ участковъ земли (см. въ плодосм. системѣ), и вся земля включается въ составъ полей. Отношеніе на послѣднихъ пространствахъ подъ хлѣбами и кормовыми растениями (или выгонными клнѣями) опредѣляется тѣми же условіями, которыя были указаны относительно того же вопроса въ плодосмѣнной системѣ. Въ выгонной системѣ всегда имѣется черныя паръ, который представляетъ здѣсь необходимость, вслѣдствіе сильнаго задержанія земли подъ многолѣтнимъ выгономъ, требующаго усиленной обработки при поднятіи послѣдняго подъ воздѣлываніе хлѣбовъ. Главныя условія, опредѣляющія целесообразность этой системы хозяйства, заключаются въ: 1) влажномъ климатѣ, способствующемъ естественному росту травъ на выгонныхъ клнѣхъ; поэтому выгонныя системы утвердились повсюду въ приморскихъ странахъ по берегамъ сѣверо-вѣстнаго моря и, напротивъ, весьма мало распространены въ континентальной Европѣ; по той же причинѣ, эта форма хозяйства преобладаетъ во всѣхъ горныхъ странахъ Европы; 2) разсыпчатомъ и слишкомъ сухомъ свойствѣ почвы, которое требуетъ для уплотненія послѣдней, время отъ времени, продолжительнаго пользованія ею, какъ выгономъ; вызываемыя этими условіемъ выгонныя системы

встречаются въ континентальной Европѣ оазисами, а именно: въ бельгійской Кампинѣ, Маркѣ-Бранденбургѣ, вестфальскомъ Мюнстерѣ и пр. Въ зависимости отъ этихъ причинъ происхожденія выгонныхъ системъ, ихъ обыкновенно подводятъ при классификаціи подъ три группы: а) выгонныя системы береговыхъ странъ, б) горныхъ и с) континентальныхъ странъ съ сухою песчаной почвою.

а) Представителями выгонныхъ системъ береговыхъ странъ могутъ служить: голштинское и мекленбургское хозяйства.

Голштинская выгонная система. По свойствамъ глубокой и плодородной суглинистой почвы, преобладающей здѣсь, и при очень влажномъ климатѣ, естественный ростъ травъ на выгонѣ такъ роскошенъ, что уже издревле въ Голштиніи скотоводство заняло въ хозяйствѣ преобладающее положеніе, почему на поляхъ отводится большая доля подъ кормовые, нежели хлѣбные клнны, какъ это можно видѣть изъ слѣдующихъ типическихъ сѣвооборотовъ.

1. Овесъ по пласту.	1. Овесъ по пласту.
2. Паръ, сильно удобр.	2. Паръ удобр.
3. Оз. хлѣбъ.	3. Озимъ.
4. Яр. хлѣбъ.	4. Яр.
5. Яр. хлѣбъ.	5. Озимъ или яръ.
6. }	6. Овесъ.
7. } Выгонъ	7. }
8. } (и сѣнокосъ для	8. }
9. } зимняго кормл.).	9. } Выгонъ
10. }	10. } (и сѣнокосъ).
	11. }
	12. }

Каждый клннъ въ Голштинскомъ хозяйствѣ обносится валомъ, а послѣдній обезживается скорораствующими древесными породами; въ годы занятія клнна хлѣбомъ—деревья вырубаются во избѣжаніе отѣненія. Поэтому Голштинская система называется нерѣдко *огороженнымъ* хозяйствомъ.

Мекленбургская выгонная система отличается отъ предъидущей относительно преобладаніемъ въ хозяйствѣ, по значенію, производства зерна надъ скотоводствомъ, что условливается здѣсь менѣе благоприятными отношеніями климата и (сухой) почвы для урожая травъ на выгонахъ. Клнны здѣсь не огораживаются. Типическіе сѣвообороты:

1. Паръ.	1. Паръ.
2. Озимъ.	2. Озимъ.
3. Ячмень.	3. Яр.
4. Овесъ и горохъ	4. Паръ.
5—7. Выгонъ.	5. Озимъ.
	6. Яръ съ клеверомъ.
	7—8. Выгонъ.

Англійская выгонная система: 1. Турнипсъ, 2. Ячмень, 3. Клеверъ, 4. Пшеница, 5. Турнипсъ, 6. Ячмень съ клеверомъ, 7, 8 и 9—Выгонъ по клеверу и райграсу, преимущественно для овецъ. Или: 1 Турнипсъ, 2. Ячмень или пшеница, 3. Клеверъ съ травой на укосъ 4—6. Выгонъ.

б) *Горныя выгонныя системы.* Въ Штейермаркѣ: 1. Яровая рожъ у, 2. Овесъ, 3. Оз. рожъ у, 4—6. Выгонъ. Въ верхней Швабіи: 1. Овесъ, 2. Ячмень у, 3. Ячмень, 4. Овесъ, 5. Овесъ, 6—10. Выгонъ. Въ саксонскомъ Эрцгебиргѣ: Оз. рожъ у, 2. Ячмень, 3. Овесъ, 4. Горохъ и вика, 5. Овесъ, 6. Клеверъ, 7—9 Выгонъ.

с) *Выгонныя системы песчаныхъ почвъ* въ континентальныхъ климатахъ требуютъ непременно подѣла въ послѣднемъ году передъ выгономъ травъ, переносящихъ сухость почвы и климата (для этого служатъ преимущественно бѣлый клеверъ), такъ какъ въ противномъ случаѣ выгонъ весьма скудно покрывается растительностью; для увеличенія массы удобренія въ этихъ системахъ по большей части вводится картофель, хорошо переносящій сухость почвы. Типическіе сѣвообороты этой системы въ Маркѣ-Бранденбургѣ:

1. Картофель.	1. Картофель.
2. Паръ.	2. Ячмень.
3. Ячменя.	3. Клеверъ. 4. Гороха.
4. Оз. ржи.	4. Оз. рожъ.
5. Гороха.	5. Паръ.
6. Овса.	6. Озим. рожъ.
7. Выгонъ.	7. Яръ съ бѣл. клеверомъ.
8. Паръ.	8—10. Выгонъ.
9. Оз. рожъ.	11. Паръ.
10. Яръ (овесъ, гречиха, пш. шпиргель.)	12. Озимъ.

Относительно выгонной системы хозяйства вообще, можно замѣтить, что она свойственна только *большимъ имѣніямъ* и требуетъ непременно округленнаго положенія земли при полномъ отсутствіи чрезнопосага владѣнія, или пользованія; первоначальное устройство ея весьма трудно и требуетъ сложныхъ и отдаленныхъ соображеній, но будучи разъ заведена—она оказывается весьма простою и легкою для управления. Въ континентальныхъ климатахъ, при не очень сухихъ и рассыпчатыхъ почвахъ, эта система хозяйства не можетъ конкурировать съ плодоемкою и искусственнымъ травосѣяемъ, которое даетъ здѣсь гораздо большія массы корма и удобренія, производство которыхъ составляетъ конечную пѣль той и другой системы.

Исслѣдованіе доходности системы хозяйства и сѣвооборота.

Если бы возможно было изслѣдовать и выразить въ числахъ, имѣющихъ общее значеніе: величину валоваго дохода, свойствен-

ную различнымъ видамъ почвы, истощеніе послѣднихъ урожаемъ, вытекающую отсюда величину потребнаго внесенія въ почву питательныхъ веществъ (удобреній) и потребление ихъ въ почву послѣдствіе усвоенія растениями, то мы имѣли бы возможность въ общій абсолютной выгодности различныхъ сѣвооборотовъ, могли бы сравнивать ихъ между собою и, *даже не обладая точнымъ знаніемъ специальныхъ условий*, въ которыхъ примѣняется та или другая форма хозяйства, мы могли бы произносить болѣе или менѣе рѣшительное сужденіе о *степени ея целесообразности*. Но этого нѣтъ. Хотя многіе, нерѣдко гениальныя, ученые сельскіе хозяева, основываясь на массахъ эмпирическихъ опытовъ практики, и стремились вывести данныя, относящіяся къ вышеупомянутымъ величинамъ, на степень общепримѣнимыхъ законовъ, и выражать ихъ математическими формулами, но всѣ подобныя попытки до сего времени остались неудачными и именно потому, что на развитіе культурныхъ растений вліяютъ одновременно три главныхъ условія: почва, климатъ и интеллигенція хозяина, изъ которыхъ на одно не дѣйствуетъ изолированно отъ другихъ двухъ, почему и не можетъ найти для себя никакого абсолютнаго измѣренія, которое бы относилось именно къ нему одному, не заключаая въ себѣ оцѣнки дѣйствія двухъ остальныхъ факторовъ. Подобнымъ же образомъ, и отчасти даже не безуспѣшно, сельскіе хозяева пытались отдѣльные процессы питания и развитія растений и животныхъ привести къ опредѣленнымъ числовымъ выраженіямъ, которыя, при извѣстныхъ ограниченіяхъ, приносятъ большую пользу, давая опорныя точки для сравненій и моменты для объясненія подобныхъ явленій. Такія числа, кромѣ научнаго, имѣютъ и практическое значеніе, служа исходными пунктами для различныхъ приблизительныхъ сѣтъ хозяина, а также для производства опытовъ, имѣющихъ цѣлю отысканіе болѣе точныхъ подобныхъ чиселъ, которыя отклоняются отъ общихъ среднихъ въ зависимости отъ мѣстныхъ, или индивидуальныхъ причинъ. Подобныя среднія числа мы будемъ нерѣдко употреблять въ послѣдующемъ изложеніи сочиненія. Но при пользованіи ими мы рекомендуемъ никогда забывать, что какъ ни велико число наблюденій, опытовъ и исследований, на основаніи которыхъ предлагаются подобныя данныя, оно во всякомъ случаѣ ничтожно въ сравненіи съ безчисленными индивидуальными случаями, на которые эти числа *имѣютъ быть распространены* въ дѣйствительности, и что здѣсь тоже дѣло идетъ всегда о весьма сложныхъ явленіяхъ, отдѣльныя производящія причины которыхъ не могутъ быть вполнѣ изслѣдованы даже при тщательномъ изслѣдованіи. Вотъ почему, при изслѣдованіи доходности системы хозяйства, или сѣвооборота, хозяинъ не можетъ основываться на подобныхъ среднихъ числахъ, или на какой либо заранее выведенной формулѣ, но необхо-

димо долженъ всѣ нужныя числа брать изъ *дѣйствительности* даннаго случая и на основаніи *самостоятельнаго вычисленія* рѣшать вопросъ о томъ, какая система даетъ въ этомъ случаѣ болѣе доходъ. Даже напротивъ, когда хозяинъ имѣетъ въ виду сравненіе различныхъ системъ, не касаясь своего частнаго случая, онъ долженъ исходить изъ того вѣзда, что *всѣ системы имѣютъ равное достоинство*, т. е. каждая изъ нихъ въ *опредѣленное время, опредѣленномъ мѣстѣ и опредѣленныхъ условіяхъ* можетъ быть болѣе выгодною, нежели всѣ другія. Что же касается до вопроса, какая система общааетъ наибольшій доходъ въ какомъ либо частномъ конкретномъ случаѣ одного хозяина, отвѣчать на него, даже приблизительно, не можетъ никто, кому неизвѣстны самыя подробныя детали этого хозяйства и его условій; нѣтъ ничего ошибочнѣе, какъ рѣшать подобныя вопросы не основаніи среднихъ чиселъ и общихъ формулъ.

Приступая къ изслѣдованію относительной доходности различныхъ системъ въ данномъ хозяйствѣ, прежде всего необходимо опредѣлять средніе урожаи, которые въ мѣстности и при данной почвѣ получаются при воздѣлываніи различныхъ растений; точками опоры для соображеній въ этомъ случаѣ могутъ служить данныя, приведенныя въ статьѣ о *посѣвахъ*, гдѣ показаны средніе урожаи и ихъ отклоненія для разныхъ растений (см. табл. посѣва и урожаевъ). Объ отношеніи между всѣмъ зерномъ и соломою въ урожаихъ колосовыхъ хлѣбовъ приведены показанія въ отдѣлѣ объ *уборкахъ*. При вычисленіи урожаевъ сѣна съ луговъ, на сколько послѣдніе важны по своему вліянію на развитіи воздѣлыванія кормовыхъ растений на поляхъ, ихъ слѣдуетъ оставить пока въ сторонѣ и уже по окончательномъ выборѣ сѣвооборота (независимо отъ луговъ) дѣлать въ послѣднемъ измѣненіи, соответственно пространству имѣющихся луговъ и урожайности послѣднихъ.

Самое вычисленіе должно производиться на принятую въ странѣ единицу мѣры поверхности, сѣѣдов. на 1 кв. десятину. Послѣ вычисленія валовыхъ доходовъ разныхъ культур производится такое же опредѣленіе *суммы расхода*, который требуется въ данной мѣстности при производствѣ всѣхъ возможныхъ растений и состоитъ въ затратѣ: *сѣмянъ, работы, удобренія, оборотнаго капитала, пздержекъ на управленіе и надзоръ*; при арендованіи, къ разряду расхода принадлежитъ сверхъ того еще *арендная плата*. При опредѣленіи потребнаго количества удобренія (которымъ опредѣляется расходъ на послѣднее) въ которую точку опоры можетъ служить вычисленіе отчуждаемыхъ изъ почвы веществъ на сторону, но по отсутствію въ этомъ отношеніи прочныхъ научныхъ положеній, хозяинъ сдѣлаетъ лучше, если будетъ основываться въ этомъ вопросѣ частію на употребленныхъ въ мѣстности нормахъ удобренія въ лучшихъ хозяйствахъ,

частью же на эмпирических показаниях практики, приведенных в статью о *производстве удобрений и потребности в нем*. Само собою разумеется, что эти данные не должны приниматься по шаблону и имеют целью лишь дать начинающему хозяину точки опоры, которых он не успевает приобрести по недостатку собственного опыта; последний в этом случае, один, может привести к разрешению вопроса, соответствующему частному случаю хозяйства. Решающий момент для разбора употребления искусственных удобрений заключается в производимом ими увеличении урожая, которое может быть определено только опытом в каждом данном хозяйстве. При этом, ценность этого увеличения урожая должна превосходить продажную цену удобрений; иначе общие применимые данные в этом случае быть не может, так как действие односторонних туков колеблется весьма сильно при употреблении их на разных почвах. Хозяйственная стоимость производства навоза определится посредством вычитания из ценности употребленного для производства его корма и подстилки (определяемой по рыночной цене этих предметов) чистого дохода, полученного от произведшего этого навоза скота (этот чистый доход состоит из разности между ценностью полученных животных продуктов и расходов на: уход за скотом, ремонт и возобновление капиталов в скот, строениях и утвари); или другими словами: разность между рыночной ценой затраченных на скот корма и подстилки и чистым оплачиваемым последним скотом представляет собою хозяйственную стоимость производства того навоза, который произведен этими кормом и подстилкой; очевидно, если бы навоз не стоил этой величины, то скотоводство не имело бы смысла, так как непосредственная продажа корма на рынок давала бы хозяйству больший чистый доход. Оценка навоза по ценности составных его частей может иметь место лишь в странах с развитым рынком искусственных удобрений; попытка такой оценки сообщена в конце статьи об удобрительных средствах.

При вычислениях в крупных сметах количества навоза, получаемого из данной массы корма и подстилки, переводят весь корм на содержащееся в нем сухое вещество, умножают полученную цифру на 2 и прибавляют к произведению сухое вещество подстилки (85% веса соломы), умноженное на 3.

Величина потребности в посевных семенах колеблется в зависимости от качества зерна, времени посева, физических свойств и плодородия почвы.

Во всех подобных вычислениях, начинающий хозяин должен постоянно обращаться к помощи фактов, сохранившихся в

хозяйств от его предшественников, а применимые приведенные здесь и в других местах соображения основания вычислений, он не должен пользоваться ими как рецептами, но вести свои сметы вводить сознательно и самостоятельно; в противном случае, он может на каждом шагу уклониться от общей идеи и потеряться в сложных деталях расчетов. Все величины приходов и расходов должны выражаться в деньгах.

При выборе севооборота и возделываемых растений, необходимо постоянно иметь в виду, что: *самые надежные и доходные растения не те, которые имеют самую рыночную цену, но те, которые по вычету из валового дохода издержек производства дают наибольший излишек*, что обыкновенно сопровождается культурой, наиболее соответствующей климату и почве местности. С другой стороны, дешевизна и выгодность производства определяются не малою величиною издержек, но высоким процентом, добываемым с затраченного капитала, что в свою очередь обуславливается величиною последнего и целесообразностью его применения.

Далее, хозяин никогда не должен задаваться намерением производить в хозяйстве все то, что потребляется в нем, но лишь то, что доставляет наибольший доход; остальное выгодно приобретать покупкою.

Особое внимание должно быть уделено вопросу о выгоднейшем *оплачивании* продуктов, как при продаже их, так и потреблении в собственном хозяйстве. Ошибки в этой, так сказать спекулятивной, стороне деятельности хозяина нередко делают бесплодными техническое умение его, прилежание и бережливость. В этом отношении нельзя не упрекнуть весьма многих хозяев, которые обыкновенно с достаточным вниманием делают свои расчеты относительно продуктов, продаваемых на сторону, и в тоже время относятся довольно небрежно к целесообразности употребления продуктов, потребляемых в собственном хозяйстве, т. е. к посредственной продаже, или взаимному обмену, который постоянно ведется между отдельными отраслями хозяйства; такой способ действия, в конце концов, конечно отражается, хотя и незаметно для хозяина, на продаваемых продуктах, так как уменьшает их количество, и при том тем более, что ценность общей суммы продуктов, потребляемых в хозяйстве, по большей части значительно превышает ценность продуктов, отправляемых на рынок.

Существенное влияние, как на всю организацию хозяйства, так

и особенно на избраніе сѣвооборота и полевой системы имѣетъ соединеніе съ хозяйствомъ *техническихъ производствъ*. Здѣсь конечно не можетъ идти рѣчи о заводскихъ производствахъ въ такихъ размѣрахъ, при которыхъ сельское хозяйство оказывается подчиненною фабрикѣ отрасли, такъ какъ при этомъ руководящіе принципы организациіи всего промышленнаго предпріятія должны исходить уже не изъ интересовъ хозяйства, но изъ цѣлей, преслѣдуемыхъ фабрикою, какъ это имѣетъ мѣсто напр. въ случаяхъ соединенія хозяйства съ свеклосахарными значительными заводами.

Мы имѣемъ въ виду лишь вліяніе, которое производятъ на устройство хозяйства техническія производства такъ называемыхъ сельскохозяйственныхъ размѣровъ. Чѣмъ въ большей мѣрѣ подобныя заводы перерабатываютъ продукты, которые производятся въ хозяйствѣ въ значительныхъ размѣрахъ и въ тоже время весьма дешево, чѣмъ обширнѣе районъ сбыта добываемаго фабриката и чѣмъ болѣе высокое кормовое достоинство имѣютъ остатки производства, тѣмъ благоприятнѣе вліяніе завода на доходность хозяйства. При этомъ хозяинъ долженъ наблюдать не только за рациональнымъ веденіемъ заводскаго производства, но также и за тѣмъ, чтобы полеводство своею поставкою хорошаго и дешеваго сырого продукта содѣйствовало поднятію завода, заводъ — своими остатками — способствовалъ развитію скотоводства, а послѣднее — своимъ навозомъ — возвышало плодородіе полей, словомъ, чтобы всѣ отдѣльныя звѣнья этой цѣпи отраслей находились въ правильномъ между собою отношеніи, не поглощая другъ у друга равно необходимыхъ для каждой труда и капитала. Если, какъ это обыкновенно и бываетъ (исключая нѣкоторыхъ производствъ: маслосбойнаго, мукомольнаго), заводъ доставляетъ въ своихъ отбросахъ кормъ, слишкомъ изобилующій водою, то при обсужденіи сѣвооборота необходимо обратить вниманіе на достаточное производство сухаго корма и особенно соломенной подстилки, потребность въ которой при этомъ значительно возрастаетъ; само собою разумѣется, что назначеніе достаточнаго и наиболѣе соотвѣстнаго мѣста въ сѣвооборотѣ для растеній, доставляющаго сырой продуктъ заводу, заслуживаетъ вниманія еще въ большей степени. Вопросъ о томъ, выгоденъ или нѣтъ заводъ, можетъ быть разрѣшенъ только спеціальнымъ учетомъ въ каждомъ частномъ случаѣ, при чемъ опредѣляется сравнительно чистый доходъ съ 1 дес. земли при употребленіи послѣдней подъ три возможныхъ назначенія: 1) производство непосредственно продажныхъ растеній, 2) производство тѣхъ или другихъ животныхъ продуктовъ и 3) производство сырого продукта для, сравниваемого съ первыми двумя способами пользованія землею, технического производства.

Выборъ сѣвооборота и воздѣлываемыхъ растеній.

При обсужденіи вопроса о выборѣ сѣвооборота, въ связи съ нимъ, необходимо должны быть рассмотрѣны вопросы: о выборѣ отдѣльныхъ растеній, источникахъ добыванія сѣмянъ, общей системы обработки почвы и удобрения.

Въ проектируемый организационный планъ хозяйства должны быть включены лишь части земли, способныя приносить чистый доходъ; пустующія земли, слишкомъ отдаленные участки, подверженные періодическимъ наводненіямъ части земли и т. под. гораздо удобнѣе назначать подъ какое либо отдѣльное пользование, сдавать въ наемъ, или вознаграждать ими за работу, доставляемую хозяйству соседнимъ населеніемъ. Избираемая форма хозяйства должна находиться въ соотвѣтствіи съ имѣющимся оборотнымъ капиталомъ, наличными рабочими силами, естественнымъ разграниченіемъ отдѣльныхъ частей полевой земли, свойствами почвы и климата. Слѣдуетъ избѣгать, особенно при имѣніяхъ средней величины, назначенія нѣсколькихъ сѣвооборотовъ, раздробленнаго положенія клиньевъ и неравномѣрности величины послѣднихъ. При арендованіи, число клиньевъ и лѣтъ сѣвооборота удобнѣе сообразовать съ числомъ лѣтъ аренды, чтобы къ концу ея хозяинъ могъ воспользоваться всеми результатами избраннаго оборота культуръ. При переходѣ въ новый сѣвооборотъ, тотчасъ же по учрежденіи новаго раздѣленія полей, всѣ старанія должны быть устремлены на то, чтобы обработкою и удобреніемъ съ самаго начала обезпечить успѣхъ каждой культуры; особая забота должна быть посвящена увеличенію удобрения, которое временно можетъ быть достигнуто примѣненіемъ зеленого удобрения и искусственныхъ туковъ пока новый сѣвооборотъ въ своихъ кормовыхъ растеніяхъ не успѣлъ еще доставить постоянного источника удобрительныхъ средствъ.

Единственнымъ руководствомъ при выборѣ отдѣльныхъ растеній можетъ быть величина доставляемаго ими чистаго дохода, на которую въ мѣстности можно разсчитывать въ среднемъ выводѣ. *Всѣ растенія* извлекаютъ изъ почвы извѣстныя, одни и тѣ же, питательныя вещества, но не въ равныхъ количествахъ и пропорціяхъ: одни — болѣе фосфорной кислоты, другія кали, третьи известія и пр.; поэтому чередованіемъ растеній, различныхъ по составу, при рациональномъ сѣвооборотѣ, можно воспользоваться лучше однимъ и тѣмъ же запасомъ питательныхъ веществъ въ почвѣ, нежели при непрерывномъ воздѣлываніи однихъ и тѣхъ же растеній. *Всѣ растенія*, прямо или косвенно, служатъ въ хозяйствѣ для производства продуктовъ, продаваемыхъ на сторону; содержащіеся въ этихъ продуктахъ минеральныя вещества произошли изъ почвы и, если хозяйство

не попускает со стороны кормовых средств и удобрения, то не возвращаются в нее; поэтому все растения, без исключения, истощают почву. Но не все растения способны к производству одинакового количества *органического вещества* на данном пространстве: кормовые производят его гораздо больше, нежели зерновые. Органическое вещество кормовых растений, поступив в почву в навоз, дает в продуктах своего разложения такое количество растворяющихся средств, которое способно к переводу в почву из нерастворимого в растворимое состояние количества минеральных веществ, большая, нежели отчуждаемая из почвы продажей. Разность между количеством минеральных *растворимых* веществ, производимых в почве органическим веществом остатков культурных растений (живых и навоза), и количеством их, удаляемых из почвы вследствие культуры *тех же* растений, мы называем *относительным обогащением* почвы данным растением, если эта разность положительная, или *относительным истощением*, когда она отрицательная. Кормовые растения дают положительную, а зерновые и торговые — отрицательную разность. Но при воздвизании тех и других почва истощается *абсолютно*: с этой точки зрения — все растения суть *истощающие*.

Только в этом *относительном* смысле следует понимать удерживаемая в предлагаемом сочинении утвердившиеся выражения: *обогащающие, сохраняющие и истощающие растения*, которыми обыкновенно характеризуют относительное обогащение или относительное истощение почвы, наблюдаемое в практик при воздвизании различных растений. Но подобная классификация совершенно ошибочна, если с названными выражениями соединяется понятие об абсолютном обогащении почвы минеральными питательными веществами *). С этой точки зрения надо смотреть на приводимую в

*) Все мыслящие сельские хозяева уже давно принимают приведенные выражения в принятом нами смысле и очень хорошо знают, что они не вполне соответствуют понятию, которое имеют целью выразить. В этом случае мы видим факт, который повторяется во всех сферах жизни: старые выражения удерживаются по завоеванному или праву гражданства, хотя в них и подменяются новые понятия. Конечно, ни один разумный хозяин, который говорит о сохраняющих, или обогащающих растениях, или же дает числовое выражение для влияния, производимого культурой этих растений на его хозяйство, не воображает при этом, что его почва *обогащается абсолютно*, т. е. что в ней увеличивается количество питательных веществ вообще, но не количество *одних только растворимых питательных веществ*. Они употребляют эти выражения ради их общепотребительности и краткости обозначения или изветных моментов культуры, очень хорошо сознавая *фиктивность* их значения. Не тоже ли самое делают все, бессознательно употребляя такие выражения, как: «солнце взошло из-за горы, или опустилось за горы» и т. п. Конечно, наука должна стремиться к созданию точной терми-

следующимъ отдѣлъ таблицу, въ которой показаны эмпирическія данныя практики относительно производства и потребности различныхъ растений въ удобрѣніи (статика Пабста). Посредствомъ сильныхъ относительно — обогащающихъ (кормовыхъ) и истощающихъ (преимущественно зерновыхъ р.) растений въ сѣвооборотѣ, урожайность (также «плодородіе», но не «богатство») почвы можетъ быть подержана и даже возвышена въ теченіе весьма долгаго періода, обнимающаго нерѣдко многія десятилѣтія. Сѣвооборотъ долженъ быть составленъ такъ, чтобы въ немъ кормовыя растения производились въ разбѣрахъ, устраняющихъ абсолютную необходимость въ покупкѣ удобрѣнія для существованія выгоднаго производства, чтобы такимъ образомъ хозяйство могло опираться на собственные силы и не зависѣло отъ колебаній цѣны искусственныхъ туковъ, которыя нерѣдко условливаются совершенно неожиданными случайными причинами. При избраніи кормовыхъ растений, конечно, должно остановиться на *тех изъ нихъ*, которыя помѣстнымъ условіямъ опавчиваютъ наилучше занимаемую ими землю. Въ приложеніи, таблица подъ VI служить для того, чтобы на основаніи получаемого въ хозяйствѣ урожая и производимыхъ издержекъ, относительно каждаго растения, можно было бы немедленно вычислить кормовую цѣнность, содержащуюся въ различныхъ растенияхъ и опредѣлить какою культурою доставляется наиболее дешевый кормъ. Более точныя сѣмты получаютъ при опредѣленіи суммы *питательныхъ веществъ*, производимыхъ на 1 дес. различными кормовыми растениями, для чего нужны точки опоры находятся въ отдѣлѣ о кормленіи и кормовыхъ средствахъ. При назначеніи продуктовъ въ продажу, или для употребленія въ хозяйствѣ, хозяинъ не долженъ обращать вниманія на то, называется ли, по принятой номенклатурѣ, растеніе торговымъ, продажнымъ, или кормовымъ, но долженъ назначать въ продажу *тѣ* растенія и количества ихъ, которыя *такимъ путемъ* оплачиваются наилучшимъ образомъ, а скормливать скоту *тѣ*, которыя даютъ *при этомъ* больше дохода, нежели при продажѣ.

Существенно важно возможно дешевое производство корма; чтобы достигнуть его, главнымъ кормовымъ растеніемъ: клеверу, люцернѣ, эспарцету должны быть назначены въ поляхъ мѣста, вполне обезпечивающія ихъ урожай; даже число влиевъ въ сѣвооборотъ, при воздвизаніи этихъ растеній, должно быть сообразовано главнымъ образомъ съ *тѣмъ* промежуточнымъ временемъ, который на данной почвѣ требуется при повтореніи культуры на одномъ и томъ же клѣтѣ: клевера, люцерны и эспарцета — самихъ послѣ себя.

Ботаники, но и удержаніе стараго слова, при соединеніи съ нимъ новаго понятія, не лишено своей доли пользы: оно оставляетъ намъ интересный признакъ, или сѣмъ, для пониманія хода развитія исторіи культуры.

При умеренномъ климатѣ *однолѣтнее* воздѣлываніе краснаго клевера болѣею частію выгодноѣ *долгѣтняго*. Если въ первый разъ воздѣлывается красный клеверъ, а при повтореніи — бѣлый клеверъ въ смѣси съ травами, то клеверные годы въ сѣвооборотѣ могутъ возвращаться на одинъ и тотъ же климатъ *скорѣе*, что представляетъ ту выгоду, что въ сѣвооборотѣ увеличивается число мѣстъ, слѣдующихъ за клеверомъ, достающихъ отличныя условія роста озимымъ зерновымъ растеніямъ. Въ болѣе суровыхъ климатахъ, а также при сухомъ грунтѣ почвы, выгодноѣ *длѣтнее* воздѣлываніе клевера съ подѣвомъ къ нему соответственныхъ травъ. Корнеплоды растеній во многихъ случаяхъ даютъ еще болѣе корма на данномъ пространствѣ, нежели клеверъ, но ихъ употребленіе при кормленіи не такъ универсально, ихъ сохраненіе труднѣе, а воздѣлываніе — дороже по большому требованію работы и удобреній.

Озимые колосовые хлѣба, если ничто не препятствуетъ ихъ воздѣлыванію (климатъ), приносятъ обыкновенно большіе урожаи, нежели яровые, почему должны преобладать надъ послѣдними по пространству, если для этого достаточно производство навоза. При изобиліи послѣдняго, особеннаго вниманія заслуживаетъ культура масличныхъ растеній, которая однако всегда сопровождается большимъ *рискомъ*, нежели воздѣлываніе хлѣба; тоже относится ко всѣмъ *горькимъ* растеніямъ вообще. Стручковые растенія только на извѣстныхъ почвахъ даютъ надежныя урожаи, почему усиленному разведенію ихъ долженъ всегда предшествовать предварительный опытъ.

Въ вопросѣ о выборѣ *сѣмянъ* и источникахъ ихъ добыванія необходимо не только держаться правила употреблять на посѣвъ способныя къ прорастанію и вполне здоровыя зерна, но также стараться о томъ, чтобы изъ растеній, вообще хорошо удающихся въ мѣстности, воздѣлывались преимущественно сорты, имѣющіе особенный спросъ и слѣдовательно обшлагоющіе большій доходъ. Если подобныя сорты легко выраждаются, то подлежитъ обсужденію вопросъ, покрываются ли увеличенныя издержки на приобрѣтеніе покупкою сѣмянъ при частой ихъ *перемѣнѣ* (обновленіи) вышшею *продажною цѣною* получаемыхъ урожаевъ и болѣею величиною послѣднихъ. Если же сорты *постоянны*, то посредствомъ систематическаго *отбора лучшихъ сѣмянъ*, преслѣдуя его въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, хозяинъ имѣетъ въ рукахъ средство достигнуть производства на *продажу* собственныхъ посѣвныхъ сѣмянъ и сбывать ихъ по *высокимъ цѣнамъ* хозяевамъ, нуждающимся въ хорошихъ сортахъ. Изысканіе мѣръ для сбереженія посѣвныхъ сѣмянъ имѣетъ болѣе значеніе относительно тѣхъ видовъ растеній, которыхъ сѣмена уже сама по себѣ имѣютъ значительную цѣнность, а за тѣми тѣхъ, которыя

требуютъ много свѣта, способны къ роскошному развитію надземныхъ частей и слѣдовательно при рѣдкомъ посѣвѣ могутъ доставлять большіе урожаи; если мы и видимъ, что подобныя растенія нерѣдко высѣваются густо, то это происходитъ потому, что не доставляется каждому сѣмени и растенію условій для выхода и благопріятнаго развитія; въ этомъ случаѣ несовершенству культуры хозяинъ приноситъ жертву посѣвными сѣменами. Лучшія средства избавиться отъ такой жертвы состоятъ въ вывѣтриваніи и свѣлости почвы, тщательной обработкѣ, *современномъ* посѣвѣ, *равномерномъ* *распределеніи* сѣмянъ по поверхности поля и задѣлкѣ ихъ на *одинаковую глубину*. Машинный посѣвъ обходится болѣею частію дешевле, нежели ручной, вслѣдствіе большаго *сбереженія сѣмянъ*, если только употребленію машины не препятствуютъ слишкомъ малая величина нивы и неровное холмистое положеніе полей.

Особое стремленіе *сберегать* при посѣвѣ *сѣмена кормовыхъ растеній* по болѣею части ведетъ къ большимъ потерямъ на величинѣ урожаевъ. Вопросъ о производствѣ этихъ сѣмянъ въ хозяйствѣ, или покупкѣ на сторонѣ, разрѣшается сравненіемъ дешевизны того и другаго способа и въ особенности степенью гарантіи въ хорошемъ качествѣ покупаемыхъ сѣмянъ.

При устройствѣ сѣвооборота рѣшающее значеніе имѣетъ вопросъ, *подъ какія растенія* должно быть назначено *удобрѣніе*. Въ общемъ видѣ этотъ вопросъ рѣшается весьма легко: удобрѣніе должно быть назначено всегда *подъ тѣ растенія, которыя оплачиваютъ его наилучшимъ образомъ*; но на болѣе частный вопросъ, *какія именно растенія доставляютъ высшее оплачиваніе для употребляемаго удобрѣнія*, отвѣчать не только весьма трудно, но при современныхъ знаніяхъ даже невозможно. Можно указать лишь *на то*, что при разрѣшеніи этого вопроса въ расчетъ должно быть принято не только *увеличеніе урожаевъ* растеній, получившихъ удобрѣніе, но также и *пониженіе урожаевъ*, вслѣдствіе *неудобрѣнія*, всѣхъ тѣхъ растеній, *подъ которыя* не назначается удобрѣніе; хозяинъ въ этомъ случаѣ спрашиваетъ себя, выгодноѣ ли ему положить значительныя массы удобрѣнія только *подъ одни* высокооплачивающія его растенія, или же распределить то же количество меншими долями между многими растеніями (причемъ нѣсколько увеличивается стоимость растраты удобрѣнія); теоретически вопросъ разрѣшается слѣдовательно сравненіемъ двухъ величинъ: 1) цѣнностью увеличенія урожаевъ отъ удобрѣнія вышеупомянутыхъ *немногихъ* растеній и 2) цѣнностью уменьшенія суммы урожаевъ *многихъ* растеній, не получающихъ удобрѣнія; опредѣленіе обихъ величинъ представляетъ неисчислимыя трудности, почему поставленный вопросъ разрѣшается въ практикѣ обыкновенно опытомъ и ощущею. При употребленіи удобрѣнія не

слѣдуетъ забывать, что оно представляетъ собою *капиталъ* и слѣдовательно имѣетъ назначеніемъ приносить возможно *быстрѣ* (особенно при арендованіи) *соотвѣтственный* процентъ. Не очень сильное, но часто повторяемое и не глубоко задыбливаемое, удобреніе болѣею частью удовлетворяетъ этой цѣли лучше, нежели примѣняемое массами, повторяемое рѣдко и запахиваемое на большую глубину. Но для этого и почва должна быть приготовляема такъ, чтобы въ ея составѣ и физическихъ свойствахъ ничто не препятствовало быстрой дѣйствию удобрения, и именно растворимости и легкости распространенія составныхъ частей послѣдняго; примѣненіе же малыхъ количествъ удобрения на почвахъ связныхъ, плотныхъ, находящихся въ дурномъ культурномъ состояніи и бѣдныхъ перегноемъ, обыкновенно остается безплоднымъ и почти равнозначительно полной потерѣ затраченнаго капитала. Отсюда произошло старинное правило хозяевъ-практиковъ—удобрять *сильнѣе*, но *рѣже*, *недѣлательныя*, *холодныя*, и *слабыя*, но чаще, дѣлательныя, горячія почвы. Въ числѣ общихъ пунктовъ, относящихся къ обсужденію вопроса объ удобрѣніи въ сѣвооборотѣ, заслуживаютъ вниманія еще слѣдующіе; при обыкновенныхъ хозяйственныхъ условіяхъ, непосредственное удобреніе вознаграждается лучше: озимыми хлѣбными, масличными и плугополодными (особенно корнеплодными) растениями; если хозяйство устроено правильно и находится въ полномъ ходу, то непосредственное удобреніе выгодно также подъ тѣ изъ кормовыхъ травъ, за которыми слѣдуютъ колосовые хлѣба; въ хорошемъ удобренномъ состояніи должны находиться и тѣ клевера, на которыхъ воздѣлываются въ данномъ году хлѣба, а за послѣдними слѣдуютъ кормовыя травы, — особенно многолѣтнія; это достигается или непосредственнымъ сильнымъ удобреніемъ подъ хлѣба, или подъ предшествующее имъ растеніе (чаще—корнеплодное).

Вопросы объ относительныхъ размѣрахъ и послѣдовательности чередованія воздѣлываемыхъ растений стоятъ, какъ можно видѣть изъ всего вышеизложеннаго, въ тѣснѣйшей связи съ вопросомъ о количествѣ сѣна, которое можетъ быть содержимо при данныхъ условіяхъ хозяйства и количествомъ навознаго удобрения, производимаго въ послѣднемъ. Поэтому, обсуждая названные пункты при составленіи сѣвооборота, хозяинъ долженъ сопоставить наложенныя выше данныя съ главнѣйшими мотивами, развитыми въ статьяхъ предлагающаго сочиненія объ удобрѣніи и кормленіи скота.

Въ нижеслѣдующемъ приводится примѣръ расчета предполагаемой доходности сѣвооборота, который проектируется избрать для даннаго хозяйства; назначеніе этого примѣра—указать на главные моменты при составленіи подобныхъ смѣтъ, но не служить образцовымъ рецептомъ, который могъ бы примѣняться шаблоннымъ обра-

зомъ важнымъ хозяиномъ. Здѣсь не бесполезно будетъ напомнить еще разъ уже высказанное положеніе, что при всякомъ числѣ хозяйственнаго вычисленія производящій его долженъ поступать совершенно самостоятельно, ясно сознавая вопросъ, который имѣется въ виду разрѣшить, а слѣдовательно и употреблять способъ рѣшенія, наилучшимъ образомъ соотвѣтствующій поставленной задачѣ.

Примѣръ смѣтнаго вычисленія доходности восьми-польнаго сѣвооборота.

Въ этомъ примѣрѣ предполагается уже рѣшеннымъ, что нижеприводимый сѣвооборотъ соотвѣтствуетъ условіямъ хозяйства и показанныя количества удобрения могутъ быть произведены собственными средствами.

Въ каждомъ клнѣ 1 десятина; общее пространство полей 8 десятинъ.

- 1) Оз. рожь, удобренная 3000 пуд. навоза.
- 2) $\frac{1}{2}$ Гороха.
 $\frac{1}{2}$ Свеколовицы, удобренной 1500 пуд. навоза, 10 четвертями извести и нав. жижею.
- 3) $\frac{1}{2}$ Оз. ржи (послѣ гороха), удобр. 10 четвертями извести.
 $\frac{1}{2}$ Ячменя (послѣ свеколовицы).
- 4) Красный клеверъ.
- 5) Оз. рожь, удобренная 12 пуд. гуано.
- 6) Картофель, удобренный 1500 пуд. навоза.
- 7) Овесь.
- 8) Клеверная смѣсь (изъ бѣлаго клевера, шведскаго клевера и злаковъ!).

Слѣдующій примѣрный расчетъ долженъ показать, какъ велики доходы, на которые можно рассчитывать при введеніи такого сѣвооборота, чтобы въ случаѣ благоприятныхъ результатовъ приступить уже къ подробному расчету величины чистаго дохода отъ хозяйства и составленію полнаго плана организаціи.

Имѣя въ виду качества почвы даннаго хозяйства и проектируемыя количества удобрения, можно предположить слѣдующіе урожаи:

съ 2 $\frac{1}{2}$ десят.	ржи.	42	четверти зерна и 780 пуд. соломы.
" 1 $\frac{1}{2}$ "	ячменя	10	" " 108 " "
" 1 $\frac{1}{2}$ "	овса	19	" " 180 " "
" 1 $\frac{1}{2}$ "	гороха	4	" " 108 " "
" 1 "	картофеля	157	" " "
" 1 "	кр. клевера	480	пуд. сѣна.
" 1 "	клевер. смѣси	420	" " "
" 1 $\frac{1}{2}$ "	свеколовицы	2160	пуд. (216 берковцевъ) и 576 пуд. ботвы.

Приведенные урожаи даютъ слѣдующія количества кормовыхъ средствъ по переводу на сѣно:

54 пуд. въ питательн. сѣна отъ 108 пуд. ячмен. сол. (отн. 2:1)	
90 " " " 180 " овсян. сол. (" 2:1)	
72 " " " 108 " горох. сол. (" 3:2)	
900 " " " 157 чет. картофеля (" 2:1)	
480 " " " 480 пуд. клеv. сѣна (" 1:1)	
420 " " " 420 " сѣна смѣси (" 1:1)	
720 " " " 216 берков. свек. (" 3:1)	
96 " " " 576 пуд. свек. ботвы (" 6:1)	

Итого 2778 пуд. въ питательности сѣна.

Сверхъ того, остается еще 780 пуд. ржаной соломы для подстилки.

Вычисленное количество корма, 2778 пуд. въ питательности сѣна, достаточно для содержанія въ хозяйствѣ 8 штукъ крупнаго скота: 2778 пудовъ, раздѣленные на 365 дней, даютъ 7,6 пуда, или 304 фун. въ день, что доставляетъ при 8 штукахъ крупнаго скота 38 ф. корма въ питательности сѣна на голову, чего совершенно достаточно.

Что касается ожидаемаго производства навоза, то, не прибѣгая пока къ болѣе точному вычисленію, можно принять, что отъ каждой головы (считая 800—1000 ф. живаго вѣса), при стойловомъ содержаніи въ теченіе всего года, получается 10 паровонныхъ возовъ по 75 пудовъ каждый, или 750 пуд. навоза, а отъ 8 головъ слѣдовательно 6000 пуд., т. е. именно столько, сколько выше было принято для разсматриваемаго сѣвооборота; назначенные сверхъ этого 20 четвертей извести и 12 пуд. гуано должны приобрѣтаться повуюкоу.

Подстилки, полагая ежедневно на штуку по 6 ф., а на 8 головъ—48 ф., потребуется въ годъ около 440 пуд.; въ сѣвооборотъ произойдется ржаной соломы 780 пуд., слѣдовательно 340 пуд. ея остается еще для какаго либо другаго употребленія.

Вычисленіе валоваго дохода въ деньгахъ, основанное на среднихъ цѣнахъ за послѣднее пятилѣтіе, приводитъ къ слѣдующему результату:

42 четверти ржи	по 6 р.	252 р.
10 " ячменя	" 4 "	40 "
19 " овса	" 3 "	57 "
4 " гороха	" 5 "	20 "
157 " картофеля	" 1 "	157 "
480 пудовъ кл. сѣна	" " 20 коп.	96 "
420 " сѣна смѣси	" " 20 "	84 "
216 берков. свекл. = 720 пуд. сѣна по	" " 20 "	144 "
576 пуд. ботвы = 96 пуд. сѣна по	" " 20 "	19 "

Сумма = 669 руб.

Сверхъ этого еще имѣется:

780 пуд. ржаной соломы по 5 коп.	39 руб.
108 " ячменной " " 5 " "	5 " 40 коп.

180 " овсяной соломы по 5 коп.	9 руб.
108 " гороховой " " 7 " "	7 " 56 коп.
Сумма = 60 руб. 96 коп.	

А весь валовой доходъ = 869 руб. + 60 руб. 96 коп. = 929 руб. 96 коп. Вычитая отсюда стоимость извести и гуано, положимъ равными 49 р. 96 коп. получимъ 880 руб. валоваго дохода отъ 8 десятины вышеприведеннаго сѣвооборота въ годъ, или отъ 1 десятины (одного вѣсна) въ теченіе 8 лѣтъ.

Производя подобную смѣту, хозяину не бесполезно обратить вниманіе на два соприкасающіеся вопроса: въ какомъ направленіи и на сколько избираемый сѣвооборотъ истощаетъ почву и представляетъ ли собою производимая масса кормовъ нормальный составъ для кормленія скота. Разсмотрѣніе пераго вопроса можетъ повести къ проектированію полезныхъ мѣръ для пополненія навознаго удобрения сторонними удобрительными средствами, а изслѣдованіе втораго къ изысканію подобныхъ же мѣръ для приведенія всей массы корма въ нормальному составу.

При изслѣдованіи поставленныхъ вопросовъ, вычисленіе должно обнаружить, сколько важнѣйшихъ питательныхъ веществъ находится въ снимаемыхъ урожаяхъ, съ одной стороны, и каково количество ихъ удаляется изъ хозяйства—съ другой; сколько находится отдѣльныхъ питательныхъ веществъ въ кормахъ, добываемыхъ въ сѣвооборотѣ, — съ одной стороны, и сколько ихъ должно содержаться въ кормахъ, на основаніи правилъ рациональнаго кормленія, — съ другой стороны.

Въ приведенныхъ выше урожаяхъ, по среднимъ даннымъ изъ анализовъ, приблизительно содержится въ фунтахъ:

У р о ж а и.	Азота.	Фосфорной кислоты.	Кали.	Извести.	Magnesium.
Ржи (зерна)	219,6	102	67,2	6	23,6
Ячменя	42,4	20	13,2	1,2	4,8
Овса	69,2	19,6	15,2	3,6	6,4
Гороха	48,8	12,4	14	1,6	6,4
Картофеля	192	108	336	12	24
Свекловичны	129,6	57,6	309,6	28,8	28,8
Ботва свеклов.	57,6	15,2	82,4	32,4	27,2
Сѣно клевера	500,8	89,6	312	307,2	110,4
Сѣно кл. смѣси	238	62,8	252	196	70
Ржаная солома	62,4	48	200	80	33
Гороховая солома	37,2	13,6	36,4	66,8	13,6
Ячменная солома	17,2	6,8	33,2	12	4
Овсяная солома	24	10,8	58	21,6	10,8
Сумма:	1838,8	566,4	1731,2	769,2	363
Съ 1 десятины	204,8	70,8	216,4	192,3	45,3

Предполагая, что всѣ зерна продаются на сторону, а изъ продуктовъ скотоводства ежегодно идетъ въ продажу 20,000 фунт. молока и 4 теленка въ 100 ф. вѣса каждый, мы получимъ слѣдующее распределение питательныхъ веществъ, извлеченныхъ изъ почвы.

	Вывозится въ зернахъ.	Вывозится въ продук- тахъ ското- водства.	Содержится въ кормовыхъ средствахъ.
	фун.	фун.	фун.
Азота	380	138	1258,8
Фосфорной кислоты	154	43,2	412,4
Кали	109,6	34,8	1621,6
Извести	12,4	36	756,8
Магnezия	41,2	4,2	321,8
Сумма	697,2	256,2	4371,4

Приведенныя таблицы показываютъ, что при взятомъ 8-польномъ сѣвооборотѣ изъ почвы ежегодно извлекается 5068 ф. питательныхъ веществъ (697 + 4371 ф.); изъ нихъ продажей на сторону зерна и животныхъ продуктовъ отчуждается 953 ф. (697 + 256 ф.), а возвращается почвѣ обратно 4115 ф.; изъ второй таблицы видно, что большую часть удаляемыхъ веществъ составляютъ: азотъ, фосфорная кислота и кали.

Переходя къ обсужденію рациональности состава кормовой массы, мы находимъ, по среднимъ изъ анализовъ даннымъ, въ производимомъ кормѣ слѣдующія количества веществъ:

	Органиче- скаго (су- хаго) ве- щества.	Бѣлко- выхъ ве- ществъ.	Безазо- тистыхъ веществъ.	Жира.
	фун.	фун.	фун.	фун.
Въ 108 пуд. ячменной соломы	2868	108	1112	48
" 180 " овсяной "	4800	148	2280	120
" 108 " гороховой "	2916	232	1260	72
" 157 " четвертяхъ картофеля	14400	1200	12600	180
" 480 пуд. сѣна краснаго клевера	12336	2144	4800	512
" 420 " " клевер. смѣси	10920	1400	4900	348
" 216 берковцахъ свекловичи	7920	792	6552	72
" 576 пуд. свеклов. ботвы	1284	880	880	96
Сумма	57444	6404	34384	1448

На одну крупную *штуку* рогатаго скота, при молочномъ скотоводствѣ и живомъ вѣсѣ животныхъ въ 800 ф., требуется:

	ежедневно:	въ годъ:
Сухаго вещества	25 ф.	9125 фун.
Бѣлковыхъ вещ.	2,4 "	876 "
Безазотистыхъ вещ.	12,6 "	4672 "
Жира	0,7 "	255 "

Помноживъ числа втораго столбца на 8, мы получимъ нормальныя потребныя количества питательныхъ веществъ для проектируемаго скотоводства, а сопоставивъ эти числа съ выше полученными, можно видѣть, въ какомъ направленіи требуется исправленіе кормовой массы; а именно:

Требуется въ годъ нормальное коли- чество на 8 головъ крупнаго скота.	Производимыя въ сѣвооборотѣ ко- личества.	Въ производи- мыхъ количе- ствахъ нахо- дится избытокъ или недоста- токъ.

Сухаго вещества	73,000 фун.	57,444 фун.	—15,556 фун.
Бѣлковыхъ вещ.	7,008 "	6,404 "	—604 "
Безазотистыхъ вещ.	37,376 "	34,384 "	—2,992 "
Жира	2,040 "	1,448 "	—592 "

Изъ послѣдняго сопоставленія можно убѣдиться, что производимаго въ сѣвооборотѣ корма не достаточно вообще для содержанія 8 штукъ крупнаго рогатаго скота; происшедшая разность объясняется тѣмъ, что при предварительномъ проектированіи разнѣровъ скотоводства выше принятъ былъ способъ приведенія всѣхъ кормовъ въ общему знаменателю — *штуку*, между тѣмъ какъ въ послѣднемъ вычисленіи этимъ знаменателемъ приняты *питательныя вещества*, содержащіеся въ кормахъ, что гораздо правильнѣе по точности достигаемыхъ результатовъ, нежели выраженіе кормовъ въ питательности сѣна. Что же касается до соотношенія въ общей суммѣ корма между азотистыми и безазотистыми веществами, то оно оказывается при проектированномъ сѣвооборотѣ совершенно рациональнымъ, именно 1: 5,3, т. е. тоже отношеніе, которое показано въ выше приведенныхъ нормальныхъ количествахъ. Слѣдовательно, въ данномъ случаѣ, достаточно ограничиться уменьшеніемъ числа скота на 1 или 2 штуки.

Если подобныя предварительныя смѣты приведутъ къ окончательному избранію системы хозяйства, тогда можно приступить уже къ подробному опредѣленію величины чистаго дохода, ожидаемаго отъ хозяйства вообще и отдѣльныхъ отраслей его въ особенности, для чего уже недостаточно опредѣленія только валовыхъ доходовъ, но необходимо изслѣдовать также всѣ величины, относящіяся къ издержкамъ производства.

ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЯ И ПОТРЕБНОСТЬ ВЪ НЕМЪ.

Различные способы опредѣленія количества производимаго навознаго удобренія.

Изъ корма, который мы даемъ нашимъ домашнимъ животнымъ, значительная часть исчезаетъ при прохождѣ чрезъ животное тѣло; твердые и жидкие испражнения, взятые вѣсъ, содержатъ въ высушенномъ состояніи только $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ вѣса сухаго вещества употребленнаго корма. Недостающее количество потребляется на производство мяса, молока, вообще животныхъ продуктовъ, на дыханіе, испареніе и пр., о чемъ болѣе подробно изложено въ статьѣ о кормленіи. Относительно количества испражнений, получаемыхъ отъ различныхъ видовъ скота, старые и новѣйшія изслѣдованія доставили слѣдующіе факты.

Изъ 100 ф. сухаго вещества корма получаютъ слѣдующія количества сухаго вещества въ суммѣ твердыхъ и жидкихъ испражнений:

49 ф.	при кормленіи воловъ, получающихъ только кормъ для поддержанія жизни,
47 "	при откармливаніи воловъ,
47 "	отъ коровъ, получающихъ картофель и сѣно,
45 "	отъ коровъ при хорошемъ зимнемъ (сухомъ) кормленіи,
46—49 "	отъ лошадей, получающихъ овесъ и сѣно,
60 "	отъ овецъ, получающихъ сѣно,
51 "	отъ овецъ, получающихъ сѣно и жмыхи,
46—49 "	отъ овецъ при кормленіи сѣномъ и овсомъ,
36 "	отъ свиней, получающихъ картофель.

Само собою разумѣется, что приведенныя числа представляютъ собою только приблизительныя среднія, которыя могутъ значительно измѣниться, смотря потому, изобильно кормленіе или скудно, преобладаютъ ли въ кормѣ легко или трудно перевариваемыя кормовыя средства, много или мало въ послѣднихъ древесныхъ, кормятся ли

молодые или старые животныя и пр. Относительно элементарнаго состава корма здѣсь можно замѣтить, что при кормленіи вполнѣ взрослыхъ животныхъ, получающихъ только кормъ для поддержанія жизни, весь азотъ и всѣ минеральныя вещества его появляются вновь въ твердыхъ и жидкихъ испражненіяхъ, почему въ удобреніи, происходящемъ отъ такого скота, находятся всѣ минеральныя вещества и весь азотъ, содержащіеся въ кормѣ. При кормленіи же молодыхъ растущихъ животныхъ, молочнаго и откармливаемого скота, нѣкоторая часть азота и минеральныхъ веществъ корма переходитъ въ молоко и тѣло животного и такимъ образомъ теряется для удобренія.

Для опредѣленія количества навоза, производимаго въ хозяйствѣ, въ сельскохозяйственной практикѣ употребляются весьма различные способы, которыхъ долженъ придерживаться каждый хозяинъ, совершенствуя ихъ сообразно своимъ условіямъ, пока опытомъ не выработается способъ, дающій наиболѣе точные результаты.

1) Самый употребительный способъ состоитъ въ томъ, что *весь кормъ и всю подстилочную солому* въ хозяйствѣ, затрачиваемые на скотоводство, переводятъ на *сухой овесъ* и сумму послѣдняго *помножаютъ на два* (для русскихъ отношеній вѣроятно точнѣе брать множителемъ 1,5—1,7, такъ какъ скотъ держится дѣломъ не въ стойлахъ а слѣдовательно собирается навоза менѣе); полученное число по-казываетъ количество навоза, которое можетъ быть произведено въ хозяйствѣ при данномъ количествѣ корма, притомъ—навоза въ полу-перегнившемъ состояніи, въ какомъ онъ преимущественно употребляется въ дѣло. При переводѣ кормовъ въ сухому вѣсу полагаютъ:

100 ф.	всѣхъ видовъ сѣна, соломы, отрубей, масляныхъ жмыхъ, мякны и проч.	= 100 ф.
100 "	зеленаго корма злаковъ и мотыльковыхъ	= 20—25 "
100 "	зеленаго корма шпегеля, кукурузы и мюгара	= 25—30 "
100 "	картофельныхъ клубней	= 25—30 "
100 "	брюквы и сахарной свекловицы	= 16—18 "
100 "	кормовой свеклы и моркови	= 12—15 "
100 "	турнепсовъ, рѣпныхъ капустъ	= 9—12 "
100 "	ботвы корнеплодныхъ	= 8—9 "

При опредѣленіи количества навоза отъ разныхъ *видовъ скота въ отѣльности* полагаютъ, что изъ 100 ф. сухаго корма и подстилки (но приведеннымъ нормальнымъ числамъ для перевода) получаютъ слѣдующія количества навоза:

отъ овецъ (самый сухой навозъ) . . .	130 ф.
„ лошадей (потери при работѣ) . . .	140 "
„ рабоч. воловъ (пот. при работѣ) . .	160 "
„ молочныхъ коровъ	230 "
„ свиней (самый водянист. навозъ) . .	250 "

Слѣдовательно, при вычисленіи навоза множителемъ сухаго вѣса корма могутъ быть приняты: для овецъ, 1,3, лошадей 1,4, рабочихъ воловъ 1,6, молочныхъ коровъ 2,3, свиней 2,5.

Принимъ за основаніе установленный научными изслѣдованіями фактъ, что при кормленіи рогатаго скота, лошадей и овецъ изъ действительнаго сухаго вещества корма переходить въ испражненія 50% по вѣсу, полагая даѣе, что высушенный на воздухѣ кормъ содержитъ 14% воды, а подстилочная солома составляетъ $\frac{1}{4}$ ч. по вѣсу высушеннаго на воздухѣ корма, можно принять нижеслѣдующія среднія количества навоза (съ показаннымъ содержаніемъ воды), получаемыя изъ одного и того же корма отъ скота разныхъ видовъ:

80 ф. высушеннаго на воздухѣ корма и 20 ф. такой же соломы даютъ — при скармливаніи:

овцамъ	150 ф. навоза съ 67% содержанія воды.
лошадямъ	200 " " 75 " " "
рогатому скоту 250 " " " 80 " " "	

Изъ этихъ количествъ должны быть вычтены потери навоза отъ рабочаго скота при работахъ, а отъ другихъ видовъ скота — при пастбищѣ на выгонѣ.

2) Данные относительно полученія количествъ навоза отъ *отдѣльных кормовыхъ средствъ* хотя и весьма многочисленны, но чрезвычайно разнятся между собою при повзаніяхъ разныхъ авторовъ, что происходитъ вѣроятно отъ разницы въ способахъ содержанія скота и обращенія съ навозомъ, при которыхъ дѣлаются подобныя наблюденія. А потому на нижеслѣдующія данныя Фейта слѣдуетъ смотрѣть только, какъ на приблизительныя:

Получается навоза:	отъ овецъ.	отъ лошадей	отъ рогат. скота.
Изъ 100 ф. свекловицы	25 ф.	40 ф.	50 ф.
" 100 " зеленой травы	35 " "	40 " "	60 " "
" 100 " картофеля	40 " "	50 " "	70 " "
" 100 " кормовой соломы	120 " "	140 " "	190 " "
" 100 " сѣна	125 " "	150 " "	200 " "
" 100 " зеренъ	100 " "	150 " "	200 " "
" 100 " подстилочной соломы	136 " "	170 " "	200 " "

3) Въ прежнее время многіе хозяева употребляли также для вычисленія навоза нормы «въ питательности сѣна». А именно, переводили вѣс кормы по питательности на сѣно, складывали съ полученною цифрою вѣсъ подстилочной соломы и найденную сумму помножали на два. При производствѣ такого вычисленія по числу скота, полагали обыкновенно на 100 ф. живаго вѣса 3 ф. корма въ питательности сѣна, а на каждые 5—6 ф. таваго корма 1 ф. соломенной подстилки. Въ настоящее время этотъ способъ считается совершенно несостоятельнымъ, такъ какъ между физиологическою питатель-

ностью корма и количествомъ происходящаго изъ послѣдняго навоза не существуетъ никакой причинной зависимости.

4) Самые неточные результаты доставляетъ, наконецъ, способъ вычисленія производимаго въ хозяйствѣ навоза по числу содержимаго скота и по *пространству земли*, находящейся подъ кормовыми растениями. При этомъ способѣ, обыкновенно, принимаютъ, что на каждые 100 ф. живаго вѣса въ скотѣ получается въ годъ отъ 60 до 75 пудовъ навоза; или же, что при хорошей породѣ скота, обильномъ кормленіи и тщательномъ обращеніи съ навозомъ, его получается въ годъ: отъ 1 головы крупнаго рогатаго скота, при стойловомъ содержаніи въ теченіе круглаго года, 750 пудовъ, при лѣтнемъ содержаніи на выгонѣ — 600 пудовъ, отъ 1 головы рабочаго скота — 540 пудовъ, 1 головы молодаго крупнаго скота — 300 пудовъ, 1 свиньи — 60 пуд. и 1 овцы — 50 пуд.

Болѣе подробныя свѣдѣнія относительно твердыхъ и жидкихъ испражненій животныхъ сообщены ниже въ статьѣ о хлѣбномъ навозѣ.

Производство и потребление навоза при разныхъ способахъ хозяйства.

Вопросъ о количествѣ производимаго и потребляемаго въ хозяйствѣ навоза находится въ тѣсной связи съ вопросомъ о питательныхъ веществахъ растений, которые должны быть при культурѣ извлекаемы и возвращаемы обратно въ почву, чтобы получать отъ нея вознаграждающіе урожаи.

Но такъ какъ навозъ, добываемый отъ скотоводства, особенно въ странахъ умѣренной зоны, представляетъ собою главнѣйшее средство для превращенія дикой земли въ плодородную полевую почву, такъ какъ во всѣхъ странахъ Европы земледѣліе и скотоводство представляютъ собою двѣ, неразрывно связанныя, другъ друга обуславливающія, части сельскохозяйственнаго производства, а скотоводство, при рациональномъ веденіи, не только необходимо, но и положительно доходно, то не трудно объяснить, почему европейскій хозяинъ разсматриваетъ испражненія домашнихъ животныхъ, происходящія отъ скармливанія части получаемыхъ урожаевъ и смѣшанныя съ подстилочными средствами, а иногда и съ человѣческими испражненіями, какъ главный фондъ, изъ котораго онъ почерпаетъ средства для развитія своихъ культуръ и который стремится не только поддерживать *in statu quo*, но всевозможнымъ образомъ увеличить, преимущественно помощью культуры кормовыхъ растений.

Поэтому, въ практикѣ сельскохозяйственнаго производства, рядомъ съ вопросомъ о количествѣ вывозимыхъ и ввозимыхъ въ хо-

ция количества хлѣбовъ равнозначительны относительно истощенія или почвы:

4,91	четверти	пшеницы
6	"	ржи
7,50	"	ячменя
10,50	"	овса.

Принятіе такого отношенія значить, что если отъ даннаго количества питательныхъ веществъ въ почвѣ получается урожай пшеницы въ 4,91 четверти, то хозяинъ можетъ рассчитывать получить на той же почвѣ: урожай ржи въ 6 ч., ячменя 7,5 ч. и овса 10,5 ч., если только нѣтъ другихъ препятствій (климатъ и пр.) для произрастанія этихъ хлѣбовъ.

Представленные способы вычисленія основываются отчасти на совершенно ложныхъ, отчасти на такихъ произвольныхъ предположеніяхъ (которыми прежде удовлетворялись за отсутствіемъ другихъ основаній), что для настоящаго времени они могутъ быть признаны не имѣющими практическаго значенія, такъ какъ не даютъ никакой гарантіи въ томъ, что вычисленные результаты оправдаются въ действительности.

Вообще можно замѣтить, что при очень большомъ числѣ рѣшеній, которыя могутъ имѣть мѣсто въ приложеніи въ частныхъ случаяхъ по вопросу объ истощеніи и удобреніи, наблюденія практики до сихъ поръ еще слишкомъ мало *специализированы*, или по крайней мѣрѣ наблюдаемыя частности слишкомъ мало *известны*, чтобы возможны были крупныя *обобщенія*. Поэтому во всѣхъ случаяхъ, гдѣ дѣло идетъ не объ *общихъ взглядахъ*, но о такихъ реальныхъ предметахъ, какъ *выгода* или *потеря*, не остается ничего плава, какъ специальное вычисленіе, основанное на предлагающихъ мѣстныхъ условіяхъ и числахъ, взятыхъ изъ фактовъ действительности.

По примѣру, данному прежними авторитетами, Пабста въ выработанной имъ статикѣ имѣетъ въ виду просто потребное число пудовъ хлѣвнаго навоза въ разныхъ случаяхъ культуры и даетъ числовое выраженіе для болѣе или менѣе благоприятнаго произрастанія хлѣбовъ послѣ хорошо уродившагося клевера, разныхъ другихъ кормовыхъ растений, пара и пр.; методъ — который позволяетъ легко вычислять производство и потребность въ навозѣ при различныхъ сѣвооборотахъ. Эта статика, вытекшая изъ эмпирическихъ наблюденій весьма большаго числа фактовъ практики, тоже исходитъ изъ *опредѣленныхъ предположеній* и какъ *общая точка опоры*, для употребленія при вычисленіяхъ *общаго характера*, заслуживаетъ вниманія хозяевъ до сего времени, за неимѣніемъ иного способа. При пользованіи статикою Пабста необходимо знать величину *урожаевъ*, получаемыхъ съ единицы пространства, такъ

какъ сию опредѣляется производство навозагого удобренія. Сущность описываемаго метода состоитъ въ слѣдующемъ.

Подъ словомъ «навозъ» условливается подразумѣвать полуперепрѣвшій сѣнный навозъ, содержащій 25% сухаго вещества и 75% воды; всѣ болѣе обыкновенныя культурныя растенія дѣлятся на три группы: такъ называемыя *пестоющія*, *сохраняющія* и *обогащающія* почву; устанавливаются опредѣленные нормы: частію — показывающія, сколько пудовъ на единицу пространства требуется навоза для производства урожая средней величины растений каждой группы, частію же — показывающія, какому числу пудовъ навоза равняются, по своему *благоприятному дѣйствию на почву*, культуры на единицу пространства растений, отнесенныхъ къ группѣ *обогащающихъ* почву. Въ послѣднемъ случаѣ, слѣдовательно, дѣло идетъ о сравненіи дѣствія остатковъ урожая подобныхъ растений на улучшение состава почвы съ подобнымъ же дѣствіемъ хлѣвнаго навоза. Наконецъ, для вычисленія производства удобренія, весь кормъ (исключая соломы) переводится по питательности на сѣно, къ нему прибавляется *вся солома* и сумма, помноженная на два, представляетъ количество производимаго навоза. Въ слѣдующей таблицѣ приведены нормы удобренія по статикѣ Пабста съ показаніемъ количества навоза, доставляемаго съ 1 дес. воздѣлываніемъ разныхъ растений, причемъ доставляемый послѣднимъ кормовый матеріалъ выраженъ въ питательности сѣна (см. стр. 262, 263, 264).

При помощи представленной таблицы весьма легко производить въ разныхъ случаяхъ сравненія производства и потребленія навоза, какъ это можно видѣть изъ слѣдующихъ примѣровъ.

Примѣръ 1. Сѣвооборотъ: 1) пшеница, 2) картофель, 3) овесъ, 4) викова сѣнь, 5) озимая рожь, 6) клеверъ на укосъ.

Вычисленіе потребности въ навозѣ и производство его на 1 десятинѣ средней почвѣ при взятомъ сѣвооборотѣ:

	Такъ называемого нормальнаго навоза.	
	требуетъ	даетъ
	пудовъ.	пудовъ.
Одна десятина пшеницы	900	480
" " картофеля	720	1200
" " овса	720	420
" " сѣменъ выки съ овсомъ	600	480
" " озимой ржи	720	540
" " клевера (включая 600 пуд. обогащенія)	—	1200
Сумма	3660	4320

Если такъ называемое обогащеніе исключить изъ расчета, то при взятомъ сѣвооборотѣ, предполагая, что за исключеніемъ зерна весь кормъ потребляется въ хозяйствѣ на скотъ, производится на 60 пудовъ навоза болѣе, нежели потребляется культурами.

**Приблизительное производство материала для навоза и потребность
въ последнемъ различныхъ растений: отъ и на 1 десятинѣ.**

При воздѣлываніи нижеслѣдующихъ растений:	Н А 1 Д Е С Я Т И Н Ъ											
	Производится материалъ для навоза.				Производится нормальный навозъ.				Требуется удобренья навозомъ.			
	Въ кормовыхъ сѣнахъ, верховыхъ сѣнахъ, сѣнахъ.	Въ подстилокъ.	Въ подстилокъ.	Въ подстилокъ.	Изъ материала для навоза.	Черезъ такъ называемое обогащеніе почвы.	Въ суммѣ.					
I. Источающія растения.												
1) <i>Сильно источающія:</i>												
Цвѣтій	—	180—360	360—720	360—720	360—720	—	360—720					
Рыжикъ	—	108—156	216—312	216—312	216—312	—	216—312					
Копонія	—	60—108	120—216	120—216	120—216	—	120—216					
Лентъ	—	60—108	120—216	120—216	120—216	—	120—216					
Кукуруза на зерно	396—792	240—432	480—864	480—864	480—864	—	480—864					
Кукуруза на зеленый кормъ	—	—	792—1584	792—1584	792—1584	—	792—1584					
Мазъ	480—720	120—180	240—360	240—360	240—360	—	240—360					
Капуста	—	—	960—1440	960—1440	960—1440	—	960—1440					
Марена	—	192—240	384—480	384—480	384—480	—	384—480					
Бобы	72—156	—	144—312	144—312	144—312	—	144—312					
Морковь	360—660	—	720—1320	720—1320	720—1320	—	720—1320					
Туринскъ	336—684	—	672—1368	672—1368	672—1368	—	672—1368					
2) <i>Умеренно источающія:</i>												
Растъ озимый	—	144—288	288—576	288—576	288—576	—	288—576					
Растъ яровой	—	96—192	192—384	192—384	192—384	—	192—384					
Оурница озимая	—	108—216	216—432	216—432	216—432	—	216—432					
Оурница яровая	—	72—144	144—288	144—288	144—288	—	144—288					
Табакъ	—	96—144	192—288	192—288	192—288	—	192—288					

Брюква	360—720	—	720—1440	720—1440	720—1440	—	720—1440					
Свекловича	564—1500	—	1128—3000	1128—3000	1128—3000	—	1128—3000					
Картофель	300—900	84—108	768—2016	768—2016	768—2016	—	768—2016					
Пшеница озимая	—	120—336	240—672	240—672	240—672	—	240—672					
Пшеница яровая	—	96—276	192—552	192—552	192—552	—	192—552					
Ячмень озимый	—	144—216	288—432	288—432	288—432	—	288—432					
Ячмень яровой	—	60—216	120—432	120—432	120—432	—	120—432					
Рожь озимая	—	60—360	120—720	120—720	120—720	—	120—720					
Рожь яровая	—	48—288	96—576	96—576	96—576	—	96—576					
Овесъ	—	66—264	132—528	132—528	132—528	—	132—528					
II. Сохраняющія растения.												
1) <i>Въ малой степени:</i>												
Горохъ на зерно	60—156	—	120—312	120—312	120—312	—	120—312					
Вика на зерно	48—132	—	96—264	96—264	96—264	—	96—264					
Гречиха на зерно	—	72—144	144—288	144—288	144—288	—	144—288					
Шнаргель на зерно	84—120	—	168—240	168—240	168—240	—	168—240					
2) <i>Въ болѣе сильной степени:</i>												
Кормовая рожь	156—240	—	312—480	312—480	312—480	—	312—480					
Смѣшанный зеленый кормъ иль цѣту	144—288	—	288—576	288—576	288—576	—	288—576					
Шнаргель на сѣно	120—180	—	240—360	240—360	240—360	—	240—360					
Сѣмянной клеверъ	72—120	—	144—240	144—240	144—240	—	144—240					
III. Обогащающія растения.												
1) <i>Въ малой степени:</i>												
Посѣвъ для лѣтнаго выгона: люцер- га, сѣмянная трава, овесъ и рожь	—	—	—	—	—	—	—					
Многолѣтний выгонъ для овецъ на плохихъ земляхъ	—	—	—	—	—	—	—	288—420	—	—	—	—

И А 1 Д Е С Я Т И И в									
При воздѣлываніи извѣстныхъ вида растений:	Производится матеріалъ для навоза.			Производится нормальный навозъ.			Требуется удобрения навозомъ.		
	Въ удобрень- и средствъ, выде- ляемыхъ въ извѣ- стномъ смѣс.	Въ подсти- лочномъ средствѣ.	Изъ матері- ала для на- воза.	Черезъ такъ называемое обогащеніе почвы.	Въ суммѣ.				
2) Въ средней степени:									
Красный клеверъ	180—300	—	360—600	480—660	840—1260 720—1068	—			
Бѣлый клеверъ	120—204	—	240—408			—			
Эспарцетъ на слабыхъ почвахъ, или при короткомъ періодѣ воз- дѣлыванія	144—336	—	288—672	480—600	768—1332	—			
Многолѣтній обыкновенный вы- гонъ	—	—	—			—			
3) Въ большой степени:									
Многолѣтніе (болѣе 3-хъ), или на отличной почвѣ:	336—480	—	672—960	720—1080	1392—2040 1008—1752 720—1080	—			
Люцерна	144—336	—	288—672			—			
Эспарцетъ	—	—	—	300—504	—	—			
Отличный многолѣтній выгонъ	—	—	—			—			
Одинъ годъ чернаго пара	—	—	—	—	—	—			

Примѣръ 2. Сѣвообороты: 1) Рожь, 2) горохъ и свѣкла, 3) рожь и ячмень, 4) клеверъ, 5) рожь, 6) картофель, 7) овесъ, 8) клеверная смѣсь.

		Такъ называемого нор- мального навоза.	
		требуетъ	даетъ
		пудовъ.	пудовъ.
2 1/2	десят. озимой ржи	1800	1320
1/2	" гороха	300	120
1/2	" свекловичны	420	1020
1/4	" ячменя	420	96
1	" клевера (съ 600 пуд. обогаш.).	—	1200
1	" картофеля	720	1200
1	" овса	720	420
1	" клеверной смѣси, (включая 480 п. обог.).	—	840
Сумма		4380	6216

Если и въ этомъ примѣрѣ оставить безъ вниманія обогащеніе—1080 пуд. навоза, то оказывается, что сѣвооборотъ производить навоза на 756 пудовъ болѣе, нежели сколько нуждается въ немъ.

Изложенный методъ можетъ служить до нѣкоторой степени точкою опоры для начинающихъ хозяевъ, но лишь съ тѣмъ ограниченіемъ, что каждый пользующійся имъ хозяинъ, вмѣсто приведенныхъ въ таблицѣ количествъ производимаго матеріала для удобренія и навоза, долженъ поставить тѣ числа, которые въ этомъ отношеніи получаются фактически въ хозяйствѣ; но примѣненіе метода дастъ еще болѣе точные результаты, если хозяину изъ мѣстнаго опыта извѣстна приблизительная величина дѣйствія на урожай, которая можетъ быть приписана данному количеству навоза, такъ какъ тогда представляется возможность сдѣлать соответственные измѣненія также въ послѣднемъ вертикальномъ столбцѣ таблицы, гдѣ показаны количества навоза, потребныя при культурѣ различныхъ растений.

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ.

Почва, воздухъ, влажность, теплота, свѣтъ и электричество составляютъ необходимыя условия произрастанія растений; и каждое растение требуетъ соответствующаго ему качественного или количественнаго выполненія ихъ. А потому, при воздѣлываніи растений, намъ приходится или поддерживать, или измѣнить качество и количество этихъ условий; поддерживать, если они отвѣчаютъ требованіямъ успешнаго произрастанія растений, удовлетворяющаго насъ по своимъ качествамъ; измѣнять, если они неудовлетворяютъ этому послѣднему или же неудовлетворяютъ насъ обуславливаемымъ ими качествомъ растений, которое мы желаемъ по этому измѣнить. Но въ большой полевой культурѣ изъ всѣхъ условий произрастанія непосредственно и преимущественно мы можемъ вліять пока почти лишь на одну почву, къ которой въ нѣкоторыхъ рѣдкихъ случаяхъ присоединяется еще влажность.

Приспособленіе почвы къ потребностямъ воздѣлыванія растений и требованіямъ растений составляетъ *обработку почвы* въ обширномъ значеніи этого слова и заключается въ различныхъ приемахъ

1) для очищенія поверхности почвы отъ предметовъ, препятствующихъ занятію ея культурными растениями; эти приемы, будучи разъ примѣнены, не повторяются уже болѣе на томъ же самомъ участкѣ, пока на этомъ послѣднемъ воздѣлываются полевые растения, и называются *раздѣлкой новыхъ мѣстъ*.

2) Для приведенія почвы въ отношеніи механическаго ея строенія и физическихъ и химическихъ ея свойствъ въ состояніе наиболѣе соответствующее требованіямъ разводимыхъ растений; тѣ изъ этихъ приемовъ, которые не повторяются вовсе или повторяются черезъ весьма продолжительные промежутки времени, какъ напр. осушка, обнесение угодій живыми изгородями, навозка земли, наплавленіе и т. д. называются *коренными улучшеніями почвы*. Тѣ же изъ нихъ, которые повторяются черезъ болѣе короткіе промежутки времени, равно какъ и приемы.

3) для внесенія въ почву сѣмянъ и различныхъ частей растений, служащихъ для ихъ размноженія: клубней, черенковъ и т. д. или выборки изъ почвы клубней, корней, луковицъ и т. д. составляютъ такъ называемую *периодическую обработку почвы*.

Обработка почвы, какова бы она не была, нуждается въ *орудіяхъ обработки*.

Орудія обработки и ихъ употребленіе.

Въ большой, полевой культурѣ, особенно въ Россіи, обработка почвы *ручными орудіями* ограничивается раздѣлкой новыхъ мѣстъ, при которой употребляются иногда *кирка* и *мотыка*, мотыженіемъ (сапованіемъ) почвы между произрастающими уже на полѣ растениями и посадкой зеренъ нѣкоторыхъ растений, клубней и т. д., для чего употребляется *мотыка* (сапъ, тяпка), и для выборки клубней, корней, для чего употребляются *заступы* и *силы*. Въ этихъ случаяхъ, равно какъ и въ тѣхъ немногихъ, когда эти орудія необходимы для перекопки, разрыхленія почвы, желательно, конечно, употребленіе ихъ надлежащихъ вида и качества, хотя бы они въ такомъ случаѣ и стоили нѣсколько дороже; такъ какъ эта нѣсколько большая стоимость ихъ вполне окупается болѣею производительностію хорошаго работника, вооруженнаго такимъ лучшимъ орудіемъ.

Лучшія ручныя орудія американскія и англійскія изъ стали. Рис. 1 и 2 изображаютъ англійскія заступы, а рис. 3 и 4 англійскія же виды. Вила входятъ въ землю, особенно если эта послѣдняя нѣсколько плотна или камениста, легче заступа. Особенно разнообразны употребляющіяся мотыки, такъ какъ и цѣли, для которыхъ онѣ употребляются, довольно разнообразны; такъ, рис. 5 изображаетъ англійскую мотыгу съ молоткомъ для разбианія глыбъ; рис. 6 — большую мотыгу съ довольно широкимъ, острымъ налопатникомъ




Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 6.

(насадкой) и довольно толстым обухом; рис. 7 — двойную мотыгу с широким с одной и заостренным наконечником с другой стороны, которая употребляется на нескольких глинистых почвах; рис. 8 — кирку или тоже родъ двойной мотыги с очень заостренным наконечником с одной и топоромъ для вырубания кустарника с другой стороны. Приведенныя мотыги и кирки употребляются преимущественно для раздѣлки новыхъ мѣстъ; для перекопки же болѣе легких и средней плотности почвъ употребляются мотыги, представленныя на рис. 9 с широкимъ и на рис. 10 с закругленным наконечникомъ. Следующіе рисунки представляютъ мотыги для разрыхленія почвы и очистки ея отъ сорныхъ травъ между растениями свеклы (рис. 11, турнепсовъ (рис. 12 и 13 — двойная), мака (рис. 14) и льна (рис. 15). Мотыга, изображенная на рис. 16, служитъ для выкапыванія картофеля изъ почвы.




Рис. 7.




Рис. 8.




Рис. 9.




Рис. 10.



Рис. 11.




Рис. 12.




Рис. 13.




Рис. 14.



Рис. 15.



Рис. 16.

Обыкновенная длина наконечника въ заступѣ отъ 1,25 до 1,75 фут. и ширина верхняго края 8—9, а нижняго 7—8 дюйм. Древко заступа дѣлается съ кольцеобразной наверху рукояткой, въ 2,75—3 фут. длины, такъ чтобы верхній край рукоятки у заступа, поставленнаго на землю приходился какъ разъ подъ мышку работника.

Гораздо значительно употребленіе ручныхъ орудій употребленіе при обработкѣ почвы *конныхъ орудій*, между которыми мы должны различить *одно- и многокорпусныя*. Къ первымъ принадлежатъ *плуги, сохи, рала и косули*.

Плугъ, какъ извѣстно, назначается для отрѣзки пласта земли въ горизонтальномъ и вертикальномъ направленіяхъ, для подъема и накопекъ, оборота его, такъ чтобы большая часть земли, лежавшей до этого наверху, лежала теперь внизу; при этомъ пласть надламывается и болѣе или менѣе крошится въ зависимости отъ свойствъ обрабатываемой почвы, времени года, въ которое обрабатывается, и устройства плуга, соображеннаго съ потребностью въ большемъ или меньшемъ крошеніи пласта.

Плуги могутъ быть *передковыя* (тяжелыя), *полунавѣсныя* и *навѣсныя* (*безпередковыя*). Передковыя плуги болѣе устойчивы и потому легче для управленія, хотя требуютъ болѣе упряжной силы для ихъ влеченія, тяжелѣе для вынутія изъ земли и вставленія въ землю и требуютъ больше времени для измѣненія установка ихъ на ту или другую глубину. Изъ передковыхъ же плуговъ особенно хороши тѣ, у которыхъ каждое колесо передка имѣетъ свою отдѣльную ось и потому можетъ быть опускаемо и поднимается независимо отъ другаго. У плуговъ съ такимъ передкомъ соединеніе гридилья плуга съ передкомъ обыкновенно *неподвижно*, т. е. такого рода, что его нельзя повалить на сторону, при выемкѣ изъ борозды и заносѣ плуга, не опрокинувъ въ тоже время передка. Почему, въ послѣднее время, для облегченія движенія плуга при заносѣ и въ предупрежденіе порчи при этомъ передка, у такихъ плуговъ съ полевой стороны (обращенной къ непаханному полю) прикрѣпляютъ колеско или полозочекъ или же дѣлаютъ полевое колесо передка въ видѣ полушарія. У передковыхъ плуговъ, у которыхъ оба колеса передка находятся на одной оси, полевое колесо нѣсколько меньше борозднаго (обращеннаго въ сторону вспаханнаго поля) и гридиль соединяется съ передкомъ обыкновенно *подвижно*, помощію надвѣвающейся на гридиль кольца. Къ этимъ плугамъ принадлежатъ и нашъ обыкновенный малороссійскій плугъ (сабанъ, косули) обыкновенно съ прямою переднею стойкою, болѣе или менѣе плоскимъ лемехомъ и деревяннымъ, нѣсколько приподнимающимся къ заду прямымъ отваломъ. Плуги этого рода имѣютъ довольно вѣтрый ходъ, но пахутъ довольно мелко, не столько отворачиваютъ, сколько сдвигаютъ назадъ пласть, который упирается при этомъ въ прямую отвальную доску и да-

вится ею. При этомъ пласть, смотря по большей или меньшей связности почвы, образуетъ цѣльныя полосы или глыбы или же болѣе или менѣе крошится; а пласты, если только орудіе хорошо построено и хорошо управляется, образуютъ довольно параллельныя ряды, прислоняясь одинъ къ другому подъ умѣреннымъ наклономъ.

Таковыми плугами нельзя хорошо отворачивать пласта и пахать глубоко. Для этого необходимы плуги, у которыхъ лемехъ, нѣсколько приподнимающійся назадъ, переходитъ въ изгибающійся винтообразно отвалъ, подъ образованіемъ съ этимъ послѣднимъ одной непрерывной поверхности, по которой поднимается и которой оборачивается пласть, разрыхляющійся при этомъ болѣе или менѣе въ зависимости отъ того, въ какой степени крутъ или отлогъ подъемъ по отвалу. Чѣмъ круче этотъ послѣдній, тѣмъ болѣе крошится пласть.

Такой же видъ имѣютъ плуги полувисающіе — съ *полоскомъ* (банмакомъ) или *однимъ колескомъ* и вислѣе, безпередковые плуги съ однимъ лишь регуляторомъ у передняго конца грабля вмѣсто передка. Первые устойчивѣе и легче послѣднихъ для управления; но зато послѣдніе, при равенствѣ остальныхъ условий, требуютъ наименѣе упряжной силы.

Хозяинъ, при выборѣ плуга для своего хозяйства, долженъ руководиться какъ общими требованіями, которымъ долженъ удовлетворять каждый плугъ, такъ и частными требованіями, которымъ долженъ удовлетворять плугъ, приобретаемый для извѣстныхъ хозяйственныхъ условий.

Въ удовлетвореніе общихъ требованій: 1) плугъ долженъ вырывать прямоугольный пласть одинаковой толщины и ширины, чисто вынимать и хорошо и равномерно отворачивать его, 2) онъ долженъ: при правильномъ веденіи его рабочимъ, удерживаться, безъ особеннаго напряженія со стороны этого послѣдняго, въ одной линіи и на одной глубинѣ; легко устанавливаться въ отношеніи глубины вспашки и ширины пласта; легко вставляться въ землю и легко выниматься изъ нея. 3) Поэтому же управленіе плугомъ и установка его должны быть легко выполнимы безъ особо сложныхъ механизмовъ и не столько надежны, чтобы установленный плугъ не выскакивалъ изъ земли или не зарывался въ нее, вообще же работалъ такъ, какъ этого желаетъ пахарь. 4) На ходу плугъ не долженъ испытывать никакого ненужнаго тренія, нажиманія, никакой ненужной задержки въ какой либо изъ своихъ частей или со стороны которой либо изъ нихъ; такъ какъ всѣ такого рода препятствія увеличиваютъ лишь трату влечущей орудіе силы и уменьшаютъ вѣрность хода орудія. Наконецъ, 5) плугъ, при наибольшей производимой имъ работѣ, не долженъ требовать для своего влеченія слишкомъ большаго числа

паръ животныхъ, потому что при этомъ тратится много влечущей силы напрасно, вслѣдствіе невозможности запрячь животныхъ болѣе удобно какъ парами, одна за другой, требуются кромѣ пахари одинъ или болѣе погонщиковъ, замедляется ходъ орудія и тратится много времени при заворотахъ съ орудіемъ. Въ этомъ отношеніи наиболѣе удобно орудіе, запряженное не болѣе какъ парой животныхъ, которыми можетъ править самъ пахарь, но возможно еще выгодное употребленіе орудія, требующаго для своего влеченія 3 и даже 4 паръ, но рѣдко болѣе.

Въ удовлетвореніе частныхъ требованій: 1) плугъ долженъ имѣть передокъ или, покрайней мѣрѣ, полозокъ или колеско, если онъ долженъ имѣть особенную устойчивость; такъ, при мелкой вспашкѣ широкими пластами, при чемъ, однако, орудіе должно преодолевать довольно значительное сопротивленіе какъ, напр., при сѣзкѣ дерна (у дернорѣза); если пахутся довольно значительныя покатоки, на которыхъ плугъ безъ передка легко зарывается въ землю при движеніи его вверхъ и выскакиваетъ изъ земли при движеніи внизъ по покатоки; если, наконецъ, имѣющіеся пахари привыкли уже къ передковымъ плугамъ или недостаточно ловки и не легко участвуютъ въ управленію плугомъ, какъ напр. у насъ въ мѣстностяхъ, гдѣ издавна пахутъ малороссійскимъ плугомъ. Въ противоположномъ этому случаѣ можно предпочесть безпередковые плуги, какъ напр., у насъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ до введенія плуга пахали сохами и косулями — орудіями, требующими много ловкости отъ пахари; а на мѣстахъ съ частыми препятствіями, неровностями (кочки, пни) безпередковые плуги даже необходимы. Впрочемъ, у плуговъ съ полозкомъ, этотъ послѣдній легко можетъ быть отнятъ, или поднять совершенно вверхъ, такъ что плугъ превращается въ безпередковый, какъ это дѣлается при запашкѣ навоза плугомъ съ полозкомъ. 2) Плугъ долженъ имѣть двѣ ручки, а не одну, если онъ *грузится*; если для управленія имъ или выемки его изъ земли и вставки въ землю требуется много силы, и если рабочіе привыкли уже пахать плугами съ двумя ручками, какъ, напр., у насъ въ мѣстностяхъ гдѣ пахутъ малороссійскими плугами; тамъ же, гдѣ пахутъ сохами и косулями, легко привыкаютъ къ одноручному плугу, при которой пахарь идетъ не въ бороздѣ, какъ у двуручнаго, а сбоку борозды по невспаханному полю. 3) Плугъ долженъ имѣть ножъ, если почва, для обработки которой онъ назначается, связна и задернѣла. Безъ рѣзца можетъ быть употребленъ плугъ для перепашки лишь мягкой рыхлой земли, для запашки высокаго живня или солоmistаго навоза, когда даже у плуговъ съ рѣзцами, вынимаютъ этотъ послѣдній. Для взвѣта торфяныхъ почвъ, для подъема дернины употребляются плуги съ круглыми, заостренными на окружности, вращающимися ножками,

къ которымъ не пристаётъ земля и которые не забираютъ такъ напоза или кореньевъ. 4) Плугъ долженъ быть тѣмъ прочае, чѣмъ глубже долженъ онъ пахать, чѣмъ шире пластъ онъ долженъ отряжать, чѣмъ плотнѣе задерживаетъ землю, которая должна быть имъ вспахана. 5) Плугъ долженъ имѣть тѣмъ болѣе простое устройство, чѣмъ менѣе искусны рабочіе. 6) Плугъ долженъ имѣть тѣмъ менѣе желѣзныхъ, стальныхъ частей, чѣмъ дороже металлическія части; тѣмъ менѣе чугуновыхъ частей, чѣмъ отдаленнѣе хозяйство отъ литейныхъ заводовъ, на которыхъ могутъ быть отлиты чугуновые части, въ случаѣ ихъ поломки; тѣмъ менѣе металлическихъ частей вообще, чѣмъ затруднительнѣе починка орудій по неимѣнію въблизи механическихъ заведеній или мастеровъ. Дѣйствующія части плуга дѣлаются уже у всѣхъ сколько нибудь улучшенныхъ плуговъ металлическими: рѣзецъ — рѣдко стальной, большей частью желѣзный съ наставленнымъ лезвиемъ; лемехъ и отваль — желѣзные стальные или чугуновые; лезвіе желѣзнаго лемеха наставляется. Желѣзо довольно прочно, но мягко, скоро стирается; сталь прочна и тверда, но дороже желѣза и чугуна; чугунъ твердъ и дешевъ, но хрупокъ; поэтому гдѣ отвалу и лемеху приходится выдерживать большое сопротивленіе какъ то: на вязкихъ глинистыхъ и сильно задерживающихъ почвахъ тамъ можно предпочесть ихъ изъ стали; при меньшемъ сопротивленіи на болѣе легкихъ, въ особенности же песчаныхъ почвахъ, гдѣ они могутъ стираться, ихъ охотно дѣлаютъ изъ чугуна. Лемехъ въ тому же съ нѣскольکو болѣе мягкой верхней частью, отъ стирания которой онъ самъ собой заостривается. Корпусъ плуга (подшва, задняя и передняя стойки, полевая доска) дѣлаются большей частью изъ чугуна, но также и изъ желѣза. Впрочемъ, въ случаѣ поломки, чугуновые части могутъ быть замѣняемы новыми, которые для большей части плуговъ всегда можно имѣть въ запасѣ. Грядиль и рукоятки весьма удобно могутъ быть изготовляемы изъ дерева, такъ какъ при сравнительно меньшемъ вѣсѣ чѣмъ желѣзные, могутъ имѣть одинаковую прочность съ этими послѣдними; чѣмъ больше же вѣсъ плуга вообще, тѣмъ больше расходуется влекущей силы на ту же работу. Впрочемъ въ послѣднее время ручки плуга, даже при деревянномъ грядилѣ, предпочитаютъ дѣлать изъ желѣза, потому что, хотя онъ и стоитъ нѣсколько дороже деревянныхъ, но зато прочнѣе этихъ послѣднихъ и при возможности изготовленія ихъ прессованіемъ, выходятъ всегда болѣе одинаковой, правильной формы. 7) Плугъ можетъ имѣть тѣмъ болѣе круто приподнимающіеся переднюю стойку (плотину, горло) и отваль и тѣмъ болѣе короткій и круто изгибающійся отваль, чѣмъ рыхлѣе земля чѣмъ менѣе она задерживая, чѣмъ болѣе долженъ крошиться пластъ, чѣмъ менѣе можетъ этотъ послѣдній перекрывать предыдущій пластъ; и, наоборотъ, плугъ дол-




Рис. 17.

женъ имѣть тѣмъ отложе приподнимающіеся плотину и отваль и тѣмъ болѣе длинный и постепенно изгибающійся отваль, чѣмъ плотнѣе и болѣе задерживаетъ землю, чѣмъ менѣе долженъ крошиться пластъ и чѣмъ полнѣе долженъ этотъ послѣдній перекрывать предыдущій пластъ. 8) Плугъ долженъ имѣть тѣмъ большее разстояние между концемъ лемеха и грядилемъ по отвѣсной линіи, чѣмъ болѣе можетъ набиваться сюда травы. 9) Наконецъ, плугъ долженъ быть тѣмъ устойчивѣе, имѣть тѣмъ болѣе широкое основаніе (отъ




Рис. 18.

полевой стороны подошвы до самого внешнего края опирающегося на землю отвала), čímь тоньше и шире должен быть подрезаемый им пласт, как напр. при снятии дерна (дернорезъ).

Къ этому слѣдуетъ добавить, что čímь совершеннѣе должна быть работа плуга, čímь меньше можно требовать отъ него разнообразія въ работѣ. Одинъ и тотъ же плугъ не можетъ хорошо работать при глубокомъ и мелкомъ паханіи, при вырѣзкѣ широкаго и узкаго пласта, если разница между наибольшей и наименьшей толщиной пласта, который долженъ вырѣзывать плугъ, превышаетъ $2\frac{1}{2}$ —3 вершка, а между наибольшей и наименьшей стороной того же пласта превышаетъ $2\frac{1}{2}$ вершка.

Для выбора плуга сообразно указаннымъ требованіямъ можно назвать слѣдующіе плуги, большей частью употребляющіеся уже у насъ съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ, въ порядкѣ отъ плуговъ съ наиболѣе отлогими къ плугамъ съ наиболѣе крутыми плотной и отвалами, по каждой изъ трехъ группъ отдѣльно.

1. Изъ передковыхъ плуговъ.

1) Говарда *) Марка ДД. (рис. 17) съ стальнымъ отваломъ. Цѣна 33—35 р. и марка ВВВ (рис. 18) для подъема новой вѣсомъ 11 пуд. Цѣна 80—85 руб. **).

2) Раксма, ***). Сима и Гедд. Марка ВФС. (рис. 19) для паханія до 4 вершк. глубины, съ чугуннымъ или стальнымъ отваломъ и чугуннымъ или




Рис. 19.

*) Русское Сельскохозяйственное комиссіонерство «Работникъ». С.-Петербургъ. Дворцовъ, площ. уголъ Большой Миліонъ, въ сельскохозяйств. музей М. Г. И. Москва. Театральн. площ. д. Бронникова. Изъ двухъ цѣнъ этого комиссера, первая въ С.-Петербургѣ, вторая въ Москвѣ.

**) Цѣны очень непостоянны, а потому приводятся здѣсь для приблизительныхъ соображеній. Тамъ, гдѣ нѣтъ цѣнъ русскихъ, проставлены цѣны иностранныхъ механическихъ заведеній, въ иностранной монетѣ; для перевода ихъ на русскія деньги въ концѣ книги имѣется таблица.

***). Депо въ Москвѣ на Петровѣ 24; въ Одессѣ на Итальянской ул. 7.

железнымъ лемехомъ. Цѣна 45 руб. Немецкіе плуги подъ марками RNDW, RNEW, RNFV. (рис. 20) и RRGW, вѣсомъ 6, $7\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$ и 13 пудовъ, для паханія легкой, средней вязкости и тяжелой почвъ, 3—4, 4, 4—6 и 6—8




Рис. 20.

лошадьми на глубину $2\frac{1}{4}$ —4, $2\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$ —5 и $4\frac{1}{2}$ —7 вершк. Эти плуги могутъ употребляться съ имѣющимися при нихъ дернорезами (снимъ-вольторами)—небольшими плужными корпусами впереди и выше заднихъ большихъ, для срѣзки дерна, который, отваливаясь въ борозду, засыпается рыхлой землей, отворачиваемой заднимъ корпусомъ; это же даетъ возможность пахать задернѣвшую землю нѣсколько глубже при сравнительно небольшой ширинѣ пласта. Ц. 60, 68, 75 и 117 руб. Марки YFRLW и YFRW (рис. 21),




Рис. 21.

вѣсомъ 6 и 8 пудовъ, для паханія 1—2 и 2—3 парами воловъ на глубину до $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$ вершк., при ширинѣ пласта въ 8 и 10 вершк. Ц. 60 и 77 руб. Всѣ эти плуги железные съ чугуннымъ корпусомъ; послѣдній изъ нихъ, YFRW, съ железной плотной, стальнымъ отваломъ и колесомъ для запаса плуга; особенно хорошъ и употребителенъ для подъема степныхъ цѣпкихъ земель, на которыхъ требуетъ однако 3—4 пары воловъ для своего влеченія. Контичентальные плуги, марки НВ, НС и НД. (рис. 22), вѣсомъ 3, 4 и 6 пуд., для паханія 1, 2 и 2—3 парами лошадей или воловъ, на глубину 2—4, 3—5 и 4—5 вершк. при ширинѣ пласта 5—6, 6—8 и 7—9 вершк. Эти плуги съ деревянными граблями и ручками, со стальными отвалами и лемехами Ц. 30, 37 и 45 руб.




Рис. 22.

Къ этимъ послѣднимъ плугамъ, весьма распространеннымъ въ Венгрии, примыкаютъ Гогенгеймскіе плуги, которые послужили имъ образцомъ.

3) Мастерской хутора Ими. Общ. Сельск. Хоз. *) *Гогенгеймскій* плугъ съ двухколеснымъ передкомъ для паханія 1 парой лошадей или воловъ на глубину до 4 вершк. при ширинѣ пласта до 7 вершк. Ц. 30 руб. *Стенный* плугъ для паханія ковыльной, цѣлистой почвы 4 парами воловъ на 3—4 вершка глубины, при ширинѣ пласта въ 9—10 вершк. Ц. 50 руб. Оба плуга съ деревянными грядилками и ручками. Послѣдній изъ нихъ, на основаніи нова еще единственнаго опыта, обѣщаетъ, однако, хорошіе результаты.

Наконецъ, съ наиболѣе крутыми плотиной и отваломъ плуги для глубокаго, такъ называемаго райольнаго паханія, на глубину 6—8—10 вершковъ; изъ которыхъ мы назовемъ:

4) *Магдебургскій* **), извѣстный плугъ для обработки почвы подъ свекловицу; весьма прочный, хотя и весь деревянный, за исключеніемъ отвала, лемеха и цѣпи, сдѣланныхъ передкомъ съ довольно толстымъ, совершенно прямымъ дышлоомъ; рукоятки короткія, почти прямыя. Ц. 33 руб.

5) *Гр. Вобрицкаго* ***), какъ и предъидущій, исключительно употребляется для глубокой вспашки уже развспаханной земли; вѣсомъ 26 пуд. Ц. 130 р. Построенъ по образцу

6) *Сакки* †), (рис. 23) съ колесками, уменьшающими трепіе подолнымъ и колесной доской. Ц. около 80—100 руб.

7) *Энкерта* ††) райольный плугъ (рис. 24), вѣсомъ 6 пуд. Ц. 70 руб. Послѣдніе три плуга все желѣзные, а послѣдніе два, въ тому же, съ дерпорѣзами, почему могутъ быть употреблены даже для глубокой вспашки нѣсколько задерѣвѣвшей земли.

*) Москва, за Бутырки, хуторъ Ими. Моск. Общ. Сельск. хоз. М. В. Неручеву.

**) У Качинскаго въ Киевѣ.

***) Киевской губ. Чернасскаго уезда м. Сѣбла.

†) Механич. заводъ въ Плагвида близъ Лейпцига. Агентъ въ Москвѣ Густавъ Листъ. Сосѣдская Набаревн. собств. домъ.

††) «Работники» и братья Вутенонъ на Масницкой въ собств. домъ, въ Москвѣ. Энкерта фабрика въ Берлинѣ. (kleine Frankfurterstr. 1.)




Рис. 23.




Рис. 24.

II. Изъ полувисячихъ плуговъ.

1) *Рансома, Симса и Геда* плуги подъ марками: BFJ весь желѣзный съ стальнымъ или чугунинымъ отваломъ и съ чугунинымъ или желѣзнымъ лемехомъ, и BFO (рис. 25) съ деревяннымъ грядилемъ и ручками, для паханія




Рис. 25.

1—2 лошади на глубину 2—3 вершковъ. Марки В, С, D и Е. (рис. 26), въсомъ 2½, 3½, 3½ и 5½ пуд., для пахання 1, 2, 3 и 4 лошади на глубину 2½, 3½, 4 и 4½ вершк. при ширинѣ пласта 5½, 7, 8 и 9 вершк. Ц. 25, 30, 34 и 36 р. Всѣ эти плуги съ колескомъ впереди и деревянными граблями и ручками, но дѣлаются также и съ желѣзными граблями.




Рис. 26.

2) Голенейский плугъ (рис. 27), съ полозкомъ или башмакомъ, деревяннымъ граблемъ и одной деревянной ручкой, для пахання не слишкомъ тяжелой земли, какъ мягкой такъ и задержной, парой лошадей на глубину




Рис. 27.

до 4 вершк., при ширинѣ пласта 6—7 вершк. Изготавливается въ мастерскихъ хутора Им. Московск. Общ. Сельск. хоз. (съ одной и двумя ручками). Ц. 18 руб., с. Маховаго *) Ц. 25 руб. и с. Козлова **) Ц. 16 руб.

*) Тульск. губ. Новосильск. уезд. у Юсифа Никол. Шатилова.

**) Тверск. губ. и уезда у Алексѣя Борисов. Врасскаго.

3) Говарда Англо-американскій Ц. 19 руб. и
4) Старбука американскій (рис. 28), изготовленный въ механическихъ заведеніяхъ И. Х. Вильсона. *) Ц. 18 руб. и братьевъ Бутеновъ. Ц. 19 руб. Оба плуга съ деревянными граблями и ручками, чугунными отвалами и лемехами и съ колескомъ впереди.




Рис. 28.

III. Изъ висячихъ плуговъ.

1) Рансомъ, Симса и Гедъ: Марка L.J.N.3 (рис. 29) съ болѣе отлогимъ чугуннымъ или стальнымъ отваломъ, въсомъ 5½ пуд. для среднихъ и легкихъ почвъ.




Рис. 29.

Марка TC съ болѣе крутымъ отваломъ (рис. 30), въсомъ 7½ пуда, преимущественно для пахання почвъ, раздѣляющейся изъ подъ лѣса, въ которой еще много борней, на глубину 5½—5½ вершк., для чего требуется 4—6 лошадей. Ц. 42 и 80 руб. Марка S. R. C. (рис. 31) весьма легкій плугъ на пару небольшихъ лошадей, для вспашки на глубину 2—4 вершковъ при ширинѣ пласта отъ 4 до 6 вершк., похожъ на шведскій плугъ (см. ниже) № 9. Въсомъ около 3 пуд. Ц. со стальнымъ отваломъ и лемахомъ 19 руб.

*) Москва. Малай Икманка, собств. дѣлч.




Рис. 30.




Рис. 31.

2) *Шведские* Готенбургского завода *) плуги: № 3 В и № 1 а (рис. 32) одно- и двухконные плуги английского типа съ болѣе отлогимъ отваломъ, желѣзные со стальнымъ отваломъ и лемехомъ, вѣсомъ 2½ и 4 пуда. Ц. 14 р. 50 к.—16 р. и 24—26 руб; и № 9 американскаго типа (рис. 33) съ болѣе крутымъ отваломъ, желѣзный съ чугуннымъ корпусомъ, вѣсомъ 3½ пуда. Ц. 16—18 р.

3) *Гримонский* плугъ, съ деревяннымъ грядилемъ и ручками и чугунными подошвой, горломъ, отваломъ, лемехомъ. Изготавливается въ механическомъ заведеніи горьгорьскихъ учебныхъ учрежденій **). Вѣсомъ 3 пуда. Ц. 18 руб. съ одноколеснымъ передкомъ, вѣсомъ 3½ пуд. Ц. 21 р. и съ двухколеснымъ передкомъ, вѣсомъ 4 пудъ. Ц. 24 р. Съ желѣзнымъ лемехомъ рублемъ дорожс.

4) *Эккерта* одно- и двухконные плуги подъ маркой М R (рис. 34.), вѣсомъ 2½ и 3½ пуда, для паханія болѣе легкихъ оочъ на глубину 2—2½, и 3—4 вершк. Ц. 20 и 35 руб. Плуги Эккерта имѣютъ долотце, выдвигающееся изъ подъ отвала съ полевой стороны лемеха, составляющее часть лемеха и при-

*) Комиссіон. „Работникъ“ и братья Бутенюпъ.

**) Могилевской губ. г. Горни, механикъ В. Бромъ.




Рис. 32.




Рис. 33.




Рис. 34.

дающее лемеху форму язычковаго. Долоще представляет собою стальную пластинку, заостренную съ обѣихъ сторонъ и прикрѣпляющуюся къ полевой доскѣ. Помѣръ того какъ стирается остріе его, оно можетъ быть выдвигается и, наконецъ, переставлено задомъ напередъ.

5) Км. Васильчикова *) двуконный плужокъ, весь желѣзный, безъ поща съ крутымъ отваломъ, для паханія мягкой земли. Ц. 20 руб.

Для успѣшнаго употребленія плуговъ имѣютъ большее или меньшее значеніе нѣкоторыя плужныя принадлежности, а именно *плужныя салазки* или *плужная тачка*, для сбереженія орудій отъ поломки при перевозкѣ ихъ изъ усадьбы въ поле и обратно; *плужные вальки* и *вѣ*, которые служатъ для запряжки: первые лошадей, а второе—волонъ и значительно вліяютъ на сбереженіе плечущей силы.

Плужные салазки (рис. 35) для висячихъ и полувисячихъ плуговъ деревянные, такъ просто, что могутъ изготовляться дома; плужная же тачка (рис. 36), желѣзная для передковыхъ плуговъ, стоитъ у Рансома, Симса и Геда 7 р. 50 к. Вальки въ комиссіонерствѣ „работникъ“ деревянные, окованные желѣзомъ, на пару лошадей о 3-хъ валькахъ, стоятъ 4 р. 50 коп.; у Рансома желѣзные паровонные (рис. 37) — 15 руб. и на три лошади — 23 руб. Вѣ, если въ плугъ впрягается болѣе 1 пары волонъ, весьма хорошо двойное, при которомъ задняя пара не давится имъ къ землѣ, какъ это бывастъ, если при однопочномъ вѣ задняя пара волонъ ростомъ не ниже передней.




Рис. 35.




Рис. 36.




Рис. 37.

*) Трубечино. Тамбовской губ. Лебедянского уѣзда.

Такими *загонными* плугами, каковы приведенные выше, у которыхъ отваль прикрѣпленъ неподвижно, къ одной сторонѣ, нельзя пахать землю такъ, чтобы, проводя плугомъ борозду къ бороздѣ, отваливать пластъ къ пласту, все въ одномъ направленіи; между тѣмъ какъ во многихъ случаяхъ, какъ мы увидимъ ниже, это бываетъ не только полезно, но и необходимо, и потому приходится употреблять, такъ называемые, *оборотные плуги*. Эти плуги или имѣютъ двойной лемехъ и переставляющійся съ одной стороны плуга на другую, прямой или выпуклый отваль, несоотвѣтствующій по формѣ для паханія болѣе плотныхъ земель; или же, если они годны для этого послѣдняго, то представляютъ болѣе или менѣе полное удвоеніе всѣхъ частей плуга, иначе—два плуга, соединенные такъ, что однимъ пахутъ, идучи въ одну сторону, а другимъ, оборачиваемымъ сверху внизъ на мѣсто нижняго или сзади напередъ на мѣсто передняго, производятъ, возвращаясь назадъ, борозду подлѣ предыдущей борозды и отваливаютъ новый пластъ въ направленіи же предыдущаго. Но, такое удвоеніе частей плуга дѣлаетъ орудіе чрезвычайно тяжелымъ, такъ что на произведеніе той же работы, что и плугомъ съ постояннымъ отваломъ, тратится гораздо больше плечущей силы, чѣмъ при этомъ послѣднемъ. А потому такіе двойные оборотные плуги употребляются преимущественно при паханіи паровой силой, но преимущественно примѣняющейся въ настоящее время системѣ пароваго паханія *Фаулера*.

Изъ оборотныхъ плуговъ, представляющихъ этотъ недостатокъ въ меньшей степени, но за то и непригодныхъ для всаженія болѣе плотныхъ или задернѣвшихъ земель, можно назвать *американскій* (рис. 38) у братьевъ Эбергардтъ, въ Ульмѣ на Дунай, въ Германіи. Ц. 38½ рейнск. гульд.

На рыхлой, уже хорошо обработанной землѣ, нѣтъ надобности въ рѣзцѣ, роль котораго можетъ удобно исполниться здѣсь возвышающимся полевымъ краемъ лемеха и передней стойкой; но бываетъ надобность въ двойномъ лемехѣ, который подрѣзываетъ землю на обѣ стороны отъ средней линіи плуга, при двухъ отвалахъ—по одному съ каждой стороны плуга, которые подрѣзавшую такимъ образомъ землю отваливаютъ изъ борозды также на обѣ стороны, для того чтобы провести водосточныя борозды, образовать гребни, вывратъ картофель изъ земли, или присыпать землю къ стоящимъ по обѣимъ сторонамъ отъ борозды растеніямъ. Это послѣднее дѣйствіе называется *окучиваніемъ*, а потому и употребляемые для этого плуги называются *окучниками* или *обсыпными плужками*; но также распахивающими, пропашивающими или двукрылыми плужками. У окучниковъ менѣе важная форма отвала, но важна возможность сблизить между собой или разставить далѣе отвалы или крылья, чтобы можно было разваливать землю болѣе или менѣе широко.




Рис. 38.

Хороши окучники на одну лошадь: 1) Распашникъ Тезра у братьевъ Буте-
ноуъ 17 руб.; 2) Готенбургскій (рис. 39) у Ф. В. Грамана въ Ригѣ, 22 руб.




Рис. 39.

3) Эккерта (рис. 40) желѣзный, вѣсомъ 2 пуда; въ комиссіонерствѣ «Ра-
ботникъ» 18—19 руб. Всѣ три съ подвижными отвалами болѣе легкіе. Тяже-
лѣе ихъ, для болѣе глубокаго окучиванія: 4) Говарда марка ДД, вѣсомъ 5³/₄
пуд., съ приборомъ для выкапыванія картофеля; тамъ же 55—60 руб. и 5)
Шведскій Готенбургскаго завода (рис. 41), по образцу Говарда, 6¹/₂ пуд.,
съ приборомъ для выкапыванія картофеля (рис. 42); тамъ же 35—40 руб.




Рис. 40.




Рис. 41.




Рис. 42.

Наконечъ, въ случаѣ надобности въ одномъ лишь разрыхленіи
незадерѣвшей почвы безъ перепорачиванія пласта, употребляется
плугъ безъ вожа, котораго роль исполняетъ передняя стойка, и безъ
отвала. Этотъ плугъ называется *подпочвеннымъ* или *почвоуглубите-*
лемъ, потому что, какъ однокорпусное орудіе, употребляется лишь
для разрыхленія подпочвы глубже отпорачиваемаго пласта, почему
пускается въ борозду, открываемую обыкновеннымъ плугомъ,

вслед за этим последним, и разрыхляет подпочву, не выворачивая ее наружу.

Хороши почвоуглубители на 1 лошади: 1) *Гогемейский* (рис. 43) *) с полозком, и на 1—2 лошади, смотря по глубине, на которую разрыхляется




Рис. 43.

земля, 2) *Руда* (рис. 44) **, очень устойчивое орудие на 4 колесках; 3) *Американский* (рис. 45) *** может разрыхлять на глубину до 10 вершков. Первое орудие дѣлается всегда съ деревяннымъ дышломъ и ручками, последние же два также и съ желѣзными градилями и ручками; у первыхъ двухъ желѣзные корпуса и демехи, у послѣдняго же чугунный корпусъ съ привинчивающимися демехомъ и подошвой; 4) *Кл. Васильчикова*. Ц. 19 р. 50 коп. разрыхляетъ значительной ширины полосу и употребляется преимущественно при воздѣлываніи сахарной свекловичи.




Рис. 44.

*) Изготавливается въ мастерской хутора Имп. Моск. Общ. Сельск. Хоз. Ц. 15 р. продается у Ф. В. Грамана въ Рязѣ 22 руб. и въ комис. «Работники» 13—14 р.

**) Изготавливается въ мастерской хутора Имп. Моск. Общ. Сельск. Хоз. Ц. 25 руб.

*** Изготов. у Энкорта, продается въ комис. «Работники», 3 пуда въсомъ на 1—2 лошади Ц. 15—16 руб.




Рис. 45.

Кромѣ плуга земля пашется еще разнаго рода сохами, ралами и косулями, которыя, говоря вообще, отличаются, главнымъ образомъ, отъ плуга въ трехъ отношеніяхъ, во 1-хъ неустойчивы, потому что обыкновенно не имѣютъ подошвы; во 2-хъ болѣе отрывають, чѣмъ отрывають плать, къ тому же не прямоугольной формы; и въ 3-хъ отваливаютъ весьма дурно плать, болѣе отодвигаютъ его. Таковы наши *сохи* съ обжами для запряжки въ нихъ одной лошади, съ перекидной (великороссійская) или съ постоянной (бѣлорусская соха) палицей. Таковы *рала*: малороссійское, силезское, сигенское и др. съ градилями для запряжки въ нихъ пары воловъ. За этими орудіями, въ направленіи къ плугу, слѣдуютъ: 1) *Литовская соха* съ градилями же и подобіемъ отвала, почему довольно порядочно оборачиваетъ плать; 2) наши *косули*: костромская и ярославская (самолетъ) съ дѣйствующими частями плуга, прилаженными къ сошнымъ корпусу и упряжѣ, безъ подошвы; и потому довольно хорошо вырѣзають, отваливаютъ и крошатъ плать, но неустойчивы на ходу. 3) *Мекленбургское рало* или соха, отличающееся отъ вышеприведенныхъ ралъ подошвой; почему при тѣхъ же недостаткахъ вырѣзки и отворачиванія пласта, какъ и у другихъ ралъ, имѣетъ нѣсколько большую устойчивость; наконецъ, 4) *Богемское рухадло*, съ подошвой и плужными дѣйствующими частями, соединенными здѣсь въ одной желѣзной пластинѣ, которой заостренная, слабо приподнимающаяся нижняя часть играетъ роль демеха, тѣлый край — роль рѣзца, а вся пластина, выгнутая, довольно круто приподнимающаяся вверху и затѣмъ нѣсколько отогнутой назадъ — роль отвала. Рухадло бываетъ обыкновенное и обратное. Вслѣдствіе такого устройства, рухадло, можно сказать, рыхлитъ почву, крошитъ его отбрасывая ее почти брызгами. Легкость на ходу и хорошее искрошеніе почвы составляютъ достоинство этого орудія, которое, однако, дѣйствуетъ весьма дурно на малоразработанныхъ, вязкихъ, сильно

задеряжных почвах. Изъ всехъ названныхъ орудій рыхлало ближе всего подходитъ къ плугамъ съ круглымъ отваломъ, напр., Эккертовскимъ, кн. Васильчиковъ и райольнымъ.

Дѣйствіе этихъ орудій, послѣдствіе ихъ устройства, становится затруднительнымъ на задеряжныхъ, пѣсково вязкихъ земляхъ; для поднятія задеряжнаго мѣста сохой приходится, предварительно этого, разрѣзать дернину на ремни особымъ рѣзакомъ. Исключеніе изъ этого составляетъ литовская соха, которая при этихъ условіяхъ можетъ дѣйствовать пѣсково, но только пѣсково успѣшно. Во всему этому, этими орудіями невозможна обработка земли глубже 2—2½, много 3 вершковъ при соответственнo небольшой ширинѣ пласта; между тѣмъ какъ для такой незначительной сравнительно работы, каждое изъ нихъ требуетъ тяги одной или пары лошадей и одного пахаря. Поэтому, если эти орудія, по своей конструкции, и могутъ быть еще пригодными для нѣкоторыхъ цѣлей, напр., для окучиванія (наша соха, мельбурское рало), разрыхленія и мѣшанія почвы, задрыва сѣмянъ, то, какъ расходующія большое количество рабочихъ рукъ и животныхъ, онѣ все же должны уступить мѣсто многокорпуснымъ орудіямъ, которыя, проводя нѣсколько бороздъ за разъ, исполняютъ работу никакъ не хуже этихъ орудій, даже лучше ихъ, будучи специально принаровлены для извѣстныхъ цѣлей, а между тѣмъ требуютъ одного лишь пахаря съ прибавкой въ нѣкоторыхъ случаяхъ одного, много двухъ погонщиковъ, полуроботниковъ, для выполненія работы, которая требуетъ силы одной пары, а иногда и большого числа лошадей и для выполненія которой, помощью однокорпусныхъ орудій потребовалось бы 2, 3, 4 и болѣе пахарей—полныхъ работниковъ. Къ тому же управленіе многокорпусными орудіями требуетъ значительно меньше искусства, чѣмъ управленіе однокорпусными. Поэтому, не только сохи, рала, косули, но даже однокорпусные плуги для мелкаго паханія неширокими пластами, въ особенности однопонные плуги, должны уступить мѣсто многокорпуснымъ орудіямъ тамъ, гдѣ поля свободны отъ камней, пней, гдѣ нѣтъ большаго выгоды держать мелкій скотъ и гдѣ необходимо сбереженіе рабочихъ рукъ.

Многокорпусныя орудія представляютъ тѣже различія, что и однокорпусныя, т. е. многокорпусные загонные и оборотные плуги—послѣдніе для паханія паровой силой, многокорпусные двурыхлые плуги, которые получаютъ, однако, особое названіе и, наконецъ, многокорпусные плуги безъ рѣзовъ и отваловъ, съ одними лемехами, которые, поэтому, можно называть вообще *многолемешными* орудіями и которые получаютъ различныя названія по цѣли, для которой они служатъ.

Такъ какъ наиболѣе трудными работами паханія представляется

вспахива задеряжной почвы и глубокая вспашка (на 6—10 вершковъ), которыя уже для одной борозды требуютъ запряжки 3—4 паръ воловъ, то для этого рода вспашекъ наименѣе удобны многокорпусные плуги. Поэтому для глубокой вспашки устраиваются многокорпусными лишь плуги, приводимые въ движеніе паровой силой; для вспашки же задеряжной почвы рѣдко могутъ быть употребляемы плуги, болѣе искали двукорпусные, да и эти въ томъ только случаѣ, если задеряжное мѣсто не представляетъ такихъ препятствій, какъ пни, кочки, камни и т. д.

Лучшіе двукорпусные плуги для вспашки задеряжной почвы выходятъ безспорно изъ англійскихъ фабрикъ земледѣльческихъ орудій Мюррей и К°. (G. W. Murray & Co., Engineers, Banff, Foundry England, N. B.) и Рамсона, Спенса и Гейда. Двукорпусные плуги первой формы пользуются въ Англіи хорошей извѣстностью по легкости на ходу, простотѣ устройства ихъ и управленія ими и сравнительной дешевизнѣ; онѣ не были испытаны въ Россіи. Двукорпусные плуги второй фирмы, подъ марками RLCD, RNDW и RNFDW (рис. 46), испытывавшіеся съ успѣхомъ въ Россіи, служатъ для паханія 2—3,




Рис. 46.

3 и 3—4 парами воловъ съ однимъ пахаремъ и однимъ или двумя погонщиками на глубину 1½—3½, 2—4 и 2—5 вершк. при ширинѣ двойнаго пласта 8—12, 8—14 и 8—14 вершк. Ц. 110, 130 и 140 руб. У этихъ плуговъ подошву замѣняетъ колеско, сберегающее при работѣ двукорпусными плугами съ обыкновенной подошвой 25½ или 4 влекущей силы; вмѣсто 4-хъ лошадей въ послѣднемъ достаточно 3-хъ лошадей въ первомъ случаѣ. Въ двукорпусныхъ плугахъ подъ марками RNDW и RNFDW правый полный плужной корпусъ можетъ, если нужно, замѣняться корпусомъ подпочвеннаго плуга, который пускается, въ такомъ случаѣ, въ предыдущую борозду, открытую полнымъ плужнымъ корпусомъ, и разрыхляетъ подпочву ниже отвернутаго пласта на глубину еще 3—4 вершковъ; при чемъ борозда съ разрыхленнымъ такимъ образомъ дномъ засыпается рыхлой же землей изъ слѣдующей борозды, открываемой снова полнымъ плужнымъ корпусомъ, безъ новаго утаптыванія животными.

Для перепахки на сравнительно небольшую глубину мягкотныхъ земель, хорошо разработанныхъ предварительнымъ паханіемъ, какъ это случается при вспашкѣ жнивы (стерни), при неглубокомъ мѣшаніи, поверхностномъ порыхленіи почвы предъ посѣвомъ или запашкѣ сѣмянъ, можно употреблять трех- и даже болѣе нежели трехкорпусные плуги, такъ какъ они для выполненія такой работы не требуютъ болѣе 1—2, много 3 паръ лошадей или воловъ. Къ тому же для перепахки жнивы, когда требуется хорошее прикрытіе этаго послѣдняго, необходимы еще болѣе отлогіе плотина и отваль; для мѣшанія же и запашки сѣмянъ плотина и отваль могутъ быть гораздо круче — плужной корпусъ можетъ приближаться болѣе къ формѣ рухадла. Поэтому многокорпусные плуги, назначаемые специально для запашки сѣмянъ и извѣстные подъ именемъ *запашниковъ*, имѣютъ большей частью плужные корпуса такого вида. Въ этихъ послѣднихъ орудіяхъ весьма удобна возможность уменьшенія и увеличенія разстоянія между отдѣльными плужными корпусами, такъ какъ, въ случаѣ пѣвотораго засоренія почвы сорными травами, не-




Рис. 47.

обходимо большее между корпусами разстояніе, чѣмъ въ протиположномъ случаѣ.

Для перепахки жнивы изъ такихъ орудій можно указать на трехкорпусные плуги: 1) *Рансома, Симса и Гедд* (рис. 47) подъ маркой МЕМ. Ц. 180 руб. и 2) *Братисъ Эбергардтъ* (рис. 48), вѣсомъ около 15 пуд. Ц. 175 рейнск. гульд.




Рис. 48.

Этими плугами на 1—3 парахъ воловъ можно пахать на глубину отъ 1 до 14 вершковъ при ширинѣ трехъ пластовъ вмѣстѣ въ 18 вершк. Первый особенно хорошъ съ прорѣзными, рыхлящими отвалами; вторымъ же можно перепаживать даже несильно задернѣвшую землю, напр. изъ подъ двухлѣтней смѣси тимopheвкы съ клеверомъ, если только всѣ корпуса снабжены рѣзцами, и даже запахивать мелкій навозъ, который прикрывается хорошо безъ заграбленія его въ борозды. 3) *Эккерта* (рис. 49) подъ маркой ADS, которымъ на 1—2 парахъ лошадей можно пахать на глубину 2½ вершк., при ширинѣ тройнаго пласта въ 15 вершк., Ц. около 50 руб. 4) *Вестберга Н. А.* (въ Харьковѣ) подъ названіемъ „буттеръ“, которымъ на 2 парахъ воловъ можно пахать на глубину до 3½ вершк., при ширинѣ тройнаго пласта въ 18 вершк. Ц. около 50 руб. Для запашки же сѣмянъ, кромѣ предъидущихъ орудій, еще 5) *Запашникъ Лале ** новой конструкции — превосходное орудіе для задылки сѣмянъ; запряженное 1—2 парами воловъ перепаживаетъ землю на глубину отъ 1½ до 2½ вершк., при ширинѣ тройнаго пласта въ 16 вершк.; Ц. около 50 руб. 6)

*) Депо земледѣльческихъ орудій и машинъ г. Эйланда въ Харьковѣ.




Рис. 49.

Шестикорпусный запашник Бенко *) (рис. 50) съ шестью желѣзными рухадло, прирѣзанными къ подвижному брусу; употребляется съ обыкновеннымъ плужнымъ передкомъ.

Весьма близко къ запашникамъ стоятъ *луцильные плуги* (луцильники, дерносникатели), назначающіеся для сръзки дерна, жнивь, не глубже 1—1½ дюйм.

Покрайней мѣрѣ луцильный плугъ Розенберга-Диничскаго, которому принадлежитъ починъ въ употребленіи этихъ орудій, есть собственно трехкор-




Рис. 50.

*) Строится, напр., въ механич. заводѣнїи Эдуарда Кюне въ Визельбургѣ (Венгрія), но въ Россіи неизвѣстенъ. Ц. 24 австр. гульд.

пусное рухадло (рис. 51); хотя другой луцильный плугъ Энкерта (рис. 52) представляетъ собой пятикорпусный плугъ, у котораго каждый изъ пяти корпусовъ состоитъ лишь изъ стойки съ весьма плоскимъ, широкимъ, ост-




Рис. 51.

рымъ двойнымъ лемехомъ; эти корпуса могутъ загибаться въ этомъ орудіи 4 корпусами рухадло, и тогда орудіе превращается въ запашникъ. Цѣна первому 25, а второму 65 или 73 р. съ запашниковыми корпусами у Ф. В. Грамана въ Ригѣ.

Окучиваніе представляетъ сравнительно легкую работу, для которой могутъ быть употреблены многокорпусные окучники, если приходится окучивать невысого-




Рис. 52.

поднимающихся растений, какъ напр. у свекловицы. Чаще же многокорпусные орудия употребляются только для проведения бороздъ, какъ *маркеры*, которыми намѣчаются ряды или мѣста для высѣва или посадки зеренъ, клубней и т. д.

Рис. 53 показываетъ весьма удобный маркеръ изъ дерева съ желѣзными корпусами и дѣлами, который позволяютъ устанавливать корпусъ на 15, 18, 21 и 24 дюйм. разстоянія между проводимыми этими маркеромъ бороздами. Ц. 30 австр. гульден. у Кюне въ Визельбургъ (Венгрія). Картофельный бороздникъ съ маркеромъ для означенія бороздъ (ширина бороздъ въ 18, 21, 24 дюйм.), вѣсомъ 4½ пуда стоитъ у Ф. В. Грамана въ Ригѣ 29½ руб.




Рис. 53.

Если же нужно только разрыхлить землю или хорошенько смѣшать ее, то для этого достаточно, какъ мы видѣли, плужного корпуса безъ ножа и отвала т. е. собственно стойки съ лемехомъ. Многокорпусные или, вѣрнѣе, многолемешные орудія этого рода извѣстны подъ общимъ названіемъ *экстирпаторовъ* или *скоропашекъ*; они весьма разнообразны, смотря по цѣли, для которой употребляются. Въ двумъ указаннымъ цѣлямъ присоединяются еще вырываніе изъ земли сорныхъ травъ и прикрытие сѣмянъ. Впрочемъ, для этой послѣдней цѣли скоропашки удобны лишь на почвахъ малозасоренныхъ многочисленными сорными травами, потому что на сильно засоренныхъ почвахъ, при маломъ разстояніи между лапами скоропашки, между ними набиваются сорные травы, такъ что орудіе плохо входитъ въ землю и, вслѣдствіе того, плохо прикрываетъ сѣмена; при большемъ же разстояніи между лапами, хотя между ними и набиваются сорныхъ травъ, за то онѣ, рѣдко избороживая землю, оставляютъ много сѣмянъ непокрытыми. Въ этихъ случаяхъ необходимы запашники съ корпусами, снабженными отвалами, которые засыпаютъ бы сѣмена землей. Чѣмъ глубже должна входить

скоропашка въ землю, чѣмъ плотнѣе земля, которая ею обрабатывается, и чѣмъ болѣе назначена она для вырыванія травъ, тѣмъ болѣе отлогую, кривую линію должна образовать стойка съ прикрѣпленнымъ въ ней лемехомъ. У скоропашекъ для болѣе легкихъ почвъ, для болѣе легкой обработки почвы (до 2 вершковъ), для прикрытія сѣмянъ, лемехъ можетъ быть прикрѣпленъ въ стойкѣ подъ прямымъ угломъ; хотя въ изготовляющихся въ послѣднее время скоропашкахъ это встрѣчается лишь весьма рѣдко, такъ какъ такое устройство не допускаетъ болѣе разнообразнаго употребленія орудія, въ которомъ всегда можетъ встрѣтиться надобность. Самые лемехи могутъ быть болѣе выпуклы, представлять менѣе острый клинъ у скоропашекъ, назначаемыхъ для болѣе рыхлыхъ почвъ; у скоропашекъ же для почвъ болѣе плотныхъ они должны быть болѣе плоски, представлять болѣе острый клинъ. Очень плоскіе, широкіе, острые лемехи или же просто горизонтальные ножи, соединенные подъ прямымъ угломъ со стойкой, употребляются тогда, когда нужно подрѣзывать на небольшой глубинѣ подземныя части растений, напр. при душеніи, при истребленіи многолѣтнихъ сорныхъ травъ; причемъ, конечно, разрыхляется и поверхность почвы. Число лапъ (корпусовъ) или лемеховъ можетъ быть различно, отъ 3 до 9; рѣдко больше, чаще же всего семь у болѣе легкихъ и пять у болѣе тяжелыхъ скоропашекъ. Лапы размѣщаются обыкновенно въ два ряда, причемъ такъ, чтобы лемехи передняго ряда приходились противъ промежутковъ задняго. У лучшихъ скоропашекъ имѣется не только передокъ или, по крайней мѣрѣ, одно колесо спереди, но и задняя часть ихъ движется на колесахъ чрезвычайно способствующихъ болѣе вѣрному ходу орудія на извѣстной глубинѣ, на которую можно установить его помощію передка и заднихъ колесъ. Наконецъ, у тяжелыхъ скоропашекъ, носящихъ названіе *грубберовъ* и употребляемыхъ для глубокаго разрыхленія тяжелыхъ почвъ, имѣются особые рычажные приспособленія для выемки лапъ изъ земли.

Лучшій грубберъ безспорно *Колмана* *) (рис. 54), весь желѣзный, о 5 лапахъ, трехъ пумеровъ: вѣсомъ въ 22 (№ 5). Ц. 75—85 руб. для среднихъ почвъ, вѣсомъ въ 25 (№ 6) и 27 (№ 7) пуд. Ц. 80—90 и 95—105 руб. для болѣе тяжелыхъ почвъ. Изъ болѣе легкихъ скоропашекъ можно указать на *экстирпаторъ Трепрека* **) (рис. 55) деревянный о 5 лапахъ, вѣсомъ 4½ пуда, на 2—3 лошади. Ц. 32—34 руб.; и на деревянную *семиланную скоропашку* (рис. 56), изготовляющуюся на хут. Имп. Московск. Общ. Сельск. Хоз. Ц. 25 руб.

Экстирпаторъ или скоропашка, при замѣнѣ его стоекъ съ лемехами, рѣзками—ножами, превращается въ *скаррификаторъ*, который употребляется для истребленія многолѣтнихъ сорныхъ травъ, мховъ на лугахъ, для открытія доступа воздуха въ задерживающую почву съ цѣлю усиленія вывѣтриванія этой послѣдней, какъ-то: на лугахъ,

*) и **) Въ Комиссіон. «Работникъ».




Рис. 54.




Рис. 55.




Рис. 56.

выгонахъ, клеверныхъ и люцерновыхъ поляхъ; для измелченія дер-
нины при перепашкѣ задеряемыхъ мѣстъ.

Въ многокорпусномъ плугѣ плужной корпусъ можетъ, наконецъ, спестись, такъ сказать, на одну заостренную къ низу стойку—зубъ многокорпуснаго орудія, называемаго *бороной*, которое крошитъ комья, разбивая или разрывая ихъ, рыхлитъ землю, мѣшаетъ ее, хотя дѣлаетъ это неглубоко, поверхностно, вырываетъ сорные травы, особенно если ея зубья нѣсколько изогнуты, и прикрываетъ сѣмена. Бороны входятъ въ землю и разрѣзаютъ комья земли, если она болѣе тяжела; она крошитъ и разбиваетъ комья, если она болѣе легка. У тяжелыхъ боронъ приходится груза на каждый зубъ свыше 3, у среднихъ отъ 2 до 3 и у легкихъ меньше 2 фунтовъ. Бороны дѣлаются или изъ одного желѣза, или изъ одного дерева или изъ дере-
ва (рама) и желѣза (зубья) вмѣстѣ. Рама—одна часть бороны дѣлается пещма различной формы, начиная отъ трехугольной и кончая многоугольной, полукруглой и даже круглой; наиболѣе же употребительныя формы рамы квадратная и параллелограмная. Но, какой бы формы не была рама, зубья должны размѣщаться въ ней такъ, чтобы каждый изъ нихъ, при извѣстномъ прикрѣпленіи при-
пряжки, проводилъ бы свою отдѣльную отъ другихъ зубьевъ борозду. У бороны съ ромбоидальной рамой продолженная мысленно линія плече-
ния должна проходить чрезъ средину бороны даже при такомъ на-
правленіи этой линіи, при которомъ мысленно же продолженныя пути равно удаленныхъ другъ отъ друга зубьевъ остаются посто-
янно параллельными и никогда не переходятъ другъ въ друга. Рас-
стояние между зубьями должно быть такъ велико, чтобы между ними

не могли надолго застрять и тащиться съ бороной живые, комки земли, сорная трава и т. д.; оно у различных боронь различно велико: у тяжелых до 1 фута, у средних 10—11 дюйм. и у легких 8—9 дюйм. Этимъ разстояніемъ, равно какъ разстояніемъ между брусьями рамы, числомъ зубьевъ въ каждомъ брусѣ и помѣщеніемъ вѣста прикрѣпленія припряжки опредѣляется разстояніе между бороздами, проводимыми зубьями бороны, которое при боронованіи тяжелыми боронами, бываетъ обыкновенно въ 3, средними—въ 2—2½ и легкими—въ 1½ дюйм. Зубья должны быть одинаково длинны и толсты, чтобы все они могли равномерно проникать въ землю. Деревянные зубья у легкихъ боронъ имѣютъ въ длину (считая отъ нижней поверхности бруса) 6, а у среднихъ—отъ 10 до 12 дюйм.; желѣзные же зубья у тяжелыхъ боронъ 8—10, у среднихъ 5—6 и у легкихъ 4 дюйм. Длинные зубья скорѣе ломаются, короткія же—забиваются сорными травами. Наиболее обыкновенная форма горизонтальной площади сѣченія зубьевъ четырехугольная, обращенная однимъ угломъ впередъ; но у легкихъ деревянныхъ боронъ она бываетъ и круглой. Иногда же зубья бороны перестаютъ, такъ сказать, быть зубьями и принимаютъ форму изогнутыхъ стоекъ съ лемехами, на подобіе того какъ у скоронашекъ, такъ, напр. у такъ называемыхъ *лапчатыхъ боронъ*, или же замѣняются просто ножами въ *боронъ-скаррификаторъ*. Такія бороны употребляются также какъ экстирпаторы и скаррификаторы; только дѣйствіе ихъ слабѣе дѣйствія этихъ послѣднихъ. Зубья бороны наиболее удобно укрѣпляются въ рамѣ помощію гайки и винта. Наклоненіе зубьевъ къ поверхности рамы опредѣляется назначеніемъ бороны; гдѣ борона должна рѣзать, дѣйствовать больше своимъ вѣсомъ, тамъ зубья укрѣпляются подъ прямымъ угломъ къ поверхности рамы—самое лучшее положеніе для большей части работъ; если же работа назначается для прикрѣпленія сѣмянъ, тогда зубья наклоняются остриемъ нѣсколько впередъ, не болѣе однако, какъ на 1 дюйм. у зубьевъ 7 дюйм. длины. Это наклоненіе усиливается, если борона должна извлекать изъ почвы сорную траву. Тяжелое движеніе бороны, засореніе ея, суть обыкновенно слѣдствія слишкомъ большаго наклоненія ихъ къ поверхности рамы. Если борона должна глубоко забирать въ почву, необходимо запрячь животныхъ по длиннѣ; если же мелко, то короче, но всегда такъ, чтобы зубья бороны у запряжки уходили въ землю настолько же глубоко, какъ и въ задней части бороны. Бороны дѣлаются о различномъ числѣ зубьевъ, которое не бываетъ однако болѣе 30 и, въ рѣдкихъ случаяхъ, меньше 12. При большемъ числѣ зубьевъ, и слѣдовательно при большей величинѣ цѣльной и плоской рамы, борона не въ состояніи равномерно дѣйствовать на всю поверхность почвы, если эта послѣдняя представляетъ сколько

нибудь значительныя неровности: болѣе возвышенныя части будутъ бороноваться сильнѣе другихъ менѣ возвышенныхъ; нѣкоторыхъ углубленій борона можетъ вовсе не касаться. Такія неровности почвы, какъ мы увидимъ ниже, могутъ быть даже слѣдствіемъ самой обработки (узкіе загоны—спады); въ такомъ случаѣ рама дѣлается даже *выпуклой*, чтобы борона могла хорошо бороновать бока грядъ. Но часто такія неровности бываютъ естественныя, не настолько значительныя, чтобы нужно было дѣлать раму выпуклою; достаточно же бываетъ сдѣлать раму *соединенной* или, иначе сказать, вѣсто одной большой бороны употребить большее или меньшее число боронъ, которыхъ рамы соединены между собой подвижно, помощію цѣпей, крюковъ, петель и т. д. Такъ, для выравниванія мха на дугахъ, для чего борона должна чрезвычайно плотно прилегать къ поверхности почвы, употребляютъ борону такъ наз. *луговую*, представляющую соединеніе множества трехзубыхъ боронъ; или же дѣлаютъ подвижнымъ даже каждый зубъ. Подвижное соединеніе нѣсколькихъ боронъ въ одну представляетъ еще ту выгоду, что можно захватывать бороной большую поверхность безъ ущерба качеству боронованія, употребляя до этого въ то же время не болѣе одного работника.

Изъ лапчатыхъ боронъ хороши: трехугольная (рис. 57) Ц. 14½ руб. и че-




Рис. 57.

тырехугольная (рис. 58) Ц. 16½ руб. у Ф. В. Грамана въ Ригѣ, *Трехугольная Шведская Готенбургскаго завода* (рис. 59) вся желѣзная въ комиссіонерствѣ „Работникъ“ 20—22 руб. *Американская бороны Вальца* (рис. 60) съ кривыми зубьями можетъ быть употреблена, впрочемъ, также для весенняго порыхленія всаханной съ осени подъ посѣвъ земли. Ц. 46 рейнск. гульд. при вѣсѣ въ 4½ пуда, у братьевъ Эбергартъ въ Ульмѣ. Лучшія тяжелыя бороны *Госардовскія* (рис. 61), желѣзныя, составныя изъ 3 боронъ, съ зигзагообразной рамой, въ каждой по 20 зубьевъ, всего же 60, разставленныхъ въ 5 рядовъ, различныхъ номеровъ: захватывающія полосу шириной 4½ арш. (№ 11), 4 арш. 1 верш. (№ 12), 3 арш. 10 верш. (№ 14) и 3 арш. 3 верш. (№ 0). Вѣсомъ 6½, 5, 3½ и 3 пуда




Рис. 58.




Рис. 59.

съ вагой, на 2 или 3 лошади. На верхней сторонѣ средней изъ трехъ боронъ находятся два полозка, на которыхъ бороны, опрокинутая и сложенная двумя крайними на среднюю, удобно перевозится на поле и свозится съ поля; къ этимъ же полозкамъ привязывается веревка, за которую работникъ можетъ приподнимать иѣсколько боронъ, когдаэто нужно для того чтобы освободить ихъ отъ набившихся подъ ними сорныхъ травъ. Ц. въ комиссіон. „Работникъ“. 40—42, 35—37, 32—34 п 27—29 руб. Изъ деревянныхъ боронъ съ желѣзными зубьями




Рис. 60.




Рис. 61.

заслуживаютъ вниманіи бороны *Валькура* (рис. 62). на 1 лошадь, шир. 1 арш. 7 вершк. длин. 2 арш. 7 вершк., вѣсомъ 3 пуда, о 24 зубьяхъ. Ц. въ комиссіон. „Работникъ“ 11 р. 50—14 р. у А. Б. Враскаго 12 р. 50 к. Бороны *Шотландская* (рис. 63) изъ двухъ боронъ у Ф. В. Гримаха въ Ригѣ Ц. 22 руб. Изъ совсѣмъ деревянныхъ легкихъ боронъ можно назвать какъ лучшую *Брабантскую* (рис. 64) съ 24 наклоненными къ рамѣ, 11 дюйм. длинными зубьями; но и наша обыкновенная деревянная бороны можетъ быть пригодна тамъ гдѣ нужна мелкая бороны. Наконецъ, изъ луговыхъ боронъ — бороны *Говарда* (рис. 65) и *Альмана* (рис. 66). Первая, составная изъ стальныхъ подвижныхъ звеньевъ, 2 $\frac{3}{4}$ арш. въ квадратѣ, вѣсомъ 4 $\frac{1}{2}$ пуда съ вагой, на 2 или 4 лошади. Ц. въ комиссіонерствѣ „Работникъ“ 28—30 руб. Вторая состоитъ изъ 48 соединенныхъ подвижныхъ чугунныхъ плитокъ съ 3 ввинченными въ каждую изъ нихъ зубьями. Ц. у Кюна въ Визельбургѣ 68 австрійск. гульд.




Рис. 62.

Назначение боронъ такъ значительно, что, хотя одна и та же борона можетъ быть отчасти употреблена различно; такъ, напр. наваливъ на легкую борону какой либо грузъ (камень, дернъ и т. д.), можно сдѣлать ее тяжелой; или, измѣнивъ мѣсто припряжки, можно измѣнить разстояніе между бороздами, проводимыми зубьями; или, перенеся припряжку спереди назадъ у бороны, которой зубья наклонены впередъ, можно заставить ее дѣйствовать на почву весьма поверхностно . . . и т. д., тѣмъ не менѣе въ хозяйствѣ необходимо имѣть бороны нѣсколькихъ родовъ; такъ какъ, при употребленіи одной и той же бороны для различныхъ цѣлей, или тратится напрасно часть влекущей силы или же теряется качество выполненія работы.




Рис. 63.

Иногда мелкія сѣмена, напр. мака, прикрываютъ бороной, обоченной зубьями къ верху. Такимъ образомъ употребленная борона измѣлчиваетъ самые мелкіе комочки земли, выравниваетъ почву




Рис. 64.



Рис. 65.




Рис. 66.

непридавливая ее сильно. Но, въ виду порчи отъ этого боронъ, отчасти въ виду большого вѣса боронъ, при употребленіи въ хозяйствѣ тяжелыхъ боронъ, охотнѣе употребляютъ для названныхъ цѣлей, равно какъ и для собиранія живыхъ и корней и корневищъ сорныхъ травъ, особые орудія извѣстныя подъ именемъ *волокушей* и *цѣпныхъ боронъ*; послѣднія особенно хороши для собиранія сорныхъ травъ (пырея).

63 Хороши волокуши: *плетянка* (рис. 67) изъ деревянной съ перекладинами рамы, шир. $4\frac{1}{4}$ — $4\frac{3}{4}$ фут., длин. 2½ фут. переплетенной гибкими прутьями сплошь или только въ задней части; и *брусчатая* (рис. 68) изъ нѣсколькихъ, 11—22 фут. длинъ брусевъ, обитыхъ съ каждой стороны и съ передняго края желѣзомъ и соединенныхъ между собой цѣпью на разстояніи 5 дюйм. брусъ




Рис. 67.

отъ бруса. Могутъ быть изготовлены въ хозяйствѣ. Цѣпная борова (рис. 69), 8 фут. ширины, у братьевъ Эбергартъ II, 65 рейхс. гульд.

Если въ рыхлящемъ и выравнивающемъ дѣйствиі волокуши присоединяется еще требованіе большаго или меньшаго уплотненія почвы у ея поверхности, тогда необходимо употребить *катокъ*. Катокъ, впрочемъ, рыхлитъ землю нѣсколько иначе, чѣмъ борова и волокуша; онъ не разбиваетъ комьевъ, какъ эти послѣднія, но раздавливаетъ или вдавливаетъ ихъ, если они лежатъ на поверхности почвы, въ




Рис. 68.




Рис. 69.

землю, отчего, они притягивая влагу, распадаются потомъ весьма легко при боронованіи. Уплотненіе почвы каткомъ въ ея верхней части бываетъ нужно для того, чтобы придавить мелкія сѣмена или приподнятыя изъ земли морозомъ растенія или положенныя на почву куски дерна (при улучшеніи луговъ) въ рыхлой почвѣ или, вѣрнѣе, вдавить ихъ нѣсколько въ рыхлую почву и засыпать отчасти рыхлой землей раздавленныхъ комьевъ. Далѣе, оно нужно для того, чтобы уменьшить величину скважинъ почвы и черезъ то уве-

личить гигроскопичность и влажность почвы; вслѣдствіе перваго почва сильнѣе поглощаетъ газообразную воду изъ воздуха, вслѣдствіе втораго она сильнѣе поднимаетъ волоскую воду снизу въ поверхности; вообще же становится влажнѣе, что особенно важно для прорастанія сѣмянъ. Наконецъ, оно нужно для того, чтобы привести въ болѣе тѣсное соприкосновеніе съ почвой вносимыя въ почву сѣмена воздѣлываемыхъ растений или находящіяся въ ней сѣмена сорныхъ растений и растительные остатки; отчего первыя прорастаютъ, а вторыя разлагаются гораздо скорѣе. Катокъ, въ простѣйшей своей формѣ, есть подвѣшенный въ рамѣ цилиндръ, который катится по полю. Катки дѣлаются деревянные: пустые внутри, — такъ называемые барабанные, обитые снаружи двухдюймовыми досками, — или массивные, чугунные пустые внутри и каменные массивные. Катки, смотря по матеріалу, изъ котораго они сдѣланы и ихъ діаметру бываютъ тяжелые съ давленіемъ въ 50, средіе съ давленіемъ въ 25 и легкіе съ давленіемъ въ 16 фунт. на квадрат. вершокъ. Въ настоящее время употребляютъ предпочтительно болѣе тяжелые катки; впрочемъ вѣсь легкаго катка можетъ быть увеличенъ, если надъ рамой, въ которой подвѣшенъ катокъ, устроить ящикъ для помѣщенія въ него какого либо груза (каменей) или же сидѣнья для работника, управляющаго животными запряженными въ катокъ; работникъ въ этомъ случаѣ не только увеличиваетъ вѣсь орудія своимъ вѣсомъ, но и не утомляется, ходя за каткомъ, отчего ускоряется укатываніе. Хорошо устроенный катокъ долженъ 1) быть сдѣланъ изъ надлежащихъ качествъ матеріала; 2) представлять по возможности, правильный цилиндръ болѣе значительнаго діаметра ($1\frac{3}{4}$ —1 фут. у тяжелыхъ и $2\frac{3}{4}$ —3 фут. у легкихъ катковъ) для облегченія движенія катка; 3) имѣть незначительную длину (отъ 2 до 5 фут.), для того чтобы равномерно укатывать почву и не тащиться по землѣ и не загребать передъ собой земли при заворотахъ. Но, такъ какъ при малой длинѣ катка, невыгоднымъ становится употребленіе одного работника для прикатыванія сравнительно узкой полосы земли, то для увеличенія поверхности прикатываемой каткомъ въ управленіи одного рабочаго, соединяютъ два, три катка, каждый катокъ въ своей рамѣ — вѣсть, или же два три катка въ одной общей рамѣ; при этомъ катки размѣщаются относительно другъ друга такъ, чтобы нисколько не оставалось неприкатанной земли; или всѣ три въ рядъ съ возможно малыми между ними промежутками, или же, что еще лучше, въ два ряда: сзади помѣщаютъ два катка съ промежуткомъ между ними, нѣсколько меньшимъ длины отдѣльнаго катка, а третій катокъ впереди первыхъ двухъ, противъ промежутка между задними. При соединеніи катковъ въ отдѣльныхъ рамахъ, катки могутъ независимо одинъ отъ другаго прилежать къ поверх-

ности почвы; при соединении же ихъ въ одной общей рамѣ они могутъ дѣлать это только тогда, если катки покоятся шипами въ подшинникахъ съ длиннымъ гнѣздомъ или же они надѣты на осименного диаметра чѣмъ ихъ втулки; такъ что, если какой нибудь изъ катковъ накатится на возвышеніе, то онъ приподнимется, между тѣмъ какъ остальные останутся въ прежнемъ положеніи. Такіе катки могутъ принаравливать ко всякимъ, незначительнымъ однако неровностямъ поля. Въ случаѣ же болѣе значительныхъ неровностей, какія напр., представляетъ поле, вспаханное въ узкіе свалы, гребни, каткамъ даютъ форму, соответствующую формѣ поверхности земли; такъ, дѣлаютъ ихъ вогнутыми по длинѣ, если катокъ при укатываніи почвы средней своей частію катится по гребню; выпуклыми, если онъ средней своей частію катится по бороздѣ. 4) Катокъ долженъ укрѣпляться въ рамѣ такъ, чтобы линія влеченія была по возможности короче и имѣла такое направленіе, при которомъ точка, откуда, главнымъ образомъ, дѣйствуетъ животное, лежала бы въ одной горизонтальной плоскости съ осью катка. Рамка укрѣпляется лучше всего надъ каткомъ, который подвѣшивается въ спускающихся отъ рамы внизъ рукавахъ. 5) Катокъ долженъ быть удобенъ для перевозки его по неровнымъ дорогамъ.

Такъ устроятся катки съ гладкой поверхностью, наиболѣе употребительные, да и заслуживающіе наибольшаго вниманія при умѣстномъ только употребленіи и надлежащемъ устройствѣ ихъ. Также приблизительно устроятся и катки съ негладкой поверхностью: *бороздчатые* — съ продольными и поперечными бороздками и *зубчатые* или *хулаковые*, которые лучше гладкихъ рыхлятъ землю, но не такъ хорошо какъ эти послѣдніе, выравниваютъ ее. Первые изъ бороздчатыхъ — *рубчатые* съ продольными бороздками, угловатыми ребрами употребляются для взламыванія по веводамъ уже образовавшейся на почвѣ коры; вторые же изъ бороздчатыхъ съ поперечными бороздками, такъ называемые *кольчатые* катки и зубчатые катки — для раздробленія комьевъ и болѣе сильнаго уплотненія почвы, почему называются *пластодавами* (кольчатые) и *глыбодробами* (зубчатые). Для раздробленія комьевъ можно употреблять, такъ называемыя *Норвежскія вращающіяся бороны*, т. е. двойные катки съ нѣскольکو болѣе длинными зубцами — иглами, которые размѣщаются въ рамѣ одинъ позади другаго, притомъ такъ, чтобы рядъ иглъ на окружности одного приходился въ промежуткахъ между рядами иглъ на окружности другаго катка.

Изъ гладкихъ катковъ мы обратимъ вниманіе нашихъ хозяевъ на деревянный катокъ, представляемый рисунк. 70 и 71; тройные чугунные катки рис. 72 у Эккерта 24 дюйм. въ диаметрѣ 115 талеровъ и рис. 73 у Кюне въ Визельбургѣ 6½ фут. ширины Ц. 130 австрийск. гульден.; такъ же таковой же деревянный




Рис. 70.




Рис. 72.




Рис. 71.




Рис. 73.

катокъ Ц. 65 австрийск. гульден. Рис. 74 представляетъ деревянный рубчатый катокъ; рис. 75 — чугунный двойной кольчатый катокъ, состоящий изъ 39 прочныхъ колецъ, имѣющихъ каждое 14 дюйм. въ диаметрѣ и 4 дюйм. толщины. Ц. 107 р. у Ф. В. Грамана въ Ригѣ; рис. 76 — чугунный зубчатый катокъ-глыбодробъ *Кроскиля*, захватывающій 4½ фута, вѣсомъ 55 пуд. у Гра-




Рис. 78.




Рис. 79.

лапы могут помещаться по бокам первой лапы (рис. 80) для облегчения действия ножа. Для более полного истребления трав, подрезываемых этим орудием, къ нему присоединяется сзади раздвижная, на подобие ножниц, борона (рис. 83), которую можно устанавливать всегда сообразно ширине установка ножей. Наконец, съ защитной боковых частей брусками съ зубьями, это орудіе превращается въ бороздную борону (рис. 84). Ц. этого орудія у Кюна въ Визельбургъ со всеми принадлежностями 63 австр. гульд. (34 мотыка, 10—4 эстаир. лапы, 7 раздвижная борона и 12 бороздная борона). 4) Пятизачатый культиваторъ братьевъ Эбергардтъ (рис. 85) Ц. 43 рейнск. гульд. 5) Бороздная борона братьевъ Эбергардтъ (рис. 86). 6)




Рис. 80.




Рис. 81.




Рис. 82.




Рис. 83.




Рис. 84.

Два культиватора для полоть и окучиванія; одинъ изъ нихъ вѣсомъ 2 пуда, у Эккерта 10 талеровъ, другой (рис. 87) у Кюне 25 австр. гульден.; при первомъ полоть пмъ, послѣднимъ корпусамъ педаютъ окучивать, но, повернувъ ихъ болѣе внутрь, заставляютъ ихъ, напротивъ, отгребать землю отъ растений. 7) Культиваторъ или полольный катокъ Бесси (рис. 88) собственно орудіе, подобное трехлапчатому культиватору рис. 79 съ прибавленіемъ сзади небольшого зубчатого катка. Изъ многорядныхъ орудій можно назвать: 8) конную мотыку Смита (рис. 89); съ тремя окучными корпусами въ компрессіон. „Работникъ“ 110—120 руб. у кн. Наспльникова 85 руб. 9) *Гаварда борозная борона* (рис. 90), пронизываетъ за-разъ 2—3 междурядія до самыхъ рядовъ растений и содѣйствуетъ, какъ говорятъ, истребленію вредныхъ наѣжкомыхъ. 10) *Универсальный культиваторъ Сакка* съ 9 широкими и 9 узкими экстирпаторными лапами, 8 полольными ножами и 3 окучниками къ одной рамѣ 105 талеровъ; 11) *Двурядная конная мотыка*, употребляющаяся въ Смитѣ; для одной лошади и 3-хъ рабочихъ, изъ копѣй двое управляютъ собственно полотьемъ—каждый полотьемъ своего ряда. Ц. 60 руб.

Въ заключеніе, относительно выбора, приобрѣтенія и содержанія орудій, нельзя не замѣтить, что—это относится и къ машинамъ—выбирать и приобрѣтать орудіе слѣдуетъ не иначе, какъ по ближайшей оцѣнкѣ всѣхъ частныхъ устройствъ орудія и условий, при которыхъ оно должно дѣйствовать. Если бы для такой оцѣнки не доставало свѣдѣній, то лучше хозяину посоветоваться относительно выбора съ свѣдущими и опытными въ этомъ отношеніи людьми; это можетъ предупредить много напрасныхъ тратъ. Затѣмъ, ни на основаніи своихъ собственныхъ соображеній, ни на основаніи совѣта, никогда не приобрѣтать сейчасъ же новаго орудія въ большомъ числѣ; приобрѣсти же сперва одно, и испытать его, да испытать не какъ-либо, а во всѣхъ отношеніяхъ, въ различныхъ случаяхъ, приобрѣсти самому навыкъ работать имъ и приучить работать имъ рабочихъ или, по крайней мѣрѣ, одного рабочаго, и только тогда,




Рис. 85.




Рис. 86.

когда все это неоспоримо подтвердить достоинство и применимость орудія, приобрѣсти его въ необходимомъ числѣ экземпляровъ. Какъ часто бракуется и бросается само по себѣ прекраснѣйшее орудіе, потому только что неостало терпѣнія приобрѣсти въ употребленіи его




Рис. 87.




Рис. 88.




Рис. 89.




Рис. 90.

навыка, котораго въ большей или меньшей степени требуетъ успѣшное примѣненіе каждаго, часто даже самаго простаго орудія. Далѣе, неслѣдуетъ гоняться за лучшимъ, совершеннѣйшимъ орудіемъ, такое орудіе еще неизобрѣтено, да и никогда изобрѣтено не будетъ! Каждое орудіе имѣетъ извѣстные недостатки; надобно довольствоваться, поэтому, тѣмъ, которое имѣетъ ихъ наименьше, котораго введеніе представляется несомнѣнно выгоднымъ. Разъ же заведя орудіе, неслѣдуетъ мѣнять его такъ скоро, безъ особенной нужды, безъ особенно и осязательно большихъ выгодъ, на лучшее, если бы такое и оказалось; потому что нерѣдко лучшее орудіе далеко не настолькоъ лучше, чтобы оплатить затраты, которыхъ потребуетъ замѣненіе стараго орудія новымъ не только деньгами на приобрѣтеніе новаго орудія, но и временемъ на приученіе къ нему рабочихъ. При выборѣ орудій всегда слѣдуетъ отдавать предпочтеніе болѣе простому, хотя бы, вслѣдствіе этого оно и было пригодно для извѣстной только работы. Многообразное употребленіе орудій, въ большей части случается, возможно лишь въ ущербъ или прочности орудія или качества исполняемыхъ имъ работъ. Коль скоро найдено орудіе, отвѣчающее требованіямъ, неслѣдуетъ жалѣть рубля для покупки хорошаго орудія; это особенно важно при покупкѣ первыхъ орудій, которыя должны внушить довѣріе къ себѣ рабочимъ. Боязнь израсходовать въ этомъ случаѣ нѣсколько больше есть обыкновенно слѣдствіе неувѣренности въ пригодности приобретаемаго орудія,

но въ такомъ случаѣ лучше вовсе не покупать орудій. Неслѣдуетъ приобретать усовершенствованныхъ орудій, не позаботившись предварительно о возможности скорой и удовлетворительной починки ихъ у себя въ хозяйствѣ или вблизи этого послѣдняго; потому что неломящихся орудій нѣтъ и нѣтъ механическихъ заведеній, которыя, строя вообще хорошія орудія, могли бы поручиться за то, что не выпустятъ отъ себя нѣсколько орудій болѣе ломкихъ, чѣмъ остальные. Между тѣмъ, какъ часто на основаніи такихъ случайностей составляетъ у хозяевъ репутація механическаго заведенія. Приобрѣтая орудія, необходимо приобретать всегда въ запасъ нѣкоторыя части ихъ, наиболѣе подверженныя ломкѣ, и еще лучше пять всегда соотвѣтствующее число запасныхъ орудій, въ предупрежденіе остановки работъ при поломкахъ. Хорошее сохраненіе орудій, очистка и смазка ихъ, бережное обхожденіе съ ними и осмотръ ихъ отъ времени до времени могутъ значительно уменьшить и поломки и расходъ на ремонтъ орудій.

Многія орудія или по крайней мѣрѣ части ихъ, въ особенности же деревянные, могутъ быть изготовляемы въ самомъ хозяйствѣ; а потому заведеніе въ хозяйствѣ хорошихъ орудій значительно облегчалось бы возможностью приобретать отдѣльныя части орудій, преимущественно чугуныя и желѣзныя; тѣмъ болѣе что дерево часто гораздо дороже въ мѣстахъ нахождения механическихъ заведеній, чѣмъ въ мѣстностяхъ хозяйствъ употребляющихъ орудія. Въ этомъ случаѣ примѣромъ для нашихъ хозяевъ и нашихъ механическихъ заведеній могла бы служить Венгрія, гдѣ механическія заведенія, напр. Кюне въ Визельбургѣ, предлагаютъ въ продажу такіе отдѣльныя части общепотребительныхъ орудій по умѣреннымъ цѣнамъ. У насъ изготовленіемъ деревянныхъ и даже многихъ желѣзныхъ частей, а затѣмъ и сборкой орудій, могли бы заниматься крестьяне въ деревняхъ, въ свободное зимнее время, имѣя возможность приобретать готовыя чугуныя и желѣзныя части. Это удешевило бы орудія, дадо бы крестьянамъ необходимый для нихъ въ зимнее время заработокъ, приучило бы ихъ къ употребленію орудій лучшихъ, чѣмъ ихъ настоящіе и усилло бы мѣстныя средства ремонта орудій. Но для этого необходимо, чтобы наши хозяйства, подѣ влияніемъ яснаго представленія нашимъ хозяевамъ объ орудіяхъ, удовлетворяющихъ наиболѣе потребностямъ рациональнаго у насъ хозяйства, усвоили себѣ извѣстные опредѣленные типы орудій. Это послѣднее должно имѣть громадное влияние на удешевленіе орудій, потому что механическія заведенія въ состояніи производить дешево и хорошо только тогда, когда они производятъ не большое число орудій, но въ большомъ числѣ экземпляровъ. Наши же механическія заведенія, не зная, чего потребуетъ отъ нихъ хозяинъ,

производить всего по одному или по нѣсколько только экземпляровъ. Наконецъ, нельзя не обратить вниманія нашихъ хозяевъ, нашей торговли земледѣльческими орудіями и машинами на механическія заведенія Венгріи, въ особенности Кюне въ Визельбургѣ; братьевъ Эбергардтъ въ Ульмѣ, которыя, по рациональности, качеству и умѣреннымъ цѣнамъ производимыхъ ими орудій, могутъ быть для насъ не столько же полезными, на сколько были механическія заведенія Рансома, Симса и Гада, Клантона и Шетльворса, Эккерта и др.

Раздѣлка новыхъ мѣстъ.

Новыя мѣста, никогда или давно не обрабатывавшіяся, которыя нѣрѣдко приходится русскому хозяину разрабатывать, обращать въ поле, бываютъ заняты водою, камнями, деревьями (лѣсъ), кустарникомъ, (паростникъ) и растеніями, образующими деренъ (лугъ, выгонъ, пожня, залежь, цѣлина).

Удаленіе воды.

(Спускъ водоемовъ. Осушеніе.)

Вода отнимаетъ мѣсто у воздѣлываемыхъ растений, покрывая почву болѣе или менѣе толстымъ слоемъ (озеро, прудъ) или пропывая ее болѣе или менѣе въ видѣ водосной или нажимной воды. Въ первомъ, болѣе рѣдкомъ случаѣ *спускаютъ* воду, покрывающую почву въ видѣ озера или пруда помощью канавы, открывающей водъ стокъ въ другіе водоемы, лежащіе ниже спускаемаго. Освобождаясь такимъ образомъ изъ-подъ воды почва можетъ быть весьма плодородною, такъ какъ на двѣ водоемовъ, окруженныхъ плодородными, удобряющимися полями, накопится много плодороднаго ила.

Во второмъ, болѣе частномъ случаѣ необходимо осушеніе—удаленіе изъ почвеннаго слоя вреднаго для растеній излишка воды (стр. 109 и 136). Успѣхъ осушки зависитъ:

1) отъ *основательнаго знанія причинъ*, иначе происхожденія *излишка воды* въ почвѣ. Первоначально всякая вода атмосфернаго происхожденія—метеорная; но, по отношенію къ данному участку земли можно различить: *верховую и грунтовую (ключевую)* воды.

Верховая вода есть или метеорная (дождевая, снѣговая) вода, непосредственно выпадающая на участокъ; или вода, стекающая на него съ поверхности граничащихъ съ нимъ болѣе возвышенныхъ мѣстъ; или, наконецъ, вода, которая заливаетъ его, при выступленіи ее изъ береговъ близъ лежащаго водоема, во время повышенія уровня воды въ этомъ послѣднемъ, и не можетъ стекать обратно въ водоемъ при пониженіи въ немъ уровня. Вода, попадающая на поверхность участка въ большемъ или меньшемъ количествѣ, частію стекаетъ съ участка, частію, къ тому же большей (до $\frac{3}{4}$ всего количе-

ства ей) испаряется съ его поверхности и только частью проникает въ его почву. Относительная величина этихъ частей зависитъ отъ того, имѣетъ ли участокъ горизонтальную или болѣе или менѣе покатую поверхность, рыхла или болѣе или менѣе вязка его почва, поросла ли поверхность ея растеніями, сильно удерживающими влагу, напр. мхами (стр. 95) или нѣтъ, попадаетъ ли на него вода рѣдко но большими заразъ количествами или часто но малыми каждыи разъ количествами, и влажны и теплы или сухи и холодны климатъ, въ которомъ находится участокъ, и время года, въ которое попадаетъ вода на участокъ. Проникающая въ почву часть верховой воды, въ случаѣ большой влагоемкости почвы, сильно задерживается почвою и можетъ дѣлать ее излишне сырою; въ случаѣ же меньшей влагоемкости, болѣе рыхлости почвы, проходитъ сквозъ нее до непроницающаго ея слоя, и, если этотъ послѣдній имѣетъ такое положеніе, что недопускаетъ стока по нему воды (рис. 91 *), то опустившаяся до него верховая вода поднимается снова вверхъ, на большую или меньшую высоту, въ зависимости отъ количества воды, проникающей до не пропускающаго слоя, отъ глубины, на которой находится этотъ послѣдній, и отъ условій болѣе или менѣе быстро испаренія воды отъ глубины почвы. Часто же непроницающій воды слой находится на значительной глубинѣ, къ тому же имѣетъ покатое положеніе и въ дальнѣйшемъ своемъ распространеніи ограничивается съ разныхъ сторонъ пропускающій слой, который то расширяется, то суживается, развѣтвляется; такъ что вода, достигшая непроницающаго слоя, не поднимается вверхъ и оставляетъ въ этомъ мѣстѣ почвенный слой сухимъ; но, направляемая непроницающимъ слоемъ, двигается, въ видѣ *грунтовой* воды, въ пропускающемъ слое въ низшимъ мѣстамъ, отыскивая себѣ выходъ. Этотъ послѣдній она находитъ или въ нетолстомъ, хотя и трудно проницаемомъ для нея слое (аб. рис. 92),




Рис. 91.

черезъ который она испаряется, поднимаясь въ немъ силой претерпѣваемаго ею давления и волосностью и пресыщая его влагой; или же, она находитъ себѣ




Рис. 92.

*) Въ этомъ разѣ и въ послѣдующихъ схематическихъ рисункахъ не пропускающіе воды слои затрихованы, пропускающіе же оставлены белыми.

выходъ въ выходящемъ наружу пропускающемъ слое, который, переполнясь ею, превращается въ болото, (аб. рис. 93) или выводитъ ее наружу въ видѣ *ключей* (и, г, д. рис. 93), питающихъ ручьи и рѣчки. Иногда проникающая въ почву вода




Рис. 93.

происходитъ (стр. 138) изъ водоема (рѣки, —рис. 94. аб. —поперечный разрѣзъ русла —ручья, озера, пруда), лежащаго вблизи страдающаго отъ сырости участка, если первый лежитъ относительно второго такъ, что вода изъ водоема, при обыкновенной высотѣ ея уровня или же только при возвышеніи этого послѣдняго, вслѣдствіе сильныхъ дождей, тайныхъ снѣга, возвышенія русла различными наносами, поднятія шлюзовъ и т. д., проникаетъ въ пропускающій слой, открывающійся въ берегъ водоема ниже уровня воды въ немъ, двигается въ этомъ слое и выступаетъ наконецъ наружу тѣмъ или другимъ изъ приведенныхъ выше путей.



Рис. 94.

Уровень грунтовой воды повышается, ключи становятся обильнѣе, когда, въ влажное время, сильныя и частыя атмосферическія испаренія увеличиваютъ прибыль грунтовой воды, или же когда уменьшается расходъ ея вслѣдствіе ослабѣвшаго испаренія или же затрудненнаго истеченія ключей. Уровень грунтовой воды, напротивъ, понижается, ключи даютъ менѣе воды, когда въ сухое время, за недостаткомъ атмосферическихъ испареній, уменьшается прибыль грунтовой воды или же когда увеличивается расходъ ея, вслѣдствіе ли усилившагося испаренія ея черезъ непроницаемый слой или же усилившагося истеченія ключей. Впрочемъ, на уровень грунтовой воды, притекающей часто издалека, имѣетъ въ такомъ случаѣ вліяніе состояніе времени года не того мѣста, въ которомъ находится страдающій отъ нея участокъ, но того мѣста, гдѣ выпадаетъ порождающая ее атмосферная вода.

Избытокъ воды въ почвѣ вообще вреденъ для растений, потому что она холодитъ почву (стр. 109), затрудняетъ доступъ въ нее воздуха, а слѣдовательно и кислорода (стр. 136), разжижаетъ поч-

венную жидкость (стр. 129), и, какъ слѣдствіе этого, затрудняетъ обработку особенно болѣе вязкихъ почвъ, отодвигаетъ время весеннихъ посѣвовъ и созрѣваній растений и засоряетъ почву некоторыми сорными растениями: хвощами, мхами и т. д. (стр. 167). Но, въ отношеніи причиняемаго почвѣ, а слѣдовательно и произрастающимъ на ней растениямъ, вреда, верховая и грунтовая воды нѣсколько различны. Между тѣмъ какъ первая содержитъ значительныя количества воздуха сравнительно богатаго кислородомъ, азотной кислотой и амміакомъ, имѣетъ температуру воздуха, послѣдняя содержитъ мало кислорода, азотной кислоты и амміака, послѣдняя даже иногда вовсе не содержитъ, большей частью холодна и нѣрѣдко содержитъ въ растворѣ вредныя для растений вещества (напр. соли, зѣлени желѣза), которыя растворяетъ на пути своего движенія по слоямъ земли весьма различнаго состава.

2) отъ *тщательности нивелировки* осушаемаго участка, которая должна показать относительное возвышеніе надъ горизонтальной поверхностью различныхъ точекъ осушаемаго пространства и возвышеніе низшей точки этого послѣдняго надъ уровнемъ воды въ водоемѣ, въ который предполагается отвести воду; и отъ *изслѣдованія свойствъ грунта*.

3) Отъ *возможности отвести воду*, т. е. отъ нахожденія рѣки, озера или пруда въ такомъ положеніи относительно осушаемаго пространства, чтобы ни недостатковъ паденія, ни особенно большое удаленіе, ни право провода воды на этомъ разстояніи не препятствовали отводу воды въ эти водоемы. Въ случаѣ неимѣнія водоема въ такихъ условіяхъ для спуска воды, что наименѣе случается при котловинномъ положеніи осушаемаго участка, можно въ крайнемъ случаѣ, или провести отводную канаву тунелемъ сквозь возвышенности, окружающія осушаемое пространство и препятствующія отводу воды; или устроить въ низайшемъ мѣстѣ осушаемаго пространства искусственный водоемъ, прудъ, въ который могла бы собираться со всего участка излишняя вода и удалаться или испареніемъ при достаточной величинѣ водоема, или же выкачиваться насосомъ и отводиться особымъ водопроводомъ за возвышенности; или же, наконецъ, въ случаѣ нахожденія пропускающаго воду слоя подъ непронускающимъ ея, продѣлать черезъ этотъ послѣдній шахту (рис. 95), по которой излишняя вода могла бы спуститься съ осушаемаго участка въ проводящій воду слой.

Такая шахта (рис. 96) продѣлывается обыкновенно, на самомъ низшемъ мѣстѣ осушаемаго участка, на днѣ канавы, которая собираетъ въ это мѣсто воду со всего участка: сперва въ видѣ колодезя, который вырывается глубиною до 18—20 фут. при такомъ діаметрѣ (до 15 фут.), чтобы стѣнки его имѣли откосъ; а затѣмъ уже со дна этого колодезя въ видѣ буровой скважины, пробуровываемой помощью бурава. Въ предупрежденіе засоренія




Рис. 95.




Рис. 96.

шахты, въ буровую скважину вставляется деревянная: ольховая, вязовая или дубовая труба, выставляющаяся нѣсколько надъ дномъ колодезя и закрывается по верхнему своему отверстію хворостомъ, по хворосту плитой, опирающейся на двѣ плиты, поставленныя стойми, и, наконецъ, камнями, которыми наполняется колодезь до краевъ, вровень съ дномъ ямы.

Обыкновенный *земляной буравъ* состоитъ изъ желѣзной, круглой *ложки* 5—10 дюйм. въ діаметрѣ (рис. 97) и желѣзной четырехгранной *палки* (рис. 98), на которую навинчивается ложка. Палка, при значительной длинѣ ея, состоитъ изъ нѣсколькихъ колѣнъ, которыя навинчиваются одно на другое, по мѣрѣ того какъ буравъ уходитъ въ землю. Для приведенія бурава въ движеніе, на верхній конецъ палки насаживается *рукоятъ* (рис. 99); а пока эта послѣдняя находится еще такъ высоко надъ землею, что неудобно дѣйствовать ею, употребляютъ *крючекъ* (рис. 99), которымъ обхватываютъ четырехгранную палку. Американскій земляной буравъ изъ 10 фут. желѣзной палки съ прикованною къ ней ложкою, 5 дюйм. въ діаметрѣ, весьма простаго устройства, такъ что, въ случаѣ поломки его, можетъ быть исправленъ обыкновен-




Рис. 97.



Рис. 98.





Рис. 99.



нымъ кузнечомъ, стоитъ у Эккерта въ Берлинѣ 7 талер. Буравъ, при употребленіи его, долженъ входить въ землю совершенно отвѣсно; и, послѣ каждаго углубленія его на новыя 6 дюйм., долженъ быть извлекаемъ изъ земли. Если онъ попадетъ на камень, то необходимо оставить начатую скважину и начать буравить новую. На это слѣдуетъ обратить особенное вниманіе, если приходится буравить глубже 4 фут.; такъ какъ въ противномъ случаѣ буравъ легко можетъ сломаться, особенно въ нѣсколько плотной почвѣ.

4) Отъ надлежащаго избранія *типа осушки*, которыя имѣютъ въ виду или преградить водѣ путь въ участку или же удалить воду, находящуюся уже на участкѣ; отъ *надлежащаго выполненія избраннаго типа*, проведенія канавъ для пріема, сбора и отвода воды съ осушаемаго участка; и отъ *надлежащей поддержки осушительныхъ сооружений*.

Канавы могутъ быть *открытыя* или *закрытыя* (дрены). Какъ тѣ, такъ и другія, будучи вырыты въ землѣ на известную глубину, открываютъ стокъ нажимной водѣ, находящейся въ почвѣ выше ихъ дна, и слѣдовательно опускаютъ ее въ уровень съ своимъ дномъ. Впрочемъ, это послѣднее вѣрно только для самыхъ близкихъ къ канавѣ мѣстъ; въ нѣкоторомъ же разстояніи отъ нихъ нажимная вода находится выше уровня ихъ дна, вслѣдствіе сопротивленія, которое представляетъ почва ея движению и которые тѣмъ болѣе, чѣмъ влагоемче почва; поэтому уровень воды u' (рис. 100) въ почвѣ




Рис. 100.

между двухъ канавъ представляетъ выпуклую вверхъ линію, и тѣмъ болѣе выпуклую, т. е. вода тѣмъ менѣе опускается въ отдаленіи отъ канавъ, чѣмъ влагоемче почва. Открытыя канавы сверхъ того доступны для воды, стекающей съ поверхности почвы. Какъ тѣ, такъ и другія канавы, при склонѣ ихъ дна, отводить попавшую въ нихъ такъ или иначе воду.

Канавы могутъ быть *накопныя* или *водоприемныя* и *отводныя* или *собирательныя*. Первые служатъ для того, чтобы принять въ себя внутреннюю грунтовую воду, вытекающую ключами или просачивающуюся въ почву. Вторыя служатъ для возможно быстрого

отвода съ участка воды, приводимой въ нихъ водоприемными канавами. Иногда, впрочемъ, одна и та же канава исполняетъ одновременно оба назначенія. Наконецъ, какъ тѣ такъ и другія открытыя канавы служатъ въ тоже время для отвода верховой воды.

Канава можетъ отводить воду еще при паденіи ея дна въ 0,0002 или когда верхній конецъ канавы, длиною въ 10000 вершковъ, выше нижняго на 2 вершка; но при этомъ вода двигается до того медленно, что легко осаждаются въ ней частицы и засоряютъ ими канаву, которая сверхъ того зарастаетъ травой, тростникомъ и т. д. Наиболѣе благоприятное паденіе можно считать въ 0,001—0,0015. Встрѣчается, однако и большее паденіе; но съ увеличеніемъ паденія усиливается опасность отъ размыва канавы быстро движущейся водой; такъ что, если поверхность земли, по которой приходится проводить канаву, весьма покатая, то проводить ее наискось или зигзагомъ или уступами, укрѣпляя эти послѣдніе камнемъ. Вообще, чѣмъ менѣе количество воды, протекающее по канавѣ, тѣмъ болѣе паденіе должно имѣть дно канавы, и наоборотъ. Отводныя канавы, говоря вообще, требуютъ большаго паденія, чѣмъ накопныя, которыя могутъ быть даже съ горизонтальнымъ дномъ.




Рис. 101.

Открытымъ канавамъ даютъ обыкновенно въ *поперечномъ сѣченіи* форму трапеціи (рис. 101), которой непараллельныя стороны представляютъ бока канавы, а параллельныя: меньшая — дно, а большая — верхнее отверстіе канавы. Бока канавы, въ предупрежденіе ихъ обвала или размыва, отклоняютъ отъ вертикальной линіи на $\frac{1}{2}$ —1 (рис. 101)— $1\frac{1}{2}$ и 2 глубины канавы, смотря по свойству грунта, быстротѣ теченія воды, слѣдовательно паденію дна и глубинѣ канавы; менѣе — на грунтахъ болѣе связныхъ, глинистыхъ, въ особенности торфяныхъ, при маломъ паденіи дна и малой глубинѣ канавы; болѣе — на грунтахъ рыхлыхъ, песчаныхъ, при большемъ паденіи дна и большей глубинѣ канавы. Въ случаѣ особенной непрочности грунта, бока отводныхъ канавъ укрѣпляютъ деревянною, каменною, дерновою, торфяною и даже соломенною обдѣлкой; бока же накопныхъ канавъ, собирающихъ грунтовую воду, должны оставаться совершенно свободными для того, чтобы безпрепятственно пропускать черезъ себя воду; да они менѣе и нуждаются въ такой обдѣлкѣ, потому что неимѣютъ никогда большаго паденія дна.

Зная паденіе дна канавы, слѣдовательно быстроту теченія воды, уклонъ, который должны имѣть ея бока, и количество воды, которое должна отводить канава, можно опредѣлить *размѣры* поперечнаго ея сѣченія, (см. прил. VII) а именно: *глубину* ея и *ширину* ея дна. Канавы дѣлаютъ глубже и шире тѣхъ размѣровъ, какіе вычислены для вмѣщенія количества воды, отводимого канавой въ обыкновенное время; глубже, на 1—2 фута, чтобы болѣе или менѣе понизить уровень грунтовой воды, шире — же, чтобы канава могла вмѣстить и большую обыкновенной массы воды, какая можетъ случиться во время таенія снѣговъ, ливней и т. д. Глубина накопныхъ канавъ, собирающихъ грунтовую воду, опредѣляется кромѣ того положеніемъ проводящихъ воду слоевъ, такъ какъ онѣ должны прорѣзывать эти слои и для болѣе полнаго отвода воды изъ этихъ слоевъ дно ихъ должно нѣсколько углубляться въ непроницающій воды слой (рис. 102). Впрочемъ, если накопная канава должна прорѣзать два или нѣсколько проводящихъ воду слоевъ (рис. 103) или же и одинъ, но глубоко залегающій (рис. 104), то, чтобы, не дѣлать ея

онѣ принимать въ себя воду не только черезъ дно, но и черезъ оба бока, и нерѣдко вполне достаточны для осушенія участка безъ водопріемныхъ канавъ. Наконецъ, въ отводныхъ канавы входятъ подѣ прямымъ угломъ водопріемныя канавы (в, в), которыя проводятъ обыкновенно поперекъ главнаго ската, вдоль подошвы обильнаго водой ската или же по самому скату, если этотъ послѣдній не на столько крутъ, чтобы вода, неперехваченная канавой, могла проникнуть подѣ дномъ канавы въ низшія мѣста. Въ этомъ случаѣ необходимо было бы или сдѣлать канаву очень глубокой, что повело бы къ обваламъ или къ большой потери пространства, или же провести нѣсколько параллельныхъ водопріемныхъ канавъ въ слѣшкомъ близкомъ одна отъ другой разстояніи, что тоже также было бы сопряжено съ утратой пространства. Въ этомъ случаѣ водопріемлющія канавы принимаютъ въ себя воду черезъ дно и черезъ бока, обращенный къ скату. Водопріемлющія канавы должны проводиться въ члѣбѣ, обеспечивающемъ вполне осушеніе участка, т. е. пониженіе уровня грунтовой воды до безвредной для растительности глубины, причемъ необходимо принять во вниманіе также поднятіе нажимной воды выше ея уровня водосилою почвы, особенно сильной у торфяныхъ почвъ. Это же будетъ зависѣть отъ глубины водопріемлющихъ канавъ, которая, по соображенію ея съ разстояніемъ между водопріемлющими канавами и покатостію участка, должна понижать уровень грунтовой воды на столько, чтобы земля, на $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ фута ниже ея поверхности, была свободна отъ избытка вѣсовой воды. Разстояніе между водопріемлющими канавами много зависитъ отъ свойствъ почвы. Оно можетъ быть тѣмъ больше при одномъ и томъ же главномъ паденіи, чѣмъ рыхлѣе почва, и тѣмъ меньше, чѣмъ плотнѣе почва; потому что въ рыхлыхъ почвахъ вода встрѣчаетъ менѣе препятствій своему движенію внизъ (стр. 106), въ состояніи пройти большее пространство, чтобы достигнуть болѣе удаленныхъ одна отъ другой канавъ, а слѣдовательно и ниже опуститься подѣ поверхность почвы, чѣмъ въ болѣе плотныхъ почвахъ. Полезно располагать устья канавъ, входящихъ въ другія канавы съ противоположныхъ сторонъ, попарно, на сколько это допускается другими соображеніями, такъ какъ этимъ усиливается протокъ воды въ канавѣ, въ которую входятъ такимъ образомъ притоки, и тѣмъ устраняется возможность задержанія ихъ въ этомъ мѣстѣ.

Лучшее время для рытья канавъ конецъ лѣта, когда наименѣе воды. Приступая къ прорытію канавы, назначаютъ колышками направление канавы, причемъ набиваютъ ихъ въ два ряда, обозначающіе ширину дна канавы; затѣмъ, начиная снизу вверхъ, роютъ канаву надлежащей глубины, въ ширину дна съ откосными стѣнками, а потомъ уже, отложивъ въ сторону отъ краевъ этой предварительной канавы $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ — 2 глубины, срѣзаютъ откосы. Для большей правильности поперечнаго сѣченія проводимой канавы можно употребить изготовленный изъ дерева шаблонъ опредѣленныхъ размѣровъ канавы. Повѣстно, что съ измѣненіемъ глубины канавы на ея протяженіи, въ зависимости отъ паденія, которое должно имѣть ея дно, измѣняется и ея ширина для сохраненія того же уклона ея боковъ. Выбрасываемая изъ канавъ земля не должна быть складываема по близости краевъ канавы, такъ какъ, образуя въ этомъ случаѣ вдоль канавы валъ, она можетъ препятствовать стоку воды въ канаву и, смываясь въ канаву водой, засорять ее; кромѣ того, подѣ давленіемъ ея могутъ обваливаться бока канавы. А потому лучше распределять выбрасываемую изъ канавъ землю по всему осушаемому пространству; для сего необходимо предварительно разрыхлить ее, а затѣмъ развезти помощью ручныхъ или двухколесныхъ, опрокидывающихся конныхъ тачекъ или помощью конной лопаты (рис. 108)*. Въ боло-

тистыхъ слабыхъ грунтахъ не слѣдуетъ рыть канавъ сразу надлежащихъ размѣровъ, такъ какъ ихъ откосы легко сдвигаются при влажномъ состояніи почвы. Окончательно вырываютъ канавы здѣсь не раньше того, какъ почва, освободившись достаточно отъ воды, приобрететъ нѣсколько болѣе связности.




Рис. 108.

Открытыя канавы, для успѣшнаго дѣйствія, требуютъ постояннаго призора, который долженъ состоять въ томъ, чтобы, а) смотря по размѣрамъ участка и способу пользованія имъ, устроить черезъ канавы одинъ или нѣсколько мостовъ для прогона скота на выгонъ и для проѣзда съ возами навоза, сноповаго хлѣба, сѣна и т. д.; б) осматривать канавы послѣ каждого сильнаго дождя и немедленно исправлять произведенныя имъ поврежденія; в) очищать канавы весной отъ накопившагося въ нихъ снѣга и въ особенности разбивать ледъ, если бы этотъ послѣдній образовался въ нихъ; иначе вода не будетъ свободно течь по нимъ, канавы будутъ бездѣйствовать и засорятся; наконецъ г) очищать канавы, лучше всего осенью, отъ пла, который осаждается въ нихъ протекающей по нимъ водой, отъ земли, которой онѣ засыпаются вслѣдствіе обвала боковъ, и отъ водяныхъ растений, которыми онѣ зарастаютъ. Это важно для отводныхъ канавъ, которыя должны доставлять безпрепятственное движеніе воды; это же важно и для наклонныхъ канавъ, которыхъ бока, для свободнаго пропуска чрезъ себя воды, должны быть свободны отъ растительности. У канавъ съ одернованными боками необходимо поддержаніе дерновой обдѣлки въ порядкѣ. Канавные очистки лучше всего складывать около канавъ, а съ наступленіемъ морозовъ, свозить по первому санному пути въ кучи для компоста. При очисткѣ канавъ необходимо наблюдать, чтобы дно канавы сохраняло свое правильное паденіе; при недосмотрѣ въ этомъ отношеніи правильность паденія дна нерѣдко исчезаетъ, вслѣдствіе чего въ канавѣхъ начинаетъ мѣстами застаиваться вода, канавы перестаютъ дѣйствовать и засоряются, и для исправленія ихъ приходится прибѣгать къ ихъ углубленію, а по истеченіи нѣсколькихъ лѣтъ такой небрежности, зло можетъ сдѣлаться даже неисправимымъ, особенно если главное паденіе незначительно.

Осушеніе открытыми канавами, кромѣ большихъ затратъ, которыхъ требуетъ поддержаніе канавъ въ исправности, представляетъ много другихъ еще неудобствъ. Оно уменьшаетъ пространство земли, которое можно занять воздѣлываніемъ, и уменьшаетъ его тѣмъ болѣе, конечно, чѣмъ болѣе число канавъ, чѣмъ шире ихъ отверстія, слѣдовательно, чѣмъ глубже канавы. Открытыя канавы, въ особенности же, если онѣ чисты и ограничиваемы ими участки не имѣютъ правильной четырехугольной формы, чрезвычайно затрудняютъ прогонъ скота, движеніе повозъ, обработку и удобреніе земли, уборку растений и въ особенности употребленіе при этомъ

*) У братьевъ Эбергардъ въ Ульмѣ 29 рейнск. гульд.

сдвига, и съ обкладкой стыка глиной или мхомъ, въ предупрежденіе загни-
нія трубъ; или же вставляютъ соединяемые концы ихъ въ муфты (корот-
кія трубы нѣсколько большаго діаметра чѣмъ соединяемая) (рис. 119).
Трубы же съ раструбомъ укладываются такъ, что одна труба узкимъ концомъ
своимъ вкладывается въ раструбъ другой. Оба послѣднія соединенія хороши,
если грунтъ не очень иливучъ или не легко размывается водою; въ против-
номъ случаѣ вкладываютъ иногда одинъ рядъ трубъ въ другой большаго діам-
метра, такъ однако, чтобы стыки одного приходились бы противъ середины
трубъ другого ряда.




Рис. 113.




Рис. 114.




Рис. 115.




Рис. 116.




Рис. 117.




Рис. 118.



Рис. 119.

Слѣдующая таблица
показываетъ сравнитель-
но стоимость устройства
закрытыхъ канавъ выше-
приведенными способами
на протяженіи 500 погон.
саж. или на пространствѣ
1 десятины.

При устройствѣ:	вырытіе канавы.	засыпку канавы землей.	материалъ, его приго- товленіе и укладку.	мелочные расходы.	всего.
дерновыхъ дренажъ . . .	70 р. — к.	20 р. — к.	9 р. 75 в.	1 р. 50 к.	101 р. 25 в.
торфяныхъ „ . . .	70 „ — „	20 „ — „	11 „ 15 „	1 „ 50 „	102 „ 65 „

*) Заимствовано изъ статьи *О. О. Баталова* «о различныхъ способахъ осушки» въ журн. «Сельское Хозяйство и Лѣсоводство». Январь, 1874. Расчеты сдѣланы на основаніи, главнымъ образомъ, урочнаго положенія 1869 и показаній

фашинныхъ дренажъ									
безъ колець . . .	87	р. 50 к.	25 р. — в.	17 р. 50 к.	1 р. 50 в.	131 р. 50 в.			
съ кольями . . .	62	„ 50 „	20 „ — „	21 „ 50 „	1 „ 50 „	105 „ 50 „			
			(со втыканіемъ колець).	(не считая колець).					
деревянныхъ дренажъ:									
изъ жердей . . .		90 руб.		13 „ 65 „	1 „ 50 „	105 „ 15 „			
„ деревян- ныхъ трубъ 50		„ — „ 15 „ — „		13 „ 75 „	1 „ 50 „	80 „ 25 „			
„ драпиць . . .		65 руб.		4 „ 35 „	2 „ — „	71 „ 35 „			
каменныхъ дренажъ:									
изъ мелкаго камня . . .	70	„ — „	20 „ — „	54 „ — „	1 „ 50 „	145 „ 50 „			
„ гравіа . . .	87	„ 50 „	139 р. 40 в.		1 „ 50 „	228 „ 40 „			
дренъ изъ гончар- ныхъ трубъ . . .	50	„ — „ 15 „ — „	41 „ 7 „	1 „ 50 „	107 „ 57 „				

Изъ этого видно, что дренажъ изъ цилиндрическихъ гончарныхъ трубъ обо-
дится дешевле каменныхъ и фашинныхъ безъ колець; почти столько же,
сколько фашинныхъ съ кольями и деревянныхъ изъ жердей; но дороже дерно-
выхъ и торфяныхъ, въ особенности же дражковыхъ, которыхъ пригодность
неподтверждена еще, впрочемъ, опытомъ, и дренажъ изъ деревянныхъ трубъ.
За то дренажъ изъ цилиндрическихъ гончарныхъ трубъ выйдетъ съ дражковыми
дренажами требующъ наименьшаго расхода на вырѣзку канавъ и засыпку ихъ,
другими словами, требуютъ наименьшаго количества земляной работы.
Укладка ихъ также дешева, дорогъ лишь матеріалъ для ихъ устрой-
ства — гончарныя трубы. Въ Германіи считаютъ средней цѣной за 1000 трубъ:

1 1/2 1 1/2 2 2 1/2 3 4 4 1/2 5 и 6 дюйм. въ діаметрѣ
5 5 1/2 6 1/2 9 10 12 16 20 26 1/2 и 33 1/2 талеровъ.

У насъ 1000 трубъ съ муфтами, привезенныхъ изъ Бельгіи въ видѣ балласта,
необходится дешевле 8 руб.; при изготовленіи же ихъ домашними средствами
они могутъ обойтись не дороже 4—5 рублей. Въ Австріи изготовленіе 1000,
примѣрно, 3 дюйм. трубъ, обходится въ 9 гульд. 75 крейц. (австр.), а именно:

выкопка глины . . .	—	гульд. 35	крейц.
размятіе ее работникомъ и лошады . . .	1	„ 30	„
1 работникъ для приведенія въ движеніе прессы . . .	—	„ 35	„
1 „ для подкладки глины . . .	—	„ 35	„
2 мальчика для снятія трубъ . . .	—	„ 35	„
1 работникъ для укладки въ печь . . .	—	„ 25	„
обжиганіе . . .	—	„ 25	„
выборка изъ печи . . .	—	„ 25	„
1 саж. дровъ . . .	6	„ 30	„

Для изготовленія дренажныхъ гончарныхъ трубъ необходимы глино-очи-
стительныя машины и прессы. Изъ первыхъ особенно хороша *Клайтона* ма-

разныхъ хозяевъ-практиковъ и инженеровъ. При этомъ полагалось за рытіе кан-
навъ: глуб. 5 суг. шириной внизу 3 и сверху 21 дюйм. — 10 коп., и глуб. 5 суг. и
шириной: внизу 12 и сверху 30 дюйм. — 17 1/2 коп. за погон. саж. За засыпку погон.
саж. канавы отъ 3 до 5 коп. Мужской рабоч. день отъ 50 (вязка сашинъ) до 75 в.
(разкаторъ, дерна) и 80 коп. (носка камня). Куб. саж. хвороста 50 коп.; куб. саж.
сосновыхъ жердей длин. 2 саж., 4 дюйм. въ діам. 4 руб.; 1000 деревн. трубъ,
высверленныхъ въ брускахъ толщ. 2,6 дюйм. въ каждую сторону, длин. въ 1 сугъ
3 руб. 50 коп.; 1000 отборной сосновой драги длин. 1 саж. шир. 3 дюйм. 1 р. 50
коп.; 1000 цилиндрическихъ гончарныхъ трубъ 1 дюйм. въ діаметрѣ — 10 руб.

лам. Ц. 90 тал.; изъ которыхъ: 1) *Клайтона* (рис. 120), въ особенности для изготовленія трубъ большаго діаметра, двойная. Трое рабочихъ приготавливаютъ на ней въ день 6000 трубъ 2½ дюйм. въ діаметрѣ. Ц. 28 фунт. стерлинг.




Рис. 120.

2) *Вайтинда* (рис. 121) тоже прекрасная машина, но одиночная; 2 рабочихъ приготавливаютъ на ней отъ 4 до 5000 двухдюйм. трубъ. Ц. 175 талер. 3) *Вильгельма*, на которой работникъ съ 2 мальчиками приготавливаетъ въ 10 ра-




Рис. 121.

бочихъ часовъ до 8000 однодюйм. трубъ. Ц. 125—136 тал. 4) *Финнера* (рис. 122). Для малаго производства, 2 работн. приготавливаютъ на ней въ день отъ 2500 до 3000 1½ дюйм. трубъ. У Эккерта въ Берлинѣ стоитъ 25 талеромъ. Всѣхъ 50 пудовъ.

Правда, изъ приведенныхъ выше расчетовъ оказывается, что матеріалъ каменныхъ дренажъ и укладка его стоятъ дороже матеріала дренажъ изъ гончарныхъ трубъ и ихъ укладки; но во многихъ мѣстностяхъ Россіи, гдѣ камня много, какъ напр. въ Псковской, Новгородской губ., эти цифры могутъ очень сблизиться, особенно если принять во вниманіе, что устройствомъ каменныхъ дренажъ можно принести еще другую пользу полямъ—освободить ихъ отъ камней. Дренажъ изъ цилиндрическихъ гончарныхъ трубъ очень проченъ; въ прочности съ ними могутъ сравняться развѣ каменные дренажъ, которыя могутъ прослужить до 50

лѣтъ; менѣе прочны деревянные и фашинныя (изъ ольховыхъ фашинъ) могутъ прослужить 6—8 лѣтъ); наименѣе же прочны дерновые, торфяныя и плужныя дренажъ, которыя требуютъ возобновленія черезъ 5—6 лѣтъ. Дренажъ изъ гончарныхъ трубъ, исчисленные своей прочностію, лучше предохраняютъ протоки отъ засоренія обвалами земли; гораздо хуже дѣлаютъ это дренажъ изъ мелкаго камня и особенно плохо — торфяныя, дерновые и плужныя; онѣ неподвержены поврежденію мышами и кротами, тогда какъ отъ этого чрезвычайно страдаютъ дерновые, торфяныя и фашинныя; въ нихъ не такъ легко проникаютъ корни растений, между тѣмъ какъ отъ этого особенно страдаютъ дерновые, торфяныя и плужныя; онѣ наименѣе замостятся иломъ, которымъ легко засоряются дренажъ изъ мелкаго камня, плужныя, фашинныя, торфяныя и дерновые. Дренажъ изъ цилиндрическихъ гончарныхъ трубъ, сравнительно съ массой матеріала потребнаго для ихъ изготовленія, даютъ наибольшую площадь внутренняго сѣченія воднаго протока, представляютъ наименьшее сопротивленіе движенію воды; почему, при одномъ и томъ же уклонѣ и одной и той же площади поперечнаго сѣченія протока, онѣ менѣе засоряются другими родами дренажъ позволяютъ водѣ осажждать взмученныя части и закладывать протоки. Въ этомъ отношеніи особенно дурны дренажъ изъ мелкаго камня и фашинныя, для хорошаго дѣйствія которыхъ необходимъ уклонъ не менѣе 0,006, и плужныя, которыхъ уклонъ зависитъ отъ естественнаго паденія дренажуемой площади. Наконецъ, дренажъ изъ гончарныхъ трубъ весьма удобны для глубокой закладки въ землю; наименѣе удобны въ этомъ отношеніи плужныя дренажъ, которыя не могутъ быть проведены глубже 2 фут.; на этой же глубинѣ земля промерзаетъ, вслѣдствіе чего, при оттаиваніи легко обваливается и засоряетъ дренажъ; къ тому же, весной дренажъ въ промерзшей землѣ долго не дѣйствуютъ. Вотъ, тѣ преимущества дренажъ изъ гончарныхъ трубъ, которыми обуславливается преимущественное, почти исключительное примѣненіе ихъ въ послѣднее время, хотя нельзя не замѣтить, что дешовизна дерева, камня, небольшіе размѣры дренажуемаго пространства, при трудностяхъ приобретенія гончарныхъ трубъ покупкой, могутъ сдѣлать рациональнѣе устройство и другаго рода дренажъ.




Рис. 122.

Но, чтобы дренажъ изъ цилиндрическихъ гончарныхъ трубъ дѣйствовали успешно, необходимо: 1) чтобы дренажъ были проложены по плану, составленному на основаніи тщательной нивелировки. Нивелировка должна опредѣлить достаточное число точекъ для того, чтобы, соединеніемъ точекъ равнаго возвышенія, получить горизонтальныя линіи h,h (рис. 123), которыми бы исполнѣны были на картѣ, какъ форма всей поверхности такъ и направленіе самаго большаго ея паденія. Дренажъ, по назначенію ихъ, могутъ быть: а) головныя k,k (рис. 123), которыя проводятся вдоль самой возвышенной, прямой или кривой, линіи участка; изъ которыхъ вода изливается




Рис. 123.

въ всасывающія дрены (рис. 123, s, s), спускающіяся отъ головныхъ внизъ; онѣ проводятся тогда только, когда необходимо перенять большое количество воды, появляющейся уже въ самой верхней части участка или притекающей съ выше еще лежащихъ участковъ или ключей. б) *Всасывающія* (рис. 123, ss) дрены, которыя проводятся параллельно между собой, вдоль наибольшаго паденія, перпендикулярно къ горизонтальнымъ линиямъ, и назначаются для принятія воды изъ головной дрены, всасыванія ея изъ почвеннаго слоя ближайшихъ къ нимъ мѣстъ и отвода внизъ, въ в) *собирающія* (рис. 123, abc, de и fg) дрены, которыя проводятся вдоль линій, по которой двѣ площади склонающіяся одна къ другой встрѣчаются и прерываютъ линію наибольшаго паденія, слѣдовательно въ нижней части участка, нѣсколько діагонально, такъ чтобы всасывающія дрены входили въ нихъ подъ нѣсколько острымъ угломъ; онѣ назначаются для отвода воды съ осушае-

маго участка въ ручей, прудъ, открытую канаву. Соединеніе всасывающей дрены съ собирательной дѣлается лучше всего помощью отверстій въ трубахъ, которыя продѣлываются молоткомъ, походящимъ на легкій, употребляемый каменщиками, съ острыми, насаженными съ одной стороны широкой, а съ другой — заостренной лопаткой; нижняя труба всасывающей дрены, продѣланная въ пѣй отверстіемъ, накладывается на такое же отверстіе, продѣланное въ соответствующей трубѣ собирательной дрены (рис. 124), такъ что вода изъ первой выливается прямо внизъ во вторую.




Рис. 124.

Всасывающія дрены, втекающія въ одну общую собирательную, составляютъ одну отдѣльную систему. Отдѣльныя системы должны, по возможности, соединиться между собой. Источникъ долженъ быть возможно меньше, такъ какъ слишкомъ большое число ихъ увеличиваетъ расходы на первоначальное устройство дренажа и послѣдующій присмотръ за нимъ. Устройство колодезей, которые прерываютъ собирательныя дрены и въ которые дрены входятъ ниже поверхности выходятъ изъ нихъ, для того чтобы вода могла осадить здѣсь взмученныя части, могутъ быть полезными для наблюденія (почему и называются *наблюдательными*), напр., количества воды вытекающей изъ той или другой системы или подъ особенными вліяніями погоды; могутъ даже, при извѣстномъ устройствѣ ихъ, обеспечивать и даже увеличивать правильное дѣйствіе дренажной сѣти; но такая польза ихъ въ рѣдкихъ случаяхъ въ состояніи окупить сопряженное съ ихъ устройствомъ увеличеніе стоимости дренажнаго осушенія;

2) Чтобы трубы укладывались на извѣстную глубину, въ зависимости отъ почвенныхъ и другихъ условий. Чѣмъ вязче почва, чѣмъ выше поднимается она волосную воду и чѣмъ ниже долженъ быть пониженъ уровень наземной и волосной воды, тѣмъ глубже должны быть уложены трубы. Трубы должны, конечно, укладываться на такую глубину, при которой онѣ неповреждаются обработкой и не достигаются, по возможности, корнями растеній и на которой почва уже болѣе не промерзаетъ; такъ какъ иначе, въ послѣднемъ случаѣ, дренажи могли бы разрушаться льдомъ, который, медленно оттаивая весной, холодила бы почву и препятствовалъ бы стоку по дренажамъ воды. Въ большей части случаевъ, укладку трубъ всасывающихъ дренъ на глубину 4 фут. можно считать съ одной стороны необходимой, съ другой — вполне достаточной. На слишкомъ вязкихъ, влажныхъ почвахъ, эта глубина можетъ быть, впрочемъ, съ пользою еще увеличена до 5 фут., а въ торфяныхъ, губчатого свойства почвахъ — даже до 6—7 фут. Глубина укладки трубъ собирательныхъ дренъ зависитъ отъ паденія поверхности участка и глубины укладки всасывающихъ дренъ.

3) Чтобы разстояніе между всасывающими дренами было соображено съ глубиной укладки трубъ, количествомъ воды, которое дренаи должны отводить, и большей или меньшей пропускательностью для воды почвы, въ которой онѣ проводятся. Чѣмъ глубже укладываются трубы (рѣдко глубже 4 фут.), тѣмъ болѣе протраство, съ котораго онѣ стягиваютъ воду, тѣмъ

больше можетъ быть расстояние между всасывающими дренами (рис. 100 стр. 322). Напротивъ, дренаи должны быть проведены тѣмъ ближе одна къ другой, чѣмъ больше количество воды, которое онѣ должны отводить, чѣмъ меньше проницаема для воды почва. Для ближайшихъ соображеній могутъ служить слѣдующія числа:

На почвахъ:	Наименьшее удаление одной дрены отъ другой.	Наибольшее
Грубозернистомъ, хрящеватомъ пескѣ	49,5 фут.	62,0 фут.
Желтосодержащемъ, грубозернистомъ пескѣ	43,5 »	49,5 »
Мелкозернистомъ, нѣсколько связномъ пескѣ	31,0 »	37,0 »
Глинистомъ пескѣ	37,0 »	43,5 »
Плотной, вязкой глины	25,0 »	31,0 »
Пластичной, жирной глины	18,5 »	21,5 »
Обыкновенной глины и суглинкѣ	31,0 »	37,0 »
Песчанистой глины и суглинкѣ	37,0 »	43,5 »
Жирной, прудовой почвы	18,5 »	37,0 »
Торфяной почвы	37,0 »	43,5 »
Известковой и мѣловой почвахъ	25,0 »	31,0 »

4) Чтобы длина всасывающихъ дренъ была сообразна со свойствами почвѣ и способностью ея разжижаться водою; чтобы она, въ предупрежденіе слишкомъ скорого засоренія дренъ, не превышала 90—100 сажень. Поэтому, при слишкомъ большихъ покатохъ слѣдуетъ предпочесть чрезмѣрному удлиненію всасывающихъ дренъ пересѣченіе ихъ на половинѣ диагональной головной и въ то же время собирательной дренаю, которая отводила бы воду въ сторону. Длина собирательныхъ дренъ зависитъ отъ мѣстности и количества отводимой воды.

5) Чтобы при опредѣленіи диаметра трубъ, которыя должны быть употреблены, было принято болѣе или менѣе вниманіе приблизительная оцѣнка наибольшаго количества воды, собирающагося въ извѣстное время на данномъ участкѣ. Таблицы, приведенныя въ приложеніи VII, могутъ служить пособіемъ для болѣе опредѣленнаго числоваго выраженія результатовъ такой оцѣнки. Для собирательныхъ дренъ необходимы трубы большаго диаметра, отъ 2 1/2 до 3 дюймовъ въ диаметрѣ и болѣе, чѣмъ для всасывающихъ дренъ, для которыхъ, на протяженіи, по крайней мѣрѣ, первыхъ 250 фут., можно довольствоваться однодюймовыми трубами; на протяженіи же ихъ свыше 250 до 350 фут. необходимы двухдюймовыя, а далѣе 350 фут. даже трехдюймовыя трубы. На слабыхъ грунтахъ предпочтительнѣе употребить трубы нѣсколько большаго диаметра, такъ какъ здѣсь, при возможности сдвиговъ, всегда возможно суженіе протока. Безъ нужды же слѣдуетъ избѣгать употребленія трубъ большаго, чѣмъ нужно, диаметра, такъ какъ труба, наполненная водою, менѣе подвержена засоренію. Если бы не было трубъ большаго диаметра, то можно замѣнить ихъ 2, 3 меньшаго диаметра, положенными: двѣ въ рядъ, а одна снизу или сверху ихъ; хотя во второмъ случаѣ трубы лежатъ прочіе, чѣмъ въ первомъ, но зато, въ то время, когда дрена проводить нечего, нижняя труба въ первомъ случаѣ можетъ быть наполнена водою и, слѣдовательно, менѣе подвергаться засоренію. Такая замѣна, впрочемъ, трубы большаго диаметра нѣсколькими трубами меньшаго диаметра представляется не неудобно, что, при одинаковой площади сѣченія воднаго протока въ обоихъ случаяхъ, вода течетъ медленнѣе по двумъ, тремъ трубамъ, чѣмъ по одной и, слѣдовательно, каждая изъ меньшаго диаметра трубъ засоряется скорѣе, чѣмъ одна большаго диаметра. Чѣмъ болѣе диаметръ трубы, тѣмъ толще должны быть ея стѣнки, для того чтобы

труба большаго диаметра имѣла одинаковую прочность съ трубой меньшаго диаметра. По Винченцу—у трубъ: 1, 1 1/2, 2, 3, 4, 5 и 6 дюйм. въ диаметрѣ толщина стѣнки должна быть: 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 и 1 1/8 дюйма.

6) Чтобы паденіе было вполне достаточно для того, чтобы вода, вступаящая въ дрена со вмученными въ ней частями чрезъ стыки трубъ, проносила по трубамъ мелкій песокъ и илъ и не позволяла имъ застрѣвать въ трубахъ и засорять ихъ. Поэтому, наименьшее паденіе, которое можетъ быть допущено для дренъ, составляетъ при трубахъ 1 1/4—1 1/2—2—3 и болѣе дюйм. въ диаметрѣ: 0,00174—0,00149—0,00104—0,00070. Наибольшее же, безопасное для прочности дренажа паденіе составляетъ 0,05.

7) Чтобы отводимая дренами вода имѣла водопріемникъ, въ который она могла бы стекать при достаточномъ паденіи; причемъ истокъ трубъ, залегающей въ землѣ, по крайней мѣрѣ, на глубинѣ 2 фут., находился выше уровня воды въ водопріемникѣ на 2—4 дюйма.

Канавы роются обыкновенно снизу вверхъ помощью особыхъ заступовъ, мотыкѣ и пещни (рис. 125—131 *); и, когда всѣ канавы дренажной сѣти




Рис. 125.

Рис. 126.

Рис. 127.

Рис. 128.

Рис. 129.

готовы, тогда начинается укладка трубъ сверху внизъ помощью особаго крюка (рис. 132). При укладкѣ трубъ отверстіе первой трубы, прилегающее къ сырой землѣ, во избежаніе засоренія, закладываютъ черепкомъ или плоскимъ камнемъ; а затѣмъ засыпаютъ одну трубу за другой, по мѣрѣ

*) Рис. 125, 126 и 127 представляютъ обыкновенныя заступы, различающіеся лишь размерами своихъ наконечниковъ: у 1-го длина наконечника 10 дюйм., ширина сверху 9 1/2, снизу 8 1/2 дюйм.; у 2-го: 12—8 1/2—6 1/2 и у 3-го: 14—6 1/2—4 1/2 дюйм.; они служатъ для рытья земли, при чемъ переходятъ отъ перваго къ третьему по мѣрѣ суженія канавы внизъ; для разрыхленія земли въ самомъ низу употребляютъ желобчатый заступъ (рис. 128); въ случаѣ же каменистости грунта—пещню (рис. 129). Для выгребанія земли употребляютъ лопаты мотыки (рис. 130 и 131). Изъ коихъ изображ. на рис. 131 называется лебединой шеей и, употребляется для выгребанія земли съ самаго дна. Такой полный наборъ лучшихъ англійскихъ дренажныхъ инструментовъ, съ присоединеніемъ къ нимъ крюка (рис. 132) для укладки трубъ стоитъ 18 талеровъ.




Рис. 130.




Рис. 131.

при глубинах: 4 5 6 7 и 8 фут.
1½—3½ 2—4½ 2½—5 3—6 3½—7½ зильбергрошей.

На основании приведенных выше данных на 1 моргенъ земли необходимо *всасывающихъ дренажъ*:

90 45 36 30 25½ 24 22½ и 20 погонныхъ руть
при 2, 4 5 6 7 7½ 8 и 9 футахъ разстоянія между
всасывающими дренажъ; или на одну десятину:
672 336 280 224 193,4 186,7 168 и 150 погон. саж.
при 25 50 60 75 85 90 100 112 фут. разстоянія между
всасывающими дренажъ.

Вырыть каналъ на пространствѣ одного моргена стоитъ, поэтому:

при глубинахъ изъ вѣ:	и при разстояніи между ними въ		
	6 фут.	12 фут.	18 фут.
4 фута	отъ 4½ до 10½	отъ 2½ до 5½	отъ 1½ до 3½
5 »	» 4½ » 10½	» 2½ » 5½	» 1½ » 3½
6 »	» 5 » 11	» 2½ » 5½	» 1½ » 3½

Укладка трубъ, которая выполняется лучше всего поденными рабочими, обходится отъ ½ до ¾ зильбергроша за погонную руту. *Надсмотрщикъ* или

ихъ укладви, землей, убеждаясь каждый разъ, что уложенная труба не сдвинулась съ мѣста и не образовалось никакого препятствія для стока воды. Многие дренаеры предлагаютъ оставлять въ сухую погоду выкопанныя каналы на нѣсколько дней открытыми, безъ укладки трубъ для того, чтобы боковые стѣнки канала лучше просохли на воздухѣ, потрескались и сдѣлались, вслѣдствіе этого, болѣе проницаемыми для воды.

Для вычисленія стоимости дренажныхъ работъ могутъ служить слѣдующія данныя, заимствуемыя изъ германской практики. Рытье канала вмѣстѣ съ засыпкой ихъ обходится за погонную сажень:

главный работникъ (дренажный мастеръ) получаетъ отъ ⅔ до 1 талера въ сутки.

На основаніи вышеприведенныхъ данныхъ относительно приходящагося на десятину числа погонныхъ сажень канавъ, легко вычислить количество необходимыхъ трубъ, полагая длину трубы въ 1 футъ. Расходъ на трубы для собираемыхъ дренажъ можно полагать приблизительно равнымъ расходу на трубы для всасывающихъ дренажъ.

Расходы на изготовленіе проекта (нивелировку, составленіе плана и черченіе) трудно опредѣлить впередъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Германіи принимаютъ слѣдующія величины этого расхода на 1 моргенъ:

при дренажѣ 1 2 3 4 5 6 и 7 и болѣе моргеновъ
2—2½ 1½—1¾ 1¼—1½ 1½—1¾ 1½—1¾ 1½—1¾ 1—1 талера.

Въ отношеніи общей величины расходовъ *выисеть* принимаютъ, что, при дренажѣ большихъ пространствъ, расходъ на прорытіе канавъ почти равенъ расходу на приобрѣтеніе трубъ. Все же правильное дренажъ обходится: при благоприятныхъ отъ 8 до 10, при среднихъ отъ 12 до 16 и при самыхъ тяжелыхъ условіяхъ отъ 20 до 30 талеровъ. У насъ, по немногимъ имѣющимся даннымъ, дренажъ десятины обходился отъ 45 до 120 руб. Возвысившаяся въ послѣднее время цѣна на трубы значительно увеличила расходы дренажъ.

По истеченіи известнаго числа лѣтъ, даже хорошо исполненный дренажъ всегда можетъ потребовать кое-гдѣ ремонта. Арендаторъ, да и самъ хозяинъ, долженъ своевременно исправлять ихъ, прежде нежелательнаго увеличатся. Это вовсе не такъ тяжело, какъ часто думаютъ. Съ помощію хорошаго плана и нѣсколькихъ канавъ, прорытыхъ поперекъ направленія дренажъ изъ мѣстности поврежденія, можно скоро найти дренажъ, а затѣмъ дальѣйшими раскопками и самое мѣсто поврежденія.

Дренажъ, вслѣдствіе полноты достигаемой имъ осушки, представляетъ много выгоды; дренажъ почва сравнительно съ недренажъ: скорѣе просыхаетъ весной, а потому допускаетъ болѣе раннюю обработку и заставляя ее; ускоренъ дозрѣваніе растений; обрабатывается долѣе осенью; менѣе подвергается озими вымерзанію; ускоренъ и усиливается дѣйствіе удобрень; дѣлаетъ возможной болѣе глубокую обработку и вообще облегчаетъ обработку, менѣе стѣсняя въ выборѣ времени для обработки; уменьшаетъ протяженіе открытых канавъ и водосточныхъ бороздъ; дѣлаетъ вовсе ненужными узкіе загоны; лучше провѣтривается; лучше сохраняетъ влажность въ сухое время, потому что вода глубже проникаетъ въ нее; наконецъ, очищается отъ сорныхъ травъ, любящихъ сырость, и ослабляетъ болѣзнь растений.

Но, какъ открытыми, такъ и закрытыми каналами можно не допустить до участка воды, можно удалить изъ почвеннаго слоя находящуюся уже въ немъ нажимную воду, до известной степени повысить уровень ее въ почвѣ; но нельзя удалить непосредственно водосной воды, которая удалится изъ почвы почти однимъ лишь испареньемъ (стр. 105) и которой избытокъ въ почвѣ тѣмъ не менѣе можетъ быть вреденъ для растенія, и тѣмъ болѣе вреденъ, чѣмъ болѣе влагоемкость почвы. Канавы могутъ только посредственно служить,

содействовать удалению водосной воды изъ почвы, открывая эту послѣднюю болѣе для доступа воздуха, увеличивая, следовательно, ея испаряющую поверхность тѣмъ, что осушенная почва, начиная у открытых канавъ отъ стѣнокъ этихъ послѣднихъ, у закрытыхъ же отъ мѣстъ засыпки ихъ, получаетъ болѣе или менѣе спясныя трещины. А такъ какъ закрытыя канавы могутъ прокладываться въ большемъ числѣ, чѣмъ открытыя, то и почва дренированная получитъ гораздо больше трещинъ, чѣмъ осушенная открытыми канавами; а потому закрытыя дѣйствуютъ на осушеніе почвы сильнѣе открытыхъ.

Въ случаѣ невозможности почему-либо примѣнить эти средства осушки, осушеніе почвеннаго слоя можетъ быть достигнуто отчасти узкими загонами и глубокой обработкой (см. ниже).

Удаление камней.

(Раздѣлка каменистыхъ почвъ.)

Первичныя почвы перѣдко, если не исключительно, то преимущественно состоятъ изъ камней и камешковъ различной, болышею частью, однако, незначительной сравнительно величины. Такія же почвы попадаются и между наносными, напр. рѣчные наносы въ верхнихъ частяхъ долинъ горныхъ рѣкъ. Но и между почвами, состоящими преимущественно изъ земляныхъ частей, встрѣчаются такія, въ почвенномъ слое и на поверхности которыхъ паходятся также различной величины камни, которыхъ число сравнительно не велико, но за-то величина ихъ достигаетъ иногда громадныхъ размѣровъ. Таковы скалы, выступающія въ почву, или валуны, (завислые камни), покрывающіе почву или даже зарывающіеся въ нее болѣе или менѣе глубоко (напр., въ Псковской, Новгородской губ.).

Очищеніе почвы отъ самыхъ мелкихъ камней, мѣльче, напр., куриного яйца, можетъ быть выгодно развѣ при возможности употребить камни, по близости очищаемого отъ нихъ мѣста, для шоссированія дорогъ или устройства каменныхъ дренъ (стр. 329). Большой же частью, такая преизобилующія камнями почвы выгоднѣе бываетъ обращать подъ мирящихся съ ними культуры, какъ-то: засадку плодовыхъ деревьевъ, виноградныхъ лозъ, даже хмѣли, если такая почва содержитъ, однако, достаточно землестылыхъ частей на известную глубину; или подъ засѣвъ травъ, что особенно выгодно на такихъ почвахъ тогда, когда возможно ихъ орошеніе. Впрочемъ, въ совершенномъ удаленіи мелкихъ камней не только нѣтъ никакой необходимости: но оно можетъ быть даже вредно (стр. 136—137), особенно для почвы, бедныхъ въ составѣ своихъ землестылыхъ частей питательными веществами растенія, которыя можетъ доставить вы-

встриваніе содержащихся въ нихъ камней. Удаленіе же болѣе крупныхъ камней всегда полезно и часто можетъ быть выгодно; оно производится различными способами, смотря по величинѣ камней и возможности употребить ихъ такъ или иначе.

Камни меньшей величины изъ заслуживающихъ уборки собираются руками *) и грузятся въ тачки или тележки, въ которыхъ отвозятся къ мѣсту складки ихъ въ кучу или употребленія ихъ въ дѣло. Если же это послѣднее далеко, а между тѣмъ другія неотложныя работы въ хозяйствѣ заставляютъ отложить отвозку камней до болѣе свободнаго отъ другихъ работъ времени въ хозяйствѣ, до перваго саднаго пути, то сбрасывающихъ собираемые камни въ кучу тутъ же на очищаемомъ участкѣ, если не имѣется въ виду сейчасъ же приступить къ обработкѣ участка, которой могли бы мѣшать эти кучи или, въ противномъ случаѣ, складываютъ камни въ кучи на окраинахъ участка, куда, смотря по разстояніямъ, спосать ихъ на носилкахъ или свозятъ въ тачкахъ. Для свозки большихъ камней употребляютъ особенную тележку—дроги, въ которыхъ къ поддушкамъ осей, помощью нѣсколькихъ длинныхъ колецъ, подвѣшивается рама, состоящая изъ двухъ крѣпкихъ брусьевъ, связанныхъ двумя поперечинами. Для нагруженія на нее камней, задняя часть рамы опускается на землю, такъ что камни сваливаются на нѣсколько наклоненную раму весьма удобно. По нагруженіи же, рама снова приподнимается въ задней своей части поворотомъ задней оси во втулкахъ колецъ на 1 оборота помощью рычага, котораго одинъ конецъ приделанъ къ задней подушкѣ, а другой, послѣ подъема рамы, привязывается къ передней подушкѣ. Когда нужно свалить камня, тогда передній конецъ рычага отводится назадъ, задняя ось дѣлая 1 оборота падаетъ, опускаетъ на землю задній конецъ рамы, съ которой, затѣмъ, весьма легко сгружаются камни. Для подъема слишкомъ тяжелыхъ камней и нагруженія ихъ на тачку или тележку можетъ быть употреблена машина Ричардсона, состоящая изъ трехъ крѣпкихъ 6-аршин. деревянныхъ рычаговъ, которые, поворачиваясь на желѣзномъ болтѣ, проходятъ сквозь верхніе ихъ концы, могутъ, смотря по надобности, раздвигаться болѣе или менѣе. Къ болту подвѣшена толстая желѣзная скоба, за которую заплывается помощью крюка сложный блокъ (полосасть) изъ трехъ верхнихъ неподвижныхъ и трехъ нижнихъ подвижныхъ блоковъ. Крюкъ, прикрепляющійся къ подвижнымъ, заплывается или за кольцо желѣзнаго болта, вдавливаемого въ подвижный камень, или за веревку, которой обматывается поднимаемый камень. Конецъ веревки, обходящей блоки, навивается на воротъ, котораго шипы вращаются въ гнѣздахъ, приделанныхъ къ разномѣстному вѣзлу. На каждомъ концѣ ворота имѣется по рукояткѣ для вращенія ворота пока не вытянется веревка; когда же начинаютъ поднимать камень, тогда воротъ вращается рычагами, которые всовываютъ въ дыры, сдѣланныя на концахъ ворота. На одномъ концѣ ворота сдѣлано зубчатое колесо съ храпомъ, который падаетъ на зубцы и не даетъ вороту вращаться назадъ. По поднятіи камня, подъ него пододвигаютъ тачку или тележку, на которую и опускаютъ камень. Наконецъ, очень большие камни, особенно если они глубоко уходятъ въ землю, какъ иногда большой величины валуны, разрываютъ пороховомъ **) или, накаливъ ихъ предварительно, а затѣмъ быстро охладивъ.

*) Для собиранія каменей употребляется американская машина Друмонда, оказавшаяся, однако, непрактичной.

*) Для разрыва порохов пробуриваются в камне, смотря по величине его, одну или несколько дыр, глубиной в 9—15 дюйм.; дыра, наполненная сперва на $\frac{1}{2}$ своей глубины порохом, по вставке в нее к одной из ее сто-

динъ, разбиваютъ молотами *) на части, которыя удаляются затѣмъ уже подобно меньшей величины камнямъ.

Убираемые съ разныхъ угодій камни, кромѣ названныхъ выше цѣлей, т. е. устройства дренъ и шоссепроваія дорогъ, могутъ быть употребляемы еще для складки изгородей вокругъ угодій (гранитныя изгороди въ окрестностяхъ Абердина въ Шотландіи) и для постройки (постройки изъ дикаго камня въ Ливляндской губ.). Если же для такихъ камней нѣтъ никакого полезнаго употребленія, тогда можно большіе камни зарывать въ землю на такую глубину, которая не препятствовала бы обработкѣ поля. Для этого стоитъ только подлѣ большаго камня вырыть ему такихъ размѣровъ, чтобы переваливъ въ нее камень, можно было засыпать его слоемъ земли не тоньше 1½—2 фут. Яма, образовавшаяся на мѣстѣ прежняго нахожденія камня, заравнивается землею помощію копной лопаты (стр. 327).

Удаленіе деревьевъ и кустарниковъ.

(Раздѣлка новыхъ мѣстъ изъ-подъ лѣса и паростника.)

Новыя мѣста изъ-подъ лѣса или кустарника раздѣляются различно, смотря потому, обращаются ли онѣ подлѣ постоянныя поля или съ нихъ берется известное число урожаевъ и затѣмъ онѣ снова запускаются подлѣ лѣса; смотря потому, какъ густо поросло раздѣляемое мѣсто деревьями или кустарникомъ и требуетъ ли лѣсная почва, для произведенія хорошихъ урожаевъ, болѣе или менѣе сильнаго удобренія золою; наконецъ, смотря потому, имѣетъ ли весь лѣсной матеріалъ или только известные сорта его большую или

роизводитъ и т. д., толщиной съ гусиное перо и такой длины, чтобы она на нѣсколько дюймовъ еще выступала изъ дыры концемъ, на которомъ находится дюймовое кольцо, забивается въ 1 дюймъ поверхъ пороха вязкой глиной, а выше мелкими смоченными кусочками кирпича, которые плотно вбиваютъ желѣзныя пестомъ и молотомъ, такъ что на верху остается лишь небольшое углубленіе. Послѣ этого выдергивается игла и оставленная ею небольшая дыра наполняется порохомъ, такъ чтобы этотъ послѣдній выполнялъ бы и небольшое углубленіе на поверхности буровой дыры. Наконецъ, на порохъ накладывается губка, которая зажигается съ удаленнаго отъ пороха конца. Какъ только это сдѣлано, рабочіе тотчасъ же должны отойти по крайней мѣрѣ на сто шаговъ отъ камня или еще лучше спрятаться за какой-либо предметъ, чтобы избѣжать пораненія разлетающимися осколками. Въ предупрежденіе этого послѣдняго весьма хорошо покрывать дыру явовой плетенкой (6 фут. кв.), посреди которой, продѣлывается сдѣлываемое жестію отверстіе для прохода снѣга.

*) Камень облаживаютъ горючимъ матеріаломъ, который жгутъ до раскаленія камня, когда обиваютъ холодной водою и затѣмъ разбиваютъ молотами: или сжигаютъ горючій матеріалъ, которымъ наполняютъ выдолбленную въ камнѣ дыру выскобланнымъ доломъ, глубинъ (Америка), и когда камень достаточно раскалится, льютъ въ дыру, очистивъ ее предварительно отъ горючаго матеріала, холодную воду; камень трескается.

меньшую цѣнность. Въ зависимости отъ этого, такія мѣста раздѣляются помощію огня или безъ огня, съ корчеваніемъ или безъ корчеванія.

Если поросшее деревьями или кустарникомъ мѣсто раздѣляется помощію огня, т. е. готовится *огнище* или *пало*, то, при раздѣлкѣ изъ-подъ лѣса, иначе, при приготовленіи такъ называемаго *ляда*, лѣсъ рубится весной, когда деревья одѣнуты листомъ, причемъ сначала валить крупныя деревья, а потомъ подрубаютъ и молодякъ, стараясь рубить по возможности ближе къ корню, чтобы свободно могла проходить между пнями борова. Если, затѣмъ, предполагается сжечь все срубленное на мѣстѣ, то срубленные деревья раскладываютъ по расчищаемому мѣсту, обращая вершинами въ одну сторону, и застилавая ихъ, по возможности, ровно всю новину; на большія же безлѣсные мѣста бросаютъ вершины и сучья, обрубленные съ близъ лежащихъ деревьевъ и, даже, въ случаѣ недостатка для этого лѣснаго матеріала съ самаго расчищаемаго мѣста, навозятъ съ другаго мѣста сухаго лѣса или хвороста и раскладываютъ его на длинныхъ жердяхъ. Если же срубленный лѣсъ представляетъ цѣнный строевой, подлѣочный или дровяной матеріалъ, то, осенью, лядо *тербятъ*, т. е. обрубаютъ съ поваленныхъ деревьевъ сучья и вѣтви, выбираютъ, что годно для постройки или разныхъ подлѣлокъ или на дрова, и свозятъ это съ лядо по первому саимому пути, когда еще не глубоко снѣгъ; оставшіеся же хворостъ сносятъ въ кучи или такъ называемыя *костры*, въ которыхъ онъ и остается до весны. Такъ какъ костры хвороста слезаются подлѣ давлениемъ снѣга, то ихъ разваливаютъ раннею весною помощію смыка-бороны или граблей; а когда хворостъ или вообще оставленный для сжиганія древесный матеріалъ совершенно просохнетъ, зажигаютъ его и жгутъ до тѣхъ поръ, пока земля не прогоритъ надлежащимъ образомъ или не будетъ достаточно покрыта золою. Если бы сожигалось все срубленное, то не перегорѣвшія деревья, оставшіеся послѣ огня, или убираютъ или рубятъ и собираютъ въ валы на худо прогорѣвшія мѣста или цѣлизны, а потомъ, когда все высохнетъ, зажигаютъ вторично. Чѣмъ раньше погода позволяетъ приступить къ выжиганію, тѣмъ лучше для посѣва, который на ровно выжженныхъ мѣстахъ производится безъ всякаго приготовленія почвы, прямо по охладившейся гарѣ и только, послѣ разсѣва, сѣмена заваливаются бороной-смыкомъ. Если же лядо вышло не черное, а *пестрое*, съ необгорѣлыми плѣшинами, то такія мѣста перепашиваются до засѣва ихъ. Такія ляды засѣваются на сѣверъ ячменемъ или рѣпой, нѣсколько южнѣе, кромѣ ячменя, озимой и яровой рожью, льномъ и еще южнѣе даже яровой пшеницею. При этомъ, льномъ засѣвается преимущественно новъ изъ-подъ мелкаго 10—15 лѣтнаго березняка; рожью—изъ-подъ хвой-




Рис. 134.

выползший конец его б не приблизится к дереву на столько, что пятый рабочий успевает вложить крюк с цепи а в следующее звено 3 цепи к; после этого снова слезает движение конца рычага а к дереву, вынуте крюка ж из звена 2 и перемещение его в звено 4 и т. д.; подобное попеременное движение рычага к дереву и обратно и постепенное попеременное перемещение крюков цепи рычага из нижних, т. е. ближайших к концу * звеньев длиной цепи в верхние, продолжается до тех пор, пока большая часть корней дерева не будет выдернута из почвы и, вследствие этого, ствол дерева представит такое ничтожное сопротивление при валке дерева, что эту последнюю можно произвести уже помощью подрубаемых более толстых корней и непосредственного притягивания его к земле канатом м и цепью к л. На плотной глинистой или каменной почве бывает необходимо предварительно очищать от земли и отдельно обрубить горизонтально, более длинные корни. Во всяком же случае полезно предварительно валки или подрубить боковые корни, распространяющиеся в верхних слоях, со стороны, в которую валится дерево; так как иначе эти корни, при валке дерева, только сгибаются и удерживают таким образом пень в земле; или же подкапывать со стороны, в которую валить дерево, в расстоянии одного или двух шагов от этого последнего, бревно или небольшой отрубок ствола, или же подставку из поклажи положенного поперек на два других поклажи, для того чтобы ствол, ударяясь, при своем падении, нижней частью о такое препятствие, легче вырывал свои корни из почвы. Имевшиеся данные показывают, что на валку Швейцарским древовалам одного словаго дерева было употреблено, при четырех рабочих, от 22 до

36 минут, при диаметре древесного ствола на высоте человеческого роста от 9 до 15 дюймов; на палку же 18 дубовых деревьев, толщиной вблизи поверхности земли, от 1 до 4 фута, росших на плотной глинистой почве, было употреблено, при 6 рабочих, 1 день; причем рычагом действовало 2 человека, но было бы достаточно даже одного; на подготовительные работы — снятие верхнего покрова почвы на расстоянии 2—4 фута. вокруг валимых деревьев, подрубка и снятие более толстых боковых корней и взрыхление почвы около корней до 1 фута, — от 9 до 12 рабочих дней.

Для корчевания пней можно употребить очень простое орудие, состоящее из рычага — бревна в 6—7 арш. длины и 3 вершка в диаметре, с жестяною ланкою на конце. При употреблении его, подводят ланку под пень, и, подложив под рычаг планку, нагибают другой конец рычага кверху силой, напр., трех налегающих на него рабочих. Действуют рычагом постепенно, покачивая пень, а не вдруг, между тем как выступающие корни ни подрубаются особыми работниками. При значительной величине пня

можно употребить сразу два рычага; или же действовать на отдельные, предварительно подрубаемые корни рычагом, на конец которого крюк (рис. 135) и который, для удобства перевозки всего снаряда, имеет планку, опертую на подушку оси двухколесного хода. Далее для корчевания пней, равно как и для валки цепных деревьев, можно пользоваться обыкновенным домкратом, особенно если он имеется уже в хозяйстве для какой либо цели. Для этого необходимо, подрубить вокруг дерева или пня боковые корни и, выбрав более толстый из них, продеть под него жестяную цепь




Рис. 135.




Рис. 136.

съ крюкомъ на одномъ концѣ и, обтянувъ ею длинный деревянный рычагъ, зацепить крюкъ на одно изъ звѣзцевъ цѣпи. Конецъ рычага, ближайшій къ цѣпи, кладется на поставленный въблизи дерева или пня домкратъ, а другой упирается въ землю, какъ это видно на рисункѣ 136. При дѣйствіи домкрата *) конецъ рычага будетъ постепенно повышаться, выдергивая при этомъ изъ почвы привязанный къ рычагу корень. Еще проще орудіе, изображенное на рис. 137 и состоящее изъ желѣзнаго, дугообразнаго изогну-




Рис. 137.

таго крюка, около 1—1½ фут. длиной, съ тупымъ остриемъ на одномъ и кольцомъ на другомъ концѣ. Въ это кольцо вѣдетъ другое желѣзное кольцо, 4—5 дюйм. въ діаметрѣ, насаженное на деревянный рычагъ 14—15 фут. длины и толщиной: въ томъ концѣ гдѣ надѣто кольцо 4—5 дюйм., а въ противоположномъ—3 дюйм. Чтобы кольцо не соскакивало съ рычага, оно прикрѣплено въ послѣднемъ помощію желѣзной скобки K. Орудіе это употребляется такъ: окопавъ вокругъ пня и обрубивъ верхніе горизонтальными корнями его, привязываютъ къ пню рычагъ, въ приблизительно горизонтальномъ, или даже нѣсколько наклонномъ положеніи (конецъ e долженъ быть приподнятъ вверхъ; и, вставивъ конецъ крюка s въ углубленіе, выдолбленное въ пнѣ топоромъ, поворачиваютъ рычагъ силою одного или двухъ рабочихъ въ направленіи показанномъ въ рисункѣ стрѣлкой, т. е. удаляя конецъ его e отъ пня, отчего пень приходитъ въ вращательное движеніе вокругъ своей вертикальной оси, а стержневой, равно какъ и боковые, глубоко infil-дующіеся въ почву корни обрываются; такъ что пень дѣлается совершенно свободнымъ и легко можетъ быть вытаснутъ изъ ямы при помощи рычаговъ и веревокъ. Пни толщиной въ 5—10 дюйм. легко выкорчевать однимъ подобнымъ орудіемъ, но для пней 20 и болѣе дюймовъ необходимы два такихъ орудія, при чемъ для особенно толстыхъ пней размеры рычага, крюка и скобки должны быть увеличены. Желѣзные части этого орудія вѣсятъ отъ 7 до 18 фунт., смотря по размерамъ, и стоятъ у насъ приблизительно отъ 1½ до 3½ руб. Слѣдовательно, это самое дешевое корчевальное орудіе. Наконецъ, для корчеванія пней съ выгодой можетъ быть употребленъ также швейцарскій хреновалъ: слѣдуетъ только обрубить всѣ мелкіе, боковые, горизонтально растущіе корни, по возможности, поближе къ пню, кромѣ особенно толстыхъ, за которые постепенно прикрѣпляется конецъ длиннаго каната хреновала, и, послѣ установки послѣдняго совершенно также

*) Въ Московской конторѣ г. О. Юхима и К. патентованные домкраты Галлея стоятъ: № 1 для подъема тяжести до 125 пуд.—60 руб.; № 2 на 250 пуд.—70 руб.; № 3 на 370 пуд.—80 руб. и № 4 на 500 пуд.—90 руб.

какъ и при валкѣ цѣпныхъ деревьевъ, при чемъ, однако, часть длиннаго каната лежитъ или только касается плоскости распила ствола (рис. 138),—дѣйствовать имъ какъ и при валкѣ деревьевъ, пока эти корни одинъ за другимъ не будутъ выдернуты изъ почвы, а пень, слѣдовательно, не будетъ выкорчеванъ.

Чтобы облегчить корчеваніе особенно толстыхъ пней, необходимо предварительно расколоть ихъ на части помощію клина и топора, или, еще лучше, если пни плохо колятся, разорвать ихъ пороховъ. Для этой послѣдней цѣли употребляютъ особеннаго рода буравъ съ полымъ каналомъ внутри, пачкастый подъ названіемъ взрывочнаго винта. Набуравивъ предварительно дыру, лучше всего съ боку пня, на всю ось въ глубь и въ срединѣ его, сперва закла-




Рис. 138.




Рис. 139.

дываютъ въ нее патронъ, съ 12—24 золотниками пороха, смотря по толщинѣ пня, а потомъ ввинчиваютъ взрывочный винтъ помощію рукоятки, надѣваемой на верхнюю четырехугольную часть винта (Кепана); послѣ этого въ каналъ винта насыпаютъ немного пороха, черезъ верхнее отверстіе его, и вводятъ штанинъ (ракетку), зажегши который, отходятъ на дальнѣе отъ пня, лучше всего за дерево или какой-либо другой предметъ. Рис. 139 представляетъ взрывочный винтъ Фрибелла съ опущеннымъ, рис. 140—его же съ взведеннымъ куркомъ. Помощію деревяннаго бруска, вставленнаго въ кольцо винта e, винтъ, котораго валъ наполненъ пороховъ, ввинчивается въ набуравленную предварительно дыру пня и затѣмъ курокъ помощію прикрѣпленнаго къ нему шнура, спускается и, ударяя о пистонъ надѣтый на капсуль, разряжаетъ винтъ *). Вмѣсто этого вѣта, представ-




Рис. 140.

*) Механикъ Майеръ въ Тангеймѣ близъ Донаушингена изготавляетъ весьма хорошіе взрывочные винты по 4 талера за штуку. Винтъ долженъ быть необходимо испытанъ.

ляющаго нѣкоторыя выгоды, если онъ только достаточно проченъ, можно общепотребительнымъ для этой цѣли англійскимъ буровымъ пробуровать въ нѣтъ, снаружи его, нѣсколько наклонно къ основанію, каналъ—шириною 1—1½ дюйма и глубиною 1½—2 фута, наполнить его крупнымъ порошкомъ въ количествѣ опредѣляемомъ толщиною нѣтъ, потомъ закрыть отверстие канала пескомъ, мелкими древесными частицами, пылутиками буровымъ, или деревянной пробкой. Для образованія заливательнаго канала, т. е. свободнаго сообщенія извнѣ къ пороку, слѣдуетъ, въ первыхъ двухъ случаяхъ, плотно прижать къ верхней сторонѣ канала, выбурываемаго въ нѣтъ, толстую желѣзную проволоку и, наполнивъ каналъ пескомъ или мелкими древесными частицами, осторожно вынуть ее; при употребленіи же деревянной пробки слѣдуетъ вдоль послѣдней, съ боку, желобообразное углубленіе. Варить пороха въ каналѣ можетъ быть произведенъ двоякимъ образомъ: или посредствомъ заливательной нити, проходящей снаружи нѣтъ во внутрь наполненной пороховомъ части канала, или при помощи такъ называемой *ракеты*; послѣдняя состоитъ изъ длинной тонкой бумажной трубки, покрытой внутри слоемъ мелко пестертаго мокраго пороха, легко воспламеняющейся отъ введенія по внутрь ея горящей свѣчки или лучины и разбрасывающей при этомъ, по направленію своей длины, многочисленныя искры. Если вложить такую ракетку въ пробуранный каналъ нѣтъ надъ пороховъ и зажечь ее, то послѣдуетъ взрывъ пороха и раздробленіе нѣтъ на части.

При раздѣлкѣ нови, на которой нѣтъ стоятъ очень рѣдко, можно, безъ корчеванія, приступить къ посѣвамъ или запускать ее подъ траву въ ожиданіи, что нѣтъ и корни со временемъ поднижуютъ, такъ что или сами разрушатся или же возможно будетъ извлечь ихъ сравнительно съ малымъ трудомъ; при болѣе же густомъ стояніи нѣтъ, необходимо корчеваніе. По очищеніи нови отъ деревьевъ и ихъ большихъ корней, необходимо выровнить поверхность, для чего можетъ служить отчасти копая лопата (стр. 327 рис. 108), и затѣмъ смѣшивать покрывающіе лѣсную почву органическіе остатки (лѣсной соръ, перегной) съ верхнимъ слоемъ почвы посредствомъ паханія и боронованія или, въ крайнемъ случаѣ, взматыванія. Такое мѣсто всего удобнѣе засѣять овсомъ или, въ видахъ одолженія между прочимъ сорныхъ травъ, гречей или картофеля, при употребленіи для посадки послѣдняго жютики. Для очищенія почвы отъ сорныхъ травъ, оставшихся въ ней болѣе мелкихъ нѣтъ и корней, какъ деревьевъ такъ и кустарниковъ, весьма хорошо глубоко (вершковъ на 6) перепахать такое мѣсто помощію крѣпкаго плуга (напр. стр. 286 рис. 30).

Удаленіе растений образующихъ дернъ.

(Раздѣлка задерѣвыхъ мѣстъ.)

Раздѣлка задерѣвыхъ мѣстъ различна, смотря потому, какого рода растенія образуютъ дернъ въ зависимости отъ большей или меньшей влажности почвы въ мѣстѣ ихъ произрастанія, отъ количества растительной массы, которую эти растенія примѣшиваютъ

къ почвѣ, и отъ глубины слоя почвы, къ которому примѣшиваютъ они свои остатки, иначе—который проникается ими. Раздѣлка новей этого рода можетъ быть раздѣлкой собственно задерѣвыхъ мѣстъ или осушенныхъ зеленыхъ и торфяныхъ болотъ (стр. 95), хотя главную или, по крайней мѣрѣ, значительную часть растительности нови послѣдняго рода составляютъ не злаки, образующіе собственно дернъ своими болѣе или менѣе ползучими подземными частями стебля, но мхи, верескъ, ситовники и т. д. Дерновая растительность или связываетъ земляныя части почвы своими подземными частями, которыя затрудняютъ обработку и, отрастая, при своей живучести, могутъ засорять воздѣлываемыя растенія, или, примѣшивая къ почвѣ въ большомъ количествѣ свои остатки, дѣлаетъ почву несоответствующей потребностямъ воздѣлываемыхъ растений по ея физическимъ свойствамъ и чрезмѣрной бѣдности минеральными составными частями. Поэтому, задача раздѣлки такихъ полей заключается въ возможно скоромъ и болѣе или менѣе полномъ удаленіи дерновой растительности истребленіемъ всей или большей или меньшей части органическаго вещества, или переводомъ этого послѣдняго въ перегной, который легко могъ бы быть смѣшанъ съ почвеннымъ слоемъ.

Первое достигается помощію огня. Дерновая растительность выжигается или вмѣстѣ съ большимъ или меньшимъ количествомъ земляныхъ частей, которыя она связываетъ, или же, по возможности освобожденной отъ этихъ послѣднихъ. Въ первомъ случаѣ она выжигается въ видѣ поднятаго плугомъ пласта или въ видѣ кусковъ дерна, остающихся на мѣстахъ, на которыхъ они сѣяны, или сложенныхъ въ круглыя или продолговатыя внутри кучи.

При выжиганіи дерна въ пластахъ или кускахъ остающихся на мѣстахъ сѣзки, осенью или весной, перепахиваютъ новъ плугомъ на глубину 4—8 дюйм. смотря по количеству золы, которое желаютъ получить при этомъ. Здѣсь неважно хорошее опрокидываніе пласта; для лучшей просушки дернины, даже хорошо, если пласть становится почти на ребро. Если погода стоитъ сухая, то въ апрѣлѣ или маѣ можно уже приступить къ выжиганію пласта, поднятаго съ осени, а въ іюлѣ, августѣ и сентябрѣ—поднятаго весной. Для этого зажимаютъ дернину въ какомъ либо мѣстѣ и, затѣмъ, поднижались противъ вѣтра, разбрасываютъ все дальше и дальше горящую дернину, чтобы такимъ образомъ зажечь дернину на всемъ пространствѣ. По исчисленіи 16—24 часовъ пласть, если онъ только былъ сухъ, перегораетъ вполне. Если бы же пласть, при влажной погодѣ, не могъ достаточно хорошо просохнуть въ такомъ положеніи, то его разсѣкаютъ мотыкой на куски, которые для просушки составляютъ по два или по три мѣста. Въ такомъ положеніи дернина при теплой, вѣтряной погодѣ просыхаетъ въ теченіи 8 дней такъ хорошо, что перегораетъ вполне. При влажной же погодѣ необходимо сорвать куски въ небольшойя кучки, которыя зажимаются какъ только онѣ достаточно просохнутъ, полученную такимъ образомъ золу разбрасывать, разбираиваютъ и мелко запахиваютъ.

При выжиганіи дерна въ кучахъ, или такъ называемой раздѣлкѣ помощію *кубышей*, для варѣлки дерна употребляется плугъ, если новъ ровна не пред-

ставляет препятствій, подобных камням, пням, и къ тому же довольно обширна. Пригодный для этой цѣли плугъ долженъ быть устойчивъ, сафдовательно, съ длинной и широкой подошвой, съ передкомъ или подошвомъ, съ двумя ручками, чтобы легче было управлять его въ случаѣ встрѣчи имъ сплывшихъ корней въ почвѣ; съ плоскимъ, острымъ лемехомъ, который подрѣзываетъ пластъ 10 — 11 дюйм. ширины; съ острымъ, лучше всего, круглымъ обрабатывающимся рѣзцомъ; съ отлогимъ хорошо отворачивающимъ пластъ отваломъ. Отвороченный такимъ плугомъ пластъ разбивается затѣмъ на куски мотыгой или, если поверхность дерна равна и свободна отъ такихъ препятствій, какъ камни, пни, копки, даже тяжелымъ, педлиннымъ каткомъ, на поверхности котораго находятся ножи 3 — 4 дюйм. длины, размѣщенные такъ, что, при движеньи катка поперекъ пластовъ, они разрѣываютъ пласты по линиямъ, удаленнымъ одна отъ другой на 1—1½ фута. Впрочемъ, если предварительно разрѣзать дернъ вертикально скарификаторомъ *) на полосы равной ширины, то затѣмъ можно употребить плугъ безъ отвала и рѣза съ однимъ лишь широкимъ лемехомъ и заостренной нѣсколько стойкой, исполняющей роль ножа; такой плугъ, пускаемый поперекъ прорѣзанныхъ скарификаторомъ линий, подрѣзаетъ дернъ, поворачивая его, горизонтально и вертикально, такъ что куски дерна могутъ быть затѣмъ перемѣнены по желанію.

Если же поле не равно, покрыто камнями, пнями или не столь обширно, тогда необходима или возможна срѣзка дерна ручными орудіями: обыкновенными хорошиими заступами и мотыгами, или же особенными заступами (лопатами), вилами, рѣзаками и мотыгами. Лучшія орудія для снѣжки дерна англійскія: рис. 141 представляетъ лопату съ заостривающимся наконечникомъ, что облегчаетъ дѣйствіе его. Рис. 142 и 143 представляютъ лопаты съ загнутымъ



Рис. 141.



Рис. 142.




Рис. 143.




Рис. 144.

краемъ, такъ что ими дернъ отрѣзывается не только горизонтально, но и вертикально съ одной стороны, причемъ первая толкается впередъ однимъ ра-

*) Для этой цѣли лучше всего скарификаторы съ ножами, укрѣпленными въ балку въ одинъ рядъ. Скарификаторъ стоитъ, напр. у Лильона и Рау въ Варшавѣ, отъ 48 руб. (безъ колесъ) до 62 руб. (съ колесами).

ботникомъ, а вторая — двумя, которые налегаютъ грудью на имѣющіеся на рукояткѣ этой лопаты углубленія, между тѣмъ какъ третій тащитъ ее за веревку, прикладываемую къ кольцу дерева. Рис. 144, наконецъ, представляетъ лопату съ загнутымъ съ трехъ сторонъ краемъ наконечника, такъ что дернина подрѣзается ею горизонтально и вертикально съ двухъ сторонъ. Рис. 145 представляетъ дерновой вожь, которымъ дернъ можетъ нартзаться вертикально, а рис. 146 — лопату для горизонтальной подрѣзки дерна. Вместо лопаты можно употребить подобно имъ устройство пилы, которая легче лопату проникаетъ въ дернъ. Кромѣ мотыги, изображенной на рис. 9, можно употребить еще для срѣзки дерна мотыку съ болѣе широкимъ наконечникомъ (рис. 147).

Куски дерна нартзаются различной толщины, ширины и длины. Чѣмъ толще куски, тѣмъ полѣе истребляются предьяныя растенія и тѣмъ болѣе получается зола. Обыкновенно вхоитъ достаточно 6 дюйм. толщины; но, въ случаѣ небольшой глубины дерноваго слоя, дополняются даже 3 дюйм. толщиной. Куски рѣжутся такой длины и ширины, чтобы травянистая поверхность ихъ имѣла отъ 1 до 1½ кв. фута. Нартзаные куски дерна, для просушки ихъ, остаются лежать на мѣстѣ сперва въ теченіе нѣсколькихъ дней, обращенными травой внизъ, а затѣмъ перевороченными травой вверхъ, чтобы дать замершей дернинѣ окончательно засохнуть на солнцѣ; или складываются, по 4—6 вмѣстѣ, одинъ на другой, такъ какъ при этомъ лучше замораиваетъ дернина; или еще лучше составляются по два вмѣстѣ крышеобразно (рис. 148). Наконецъ, куски дерна, по достиженіи ими надлежащей сухости, складываются въ кучи.

Круглыя кучи (рис. 149) устраиваются 3—4 фута вышины и фут. 3 въ діаметрѣ съ небольшимъ отверстіемъ (поддувало) внизу съ подвѣренной стороны. Поддувало перекрывается поперечнымъ брускомъ для поддержанія



Рис. 145.




Рис. 146.




Рис. 147.



Рис. 148.




Рис. 149.

бренности торфяных болот; или, если масса остатков дерновой растительности, хотя и в меньшем значительном количестве, прилипает к тяжелой глинистой почве, которая сама улучшается от действия обжигания, а именно становится рыхлее, увеличивает содержание питательных для растений веществ (калий) в растворяемом состоянии и терветь, напротив, некоторые вредные для растений растворимые вещества, напр. соли закиси железа, которые разлагаются под образованием безвредного для растений, нерастворимого гидрата окиси железа (стр. 77—78). Но выжигание дерна, как уничтожающее органическое вещество, вредно на более легких, в особенности песчаных почвах, нуждающихся в перегнои для улучшения своих физических и химических свойств (стр. 148).

Выжигание дерна в гребнях применяется преимущественно на старых перелогах; в продолговатых кучах — при раздвиге луговой, залежной, длинной дернины с редкой кустарной порослью на глинистых и суглинистых, холодных почвах, содержащих мало органического вещества и нуждающихся для своего улучшения в обжигании плотной минеральной части их. С таких мест, раздвинутых выжиганием дернины, смотря по качеству почвы и обилию золы, которую удобряется при этом почва, берется от двух до трех урожаев без удобрения, напр. ржи, овса и еще раз овса, под который застилаются иногда травы; или льна и овса или пр. пшеницы и овса. Для дальнейшего употребления этих участков под полевые растения, необходимо бывает уже соответственное удобрение их; и в этих случаях полезно удобрить их ранее их истощения, следовательно по возможности по снятии первого, много второго урожая. Наконец, выжигание дерна в круглых кучах преимущественно, а в виде пласта или кусков, остающихся на местах срыбки, исключительно применяется на торфяных болотах.

Торфяные болота достигают нередко глубины 20—30 фут. и, залегая обыкновенно на глинистом слое, состоят внизу из смолистого торфа, иногда же и из полусгнившего тростника; затѣм, из черного торфа, в котором можно различить еще растительные остатки и, наконец, сверху из плотного ситеня еще мало разложившихся растений, большей частью мхов. Этот последний слой представляет большей частью желтую торфяную массу и покрывается слоем смолистого чернобураго перегноя, образовавшегося из вереска и некоторых других растений (стр. 94—95), которых поколения сменялись здесь в течение столетий. Такая глубина болота, при раздвиге их, прежде всего осушается проводом главной водоприемной и отводной канавы такой глубины, чтобы ее дно углублялось, но крайней мере, на 1½—2 фута в залегающий под ними земистый слой; если бы же такой канавы провести нельзя было по значительности глубины торфяного слоя или по невыгодности, то можно ограничиться проведением ее в 4—5 фут. глубины с надлежащим, конечно, падением. Затѣм перпендикулярно к

главной канавы проводятся каналы, глубиной 3 и шириной 3½ фута, на расстоянии 80—100 фут. одна от другой. Наконец, перпендикулярно к этим последним прокладывают канавы шириной 1½ и глубиной 1½—2 фут., в расстоянии 10—20 фут. одна от другой. Осушка обанчивается летом; осенью же приступают, при небольших пространствах, к выносу дерна; при более значительных пространствах, к поднятию плугом верхнего смолистого слоя на полную глубину его (6—8 дюйм.); но, если вереск, покрывающий место, слишком высок, то предварительно срезают его или скашивают и употребляют на подстилку; последнее на столько хуже перелога, что лишает почву, без того уже небогатую питательными для растений веществами, большого количества этих последних. При поднятии пласта плугом, лошадям подвязывают под погн деревянные лыжи, чтобы он не лез в болотистую почву. Поднятый мотыкой или плугом пласт оставляется так на зиму, в течение которой он разрыхляется; весной же пробороновывают его, или, в случае недостаточной его рыхлости, предварительно боронования, промотыживают его еще раз, но только мелко. Боронование, которое производится легкими боровами и в сухую погоду, продолжается до тех пор, пока пласт не просохнет до того, что может легко гореть. Тогда приступают к выжиганию, выбирая для этого преимущественно ветреную погоду и зажая почву соломой или горящим торфом с противоположной стороны и, подвигаясь против ветра, разбрасывают горящую массу желтыми лопатами все далее и далее вперед. В горящую еще золу высыпают гречиху и заборонивают ее. Греча родится на таких местах обыкновенно особенно хорошо. В сухую погоду, которая вообще мало благоприятна для такой операции, просушивают и срезают дерн в кучах (см. выше). Как в том, так и в другом случае почва может прогореть местами довольно глубоко. В предупреждение этого заблаговременно задерживают в канавах воду; так как иначе может прогореть почва до земляного слоя, что причиняет немалый вред. Поэтому уже самому горению лучше этого сжигание дерна в кучах. Такая обработка и посев гречихи повторяется в несколько лет сразу, до тех пор пока весь смолистый слой не выгорит, т. е. в течение 5—6 лет; так как почва прогорает при каждом выжигании не более как дюйма на 1½. При этом во второй и последующие годы, для обработки разрыхлившейся уже почвы, можно употребить желтыми 5-ти зубчатыми граблями, или плуг с мелкой вспашкой или даже одну борону. Когда же выгорит весь смолистый слой, тогда прекращают выжигание болота, так как слои, лежащие ниже смолистого, очень бедны минеральными частями, и, при помощи одного выжигания, не в состоянии производить скольконибудь удовлетворительных урожаев; и либо оставляют болото совершенно без дальнейшего вмешательства в течение которых оно, с помощью произрастающего на нем вереска, успевает образовать вновь слой смолистого торфа на своей поверхности; либо воздвигают его даже уже помощью удобрения его хитрым навозом или помощью навозки землей.

Торфяные болота меньшей глубины, от природы ли или вследствие вырзки части торфа на топливо или вследствие выжигания, могут быть раздвинуты в несколько иначе, особенно если они не глубже 1—1½ арш., состоят из мохового, легко сгорающего торфа и лежат на плодородном суглинистом или глинистом слое. В этих случаях (Финляндия, Олонецкая и Прибалтийская губ.) прокладывают также главную водоприемную и отводную канаву (рис. 151) и к ней, с одной или с обеих сторон, отбрасывают участки болота посредством канавы б. Если торфяной слой не глубокий, то эти канавы вырываются до земляного слоя; на более же глубоких болотах их




Рис. 151.

дѣлаютъ глубиной отъ 1 до 1½ арш. Они служатъ для того, чтобы воспрепятствовать просачиванію воды изъ остальной части болота въ раздѣливаемый участокъ. Затѣмъ, для болѣе осушки обведеннаго канавами участка, вырываютъ иногда еще менѣшья канавы *а*, въ разстояніи 25 фут. одна отъ другой, 1½—3 фут. глубины и 2 фут. ширины съ совершенно вертикальными стѣнками. По удаленіи деревьевъ, кустарника, корней и т. д. (стр. 342), которое облегчается здѣсь тѣмъ, что корни значительно выставляются изъ земли, вслѣдствіе осѣданія просыхающаго торфа, — болото, какъ только верхній слой просохнетъ на столько, что въ состояніи поднимать рабочій скотъ, вспахивается и затѣмъ выжигается или въ видѣ разборонованнаго пласта или въ кускахъ, сложенныхъ въ круги кучи.

Такимъ образомъ раздѣлиныя болота засѣваются въ первое время озимой рожью, по снятіи которой всякій разъ нѣсколько углубляютъ малыя канавы *а*, снова пахутъ и боронуютъ и поступаютъ какъ и въ первый разъ, высѣвая опять рожь. Такъ продолжается нѣсколько лѣтъ сряду, пока еще выжиганіе можетъ дать достаточно золы; а затѣмъ, когда выгоритъ верхній слой, засѣваютъ вмѣсто ржи менѣе прихотливый овесъ. Когда малыя канавы *а* своимъ дномъ достигнутъ материка, тогда со дна ихъ выкапываютъ землю, насыпаютъ ее на торфяной слой и перемѣшиваютъ ее съ этимъ послѣднимъ; это значительно улучшаетъ торфяную почву и отчасти замѣняетъ выжиганіе. Наконецъ, когда торфяной слой сдѣлается до того мелкимъ, что позволяетъ при паханіи захватывать материковую землю, тогда обыкновенно прекращаютъ дальнѣйшую обработку мѣста и обращаютъ его въ лугъ подѣвсомъ подъ послѣдній хлѣбъ трава. Для такого обращенія необходимо 10 и болѣе лѣтъ, въ теченіе которыхъ съ раздѣливаемаго болота снимаются урожаи ржи, пшеницы, ячменя, овса, гречихи, картофеля, рѣпы, ар. рапса, сурьпы, льна, мака, смотря по качеству болота.

Уничтоженіе дерновой растительности переводомъ ея органическаго вещества въ перегной, примѣняется преимущественно при раздѣлкѣ старыхъ перелоговъ, залежей, луговыхъ и выгонныхъ участковъ съ почвой не содержащей органическаго вещества въ из-

быткѣ; рѣже же при раздѣлкѣ торфяной дернины. Оно достигается или дѣйствіемъ однихъ обыкновенныхъ дѣателей разложенія: воздуха, влажности и теплоты, или же съ присоединеніемъ къ нимъ еще ускоряющихъ разложеніе веществъ.

Въ первомъ случаѣ поступаютъ различно: иногда перепашиваютъ осенью новъ, причемъ стараются какъ можно тщательнѣе обернуть дернину, употребляя для этого хорошій плугъ; у насъ же дѣлаютъ это обыкновенно сохой, которой предшествовать рѣзакъ, т. е. плужной рѣзецъ, прикрѣпленный къ сошнымъ обѣямъ. Весной, по пласту, пробороновать его, сѣютъ у насъ на сѣверѣ ленъ, овесъ подъ борону же; на югѣ пшеницу подъ рало или ленъ подъ борону. Подъ этими растеніями дернина разлагается на столько хорошо, что подготовленіе земли по снятіи ихъ подъ послѣдующее растеніе не представляетъ уже болѣе затрудненій. Этотъ способъ раздѣлки задернѣвшихъ мѣстъ простъ и въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ напр., при раздѣлкѣ нашихъ степныхъ ковыльныхъ пѣлинь, пока единственно возможный; но для успѣшности его необходимо, чтобы вспашка была произведена возможно тщательнѣе въ отношеніи оборота дернины и укладки пласта и достаточно глубоко, по крайней мѣрѣ на 3 вершка, если нельзя сдѣлать этого глубже, на 4—5 вершковъ, по мелкости ли хорошаго почвеннаго слоя или же по невыполнимости болѣе глубокой вспашки конными орудіями, какъ напр. на нашей ковыльной пѣлинѣ. Поднятый пластъ весьма хорошо принять тяжелымъ каткомъ вскорѣ по снятіи его, а весной, если первая вспашка была произведена не мельче 2½—3 вершковъ, обработать скоронашкой на глубину 1—1½ вершковъ, чтобы порыхлить землю и имѣть ее болѣе для болѣе полного и глубокаго прикрѣпленія сѣмянъ экипаторомъ или занчатой бороной. При возможности болѣе глубокой вспашки, напр. до 4 вершк., хорошо произвести вспашку плугомъ съ дернорѣзомъ (сѣмъ-кольторомъ), при которомъ возможно достигнуть болѣе ровной подготовки нашинъ безъ необходимости пахать пластами болѣе узкими, нежели этого требуетъ глубина вспашки для хорошей укладки пласта (стр. 275). Если бы же этого нельзя было достигнуть однократнымъ паханіемъ плугомъ съ дернорѣзомъ, то можно сперва вспахать новъ мелко на 1—1½ вершка, чтобы подрѣзать и обернуть дернину, затѣмъ, давъ дерну нѣсколько занять и просохнуть, раздробить его и освободить отчасти отъ земли скаррификаторомъ или бороной-скаррификаторомъ, а потомъ бороной, и, наконецъ, вспахать еще разъ глубже на 3—4 вершка. Конечно, эта послѣдняя обработка затруднительнѣе первой, требуетъ болѣе времени и болѣе работы, но въ обоихъ случаяхъ можно достигнуть скорѣе подготовки задернѣвшей почвы, чѣмъ, если вспахать дернину, ожидать ея разложенія прежде, нежели приступить къ дальнѣйшей разработкѣ новъ, особенно въ нашемъ сравнительно сухомъ климатѣ съ продолжительными зимами.

Для ускоренія разложенія дернины можно прибѣгать въ содѣйствіе азотистыхъ и щелочныхъ веществъ: навоза, золы, мергеля, извести, которыхъ примѣняются въ этихъ случаяхъ различно. Весной, обыкновенно, по окончаніи яровыхъ посѣвовъ, дернъ накрывается на новъ кусками и складывается по близости раздѣливаемой новы въ небольшія кучи, имѣющія видъ усѣянныхъ четырехскатныхъ крышъ съ основаніемъ въ 2 кв. саж., вышиной 5—6 футовъ и съ боками, наклоненными къ горизонту подъ угломъ въ 45°. При этомъ дернъ переслаивается или однимъ навозомъ—на 10 возовъ дерна отъ 1—3 возовъ навоза, смотря по степени разложимости дерна; чѣмъ труднѣе разложимъ онъ, чѣмъ суше дерновал растительность, тѣмъ болѣе навоза; или однимъ мергелемъ, или одной золой, или одной гашеной известью, или же нѣсколькими изъ этихъ веществъ, такъ, однако, чтобы въ этомъ по-

недешево, как показывает это следующий приблизительный расчет стоимости устройства жердевой, наиболее еще дешевой из деревянных изгородей, на протяжении 100 погон. саж., из колышек выш. 2½ арш. поверху земли, поставленных попарно на расстоянии 1½ саж. пара от пары и соединенных, как это употребительно в Московской губ., жердями в 5 рядов:

625 погон. саж. 10 арш. сосновых или еловых жердей,
считая в том числе и колья, по 3 в. за погон. саж. 18 р. 75 к.
Установка по 5 к. отъ погон. саж. 5 „ — „

Итого 23 р. 75 к.

Ежегодный же расход на 100 погон. саж. жердевой изгороди, полагая что жерди прослужат 10, а колья 5 лет, составит: 10% погашения, 10% с капитала и 2% ремонта, всего 22% первоначальной стоимости изгороди или 5 р. 22½ к. Жердевая, наиболее дешевая, а потому и наиболее употребительная из деревянных изгородей, могут служить только для ограждения скоту входа в огороженный участок или для удержания скота на нем. Вообще же, деревянная изгородь должна быть очень тщательно устроена и, при своей недолговечности, часто ремонтируема, для того чтобы исполнять свое назначение; при мало-мальски же небрежном устройстве и ремонтировании ея, она не только безобразна, но и плохо исполняет свое назначение.

Удобнее ея проволочная изгородь, которая устроивается из проволоки, натянутой в несколько рядов между вкопанными столбами. Для их устройства необходимы: во 1) проволока, которая берется различной толщины, обыкновенно одного из следующих восьми номеров: № 1 — 135, № 2 — 147, № 3 — 217, № 4 — 246, № 5 — 295, № 6 — 346, № 7 — 394 (½ дюйм. в диамет.) и № 8 — 590 фут. на пуд. Проволока, в предупреждение заржавления ея, или окрашивается *) или чаще употребляется galvanизированной. Пуд проволоки такой толщины стоит: неgalvanизированной — 3 р. 25 к., galvanизированной же — 4 р. за пуд. Проволока натягивается в три, четыре и больше, до семи рядов, при обыкновенной вышины изгороди в 4 фута поверху земли. Толщина проволоки и число рядов ея соображаются с необходимостью больше или меньше прочной и щитной изгороди. При толстой проволоке, для больше крутого скота натягивается меньшее число рядов проволоки, чем в противоположном случае. Для ягнят натягивают до 7 проволок, в том же числу по мере. 2) Столбы большей частью деревянные, лучше всего, конечно, сосновые или дубовые, 6 фут. вышины и 2 — 2½ вершк. в диаметр, которые вбиваются в землю на 2 фута, через каждые 9—12 фут. Столбы, по высоте их, просверливаются или снабжаются желѣзными ушками, по одному отверстию или ушку для каждой проволоки, через которые продевается проволока. Иногда, через каждые 250 фут. ставят по одному чугунному столбу для большей прочности изгороди. 3) Натяжные столбы, которые делаются в надземной своей части из желѣза, в

*) Для окраски, вместо масляной рекомендуют краску следующего приготовления: 5 лот. чистой хорошей резины растворяется осторожно в 10 лотах скипидара и 5 лот. макового масла на легком огне; в это прибавляется сперва 4 фунта мелко истертых цинковых белил, 5 лот. дымчатого лаку, 2 лота сусла и ¼ лота лавандового масла, а когда все это хорошо смешается, — столько макового масла, чтобы можно было наносить этот лак кистью. Так готовится лак для чистой окраски, для загрунтовки же можно приготавливать тот же лак, употребляя для этого вместо 5 лотов чистой резины 8 лотов резины старых резиновых галош.

подземной же — из чугуна. Верхняя часть столба имеет по длине прорѣз, в который устанавливается соответствующее числу проволок число валиков, расположенных по длине прорѣза один над другим. Каждый валик имеет на одном конце хранимое колесо с собачкой, на другом — четырехгранную ось, на которую, в случае надобности, надевается довольно крепкий ключ, подобный ключу для настройки фортепиано или для завода часов, для поворачивания валика и навивания на него проволоки; собачка удерживает валик от вращения назад. Такой натяжной столб, стоящий довольно дорого, — в Англии от 21 до 35 шиллингов, может быть заменен крепким деревянным столбом, который, подобно впрочем натяжным столбам вообще, подпирается со стороны противоположной натяжению проволоки, столбом ввинчиваемым в землю наклонно. В этом последнем случае для натягивания проволоки употребляются особые вешки с винтом, которые надеваются на натяжной столб временно; конец натянутой проволоки обвивается, затѣм, вокруг столба и закручивается. В Англии такая изгородь обходится, считая проволоку, столбы и установку, от 5 до 6 шепсов за фут, что составит примерно на наши деньги от 1 р. 25 к. — 1 р. 50 к. за погон. саж. У нас же, по примерно расчету, 100 погон. саж. такой изгороди в 5 рядов проволоки № 8, могли бы стоить: 3500 фут. или 6 пуд. galvanизированной проволоки, по 4 р. за пуд — 24 р. 60 сосновых столбов 6 фут. выш. и 2½ вершк. в диамет., по 10 к. — 6 „ Деревянный натяжной столб с ушкой 1 „ 200 желѣзных ушков по 1 к. 2 „ Установка 5 „

Всего 38 р.

или 38 к. погон. сажень. Ежегодный же расход на 100 погон. саж. проволочной изгороди, полагая, что столбы прослужат 5 лет, а проволока и ушки 10 лет, составит: погашения 10% стоимости столбов (1 р. 40 к.) и 1% стоимости проволоки и ушков (26 к.), 10% с капитала (3 р. 80 к.) и 2% на ремонт (76 к.) или всего 6 р. 22 к. Впрочем, для проволочной изгороди следует употреблять дубовые столбы, хотя бы и несовершенные прямые, которые могут, правда, стоять вдвое дороже сосновых, но зато и прослужат втрое долге сосновых, так что сбережется труд на более частую замену старых столбов новыми.

Каменная изгородь в виде каменной стѣны возможна у нас разве только вокруг затѣйливой усадьбы; вокруг же полей она возможна только в виде сложенных по окраинам полей камней, убранных с поля же (стр. 341).

Земляная изгородь, в виде довольно высокого вала, 2 арш. вышины и ширины 1½ арш. у основания и ¾ арш. вверху, складывается из плотной задерявшейся земли с низменных мест, напр. порослей бѣлусомы (Nardus stricta), которая нарывается пластинками в 1½ арш. длины и вершк. 6 ширины. Такая изгородь может прослужить весьма долго, лет 30 и, при уничтожении ея, дает весьма плодородную землю.

Но, если приведенные изгороди и хорошо защищают участок от захода на него или схода с него животных, и при этом отнимают мало места у полей, что, впрочем, у нас при обилии земли, не представляет большой важности, — то, они не защищают

обнесенного или участка от вѣтровъ, или защищаютъ его отъ вѣтровъ весьма недостаточно; тогда какъ это гораздо лучше дѣлаетъ *живая изгородь* изъ живыхъ кустарниковъ растений, которые засаживаются по границѣ огораживаемаго участка въ одинъ или два ряда по валу или безъ вала; живая изгородь, доставляя все то же, что и мертвая, представляетъ кромѣ того много существенныхъ выгодъ; такъ какъ она удерживаетъ вѣтры и потому подъ защитой ея: 1) почва не лишается своихъ мелкихъ частей (стр. 88), сохраняетъ лучше влагу, потому что не такъ скоро просыхаетъ, равномернѣе покрывается снѣгомъ, прочно сохраняетъ снѣжный покровъ и, медленно освобождаясь отъ него, усиливаетъ запастись влагой на болѣе сухое время. 2) Всходы растений не выдуваются, растения подвергаются въ меньшей степени поврежденію вѣтрами, какъ-то: вырыванію съ корнемъ, поломкѣ стеблей, перепутыванію стеблей, разрыву листьевъ, обиванію цвѣта, плодовъ и т. д.; страдаютъ меньше отъ холодныхъ и сухихъ вѣтровъ и меньше повреждаются морозами, такъ какъ защищаются прочнымъ снѣжнымъ покровомъ и медленно испаряютъ воду, следовательно, вслѣдствіе испаренія, не понижаютъ такъ легко своей температуры ниже 0, при температурѣ воздуха выше 0, какъ это бываетъ на открытыхъ мѣстахъ. 3) Животныя, пасущіяся на участкахъ, обнесенныхъ живой изгородью въ случаѣ бурь, непогоды и въ знойное время находятъ себѣ защиту отъ всего этого подъ живой изгородью. 4) Постройки меньше охлаждаются, повреждаются бурями и уничтожаются пожарами. Далѣе, живая изгородь даетъ пріютъ животнымъ, въ особенности птицамъ, истребляющимъ вредныхъ животныхъ, въ особенности наѣдомыхъ, могутъ затруднять распространеніе ихъ, равно какъ и болѣзней растений, обусловливаемыхъ паразитными грибами. Она доставляетъ нѣкоторое количество подѣлочнаго лѣса, преимущественно же топлива. Наконецъ, будучи устроена на валу, живая изгородь, канавою вдоль вала можетъ служить для отвода воды, въ случаѣ излишней сырости почвы. Живая изгородь конечно имѣетъ и свои недостатки: 1) она занимаетъ много мѣста, 2) она можетъ служить пріютомъ различныхъ вредныхъ для воздѣлываемыхъ растений млекопитающихъ, птицъ и наѣдомыхъ (кроликовъ, мышей, воробьевъ и т. д.); 3) она затрудняетъ нѣсколько обработку почвы и удлиняетъ путь для возки навоза, сноповаго хлѣба и т. д. 4) она отѣняетъ нѣсколько растенія, находящіяся вблизи ея, накапливаетъ вдоль себя нѣсколько большія массы снѣга, который, растаивая только медленно, губитъ покрываемыя имъ здѣсь растенія и задерживаетъ весеннюю обработку почвы на этихъ мѣстахъ; 5) она затрудняетъ передѣлъ полевыхъ клѣнцевъ, въ случаѣ заведенія новаго сѣвооборота. Но, если принять во вниманіе, что приведенные недостатки значительно перевѣшиваются

выгодами, доставляемыми живой изгородью, что снѣгъ, накапливающийся около изгороди, въ видахъ ускоренія его таенія, можетъ быть разравниваемъ, раскидываемъ при помощи даже конныхъ орудій, вавовы: соха, борова-скаррификаторъ.... и что это по времени года, въ которое оно должно производиться, можетъ стоить недорого; что полосы земли вдоль изгороди, особенно у насъ, при изобиліи земли, вмѣсто засѣва ихъ полевыми растеніями, могутъ быть оставлены подъ сносъ травы или другое какое либо употребленіе, напр. приготовленіе компостныхъ кучъ; что, наконецъ, передѣлъ клѣнцевъ случается довольно рѣдко, къ тому же, при передѣлѣ, мѣста, на которыхъ уничтожается изгородь, отличаются большимъ плодородіемъ; если принять во вниманіе все это, то, конечно, живая изгородь можетъ быть несомнѣнно полезной въ мѣстностяхъ, которыя, при нагорномъ или открытомъ положеніи отличаются суровымъ климатомъ, господствующими сухими вѣтрами, сухой и рыхлой почвой и отсутствіемъ лѣсовъ; въ которыхъ существуютъ или заводятся выгонная система полеводства съ воздѣлываніемъ кормовыхъ травъ, молочное хозяйство и откармливаніе скота на пастбищѣ; въ которыхъ преобладаетъ небольшая земельная собственность, экстензивное хозяйство переходитъ въ интензивное, чувствуется недостатокъ въ топливѣ; и въ которыхъ, наконецъ, земельная собственность свободна отъ различныхъ сервитутовъ и не слишкомъ раздроблена. Негодятся же живыя изгороди и даже вредны въ мѣстностяхъ съ низменной, влажной почвой, или на самомъ глубокомъ сѣверѣ по краткости теплаго времени.

Устройство живой изгороди по валу и безъ вала на протяженіи 100 погонныхъ сажень можетъ стоить у насъ:

	безъ вала.	по валу.
Перекопать землю на глубину $\frac{1}{2}$ аршина, полосой въ ширину $\frac{3}{4}$ арш. всего 25 кв. саж. по 5 коп. за кв. саж.	1 руб. 25 коп.	
Вырыть канаву, глубиной $\frac{1}{2}$ арш., шириной $1\frac{1}{2}$ арш., съ откосами подъ угломъ 75° къ горизонту и насыпать соответствующій этой выемкѣ ватъ; всего же за 5,56 куб. саж. вышутую и наваленную землю по 1 руб. за куб. саж.	— " — " 5 руб. 56 коп.	
Устройство временной изгороди изъ двухъ горизонтальныхъ жердевыхъ перекладинъ, прикрѣпленныхъ къ столбамъ немного толще жердей, въ разстояніи одной сажени одна отъ другой; всего же за 300 саж. жердей по 3 коп. за сажень	9 " — " 9 " — "	
Постановка такой изгороди по 3 коп. отъ погонной сажени	3 " — " 3 " — "	
Полагая на каждую сажень по 10 растеній, потребуется 1000 растеній; считая по 3 коп. за штуку.	30 " — " 30 " — "	

Посадка, полагая на одного работника с работницей в день по валу 800, а без вала 1000 растений, при пяти мужск. 50 и женск. 25 коп. день — руб. 75 к. — руб. 94 к.

Поливка, если нужно, полагая 1 работника 50 " — " 50 "
Всего . . . 44 руб. 50 к. 49 руб. — к.

или первоначальное устройство живой изгороди без вала обходится в 44,5 коп., а по валу в 49 коп. за погон. саж. Конечно, этот расход будет различен в различных известностях в зависимости от стоимости рабочих рук, жердей и саженцев, и он может значительно уменьшиться, 1) если разводить саженцы в собственном хозяйстве, для чего потребуется сравнительно немного земли, так как, полагая на саженец по 24 кв. вершка, одной десятины земли достаточно для выведения 160,000 саженцев, которыми можно засадить 16,000 пог. саж. изгороди. Саженцы, выведенные в собственном хозяйстве, могут стоить на половину дешевле, а следовательно стоимость изгороди в таком случае была бы 29,5 коп. без вала и до 34 коп. по валу за погон. саж. Если положить наименьшую величину участка требующего обнесения живой изгородью в 12 десят., то стоимость изгороди на протяжении 680 кв. саж. вокруг каждого участка, при расстоянии одной линии изгороди от другой на 160—180 саж., составила бы 200 р. 60 коп. или 231 р. 20 коп., или на каждую десятину огороженного участка 16 р. 72 к. или 19 р. 27 коп. 2) В некоторых случаях, при разведении живой изгороди из желтой акации, можно избежать совершенно саженцев и развести изгородь прямо из семян. Фунга семян акации, который стоить 50 коп. и содержит около 12,000 зерен, достаточно для засева 100 погон. саж., хотя бы некоторая часть их была неурожа. Прибавляя к этому 50 коп. на работу разсева семян и присыпку их слегка землей на $\frac{1}{2}$ —1 вершка, смотря по свойству земли, получим расход в 1 р. на погон. саж. при заложении живой изгороди из желтой акации посевами. Устройство всей изгороди на протяжении 100 погон. саж. с подготовкой земли и временной изгородью составляло бы без вала 14 р. 75 коп. и по валу 19 р. 15 к., или для участков в 12 десятин—100 р. 30 коп. или 130 р. 22 коп., или на десятину огороженного участка 8 р. 36 коп. или 10 р. 85 коп. 3) В случае разведения изгороди без вала, при известном состоянии почвы, может быть сокращен расход на первоначальную перекопку земли. Живая изгородь чрезвычайно долговечна—боярышниковая, при хорошем уходе, может просуществовать, может быть, до 500 лет; а потому можно не считать восстановления капитала, а ограничиться лишь расходами на поддержание их, процентами на затраченный капитал и рентой с иностранства земли, занимаемого изгородью. Если положить в год на первое 2% (иногда и меньше), или от $16\frac{1}{4}$ до $21\frac{1}{4}$, от $33\frac{1}{2}$ до $38\frac{1}{2}$ коп. на десятину, на второе 10%, или от $83\frac{1}{2}$ коп. до 1 руб. $8\frac{1}{4}$ коп.—от 1 руб. 67 коп. до 1 руб. $92\frac{3}{4}$ коп. на десят., и на третье, считая, при 12 десятинном участке, самое большое полд изгородью $\frac{1}{4}$ земли, и земельную ренту в 5 руб. с десятины,—20 коп. примерно на десятину,—то живая изгородь должна бы была доставлять ежегодно на десятину выгоды от 1 р. $20\frac{1}{4}$ к. до 1 р. $50\frac{1}{4}$ к. или от 2 р. $20\frac{1}{2}$ к. до 2 руб. $51\frac{1}{4}$ коп. Для этого необходимо было бы увеличение урожая с десятины, вследствие обнесения участка изгородью, на 2—6 мтр ржи. Такое увеличение среднего урожая едва ли может подлежать сомнению, так как живая изгородь может, иногда на прим. в год засух, собрать целый годичный урожай. А потому устройство

живой изгороди всегда окупится, если принять во внимание еще, что живая изгородь дает возможность сокращения расходов на пастуха, что она доставляет топливо и подпочный лес особенно ценные в безлесных странах; что приведенная цена, в особенности рента, большею частью выше и значительно выше действительных; что, наконец, при обнесении изгородью неогороженного 12 десятинного участка, а нескольких двенадцатидесятичных участков, составляющих одно поле, расходы уменьшаются, вследствие того, что эти участки имеют несколько общих частей изгороди; так, напр., при величии поля в 96 десят. расходы уменьшились бы на 0,31, при величии же поля в 144 десят.—почти даже на 0,35.

Но, чтобы живая изгородь достигала своей цели, необходимо:

1) чтобы были выбраны надлежащие растения, которые бы отбывали данным климату и почве, по возможности скоро подрастали, хорошо отбывали от самой земли и долго сохраняли ветви, доставляли бы, по возможности, более ценный древесный материал; но, чтобы при этом не распространяли слишком далеко в сторону ни корней, ни ветвей. Из довольно большого числа растений, употребляющихся для живых изгородей, назовем как наиболее удовлетворяющие приведенным требованиям. Боярышники: в особенности американский (*Crataegus coccinea*)—растение, впрочем, еще редкое у нас в торговле, затем сибирский (*C. sanguinea*) с красными и особенно с желтыми плодами и наконец обыкновенный с двумя разновидностями (*C. monogyna* особенно для южных губерний и *oxyacantha*); затем яблони: лесную (*Pyrus Malus sylvestris*) и сибирскую (*P. prunifolia* и *baccata*), терновник (*Rubus spinosa*), жостер (*Rhamnus cathartica*), ель (*Pinus abies*), вяз (*Ulmus effusa*), клен татарский (*Acer tataricum*), сибирскую акацию (*Caragana arborescens*), желтолозник (*Salix purpurea* var. *Lambertiana*), лохи: узколистный (*Elaeagnus angustifolia*) и серебристый (*E. argentea*). Из них лох узколистный годится лишь, серебристый же наиболее пригоден для изгородей южной полосы России; климат же более северных губерний (напр. Петербургской) выносить: боярышники американский и сибирский, яблони, жостер, ель и сибирская акация. Особенно хорошо переносят сухость климата лохи. Хорошей почвы требуют жостер, глинистой почвы—ель и вяз, первая из них даже несколько влажной почвы, желтолозник—влажной, даже болотной почвы, но может быть разведен даже на скудной песчаной почве; остальные растения мирятся с разного рода почвами. Все эти растения разводятся преимущественно из семян в питомниках, откуда пересаживаются на место живой изгороди в трех—четырёхлетнем возрасте (ель иногда и старше 6—7 летнего возраста), за исключением желтой акации, которую можно высевать прямо на место изгороди, лоха серебристая, который разводится исключительно корневыми отпрысками, и желтолозника, который размножается черенками. Медленнее других развиваются боярышники, яблони и в особенности ель и терновник; акация сравнительно бдла ветвями, вяз несколько обременителем своими далеко распространяющимися корнями, а терновник и серебристый лох—корневыми воблами. Тысяча 2—3 летних растений боярышника сибирского стоит 50 руб., обыкновенного—от 50 до 80 руб. и американского—80 руб.; жостра—30 руб.; ель (2—3 летняя)—10 руб.; вяз—30—50 руб. *)

Все они доставляют, по крайней мере, топливо, а желтолозник—хорошие прутья для плетения корзин. Все не годится для живых изгородей в близком соседстве полей с хлебными растениями барбарис (*Berberis*

*) В питомник Петровской Земледельческой и Лесной Академии.

vulgaris), так как он способствует развитию хлбной ржавчины, давая приют обусловливающему эту болзнь чужелдному грибку, въ одной из стадій его развитія.

2) Чтобы изгородь была устроена надлежащимъ образомъ. Изгородь устроивается на ровной землѣ или на валу. Если изгородь должна образовывать прочную ограду, какъ напр.: на границахъ владѣній, при дорогѣ или между различными угодіями, то ее должно устраивать предпочтительно по валу. Подъ засадку изгороди земля должна быть перекопана; на легкой почвѣ это можетъ быть сдѣлано даже весной, на плотной же—непременно осенью; въ тому же въ послѣднемъ случаѣ необходимо вырыть ровъ, выбросить изъ него землю на обѣ стороны, оставить ее такъ на зиму для разрыхленія и наподнять его ровъ снова весной, какъ только земля просохнетъ и несколько и сдѣлается удобной для обработки; если бы при этомъ были куски дерна или другія полусгнившія части, то ихъ бросаютъ на дно рва и потомъ засыпаютъ ровъ мелкой землей. Земля перепахивается или роется ровъ на глубину $\frac{3}{4}$ арш. и шириной въ 1 арш., глубже на легкой и мельче и шире на сырой и холодной почвѣ. Если почва не отвѣчаетъ требованіямъ растеній, избраннаго для живой изгороди, то, при перекопкѣ, или смѣшиваютъ ее съ подпочвеннымъ слоемъ, если этотъ послѣдній можетъ улучшить ее, или же смѣшиваютъ ее съ пескомъ, если бы она была слишкомъ плотна, съ дерновой землей, которую добываютъ съ краевъ луговъ и склоновъ долинъ, или съ листовой землей, которую можно брать изъ лиственныхъ лѣсовъ; въ случаѣ же особенной бесплодности почвы, наполняютъ даже вырытый подъ изгородь ровъ совершенно новой, плодородной землей, лучше всего дерновой. При засынкѣ рва выброшенной изъ него же землей, которая занимаетъ теперь больше мѣста, чѣмъ занимала до вырытія рва, необходимо засыпать ровъ вершка на 3—4 выше его краевъ, такъ какъ земля со временемъ снова оседетъ. Вдоль образующагося таковы образцы возвышенія проводятъ желобкообразное углубленіе для того, чтобы дождевая вода или вода при поливкѣ, если бы эта послѣдняя оказалась необходимой, не пропадала по напраску, а стекала бы къ корнямъ. Если земля суха, легка и рыхла, то ее приталпываютъ, особенно вдоль наружныхъ краевъ насыпи; но, если земля холодна и влажна, то она сама собой, безъ приталпыванія, уплотняется весьма скоро.

Послѣ этого для защиты огораживаемаго мѣста, пока подрастетъ живая изгородь, и для поддержки растеній живой изгороди устанавливаютъ временную деревянную изгородь различной прочности, смотря по необходимости въ болѣе или менѣе прочной защитѣ. Чаще всего дѣлаютъ жердевую изгородь изъ столбовъ, толщиной $2\frac{1}{2}$ —3 дюйм., выш. отъ $1\frac{1}{2}$ до $2\frac{1}{4}$ арш., которые вбиваются въ землю на $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ арш. глубиной, въ разстояніи сажени одинъ отъ другаго, и къ которымъ прикрѣпляются жерди въ одинъ или два ряда. Если изгородь должна быть почище, то жерди замѣняются брусками и изгородь окрашивается масляной краской. Устраиваютъ также частоколъ изъ кольевъ, которые набиваютъ въ разстояніи 3—4 вершковъ одинъ отъ другаго. Иногда, можно обойтись безъ временной деревянной изгороди, если условія для развитія растеній благоприятны и изгородь устраивается на валу. Совершенно негодны для временныхъ изгородей тесовые заборы; годны же для этой цѣли деревянные изгороди могутъ быть весьма хорошо замѣнены проволочными.

По установкѣ временной изгороди, которой передняя сторона должна приходится по средней линіи рва или вала, приступаютъ къ посадкѣ растеній на разстояніи одно отъ другаго, которое зависитъ отъ свойствъ породы и величины растеній. Чтобы получить густую изгородь, сажаютъ обыкновенно на протяженіи сажени отъ 10 до 12 растеній сибирскаго боярышника, отъ 6 до 7 американскаго боярышника, или п. вазы, если они кустисты, и отъ 12

до 24 акацій, смотря по возрасту иногда даже въ два ряда. Сажаютъ иногда большія и малыя растенія въ перемежку; но очень маленькія растенія лучше оставлять въ питомникѣ, потому что въ изгороди они могутъ быть заглушены другими, болѣе развитыми; вслѣдствіе чего образуются въсады пустые промежутки. Перемѣшивать разныя породы въ изгороди никогда не слѣдуетъ, потому что изгородь выходитъ не только некрасивая, но и неровная, такъ какъ сильно развивающіеся породы заглушаютъ медленнее растущія. При посадкѣ растеній должно гладко срезать всѣ переломанные, изуродованные и поврежденные ланотой корни, потому что они въ этомъ случаѣ скоро зарастаютъ новой древесиной и корой, въ противномъ же случаѣ поврежденныя части легко загниваютъ. Послѣ посадки приталпываютъ слегка землю вокругъ корней; если же посадка производится весной, то растенія обильно поливаютъ, не приталпывая земли, такъ какъ вода, при поливкѣ, уплотняетъ землю гораздо лучше, чѣмъ приталпываніе—земля обильнѣе корни и заполняетъ всѣ промежутки. Посаженные такимъ образомъ растенія прививаются къ временной изгороди на столько слабо, однако, чтобы они могли събѣжать въгнѣтъ съ землей. Между растеніями, предназначенными къ образованію живой изгороди, не слѣдуетъ сажать большихъ деревьевъ, хотя бы и на разстояніи 5—10 сажень одно отъ другаго, такъ какъ разрастающаяся верхняя часть деревьевъ будетъ препятствовать развитію низкихъ растеній изгороди, ограничивая ихъ въ пользованіи свѣтомъ и воздухомъ, необходимыми для успешнаго ихъ развитія.

Если растеніе, предназначенное для образованія живой изгороди, какъ напр., акація развивается изъ сѣмянъ, то вдоль поставленной временной деревянной изгороди производится посѣвъ сѣмянъ въ бороздку, открываемую въ хорошо разработанной землѣ мотыкой или заостреннымъ коломъ и закрываемую граблями.

Можно получить особенно изящную изгородь, если правильно переплести вырастающія для этой цѣли главныя вѣтви. Для такой изгороди употребляется преимущественно боярышникъ обыкновенный, который высаживается на разстояніи 1 фута одно растеніе отъ другаго и на слѣдующій годъ срезается на высотѣ 2—3 дюйм. отъ земли. Вслѣдствіе этого получается большое число сильныхъ побѣговъ, изъ которыхъ поставляются два, наиболѣе годные для переплетенія; всѣ остальные срезаются въ концѣ іюля, чтобы усилить развитіе двухъ оставленныхъ. На слѣдующую весну эти вѣтви укорачиваютъ до половины или приблизительно до высоты низкаго бруса временной изгороди (рис. 152), чтобы вызвать болѣе боковыхъ побѣговъ. Верхній или самый сильный побѣгъ, развивающійся на концѣ подрѣзанной вѣтви, назначается для проросленія вѣтви и для плавнаго сѣвигиднаго переплетенія. На слѣдующій годъ, т. е. въ третью весну, укорачиваютъ проросшую вѣтвь до 2-го или средняго бруса и срезаютъ всѣ боковые побѣги до 2—3 дюйм., чтобы образовывать большое число вѣтвей, выполняющихъ собой кѣтки сѣжи. На четвертый годъ повторяютъ тоже, и изгородь достигаетъ требуемой высоты (5 фут.). Тогда ее подрѣзаютъ ножницами. Толщина такихъ изгородей сравнительно съ толщиной обыкновенныхъ ($\frac{1}{2}$ —1 арш.) незначительна (6 дюйм.), такъ что онѣ занимаютъ немного мѣста. Такія изгороди требуютъ хорошей почвы и потому полезно удобреніе этой послѣдней навозомъ; осенью ихъ прикрываютъ землей, а весной его закапываютъ въ землю.

Для изгороди по валу, валъ насыпается изъ земли, которая вынимается изъ канавы, вырываемой съ одной или съ обѣихъ сторонъ вала. Въ первомъ случаѣ канава роется съ той стороны вала, съ которой требуется защита. Для болѣе прочной и удобства откосамъ вала и канавы даютъ слѣдующіе уклоны: откосамъ канавъ въ 45° ,—вала въ 60° и самой изгороди въ 75° — 80°




Рис. 152.

из горизонту (рис. 153 *). Для большей прочности вала, лучше, если бы он




Рис. 153.

*) аа—канавы, идущия въ поперечномъ сѣченіи 12 кв. футовъ; бб, осевшій валъ, котораго поперечное сѣченіе равно поперечнымъ сѣченіямъ канавъ; сс—изгородь, d—столбъ временной изгороди съ двумя брусками въ поперечномъ разрѣзѣ; ее—маленькіе уступы шириной 1—1½ вершка, необходимыя для прочности вала. Потому что весной съ вала сдвигается обыкновенно часть земли. Горизонтальныя линіи, сдѣланныя въ разрѣзѣ вала точками, означаютъ слои дерна, изъ которыхъ сложенъ валъ.

устранялся даже на плотной глинистой почвѣ, выкладывать если не весь валъ, то по крайней мѣрѣ бока его изъ дерна, котораго всегда почти достаточно для этого на самомъ мѣстѣ устройства вала, если только это мѣсто дерновое; если же это мѣсто не дерновое или дерна было недостаточно, то стоитъ привезти дернъ съ другаго мѣста. При устройствѣ вала на задерѣвѣнномъ мѣстѣ съ плотной глинистой почвой, необходимо подъ насыпку вала или перекопать среднюю полосу земли, предназначающуюся подъ валъ, на глубину $\frac{1}{4}$ арш., шириной $\frac{1}{4}$ арш., или же еще лучше, запаять всю полосу земли оа въ которое время подъ разведеніе какого либо полевого растенія, лучше всего плугопольнаго, напр. картофеля. Размѣры вала, среднимъ числомъ: вышины 1 арш., ширина у основанія 2 и вверху 1 арш. (рис. 153), могутъ измѣняться въ зависимости отъ пространства, которымъ можно располагать для устройства изгороди и отъ состоянія влажности почвы; такъ, при недостаткѣ первого валъ можетъ имѣть меньшіе размѣры; или на сухой почвѣ онъ долженъ быть ниже и шире, на влажной же—наоборотъ. При проводѣ живой изгороди по долинамъ и ложинамъ, подъ валомъ или сквозь валъ, проводится отводная канава. Въ мѣстахъ, гдѣ изгородь прерывается дорогой или тропинкой, должны быть устраиваемы легкіе ворота, а у изгородей по валу съ рвами—перезѣзды черезъ рвы—мостики или засыпанные землей камнями или деревянныя трубы, которыя бы не задерживали теченія воды по канавамъ. По достиженіи изгородью извѣстнаго возраста можно во многихъ случаяхъ снова закладывать или запахивать рвы вдоль вала. Въ отношеніяхъ улучшенія почвы и посадки растеній устройство изгороди по валу должно слѣдовать тѣмъ же правиламъ, что и устройство изгороди безъ вала. Засыпаніе корней мелкой землей, содержащей много перегноя, здѣсь особенно важно, потому что при насыпкѣ вала большая часть менѣ плодородной почвы ложится наверхъ.

Если бы, для устройства живой изгороди посади растеній на мѣстѣ, нельзя или не выгодно было приобрести эти послѣднія покупкой, то слѣдуетъ вывести ихъ у себя; выведенныя у себя обходятся большей частью дешевле купленныхъ. Въ руководство къ выведенію у себя растеній для живой изгороди укажемъ здѣсь на самое существенное въ этомъ отношеніи. Сѣмена, если они не покупаются, а собираются тоже у себя, собираются у вяза въ концѣ мая или началѣ іюня—лучше всего съ дерева, по неопавшія; у боярышника сибирскаго съ красными плодами—до (въ концѣ августа, началѣ сентября), съ желтыми же—во время опаденія листьевъ; у сибирской акаціи—въ сентябрѣ; у жостра и лоха—поздно осенью; у боярышниковъ американскаго и обыкновеннаго и у дикой яблони—послѣ опаденія листьевъ, у послѣдней даже, когда плоды хватить морозомъ; а у терновника и ели—зимой; у терновника отдѣленіе сѣмянъ отъ мякоти облегчается, если мякоть нѣсколько разъ послѣдовательно замерзала и оттаивала. Собираніе шишекъ у ели съ срубленныхъ деревьевъ не трудно; хорошія шишки не должны быть тусклаго какъ бы полинялаго цвѣта, лучшія изъ нихъ пахотятся на концахъ вѣтвей и у вершины дерева. У стоящихъ деревьевъ шишки могутъ быть срѣзаемы особенными ножницами на палкѣ.

Совершенно вызрѣвшіе плоды боярышника, терновника, жостра, узколистнаго лоха и яблони собираются въ деревянную посуду и по временамъ перемѣшиваются. Когда мясистыя части плода загниютъ, такъ что сѣмена начнутъ легко отдѣляться отъ мякоти, тогда плоды, которыхъ сѣмена имѣютъ болѣе твердую оболочку, какъ напр. у боярышника, терновника и лоха, мѣсятъ въ тѣсто посредствомъ деревяннаго пестя; плоды же, у которыхъ сѣмена имѣютъ менѣе твердую оболочку, какъ напр. у дикой яблони, мѣсятъ съ помощью пучка крѣпко связанныхъ прутьевъ, чтобы не повредить сѣмянъ. Когда плоды такимъ образомъ перемнутся, на образовавшееся тѣсто наливаютъ воду и всю массу хорошенько перебивываютъ. Хорошія

сѣмена опускаются при этомъ на дно, дурная же всплываютъ на поверхность и выбрасываются вмѣстѣ съ выжимками и водой. Промывка повторяется до тѣхъ поръ, пока сѣмена совершенно не очистятся; посѣвъ этого разстилаютъ ихъ тонкимъ слоемъ и даютъ имъ высохнуть. Очищенные сѣмена лучше цѣльных надобно для посѣва, потому что легче прорастаютъ въ сырой землѣ и даютъ всходы, большей частью, уже въ первый годъ посѣва сѣва. Для получения сѣмянъ, кладутъ шнуръ въ грохотъ, употребляемый для просѣва земли, и подбиваютъ въ сухой нагрѣтой комнатѣ; къ грохоту же снизу подвѣшиваютъ или подъ грохотомъ, на полу, разстилаютъ простыню, на которую падаютъ сѣмена. Выпадающія изъ шнуръ сѣмена собираются ежедневно, или даже раза два въ день, такъ какъ онъ портится, оставаясь долго въ теплѣ; при этомъ каждый разъ помѣшиваютъ шнуръ, чтобы лучше выпадали сѣмена. Сѣмена вяза высѣваются тотчасъ послѣ сбора плодовъ, потому что сѣмена его скоро портятся. Наконецъ, плоды акаціи (бобки), помѣщенные въ теплое и сухое мѣсто, раскрываются сами собой; для отдѣленія отъ мякоти просѣиваютъ ихъ черезъ рѣшето.

Мѣсто для посѣва сѣмянъ должно быть защищено отъ полуденнаго жара и слѣдовательно находится къ сѣверу или еще лучше сѣверо-востоку отъ деревьевъ или построекъ. Почва такого мѣста должна быть плотная, рыхлая, съ достаточнымъ содержаниемъ перегноя, плодородная, но не свѣжеудобренная, хорошо перекушанная, раздѣлена желѣзными граблями и очищена отъ сорныхъ травъ. Приготовленный для посѣва участокъ раздѣляютъ въ не очень высокія сѣменные гряды, шириной 1½ арш., съ хорошо выравненной граблями поверхностью.

Посѣвъ сѣмянъ на сѣменные гряды производится осенью или весной, за исключеніемъ: ели, которая высѣвается всегда весной, въ тому же по возможности рано, такъ какъ иначе сѣмена ея, прорастающія вообще медленно и трудно, всходятъ туго, особенно въ сухую погоду. вяза, который высѣвается лѣтомъ, и лоха, который высѣвается осенью.

Сѣмена особенно трудно прорастаютъ, напр., боярышника, дикой яблони, терновника, лоха, для ускоренія ихъ прорастанія, подвергаются предварительной подготовкѣ, лучше всего слѣдующаго рода: очищенные и нѣсколько просушенные сѣмена перемѣшиваются съ $\frac{1}{2}$ и болѣе рѣчнаго песка; семянется въ кадку или ящикъ, покрываются слоемъ такого же песка, для того чтобы предохранить сѣмена, оставшіяся непокрытыми, отъ высыхания, и ставятся въ холодный подвалъ съ температурой воздуха въ немъ не ниже 2—4° Р. При болѣе высокой температурѣ сѣмена перѣко прорастаютъ и дичные, вытянувшись. бѣдные ростки, при высѣвѣ проросшихъ сѣмянъ на гряды, неизменно погибаютъ. Подготовка имѣетъ цѣлю ускорить разрушеніе твердой оболочки сѣмянъ. Въ продолженіе зимы необходимо по временамъ осматривать засыпанные сѣмена для того, чтобы они не высохли, что довольно часто случается съ сѣменами, пахнущими болѣе къ сѣнѣ, чѣмъ къ посудѣ. Въ случаѣ сухости, слѣдуетъ высыпать, смочить немногимъ водой, тщательно перемѣшать и снова высыпать ихъ въ посуду. Сѣмена боярышника, дикой яблони, терновника, лоха, покупаемая весной или сохранявшіяся у себя сухо въ теченіе зимы, равно какъ и ели при позднемъ высѣвѣ, полезно намачивать сутки на двое передъ посѣвомъ въ водѣ, такъ какъ черезъ это ускоряется появленіе всходовъ; но передъ посѣвомъ ихъ должно обсушить на сѣнѣ, чтобы они не слипались.

При одинаковой величинѣ развивающихся изъ сѣмянъ растений, болѣе медленно развивающихся, наприм. боярышникъ, можно сѣять гуще; болѣе же быстро развивающихся, наприм. дикую яблоню, рѣже. Боярышникъ можно высѣвать очень густо, потому что только самая малая часть сѣмянъ его бываетъ хороша. Плодъ сибирскаго боярышника содержитъ обыкновенно

4, рѣже 3 или 5 зерны, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, половина дурно развита. На фунтъ приходится около 16000 зеренъ, изъ которыхъ слѣдовательно половина негодныхъ, остальная половина даетъ не болѣе 600—1000 здоровыхъ растений. Это слѣдуетъ имѣть въ виду при посѣвахъ, чтобы не потерять много мѣста, вследствие недостаточности густоты посѣва.

Сѣмена растений, не дающихъ въ первый годъ сильнаго побѣга, высѣваются на гряды предпочтительно въ разбросъ, такъ какъ при такомъ посѣвѣ не терется лишняго мѣста, требуется меньше работы, сѣмена прикрываются равномернѣе и меньше покрываются мышами. Посѣвъ въ разбросъ удобнѣе всего производить такъ: разбрасывать сѣмена по выровненной поверхности гряды, придавливать ихъ, затѣмъ, слегка къ землѣ дощечкой, отчего они распределяются еще лучше, засыпать мелко просѣянной легкой землей (лиственной или изъ сорныхъ травъ), слоемъ въ $\frac{1}{4}$ (ель, вязъ) до $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ (остальная) дюйм. толщиной, и затѣмъ, снова слегка прибивать. Рядами же высѣваются сѣмена растений, развивающихся болѣе быстро въ первый годъ, чаще всего акаціи, отчасти же дикой яблони, которыхъ сѣянцы уже въ первомъ году поднимаются на 1—2 фута у первой и на 1 футъ у второй. Посѣвъ рядами производится въ бороздки, которыхъ 5—6 вдоль гряды, и прикрывается закрытіемъ бороздокъ у акаціи слоемъ земли въ $\frac{1}{4}$, а у дикой яблони въ $\frac{1}{2}$ дюйм. толщиной. Въ случаѣ болѣе открытаго положенія грядъ, подвергающаго растения на нихъ выгнанию, весьма полезно и даже необходимо искусственное отѣненіе тѣмъ или другимъ способомъ, наприм. посредствомъ настилки отъ $\frac{1}{2}$ до 1 дюйм. толщины слоя мелко изрубленной соломы, опилокъ, угольнаго корешка или другаго какого либо рыхлаго вещества—дурного проводника теплоты. Такія вещества не препятствуютъ всходу сѣмянъ и доставляютъ въ сѣверной Россіи достаточно защиты. На югъ же, гдѣ продолжительные жары и засухи представляютъ гораздо болѣе опасности для всходовъ, недостаточно одного отѣненія поверхности почвы, но необходимо совершенное отѣненіе самыхъ взшедшихъ растений, которое можно достигнуть различными образомъ. наприм., посредствомъ илтеней изъ вѣтвей или драпировъ или соломеныхъ и тростниковыхъ щитовъ, которые помощью подставокъ или устанавливаются горизонтально надъ грядками, на высотѣ 3—4 вершк. отъ поверхности земли, или же нѣсколько пахлонно къ нимъ съ южной ихъ стороны. Можно отѣнять гряды также вѣтвями хвойныхъ деревьевъ (лапкой), которая втыкается вокругъ грядъ или на гряды въ нѣсколько пахлонномъ положеніи, или же просто выбрасываются на посѣвы. Такое отѣненіе поддерживаетъ въ почвѣ влажностъ, свѣжесть, необходимую какъ для всходовъ, такъ и для дальнѣйшаго развитія сѣянцевъ, и замѣняетъ собой ежедневную поливку, которая даже вредна для зародыша, такъ какъ вода быстро испаряется; хотя не устраняетъ необходимости въ сильной поливкѣ отѣненныхъ сѣменныхъ грядъ, въ случаѣ продолжительной засухи. По мѣрѣ снаженія лѣтняго жара отѣненіе ослабляютъ, чтобы растенія привыкли къ свѣту; для совершеннаго же его прекращенія слѣдуетъ выбирать пасмурные или дождливые дни.

Акація, вязъ, если только сѣмена ихъ не пересушены, дикая яблоня, жостеръ сравнительно легко даютъ всходы; послѣдній особенно при высѣвѣ его съ осени; всходы ели показываются весьма медленно, но въ первомъ же году; наконецъ, лохъ, боярышникъ и терновникъ, при твердой оболочкѣ ихъ сѣмянъ, всходятъ еще труднѣе: только частію въ первомъ, частію же во второмъ году, хотя бы сѣмена ихъ и были подготовлены; впрочемъ, слѣже собранные сѣмена ихъ, будучи высѣяны осенью, болѣею частію, даютъ всходы весной; но, при поздней сборѣ сѣмянъ, трудно успѣть высѣять ихъ осенью; сухія же сѣмена ихъ, безъ подготовки, даютъ всходы не ранее 2 года; а потому лучше, особенно если нѣтъ свободныхъ грядъ, сѣмѣвать неочищенные плоды

ихъ съ земель и оставить ихъ цѣлымъ годъ на воздухѣ прикрытыми землей же; при этомъ плодовая мякоть разрушается сама собой и затѣмъ произведенный посѣвъ даетъ уже болѣе скорые всходы.

Растенія, взшедшія изъ сѣмянъ, оставляются на сѣменныхъ грядкахъ различно долго, пущодъ за ними состоитъ въ полотьѣ и разрыхленіи земли между растеніями; при чемъ слѣдуетъ замѣтить, что полоть сѣменныхъ грядъ должно производить очень осторожно, чтобы, вырывая и обрѣзая корни сорныхъ травъ, не вырвать съ землею ни сѣмянъ, ни молодыхъ растеній. Съ сѣменныхъ же грядъ ихъ пересаживаютъ или сперва еще на пересадочныя гряды, затѣмъ въ питомникъ и наконецъ на мѣсто изгороди, или въ питомникъ и наконецъ на мѣсто изгороди или, что случается впрочемъ рѣже, наприм. у акацій, прямо на мѣсто изгороди. Питомникомъ можетъ служить мѣсто, скорѣе съ нѣсколькими влажной, чѣмъ сухой почвой, такъ какъ въ черной почвѣ растенія лучше принимаются и скорѣе достигаютъ желаемой величины. Земля въ питомникѣ должна быть тщательно разрыхлена т. е. перекопана на глубину, по крайней мѣрѣ $\frac{1}{2}$, лучше $\frac{3}{4}$ аршина и чиста отъ сорныхъ травъ; а потому мѣсто, бывшее подъ картофелемъ или капустой по удобренію, отвѣчаетъ какъ нельзя болѣе требованіямъ хорошаго питомника. Въ питомникѣ нѣтъ надобности въ грядкахъ; здѣсь удобнѣе совершенно выровненная поверхность почвы. Польза нѣсколькихъ краткихъ пересаживаній заключается въ томъ, во 1) что можно гуще сѣять и гуще сажать вначалѣ, увеличивая разстояніе между растеніями по мѣрѣ того, какъ эти послѣдніе разрастаются. Это же представляетъ ту существенную выгоду, что нѣсколько гуще посѣянные и посаженные вначалѣ растенія защищаются другъ друга, отбиваютъ почву и потому меньше терпятъ отъ лѣтнихъ жаръ и засухи; и, если не устранили совсѣмъ, то значительно облегчаютъ задачу уничтоженія сорныхъ травъ; во 2) что растенія, часто пересаживаемое, образуетъ гораздо болѣе корневыхъ мочекъ и болѣе густую крону; первое позволяетъ ему тѣмъ лучше использовать почву, когда будетъ пересажено на мѣсто изгороди. Къ тому же пересадка молодыхъ растеній менѣе затруднительна и опасна; маленькое растеніе пересаживается скорѣе, съ меньшимъ поврежденіемъ корней, чѣмъ болѣе, и легче принимается, такъ какъ требуется менѣе времени на заживленіе происходящихъ при пересадкѣ поврежденій. По этому, весьма полезно пересаживать въ первый разъ сѣянцы не старше 1 года на гряды въ разстояніи 3—4 верш. одинъ отъ другаго, во второй же разъ — въ питомникъ въ разстояніи 6—8 верш. одно отъ другаго; но при этомъ необходимо вынимать молодая растенія съ осторожностью, чтобы не повредить невозшедшихъ еще сѣмянъ, которые даютъ всходы только еще во второй годъ, затѣмъ разрыхлить и слегка придавить потревоженную на грядкахъ землю держиной лопатой и покрыть оставшіяся обнаженными стѣпы тонкимъ слоемъ мягкой земли. Сѣянцы пересаживаются въ первый разъ въ различномъ возрастѣ; иногда только что взшедшіе съ сѣмяночными еще листьями, начавшіе только что образованіе перваго настоящего листа, какъ наприм. быстро растущая дикая яблоня, если всходы ея густы. Иногда, одиолѣтніе, напр. у вяза, котораго всходы, при вырѣзѣ его лѣтомъ, по краткости лѣта не достигаютъ значительныхъ размѣровъ до наступленія зимы, по котораго растенія на это; онѣ лѣто даютъ сильные побѣги и потому весной втораго года пересаживаются на пересадочныя гряды; а также и у другихъ растеній (наприм. боярышника, дикой яблони). Навчаше, если, при вырѣзѣ сѣмянъ ихъ, перевозившихъ въ сѣбѣ съ мокрымъ пескомъ, всходы ихъ покажутся весьма скоро и густо. Иногда, двухлѣтніе, какъ наприм. у медленно растущей ели или у акацій, которая пересаживается съ сѣмянныхъ грядъ прямо на мѣсто изгороди; равно какъ и у другихъ растеній (боярышникъ, дикая яблоня), если въ первомъ году дали всходы не болѣе полови-

ны высѣянныхъ сѣмянъ; такъ какъ оставленіе въ этомъ случаѣ одиолѣтнихъ растеній на 2 года не только не повредитъ всходамъ слѣдующаго года но еще и защититъ ихъ.

Сѣянцы, назначенные для пересадки, выкапываются осторожно весной; иногда, впрочемъ, и поздно осенью, отчасти потому что осенью болѣе свободнаго времени чѣмъ весной; отчасти же потому что саженыя выкопанные осенью остаются весной, не трогаясь въ ростъ, гораздо долѣе, чѣмъ выкопанные весной, въ которыхъ, какъ бы рано не были они вынуты изъ земли, сокъ всегда уже въ движеніи, а потому они не могутъ оставаться безъ вреда для нихъ долгое время непосаженными; это же особенно важно тогда, когда необходимо пересадить большое количество растеній. По выконкѣ изъ земли, сѣянцы сортируются по величинѣ на 2 или 3 разряда; причемъ обрѣзаются веретенообразные ихъ стволы и корни. Подрѣзка производится съ цѣлю вызвать изъ одиолѣтняго ствола и стержневого корня по возможности большое число боковыхъ отростковъ и, такимъ образомъ, съ самаго начала образовывать густые кусты и богатые мочками корни; кромѣ того укороченіе корней значительно облегчаетъ посадку. У крупнѣйшихъ или двухлѣтнихъ сѣянцевъ стволъ и корни подрѣзываются на 4—6 вершковъ, у болѣе же мелкихъ или одиолѣтнихъ нѣсколько короче, на 3—4 вершка. Приготовленные такимъ образомъ въ пересадкѣ растенія кладутся рядомъ въ плоскую вырытую борозду на тѣнстомъ мѣстѣ, причемъ корни ихъ покрываются сырой землей, приталаниваемой въ нѣмъ, и могутъ сохраняться въ такомъ положеніи безъ всякаго вреда нѣсколько недѣль и даже цѣлую зиму, что особенно удобно въ виду того, что при пересадкѣ осенью корни пересаженныхъ растеній легко выпираются морозомъ изъ земли. Сѣянцы, выкопанные осенью и сложенные рядами, подвергаются нападению мышей болѣе, чѣмъ оставшіеся въ грядкахъ; но отъ этого они могутъ быть предохранены легкими прикрытіями ихъ еловой волочей лапкой.

Чтобы, по возможности, предупредить высыханіе весьма нѣжныхъ молодыхъ растеній, слѣдуетъ стараться выбирать для пересадки пасмурные дни и, въ особенности, въ случаѣ пересадки въ ясные дни, сухую погоду, защищать корни ихъ отъ высыханія мхомъ или обмакивать корни стянцевъ, тотчасъ по вынутіи ихъ изъ земли, въ воду, въ которой изобилуютъ черноземъ или перегной, и, разложивъ ихъ затѣмъ правильно въ какой либо ялоской посудѣ, чтобы съ корней ихъ не стекла вода, сѣянцы немедленно ихъ пересаживаютъ. Обмакиваніе корней, кромѣ того, дѣлаетъ корневые мочки болѣе тяжелыми, такъ что онѣ легче входятъ въ ямку, назначенную для посадки. Пересадка производится помощью садиловника (рис. 154) — небольшого древка,



Рис. 154.

предварительно напичкаются шнуромъ линіи, въ разстояніи одна отъ другой различномъ для различныхъ растеній, или 2 верш. для ели, которая развивается медленно, до 4—6 вершковъ для вяза, который развивается довольно скоро и сильно въ это время; потомъ работникъ дѣлаетъ на линіи, начиная съ одного конца этой послѣдней и продолжая къ другому, садиловникомъ, который держитъ въ правой рукѣ, ямку, соответствующую величинѣ корешка, схватываетъ въ то же время лѣвой рукой растеніе за верхушку и, вынувъ садиловникъ изъ земли, опускаетъ на мѣсто его въ ямку корешокъ въ прямомъ (никакъ не въ согнутомъ) положеніи на такую глубину, на которой растеніе сидѣло прежде, или только нѣсколько глубже; затѣмъ, не выпуская

Для устройства живой изгороди можно пользоваться кроме размножения растений из семян, размножением их еще корневыми черенками, корневыми отпрысками, отводками и стеблевыми черенками, а также дикопроизрастающими растениями. Хотя все эти способы употребляются мало или меньше чем размножение из семян, частью потому что они менее удобны, частью потому что требуют больше заботы; тем не менее они заслуживают большого внимания хозяев в том случае, когда саженцы дороги или когда их нельзя иметь в достаточном количестве.

Корневыми черенками можно размножать напр. боярышник, узколиственный и серебристый лохи; их нарезают, длиной в 2—3 вершка, от корней старых кустов, толщиной от гусяного пера до пальца, достигавших персядо 2 фута в длину. Если старые кусты остаются на месте, то для нарезки черенков откапывают от корней землю; если же они пересаживаются, то черенки нарезаются из корневых частей, получившихся при подрезке корней до 3—5 вершков в длину. Корневые черенки сажают на гряды в 6 рядов, так чтобы, при наклонном положении корня, нижний, более тонкий конец его был прикрыт слоем земли, по крайней мере в 2 вершка; верхний же конец был бы вровень с поверхностью земли. Затем, в особенности в сухую погоду стараются о сохранении в почве таких гряд в тени притенением и поливкой, пока они не укоренятся. Если не все, то большая часть этих черенков, посаженных весной, даст к концу июня один или несколько побегов; после чего они требуют такого же ухода, как и саженцы.

Корневыми отпрысками размножаются терновник и серебристый лох; старые кусты их или изгородь из них дает большое число таких отпрысков, особенно если почва рыхлая, плодородна и несколько свежа. Корневые отпрыски вырываются осторожно из земли с возможно большим числом корней и, по обрезке ветвей, более сильной у терновника, сажаются в питомник, откуда года через 2 или 3 высаживаются уже на место изгороди.

Размножение отводками применяется особенно в тех случаях, когда в дурно выдержанной изгороди (из боярышника, серебристого лоха) приходится доводить образовавшиеся промежутки. Такой способ разведения представляет удобный способ, — растения выходят сильнее, чем при размножении корневыми черенками, но он несколько хлопотливее последнего, и выращенные им растения, особенно в корнях, менее правильны, чем саженцы; это, впрочем, неважно, если растения остаются на месте их вывода, напр. изгороди. При размножении отводками растения сажаются втрое, вчетверо реже обыкновенного на 2 и 4 фута, смотря по возрасту, так чтобы, при наклонении растения к земле, вершина стебля не доходила бы до корня соседнего растения. Следовательно, при размножении отводками, для насаждения изгороди, требуется вчетверо меньше саженцев, а потому этот способ размножения выгоден, когда саженцы дороги или их нельзя достать в необходимом количестве, так как их собирается в этом случае до 75%; но зато устройство изгороди замедляется, по крайней мере, на 2 года.

Отводок удастся, если отводятся хорошо укоренившиеся растения, а потому не следует делать отводков в первом году по пересадке. Делаются отводки так: около растения вырывают яму, глубиной в 3—4 вершка, на таком расстоянии от корня, чтобы ветви растения, наклоненные к земле, приходились прямо в яму (рис. 156). Ветви на том месте, на котором он должны быть прикрты землей, скручивают так, чтобы на них остались продольные трещины, но поперечных трещин или повреждений не должно быть; и затем, прикрты к земле деревянными брусками, (рис.




Рис. 156.

156, б) для того чтобы он, по своей упругости, не приводимался, засыпают их землей так, чтобы концы их выходили наружу. Из стебля, после наклонения отводков образуются побег, ветви; и если бы эти побег, не развивались, то, после совершенного укоренения отводков, стебель перерывался бы, после чего он образует сильные ветви; получающиеся таким образом растения обрезаются на высоту от поверхности земли на, обозначаемой линией *ee* (рис. 156). Если земля недостаточно влажна и по года суха, то размножение отводками мало успешно. Можно также, надрав ветви поперечно до середины, расколоть ее по длине на протяжении 2—3 дюйм., а для того чтобы обе половины держались в некотором расстоянии одна от другой, положить между ними камешек; затем, наклонив ветку к земле оттопырившей половинкой книзу, прикрты ее и засыпать землей, как было описано выше. Этот последний способ можно получить отводки, которые скорее образуют сильные корни, но требуют много заботы, и так как ускорение образования корней не имеет существенной важности, то отводки делаются большей частью без надравов. Обыкновенно проходит года два, пока отводки укоренятся совершенно.

Стеблевыми черенками (прутьями) употребляются для устройства живой изгороди из желтолозника; они нарезаются осенью или весной, длиной в 1—2 фута и толщиной с палец, и сажаются прямо на то место, где хотят иметь изгородь. Посадку эту лучше всего делать в два ряда, приготовив предварительно почву. Впрочем, при устройстве лозовой изгороди можно брать лозовые колья, 1 1/2 арш. (от 1/2 до 3 арш.) длины и 1/2—1 1/4 дюйм. (от толщины пальца до порядочного кола) в диаметр, которые заготавливаются лучше всего весной, пока лоза еще не раскрыла своих почек, и вбиваются в разрыхленную землю заостренным концом, или же, что лучше, устанавливаются в сделанном ровке и засыпаются землей на половину, пригнано, своей длины не выше, однако, 2/3 аршина. Они вбиваются или устанавливаются обыкновенно в наклонном (примерно 45°) к поверхности земли положении и в том же в двух противоположных направлениях, так что перекрещиваются в изгороди. При забрасывании землей хорошо наблюдать, чтобы в непосредственное соприкосновение с черенками (кольями) приходила лучшая земля, а не засыпка, особенно на несколько сухой почве, прикрты рыхлую землю чем либо, напр. соломой, сошкой и т. д., для того чтобы предупредить уплотнение почвы и сохранить в ней лучше влагу, что значительно способствует укоренению черенков. Лозовые изгороди этого рода, в случае некоторой сухости места их закладки, можно

устраивать, набивая колья в канаву, из которой земля может быть частью насыпана в вид вала со стороны, с которой изгородь легче всего может страдать от засухи, частью (лучшая) употреблена для засыпки черепков. На 1 погон. саж. такой изгороди идет 12 колья. 1 рабочий может заготовить в сутки от 500 до 1000 таких кольев, для высадки которых с засыпкой можно считать 1—2 рабочих дня при двух рабочих.

Разведение ели сравнительно с другими древесными породами, употребляемыми для изгородей, несколько медленнее и хлопотливее, но зато еловый изгородь необыкновенно прочна и составляет превосходную защиту от животных, нередко обладающих листовыми породами. Это служит, между прочим, основанием, почему еловыми ветками (лапшой) окружают или прикрывают отдельные растения и ряды, когда их хотят сохранить от мышей, зайцев и других грызунов животных. В случае крайности, для разведения ели можно пользоваться *дикорастущим ельником*, если рост его отвечает требованиям; хотя, как известно, ельские ели трудно принимаются при пересадке без защиты и отблески окружающих растений, а, принявшись, в течение нескольких лет еще затормозив растут туго, хворают. У ельного ельника, как вообще у еланцев, которые не пересаживались, нет корневых мочек близ шейки, и корень состоит из стержня с немногими длинными разветвлениями, которые, при вырвании растения, всегда повреждаются, и, затормозив, даже при благоприятных условиях, весьма трудно замещаются молодыми корневыми мочками. Для большого успеха пересадки, необходимо выбирать низкие (не выше 6—8 вершков), ветвистые экземпляры с открытых солнечных мест, а затормозив сажать их на несколько шире, usualное место в таком расстоянии, что бы ветви одного дерева не касались ветвей другого, не доставляя друг другу некоторую защиту и отблески земли. При такой посадке они принимаются легче, чем стоя уединенно. Выбор пшкороных кустарных растений существует при разведении еловых изгородей, чем при разведении изгородей из других древесных пород, которые можно поправить еще подрезкой у самой земли; но ель гибнет от такой обрезки, толще стволы ее никакими средствами нельзя превратить в ветвистые, почему особенно важна правильная обрезка у еловых изгородей, которая не допускала бы образования верхушек, выставляющихся над изгородью. Все поврежденные и расщепленные корни следует ровно обрезать при пересадке; иначе повреждения эти не только не заживают, но произведут гниль и окончательное разрушение корней. На местах, где ветви, стоят слишком тесно, некоторые из них можно совершенно срезать, остальные же только укоротить, если они длинные. Подрезывать ветви должно так, чтобы оставалась часть иголь и почки; иначе вся ветвь погибнет. Самое удобное время для пересадки ели — август месяц, потому что нисходящие в это время соки способствуют развитию корней.

Особенная осторожность необходима при перевозке растений с одного места на другое, для этого следует укладывать растения в сырой мох и стараться как можно скорее прикрывать корни растений мхом или землей. При известной осторожности можно пересаживать еловую ель и весной, до начала развития. Годы через 2—3 после пересадки растений сдвигаются годными для посадки на место; они успевают в это время произвести хорошую крону и большое число корневых мочек, так что могут быть удобно пересажены на место изгороди со ступом, т. е. с сохранением земли вокруг корней. Вроде, но зато и затруднительнее, пересадка осенью со ступом замерзшей земли, которая, поэтому, применима лишь при пересадке небольших разрывов. Успех этого способа пересадки требует, чтобы предназначение к пересадке растений до наступления зимы еще было об-

копано, на расстоянии равном длине ветвей, канавкой, доходящей до корней; и, когда земля замерзнет, вынуты с замерзшей землей желаемые толщину, что вовсе не трудно, и прямо посажены на место изгороди. В предположении возможной гибели при этом пересаживаемого растения от мороза, лучше производить такую пересадку при небольших морозах, обнаженные корни ели сносить в этом случае мороз до 18° Р., дубы же пропадают в короткое время при морозе уже в 4—6° Р. Ины для растений, пересаживаемых со ступом, должны быть приготовлены, конечно, заранее; а так как в замерзшую землю сажать нельзя, то для предохранения земли от замерзания, необходимо прикрывать ее на месте, назначаемом для засадки изгороди полосою, по крайней мере в аршин ширины, листьями, мхом, соломой или другим каким либо дурным проводником тепла. В начале зимы для той же цели достаточно покрыть в 1—2 вершка толщиной; но, для того чтобы ее не разносило ветром, прикрывают ее еще ветвями.

Наконец, при устройстве живых изгородей должно быть принято во внимание *вышина их и наименьшая величина участка* обнесимаго живого изгородью. Вышина изгороди определяется тем, для которой она назначается. В большей части случаев изгородь, вышиной в 3—4 фута, доставляет уже достаточную защиту; по соседству с постройками она должна быть выше. Изгороди вокруг полей сажают обыкновенно по валу, вышиной в 2—3 фута с канавой, так что вышина изгороди в 3—4 фута поверх вала и здесь совершенно удовлетворительна; если же изгородь устраивается на ровной земле, то она должна быть не ниже 5 футов. Изгороди, разводимые для защиты от холодных ветров, бывают от одной до двух саж. вышины, смотря по местным условиям. Наименьшая величина участка, обнесимаго живой изгородью в поле, зависит от высоты изгороди — чем выше она тем более распространяется ее действие, защищающее от холодных и сухих ветров, тем более могут быть удалены линии живой изгороди одна от другой и наоборот; отсюда, с которой должны защищать изгородь от ветров — защита должна быть тем сильнее, чем легче почва, чем суше климат, чем более открыто положение; и она тем сильнее, чем чаще пересажается поле изгороди, чем меньше становятся окружаемые изгородью участки; но тем выше и чаще изгороди, тем более сдвигается движение воздуха, замедляется просыхание почвы и сушка урожая, отбываются растения, затрудняется обработка и уменьшается пространство земли под полевыми растениями. Поэтому, живой изгородью, в 1 саж. вышины с валом, безвредно можно обнести участок не менее 3 1/2 десятины; но, так как тем реже могут быть изгороди, тем меньше затраты на их устройство и поддержание, то для действительной защиты от ветров можно считать достаточным обнесение живой изгородью участка в 10—12 десятины, при высоте изгороди от 1 до 1 1/2 саж. Увеличение высоты изгороди ничего не стоит, между тем как увеличение длины изгороди стоит очень много.

3) *Чтобы за изгородью была надлежащий уход.* Самую важную часть ухода за готовой живой изгородью составляет ее подрезка. Эту работу производить в садах два раза: первый раз, в период времени опадения листьев — осенью или до развития новых почек весной, и второй раз в конце июня, по окончании развития летних побегов. У молодых и слабо развитых изгородей, напр. вновь посаженной изгороди в первый год, летняя обрезка должна ограничиваться подрезкой только слишком длинных побегов, для того чтобы вызвать более густой рост; потому что такая изгородь, сохраняя более листья, которыми усваивают пищу, скорее прибудет. Более сильно можно подрезывать после опадения листьев, так как эта подрезка в это время не только не ослабляет растения, но заставляет

его развиваться потомъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ ниже было оно срезано. При стрижкѣ оставляютъ каждый разъ столько молодыхъ побѣговъ, чтобы изгородь имѣла видъ сплошной массы; когда же она достигнетъ желаемой вышины и ширины, тогда можно подстригать ее, какъ весной такъ и лѣтомъ, сколько можно ближе къ мѣстамъ подрѣзки предшествующаго года. Для того чтобы при стрижкѣ сохранить правильную прямую или дугообразную поверхность изгороди, требуется значительный навыкъ, и рабочий долженъ постоянно смотрѣть впередъ, чтобы видѣть, какъ вести ему направление стрижки, такъ какъ въблизи нельзя усмотрѣть неправильности, совершенно ясно замѣтная издали; а потому мѣсте опытный въ дѣлѣ стрижки долженъ въ такихъ случаяхъ отступать на некоторое разстояние, чтобы съ большей вѣрностью опредѣлить, какъ вести линію.

Бока изгороди должны быть не вертикальны, но легко наклонены къ вершинѣ внутрь изгороди, подъ угломъ въ $75-80^\circ$ (см. рис. 153) къ отвѣсной линіи; потому что въ этомъ случаѣ нижнія вѣтви не лишаются благотворнаго дѣйствія свѣта, воздуха, росы и дождя. Для стрижки высокихъ изгородей или изгородей растущихъ на валу нельзя обойтись безъ болѣе или менѣе высокихъ скамеекъ со ступеньками. У полевыхъ изгородей такая тщательная и частая стрижка невозможна; достаточно стричь ихъ хоть разъ въ годъ, весной или осенью; колючія же изгороди подрѣзываютъ даже каждые 6—7 лѣтъ до высоты 1—2 фут. Старыя изгороди, не смотря на правильный и тщательный уходъ за ними, со временемъ достигаютъ вышины и ширины, превосходящихъ желаемыя размѣры; вѣтви дѣлаются уродливыми, ростъ слабѣетъ, мѣстами появляются сухіе сучья; однимъ словомъ изгородь дряхлѣетъ. Въ такихъ случаяхъ необходимо подрѣзывать изгородь до $\frac{1}{4}-\frac{1}{2}$ вышины и ширины и тѣмъ вызвать усиленное развитіе. Хорошо выдержанная изгородь должна представлять густой, кустистый ростъ отъ самой земли (рис. 157).



Рис. 157.

Но, не только въ изгородяхъ, подстригаемыхъ дугою, но даже въ изгородяхъ, которыя правильно подстригаются, случается, что опадаютъ нижнія вѣтви и образуются скажины (рис. 158); въ такомъ случаѣ остается только срубать



Рис. 158.

растенія до высоты нѣсколькихъ дюймовъ (какъ это показывать линія *bb* на рис. 158). Если высаженыя растенія бѣдны нижними вѣтвями, то нельзя срезать ихъ такъ низко тотчасъ послѣ пересадки: сначала срезаютъ только часть верхушки, а уже на слѣдующій годъ, пока не наступило еще весеннее движеніе сока, — до показанной линіи. Въ продолженіе лѣта, въ этомъ случаѣ, развивается изъ основанія стебля большое число побѣговъ, которые правильнымъ уходомъ можно обратить потомъ въ хорошую изгородь; для подрастающей такимъ образомъ изгороди можетъ быть нелишнимъ новая временная деревянная изгородь. Меньшія поврежденія и скажины можно и слѣдуетъ исправлять посадкой новыхъ растеній или, если растенія молоды и стоятъ рѣдко, дѣланиемъ отводковъ, выбравъ для этого послѣдняго вѣтки по крайней мѣрѣ съ нѣсколькими вѣточками. Изгороди повреждаются особенно сильно людьми и животными, которые прорываютъ ихъ обыкновенно въ слабыхъ мѣстахъ, напр. тамъ, гдѣ погибло растеніе и не было замѣнено новымъ, или на углахъ. Такія поврежденія исправляются трудно и медленно; если они произошли у значительно обросшей изгороди и, какъ это часто случается, не имѣется подъ рукой для посадки растеній требуемой высоты, а малыя растенія не доставили бы надлежащей защиты, то лучше всего въ подобныхъ случаяхъ устроить на поврежденномъ мѣстѣ палисадъ изъ колючихъ съ поперечнымъ брускомъ у вершины, и подъ защитой ея вывести вновь посаженныя растенія. Если скажины не велики, то ихъ можно прикрыть, наклоняя и привязывая соединяющія вѣтви.

Кромѣ растеній канавы и валы живой изгороди требуютъ также известнаго попеченія. Канавы очищаютъ обыкновенно въ нѣсколько лѣтъ разъ, главнымъ образомъ, для того, чтобы землей изъ нихъ исправить валъ, такъ какъ земля на немъ постоянно осѣдаетъ и осеивается вслѣдствіе чего обнажаются корни изгороди. Исправленіе вала состоитъ постою въ пасынкѣ новаго слоя земли съ каждой стороны вала на всемъ его протяженіи и въ выравниваніи обвалившихся мѣстъ. Подсыпка земли полезна еще въ томъ отношеніи, что препятствуетъ развитію сорныхъ травъ, появляющихся особенно обильно послѣ срубки изгороди.

Наконецъ, весьма важна въ уходѣ за живой изгородью забота о томъ, чтобы насажденія изгороди, въ особенности молодыя, слабо укоренившіяся и медленно растущія, не заглушались сорными растеніями, какъ-то: ренейникомъ, крапивой, лебедой, горчакомъ и другими сильно развивающимися травами.

Получающіеся при стрижкѣ или срубкѣ изгороди части растеній употребляются для разныхъ цѣлей, какъ-то: на плетни, фаншину, тонку и т. д.; онѣ даютъ сильный, но не продолжительный жаръ.

Высокія изгороди, однако, лучше защищаютъ отъ вѣтровъ и тѣмъ лучше, чѣмъ плотнѣе и шире онѣ; но въ такомъ случаѣ линіи ихъ не должны быть такъ близки одна къ другой, чтобы онѣ могли вреднымъ образомъ отѣнять почву. Вотъ такіе болѣе высокія, широкія и плотныя изгороди, устраиваемыя, поэтому, изъ деревь или высокыхъ кустарниковъ, или изъ тѣхъ и другихъ вѣтвей, которые высаживаются въ нѣсколько рядовъ на ровной почвѣ или на полосѣ, слегка возвышенной землеко, выбрасываемой изъ канавъ, ограничивающихъ эту полосу съ обѣихъ сторонъ, — называются *лѣсными опушками*, служатъ, главнымъ образомъ, для защиты мѣстности отъ вѣтровъ, и потому засаживаются со сторонъ, открытыхъ господствующимъ

вѣтрамъ, и располагаются менѣе частыми линиями, чѣмъ живыя изгороди.

Но, чтобы отъ такого рода лѣсной опушки не происходило вреда полямъ черезъ отѣненіе ихъ, чтобы корни лѣсныхъ породъ не распространились по самому полю, не затрудняли его обработки и не отнимали у воздѣлываемыхъ растений питательныхъ веществъ, можно закладывать лѣсную опушку въ нѣкоторомъ разстояніи отъ поля, а также отдѣлять ее отъ него посредствомъ хотя неглубокаго рва.

Совѣстнымъ заложениемъ размѣщенныхъ соответствующимъ образомъ по полю живыхъ изгородей и опушекъ можно достигнуть полного огражденія полей отъ всѣхъ невзгодъ, которымъ подвергаются только неогороженные, не защищенные мѣста. Лѣсныя опушки, замѣняя собой лѣса болѣе, чѣмъ живыя изгороди, особенно важны въ безлѣсныхъ странахъ. Въ странахъ же имѣющихъ еще лѣса, необходимо, при вырубкѣ лѣса, обращать вниманіе на то, чтобы не уничтожить ихъ на столько, па сколько они служатъ защитой для полей отъ губительныхъ вѣтровъ, и вести рубку лѣса такъ, чтобы поля всегда имѣли необходимую для нихъ защиту. Это, конечно, стоитъ дешевле, чѣмъ заложение новыхъ опушекъ. Поэтому, если принять во вниманіе большей частью открытое положеніе нашихъ полей въ степныхъ губерніяхъ, послѣдствіе совершенной безлѣсности, въ другихъ же, послѣдствіе скудости лѣсовъ или неправильнаго распредѣленія ихъ по площади губерній; если принять во вниманіе предное, при такомъ открытомъ положеніи, дѣйствіе вѣтровъ, которые сносятъ частицы пыльных, напр. нѣкоторыхъ черноземныхъ почвъ, и павѣвалъ свѣтъ въ низины, оставляютъ обнаженными отъ свѣга доли, страдающія отъ холода, и дѣлаютъ непроезжими дороги, и которые перепутываютъ и ломаютъ полевныя растенія и вредятъ пашнямъ домашнимъ животнымъ на пастбищѣ; если, наконецъ, принять во вниманіе господство у насъ, особенно въ весеннее время, холодныхъ и сухихъ сѣверныхъ и сѣверо-восточныхъ вѣтровъ, холодящихъ и сушащихъ почву и выдувающихъ посѣвы; сухость нашего климата, знойность лѣтнихъ жаровъ, постоянно увеличивающееся распространеніе вредныхъ насекомыхъ, недостатокъ рабочей силы для присмотра за скотомъ на пастбищѣ, недостатокъ часто въ лѣсныхъ продуктахъ, обиліе и сравнительную дешевизну земли, — если принять все это во вниманіе, то едва ли можно еще сомнѣваться въ необходимости для насъ, въ видахъ ограниченія вреднаго дѣянія нашего климата на полевою, луговую, садовую и др. культуры, прежде всего сохраненія лѣсовъ или только лѣсныхъ полосъ въ опредѣляемомъ господствующими вѣтрами топографическомъ отношеніи къ остальнымъ уголкамъ, затѣмъ устройства лѣсныхъ опушекъ и живыхъ изгородей прежде всего въ степныхъ мѣстностяхъ, гдѣ возможность хотя и

очень труднаго разведенія деревьевъ и лѣсовъ находится въ всякаго сомнѣнія въ основаніи имѣющихся примѣровъ.

Выборъ растений для лѣсныхъ опушекъ гораздо шире; такъ какъ растенія здѣсь не подраздѣляются, такъ какъ они могутъ быть различной вышины и, при разведеніи ихъ въ нѣсколько рядовъ, могутъ быть менѣе вѣтвисты, чѣмъ растенія для живой изгороди. Слѣдовательно, въ выборѣ растений для лѣсной опушки можно руководствоваться, главнымъ образомъ, требованіями растенія относительно климата, почвы, легкостью размноженія и возможностью извлечь большую выгоду изъ доставляемаго ими древеснаго матеріала; это послѣднее здѣсь настолько важнѣе, чѣмъ у изгороди, что древесная масса здѣсь болѣе, чѣмъ у послѣдней на одномъ и томъ же протяженіи. Вотъ растенія, которыя, кромѣ указанныхъ для живой изгороди и также годныхъ для лѣсной опушки, могутъ быть разводимы въ лѣсныхъ опушкахъ; изъ хвойныхъ: ели (*Picea*) — обыкновенная (*P. vulgaris*, Link) и алтайская (*P. abovata*, Ledeb); пихты — сибирская (*Pinus pichta*, Fisch), бальзамическая (*P. balsamea*, L.), западная (*P. picea*, Duroi) и кавказская или Нордмана (*Abies nordmanniana*); сосна Веймутова (*Pinus strobus*, L.); лиственничъ (*Larix*) — европейская (*L. europaea*, DC.) и сибирская (*L. sibirica*, Ledeb.); можжевельникъ обыкновенный (*Juniperus communis*, L.). Изъ лиственныхъ: береза обыкновенная (*Betula alba*, L.); вѣзь (*Ulmus effusa*, Willd et U.); ильмъ (*U. campestris*, L.); карагачъ (*U. suberosa*, Ehrh.); дубы (*Quercus*) — обыкновенный или лѣтний (*Q. pedunculata*, Ehrh.), зимній (*Q. Robur*, L.) и иберійскій (*Q. Hartweissiana*, Stev. iberica, Hort.); липы (*Tilia*) — мелколистная (*T. parvifolia*, Ehrh.) и крупнолистная (*T. grandifolia*, Ehrh.); клены (*Acer*) — обыкновенный (*A. platanoides*, L.), яворъ (*A. pseudoplatanus*, L.), татарскій (*A. tataricum*, L.) и полевой (*A. campestre*, L.); ясени (*Fraxinus*) — обыкновенный (*F. excelsior*, L.) и американскій (*F. americana*, Willd.); ольха черная (*Alnus glutinosa*, Grt.); тополи (*Populus*) — черный или осокорь (*P. nigra*, L.), канадскій (*P. canadensis*, Mehl.), ожерельный (*P. monilifera*, Ait.), серебристый (*P. alba*, L.), лавролистный (*P. laurifolia*, Ledeb.) душистый (*P. suaveolens*, Fisch.) бальзамическій (*P. balsamifera*, L.), онтаріо (*P. ontariensis*, Des.), каролинскій (*P. Caroliniensis*) и березолистный (*P. betulefolia*); грабъ (*Carpinus betulus*, L.); аблоня дикая (*Pyrus malus*, L.); груша дикая (*P. communis*, L.); рябины (*sorbus*) — обыкновенная (*S. aucuparia*, L.) и крымская или домашняя, садовая (*S. domestica*, L.); черемухи — обыкновенная (*Prunus padus*, L.) и душистая (*P. Mahaleb*, L.); Айлантъ или китайскій ясень (*Ailanthus glandulosa*, Desf.); мелколистный (*Morus*) — бѣлая (*M. alba*, L.) и красная (*M. rubra*, L.); акація бѣлая (*Robinia pseudacacia*, L.); гледичія или теръ іерусалимскій (*Gleditsia triacanthos*, L.); акація желтая, гороховикъ (*Caragana arborescens*, Lamb.); орѣшникъ, лещина (*Coryllus avellana*, L.); жимолость татарская (*Lonicera tatarica*, L.); бересклеты (*Evonymus*) — европейскій (*E. europaeus*, L.) и бородавчатый (*E. verrucosus*, Scop.); дерны (*Cornus*) — бѣлый (*C. alba*, L.) и плодовой или кизиль (*C. mascula*, L.); калина (*Viburnum opulus*, L.); таволга рябинолистная (*Spiraea sorbifolia*, L.); наконецъ ивы (*Salix*) — вѣтла (*S. alba*, L.), ломкая (*S. fragilis*, L.), бредина (*S. caprea*, L.), черноталъ (*S. pentandra*, L.), красноталъ, верба красная или шелуха (*S. acutifolia*, Willd.), пенельная (*S. cinerea*, L.), яшмовая (*jaspidia*, Hort.), крупноприлистникова (*S. stipularis*, Sm.), лоза (*S. viminalis*, L.), волнистая (*S. undulata*, Ehrh.), миндальная (*S. amygdalina*, L.) и остролистная (*S. acuminata*, Sm.) Изъ нихъ таволга, желтолозникъ, калина — небольшіе кустарники; ивы: миндальная, волнистая, лоза, крупноприлистникова, пенельная, дерны, бересклеты, жимолость, орѣшникъ, душистая черемуха — большіе кустарники; яшмовая

ива, шелюга, черпоталь, бредина, шелковица уже въ средней Россіи, татарскій и полевой кленъ, карагачъ и можжевельникъ вырастаютъ въ большей или меньшей величинѣ кустарники, но вырастаютъ и въ меньшей или большей величинѣ деревья; шелковица, черемуха обыкновенная и рябина обыкновенная — небольшие деревья; ломкая ива, ветла, гледичія, акація бѣлая, айлантъ, крымская рябина, дикия: груша и яблоня, грабъ, серебристый тополь, обыкновенный кленъ, береза и бальзамическая пихта — средней величины деревья, рѣдко вырастающія выше 60 фут.: наконецъ, остальные изъ приведенныхъ растений достигаютъ высоты болѣе 60 фут.

Въ отношеніи климата могутъ быть разводимы съ успѣхомъ по всей Россіи: почти всѣ ивы, таволга, бѣлый деренъ, жимолость, орѣшникъ, желтая акація, обыкновенная рябина, серебристый тополь, татарскій кленъ, мелколистная липа, можжевельникъ и лиственницы; только въ южныхъ губерніяхъ — гледичія, бѣлая акація, шелковица, айлантъ, душистая черемуха, крымская рябина, полевой кленъ, яворъ, карагачъ и кавказская пихта; не только въ южныхъ, но и въ западныхъ губерніяхъ: кизиль, дикия яблоня и груша, грабъ, осокорь, крупнолистная липа, зимній дубъ и алтайская ель; не только въ южныхъ, но и въ среднихъ губерніяхъ — шелковица и айлантъ, хотя они страдаютъ здѣсь отъ мороза, дикия яблоня и груша, каролинскій, березолистный, канадскій и ожерельный тополи и пльмъ; въ среднихъ губерніяхъ, южнѣе Москвы — бересклетъ европейскій, онтаріо-тополь, бальзамическій тополь, ясень обыкновенный, кленъ обыкновенный, лѣтній дубъ и пльмъ; въ среднихъ и сѣверныхъ губерніяхъ — калина, бересклетъ бородавчатый, черемуха обыкновенная, душистый тополь, черная ольха, американскій ясень, вязъ, береза и веймутова сосна; айлантъ и шелковица въ Московской губ. вымерзаютъ до земли; въ западныхъ губ. — западная пихта; наконецъ въ сѣверныхъ губ. — сибирская пихта и обыкновенная ель. Особенно хорошо спосать жаръ и засуху — бѣлая акація, полевой и татарскій кленъ, карагачъ, можжевельникъ и бальзамическая пихта; зимній дубъ спосать засуху и жаръ лучше лѣтняго.

Въ отношеніи почвы мирятся со всякой почвой: почти всѣ ивы, жимолость, желтая акація, черемуха обыкновенная, лауролистный и душистый тополи, полевой и татарскій кленъ, береза; произрастаютъ на хорошей черноземно-суглинистой или плодородной глинистой почвѣ: вязъ, пльмъ, лѣтній дубъ, липы, ясень, осокорь, канадскій и серебристый тополи, яблоня дикая; на суглинистой почвѣ — обыкновенная и алтайская ели, сибирская пихта (нѣсколько черноземной), рябины; на болѣе легкой, чѣмъ тяжелой почвѣ — гледичія, дикая груша, обыкновенный кленъ и лещина (орѣшникъ); на песчаной почвѣ — сибирская пихта (влажной), каролинскій и березолистный тополи, бѣлая акація, орѣшникъ, айлантъ и рябины; на легучихъ пескахъ — шелюга, осокорь, канадскій, каролинскій и ожерельный тополи и зимній дубъ; на каменистыхъ почвахъ — лиственницы, зимній дубъ, душистая черемуха (известковой), кизиль и бѣлая акація; на торфяныхъ почвахъ — черная ольха и ивы; на сухихъ почвахъ — лиственницы (на сѣверѣ), зимній дубъ, грабъ, дикая груша, душистая черемуха, айлантъ и бѣлая акація; на влажной — ива, сибирская пихта, ясень, липа, черемуха, онтаріо-тополь, бѣлый деренъ, калина; на болотистыхъ мѣстахъ — черная ольха и ивы, въ особенности же: пенелая и черпоталь.

За исключеніемъ ивъ и тополей, которыя за небольшими исключеніями размножаются черенками — осокорь, бредина и черпоталь также и сѣменами, — всѣ остальные изъ названныхъ растений размножаются исключительно или преимущественно сѣменами. Кромѣ того липы, черемуха обыкновенная и бѣлый деренъ — отводками; рябины, орѣшникъ и калина — порослью отъ пня; серебристый тополь, айлантъ и таволга — корневymi отпрысками; чере-

муха обыкновенная и бѣлый деренъ черепками; наконецъ, айлантъ, бѣлая акація — также корисными черенками.

Изъ этихъ растений даютъ поросль отъ пня: ивы, липа, дубъ, кленъ, вязъ, пльмъ, грабъ, рябина, черемуха, орѣшникъ, бѣлая и желтая акація, калина; а потому они спосать обрѣзку и обрубку во всякомъ возрастѣ, береза — только въ молодости; лиственница спосать обрѣзку.

Доставляемые этими растениями произведенія находятъ себѣ весьма многоразличное употребленіе и имѣютъ различную цѣнность: строевой дѣсь доставляютъ преимущественно ель, лиственница и дубъ — послѣдніе для кораблестроенія; изъ осокора выдѣлываются лодки; хорошій подѣлочный лѣсъ доставляютъ: дубъ, ясень, пльмъ, черная ольха, липа и береза, которыхъ доски употребляютъ въ столпрномъ дѣлѣ; вязъ и пльмъ употребляютъ на лафеты; изъ молодого вяза приготовляются тонкія дуги и оглобли; ветла и бредина употребляютъ на приготовленіе дугъ, корытъ и латевъ; грабъ и обыкновенный кленъ, по твердости ихъ древесныя, — на изготовленіе различныхъ инструментовъ, орудій, машинъ и т. д.; липовое дерево цѣнится для такихъ подѣлокъ, въ которыхъ дерево не должно коробиться, напр. рамъ, рисовальныхъ досокъ, гледичія, черемуха обыкновенная, дикия яблоня и груша, татарскій кленъ и европейскій бересклетъ, котораго древесина особенно плотна и извѣстна подъ названіемъ „дальмоваго дерева“ — на разныя мелкія подѣлки; можжевельникъ — на изготовленіе лучшей молочной посуды (финляндія); рябина — на рукоятки къ различнымъ инструментамъ; дикия яблоня и груша цѣнятся въ товарномъ дѣлѣ; изъ душистой черемухи и полевого клена получаютъ весьма цѣнные чубуки. Ивы: пенелая, крупнолиственничная, волчаная, миндальная, въ особенности же остролистная, лоза и желтолозникъ доставляютъ хорошіе прутья для плетенія; бредина и пенелая — кору для дубленія кожи; липа — мочалу. Всѣ эти растения доставляютъ топливо; особенно хорошее же — бѣлая акація, черная ольха, татарскій кленъ, карагачъ, береза и ель; а хорошій уголь — черная ольха, береза и липа: липовый и ольховый уголь употребляется для приготовленія пороха. Береза даетъ бересту, изъ которой добывается чистый деготь; изъ лиственнымъ получается венесуэльский терпентинъ, изъ бальзамической пихты — извѣстный канадскій, бальзамъ; изъ пихты — вообще много смолы; изъ алтайской ели — смола, извѣстная подъ названіемъ „Саниндовыхъ слезъ“. Наконецъ, калина и кизиль даютъ съдобныя, а можжевельникъ — ароматическія, лѣкарственные ягоды, орѣшникъ — орѣхи, береза — напиктъ березовики, а шелковицы и айлантъ — коры для двухъ шелкопрядовъ: шелковица для шелкопрядного, а айлантъ для айлантоваго шелкопряда.

Выбравъ растеніе, необходимо приготовить почву подъ посадку такой опушки. Рѣдко можетъ встрѣтиться необходимость въ удобреніи почвы — въ крайнемъ случаѣ развъ можетъ понадобиться подсыпка небольшого количества чернозема подъ корни сажаемаго на мѣсто дерева; но всякомъ же случаѣ необходима хорошая обработка почвы, на глубину $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ арш. на хорошей нѣсколько потной почвѣ, на $\frac{1}{2}$ — 1 аршинъ. въ большей части случаевъ и даже на $1\frac{1}{2}$ аршина на твердыхъ безплодныхъ почвахъ; если и не на всемъ пространствѣ, назначаемомъ подъ лѣсную опушку, сплошь, то, по крайней мѣрѣ, полосами въ 1 саж. шир. или даже площадками въ 1 кв. арш., иначе вырѣте ямы для каждаго дерева. Конечно, въ твердомъ глинистомъ или каменистомъ грунтѣ такіа ямы недостаточно обезпечиваютъ хорошей ростъ деревьевъ въ будущемъ; такъ какъ дальнѣйшее распространеніе корней задерживается плотными стѣнками ямы и дерево останавливается въ ростѣ. Деревья, высаживаемыя на открытій мѣста, страда отъ разныхъ вредныхъ вліяній, какъ-то: жары, холода, бури несравненно болѣе, чѣмъ находящіеся въ лѣсахъ или садахъ, требуютъ тѣмъ болѣе благоприятныхъ

удобнѣе для развитія своихъ корней; а потому, въ случаѣ возможности, не слѣдуетъ жалѣть расхода на усиленную обработку засаживаемаго участка.

Наиболѣе удобное время для такой глубокой обработки земли есть осень, когда болѣе свободной рабочей силы, когда почва, пропитанная водой, становится мягче и когда вывернутая изъ глубины земля можетъ подвергнуться въ теченіе зимы благотворному дѣйствию воздуха и холода, мороза. Обработанная съ осени земля и выравненная, разборонованная весной, готова для посадки деревъ той же весной.

Лѣсныя опушки приходится обыкновенно засаживать съ холодной сѣверной и восточной, рѣже съ южной и западной сторонъ; такъ какъ съ первыхъ двухъ сторонъ чаще нужна защита. Опушка можетъ состоять изъ одного или, чаще, изъ несколькихъ рядовъ деревъ; въ первомъ случаѣ слѣдуетъ сажать деревья чаще, въ разстояніи 1—1½ арш. одно отъ другаго; во второмъ же можно сажать деревья рѣже, напр. при трехъ рядахъ въ разстояніи 2—3 арш. одно отъ другаго. Иногда, засаживаютъ 3 и болѣе рядовъ съ тѣмъ, чтобы впоследствии нѣкоторые изъ нихъ вырубить или употребить для засадки другаго мѣста; напр. два наружные ряда засаживаютъ скоро растущими слабыми листовыми деревьями, какъ-то: тополями, ивой и другими подобными; средній же дубомъ, елью, лиственницей или пихтой, которые въ молодомъ возрастѣ сами требуютъ нѣсколько защиты. Какъ только станетъ тѣсно деревьямъ средняго ряда, деревья обоихъ наружныхъ рядовъ вырубать, а деревья оставшагося ряда иногда подрѣзываютъ въ видѣ высокой изгороди, или только обрубать немного слишкомъ далеко выдающіеся вѣтви; иногда же оставляютъ разрастаться совершенно свободно. Часто засаживаютъ нѣсколько параллельныхъ рядовъ различными деревьями и кустарниками, съ цѣлью оставить всѣ эти породы и ряды деревьевъ расти на мѣстѣ; но при этомъ необходимо наблюдать, чтобы средніе ряды засаживались высокорослыми деревьями, на разстояніи 1—2 саж. дерево отъ дерева; слѣдующіе затѣмъ ряды, снаружи, — низкорослыми, на разстояніи ½—1 саж. одно отъ другаго, а самые наружные, крайніе — кустарниками, если эти послѣдніе тоже высаживаются, на разстояніи ½ саж. одинъ отъ другаго. Сажать при этомъ всѣ деревья по прямой линіи нѣтъ надобности, хотя въ этомъ нѣтъ и вреда. Устроенная такимъ образомъ опушка не только красива, но и прочна; вѣтеръ, ударяющійся о такую опушку, встрѣчаетъ наклонную поверхность, по которой направляется вверхъ, такъ что высокіе деревья, защищаемыя наружными низкорослыми деревьями и кустарниками, менѣе страдаютъ отъ вѣтрова.

При посадкѣ деревъ слѣдуетъ принять за общее правило, не сажать ихъ глубже того, какъ они сидѣли на смѣнившихся грядкахъ. Исключеніе изъ этого составляютъ лишь тѣ деревья и кустарники, которые разводятся черенками или легко образуютъ новые корни изъ ствола, какъ-то: тополи, ивы, и которые, по этому, могутъ быть сажаемы глубже того, чѣмъ сидѣли прежде. Глубже прежняго на 1—2 вершка сажаютъ также обыкновенно деревья при пересадкѣ въ сухую почву, для того чтобы корни ихъ менѣе высушились; впрочемъ, въ такомъ случаѣ полезнѣе притѣненіе почвы вокругъ ствола соломинистымъ навозомъ, мхомъ, листьями, изрубленными сорными травами (но безъ сѣмянъ), или другими подобными матеріалами, который притѣнствовалъ бы неперенѣю и дурно проводилъ тепло. Кроме того, въ тѣхъ же случаяхъ полезно оставлять вокругъ ствола углубленіе, въ которомъ могла бы задерживаться дождевая вода, или, въ случаѣ надобности, прибѣгать къ поливкѣ. На влажныхъ мѣстахъ все это не только не нужно, но даже вредно; здѣсь, если только не высаживаются деревья, требующія сырости, какъ напримеръ, необходимо, напротивъ, позаботиться объ осушкѣ и осушваніи почвы посредствомъ канавокъ и посадки деревъ на не болѣе возвышенностяхъ;

въ крайнемъ же случаѣ, на такихъ мѣстахъ деревья сажаются не въ землю, а поверхъ предварительно обработанной земли причемъ и корни ихъ прикрываются землей привезенной съ другаго мѣста или же взятой между рядами. Въ сѣверныхъ мѣстностяхъ лучшимъ, наиболѣе благоприятнымъ временемъ для посадки деревъ представляется ранняя весна. Въ южныхъ же мѣстностяхъ растенія, менѣе чувствительныя къ морозу, могутъ быть пересаживаемы и осенью; растенія же болѣе чувствительныя въ нему, какъ напр. шелковница, айлантъ и даже простой дубъ пересаживаются и здѣсь съ большимъ успѣхомъ весной, чѣмъ осенью.

Между посаженными деревьями не слѣдуетъ терять проросшихъ сорныхъ травъ, которая, вытягивая влагу изъ глубины почвы, сунуть эту послѣднюю, тогда какъ влага нужна для корней посаженныхъ деревъ; появленіемъ мелкихъ сорныхъ травъ, какъ напр. мокрицы и большинства злаковъ, можно пренебречь, потому что они не причиняютъ особеннаго вреда посаженнымъ деревьямъ. Относительно обрѣзки разводимыхъ въ лѣсныхъ опушкахъ кустарниковъ и даже тѣхъ древовидныхъ растеній, которыя выводятся въ видѣ кустарника съ нѣсколькими стволами отъ корня, можно вполнѣ руководствоваться правилами, данными для обрѣзки растеній, разводимыхъ для живой изгороди. При разведеніи же въ лѣсной опушкѣ одностовольныхъ деревъ слѣдуетъ держаться другихъ правилъ. При самой пересадкѣ дерева на мѣсто можно обрѣзать часть его верхушки, соотвѣтственно потерянной или обрѣзанной части корней; вслѣдствіе этого обыкновенно образуются нѣсколько побѣговъ, изъ которыхъ слѣдуетъ оставить лишь одинъ главный для дальнѣйшаго развитія, съ цѣлью образованія ствола; другіе же обрѣзать на 1—3 вершка отъ основанія. Изъ оставшихся частей срубленныхъ побѣговъ прорастаютъ нѣсколько слабыхъ побѣговъ, которые, однако, не образуются, потому что позже засыхаютъ сами. Обрѣзать боковые побѣги у самаго ствола не слѣдуетъ, во первыхъ, потому что главный стволъ вытягивается въ этомъ случаѣ слишкомъ въ длину, выходитъ тонкимъ, слабымъ, недостаточно сильнымъ для того, чтобы держаться самостоятельно на открытыхъ мѣстахъ; а во вторыхъ, совершенно голые стволы не огнѣчаютъ для посадки въ аллею, особенно если насажденіе состоитъ изъ одного или нѣсколькихъ рядовъ деревъ; при болѣешемъ числѣ рядовъ въ опушкѣ, конечно, это обстоятельство имѣетъ менѣе значенія. Деревья, назначенныя для посадки въ аллею, выводятся обыкновенно въ видѣ штамбовыхъ деревъ, вышиной около 3-хъ аршинъ, съ правильной, по возможности, кроной. Чтобы получить такіе деревья, необходимо обрѣзать стволъ на желаемой вышинѣ, и, если затѣмъ не является достаточное количество побѣговъ, то повторить въ слѣдующемъ году обрѣзку, укоротивъ образовавшіеся побѣги на половину ихъ длины. Хвойныя деревья вообще не обрѣзываютъ при пересадкѣ, или, если обрѣзываютъ, то только нѣсколько слишкомъ густо сидящихъ вѣтвей для того, чтобы установить равновѣсіе между корнями и верхней частью растеній; у лиственницы, впрочемъ, можно подрѣзать верхнюю часть главнаго ствола, равно какъ и часть боковыхъ побѣговъ, если они слишкомъ вытянулись. Лиственница, послѣ обрѣзки, образуетъ весьма легко много побѣговъ, изъ которыхъ впоследствии становится главнымъ почти всегда только одинъ; если бы же образовалось два или три ствольныхъ побѣга, то лишніе можно со временемъ обрѣзать. Какъ не прочна лиственница впоследствии, въ молодости она чрезвычайно гибка и въ бурю перелома наклоняется къ землѣ, если стволъ слишкомъ высокъ относительно толщины. Чтобы придать стволу болѣе твердости, необходимо разсаживать молодія растенія въ питомникѣ нѣсколько рѣже, чѣмъ сажаютъ другія теряющія листья деревья; это способствуетъ образованію побочныхъ вѣтвей отъ самой земли, вслѣдствіе чего стволъ получаетъ значительно большую толщину низу.

Заложение лѣсныхъ опушекъ прямымъ высѣвомъ сѣмянъ на мѣсто невозможно, такъ какъ сѣмена плохо всходятъ на открытыхъ мѣстахъ, а молодые пеходы большей частью погибаютъ отъ жаровъ или заглушаются сорными травами. Впрочемъ, удается такое заложение опушекъ изъ бѣлой и желтой акацій, которыхъ сѣмена могутъ быть высѣваемы на мѣсто рядами, въ разстояніи рядъ отъ ряда на 1 арш. лучше всего рядовой сѣянкой. Засѣивается такимъ образомъ до 8 рядовъ на предварительно хорошо разработанной почвѣ, примерно, какъ полъ свекловичу.

Въ болѣе широкихъ лѣсныхъ опушкахъ растенія находятъ различное мѣстоположеніе; одни находятся съ южной, теплой, солнечной; другія — съ сѣверной, холодной, тѣнистой стороны. Понятно, что желающій разводить болѣе нѣжные деревья, напр. шелловину, долженъ сажать ихъ на болѣе выгодныхъ мѣстахъ. Что касается направленія рядовъ деревьевъ, то оно зависитъ отъ направленія господствующаго въ мѣстности вреднаго вѣтра, такъ какъ самая опушка должна возможно лучше защищать отъ него хозяйственные угодья. Ширина опушки зависитъ отъ различныхъ условий, главнымъ же образомъ климата. Чѣмъ труднѣе вырастаютъ въ извѣстной мѣстности деревья, тѣмъ шире должна быть опушка и тѣмъ гуще должны быть сажены растенія, чтобы они тѣмъ лучше защищали другъ друга и тѣмъ сильнѣе отбѣжали почву. Разстоянія между опушками, которыхъ на большихъ площадяхъ должно быть нѣсколько, зависятъ отъ высоты деревьевъ, отъ свойства господствующаго вѣтра, отъ возвышенія площади надъ уровнемъ моря, отъ наклоненія ея къ горизонту, отъ свойствъ ея поверхности, ровной или холмистой; отъ свойствъ почвы, песчаной или глинистой, отъ рода культурныхъ растеній, изъ которыхъ одни требуютъ болѣе защиты, чѣмъ другія; такъ: плодовые, ягодные, сады, парники, огороды — болѣе, чѣмъ полевныя растенія; между этими послѣдними масличныя, красильныя и т. п. болѣе чѣмъ хлѣбныя, корнеплодные и т. д. На сколько согласимы съ этими обстоятельствами, весьма различными въ различныхъ мѣстностяхъ, опушки весьма удобно засаживаются по границамъ имѣнія, по границамъ хозяйственныхъ угодій, по дорогамъ и т. д.

Укрѣпленіе летучихъ песковъ.

Летучіе, сыпучіе пески представляютъ почву, состоящую на значительную часть глубины изъ самаго мелко-зернистаго, болѣею частью кварцеваго и только частью спликоватаго песку, совершенно свободнаго отъ камней. Такая почва суха и подвижна; мелкія песчаныя частицы ея легко поднимаются и перемѣщаются вѣтромъ на значительныя часто разстоянія; такъ, что она повсе не покрывается или только скудно покрывается растеніями, слѣдовательно не связывается въ своихъ частяхъ корнями растеній и не накопляетъ въ себѣ перегноя, который могъ бы придать связность ея частицамъ; но, слѣдуя за вѣтромъ, засыпаетъ сосѣднія съ ней угодія.

Чтобы сдѣлать такую почву производительною и безвредною для прилегающихъ къ ней мѣстъ, иногда выравниваютъ предварительно ея поверхность и огораживаютъ вышней изгородью все занимаемое ею пространство или только часть его, для позбавленія доступа къ нему животныхъ и проѣзда по немъ, такъ-какъ и то другое, препятствуя развитію растительности, поддерживаетъ рыхлость почвы; а

затѣмъ, для защиты почвы отъ перемѣщенія частицъ ея вѣтромъ, разбиваютъ обнесенное изгородью пространство, если оно довольно значительно, на меньшіе участки *опушечными изгородями* и прикрываютъ поверхность почвы сплошн или только отчасти преимущественно растительными веществами, или засыпаютъ почву какии-либо соответствующими ей и, по возможности, улучшающимъ ее и въ то же время доходнымъ растеніемъ. Часто, впрочемъ, повсе не выравниваютъ поверхности, а на небольшихъ пространствахъ сыпучихъ песковъ, какія встрѣчаются иногда въ хозяйствахъ, приступаютъ даже прямо къ разведенію на нихъ растеній. Конечно, скорѣе всего можетъ вызвать растительность на сыпучемъ пескѣ орошеніе его, если только мѣстные условия допускаютъ его примѣненіе.

Посеранность сыпучихъ песковъ выравнивается, т. е. понижается или уничтожаются небольшіе песчаные холмы и выполняются углубленія, помощью вѣтра. Для этого поверхность возвышенныхъ мѣстъ разрыхляется ручными орудіями, а въ глубинѣ овраговъ и рытвинъ устраивается одна или нѣсколько поперечныхъ изгородей — горизонтальныхъ плетней; такъ, что разрыхленный песокъ сносится съ возвышенностей вѣтромъ и засыпаетъ углубленія, останавливаемый въ своемъ движеніи вдоль оврага въ и рытвинѣ поперечными изгородями.

Вышняя изгородь въ большей своей части устраивается въ видѣ частокола, съ подвѣтренной же стороны, съ которой она должна защищать отъ вѣтра, она дѣлается горизонтальнымъ плетнемъ подобно тому какъ и *опушечной* изгороди. Для устройства горизонтальнаго плетня, въ этихъ случаяхъ набиваютъ колья изъ расколотаго дуба или старой смолистой сосны, какъ можно глубже, и переплетаютъ ихъ, какъ можно плотнѣе, молодымъ, 6 — 10-лѣтнимъ соснякомъ, который не только долговѣченъ, но и образуетъ весьма плотную изгородь. При недостаткѣ сосняка, необходимо заплетать имъ по крайней мѣрѣ низъ плетня для того, чтобы песокъ не могъ проходить сквозь него; сверху же можно заплетать ивнякомъ, а въ самомъ верху плетня хорошо укрѣпить хмѣлевые жерди или толстые сучья, чтобы удерживать нижній хворостъ отъ расползанія. На ровныхъ мѣстахъ плетни дѣлаются вышней въ 3—3½ фута, а въ рытвинахъ или оврагахъ — въ 4½—5 ф. Плетни начинаютъ устраивать со стороны господствующаго вѣтра; для болѣе же устойчивости раскладываютъ ихъ такъ, чтобы они не пересѣкали направления господствующаго вѣтра подъ прямымъ угломъ, и даже подиравляютъ ихъ съ противоположной направленію вѣтра стороны. Концы плетней стараются выдвинуть за предѣлы летучихъ песковъ, чтобы эти послѣдніе, при своемъ движеніи, не могли обогнуть изгородь; если же концы ихъ примыкаютъ къ горнымъ скатамъ, то постепенно понижаютъ ихъ, на протяженіи послѣднихъ 2—3 саженой, такъ какъ иначе, при окончаніи изгороди у ската, образуются весьма легко продувы (рытвины). Наконецъ, не ставятъ изгороди въ такомъ мѣстѣ, въ которомъ позади ея и въ недалекомъ разстояніи отъ нея находится бы господствующая надъ нею возвышенность, которую безъ того уже задерживается вѣтеръ, или въ такомъ мѣстѣ, въ которомъ верхняя линія изгороди находилась бы въ уровеньъ съ поверхностью защищаемой ею мѣстности или даже ниже этой послѣдней. Внутреннія изгороди ставятся въ разстояніи 20—100 фут. одна отъ другой, смотря по болѣе или меньшей величинѣ участковъ, на которые разбивается все укрѣпляемое пространство въ зависимости отъ мѣстныхъ условий. При слишкомъ маломъ разстояніи онѣ преграждаютъ свободный доступъ воздуха и свѣта

въ поверхности участка, и дѣломъ растительность на отдѣляемыхъ или участкахъ выгораетъ отъ зноя въ смертномъ воздухѣ; при слишкомъ же большомъ разстояніи онѣ не защищаютъ достаточно всей поверхности отъ вреднаго дѣйствія вѣтра.

Въ случаѣ недостатка матеріала для устройства изгородей, можно замѣнить эти послѣднія болѣе простыми и дешевыми *залами*, которые устраиваются такъ: первоначально втыкаютъ въ песокъ рядомъ, какъ можно ближе другъ къ другу, хворостъ, пучки соломъ, дикой рябины, вересекъ и т. д. и оставляютъ, пока не занесетъ ихъ пескомъ; тогда на образовавшемся возвышеніи снова втыкаютъ хворостъ и снова оставляютъ его пока не занесетъ его пескомъ. Когда, послѣ повторенія этого нѣсколько разъ, образуется валъ надлежащей вышины, тогда весной, когда песокъ уже оттаеетъ и пока онъ еще содержитъ въ себѣ достаточно влаги, засѣваютъ по валу колоснякъ или морской овесъ (*Elymus arenarius*, L.) и песчаный тростникъ, называемый морской розгой (*Aeluropus arenaria*) въ 4, 5 или 6 параллельныхъ рядовъ, на разстояніи не болѣе одного фута рядъ отъ ряда. Эти растенія произрастаютъ дико на песчаныхъ берегахъ морей и растутъ хорошо при безпрерывномъ засыпаніи ихъ пескомъ, пуская изъ-подъ узловъ своего стебля корни, которыми скрѣпляютъ песокъ. Оба растенія могутъ быть разводимы на валу рядами не только поспѣлымъ, но и садовой нарочно возвращенныхъ для сего саженцевъ, или же экземпляровъ, взятыхъ съ мѣста, гдѣ они выросли дико, если они тамъ не нужны для укрѣпленія песковъ. Приносимый вѣтрами песокъ удерживается въ этихъ растеніяхъ, который, покрываясь наносами песка, быстро выдвигаются наружу. Такимъ образомъ, вскорѣ образуется холмъ отъ 2 до 3 сажень вышины и отъ 6 до 7 саж. ширины въ основаніи.

Однѣ изгороди достаточно защищаютъ укрѣпленное пространство только тогда, если песокъ не слишкомъ мелокъ; въ противномъ же случаѣ необходимо въ помощь изгородямъ прикрывать дерниной, хвоей, хворостомъ, тростникомъ, верескомъ, сорными травами и другими подобными веществами всю песчаную поверхность, или, въ случаѣ недостатка годнаго для того матеріала, по крайней мѣрѣ полосу въ 1—2 саж. ширины впереди каждой плетня, такъ какъ иначе можетъ совсемъ занести изгородь. Дернъ, лучше всего вересковый или торфяной, нарезанный пластами въ 2—3 дюйм. толщины и въ 1,5 фута ширины и длины, укладывается не сплошь, а въ разстояніи пласть отъ пласта на 6—8 дюйм. промежутки же засаживаются деревьями или засѣваются травами, годными для настилки. Хвоя собирается въ лѣсахъ подъ деревьями и наваливается слоемъ въ 3 дюйм. толщины; она укрѣпляетъ песокъ очень хорошо, но, трудно согнывая, допускаетъ посѣвъ травъ не раньше какъ черезъ 5—6 лѣтъ послѣ насаженія ея. Для покрытія 1 десат. хвоей нужно по крайней мѣрѣ 20 десат. хвойнаго лѣса. Хворостъ, особенно сосновый и слювый (лапка), начиная съ восточной или юго-восточной стороны укрѣпляемаго пространства, настилается рядами, такъ чтобы послѣдующій рядъ перекрывалъ нѣсколько предыдущій. Устилку хворостомъ можно начинать фут. 6—8 позади изгороди, такъ какъ на это разстояніе достаточно защищаетъ сама изгородь, а въ мѣстахъ, наиболѣе подверженныхъ дѣйствію вѣтра, можно прибавлять хворостъ деревянными гвоздями или же втыкать его толстыми концемъ въ землю. Хворостъ не только предохраняетъ песокъ отъ разноса, но и содѣйствуетъ еще образованію дерна, защищая почву отъ палящихъ лучей солнца и доставляя ей, по своему согнанію, черноземный покровъ. Конечно, настилка хвороста не должна быть до того густа, чтобы она препятствовала доступу воздуха и свѣта въ растенія, развивающіеся подъ защитой хвороста. Для покрытія 1 десат. нужно 120—150 однокоп. возовъ сосноваго хвороста. Хуже хвороста прикрѣпка тростникомъ и верескомъ, употребляющаяся, однако, въ случаѣ неимѣнія

перваго. Тростниковая настилка удерживается жердями, которая вкалывается въ песокъ и приближаются деревянными гвоздями; она скоро разлагается.

Въ случаѣ недостатка матеріала для прикрытія сыпучаго песку, необходимо прибѣгнуть къ укрѣпленію его засѣвомъ такихъ растеній, которыя могутъ расти на сухихъ и тощихъ песчаныхъ мѣстахъ. Къ числу этихъ послѣднихъ кромѣ приведенныхъ выше морскаго овса (колосняка) и морской ржи (песчаного тростника), принадлежатъ еще: осока песчаная (*Carex arenaria*, L.) и пшеница сытниковидная (*Triticum junceum*, L.), какъ растенія лучше всего произрастающія на пескахъ; при возможности же прикрыть песокъ хворостомъ или коммостомъ, можно засѣвать его съ укрѣпкомъ: овсомъ желтымъ (*Avena flavescens*, L.), овсяницей овечьей (*Festuca ovina*, L.), мятликомъ луковичнымъ (*Poa bulbosa*, L.), бухарникомъ мятликомъ (*Holcus mollis*, L.), луковикомъ сѣрымъ (*Aira canescens*, L.), щетинникомъ зеленымъ (*Setaria viridis*, P. B.), песчаной гвоздикой (*Statice armeria*), бухарникомъ горнымъ (*Jasione montana*, L.), лещинкой волосистой (*Hieracium pilosella*, L.), тильландомъ богородской травой (*Thymus serpyllum*, L.), понутикомъ песчанымъ (*Plantago arenaria*, W. et K.), бороданикомъ глянчымъ (*Lapsana pusilla*), итиценожкой (*Ornithopus perpusillus*, L.), колокольчиками рѣвчатовиднымъ и круглолистнымъ (*Campanula rapunculoides*, L. и *rotundifolia*, L.), выюнкомъ полевымъ (*Convolvulus arvensis*, L.), крупкой (*Draba verna*, L.), дроками английскимъ и волосистымъ (*Genista anglica*, L. и *pilosa*, L.), деревомъ (*Sarothamnus scoparius*, Wimm.), полевой (*Artemisia campestris*, L.) и нижней дикой-рябиной (*Tanacetum vulgare*, L.) — растеніями, которыя доставляютъ довольно хорошій кормъ овцамъ, почему засѣанный ими сыпучій песокъ, какъ только достаточно задороветъ, можетъ служить для выгона овецъ.

Наиболѣе соотвѣтствующее средство укрѣпленія сыпучаго песка есть разведеніе на немъ лѣсныхъ древесныхъ породъ, изъ коихъ пригодны для этого сосна, ива (шелюга), дубъ, тополь, береза и можжевельникъ, въ особенности же первый дѣвѣ—шелюга (*Salix acutifolia*, Willd.) и сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris*, L.). Первая разводится черепками, длиной $\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{2}$ до 2 аршинъ даже, толщиной $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ дюйм., которые заготовляютъ весной, до появленія листа, изъ прошлогоднихъ, не слишкомъ развилыстыхъ вѣтвей, выбирая преимущественно ровные длинные пруты; въ случаѣ же невозможности имѣть черенки по близости мѣста посадки, заготовляютъ ихъ и въ исходѣ зимы, чтобы воспользоваться для ихъ перевозки еще самымъ путемъ и чтобы успѣть доставить черенки въ началу весны и начать садку пока земля еще сыра. Впрочемъ, садить шелюгу можно и осенью, но въ такомъ случаѣ черенки заготавливаются незадолго до посадки, и, если нужно подвести ихъ издалека, то, чтобы они не высохли, завертываютъ ихъ въ сырыя рогузки, которыя смачиваютъ по нѣскольку разъ въ сутки. Кромѣ того, по доставкѣ ихъ въ мѣсто, полезно класть ихъ въ воду дня на два передъ высадкой. Черенки шелюги сажаютъ подлѣ наугъ, т. е. кладутъ въ открываемую наугомъ борозду и закрываютъ, провѣдая слѣдующую борозду подлѣ предыдущей. Борозды проводятся перпендикулярно къ направленію господствующаго вѣтра и закладываются черепками или попарно, въ разстояніи $1\frac{1}{2}$ саж. пара отъ пары, или же участками, по восьми бороздъ сразу, съ разстояніемъ до 40 и болѣе саженой между участками, смотря потому, гдѣ оканчивается дѣйствіе вѣтра. Засадивъ укрѣпляемое пространство въ одномъ направленіи, засаживаютъ его точно также и въ другомъ, перпендикулярномъ первому; слѣдствие чего образуются квадратные участки, защищенные со всѣхъ сторонъ отъ вѣтра. Черенки навоза не втыкаются въ землю, такъ какъ при этомъ кора легко отдѣлается отъ древесины и черенки не принимаются. Сосна разводится на пескахъ посѣвомъ чистыхъ сѣмянъ,

высевомъ шишекъ или посадкой деревьевъ; послѣдній способъ наиболѣе употребителенъ. Для посадки употребляютъ 2-лѣтние и нестарше 3-лѣтнихъ саженцевъ, которые сажаютъ рядами въ разстояніи 1 и неболѣе 3 фут. одинъ отъ другаго. При разведеніи сосны посѣвомъ чистыхъ сѣмянъ, посѣвъ производится въ началѣ весны, въ сухую погоду, въ борозды, открываемыя плугомъ или ручнымъ орудіемъ, въ направленіи отъ запада къ востоку, глубиной 10—12 дюйм. и въ разстояніи 2—2½ фут. одна отъ другой. Посѣвъ закрываютъ хворостомъ, чтобы предохранить сѣмена отъ растаскиванія птицами и отъ вреднаго дѣйствія жара. При недостаткѣ хвороста можно по гребнямъ бороздъ втыкать прутья и перегнать ихъ подъ угломъ въ 30°. Если же разводить сосну посѣвомъ шишекъ, то ихъ разбрасываютъ по поверхности или кладутъ въ борозды, а по истеченіи двухъ или трехъ недѣль послѣ посѣва, смотря по погодѣ, когда шишки начнутъ раскрывать чешуйки и роить сѣмена, шишки возвращаютъ деревянной бороной или обыкновенной метлой. Дубъ разводится посадкой и посѣвомъ желудей. Подъ защитой деревьевъ, изъ опавшихъ листьевъ, иголъ, щепъ и сучьевъ скоро начинаютъ образовываться на сыпучихъ пескахъ органическій покровъ, который способствуетъ и укрѣпленію неспоквѣ и лучшему развитію древесныхъ породъ; а потому въ лѣсныхъ насажденіяхъ на сыпучихъ пескахъ отнюдь не слѣдуетъ убирать лѣсного сора, а, при сведеніи ихъ, начинать рубку съ противоположной господствующему вѣтру стороны.

Въ крайнемъ случаѣ, на сыпучихъ пескахъ, защищенныхъ вѣтряной и плутрейними изгородями, при достаткѣ навоза, навозной жижи и компостнаго удобрения, можно разводить нѣкоторыя полевныя растения, болѣе мирящіяся съ сухостью почвы, какъ-то: рожь, земляную грушу, просо (могаръ), майскъ, фасоль, картофель, инчерель, люпинъ. Рожь можетъ разводиться на пескахъ глубиной въ 30—40 фут., если удобрять пески ежегодно или черезъ каждыя два года компостомъ изъ вересковой дернины и производить посѣвъ на столько рано, чтобы всходы ржи, до наступленія зимы еще, могли плотно укрыть землю. По жнивью ржи, еще въ томъ же году, можно высѣять горчицу, если это допускается мѣстная продолжительность благоприятнаго для этого лѣтнаго и осенняго времени; посѣванна торца скашивается, сжигается или же зашивается на зеленое удобреніе.

Земляная груша сажается обыкновенно въ дунки, наполненные навозомъ или компостомъ; своими широкими листьями и большими стеблями она защищаетъ пески отъ развѣса, а глубоководные корни обезпечиваютъ ихъ въ отношеніи почвенной влаги. Клубни земляной груши могутъ оставаться въ землѣ на всю зиму; ботва ея зашивается обыкновенно въ землю при выборкѣ клубней. Просо можетъ произрастать на пескахъ только при сильномъ удобреніи, но за то, имѣя это послѣднее, оно выноситъ здѣсь засуху и жаръ и не страдаетъ ни отъ сырости, ни отъ болѣзней. При сильномъ же удобреніи, въ болѣе южныхъ странахъ можно воздѣлывать на пескахъ майскъ (букурзу) и фасоль, сажая зерна ихъ въ дунки или борозды по навозу и закрывая посѣвъ бороной. Картофель сажается на пескахъ на 5—6 дюйм. глубиной, но не окуливается; при удобреніи компостомъ даетъ хорошіе урожаи. Люпинъ самое драгоцѣнное растение для песковъ по богатству листовъ, отнимающей почву, и глубиной, на которую развиваются его корни.

Менѣе сыпучія песчаная почва, покрывшіяся разн. растеніями дѣлается унавоженной далѣ оставленіемъ ихъ на болѣе долгое время подъ выгономъ безъ вспашки; причемъ пасущіеся животныя утаптываютъ землю, а устроеніе вспашки устраняетъ разрыхленіе земли, такъ что земля связывается все болѣе и болѣе корнями растеній и перегноемъ, образующимся изъ сгнивающихъ частей растеній. Черезъ 4—5 лѣтъ такого выгона можно обрабатывать

пески подъ засѣвъ какого-либо полезнаго растенія, безъ всякаго сверху этого удобрения.

Навозка земель, наплавленіе, прудовое хозяйство, накопные пруды.

Пополненіе въ почвѣ недостающей изъ главныхъ составныхъ частей ея, какъ-то: глины, песка, извести и перегноя, опредѣляющихъ главнымъ образомъ физическія свойства почвы, можетъ быть произведено различно въ зависимости отъ того, будетъ ли эта недостающая часть находиться подъ самымъ почвеннымъ слоемъ, требующимъ улучшенія, на всемъ протяженіи этого послѣдняго и на такой глубинѣ, на которой можно достать ее плугомъ, или же она будетъ залегать не подъ всемъ требующимъ улучшенія почвеннымъ слоемъ или на такой глубинѣ подъ нимъ, что нельзя достать ее плугомъ или, наконецъ, въ большемъ или меньшемъ разстояніи отъ мѣста выношенія требующаго улучшенія почвеннаго слоя, на самой ли поверхности или на нѣкоторой глубинѣ подъ поверхностью земли.

Въ первомъ случаѣ недостающая составная часть или землестая масса, болѣе богатая этой составной частью, чѣмъ требующій улучшенія почвенный слой, можетъ быть примѣшана къ этому послѣднему помощію болѣе или менѣе глубокой вспашки.

Этотъ случай чаще встрѣчается при раздѣлкѣ торфяныхъ болотъ (стр. 358) и такой способъ пополненія недостающей составной части примѣняется здѣсь, если торфъ образуетъ слой не глубже 8—16 дюйм. Для успѣха такого кореннаго улучшенія торфяной почвы лучше, если подъ торфянымъ слоемъ находится болѣе песчаный слой, чѣмъ болѣе глинистый, особенно если въ этомъ послѣднемъ не находится извести. Глубокой вспашкой въ этомъ случаѣ можетъ предшествовать съ успѣхомъ выжиганіе; необходимо же должна предшествовать основательная осушка помощію соотвѣственно проведенныхъ канавъ, шириной 16 фут. сверху и 6 фут. внизу у подонья и глубиной 4—5 фут. Канавы дѣлаются на столько глубокими, чтобы былъ стокъ воды въ главную отводную канаву. Чѣмъ глубже канавы, тѣмъ меньше можетъ быть число ихъ, тѣмъ полнѣе осушка. Выбросъ изъ канавы распределяется по обѣимъ сторонамъ ихъ, полосой въ 2 саж. ширины, которая въ случаѣ надобности можетъ служить дорогой.

Глубокая вспашка производится помощію трехъ слѣдующихъ одинъ за другимъ въ ту же борозду плуговъ различной конструкции. Первый—висячій плугъ (напр. рис. 32), запряженный парой воловъ, спинаетъ дернъ на глубину 3 дюйм.; второй—передковій съ высокими колесами у передка, руко-долообразнымъ корпусомъ и прѣвѣннымъ грядилемъ (напр. рис. 34 только съ передкомъ), запряженный 2 парами лошадей или воловъ, углубляется на 12—16 дюйм. до матерой земли; наконецъ, третій—собственно райольный плугъ весьма сильной конструкции, съ высокой отвальной доской (напр. рис. 24 только безъ передка), запряженный 3 парами воловъ, выворачиваетъ, по крайней мѣрѣ, 6 дюйм. землестого слоя и засыпаетъ имъ плѣсъ, отвернутый вторымъ плугомъ. Встрѣчающіеся при этомъ камни или древесные корни должны тотчасъ же выкапываться слѣдующими за плугами рабочими и извлекаться на поверхность. При болѣе мелкомъ торфяномъ слое, толщиной 6—7 дюйм., достаточно тщательной вспашки двумя плугами, причемъ точно также долженъ быть вывернутъ наружу землестой слой.

Глубокую вспашку лучше всего производить летом или осенью, и глубоко вспаханную землю оставлять на зиму без всякой дальнейшей обработки; весной же выравнивать тяжелой железной борошей под покровом осы. Глубокая вспашка должна повторяться каждые 6 лет, но крайней мерой в течении первых 20 лет; так как здесь песок легко спускается вниз, в совершенно разрыхленную плугом торфяную массу. Глинистая земля, по своей связности, удерживается на поверхности лучше песка. Кипечно, во второй раз стоимость глубокой вспашки значительно меньше, чем в первый, когда она, при трех плугах, обходится в Северной Германии в 6—7 тал. на 1 морген. (28—32 руб. за десятину).

В случае большой толщины торфяного слоя, в 1½—2½ даже 3 и более фут., торфяник может быть раздлан помощью так называемой *градовой культуры*, которая по существу своему весьма сходна с глубокой вспашкой, которая тем успешнее, чем крупнее зерно песка, залегающий под торфяным слоем, и которая может быть успешной еще и тогда, если между торфяным и песчаным слоем залегают глинистый слой — нетолще однако 12—15 дюйм. Эта культура, подобно глубокой вспашке, требует основательной предварительной осушки и относится благоприятно к предварительному выжиганию. Вдоль главной осушительной канавы оставляется полоса торфяника в 2½ саж. ширины, которая возвышается выброном из главной канавы и служит для проезда, прогона или же для заворота с орудиями. Под прямыми или острыми углом к главной канаве отбиваются параллельные канавы, шириной 16 фут., в 6 саж. расстояния одна от другой. За тем выбирается из канав торф и в ручных тачках по доскам распределяется и разравнивается по обе стороны канавы, на 3 саж. расстояния от края канавы в каждую сторону. За торфом выбирается глинистый слой, а за этим песчаный на глубину по крайней мере 12 дюйм., с которыми поступают точно также как и с торфом. Песок должен покрывать поверхность слоем не тоньше 4 дюйм. слишком. Посад этого канавы получают следующие размеры: в ширину 16 фут. сверху и 11 фут. внизу и в глубину 4—5 фут. Из готовых междурядных канав вода отводится в главную осушительную канаву помощью 6-дюймовых дренаж. При 4-футовой глубине междурядных канав, рытье этих последних обходится в Северной Германии в 22½ талера (около 100 руб.), расчистка выброма 2 тал. (около 9 руб.) и дренаж 25 зильб. грош. (около 1 руб.) с моргена (с десятины); при большей глубине соответственно дороже. Вынутые 144 куб. фут. на половину песку, на половину торфа обходится средним числом в 5 зильб. грошей (около 20 коп.), причем рабочий зарабатывает в день 18 зильбергройш. (около 70 коп.). Гряды, тотчас же по окончании их устройства, могут быть засеяны овсом. Весьма хорошо при первых вспашках смешать с песком несколько торфа. Десятина раздланного таким образом торфяника при удобрении приблизительно 12 пуд. костяного суперфосфата, 12 пуд. раскисленной костяной муки и 9 пуд. калиевой соли, без нужной обработки, дала слишком 31 четверть овса рядового посева. Посев овса на раздланном участке следовали: кормовая вика или горох (Виктория) по удобрению, рожь по костяному удобрению, картофель или кормовая свекла, овес, клевер для укоса или выгона, рожь по костяному удобрению, а затем кормовой вики или горохом начался снова 6-польный севооборот. Все урожаи вообще были очень хороши; так получено кормовой вики 650 ауд., ржи 22½ четверт., гороха 14½ четверт., овса 34 четверт., картофеля 134½ четверт. с десятины; а только урожай клевера был несомненно удовлетворителен — 130—200 пуд. с десятины.

При обращении торфяника помощью градовой культуры в постоянный луг, выгодно покрыть торфяную массу не толще 3 дюймов землей.

слоем, не смотря на более или менее глинистыя или песчаные свойства этого последнего; сбывать канавы шириной около 12 фут. с возможностью закрывать в них воду. смотря по надобности; смешать нужной вспашкой наспавший землей слой с ½, примерно, торфа и в первые три года до заезда травой засыпать последовательно овсом, плугопольным растением по удобрению и снова овсом. Впрочем, если землей слой представлять очень плотную глину, то успех такой культуры все же сомнителен.

Если бы при этой культуре, точно также как и при глубокой вспашке, вынутый наружу песок опустился современным вниз, то можно или вычерпать воду из междурядных канав водоподъемной машиной, углубить их еще на 1 фут. и извлеченный при этом песок разбрасывать на поверхность гряд, или же, спустя еще некоторое время, перевернуть гряды.

Глубокой же вспашкой может быть улучшена иногда и сыпучая песчаная почва, если под подвешенным слоем находится более плотный, лучший качества землей слой и если этого последнего слоя вывернуть наружу по крайней мере 6—8 дюйм.; для посева же колосовых хлебов даже больше, потому что хлеба иначе выгорают.

Если же земля или вещество, которым нужно улучшить почвенный слой, залегают глубоко под этим последним, как это бывает с мергелем, так что нельзя бывает произвести смешение помощью глубокой вспашки, или, хотя и выходит даже наружу, но лишь на небольшом пространстве, в вид бугров или холмов, как это бывает с глиной или песком, — тогда необходимо бывает добывать землю для улучшения из одной или нескольких ям или выкапывать ее из бугра и развозить затем уже по предназначению к улучшению пространству. Добывание из ямы затрудняется значительно с увеличением глубины ее, не только потому, что с большей глубиной ее делается затруднительнее извлечение из нее, но и потому что на большей глубине нелегко, как напр., при добытии мергеля, приходится иметь дело с водой, которая должна быть отстрапана сначала работой, на которой устранение бывает иногда до того затруднительно, при необходимости выкапывать машиной, что делает решительно невыгодным добывание.

Если же необходимая для улучшения земля находится не под почвенным слоем, требующим улучшения его, но, как это часто случается, в большем или меньшем расстоянии от него, тогда к расходу на более или менее трудное добывание улучшающего вещества присоединяются еще расходы на перевозку его на большее или меньшее расстояние от места копки до предполагаемого к улучшению пространства; это увеличение расходов может быть часто до того значительно, что в состоянии сбывать улучшение почвы помощью навозной земли нерасчетливым.

О значительности расхода на перевозку улучшающего вещества при улучшении почвы навозной землей, можно судить по количеству земли, которое требуется в различных случаях для улучшения

почвы. Такъ, чтобы увеличить въ почвенномъ слое, 4 вершк. глубины, содержание песка только на 50%, необходимо вывезти 8000 пуд. (400 возовъ) песку на десятину, полагая въсь 1 куб. саж. песку только въ 800 пуд.; такое количество песка можетъ покрыть почву слоемъ не толще $\frac{1}{2}$ вершк. Большой же частью такого количества песку недостаточно и случается необходимость въ покрытии почвы слоемъ песку въ 1 вершк. толщины; для этого же понадобилось бы 40,000 пуд. (2,000 возовъ) песку на десятину. Мергеля вывозится на десятину отъ 6 до 20 и болѣе куб. саж. (отъ 4,800 до 16,000 пуд. или отъ 240 до 800 возовъ), а торфа отъ 20 до 50—60 куб. саж. (отъ 8 до 20—24 тысячъ пудовъ или отъ 400 до 1,000—1,200 возовъ). Понятно, что, при необходимости вывозки такихъ громадныхъ количествъ, особенно важную роль играютъ при рѣшеніи вопроса о возможности примѣненія навозки земель въ данномъ случаѣ *разстояніе*, на которое приходится перевозить, и *способъ перевозки*. Такъ, перевозка мергеля на разстояніе свыше $1\frac{1}{2}$ —2 верстъ отъ мѣста копки до предполагаемаго къ улучшенію мергелемъ поля рѣдко оказывается выгодной. Весьма важна возможность перевозки въ наиболѣе свободное отъ полевыхъ работъ время, слѣдовательно зимой, когда въ то же время полевые дороги находятся въ наиболѣе проходимомъ состояніи. Наконецъ, для перевозки на колесахъ, на саняхъ ли, весьма удобны ящики, которые могутъ быть спораживаемы чрезъ верхній край опрокидываніемъ ихъ или чрезъ отверстіе, образуемое вынутіемъ одной изъ стѣнокъ ящика, обыкновенно задней. Для перевозки на колесахъ можно употреблять одноконные тачки (ратки), изъ коихъ лучшія англійскія. Для развозки улучшающаго вещества изъ ямъ или бугровъ, находящихся на самомъ улучшаемомъ пространствѣ, употребляются ручныя тачки; самое же разбрасываніе изъ навезенныхъ кучъ дѣлается лопатой (песокъ, глина, мергель) или вилою (торфъ).

Наилучше примѣняется улучшеніе почвы *навозной мергеля*. Мергель (стр. 79) представляетъ тѣсное смѣшеніе углекислой извести съ глиной; сверхъ того сюда примѣшивается песокъ, нѣкоторые другіе минеральныя вещества (окисъ желѣза, углекислая магнезія, гипсъ) и органическія вещества. Мергели бывають землянистыя, порошкообразныя, слоистыя; иные похожи на камень. Въ изломѣ мергель часто раковистый и всегда матовый; въ сухомъ состояніи приливаетъ въ языку на подобіе глины, маслянисть на ощупь, склеиваетъ съ кислотами, распадается на воздухѣ въ рыхлую массу и образуетъ съ водой скорѣе кашичу нежели тѣсто. Цвѣтъ его различенъ: зеленоватый, желтый или бѣлый, часто же коричневый, красный, сѣроватый, голубоватый или черноватый. Эти различныя цвѣта происходятъ отъ окисловъ желѣза или марганца, отъ большаго или меньшаго количества извести, песку, глины и органическихъ веществъ, содержащихся въ немъ. Мергели очень распространены въ депулической (водной) части земной коры, особенно же между юрскими и меловыми членами ея. Различаютъ мергели: *известковый* съ со-

держаніемъ 50—90% извести бѣлаго, желтаго или сѣраго цвѣта, скоро распадающійся на воздухѣ; *песчанистый* съ содержаніемъ, при 10—50% извести, отъ 50 до 75% песку, рыхлый; *глинистый* съ содержаніемъ, при 25—50% извести, 50—75% глины, плотный и маслянистый на ощупь, обыкновенно темноватыхъ, хотя различныя цвѣтовъ; *магнезистый* съ содержаніемъ отъ 5 до 30% углекислой магнезій, очень рѣдкій; наконецъ, *черноземный* или перегнойный, содержащій много органическихъ остатковъ. Мергели содержатъ кали (0,082—0,163%) и аммиакъ (0,0047—0,0579%), къ тому же тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе содержится въ немъ извести; содержаніе же въ нихъ воды (1,6—2,0%) увеличивается съ содержаніемъ въ нихъ глины. Кромѣ геогностическихъ указаній въ описаніи мергеля, залегающаго неглубоко, можно руководиться указаніями растений, любящихъ мергельную почву (стр. 167). При мергельныхъ развѣдкахъ слѣдуетъ обращать особенное вниманіе на горные откосы, берега и подошвы овраговъ, и, въ случаѣ обнаруженія слѣдовъ нахожденія мергеля, прибѣгать въ заступу или земляному бураву (стр. 166), по предварительному испытанію образца кислотой, для открытія въ немъ присутствія углекислой извести, а затѣмъ и къ болѣе точному опредѣленію въ немъ содержанія глины, песку и извести (стр. 159—160 и 100). Если мергель найденъ и если онъ оказался годнымъ, а примѣненіе его, по соображенію расходовъ на его добываніе и перевозку, — выгоднымъ, то сначала снимають верхнюю землю, а затѣмъ устраивають сѣзды въ яму и вытѣхъ изъ нея и, если бы оказалось пучиннымъ, прорывають каналы для отвода воды изъ мергельной ямы или устанавливають насосы для ея откачки. Мергель можно вывозить во всякое время, удобное для проѣзда по полю, но чаще вывозится онъ лѣтомъ на паровое поле подъ озимъ или, особенно если онъ очень плотный: трудно разсыпается, — поздней осенью и зимой, пока холода не затрудняютъ слѣзкомъ его конки, подъ яръ (горохъ, картофель и т. п.). Его рассыпають, когда онъ по возможности распадется самъ (стр. 110); такъ какъ тѣмъ лучше, чѣмъ полѣе распадется мергель до занаша и чѣмъ лучше будетъ онъ смѣшанъ, послѣдствіе этого, съ почвеннымъ слоемъ. Послѣ разсыпки поле укатываютъ, боронуютъ, еще разъ укатываютъ и мелко занашивають. Послѣ этого, если только позволяетъ время, перенапахивають поле еще разъ и даже болѣе, такъ же мелко, какъ и въ первый разъ, проборанивая его между всѣшками. Всѣ эти работы, въ особенности же первыя, должны быть производимы въ возможно сухую погоду; по въ промежуткахъ между всѣми этими работами желательны даже дожди. Въ первые годы послѣ павозки мергеля не слѣдуетъ пахать глубоко, потому что известъ, одна изъ дѣйствующихъ составныхъ частей мергеля, и безъ того уходитъ внизъ (стр. 113). Мергель улучшаетъ почву для всѣхъ растений вообще. Мергель, какъ вещество улучшающее преимущественно физическія свойства почвы, дѣйствуетъ содержащимися въ немъ известью, глиной и пескомъ; а потому дѣйствіе его весьма различно на различныя почвы, смотря по свойствамъ почвъ, которая улучшается мергелемъ, и мергеля, которымъ улучшается почва. Песчаный мергель лучше всего можетъ дѣйствовать на глинистыхъ почвахъ, глинистый — на песчаныхъ, известковый — на перегнойныхъ; но если не имѣется выбора, то можно употребить глинистый мергель и на глинистой почвѣ, песчаный мергель и на песчаной почвѣ, пылая его только въ первомъ случаѣ побольше, а во второмъ поменьше; такъ какъ здѣсь мергель дѣйствуетъ главнымъ образомъ известью и дѣйствіе это должно быть сильнѣе въ первомъ и слабѣе во второмъ случаѣ. Такимъ образомъ, мергель оказываетъ особенно сильное дѣйствіе на почвахъ вообще мало плодородныхъ, песчаныхъ и суглинистыхъ, содержащихъ мало извести, но достаточное количество перегноя, хотя бы и кислыхъ свойствъ; на глинистыхъ почвахъ его дѣйствіе значительно только тогда, если почва содер-

жить мало известно, онъ же, напротивъ, — больше известен и песку; на известковых почвах мергель употребленъ лишь, если въ немъ немного известия, но больше другихъ составныхъ частей, въ особенности глины и перегноя. Почва нуждается въ улучшеніи мергелемъ, если она производитъ много кислыхъ растений, въ особенности шавеля (*Rumex*); и появленіе этихъ растений вновь на почвахъ разъ улучшенныхъ мергелемъ указываетъ на необходимость повторенія такого улучшенія. Это наступаетъ чрезъ различныя промежутки времени въ зависимости отъ свойствъ почвы и мергеля и количества этого послѣдняго, употребленнаго для улучшенія. Такъ, можно въ большинствѣ случаевъ считать, что улучшеніе мергелемъ почвы соответствующимъ свойствамъ, при которомъ на десятину вывозится около 17 куб. саж. мергеля или почва покрывается слоемъ мергеля толщиной въ $\frac{1}{2}$ дюйма, сохраняетъ свое дѣйствіе въ теченіи 20 — 30 и болѣе лѣтъ. Что же касается количества, въ которомъ мергель долженъ приниматься для улучшенія почвы, то оно зависитъ отъ свойствъ почвы и мергеля. Мергеля, содержащаго много известия, нужно меньше вообще, на песчаныхъ же и особенно известковыхъ почвахъ въ особенности; песчанистаго мергеля вывозится обыкновенно меньше, чѣмъ глинистаго, въ особенности на песчаныхъ почвахъ; плодородная почва требуетъ меньшаго количества мергеля, чѣмъ тощая. Для приблизительнаго опредѣленія стоимости мергеляго улучшенія, въ даннымъ относительно стоимости перевозки, которая будетъ указана ниже, слѣдуетъ прибавить, что при каждой тачкѣ, съ грузомъ въ 20 пуд., необходимо 2 рабочихъ для загрузки и разброса мергеля и что надержки на закладку ямы, отвода воды и пр. могутъ составлять 10 — 25% стоимости ручной работы, не считая въ томъ числѣ работъ по смѣшенію мергеля съ почвеннымъ слоемъ.

Послѣ мергеля наиболее пригодно *навозка перегной* въ видѣ *торфа* (стр. 95 — 96) или *болотнаго луговаго чернозема* и *прудоваго ила*. Послѣдніе два суть пещества собственно сегодоваго образованія (стр. 93 — 94); болотный черноземъ образуется въ низменныхъ мѣстахъ изъ минеральной части почвы этихъ низменныхъ мѣстъ, въ которой примѣшиваются органическія остатки произрастающихъ на ней растений и минеральныя и органическія частица, принесенныя сюда водой; поэтому въ различныхъ случаяхъ онъ представляетъ массу различно богатую перегноемъ, въ тому же въ различной степени разложившуюся, смотря по степени сырости мѣста образованія болотнаго, луговаго чернозема; онъ представляетъ массу содержащую перегной въ большей степени разложенія и большее количество землянистыхъ частей, чѣмъ торфъ, хотя принимаетъ иногда характеръ торфяной массы точно также какъ иногда, при условіяхъ болѣе благоприятныхъ для разложенія растительныхъ остатковъ, переходитъ въ черноземную почву, весьма богатую органическими пеществами. Прудовой илъ есть собственно прудовая сегодовая почва (стр. 93). Какъ торфъ, такъ и болотный черноземъ и прудовой илъ могутъ содержать въ себѣ вредныя для растений вещества, напр. въ видѣ перегнойной кислоты (стр. 90) или растворимой соли закиси желѣза.

Эти вещества, послѣ предварительной осушки мѣсть ихъ добыванія, въ особенности же прудовой илъ, навозиваются лучше всего дѣломъ или осенью и складываются въ кучи длиной около сажени, шириной $1\frac{1}{2}$ арш. и въ высоту $\frac{3}{4}$ арш., на самомъ мѣстѣ добыванія, или поблизу его, если они должны пролежать въ кучахъ годъ и болѣе, или же на паровомъ полѣ, которое наиболее удобно для улучшенія навозкой земли и на которое они капаются въ такомъ случаѣ еще съ осени. Въ такомъ положеніи эти вещества остаются въ теченіе зимы или еще болѣе продолжительнаго времени; подвергаясь дѣйствию кислорода воздуха при достаточной степени влажности и теплоты, которая обезвечивается имъ складкой ихъ въ кучи, они подготавливаются для

лучшаго дѣйствія на почву и на произрастающія на этой послѣдней растенія. При этомъ вредныя пещества, обислаясь выше, становятся безвредными, (стр. 77); растительные остатки и перегнойныя вещества, разлагаясь дальше, даютъ соединенія, годныя для благоприятнаго дѣйствія на почву и для питанія растенія (стр. 90 — 91); болѣе разложившаяся масса становится и болѣе годной для улучшенія физическихъ свойствъ большей части почвъ (стр. 149 — 150), въ особенности же песчаныхъ; мало разложившаяся же торфяная масса годна развѣ для улучшенія самыхъ плотныхъ глинистыхъ почвъ. Разложение этихъ массъ въ кучахъ можетъ быть значительно ускорено, а хорошее дѣйствіе ихъ на почву и растенія усилено смѣшеніемъ ихъ въ кучахъ съ известью или золой, поливкой ихъ навозной жижей или переслоеніемъ ихъ съ хлѣвнымъ навозомъ. Изъ кучъ, лежащихъ на полѣ или только что вывезенныхъ на поле, подготовленная перегнойная масса разбрасывается по полю конатой, если она болѣе земляниста, или вилой, если она болѣе торфяниста, и затѣмъ разбрасывается и смѣшивается, наконецъ, съ почвой неглубокой вспашкой, но возможности заблаговременно до заѣзда улучшаемаго такимъ образомъ поля.

Послѣ перегноя, наиважнѣе сподручна *навозка песку*, въ особенности на торфяныхъ почвахъ, которая она улучшаетъ поразительно, такъ что, если песокъ находится неподалеку торфяной почвы, — а это случается перѣдко — то едва ли можно найти другое улучшеніе, которое окончилось бы такъ скоро и вѣрно, какъ улучшеніе торфяной почвы пескомъ. Торфяная почва навозится пескомъ въ такое время, когда она наиболее доступна для подвоза, слѣдовательно, въ сухое или морозное, и когда рабочія руки въ хозяйствѣ наиболее свободны отъ спѣшныхъ полевыхъ работъ. Песокъ можетъ быть разбросанъ сейчасъ же послѣ его паконки по поверхности улучшаемой или почвы, такъ какъ пѣть надобности въ предварительномъ оставленіи его въ кучахъ; онъ не содержитъ вовсе или содержитъ весьма мало вредныхъ веществъ, или такихъ, которыхъ разложеніе могло бы отъ этого значительно усиливаться. Песокъ разбрасывается по поверхности задерѣвней торфяной почвы, если навозится слоемъ до 3 дюйм. толщины, или же предварительно вспаханной и всбороненной почвой, если навозится слоемъ, слегка закрывающимъ почву; разбрасывается возможно равномерно, лучше всего осенью или даже зимой, пока почва вовсе не покрыта или не покрыта еще глубоко сѣномъ, весной же по песку высеивается овесъ, который, будучи тщательно забороненъ, обыкновенно удается весьма хорошо. Песокъ не запахивается обыкновенно, такъ какъ, при замашкѣ его, онъ осмывается легко въ борозды и слѣдовательно дурно смѣшивается съ почвой; если же смѣшивать его съ почвой предварительно заѣзда, то лучше смѣшивать помощію безотвалныхъ орудій (скоропашекъ, эжектораторовъ, грубберъ иъ) съ предварительно вспаханной и выборопанной почвой. При навозкѣ песку болѣе толстымъ слоемъ на задерѣвную поверхность, песокъ замѣняетъ обработку и означаетъ этихъ значительную часть расходовъ на его вывозку; такъ какъ обработка задерѣвней почвы довольно затруднительна, а въ мѣстахъ, гдѣ такая почва, по своей рыхлости, не поднимаетъ рабочаго скота, даже невозможно. Въ осени дернина, покрытая пескомъ, совершенно разлагается, и живые, если только оно поднимаетъ рабочій скотъ, можетъ быть легко вспахано, или же, во всякомъ случаѣ, легко перекопано или взомыжено людьми. Если такая торфяная почва не слишкомъ влажна, то послѣ овса она можетъ дать довольно хорошій урожай ржи; въ болѣе же части случаевъ вѣрнѣе послѣ повторенной навозки песку. Гдѣ нужно осушеніе, тамъ оно должно быть произведено до навоза песку; иначе, торфяная почва, страдающая отъ избытка застаивающейся въ ней воды, можетъ быть еще испорчена навозкой

песка, такъ какъ плотный и сырой песчаный покровъ покрылся бы скоро сплывками и хвощами.

Навозка песку представляетъ весьма дѣйствительное средство улучшения вязкихъ глинистыхъ почвъ, хотя случаи ея примѣненія могутъ встрѣтяться рѣже, потому что количества песка, необходимыя для навозки на глинистыхъ почвахъ, весьма значительны. Глинистая почва, при содержаніи 80% иловатыхъ частей и въ томъ числѣ 50% глинистыхъ, почти совершенно безплодна; при содержаніи такихъ частицъ на 10% меньше приведеннаго, производительность ея подвергается еще многимъ случаямъ. Такъ, что для улучшения свойствъ такой почвы необходима примѣсь по крайней мѣрѣ 10% песку. Успѣхъ навозки песка на глинистыя почвы въ тѣхъ случаяхъ, когда такое улучшение почвы возможно, зависитъ отъ тщательности смѣшенія песка съ почвой, которая достигается лучше всего разбраиваніемъ песка по поверхности всахающей и хорошо разборошенной почвы и смѣшеніемъ его съ хорошо измелченной такимъ образомъ почвой, въ сухомъ ея состояніи, помощью безотвальныхъ орудій; при употребленіи же для этого плуга, первая всахака должна быть мелкая и уборобороздная и за ней должно слѣдовать тщательное боронованіе. Послѣдующія же всахи должны постепенно углубляться. Если же запахать песокъ въ первый разъ на всю глубину пахатнаго слоя и притомъ еще при нѣскольکو влажномъ или даже мокромъ состояніи почвы, то прадъ ли можно рассчитывать на хорошее смѣшеніе песка съ почвой даже въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ.

Наконецъ, могутъ быть случаи выгоднаго *навозки глины* на песчаныхъ почвахъ, если мѣсто добычанія глины недалеко отъ улучшаемой почвы, такъ какъ улучшающее дѣйствіе глины на песчаную почву весьма значительно, даже при вывозѣ ея въ сравнительно меньшихъ количествахъ, чѣмъ песка на глинистыя почвы, напр. въ количествахъ 24—36 тысячъ пуд (1200—1800 возовъ) въ три раза черезъ промежутокъ времени въ 5—6 лѣтъ между каждымъ разомъ. Но такъ какъ песчаная почва можетъ быть улучшаема болѣе удобно навозкой мергеля или перегоя и даже воздѣлываніемъ на нихъ извѣстныхъ растений, оставленіемъ ихъ подъ выгономъ и т. д., то, при неимѣніи въ большей части случаевъ по близости ихъ глины для ихъ улучшения, улучшение ихъ навозкой глины представляетъ болѣе рѣдкое явленіе, чѣмъ улучшение почвы навозкой мергеля, перегоя или песку. Успѣхъ навозки глины зависитъ, какъ и при навозкѣ другихъ земель, отъ тщательнаго смѣшенія ея съ улучшаемой почвой. Это же послѣднее достигается лишь тогда, если глина вывозится въ томъ состояніи, въ которомъ она наилучше рыхлится, если она смѣшивается съ почвой сразу въ большихъ количествахъ помощью безотвальныхъ орудій или, при зашлѣ плугомъ, заханивается неглубоко. Рыхлость глины при смѣшеніи зависитъ отъ свойствъ глины и времени, въ которое она вывозится. Одни сорта глины при высыханіи твердѣютъ какъ камень и легко крошатся только въ состояніи уфрѣнной влажности; другіе распадаются лучше всего въ сухомъ состояніи. Лучшее время для вывозки глины то, когда глина находится въ томъ состояніи влажности, при которомъ она лучше всего крошится. Вывезенная глина должна разбрасываться по полю, а тѣмъ болѣе заханиваться тотчасъ почвѣ ея вывозки, но должна предварительно пролежать, по крайней мѣрѣ, одну зиму, а если можно то и часть лѣта въ крышеобразныхъ кучахъ, вышиной и шириной аршинъ. При этомъ она теряетъ вредныя вещества, вслѣдствіе дальнѣйшаго ихъ окисленія, подготавливается химически дѣйствіемъ продуктовъ разложенія содержащихся въ ней органическихъ веществъ и распадается разрыхляемая газами, отблѣкающимися при разложеніи органическихъ веществъ, постепеннымъ высыханіемъ зимними морозами. Если глина содержитъ нѣсколько процентовъ извести или переслаивается съ навозомъ или по крайней мѣрѣ съ 60—

лотнымъ черноземомъ, то складкой ея въ кучи на зиму достигается еще совершеннѣе ея распадѣніе. Конать и складывать глину въ кучи лучше всего потому подъ осень, по окончаніи жатвы, а смѣшивать съ почвой въ половинѣ лѣта. Разрыхленная глина разбрасывается по полю, размельчается еще болѣе боровами и каткомъ и смѣшивается съ почвой или безотвальными орудіемъ или плугомъ возможно мелко при узкихъ бороздахъ.

И такъ, улучшение почвы навозкой землѣ тѣмъ выполнимѣе, чѣмъ ближе къ мѣсту улучшения можетъ быть получена улучшающая почва земли, чѣмъ меньше количество, въ которомъ эта послѣдняя должна быть вывезена на поле, чѣмъ легче она рыхлится и смѣшивается съ почвой, чѣмъ полнѣе ея дѣйствіе на улучшение физическихъ свойствъ почвы, составляющее главную задачу навозки земель и чѣмъ болѣе при этомъ достигается пополненіе почвы питательными веществами вообще, въ особенности же питательными веществами въ состояніи удобоусвояемомъ для растений. Послѣднее же возможно лишь тогда, если навозимая земля представляетъ вещество процентно болѣе богатое, чѣмъ почва, питательными веществами вообще и въ особенности питательными веществами въ удобоусвояемомъ для растений видѣ. Во всѣхъ этихъ отношеніяхъ мергель въ большей части случаевъ стоитъ выше всѣхъ другихъ земель.

Затрудненіе, которое представляетъ для улучшения почвы навозкой земли перевозка большихъ массъ, особенно на значительныхъ разстояніяхъ, устраняется въ настоящее время въ нѣкоторыхъ мѣстахъ замѣной животной силы паромъ, который двигаетъ вагоны съ землей по канатному пути, или же при извѣстныхъ мѣстныхъ условіяхъ силой тяжести, которая влечетъ съ горы по рельсамъ вагоны, нагруженные землей, и въ то же время поднимаетъ вверхъ пустые вагоны; но сподручнѣе всего для насъ оно можетъ быть устранено въ нѣкоторыхъ случаяхъ замѣной животной силы силой воды, которая, двигаясь по покатости съ болѣе или меньшей скоростью, уноситъ съ собой болѣе или менѣе крупныя почвенныя частицы русла и береговъ ея теченія, или же частицы, которыя нарочно бросаются въ нее; замѣной собственно навозки земли такъ называемымъ *наплавленіемъ*.

Наплавленіе примѣняется наилучше въ рѣчныхъ долинахъ, заключенныхъ между суглинистыми или песчаными возвышенностями съ цѣлю превратить торфяную почву долины въ хорошіе, орошаемые дуга. Для этого рѣка или ручей запруживается какъ можно дальнѣе вверхъ по долині и изъ рѣки, выше запруды, проводится *водопроводная канава а* (рис. 159) съ весьма малымъ паденіемъ: она врѣзывается въ возвышенность, предназначенную къ сплавленію, на глубину того слоя земли, который долженъ быть сплавленъ, и доводится предварительнѣе до того мѣста, гдѣ вода, направленная изъ нея снова въ рѣку, можетъ имѣть уже на столько значительное паденіе, что въ состояніи быстро нести внизъ брошенную въ нее землю; здѣсь изъ пелъ, въ направленіи къ низинѣ прорывается сквозь возвышенность собственно *сплавная* или *наплавная* канава б съ паденіемъ два въ 1 — 2 дюйм. на 16 фут.




Рис. 159.

длины (0,005—0,010%). При этом чем больше масса воды, которою можно располагать для сплавления, тем меньше может быть наделение; так, если, при ширине водопроводной канавы у ее дна в 2 фута, уровень протекающей по ней воды находится на высоте $1\frac{1}{2}$ фут. от дна, то для влажности сплавления вполне достаточно 1—1½ дюйм. наделения на 16 фут. длины (0,005—0,008%). При малом количестве воды наплавление делается невыгодным, отчасти потому, что бросаемая в воду земля относится в таком случае недостаточно далеко, отчасти же и даже главным образом потому, что самая операция становится при этом малопроизводительной. Поэтому то, наплавление предпринимается всегда в такое время года, когда реки и ручьи наиболее богаты водой, т. е. поздней осенью или весной. Вода из водопроводной канавы стремительно направляется по наплавленной канаве на низину и увлекает с собой землю, которая безпрерывно бросается в нее небольшими количествами и разбрасывается в ней широкими мотыками и которую она снова осаждают внизу — там, где она приходит в покой. Земля, бросаемая в воду, скатывается так глубоко, чтобы наплавленная канава, подвигаясь в сторону скатываемой возвышенности, постоянно сохраняла указанное выше наделение; а так как при этом наплавленная канава постоянно расширяется, а вместе с тем протекающая по ней вода разливаясь на большую ширину, теряет много своей переносной силы, то для удержания воды в руслах 2—3 фут. ширины, прилегающем к срываемой возвышенности, со стороны сплавленной уже возвышенности кладут фашины в положении, указываемом на рисунке 159 буквами а, в, с, е, а между фашинами, для усиления их действия насыпают несколько земли. По мере того как земля скатывается, удлиняется водопроводная канава па-сышкой со стороны низины вала г, который подводится к несплавленной еще возвышенности так близко чтобы между этой последней и нпч оста-

валось отверстие д, шириной в 2—2½ фут., для выхода воды в наплавленную канаву; вместе же с удлинением вала необходимо подвигать в сторону несплавленной еще возвышенности и фашины, суживающие русло спускающейся к низине воды. Для успеха наплавления весьма важно, чтобы бросаемая в воду земля суглинистых, в особенности же глинистых свойств тщательно разбавлялась в воде. Так продолжается работа до тех пор, пока вверху не исчезнет возвышенность, а внизу сеньюлится низина. Опыт показал, что при наплавлении один работник с помощью воды может переместить земли гораздо больше чем 10—15 рабочих с ручными тачками. Сколько должно быть с одной стороны сплавлено, с другой — наплавлено земли, может быть определено предварительной нивелировкой местности; и знать это до начала сплавления важно для того, чтобы знать как далеко должна пропигать водопроводная канава в возвышенность или сколько кубич. футов земли должно быть сплавлено вниз. Конечно, если только позволяет количество воды, выгодно сплавить как можно больше возвышенности, так как этим приобретает большее пространство земли.

На самой низине сравнительно мало работы: если имеется в виду преимущественно возвысить какую либо особенно низкую лежащую часть низины, то окружают эту часть валами с и направляют на нее воду посредством наикосее положенных фашинок ж. Земля осаживается из воды прежде всего в углублениях и ямах; и, когда выведены эти последние, тогда только распределяется она равномерно по всей площади. Для того чтобы более мелкие земляные частицы, долго остающиеся взмученными, не попали в реку, необходимо бывает насыпать вдоль реки, по ее берегу, палы з; так, чтобы вода, прежде нежели она стекает в реку, собиралась перед валами, приходила здесь в покой и осаждала большую часть мелких частиц. Но если сплаваемая земля очень глинистых свойств, то вода уносит с собою весьма далеко глинистые частицы и осаживает их лишь там, где она приходит в покой аа более долгое время. Ниже лежащими мельницами приходится нередко терять от этих мелких глинистых частиц, а потому мельники обыкновенно первые противники наплавления. В этих случаях часто приходится устраивать поперек реки, выше мельницы плотину, которая, останавливая воду на некоторое время, заставляет ее осаждать глинистые частицы. Возвышенности могут сплавляться не с одного только, но и с обоих берегов реки; при этом можно сохранить старое русло реки, защитив его с обеих сторон валами з, или же можно совершенно завлаять его и затить прорыть новое. Впрочем можно землю сплаваемую с возвышенности на одном берегу, перенести на другой берег реки посредством широкого, перекинутого через реку жолоба ч, если направить ее в жолобу помощью косвенно положенных фашинок к, л, м и удерживать ее на противоположной стороне от обратного стекания в реку валами з вдоль противоположного берега реки. Фашины представляют весьма важное орудие наплавления, так как только помощью их можно дать воде желаемое направление и увеличить ее скорость сужением русла настолько, чтобы вода в состоянии была переносить более крупные взмученные части на расстояние 150—200 шагов. Лучшие фашины изготовляются из можжевельника, который по своей плотности почти вовсе не пропускает или пропускает весьма мало воды; их делают 6—8 фут. длины и 10—12 дюйм. в диаметре. Кроме можжевельника, хорошие фашины из ели и дуба; если же нельзя иметь таковых, то можно употребить жерди обитые соломой в 5 дюйм. толщины. Если фашины, как это часто случается засоряются землей, то их извлекают из этой последней и употребляют в новом месте.

Если на сплаваемой возвышенности находятся деревня или инв, то их

не валять, не корчуютъ, такъ какъ, при сплавленіи, корни ихъ постепенно обнажаются и они падаютъ сами собой. Точно также при сплавленіи возвышенностей, содержащихъ камни, эти послѣдніе различной величины обнажаются, такъ что нерѣдко сплавленное мѣсто представляется устланымъ камнями. Кустарники, находящіеся на сплавляемой низинѣ, можно также не выкорчевывать, если низина наплавляется такимъ толстымъ слоемъ земли, который въ состояніи прикрыть кустарники. Верхній, содержащій перегной слой земли сплавляемой возвышенности не бросаютъ обыкновенно въ воду, но распределяютъ его потомъ уже по поверхности наплавленного пространства; точно также, если на предназначенной для наплавления низинѣ находится мѣстами черноземъ, то его до начала наплавления, свиваютъ въ высокие кучи; если бы при этомъ образовались ямы, то это еще неважно, такъ какъ эти послѣднія скоро запосыются снова землей. Изъ кучъ черноземъ разбрасывается по поверхности наплавленного уже пространства или употребляется на приготовленіе компоста. Черноземъ, сохранившійся до верхняго слоя, значительно облегчаетъ образованіе новаго дерна, тогда какъ, въ противномъ случаѣ, онъ можетъ быть занесенъ слоемъ земли въ 3—4 фута. Наплавленіе возможно и происходитъ довольно быстро, если сплавляемая земля есть мелкозернистый песокъ или песчаный суглинокъ; но оно дѣлается совершенно невозможнымъ или происходитъ чрезвычайно медленно, если сплавляемая земля, напротивъ, глинистыхъ свойствъ, такъ какъ глина раскисается въ водѣ медленно и глинистыя частицы осаждаются изъ нея до того медленно, что, оставаясь долго взмученными, спускаются наконецъ, съ водой съ наплаваемого пространства.

По окончаніи наплавленія, выравниваютъ углубленія и ямы, остающіяся еще на наплавленномъ пространствѣ, причемъ пользуются конной лопатой (стр. 327, рис. 108); а когда поверхность нѣсколько обсохнетъ, тогда разравниваютъ ее, засѣваютъ соответствующими травами, присыпаютъ посѣвъ, если есть, компостомъ или мелкимъ навозомъ и заволакиваютъ обороченной боронкой; присылка и заволакиваніе весьма благоприятно дѣйствуютъ на дальнѣйшее развитіе посевовъ. Нерѣдко и обильное даже появленіе хвоща на наплавленныхъ мѣстахъ не должно смущать; онъ исчезаетъ при послѣдующемъ орошеніи.

Руководствуясь этимъ указаніемъ, можно нерѣдко воспользоваться мѣстными условіями для болѣе дешеваго наплавленія. Такъ, иногда достаточно бываетъ съ осени разрыхлить поверхность песчаной возвышенности, чтобы весеннія воды снесли съ нея массу песка и занесли имъ съ пользой близъ лежащее торфянистое мѣсто.

Чѣмъ меньше части, которыя несетъ вода, тѣмъ дальше переносить она ихъ, тѣмъ больше времени покойнаго стоанія воды необходимо для того, чтобы она осадилась эти иловатыя части; а потому, если необходимо примѣнять къ извѣстной почвѣ иловатыя части помощи воды, иначе *заилить* почву, то необходимо продержатъ эту послѣднюю нѣкоторое время подъ водой, содержащей много иловатыхъ частей.

Заливаютъ обыкновенно земли, лежащія на берегахъ рѣкъ, которыхъ вода въ извѣстное время года содержитъ много иловатыхъ частей и потому можетъ служить для *заиленія*. Заиленіе можно улучшить каждую почву, болѣе же всего легкую, сухую, песчаную, которая заносится при этомъ не только удобрительными веществами, но и значительнымъ количествомъ

влага. Низменныя, мокрыя мѣста могутъ быть значительно подняты, а следовательно и осушены въ извѣстной степени заиленіемъ, если это послѣднее повторяется довольно часто; извѣстно даже много случаевъ, въ которыхъ въ теченіи года былъ осаждеиъ слой ила толщиной въ 12—16 дюймовъ. Мокрыя мѣста, даже значительно поднятыя заиленіемъ, обращаются съ наибольшей выгодой въ покосы, тогда какъ заиленныя возвышенныя, сухія почвы полезны для обращенія подъ воздѣлываніе хлебовъ.

Конечно, дѣйствіе заиленія зависитъ отъ качества рѣчной воды, употребляемой для заиленія, т. е. отъ качества и количества не только взмученныхъ (ила), но и растворенныхъ въ ней веществъ; эти послѣдніе, проникая въ почву, отчасти остаются въ ней въ силу задерживательной способности почвы (стр. 112—117), отчасти же способствуютъ растворенію изъ почвы извѣстныхъ веществъ. Количество и качество взмученныхъ и растворенныхъ веществъ различны въ различныхъ рѣчныхъ водахъ; они различны даже у одной и той же рѣчной воды въ различныхъ мѣстахъ рѣки въ зависимости отъ горнокаменныхъ породъ, образующихъ русло рѣки и ея притоковъ, отъ продолжительности и полноты соприсосновенія воды съ атмосфернымъ воздухомъ и отъ быстроты теченія, а следовательно и отъ количества воды; они различны, наконецъ, въ одномъ и томъ же мѣстѣ рѣки въ различныя времена года. Во время половодья рѣки содержатъ обыкновенно болѣе взмученныхъ и меньше растворенныхъ частей. На стр. 75 приведены количество и химическій составъ растворенныхъ веществъ въ нѣкоторыхъ рѣчныхъ водахъ; здѣсь же, приведемъ тоже относительно взмученныхъ частей. Образцы нѣкоторыхъ рѣчныхъ водъ, взятые въ особенно благоприятное время, будучи влиты въ стеклянные цилиндры, осаживаютъ въ теченіи $\frac{1}{4}$ часа слои ила въ 1 дюймъ толщины, при высотѣ водянаго столба въ 15 дюйм. Рѣка Варъ во Франціи въ 1864—65 году

	содержала среднимъ образомъ 000 фунтовъ ила въ куб. саж. воды.	доставляла пудовъ ила.
въ Сентябрѣ	17,537	3514220,7
» Октябрѣ	201,580	798906873,0
» Ноябрѣ	12,944	46641303,5
» Декабрѣ	6,416	11486374,4
» Январѣ	1,238	273257,4
» Февралѣ	1,262	334096,2
» Мартѣ	8,809	2750913,4
» Апрельѣ	9,313	4391119,8
» Май	12,366	7590523,9
» Июнь	264,600	177426232,3
» Июль	39,675	16676907,0
» Августѣ	52,885	11938117,4
» теченіе цѣлаго года		1081930639,0

Наименьшее количество ила содержала рѣка Варъ 9 Января 1865 г. — 0,217 и наибольшее 30 Июня 1865 г. — 868,4 фунта въ 1 куб. сажени воды. Среднее содержаніе ила—общее годовое количество ила, раздѣленное на годовую объемъ протекающей воды — составляло 84,8 фунта ила въ 1 кубич. саж. воды. Общее количество ила, уносимаго Варомъ въ теченіи года, составляетъ примѣрно 1082 милліона пудовъ, представляющихъ приблизительно объемъ въ 1200000 куб. сажени, которыхъ достаточно было бы для покрывтія около 6000 десятины слоемъ ила въ $\frac{1}{4}$ арш. толщины.

Химическій анализъ показалъ въ илѣ изъ рѣки:

	Иль у Мюнхена.	Иль у Бе- венгаузена.	Граде.	Везера	Иль.
Растворимыхъ въ соляной кислотѣ	88,471	20,27	9,08	21,64	55,733
Нерастворимыхъ въ соля- ной кислотѣ	12,038	80,23	90,80	78,35	43,826
между растворимыми:					
Органическаго вещества в химически соединен- ной воды	1,685	4,15	1,93	5,50	9,426 ⁴⁾
Оксидъ желѣза	0,386 ¹⁾	2,00	2,22	3,36	15,992
Глинозема	0,422	1,86	1,07	4,16	10,341
Извести	59,757 ²⁾	6,40	1,35	2,68	1,817
Магнезинъ	24,627 ³⁾	1,31	0,80	1,38	2,271
Кали (въ видѣ хлорист. натра) щелочей	—	0,55	0,80	0,35	0,691
Хлора	—	—	0,08	0,11	1,283
Сѣрной кислоты	—	—	—	—	0,744 ⁵⁾
Фосфорной	—	0,25	неопредѣлано	—	—
Угольной	—	0,25	0,22	0,03	1,070
Кремневой	1,543	3,60	1,10	2,59	—
между нерастворимыми:					
Кремневой кислоты	—	68,00	79,42	64,66	26,801
Оксидъ желѣза	—	1,55	1,19	2,87	5,095
Глинозема	—	6,06	6,39	6,21	7,385
Извести	—	0,75	1,83	0,51	0,938
Магнезинъ	—	0,05	сильнѣе	0,41	0,933
Кали	—	2,81	1,90	2,09	0,552
Натра	—	1,04	0,57	1,60	2,127

Рѣка Вала у Иены, покрывая поднимаемая ею мѣста слоемъ ила въ 1¹/₂ дюйм., доставляетъ почвѣ на пространствѣ 1 десят. 111,3 пуда органическихъ веществъ съ 6,6 пуд. азота, 2,1 пуда азотной кислоты, 9,6 пуд. фосфорной кислоты, 1,3 пуд. хлористыхъ щелочей и 56,0 пуд. кали. Вообще рѣки, протекающія по мѣстностямъ съ мергелистой или суглинистой почвой, осаждаютъ болѣе плодородный иль, чѣмъ рѣки, протекающія по мѣстамъ съ песчаной почвой.

Для заклепиа необходимо заградить рѣку въ томъ мѣстѣ, откуда должно начаться заклепие, чтобы имѣть возможность всю массу рѣчной воды или только часть ея провести на предназначенную къ заклепию землю. Иногда бываетъ необходимо повысить берега рѣки выше заграды насинкой на обѣихъ сторонахъ рѣки вала, чтобы можно было поднять воду повыше и тѣмъ заставить рѣку возможно скоро заливать заклепное пространство большою массою воды. Поднятіе воды въ рѣкѣ до извѣстной высоты тѣмъ необходи-
мѣе, чѣмъ болѣе удалены отъ рѣки предназначенные къ заклепию участки, такъ какъ вода, пропущенная на эти участки каплями, легко можетъ осаж-
даться въ каналахъ плывучихъ частицъ, если теченіе ея не будетъ довольно быстро.

Участки, которые желательно заклепить, окружаются плотинами въ 3—4 фут. вышиной, въ которыхъ продѣлываются отверстія для входа и выхода

¹⁾ въ томъ числѣ углекислой закиси желѣза. — ²⁾ и ³⁾ въ видѣ углекислыхъ солей. — ⁴⁾ и ⁵⁾ показаны въ оригиналѣ въ нерастворимой части.

воды, запираемые плотины. Плотины должны быть съ совершенно горизон-
тальными гребнями; онѣ насыщаются изъ земли, которая выбирается изъ
вырываемыхъ позади плотинъ канавъ. Если почва представляетъ значитель-
ную покатость, то участки, окружаемые плотинами, не должны быть слиш-
комъ велики, такъ какъ иначе вода покрывала бы одну часть участка слиш-
комъ глубоко, другую слишкомъ мелко: это же, впрочемъ уже о болѣе стои-
мости въ такомъ случаѣ устройства плотинъ, идетъ въ тому еще, что по
1-хъ, иль, равномерно распределенный по всей массѣ воды, неравномерно
осаждается на различныхъ частяхъ большого участка; во 2-хъ, вода сильно
возмущается въ встряную погоду, образуетъ большія волны, которыя, конечно,
мѣшаютъ осажденію ила; и въ 3-хъ, нужно много времени, какъ для того
чтобы залить участокъ необходимымъ количествомъ воды, такъ и для того
чтобы спустить съ участка воду, осадившую уже иль; первое невыгодно въ
томъ отношеніи, что вода можетъ преждевременно осадить свой иль, второе
же — въ томъ отношеніи, что не позволяетъ повторять заклепиа большаго
участковъ такъ часто какъ малыхъ. Поэтому, наилучше имѣть нѣсколько
окружаемыхъ плотинами, смежныхъ, небольшихъ участковъ, въ 2 — 2¹/₂ де-
сятинны каждый; такъ какъ при этомъ можно наускать содержащую иль
рѣчную воду на то, что, то на другой участокъ, смотря по надобности. Для
возможности большого сокращенія протяженія плотинъ дѣлать участки по
возможности квадратными.

Время, въ теченіи котораго иль совершенно подѣляется изъ воды, запис-
ать отъ мѣлкости его частицъ; чѣмъ мельче эти послѣднія, тѣмъ продолжи-
тельнѣе подѣленіе, и часто необходимо для этого 12, даже 24 — 48 часовъ.
Подъ конецъ осаждающійся иль, впрочемъ, самый лучшій, такъ какъ онъ
содержитъ наибольшее количество перегнойныхъ частицъ. Поэтому, если
желать извлечь наибольшую пользу изъ заклепиа, то не слѣдуетъ спускать
спускомъ воды съ заклепного участка. Вода должна спускаться постепенно,
не вдругъ, чтобы она не волновалась, не поднимала при этомъ снова ила и не
сносила его.

Если заклепиаются луга, которые должны и впредь служить для покоса, то
не должно заклепать ихъ сразу глубоко, чѣмъ на 1¹/₂ дюйма; въ особенности же,
если иль очень густой, потому что при болѣе глубокомъ заклепиа подав-
ляется совершенно дерновая растительность. При 1¹/₂ дюймовомъ же закле-
пиа злаки не только выносятся наружу, но и обновляются, образуя въ иль-
номъ слое новые боковые побѣги и корни. Заклепие лучше всего уничто-
жаетъ червей, насекомыхъ и т. д. на лугахъ. Наконецъ, оно постепенно
умельшаетъ имѣющіяся небольшія неровности и, будучи повторено нѣ-
сколько разъ, дѣлаетъ лугъ даже до того гладкимъ и ровнымъ, что трава на
немъ можетъ скашиваться у самой поверхности земли. Если часто заклепиа
низменный, мокрый лугъ съ богатой перегноемъ почвой, то при этомъ ко-
нечно, теряется часть столь важнаго для растительности перегноя, вследствие
того, что этотъ послѣдній глубоко заносится плотью. Поэтому, чтобы сохра-
нить хотя часть перегноя въ этомъ случаѣ, обраскиваютъ его мѣстами въ
луги или совсѣмъ связать его съ луга прочь, или разбрасываютъ его потомъ
по поверхности заклепного луга.

Снѣговая и дождевая воды спосать съ полей много хорошихъ,
плодородныхъ частицъ земли въ нижележащія мѣста или даже въ
рѣки. Поэтому, если соответствующимъ устройствомъ плотинъ
удержать эти воды въ нижележащихъ мѣстахъ, то можно заставить
ихъ осадить успешнымъ или вещества на днѣ пруда, образовавша-
гося съ устройствомъ плотинъ. Въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ на днѣ

пруда может накопиться столько плодородного ила, что съ прудового дна, если бы оно до этого представляло даже довольно толстую почву, можно, по спуску воды и подлежащей осушке, получить несколько весьма обильных урожаев; когда же почва понижается, восстанавливают пруды обыкновенно на столько лет, сколько лет сгнивали съ прудовой почвы урожан. Прудовой водой можно пользоваться для разведения рыбы, орошения лугов и водопоя; она же облегчает содержание домашней водной птицы — гусей. Такое попеременное пользование угодьем, как полемъ и какъ прудомъ, представляетъ известный видъ такъ называемаго *прудоваго хозяйства*, который можетъ быть очень выгоднымъ тамъ, гдѣ недостаетъ воды и пашова и гдѣ въ цѣль рыба.

Успѣхъ прудоваго хозяйства зависитъ отъ избранія пригодной для устройства прудовъ мѣстности, отъ соответствующаго устройства ихъ во остальныя части и отъ надлежащаго пользованія ими.

Мѣстность пригодна для устройства пруда, если:

а) обезпечиваетъ достатокъ хорошаго качества воды. При непроницающей прудовой почвѣ можно имѣть пруды изъ однихъ снѣговыхъ и дождевыхъ водъ, но такія пруды нерѣдко пересыхаютъ зѣтомъ, а если и не пересыхаютъ, то вода ихъ бѣднѣетъ кислородомъ и переносится продуктами гниения органическихъ веществъ до того, что водящихся въ ней рыбъ оказываютъ или мясо ихъ принимаетъ непріятный вкусъ. Поэтому для образования хорошаго пруда, кромѣ снѣговой и дождевой водъ, необходимо еще постоянный притокъ рѣчной или ключевой воды; въ особенности первой, такъ какъ она теплѣе, мягче и содержитъ болѣе чѣмъ ключевая вода, кислорода и органическихъ веществъ, служащихъ пищей для рыбы. Постоянный притокъ воды въ прудъ весьма важенъ зимой, въ видахъ обезпеченія рыбъ, заключенныхъ подъ ледяной корой необходимымъ для нихъ кислородомъ. Непригодны для рыбъ, отчасти же и для орошенія луговъ, вода, которая содержитъ въ растворѣ: или большое количество солей, какъ то гипса, углекислыхъ: извести, магнези и закиси желѣза, поваренной соли и хлористыхъ: извести и магнези (часто ключевая вода), или дубильныя и перегнойныя вещества (вода, вытекающая изъ дубовыхъ лѣсовъ или торфяныхъ болотъ), или вредныя газы (сѣрный водородъ, какъ напр. вода въ которой примѣнивается вода изъ мочальныхъ ямъ), или вода, стекающая изъ другого пруда, бѣдная кислородомъ и изопатыми, питательными для нѣкоторыхъ рыбъ (грунтовыхъ *) кария) веществами, которая осадилась или потреблена рыбами въ другомъ уже прудѣ. Качество большей части этихъ водъ можетъ быть исправлено оставленіемъ ихъ на болѣе продолжительное время въ соприкосновеніи съ атмосфернымъ воздухомъ, напр., во время провода ихъ на нѣкоторомъ разстояніи въ открытыхъ канавахъ; такъ какъ при этомъ онѣ обогащаются содержаніемъ кислорода и, отчасти вслѣдствіе процесса окисленія, отчасти же вслѣдствіе потери растворенныхъ газовъ (углекислоты), освобождаются отъ избытка нѣкоторыхъ вредныхъ, растворенныхъ въ нихъ веществъ (перегнойныхъ, углекислоты извести). Кромѣ температуры и мягкости или жесткости воды, которая могутъ быть опредѣлены прямыми нетрудными изслѣдованіемъ: первая — помощію термометра, послѣдняя же —

*) которая держится у дна и не пятаются другими рыбами, а пятаются преимущественно червями, налимными, падалюю, иломъ и т. д.

помощію мыла, котораго растворъ въ дождевой водѣ или спиртѣ мутнѣетъ отъ прибавленія къ нему жесткой воды *), количество воды можетъ быть отчасти опредѣлено изъ прямого пеннѣнія пригодности ея для того или другаго рода рыбы въ ямѣ, которая, шириной и длиной 10—12 в глубина 5—6 фут., роется на мѣстѣ предполагаемаго пруда; въ нее проводится, затѣмъ, вода, имѣющаяся для наполненія пруда, и, наконецъ, выпускаются нѣкоторые виды рыбъ (особенно удобны для испытанія карий, щука и форель), которые предполагается разводить въ будущемъ прудѣ. Если рыбы, при поторья предполагается разводить въ будущемъ прудѣ въ такое, однако, время, когда блюденіи ихъ въ теченіи нѣсколькихъ недѣль въ такое, однако, время, когда вода въ рѣчкѣ или прудѣ, изъ котораго взяты онѣ для опыта, будетъ имѣть температуру мало разнающуюся отъ температуры воды въ опытной ямѣ, — температуру мало разнающуюся отъ температуры воды въ опытной ямѣ, — остаются здоровыми, бодрыми и держатся болѣе у дна, а не всплываютъ наверхъ, то можно разсчитывать вполне на пригодность такой воды для прудоваго хозяйства. Отчасти же качество воды можетъ быть опредѣлено по качеству растеній, произрастающихъ въ водѣ и по берегамъ воды. Въ хорошей рѣчной водѣ растутъ: лютики водной и плавающей (*Ranunculus aquatilis*, L. и *fluitans*, Lam.), разные виды рдеста (*Potamogeton*), какъ то: сизоводный (*P. perfoliatus*, L.), плавающий (*P. natans*, L.), длинный (*P. gracilongus*, Wulf.) и др. По берегамъ такихъ рѣкъ встрѣчаются: манники: обыкновенный (*Glyceria fluitans*, R. Br.) и поядной (*G. aquatica*, Presl.), канарейникъ тростниковый (*Phalaris arundinacea*, L.), сусакъ зонтичный (*Butomus umbellatus*, L.), стрѣлолистъ обыкновенный (*Sagittaria sagittifolia*, L.), аиръ болотный (*Acorus calamus*, L.) и проч. Признакомъ хорошей ручейной и ключевой водъ бываютъ: уруть мутноватый (*Myriophyllum verticillatum*, L.), жеруха лекарственная — водяной крессъ (*Nasturtium officinale*, R. Br.), вероника ибунка (*Veronica beccabunga*, L.), разные роды нитчатокъ (*Confervae*) и др. Въ болѣе бѣдной питательными веществами водѣ растутъ: поручейники широколистный и узколистный (*Sium latifolium*, L. и *S. angustifolium*, L.), шавель водной (*Rumex aquaticus*, L.), вехъ ядовитый (*Cicuta virosa*, L.), мята водная (*Mentha aquatica*, L.), чистецъ болотный (*Stachys palustris*, L.), частуха-подорожника — водяной шалынь (*Alisma plantago*, L.), рогозъ широколистный (*Typha latifolia*, L.), камышъ болотный (*Scirpus palustris*, L.), разные виды ситника (*Juncus*, L.) и др. Вода, совершенно бѣдная питательными веществами, производитъ однихъ лишь осоки (*Carex*, L.): острую (*C. acuta*, L.), обыкновенную (*C. vulgaris*, Fries.) и др. Нѣкоторые виды хвоща (*Chara*) растутъ въ известковой водѣ, а кубышка — кубышка желтая (*Nuphar luteum*, Sm.) и нимфея бѣлая (*Nymphaea alba*, L.) — въ медленно текущихъ водахъ. Кромѣ того, если на мѣстахъ заливаемыхъ водой, растутъ хорошия травы, то заливаемая вода имѣетъ хорошия качества.

б) представляютъ соответствующихъ качество прудовую почву, лучше всего сулинную или мергелистую, такъ какъ эти роды почвъ болѣе благоприятны для рыбъ, въ особенности грунтовыхъ, и въ то же время, при своей малой проницаемости для воды, хорошо удерживаютъ воду въ прудѣ и представляютъ хороший матеріалъ для возведенія плотинъ. Глинистая почва, годная въ этомъ послѣднемъ отношеніи, неблагоприятна для рыбъ, какъ прудовая почва. Для нѣкоторыхъ рыбъ (форелей) особенно хороша песчаная или хрищевая почва, которая, если только лежитъ на непроницающемъ водѣ слое, можетъ быть хорошей почвой рыбнаго пруда. Впрочемъ, вслѣдствіе за-

*) Впрочемъ, присутствіе въ водѣ углекислыхъ и хлористыхъ извести и магнези, гипса и поваренной соли можетъ быть дознано способами, указанными на стр. 101 и 161.

иления и несколько пропускающая воду почва делается непроницаемой, так что пруды, в которых первоначально дурно держится вода, со временем начинают держать ее довольно прочно. Совершенно негодны для прудовых почв почвы мблвая или известковая и в особенности богатая перегноем (торфяная); первая, потому что доставляют водѣ много растворимой ею углекислой известки, вторая же, потому что лишаютъ воду кислорода. Впрочемъ, для многихъ грунтовыхъ рыбъ, напр. карпія, карася и т. д. весьма хорошо, если прудовая почва въ верхнемъ своемъ слое плодородна, содержитъ перегной;

в) дѣлаетъ возможною надлежащую глубину пруда, меньшую 2—3 фут. въ вершинѣ пруда; если же прудъ долженъ доставлять кромѣ того воду для орошенія луговъ, то такой глубины мало. У плотинны пруды, соответственно паденію своего дна и своей длинѣ, будутъ глубже. Рыбы, приравненныя къ такимъ условіямъ, предпочитаютъ мелкіе пруды, въ которыхъ легче согрѣвается вода и которые, вслѣдствіе этого, доставляютъ рыбамъ больше пищи—червь и навозныхъ, предпочитающихъ такую воду. Мелкіе пруды, наполненные водой не глубже 2—3 фут., зарастаютъ травой, въ особенности малякомъ обыкновеннымъ (*Glucosia fluitans* R. Br.), котораго сѣмена доставляютъ весьма пригодную пищу для нѣкоторыхъ рыбъ, въ особенности карпія. Пруды, въ которыхъ растутъ много травы, даютъ, по снуеѣ изъ нихъ воды, немалое количество подстилки, доставляющей превходный навозъ. Но, за то мелкіе пруды должны имѣть постоянный притокъ воды, такъ какъ иначе они не только скоро пересыхаютъ, но и находящаяся въ нихъ органическая вещества, вслѣдствіе сильнаго нагреванія воды, скоро переходятъ во вредное для рыбъ гніеніе. Кромѣ того, въ мелкихъ прудахъ не можетъ зимовать рыба, особенно въ болѣе сѣверныхъ странахъ, гдѣ то щина льда достигаетъ 3 фут. Для зимовки въ нихъ рыбы необходимы особыя, глубокия ямы—рыбныя котлы (искусственные бочаги), которыя даютъ въ то же время возможность точно знать, гдѣ слѣдуетъ зимой прорубить ледъ; проруби должны, впрочемъ, дѣлаться съ осторожностью, чтобы рыба не пугалась, не всплывала, вслѣдствіе этого, наверхъ и не примерзала плавающимъ ко льду. Глубокіе же пруды представляютъ то удобство, что часть ихъ воды, напр. фута 2 изъ 9, можетъ быть употреблена для орошенія, и что зимой, при полной высотѣ въ нихъ воды, они обезпечиваютъ возможность зимовки для рыбъ, даже если бы толщина льда достигала значительной величины. Все же выгоды, представляемыя мелкими прудами на столько значительны, что по возможности слѣдуетъ избѣгать глубокихъ.

г) представляетъ соответствующее для пруда положеніе, лучше всего слегка покатую ложбину, такъ чтобы, при паденіи прудоваго дна не менѣе какъ въ 0,007, вода могла бы безпрепятственно и вполне стекать со дна. При такомъ маломъ паденіи, конечно, водная поверхность должна быть весьма значительна, если прудъ долженъ имѣть соответствующую глубину. Такъ, для глубины пруда у плотины въ 9 фут., длина водной поверхности отъ входа воды въ прудъ до плотины должна составлять уже около 184 саж., что весьма часто отбѣчаетъ, примѣрно, 11 десят. водной площади. Поэтому, въ малыхъ прудахъ необходимо гораздо болѣе паденіе для того, чтобы имѣть воду надлежащей глубины; но, если паденіе слишкомъ велико, то для образования большой водной поверхности потребуетъ слишкомъ дорого стоющая, высокая плотина. А потому, въ случаѣ необходимости устроить прудъ въ очень крутой, узкой долинѣ, лучше устроить нѣсколько меньшей величины прудовъ, чѣмъ одинъ большой; такъ какъ устройство нѣсколькихъ небольшихъ плотинъ потребуетъ значительно меньше земной работы, а слѣдовательно и будетъ стоить дешевле, чѣмъ устройство одной большой плотины, хотя эта послѣдняя уменьшитъ площадь поверхности нѣсколько менѣе, чѣмъ

первая; такъ какъ дѣла, для наполненія одного пруда съ высокой плотиной потребуются гораздо большае воды, чѣмъ для наполненія нѣсколькихъ съ меньшей высокими плотинами, если величина водной поверхности въ обоихъ случаяхъ одинакова; такъ какъ меньшая глубина пруда до извѣстной степени предпочтительна болѣе (стр. 412), и такъ какъ, наконецъ, въ первомъ случаѣ вода покрываетъ дно, а слѣдовательно и занимаетъ его равномерно, чѣмъ во второмъ. Но, при этомъ, необходимо, 1) чтобы поверхность воды лежащаго пруда не находилась выше устья сточнаго жолоба выше лежащаго пруда, такъ какъ иначе вода не могла бы быть слущена до чиста изъ верхняго пруда безъ того, чтобы не спустить хотя части ея изъ вышлага, что въ болѣе части случаевъ весьма неудобно; и 2) чтобы нижній прудъ могъ всегда получать воду помимо верхняго, прямо изъ источника (напр. рѣки), такъ какъ если нижній прудъ получаетъ воду не иначе какъ изъ верхняго, то групповыя рыбы первого получаютъ махонитательную воду (стр. 40); такъ какъ дѣла вода въ жолобѣ, проводящемъ ее изъ верхняго въ нижній прудъ, при маломъ паденіи его, легко замерзаетъ, отчего рыбы нижняго пруда, даже хищныя*), легко могутъ терпѣть недостатокъ въ водѣ; и такъ какъ, наконецъ, при выловѣ рыбы необходимымъ въ такомъ случаѣ особый, иногда весьма неудобный порядокъ.

Если долина, превращаемая въ прудъ, слишкомъ широка, то необходима длинная плотина; если же бока ложбины ниже той высоты, на которую должна быть поднята вода въ прудѣ, то необходимы кромѣ передней плотины еще и боковыя (возвышеніе береговъ); въ обоихъ случаяхъ значительно увеличивается стоимость прудоваго устройства. Напротивъ, расходы на устройство плотины значительно сокращаются, если долина, ложбина съ высокими боками и, при небольшомъ паденіи и глубинѣ ея, суживается мѣстами и въ томъ же изгибается; такъ какъ первое дѣлаетъ возможнымъ устройство болѣе короткой плотины въ мѣстѣ суженія ложбины, а второе ослабляетъ во время бурь дѣйствіе волнъ на плотину. Хорошо, если положеніе пруда, кромѣ наводненія въ немъ снѣговой и дождевой водѣ, дѣлаетъ возможнымъ еще проведеніе въ него ключевой, или еще лучше рѣчной (стр. 110) воды. Съ пользой могутъ быть устраиваемы пруды подлѣ рѣки (рис. 160, запружен-




Рис. 160.

ныхъ шлюзовъ, такъ какъ при этомъ, располагаясь одинъ за другимъ, вдоль покатой долины, они могутъ, въ видахъ сокращенія расходовъ на ихъ устройство, имѣть одну общую плотину для каждаго двухъ смежныхъ по-

*) которыя питаются другими рыбами, напр. прудовая форель.

дот и наполняться водой и спораживать от воды по желанію, независимо одинъ отъ другаго. Такое же устройство годится и для наплавленія (стр. 409). Пруды вообще должны находиться въ мѣстахъ, неподверженныхъ наводненіямъ, въ противномъ случаѣ должны быть защищены отъ наводненій, такъ какъ наводненія могутъ прорывать плотины, павосить въ пруды много земли и камней, заводить въ нихъ хищныхъ рыбъ и выводить изъ нихъ разводныхъ рыбъ, которыя, всплывая на поверхность переливающейся чрезъ плотину воды, дѣлаются добычей людей и животныхъ; если же наводненія случаются въ то время, когда пруды покрыты льдомъ, то они поднимаютъ преждевременно рыбу изъ мѣстъ ея зимовки. Поэтому при устройствѣ нѣсколькихъ прудовъ въ поватой долині одного за другимъ, хорошо провести водопроводную канаву подлѣ прудовъ и сдѣлать изъ нея водные выпуски сбоку каждого пруда; такъ какъ эта же канавка, если только возвыситъ ея берегъ со стороны прудовъ насыпкой вала, можетъ служить для отвода избытка воды помимо прудовъ и слѣдовательно защищать эти послѣдніе отъ наводненій. Лучшіе пруды находятся среди удобряемыхъ полей, луговъ и выгоновъ, съ которыхъ дождевой и снѣговой водами спосится много плодородныхъ частицъ и въ то же время пищи для грунтовыхъ рыбъ; пруды же, окруженные возвышенностями, съ которыхъ могутъ сноситься въ нихъ водой земля или камни, требуютъ значительныхъ издержекъ на защиту или же на очистку ихъ отъ заносовъ. Пруды, окруженные со всѣхъ сторонъ деревьями или находящіеся въ лѣсу, не пользуются въ достаточной степени солнцемъ, и потому не даютъ столько хорошей рыбы, но и хорошихъ урожаевъ по спуску изъ нихъ воды; впрочемъ у большихъ прудовъ съ сѣверной стороны соседство лѣса менѣе вредно, чѣмъ у малыхъ съ южной, а нѣсколько отдаленныхъ деревьевъ могутъ быть полезны даже съ южной стороны пруда, такъ какъ и рыбы любятъ иногда тѣнь. Наконецъ, очень удобно, если положеніе будущаго пруда обозначиваетъ возможность полученія въ не далекомъ отъ пруда разстояніи необходимыхъ земли и зерна для поведенія плотины.

И такъ пруды могутъ устраиваться въ ложбинахъ, долинахъ (балкахъ, верхкахъ) или для собиранія и храненія снѣговой и дождевой воды, которыя стекаютъ въ ложбину съ окружающихъ ее возвышенностей и къ которымъ присоединяется иногда въ большемъ или меньшемъ количествѣ вода ключей, открывающихся на днѣ или въ берегахъ пруда; или для храненія воды, которая проводится въ нихъ изъ близлежащихъ: рѣки, ручья, ручья или ключей (рис. 161); или же они устраиваются въ долинѣ рѣки, изъ которой въ нихъ проводится вода, съ насыщенными берегами, вдоль рѣки (рис. 160). Въ первомъ случаѣ устройство пруда нерѣдко, при сравнительно небольшомъ количествѣ воды, ограничивается насыпкой одной глухой, безъ всякихъ отверстій плотины; въ послѣднихъ же двухъ оно требуетъ кромѣ плотины, канавъ, водоспуска, водосливовъ и т. д.

Соответствующее устройство пруда во всѣхъ его частяхъ требуетъ 1) *тщательной нивелировки*, которая должна быть поручена челоуку, хорошо знакомому съ цѣлю; ею опредѣляется относительное возвышеніе различныхъ точекъ мѣстности; 2) опредѣленія на основаніи нивелировки линіи прудоваго берега (а, а, а, рис. 161), направленія и размѣровъ плотины (б, б) и различныхъ канавъ, раз-




Рис. 161.

мѣровъ углубленія и выравниенія дна, иначе *составленія проекта устройства пруда*; и 3) *тщательнаго выполненія проекта, т. е.*

а) *проведенія канавъ*: главной приводной, впускной, обводныхъ, оросительныхъ, спускныхъ и главной отводной канавы.

Главная приводная канавка служитъ для наполненія пруда водой, если эта послѣдняя приводится изъ рѣки и ключей. Хорошо, если вода во время половодія можетъ находиться въ приводной канавѣ на 6 дюйм. ниже ея краевъ и если размѣры водопроводной канавы допускаютъ наполненіе пруда водой въ теченіе 24 часовъ. Приводная канавка должна имѣть шлюзъ при выходѣ ея изъ рѣки или ручья *де у* для того, чтобы можно было управлять наполненіемъ пруда водой. Если бы же уровень воды въ рѣкѣ или ручьѣ понижался въ лѣтнее время до того, что вода не входила бы въ приводную канаву, то необходимо было бы зарудить рѣку шлюзомъ *е* ниже выхода изъ нея приводной канавы. Для большаго укрѣпленія каналы ее пскрпляютъ

отвѣсно поставленной, четырехугольной деревянной трубы (б в, рис. 164 *), которая со стороны, противоположной входу въ нее водосточной трубы, имѣетъ разборчатую стѣнку изъ плотно прилегающихъ другъ къ другу дощечекъ (1, 2, 3, 4, 5, 6), вставляющихся въ пазы, выбранные въ двухъ боковыхъ стѣнкахъ; дощечки удерживаются кромѣ того въ ихъ положеніи находящимся передъ ними брускомъ (шир. 3 дюйм.), который пазимымъ своимъ концомъ вставляется въ желѣзное гнѣздо, а верхнимъ приставляется къ водосточной трубѣ помощью желѣзнаго крюка. Снявъ крюкъ съ бруска, вставляя одну дощечку за другой, начиная снизу, можно поднимать воду выше и выше; наоборотъ, прижимая прочь дощечки одна за другой, начиная сверху, можно спускать воду все ниже и ниже и, наконецъ, прижавъ прочь посаженую, самую нижнюю, можно спустить всю воду. Для этого-то отвѣсная труба дѣлается такой длины и вкапывается въ дно пруда на такую глубину, чтобы отверстіе водосточной трубы приходилось въ уровень съ прудовымъ дномъ, и чтобы самая высшая дощечка ея разборчатой стѣнки, находящаяся на высотѣ наибольшаго уровня воды въ прудѣ, устанавливается она лучше всего на каменномъ основаніи и утверждается въ своемъ отвѣсномъ положеніи належащими подпорками. Такая труба съ разборчатой стѣнкой можетъ замѣнять собой отчасти водосливъ или шлюзъ, такъ какъ вода, поднимавшаяся выше высшей дощечки, можетъ истекать черезъ отвѣсную трубу въ водосточную. Во второмъ случаѣ боковое коническое, расширяющееся вверху отверстие водосточной трубы закрывается деревянной конической втулкой (рис. 165), которая посажена на стержень, движущійся совер-




Рис. 164.




Рис. 165.

шенно отвѣсно въ особенной подстанкѣ; эта послѣдняя устанавливается прежде укладки водосточной трубы на брускахъ (а, ж и ж рис. 163), которые вставляются въ дно пруда такъ глубоко, чтобы отверстіе положенной на нихъ водосточной трубы находилось вровень съ прудовымъ дномъ и приходилось какъ разъ подъ втулкой (рис. 163 и 165).

Если, при значительной величинѣ пруда, укладывается нѣсколько водосточныхъ трубъ, то онѣ могутъ укладываться одна подлѣ другой съ общей подстанкой для запирающихъ ихъ отверстій втулокъ; или же, если желательно употребить спускаемую изъ пруда воду возможно полно для орошенія, то можно положить двѣ водосточныя трубы, примѣрно, по срединѣ между с и ж (рис. 161) въ обѣ стороны отъ с. Стекающая черезъ эти побочныя водостоки вода можетъ быть употреблена въ такомъ случаѣ для орошенія луга, помощью соответственно проведенныхъ капавъ; тогда какъ безъ этихъ побочных водостокъ вся вода изъ пруда стекла бы по отводной капавѣ и слѣдовательно безъ болыяго выгоды для орошенія луга. Такъ какъ побоч-

*) и в рис. 161 есть перекидыва, на которую кладутся мости съ плотинами для подхода въ вертикальной трубѣ.

ные водостоки отводить изъ пруда значительное количество воды, то, при существованіи ихъ, можетъ быть совершенно достаточно одного главнаго водостока для своевременнаго спуска воды изъ пруда.

Когда пасынка плотины достигнетъ нормальной высоты уровня воды въ прудѣ, тогда приспугиваютъ къ устройству въ плотинѣ, смотря по количеству воды, одного или двухъ водосливовъ въ и, и (рис. 161), которые у прудовъ съ обводными канавами имѣютъ назначеніе отводить изъ пруда лишь то количество воды, которое нормально возобновляется въ прудѣ и, при отсутствіи водослива, можетъ поднимать уровень воды въ прудѣ выше нормальнаго. При отсутствіи же обводныхъ канавъ, водосливы назначаются и для отвода излишней воды во время половодій. Въ послѣднемъ случаѣ они должны быть излившей воды во время половодій. Въ послѣднемъ случаѣ они должны быть гораздо прочнѣе, а потому и устройство ихъ гораздо труднѣе, чѣмъ въ первомъ. Прочность прудовыхъ сооружений значительно выигрываетъ, если водосливы могутъ быть устроены не въ плотинѣ, а въ берегѣ выше плотины (рис. 161); причемъ они отводятъ воду черезъ обводныя каналы. Водосливы дѣлаются открытые — въ видѣ жолобовъ, или закрытые — въ видѣ трубъ, каменные или деревянные. Закрытыми они дѣлаются преимущественно тогда, когда черезъ плотину протекаетъ проезжая дорога; и въ такомъ случаѣ, каменные покрываются сводомъ, черезъ деревянные же дѣлается перебѣздъ, который, въ предупрежденіе поврежденій водосливнаго жолоба, опирается не на жолобъ, а на брусья, положенные на земляную часть плотины, параллельно крайнему жолобу. Каменные водосливы (рис. 166), предпочтительнѣе деревяннымъ потому что въ водосливахъ дерево находится постоянно подъ вліяніемъ воды и воздуха и потому весьма скоро сопрѣваетъ. Подъ водосливомъ, смотря по ихъ грузности (каменные или деревянные), грунтъ укрѣпляется вырытиемъ канавъ, глубиной въ $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ и даже $\frac{2}{3}$ (самый легкій грунтъ) высоты каменной кладки, которая набивается глиной. На болѣе слабыхъ еще грунтахъ кладка водослива производится на ростверкѣ изъ продольныхъ бревенъ, связанныхъ поперечными. Ростверкъ кладется или прямо на земляное дно имы, или даже на сваи, которыя должны проходить сквозь слабый въ плотный грунтъ; при томъ, кладется на такую глубину, чтобы постоянно находился въ водѣ, или, по крайней мѣрѣ въ сыромъ грунтѣ. Промежутки между лежнями въ ростверкѣ набиваются глиной или медкимъ вяжущимъ, который заливается гидравлической известью. Водосливы соединяются съ земляной пасынкой плотины помощью глины, которая хорошо утрамбовывается и въ мѣстахъ сопряженія съ водой обдѣлывается дерномъ. Водосливамъ дается паденіе только нѣсколько болѣе паденія впускной канавы, напр., при паденіи послѣдней въ 0,002, первымъ дается паденіе въ 0,0035—0,007, для того, чтобы они не засорялись и чтобы они достаточно быстро отводили излишнюю воду изъ пруда; при выходѣ же водослива въ спускную капаву паденіе можетъ быть точнѣе же уменьшено. При чрезмѣрно сильномъ паденіи, водосливы подвергаются сильному размыву. Весьма хорошо, если крытые водосливы имѣютъ такіе разбѣры (вышину), чтобы могъ проходить въ нихъ челнокъ, для необходимой прочистки ихъ или необходимаго въ нихъ исправ-




Рис. 166.

Рис. 166.

вырыть пруда (стр. 417). Этой работой слѣдуетъ, по возможности, спѣшить при благоприятной погодѣ, такъ какъ успѣшно выполняется она только въ сухое, не слишкомъ холодное время; а потому, при ограниченномъ пользованіи рабочей силой, слѣдуетъ складывать накопываемый илъ въ кучи, по возможности ближе къ мѣсту накопленія, лучше всего на такомъ мѣстѣ прудового берега, съ котораго удобна была бы дальнѣйшая перевозка его въ орудія. Въ такихъ кучахъ илъ, особенно если перескочить его въ нихъ жженой известью, перепрѣваетъ и хорошо подготавливается для удобренія илъ почвы (стр. 400). При этомъ, илъ не долженъ сканиваться до материка, потому что это вредно не только для грунтовыхъ рыбъ, но еще болѣе для растений, если прудовая почва пазвачается для засѣва. Очистку пруда лучше всего сдѣлать позднѣе. Если бы почему либо нельзя было очистить отъ ила всего пруда, то можно ограничиться очисткой лишь рыбнаго котла и главной канавы и, затѣмъ, подпитъ нѣсколько воду въ прудъ, если только прудовая плотина и берега на столько высоки, что подъемъ воды не угрожаетъ затонленіемъ прилегающихъ къ пруду земель.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ возможно и выгодное устройство *накопныхъ прудовъ* съ главной, если не исключительной кѣлью накопленія ила, который, затѣмъ, по мѣрѣ его накопленія, можетъ быть выбираемъ для вывозки на поля.

Кромѣ необходимаго очищенія пруда отъ заносовъ ила чрезъ болѣе или менѣе продолжительные промежутки времени, для успѣшнаго разведенія рыбы, въ особенности карпи, который предпочитаетъ пруды съ суглинистой и иловатой почвой, можетъ быть особенно выгодно отъ времени до времени спускать воду изъ прудовъ, для того, чтобы засѣвать пруды *кормовыми* или *хлебными растениями*; такъ какъ это, помимо выгоды, доставляемой воздѣлываемыми растениями, доставляетъ значительное количество пищи для рыбы въ урожайныхъ остаткахъ и размножающихся вслѣдствіе того сухонутныхъ пассивныхъ и червяхъ; истребляетъ вредныя водныя растенія и вредныхъ водяныхъ пассивныхъ и увеличиваетъ образующійся подъ водой кислый и вижущій перегной.

Какъ часто должны быть спускаемы пруды, для засѣва ихъ, и какъ долго могутъ быть они засѣваемы, зависитъ отъ мѣстныхъ условій: качества прудовыхъ почвы и ила, степени влажности прудовой почвы въ то время, когда вода спущена, рода засѣваемыхъ растений и т. д. Опытъ показываетъ, что пруды не только безъ вреда, но даже съ пользой для разведенія въ нихъ рыбы могутъ быть засѣваемы кормовыми растениями каждыя 3—4 года, хлебными же каждыя 6—8 лѣтъ. Засѣваніе пруда болѣе чѣмъ въ теченіи одного года, въ теченіи 2—3 и даже 6 лѣтъ, столькожъ лѣтъ, сколько остается прудъ наполненнымъ водой, можетъ вредить плотинѣ, которая портится въ это время кротами, водосточкамъ, рѣшеткамъ, которыя остаются неокрытыми водой, сопрѣваютъ скорѣе, портятся людьми и т. д., а потому встрѣчается лишь у большихъ прудовъ (въ 70, 100 и даже болѣе десятковъ, въ Курляндіи) съ широкими плотинами и простыми водосточками; причемъ, входное отверстіе водосточной трубы можетъ быть осмолено и обито жестию, чтобы предохранить эту важную часть прудоваго сооруженія отъ сопрѣванія или другого рода поврежденій.

Для засѣва пруда, вода спускается точно также осенью, по возможности рано, и такимъ же способомъ, какъ и для очищенія пруда отъ ила. Весной, по ставленіи сѣва, повторяется очищеніе канавъ, чтобы по возможности ускорить просыханіе почвы для засѣва. Для зерна пачае засѣваютъ прудовую почву овсомъ; по если илъ пахороденъ и незначительна влажность, то и другими хлебными, равно какъ иконошней. Изъ кормовыхъ же растений, прудовая почва, рано просыхающая, засѣвается кормовой смѣсью изъ овса, вины,

гороха и бовескихъ бобовъ; если же она при этомъ болѣе легкая свойствъ, то гречихой. Просыхающая нѣсколько позже засаживается свеклой, козыраби, или канустой; просыхающая еще позже засѣвается рѣпой. По уборкѣ растений, воздѣлывающихся для зерна, весьма хорошо всахатъ живые осенью до наводненія снова пруда водой, такъ какъ разрыхленіе почвы облегчаетъ для рыбы отысканіе пищи. Послѣ же названныхъ выше кормовыхъ растений пруды наполняются водой безъ предварительной всахатки прудовой почвы, въ которой остаются: живые кормовой смѣси, дурные корни свеклы и козыраби и канустыи кочерыжки. Въ такихъ прудахъ карпій достигаетъ въ 2 года такой величины, какой онъ не достигаетъ и въ теченіи 3 лѣтъ въ неперенаживающихся и незасѣваемыхъ прудахъ. Иногда, хорошая мергельная суглинистая, благоприятная для клевера, и, при правильномъ устройствѣ прудоваго дна, рано просыхающая прудовая почва засѣвается овсомъ съ подѣльнымъ подъ него смѣси изъ бѣлаго и краснаго клеверовъ. По скошеніи овса на зеленый кормъ, клеверъ остается и, какъ показываетъ опытъ, даетъ весьма хорошіе урожаи, безъ возобновленія его посѣва въ теченіи многихъ лѣтъ, если только прудъ наполняется водой не болѣе какъ на годъ, на два года и, затѣмъ, снова освобождается отъ воды на годъ; при этомъ, на два года и, затѣмъ, снова освобождается отъ воды на годъ; при этомъ рыба ведется какъ нельзя лучше. Если засѣваютъ пруды нѣсколько лѣтъ сряду, то засѣваютъ ихъ пшеницей, овсомъ, озимыми хлебными, льномъ и кормовыми травами и получаютъ весьма обильные урожаи (Курляндія).

При правильномъ устройствѣ прудоваго дна, допускающемъ осушку прудовой почвы единственно подчисткой существующихъ уже канавъ, можно иногда всахатъ прудовую почву уже осенью, что оказываетъ весьма хорошее вліяніе на слѣдующій затѣмъ урожай. Большею же частію приходится приступать къ обработкѣ прудовой почвы только весной, но надежда прорыть ее, и ограничивать обработку почвы подъ посѣвъ одной всахаткой или даже, если почва очень рыхлая, однимъ боронованіемъ и сѣвомъ подъ борону. Всахатка производится весьма удобно узкими (въ 6—8 бороздъ) загонами (см. ниже), которые особенно полезны затѣмъ еще потому, что допускаютъ боронованіе почвы даже въ нѣсколько влажныхъ состояніяхъ, такъ какъ жнотныя (лучше всего вола) могутъ идти при этомъ по бороздѣ. При малыхъ прудахъ и большомъ числѣ канавъ, плугъ замѣняется мотогой, а борона — граблями. Конечно, засѣваться могутъ только пруды, задищенные отъ наводненія, иначе имѣющіе обводныя канавы, которыя дѣлаютъ возможнымъ въ то же время продолженіе орошенія дуга и носъ спуска воды изъ пруда, хотя орошеніе въ этомъ случаѣ не обезпечено во всякое время за отсутствіемъ прудоваго запаса воды.

Въ числѣ побочныхъ пользованій прудовое хозяйство допускаетъ пользованіе травой на плотинѣ и по берегу пруда. Трава должна сканиваться и удаляться съ осторожностью, чтобы не повредить откосамъ плотинъ и канавъ и береговъ пруда, а потому лучше свозиться, до не свозиться. Страиваніе же травы на этихъ мѣстахъ, въ особенности лошади и крупными рогатыми скотомъ, особенно вредно; менѣе вредно овцами и козами. Страиваніе травы овцами и крупными рогатыми скотомъ возможно еще по берегамъ, если эти послѣдніе и не имѣются обводныхъ канавъ. Ивы, произрастающія по берегу пруда, могутъ доставлять весьма цѣнный матеріалъ для плетенія корзинъ—въ однолѣтнихъ побѣгахъ, или для обручей, фашинъ ит. д.—въ болѣе старыхъ частяхъ. Чтобы, съ одной стороны, не повредить прудовой опушки, съ другой не дать пріюта хищнымъ птицамъ въ болѣе старыхъ деревьяхъ, хорошо пользоваться однолѣтними побѣгами въ теченіи одного двухъ лѣтъ; а затѣмъ, оставивъ ивы въ теченіи трехъ лѣтъ безъ рубки, чтобы послѣ этого получить болѣе грубый матеріалъ для обручей и фашинъ. Наконецъ, произрастающія въ прудѣ водныя растенія достав-

ляютъ хорошее подстильное средство, матеріалъ для покрытія крышъ, топливо и т. д. Онѣ собираются удобнѣ всего сѣзкой ихъ зимой, выше льда, или же при спускѣ воды изъ пруда, у земли. Но можно убирать ихъ и лѣтомъ сѣзкой серпомъ или горбушей изъ челока, въ виду того, что, при уборкѣ ихъ въ зеленомъ состояніи, онѣ могутъ доставлять матеріалъ для пахотенія и даже кормъ для скота и не допускаются до созрѣванія, а следовательно и осенняя сѣйка.

Обжиганіе глинистыхъ почвъ.

Нѣкоторыя очень вязкія, глинистыя почвы дѣйствительно всего улучшаются обжиганіемъ, которое измѣняетъ глину механически и химически: *механически*, дѣлая ее болѣе скважистой, разсыпчатой, менѣе влагоемкой, болѣе способной поглощать газы, въ особенности амміакъ; *химически*, удаляя изъ нея нѣкоторыя вредныя составныя ея части, напр. растворимую закись желѣза (стр. 356), и обогащая ее растворимыми, болѣе удобопріемливыми для растений, питательными веществами: кали, которое освобождается изъ находящихся въ глинѣ калиевыхъ силикатовъ, въ особенности, если въ глинѣ въ то же время примѣшивается углекислая известь; амміакомъ, который, можетъ быть, образуется при обжиганіи глины прямо изъ азота воздуха, и золой заключающихся въ почвѣ растительныхъ остатковъ, въ составѣ которой особенно важна въ этомъ случаѣ фосфорная кислота, какъ необходимое здѣсь дополненіе первыхъ двухъ питательныхъ веществъ. Кроме того, если въ обжигаемой почвѣ много углекислой извести, то обожженная почва будетъ содержать много ѣдкой извести, которая оказываетъ энергическое дѣйствіе на почву, какъ мы увидимъ ниже. Накопецъ, дѣйствіемъ огня истребляются, возможно полно, сорныя травы — ихъ корни и сѣмена и насѣкомыя съ ихъ личинками и куколками. Поэтому, съ успѣхомъ обжигаются почвы, содержащія много глины и растительныхъ остатковъ, къ тому же съ тѣмъ болѣе успѣхомъ, чѣмъ болѣе глина содержитъ силикатовъ щелочей (въ особенности калиевыхъ) и щелочныхъ земель (известковыхъ), а растительные остатки — золы, богатой важными питательными для растений веществами (см. ниже) и чѣмъ болѣе въ почвѣ примѣсь углекислой извести; следовательно, успѣшно улучшаются обжиганіемъ: вязкія глинистыя, если онѣ, однако, содержатъ болѣе нежели сѣзды названныхъ силикатовъ и не представляютъ собой почти чистой трубочной или фарфоровой глины, мергелисто-глинистыя, глинисто-мергелистыя и, даже, глинисто-известковые почвы. Но для успѣха обжиганія необходимо, чтобы почва не была пережжена, потому что отъ чрезмѣрнаго обжиганія глина, напротивъ, твердѣетъ, какъ камень, и уменьшаетъ свои скважистость и содержаніе растворимыхъ веществъ, сравнительно съ вовсе необожженной глиной. Почва обжигается въ продолговатыхъ кучахъ (рис. 150)

указаннымъ выше (стр. 355) способомъ. Вязкая, бесплодная, глинистая почва значительно улучшается, если обжечь такой слой ея, который на десятину далъ бы 30 куб. саж. обожженной массы. Обжиганіе составляетъ прекрасную подготовку почвы подъ корнеплодные растенія, въ особенности же рѣпу; оно дѣйствуетъ весьма быстро и, въ большинствѣ случаевъ, въ особенности на топкихъ почвахъ и при обилии доставляемой изъ золы, устраняетъ на много дѣтъ удобреніе почвы другими веществами, въ особенности же содержащими значительное количество амміака.

Съ обжиганіемъ почвъ сходна, по дѣйствию на почву, *навозка* на почву *жженой глины*, или *удобреніе* почвы *жженой глиной*. Хотя послѣднее примѣняется въ настоящее время сравнительно рѣдко, тѣмъ не менѣе примѣнимость его шире примѣнимости перваго; такъ какъ жженная глина можетъ быть употреблена для улучшения не только глинистыхъ почвъ, которыми она дѣлаетъ рыхлѣе и суше, но и торфяныхъ (вересковыхъ) и песчаныхъ, въ которыхъ она пополняетъ питательныя вещества, недостающія въ нихъ въ удобопріемимомъ для растений состояніи, и которыми она улучшаетъ физически: навезенная ею песчаная почва дѣлается связнѣе, влагоемче. Для улучшения почвы жженой глиной, необходимо этой послѣдней рѣдко менѣе 2½, 5, даже 10 тысячъ пудовъ на десятину; большее количество ея нужно тогда, когда имѣется въ виду улучшить физическія свойства, къ тому же, такихъ почвъ, какъ вязкая глинистая или рыхлая песчаная. Поэтому, во избѣжаніе расходовъ на перевозку большихъ количествъ, для обжиганія берутъ глину, которая нарочно накапывается для этого изъ подпочвы, предполагаемаго для улучшения ею, поля, или которая получается при рытвѣ капавъ на этомъ полѣ; привозятъ же ее изъ болѣе или менѣе далека только въ случаѣ неимѣнія ея въ подпочвѣ на мѣстѣ улучшения. Во всякомъ же случаѣ, употребляющаяся для обжиганія съ этой цѣлю, глина не содержитъ вовсе растительныхъ остатковъ, или содержитъ ихъ весьма мало, такъ что по обжиганію даетъ массу, не содержащую вовсе, или содержащую весьма мало растительной золы и тѣмъ отличающуюся отъ массы, которая получается при обжиганіи почвы. Вслѣдствіе же этого, улучшение почвы навозкой жженой глины будетъ отличаться отъ улучшения почвы обжиганіемъ въ томъ, что въ первомъ случаѣ улучшенная почва будетъ содержать въ составѣ болѣе или менѣе разложившихся растительныхъ остатковъ, следовательно въ менѣе удобопріемимомъ состояніи тѣ питательныя для растений вещества, которыя во второмъ она будетъ содержать въ видѣ золы этихъ растительныхъ остатковъ, следовательно въ болѣе удобопріемимомъ для растений состояніи. Далѣе, если навезенная въ первомъ случаѣ обожженная глина будетъ содержать питательныхъ для растений

творившей ихъ воды. По различію мѣстоположенія и содержанія соли, солонцы раздѣляютъ въ Россіи на: солонцы степные, солонцы прирѣчные и солонцы приморскіе. Солонецъ, особенно послѣ продолжительной засухи, можно узнать издали по бѣлому цвѣту его почвы, при освѣщеніи его косвенными солнечными лучами; иногда же они бываютъ такъ обильны солью, что эта послѣдняя толстой корой покрываетъ почву. Солонцевыя почвы, болѣею частью сильно пловатыя (состоящія изъ мелкихъ пловатыхъ частицъ), имѣютъ обыкновенно буровато-сѣрый цвѣтъ, особенно въ низшихъ слояхъ. Сильно солонцевыя почвы не только негодятся подъ посѣвъ хлѣбовъ, но даже не производятъ годныхъ луговыхъ или пастбищныхъ (для овецъ) травъ; одинъ произрастающій на нихъ курай (*Salsola kali* L.) собирается для продовольствія овецъ въ безкорыцу. Солонцеватыя же почвы, мало пропитанныя солью, которые поэтому не называютъ уже солонцами, бываютъ иногда весьма плодородны и въ Саратовскомъ Заволжьи, въ дождливый лѣта, производятъ лучшую пшеницу бѣлотурку. И такъ, чтобы улучшить солонецъ, необходимо удалить изъ него соль; и это возможно единственно помощію воды, т. е. *выщелачиваніемъ*. Для успѣха же выщелачиванія необходимо сдѣлать обыкновенно пловатую, плотную солонцевую почву пропитаемъ для воды, и, затѣмъ, дать водѣ, проникшей въ солонцевую почву и насытившейся солью, стокъ изъ солонцевой почвы. Если бы для достаточно быстро го выщелачиванія недостаточно было дождевой и сѣвговой водѣ, то хорошо употребляютъ для этого рѣчную воду, если только возможно проведеніе этой послѣдней на солонцевую почву.

Поэтому, улучшеніе солонца должно начинать съ осушки его выравниваніемъ его поверхности и прорытіемъ канавъ, для того чтобы преграждать притокъ къ нему солевой воды и отвести съ него воду, насыщенную солью. Затѣмъ, чтобы дать его почвѣ возможно лучше пропитаться дождевой и сѣвговой водами, слѣдуетъ всахатъ ее подъ зиму и оставить въ пластахъ неборонованной; въ такомъ видѣ она лучше промерзаетъ, разрыхляется, намокаетъ, закрывается сѣтвомъ; весной же вода, насыщенная солью, обтѣкает съ поверхности земли и уноситъ съ собой значительное количество соли. Если поступать такимъ образомъ изъ году въ годъ, между тѣмъ какъ новой соли не будетъ прибывать въ почву, то содержаніе соли въ почвѣ съ каждымъ годомъ должно уменьшаться; и, наконецъ, почва сдѣлается способной въ произведенію хлѣбовъ. Появленіе луговыхъ травъ, особенно же ковыля, есть признакъ уменьшенія количества содержащейся въ почвѣ соли до безвреднаго для хлѣбовъ. Выщелачиваемость солонцевой почвы можно значительно усилить, если удобрять ее хлѣвнымъ навозомъ, способнымъ разрыхлять ее. Еще же лучше можетъ дѣйствовать дренажъ солонцевъ, такъ какъ онъ разрыхляетъ почву и въ то же время удаляетъ изъ почвы соленую воду. Весьма хорошо солонцевую почву, уже нѣсколько выщелоченную, начинающую покрываться хорошей травой, прежде обращенія ея подъ пашню, пустить подъ пастбища скота, особенно овецъ; скотъ не только роняетъ твердую изверженія, но пускаетъ и мочу, которая особенно исправ-

ляетъ такіе почвы. Въ огородахъ, заблаговременно на солонцевыхъ почвахъ, съ которыхъ нельзя спустить воды, освобожденіе верхняго слоя почвы отъ соли достигается устройствомъ высокихъ грядъ, такъ какъ вся соль при этомъ стягивается въ борозды; на полѣ то же самое можетъ быть отчасти достигнуто всаиваніемъ въ узкіе загоны (см. ниже) — свалы.

Періодическая обработка почвы.

Механическое состояніе почвы опредѣляетъ ея рыхлость, физическое — ея отношеніе къ влагѣ, газамъ и теплотѣ; какъ то, такъ и другое имѣетъ вліяніе на химическое состояніе почвы, которымъ опредѣляется содержаніе въ почвѣ тѣхъ или другихъ элементовъ, въ томъ или другомъ соединеніи, и которое, въ свою очередь, можетъ вліять на первые два. Поэтому, невозможно указать хотя на одинъ приемъ періодической обработки почвы, который непосредственно или посредственно не вліялъ бы на состояніе почвы во всѣхъ трехъ отношеніяхъ. Тѣмъ не менѣе, можно различить приемы періодической обработки на два ряда: одинъ обнимаетъ приемы, которые непосредственно вносятъ что либо въ почву и вліяютъ преимущественно на химическое состояніе почвы и которые мы соединяемъ въ одно цѣлое, подъ названіемъ *періодической химической обработки почвы*, или короче — *удобренія почвы*; другой обнимаетъ приемы, которые ничего не вносятъ въ почву и вліяютъ, преимущественно, на механическое и физическое состояніе почвы и которые мы соединяемъ въ другое цѣлое, подъ названіемъ *періодической механической обработки почвы*, или короче — *періодической обработки почвы*, или даже просто *обработки почвы*, въ тѣсномъ смыслѣ слова.

Обработка почвы.

(Періодическая механическая обработка).

Почва отвѣчаетъ требованіямъ растений, если она представляется разрыхленной въ большей или меньшей степени, смотря по растенію, и на надлежащую глубину, такъ что въ ней могутъ свободно развиваться корни растений и въ нее могутъ быть удобно внесены сѣмена или другія части растений, служащія для ихъ размноженія; — если она, вслѣдствіе разрыхленія, равно какъ и въ силу ея физическихъ свойствъ, принимаетъ, распределяетъ и сохраняетъ въ себѣ хорошо влагу, не удерживая ее въ избыткѣ, удобно проникается воздухомъ, обогрѣвается и сохраняетъ въ мѣру теплоту; — если она содержитъ достаточное количество питательныхъ веществъ, въ такихъ соединеніяхъ, въ такомъ видѣ, что она непрерывно и въ надлежащемъ количествѣ могутъ поступать въ растенія; — если такого вида питательныя вещества растенія возможно равномерно распре-

длены въ почвѣ;—если она не содержитъ вредныхъ для растений веществъ и если она, наконецъ, чиста отъ сорныхъ травъ.

Удовлетворяющее требованіямъ воздѣлываемыхъ нами растений состояніе почвы, въ отношеніи механическаго, физическаго и химическаго состояній, составляетъ ея *сытость* и выражается въ слѣдующихъ признакахъ: въ болѣе темномъ цвѣтѣ; въ рыхлости, которая не есть порошкообразное или пылеобразное состояніе почвы, но заключается въ разсыпчатости небольшихъ комочковъ, изъ которыхъ состоитъ сылая почва, при самомъ легкомъ давленіи на нихъ; въ увеличенномъ объемѣ почвы, нѣкоторой вздутости ея, напоминающей подошедшее тѣсто; въ упругости почвы подъ ногами; въ меньшей шероховатости ея на ощупь и въ быстромъ развитіи на ней болѣе живыхъ, преимущественно однолѣтнихъ сорныхъ травъ, требующихъ болѣе благоприятныхъ условий для своего развитія, напр., щершцы (*Amaranthus retroflexus* L. и *blitum*, L.), различныхъ видовъ лебеды (*Atriplex*) и т. д.

Механическое разрыхленіе почвы открываетъ почвѣ путь въ сытость, потому что оно открываетъ доступъ въ почву воздуху съ содержащимся въ немъ кислородомъ, обуславливаетъ надлежащую влажность и температуру почвы, слѣдовательно доставляетъ условия, необходимыя для разложенія находящихся въ почвѣ органическихъ веществъ и образованія продуктовъ этого разложенія — газовъ, которые, вмѣстѣ съ влажностью и теплотой, обуславливаютъ измѣненіе (увеличеніе) объема почвы, упругость и, въ свою очередь, извѣстное разрыхленіе ея; къ тому же тѣмъ большія, чѣмъ больше въ почвѣ, съ одной стороны, плавящихся частицъ, слѣдовательно чѣмъ больше до извѣстной степени связность почвы, съ другой — органическихъ веществъ. Присутствіе въ почвѣ органическихъ веществъ, въ извѣстномъ состояніи разложенія, и надлежащая влажность, т. е. сытость или потность (стр. 128) почвы обуславливаютъ болѣе темный цвѣтъ и меньшую шероховатость почвы на ощупь. Дѣйствіе кислорода и другихъ газовъ (стр. 77) воздуха, равно какъ продуктовъ разложенія органическихъ веществъ на минеральную часть почвы, при содѣйствіи надлежащихъ влажности и теплоты, обуславливаетъ, наконецъ, ту подготовку питательныхъ для растенія веществъ въ почвѣ, которая, вмѣстѣ съ благоприятнымъ состояніемъ сылой почвы относительно рыхлости, влажности и теплоты, вызываетъ быстрое развитіе сорной растительности. Такимъ образомъ, сытость почвы для развитія ея воздѣлываемыми растениями, есть результатъ не одного механическаго разрыхленія почвы, но и происходящихъ въ почвѣ химическихъ процессовъ, преимущественно же, разложенія находящихся въ почвѣ въ достаточномъ количествѣ органическихъ веществъ. Эти процессы требуютъ для приведенія почвы въ сытое

состояніе, болѣе или менѣе продолжительнаго времени (отъ 4 до 7 недѣль), смотря по почвѣ и состоянію погоды; при надлежащихъ степеняхъ теплоты и влажности и достаточныхъ рыхлости почвы и содержаніи въ ней органическихъ веществъ — меньше, чѣмъ въ противоположномъ случаѣ. Въ теченіи этого промежутка времени почва можетъ обрабатываться только поверхностно и даже должна обрабатываться такъ, если отвердѣла или залубенѣла на поверхности или же одолевается сорными травами; но она не должна разрыхляться въ теченіи этого времени сколько нибудь глубоко, она должна оставаться, по возможности, въ покоѣ до наступленія сылости, такъ какъ иначе она теряетъ необходимыя для химическихъ процессовъ влагу и упругость заключенныхъ въ ней газовъ, при которыхъ дѣйствіе этихъ послѣднихъ на почву самое сильное.

Но почва, приведенная разъ въ состояніе сылости, наибольшей пригодности для воздѣлываемыхъ растений, не сохраняетъ его постоянно; она утрачиваетъ его, вслѣдствіе самаго воздѣлыванія на ней растений, вслѣдствіе потери влаги непосредственно въ атмосферу черезъ растенія, вслѣдствіе оплотняющаго на нее дѣйствія сильныхъ дождей и ослабленія, поэтому, происходящихъ въ ней химическихъ процессовъ; такъ что исчезаетъ подлежащая ея рыхлость, содержаніе въ ней удобоусвояемыхъ для растений питательныхъ веществъ становится недостаточнымъ для новаго урожая, а распределеніе ихъ — неравномернымъ, почва засоряется сорными травами.

Кромѣ удобоусвояемыхъ для растенія питательныхъ веществъ, почва содержитъ, однако, гораздо въ большемъ еще количествѣ питательныя вещества въ неудобоприемлемомъ для растенія состояніи. Изъ этого послѣднего питательныя вещества переводятся въ удобоприемлемое состояніе постепенно, дѣйствіемъ атмосфернаго воздуха, содержащаго кислородъ, углекислоту, аммиакъ и азотнокислыя соли, или непосредственно, или посредствомъ тѣхъ соединений, которыя образуются въ почвѣ при содѣйствіи воздуха изъ составныхъ же частей ея, напр., посредствомъ углекислоты, образующейся изъ органическихъ остатковъ почвы. Кромѣ того, тѣкоторыя составныя части почвы, напр. желѣзо, могутъ находиться въ ней въ соединеніяхъ вредныхъ для растений, напр. въ видѣ сѣрнокислой закиси желѣза, которыя дѣйствіемъ воздуха превращаются въ безвредныя соединенія, напр. въ гидратъ окиси желѣза (охру) съ одной и сѣрнокислую известь (гипсъ) или сѣрнокислую магнезію и т. д. — съ другой стороны. Воздухъ можетъ дѣйствовать успѣшно въ приведенныхъ отношеніяхъ, если въ своемъ дѣйствіи поддерживается въ надлежащей степени теплотой и влагой. Его же проникновеніе въ почву, равно какъ и содѣйствіе ему влаги и теплоты обуславливается состояніемъ рыхлости почвы и ея физическими свойствами. И такъ, механическая обработка почвы, дѣйствуя на механическое и физическое состояніе почвы, необходимо вліяетъ и на химическое ея состояніе.

Бываютъ случаи, что для привлеченія влаги, а вмѣстѣ съ нею, быть можетъ, и питательныхъ веществъ изъ болѣе глубокихъ слоевъ почвы въ верхніе часта ея, для замедленія испаренія влаги въ верхнихъ частяхъ и для приведенія въ болѣе тѣсное соприкосновеніе съмять или удобрительныхъ веществъ съ частицами почвы, необходимо уплотненіе верхняго слоя почвы;

оно же достигается также однимъ изъ приѣмовъ періодической механической обработки почвы—укатываніемъ.

Убыль удобоусвояемыхъ питательныхъ веществъ изъ почвы, вслѣдствіе воздѣлыванія растеній, можетъ быть пополнена не только изъ запасовъ неподготовленной пищи въ почвѣ, но и внесеніемъ этихъ питательныхъ веществъ извнѣ, въ болѣе или менѣе благоприятномъ, для перехода въ растеніе, состояніи, въ видѣ удобрительныхъ веществъ, которыми хозяинъ удобряетъ почву и которая, для возможно полнаго дѣйствія ихъ на почву и на растенія, должны быть возможно тщательно смѣшаны съ почвой. Это послѣднее достигается точно также механической обработкой почвы.

Произрастающія на почвѣ растенія берутъ питательныя вещества неравномерно изъ всѣхъ частей почвы, они берутъ ихъ лишь изъ тѣхъ частей ея, съ которыми приходятъ въ соприкосновеніе части ихъ корней, принимающія пищу. Кроме того, подготовля питательныхъ веществъ въ почвѣ не происходитъ вездѣ равномерно; а потому, для того, чтобы выравнять нарушенное растеніями равномерное распредѣленіе питательныхъ веществъ въ почвѣ, чтобы равномерно распредѣлить въ почвѣ продукты неравномерной подготовки ихъ въ ней, необходимо хорошенько перемѣшивать частицы почвы между собой. Это достигается также механической обработкой почвы.

Почва съ наилучшими физическими свойствами, но при сколько нибудь ровномъ положеніи, не въ состояніи надлежащимъ образомъ освободиться отъ воды, выпадающей на нее въ огромномъ количествѣ, въ извѣстныя прѣмѣна года, такъ, напр. во время осеннихъ дождей или, въ особенности, весной, при таяніи снѣга. Кроме того почва, при неглубоко находящейся подъ нею трудно пропускающей воду подпочвѣ, не представляетъ стока этой воды и страдаетъ отъ влаги, задерживаемой подпочвой въ ея движениіи внизъ. Почва, душно и мелко разрыхленная, трудно проникается водою, а потому попадающая на ея поверхность вода, при горизонтальной или малонаклонной поверхности почвы, не будучи въ состояніи проникнуть въглубь почвы, будетъ пресыщать эту послѣднюю влагою; при болѣе же наклонной поверхности почвы, можетъ въ значительной части стекать, или испаряться съ поверхности почвы, проникая въ эту послѣднюю лишь въ небольшомъ количествѣ; по и это небольшое количество ея, не опускаясь въ почву довольно глубоко, легко снова удаляется изъ почвы испареніемъ же. Въ этихъ случаяхъ механическая обработка почвы можетъ содѣйствовать или удаленію избытка влаги проведеніемъ водосточныхъ бороздъ, вспашкой почвы въ узкіе загоны—свалы, подотраннымъ разрыхленіемъ, глубокой перепашкой почвы; или задержанію влаги въ почвѣ—разрыхленіемъ почвы на различныхъ глубинахъ.

Почва всегда снова засоряется въ извѣстной степени сорными травами, отчасти потому, что изъ нея трудно удалить сѣмена сорныхъ травъ или другія части этихъ растеній, служащая для ихъ размноженія, —отчасти потому, что сѣмена и служащая, для размноженія сорныхъ травъ, части растеній заносятся на поля вновь втѣромъ съ составныхъ мѣстъ, или изверженіями животныхъ, или неосторожнымъ удобреніемъ сѣянныи навозомъ, сорными травами, или употребленіемъ для обѣмненія полей нечистыхъ сѣмянъ, или, наконецъ, уборкою полевыхъ растеній въ то время, когда дозрѣли уже сѣмена засоряющихъ ихъ растеній. Вслѣдствіе этого постоянно приходится прибѣгать въ механической обработкѣ почвы, съ цѣлю истребленія сорныхъ травъ.

Нерѣдко—одинаковость условий, въ которыхъ должно быть поставлено каждое растеніе одного и того же поля, требуетъ тщательнаго выравниванія поверхности поля, которое также доступно извѣстными приѣмами періодической механической обработки.

Наоборотъ, въ почву, готовую для произрастанія полевого растенія, вно-

сятся сѣмена или другія, служащая для размноженія, части растеній, которыя должны быть прикрыты на различную глубину, сообразно величинѣ ихъ, свойству растенія, состоянію почвы и погоды. Это прикрытіе имѣетъ цѣлю, главнымъ образомъ, доставить необходимое для развитія этихъ частей количество влаги, и совершается также помощію приѣмовъ періодической механической обработки почвы.

И такъ, періодическая механическая обработка почвы имѣетъ для разрыхленія, главнымъ образомъ, слѣдующія шесть задачъ.

1) Разрыхленіе земли на различную глубину, для болѣе успѣшнаго развитія корней растенія, для внесенія въ нее сѣмянъ или другихъ, служащихъ для размноженія, частей растенія, для открытія почвы лучшему дѣйствію атмосферическихъ дѣятелей и для надлежащаго распредѣленія влаги въ почвѣ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ уплотненіе верхняго слоя почвы можетъ составлять также задачу періодической механической обработки почвы.

2) Смѣшеніе частицъ почвы между собой и съ внесенными въ почву удобрительными веществами.

3) Освобожденіе почвы отъ излишней влаги и удержаніе влаги въ почвѣ.

4) Очищеніе почвы отъ сорныхъ травъ.

5) Выравниваніе почвенной поверхности.

6) Прикрытіе сѣмянъ и другихъ, вносимыхъ въ почву, частей растенія, служащихъ для размноженія.

Для рѣшенія этихъ задачъ періодическая механическая обработка владѣетъ различными приѣмами, которые выполняются описанными выше (стр. 267 — 315) орудіями и которые, хотя и не всеѣмъ рѣзко, можно различить на:

А. Разрыхляющія почву

а) разрыхляніемъ или разламываніемъ пласта, глыбъ или комковъ земли:

1) съ оборотомъ пласта, т. е. нижнихъ частицъ почвы вверхъ и верхнихъ внизъ—*обработка почвы отвальными орудіями* (плугами, косулами, сохами, окучниками, маркерами); *собственно паханіе*.

2) безъ оборота пласта, съ перемѣшиваніемъ частицъ почвы такъ, что въ верхнюю примѣшивается часть нижнихъ, въ нижнюю часть верхнихъ частицъ почвы—*обработка почвы безотвальными орудіями* (подпочвенниками, грубберами, экстирпаторами, скаррификаторами, мотыками) и *боронованіе тяжелыми боровами*.

б) разбиваніемъ глыбъ или комковъ земли—*боронованіе легкими боровами, заволакиваніе*.

в) раздѣлываніемъ глыбъ и комковъ—*укатываніе глыбодробами*.

Б. уплотняющія почву—*укатываніе вообще*.

1. *Обработка почвы отвальными орудіями — паханіе.*

Обработка почвы отвальными орудіями называется, по преимуществу, паханіемъ, хотя также называютъ иногда и обработку почвы безотвальными орудіями. Задача обработки почвы отвальными орудіями указана на стр. 269, такъ какъ ея выполненіе есть назначеніе

плуга, какъ представителя отвальныхъ орудій. Отвальное орудіе, отворачивая *пласты* (а рис. 173), образуетъ *борозду* (б).

Обработка почвы отвальными орудіями можетъ быть *загонная* или *ровная* (гладкая). Первая наичае примѣняется при употребленіи плуговъ съ постояннымъ отваломъ, косулей или сохъ съ постоянной палицей; такъ какъ этими орудіями, если не проходить въ обратный путь безъ работы, нельзя отваливать пластовъ одинъ къ другому, все въ одномъ направленіи. Во избѣжаніе же прохода въ обратный путь безъ работы, приходится отваливать пласты, проходя въ одинъ конецъ, въ одномъ и, возвращаясь назадъ, въ другомъ направленіи; причемъ отворачиваемые пласты или сваливаются другъ къ другу (рис. 174), т. е. поле намется въ *свалъ* (въ одинъ загонъ) и лошади, при концѣ борозды, поворачиваются всегда направо; или разваливаются одинъ отъ другаго (рис. 175), т. е. поле намется въ *развалъ* (или *половинками* двухъ смежныхъ загонныхъ) и лошади, при концѣ борозды, поворачиваются всегда влево. Поверхность вспаханнаго въ загонъ поля принимаетъ видъ грядъ (рис. 176), назы-



Рис. 173.



Рис. 174.



Рис. 175.




Рис. 176.

ваемыхъ *загонами*, которые раздѣлены между собой *разгребными* бороздами (а, а) и которыхъ середина по длинѣ называется *гребнемъ* (б, б).

Загоны могутъ быть различно широки, отъ 4 до 40 и болѣе футовъ; загоны, шириной свыше 17 фут., считаются широкими; свыше 8 фут. и менѣе 16 фут.—средними; загоны, шириной въ 4—8 фут.—

узкими; эти послѣдніе, съ искусственно приподнятымъ нѣскольکو гребнемъ, называются *свалами*. Чѣмъ шире загоны, въ которые пахнется земля, тѣмъ больше трата времени на проходъ по обочинамъ въ каждомъ концѣ загона. Такъ, если должна быть вспахана въ загоны полоса земли, шириной, примѣрно, въ 32 фута, то, при вспашкѣ ея въ два загона пластами шириной въ 1 футъ, потребуется пройти по обочинамъ 288 фут., по 144 фут. въ каждомъ загонѣ, по 72 фут. $(2 + 4 + 6 + \dots + 14 + 16)$ съ каждого конца загона; при вспашкѣ же той же полосы въ одинъ загонъ, пластами такой же ширины, потребуется пройти 544 ф. или 272 ф. $(2 + 4 + 6 + \dots + 28 + 30 + 32)$ съ каждого конца загона. А потому, чтобы вспахать поле въ загоны извѣстной ширины и пройти при этомъ по обочинамъ такой же путь, какой необходимо было бы пройти при вспашкѣ того же поля загонами вдвое уже, пахнутъ поле *въ свалъ и развалъ вмѣстѣ*, т. е., разбивъ поле на полосы шириной, напр., въ 30 фут., пахнутъ сперва черезъ полосу въ свалъ, а затѣмъ, промежуточные, между вспаханными въ свалъ, полосы пахнутъ въ развалъ; такъ что, съ окончаніемъ вспашки получаютъ загоны, шириной 60 фут., при вспашкѣ въ которые проведено по обочинамъ не болѣе того, сколько было бы пройдено при вспашкѣ поля въ загоны шириной 30 фут.

Вновь разрыхленная земля намется иногда въ загоны, состоящие изъ двухъ сваленныхъ пластовъ, образующихъ въ этомъ случаѣ, по причинѣ рыхлости земли, нѣсколько закругленный гребень (рис. 177); такое паханіе называется *паханіемъ въ гребни*, произво-




Рис. 177.

дится обыкновеннымъ плугомъ или, удобнѣе, помощію *окучника* (стр. 283—285) и примѣняется, обыкновенно, для подготовки земли подъ посѣвъ или посадку растений, разводимыхъ въ рядахъ, напр. паровой рѣпы, свекловицы, картофеля. Земля же, нѣсколько связанная растительными остатками (жнивье, задерживая землю), особенно на влажныхъ мѣстахъ, намется иногда съ осени подъ зиму въ такъ-

называемыя *балки* (рис. 178), которые состоятъ изъ единичныхъ отвернутыхъ пластовъ, раздѣленныхъ бороздами. Впрочемъ, встречаются двухпластовыя балки — изъ двухъ пластовъ, спаленныхъ одинъ къ другому такъ, чтобы они были возможно полно опрокинуты и, по возможности, прилежались между собой; въ этомъ случаѣ, какъ борозды, такъ и гребни, будутъ вдвое шире, чѣмъ въ первомъ. Такъ какъ при вспашкѣ въ балки половина земли остается невспаханной, то такую вспашку называютъ также *полуспашкой*.




Рис. 178.

Если поле, вспаханное въ загоны, пахать вторично или даже и въ третій разъ въ загоны такой же ширины, какъ въ предшествующіе разы, притомъ такъ, чтобы гребни новыхъ загоновъ приходились на гребняхъ старыхъ, или, какъ говорится, *спахивать* загоны, то загоны значительно возвысятся отъ разъемныхъ бороздъ въ гребняхъ (рис. 179). Если же во второй разъ поле будетъ вспахано




Рис. 179.

въ загоны такъ, что гребни новыхъ загоновъ придутся тамъ, гдѣ были разъемныя борозды предшествовавшихъ загоновъ, иначе если при послѣдующей вспашкѣ *распахивать* загоны предыдущей вспашки, то высота новыхъ загоновъ сравнительно съ высотой

предшествовавшихъ не измѣнится и пашня останется ровной, особенно если загоны широкиѣ.

Земля падаетъ въ загоны въ известномъ *направленіи*; при вспашкѣ въ узкіе загоны лучше всего, если гребень ихъ направляется отъ сѣвера къ югу, такъ какъ въ этомъ случаѣ дѣйствіе солнечныхъ лучей распределяется равномерно по обѣ стороны загона. Но не всегда возможно такое лучшее направленіе, такъ какъ направленіе загона обусловливается кромѣ того склономъ поля и формой участка. Для удобнѣйшаго стока воды загоны должны бы были направиться вдоль линіи главнаго ската, но въ этомъ случаѣ разъемныя борозды отводили бы такъ быстро воду, что эта послѣдняя могла бы размывать и разрывать поле. А потому загоны направляются вдоль главнаго ската лишь на незначительныхъ покатостяхъ; на болѣе же значительныхъ, превышающихъ 3—5 градусовъ наклоненія къ горизонту, ихъ направляютъ нѣсколько наискось, примѣрно подъ угломъ 45 градусовъ наклоненія къ линіи главнаго ската. Форма участка вліяетъ на направленіе загона на столько, что узкіе и длинныя участки допускаютъ вспашку въ загоны лишь въ одномъ направленіи, по длинѣ участка; такъ какъ иначе, при короткихъ загонахъ, а следовательно и бороздахъ, тратится много времени на частые повороты съ орудіемъ.

Если поле *абаг* (рис. 180) должно быть вспахано въ загоны, то сперва плужными бороздами *де* и *жз* отдѣляютъ *обочины* *абе* и *вжз* ширины рашной




Рис. 180.

съ шириной загона, во всякомъ же случаѣ не уже длины лошади вмѣстѣ съ плугомъ; съ обѣихъ концовъ поля, если поле на обѣихъ концахъ граничитъ съ такими участками земли, на которые нельзя извѣзжать съ орудіемъ для загона этого послѣдняго; или съ одного конца, если поле только съ одного конца граничитъ съ такимъ участкомъ земли; или же, наконецъ, вовсе не отдѣляютъ *обочины*, если поле, что бываетъ не такъ часто, на обочинахъ кончается

прилежатель къ свободнымъ участкамъ земли, какъ то: дорожѣ, выгону или же и полевому участку, на которые можно взѣзжать съ орудіемъ. Потомъ на полевыхъ межинкахъ *аб* и *вг* или же на межинкахъ *де* и *жз*, отдѣляющихъ обочины отъ остальной части поля, отмѣриваютъ сперва половину ширины загона, а затѣмъ далѣе по цѣлой ширинѣ загона; такъ что получаются точки *и*, *к*, *л*, *м*... на одномъ и *н*, *о*, *п*, *р*... на другомъ концѣ поля. Поставивъ въ этихъ точкахъ вешки, а если линіи *ин*, *ко*, *лп*, *мр*... слишкомъ длинны, то и посреди ихъ, начинаютъ пахать поле, напр., изъ точки *и*, на которую становится пахарь съ плугомъ и, принявъ стоявшую тутъ вешку, проводятъ борозду въ направленіи къ *н*, при чемъ отворачиваетъ пластъ въ сторону линіи *ав*. Дойдя до *н*, пахарь поворачиваетъ лошадей на право, проходитъ вторую борозду въ обратномъ направленіи подлѣ предыдущей, при чемъ отворачиваетъ пластъ въ сторону линіи *бг*, сваливая его къ предыдущему, и продолжаетъ пахать такимъ образомъ, поворачивая лошадей все вправо, до тѣхъ поръ пока недонахатъ съ одной стороны до линіи *ав*, а съ другой до линіи *вг*. Тогда тотъ же пахарь или другой, въ то время еще, какъ первый сваливаетъ пластъ въ загонъ къ линіи *ин*, начинаетъ пахать у *н* и сваливаетъ пластъ подобно первому въ загонъ къ линіи *ко* до тѣхъ поръ, пока недонахатъ съ одной стороны до линіи *ин*, съ другой же до линіи *ко* и т. д. Съ окончаніемъ вспашки загоновъ съ гребнями по линіямъ *ин*, *ко*, *лп* и *мр* и разъемными бороздами по линіямъ *ав*, *вг*, *до*, *жз* и *ио*, пахнутъ обочины въ загоны съ гребнями по линіямъ *ст* и *уф* и разъемными бороздами по линіямъ *аб*, *де*, *жз* и *ио*. При второй вспашкѣ этого поля, сохраняющіеся слѣды гребней и разъемныхъ бороздъ загоновъ первой вспашки дѣлаютъ излишнимъ новую разбивку поля, если это послѣднее наметено въ загоны той же ширины или ширины кратной отъ первой ширины и въ томъ же направленіи. Если при этомъ распахиваются загоны предыдущей вспашки, то пласты сваливаются въ загоны къ линіямъ *и*, *к*, *л* и *м*, и остаются два полузагона, съ каждой стороны поля по одному, которые слѣдуетъ вспахать съ отворачиваніемъ пластовъ въ сторону линіи *ав* и *бг*; для этого же или проходить въ одномъ направленіи безъ работы, если пахнутъ каждый полузагонъ отдѣльно, или дѣлать значительные проходы по обочинамъ при заносѣхъ плуга съ одного полузагона на другой, если, при незначительной ширинѣ всего вспахиваемого поля, пахнутъ оба полузагона заразъ. Загоны обочины при второй вспашкѣ — въ развалъ превращаются въ два полузагона каждый съ разъемными бороздами по линіямъ *ст* и *уф*.

Если пахать поле въ загоны шириной 60 фут., къ тому же при каждой слѣдующей вспашкѣ распахивать, а не спахивать загоны предшествующей вспашки, то вспаханное поле будетъ представлять довольно ровную поверхность. Но поверхность поля будетъ еще ровнѣе, если при паханіи плугомъ съ постояннымъ же отваломъ, пахать поле не въ загоны, а *фигурно*, т. е., разбивъ поле, смотря по очертанію его на квадраты, ромбы, продолговатые четырехугольники, трапеціи, трехугольники..., пахать эти участки вокругъ отъ краевъ къ *серединѣ* (въ развалъ), поворачивая лошадей всегда налѣво и отворачивая пластъ внаружи, или отъ *серединѣ* къ *краямъ* (въ сваль), поворачивая лошадей всегда направо и отворачивая пластъ кнутри участка.

При первомъ способѣ фигурнаго паханія, къ серединѣ, пахнутъ участокъ вокругъ до тѣхъ поръ, пока поворачиваніе лошадей съ плугомъ не сдѣлается затруднительнымъ, по малой величинѣ остающагося неспаханнаго сред-

няго участка; этотъ послѣдній, если только пластъ брались всегда равной ширины, подобенъ по очертанію цѣлому участку и наметенъ, затѣмъ, уже въ развалъ, въ двѣ половины загона съ разъемной бороздой по своей серединѣ. Если же поле наметенъ фигурно вторымъ способомъ, къ краямъ, то необходимо начинать вспашку съ серединѣ и слѣдовательно съ середняго участка въ сваль, въ одинъ загонъ съ гребнемъ по серединѣ этого участка; но для этого послѣдняго необходимо, чтобы предварительно былъ выдѣленъ средній участокъ, подобный цѣлому участку.

Выдѣлъ средняго подобнаго цѣлому участку производится различно, смотря по очертанію цѣлаго участка. Если этотъ послѣдній образуетъ *квадратъ* *абвг* (рис. 181), то выдѣлъ средняго участка незначителенъ: прежде всего проводятъ мелкія плужныя борозды по діагоналямъ *аи* и *бв*, а затѣмъ всего проводятъ мелкія плужныя борозды по линіямъ *аи*, *бв*, *ио* и *жз* и изъ точекъ ихъ пересѣченія *и* и *ж* отмѣриваютъ по нимъ во всѣхъ четырехъ направленіяхъ произвольной, но равной длины линіи *ид*, *ие*, *иж* и *из*. Если участокъ имѣетъ очертаніе *ромба* *абвг* (рис. 182), то, какъ и въ предыду-




Рис. 181.




Рис. 182.

щемъ случаѣ, проводятъ прежде всего мелкія плужныя борозды по діагоналямъ *аи* и *бв*, а затѣмъ отъ точки *и* пересѣченія діагоналей отмѣриваютъ сперва, напр., линію *ид* произвольной длины, а послѣ этого линіи *ие*, *иж* и *из*, во столько разъ меньшія соответствующихъ линій *иб*, *ие* и *ио*, во сколько линія *ид* меньше линіи *иа* ($ид : ие : иж : из = иа : иб : ие : ио$). Если участокъ имѣетъ очертаніе *продолговатаго* *четырехугольника* *абвг* (рис. 183), тогда поступаютъ такъ: дѣлятъ сперва углы пополамъ; для этого же отсѣкаютъ отъ вершины каждаго угла, напр., *а*, по обѣимъ сторонамъ его равной длины линіи *аи* и *ам* и полученными такимъ образомъ точками *и* и *ж* соединяютъ линіей *иж*; эту послѣднюю дѣлятъ пополамъ и черезъ полученную при этомъ точку *к* проводятъ изъ вершины угла *а* линію, которая пересѣкаетъ линію *бв*, проведенную тѣмъ же способомъ изъ вершины угла *б* въ точку *и*. Линіи, дѣлящія пополамъ углы *в* и *г*, пересѣкаются въ точкѣ *к*; затѣмъ, отмѣриваютъ отъ точекъ *и* и *ж* линіи произвольной, но равной длины *ид*, *ие*, *иж* и *из*. Если участокъ представляетъ *трапецію* *абвг* (рис. 184), тогда выдѣленіе средняго участка усложняется, потому что, раздѣливъ углы пополамъ, проводятъ плужныя борозды по линіямъ, дѣлящимъ углы попо-




Рис. 183.

ласть, отъ вершинъ угловъ до пересѣченія между собой линій дѣлящихъ углы a и b въ точкѣ $и$, линій дѣлящихъ углы c и d въ точкѣ $ж$ и линій дѣлящихъ углы a и c въ точкѣ $л$. Послѣ этого отмѣриваютъ отъ вершины a къ $л$ произвольной длины линію $ад$ отъ вершины b къ $и$ линію $бе$, во столько разъ меньшую линіи $би$, по сколько линіи $ад$ меньше линіи $би$ ($бе : би = ад : би$), отъ вершины c къ $ж$ линію $сж$, по столько разъ меньшую линіи $ди$, по сколько линіи $ад$ меньше линіи $ди$ ($сж : ди = ад : ди$) и, наконецъ, отъ вершины d къ $ж$ линію $дз$, по столько разъ меньшую линіи $жк$, по сколько линіи $сж$ меньше $жк$ ($дз : жк = сж : жк$). Если, наконецъ, участокъ есть *треугольный* abc (рис. 185), то проводятъ прежде всего по линіямъ, дѣлящимъ углы пополамъ, пазухины борозды до взаимнаго пересѣченія ихъ въ точкѣ $г$, отъ которой сперва по одному какому либо направленію, напр. въ a , отмѣриваютъ линію $ид$ произвольной длины, а затѣмъ по остальнымъ двумъ направленіямъ линіи $е$ и $жз$, по столько разъ меньшія соответствующихъ линій $ид$ и $дг$, по сколько линіи $ид$ меньше линіи $дг$ ($ег : иг = жз : жг = ид : дг$). Между полученными такимъ образомъ точками въ первыхъ четырехъ случаяхъ: $д$, $е$, $ж$ и $з$, а въ послѣднемъ, пятомъ случаѣ $г$, $е$ и $ж$ проводятъ пазухины борозды, которыя выдѣляютъ средніе участки *безъ* въ первыхъ четырехъ случаяхъ и средній участокъ *безъ* въ послѣднемъ. Наконецъ, вспаханъ средній участокъ въ загоцѣ съ гребнемъ по линіи $жл$ въ первыхъ двухъ, по линіи $ик$ — въ третьемъ и четвертомъ и по линіи $ег$ въ пятомъ, и съ разъемными бороздами по линіямъ $сж$ и $дз$ въ первыхъ трехъ случаяхъ и безъ собственно разъемныхъ бороздъ въ послѣднихъ двухъ случаяхъ, гдѣ борозды по мѣрѣ удаленія ихъ отъ гребня постоянно укорачиваются. — продолжатъ вѣдѣть вокругъ выдѣленныхъ среднихъ участковъ фигурное паханіе съ отнаиваіемъ пластовъ въ сторону средняго участка. Линіи, отмѣриваемая въ каждомъ случаѣ произволь-

Рис. 184.




Рис. 185.

ной длины, должна быть, однако, такъ длинна, чтобы зависѣла отъ нея величина средняго участка не препятствовала бы поворачиваться вокругъ него съ орудіемъ; чтобы участокъ въ 100—120 кв. саженей былъ бы не уже 2 саж.

Впрочемъ, выдѣленіе средняго, подобнаго пѣлому участка по второму, четвертому и пятому случаямъ, можетъ быть вышолнено вѣсколько иначе помощью параллельныхъ линій, которыя проводятся къ сторонамъ фигуры участка въ одинаковомъ отъ этихъ послѣднихъ разстояніи. Если же къ краямъ падается участокъ, вспаханный передъ тѣмъ къ серединѣ, то можно воспользоваться для всапки къ краямъ слѣдами бороздъ всапки къ срединѣ и такимъ образомъ обойтись безъ выдѣленія средняго участка.

Наконецъ, совершенно ровна поверхность поля, вспаханнаго *сплошь* (рис. 186), такъ какъ при сплошномъ паханіи помощью обо-



Рис. 186.

ротнаго плуга (стр. 284 рис. 38) или сохи съ переставной палицей, пласты отворачиваются одинъ къ другому все въ одномъ направленіи, а потому не получается ни гребней, ни разъемныхъ бороздъ.

Изъ этихъ трехъ системъ паханія, системы ровнаго паханія — фигурнаго и сплошнаго представляютъ наибольшій преимущества; потому что, при ровномъ паханіи, на всѣхъ частяхъ поля равномерно разрыхляется почва и смѣшиваются частицы почвы какъ между собой, такъ и съ частицами различныхъ веществъ, вносимыхъ въ почву, какъ напр. хлѣбнаго паша; равномерно проходятъ всѣ физическія явленія, какъ-то: поглощеніе и излученіе почвой теплоты, вбирание ею воды и растворенныхъ въ ней веществъ, стокъ съ нея и испареніе ея воды и т. д.; равномерно дѣйствуютъ на почву атмосферныя вліянія и, вслѣдствіе этого, равномерно развиваются въ ней

химическіе процессы, а слѣдовательно равномерно спѣеть она. Состояніе поля, пахущаго постоянно ровно, постепенно выравнивается, отчего выравнивается урожайность различныхъ его частей, и урожай дѣлается болѣе постоянны. Всѣ работы на полѣ облегчаются и упрощаются, въ особенности работы по удаленію сорныхъ травъ; которыя изъ мѣръ истребленія сорныхъ травъ превращаются совершенно въ мѣры, предупреждающія ихъ появленіе. Ровное паханіе допускаетъ или облегчаетъ примѣненіе болѣе совершенныхъ приемовъ культуры, допуская или облегчая употребленіе различныхъ улучшенныхъ орудій и машинъ: пароваго плуга, эскаризаторовъ, рядовыхъ сѣлокъ, жатвенныхъ машинъ, и тѣмъ удешевляетъ работу сравнительно со стоимостью этой послѣдней при загонномъ паханіи. Ровное паханіе освобождаетъ весьма полно и сравнительно въ короткое время отъ воды даже нѣсколько низменныхъ, сырыхъ поля, съ небольшоимъ паденіемъ, если только имѣется или возможно устроить подоприемникъ для стекающей воды и снабдить ровно вспаханное поле достаточнымъ числомъ хорошо отдранныхъ подсточныхъ бороздъ, проведенныхъ въ надлежащемъ направленіи. Впрочемъ эти значительныя выгоды ровнаго паханія, на сколько онѣ обуславливаются полнотой и равномерностью вспашки поля и степенью ровности поверхности вспаханнаго поля, принадлежатъ не совсѣмъ одинаково обѣимъ системамъ ровнаго паханія. Между тѣмъ какъ при фигурномъ паханіи въ краяхъ остается неспаханной полоса земли подъ гребнемъ средняго загона, въ ширину безъ малаго двухъ отвороченныхъ пластовъ и въ длину средняго участка, при сплошномъ паханіи остается неспаханной полоса земли подъ первымъ отворачиваемымъ пластомъ въ ширину оборачиваемаго пласта и въ длину вспахиваемаго участка, а при фигурномъ паханіи къ среднему полюсу земли подъ первымъ отворачиваемымъ пластомъ, въ ширину отворачиваемаго пласта и въ длину всей окружной межи вспахиваемаго участка. Правда, это неудобство устранится во всѣхъ трехъ случаяхъ, если предварительно вспашки участка, лучше за нѣсколько времени до этой послѣдней, подпахать полоску земли, которая должна бы остаться при вспашкѣ всего поля неспаханной, причемъ отвернуть неглубоко подрѣзанный плугомъ пластъ въ сторону противоположную той, въ которую будетъ отворачиваться на этомъ мѣстѣ пластъ при вспашкѣ, оставить его, затѣмъ, на нѣсколько времени, пока завянутъ корни растений, и затѣмъ пробороновать даже для уничтоженія сорныхъ травъ. При вспашкѣ же всего поля подрѣзается пластъ, прикрытый пластомъ, подрѣзаннымъ при пахашкѣ, и опрокинется въ борозду подпахши. Затѣмъ, при фигурномъ паханіи на заворотахъ недостаточно внимательный работникъ легко забываетъ удерживать плугъ на полной глубинѣ при окончаніи и на-

чалѣ борозды, и съ заворотовъ же сваливается навозъ, если этотъ послѣдній запахивается такимъ паханіемъ; эти неудобства также устраняемы тѣмъ, что, не говоря уже о хорошемъ надзорѣ за пахарями, мѣста заворотовъ, тотчасъ же или по крайней мѣрѣ какъ можно скорѣе послѣ фигурной вспашки поля, въ первомъ случаѣ перепашиваются еще разъ плугомъ или же взрыхляются грубберомъ, а во второмъ — удобряются еще разъ нѣсколькими возами навоза. Далѣе, при фигурномъ паханіи въ срединѣ нѣкоторые вспаханные уже части поля запалываются животными при поворотахъ, почему должны быть взрыхляемы еще разъ. Наконецъ, если пахать поле постоянно въ срединѣ или постоянно въ краяхъ, то въ срединѣ пахущаго фигурно участка можетъ образоваться въ первомъ случаѣ углубленіе около разъемной борозды, во второмъ — возвышеніе около гребня средняго участка; но и это устранимо попеременнымъ паханіемъ участка въ срединѣ и въ краяхъ.

Кромѣ того фигурное паханіе неудобно еще въ томъ отношеніи, что утомляетъ лошадей, особенно когда повороты становятся очень часты, и что нѣсколько пахарей пахаетъ одинъ участокъ, слѣдуя въ бороздѣ одинъ за другимъ, и слѣдовательно, по избѣжаніе промедленій въ работѣ, пахари должны во все время паханія слѣдовать одинъ за другимъ въ возможно равномъ другъ отъ друга разстояніи. А потому, при паханіи въ срединѣ пахари начинаютъ паханіе безостановочно одинъ за другимъ, на извѣстномъ разстояніи, чрезъ сравнительно короткіе промежутки времени; при паханіи же въ краяхъ они выжидаютъ пока средний участокъ, который начинаетъ пахать одинъ пахарь, достигнетъ такой ширины, что могутъ пахать нѣсколько пахарей; наконецъ, при фигурномъ паханіи вообще, порча орудій или какою либо другою причиною остановки одного пахари останавливается на болѣе или менѣе долгое время и всѣхъ другихъ пахарей слѣдующихъ за остановившимся. Хорошая фигурная вспашка требуетъ, чтобы глубина вспашки оставалась неизмѣнной и пласты отдрывались совершенно равной ширины; но это послѣднее требованіе трудно выполнимо, а потому нерѣдко случается что при фигурномъ паханіи участокъ допахивается съ одной, двухъ, трехъ сторонъ раньше, чѣмъ съ остальныхъ трехъ, двухъ или одной стороны. Тогда, по избѣжаніе прохода съ плугомъ безъ работы, допахиваютъ оставшіяся недопаханными одну, двѣ или три стороны помощью обратнаго плуга. Такимъ же образомъ можно допахивать и тѣ участки земли, которые, при извилистомъ очертаніи поля, остались бы внѣ прямыхъ линий, ограничивающихъ отбитый для фигурнаго паханія участокъ.

Хотя значительный переѣздъ выгодъ, представляемыхъ ровнымъ и въ особенности сплошнымъ паханіемъ, надъ присущимъ этой си-

стемъ паханія недостатками заставляетъ желать его распространения; тѣмъ не менѣе встрѣчаются обстоятельства, препятствующія его введенію. Введеніе сплошнаго ровнаго паханія крайне затрудняется отсутствіемъ вспашки и для всѣхъ случаевъ пригодныхъ оборотныхъ плуговъ (стр. 283), фигурное же ровное паханіе непримѣнимо на малыхъ, особенно узкихъ участкахъ.

Загоное паханіе, при ширинѣ загоновъ въ 60 фт., безъ искусственнаго поднятія гребня, при распаханіи загоновъ, приближается въ ровному паханію; оно, какъ и это послѣднее, допускаетъ вспашку плугомъ въ направленіяхъ перпендикулярныхъ одно къ другому, т. е. напрестъ, что необходимо для хорошаго разрыхленія почвы, допускаетъ обработку почвы и другими орудіями кромѣ плуга, въ любомъ направленіи, допускаетъ употребленіе различныхъ машинъ и, наконецъ, не затрудняетъ движенія возовъ съ сноповымъ хлѣбомъ, навозомъ и т. д. Но загоное паханіе тѣмъ болѣе удаляется отъ ровнаго, чѣмъ уже загоны, чѣмъ выше поднимается ихъ гребень искусственнымъ поднятіемъ его и сплываніемъ загоновъ.

Загоное паханіе въ болѣе узкіе загоны вообще, хотя и уменьшаетъ потерю времени при заворотахъ сравнительно съ паханіемъ въ болѣе широкіе загоны, тѣмъ не менѣе представляетъ много весьма существенныхъ недостатковъ. Оно создаетъ неравномерныя условія произрастанія для растений въ различныхъ частяхъ загона. Такъ, на гребняхъ растений находятъ болѣе глубокой слой разрыхленной почвы, чѣмъ около разъемныхъ бороздъ; если бы же, для устраниенія этого, углубить нѣсколько, какъ это иногда и дѣлается, вспашку въ разъемныхъ бороздахъ, то получатся загоны съ углубленіями между гребнями и возвышенными краями загоновъ, въ которыхъ застаивается вода. Далѣе, при заправкѣ навоза, навозъ скопляется преимущественно подъ гребнемъ, между тѣмъ какъ около разъемныхъ бороздъ земля остается безъ удобренія; конечно, это неудобство устраняется нѣсколько тѣмъ, что плодородныя частицы почвы легко сносятся водой съ гребней въ разъемныхъ бороздахъ. Затѣмъ, верховая вода, попадающая на загоны, стекаетъ болѣе или менѣе скоро отъ гребней въ разъемныхъ бороздахъ, а грунтовая вода, если таковая находится въ почвѣ, находится глубже всего, следовательно дальше всего отъ поверхности почвы подъ гребнемъ и затѣмъ все болѣе и болѣе приближается къ поверхности почвы въ направленіи отъ гребней въ разъемныхъ бороздахъ; такъ что почва въ гребняхъ загоновъ всегда суше, чѣмъ почва около разъемныхъ бороздъ, и растения въ сухіе годы страдаютъ отъ засухи на гребняхъ, въ влажные же годы отъ избытка влажности около разъемныхъ бороздъ.

Наконецъ, на обоихъ скатахъ загона не одинаково дѣйствіе на растенія вѣтровъ и снѣга; послѣднее, въ особенности если загоны

направляются съ В. къ З (стр. 139—140 и 443); направленіе же загоновъ не всегда можетъ быть сообразено съ этими обстоятельствами. Загоное паханіе въ болѣе узкіе, особенно сплываемые загоны затрудняетъ измѣненіе разъ принятаго направленія обработки почвы какъ плугомъ, такъ и другими орудіями; затрудняетъ движеніе возовъ по полю; затрудняетъ или дѣлаетъ даже невозможнымъ употребленіе нѣкоторыхъ, въ особенности болѣе сложныхъ орудій для обработки почвы, напр. конныхъ мотыкъ, въ особенности многорядныхъ, и машинъ, напр. жатвенныхъ; увеличиваетъ количество ручной работы, требуя ея, напр. для обработки почвы между произрастающими растеніями, и дѣлаетъ необходимымъ, въ случаѣ слишкомъ узкихъ и выпуклыхъ загоновъ, употребленіе приравненныхъ къ данной ширинѣ загона орудій и машинъ, напр. боронъ (стр. 299), катковъ (стр. 306), сѣяльныхъ машинъ и т. д.

Насупротивъ этихъ недостатковъ загоное паханіе, конечно, представляетъ нѣкоторыя выгоды, хотя многія изъ нихъ принимаются сомнительно. Такъ, несомненно, что въ гребняхъ загоновъ поверхность почвы возвышается и увеличивается слой разрыхленной земли, вслѣдствіе чего на мелкихъ почвахъ растений находятъ на гребняхъ болѣе глубокой слой рыхлой почвы для развитія своихъ корней, а на почвахъ, страдающихъ отъ грунтовой воды на незначительной отъ поверхности почвы глубинѣ, — болѣе толстый слой почвы свободной отъ такой воды; но за то тѣмъ въ болѣе невыгодныхъ условіяхъ находится растенія въ этихъ случаяхъ по близости разъемныхъ бороздъ. Также несомненно, что разъемныя борозды могутъ быть весьма удобны для того, чтобы проходить по нимъ на полѣ, завитомъ такими растеніями, которыя требуютъ такого прохода, а между тѣмъ легко могутъ повреждаться проходящими людьми, напр. конюшья при выдергиваніи изъ нея посконья. Но зато, несправедливо или не всегда справедливо приписываются загоной вспашкѣ такіа выгоды, какъ: болѣе скорое удаленіе сырости вообще, сохраненіе влаги въ почвѣ на случай засухи, болѣе скорое обогрѣваніе почвы, увеличеніе поверхности, истребленіе многочисленныхъ сорныхъ травъ, облегченіе посѣва и ускореніе вспашки; потому что, хотя у вспаханнаго въ загоны поля увеличивается поверхность соприкосновенія почвы съ воздухомъ сравнительно съ ровно вспаханнымъ полемъ, но испареніе влаги изъ почвы не всегда ускоряется здѣсь, вслѣдствіе этого, такъ какъ, при неровности этой поверхности, вѣтеръ дѣйствуетъ на нее не всегда также полно какъ на ровную поверхность; къ тому же попадающая на почву верховая вода, быстро стекая съ гребней въ разъемныя борозды, стекаетъ по этимъ послѣднимъ далѣе только при условіи, что разъемныя борозды представляютъ правильно отдѣланныя канавки съ достаточнымъ паденіемъ;

этого же большей частью не бывает, потому что разъемныя борозды не отдѣляются достаточно тщательно и, опредѣляемыя въ своемъ направленіи направленіемъ загоновъ, не всегда направляются вдоль ската, а иногда даже и не должны имѣть такого направленія (стр. 443); поэтому стекающая къ нимъ вода застываетъ въ нихъ и испаряется медленно, представляя сравнительно меньшую поверхность для испаренія, чѣмъ въ случаѣ если бы она была равномерно распределена въ слой равно вспаханной почвы. Точно также загонное паханіе не содѣйствуетъ сохраненію влаги въ почвѣ болѣе, нежели ровное паханіе; если здѣсь подъ высоко насыпаннымъ гребнемъ вода находится нѣсколько глубже отъ поверхности, чѣмъ въ ровно, но также глубоко вспаханной почвѣ, то къ разъемнымъ бороздамъ вода находится тѣмъ ближе къ поверхности и слѣдовательно тѣмъ скорѣе можетъ испариться здѣсь; а, сверхъ того, поднимается отсюда постоянно къ гребнямъ по мѣрѣ того какъ она испаряется изъ этихъ послѣднихъ, болѣе свободно охватываемыхъ вѣтромъ.

Если въ загонныя вспаханное поле, при своей неровной поверхности, способно нѣсколько лучше задерживать снѣгъ, чѣмъ ровное вспаханное, то это только въ разъемныхъ бороздахъ, куда сметается снѣгъ съ гребней, и потому съ одной стороны растенія на обнаженныхъ отъ снѣга гребняхъ могутъ подвергаться гибельному дѣйствію морозовъ, съ другой—снѣговая вода, скопясь преимущественно въ разъемныхъ бороздахъ, или застываетъ здѣсь, причѣмъ большей частью испаряется, проникая лишь медленно въ почву подъ гребни, или стекаетъ по разъемнымъ бороздамъ; во всякомъ случаѣ тернется для остальной части загона. При той же медленности, съ которой освобождается въ большей части случаевъ отъ избытка воды въ загонныя вспаханная почва, нельзя допустить, чтобы эта послѣдняя могла всегда скорѣе обогрѣваться. Паханіе въ загонны дѣйствительно увеличиваетъ нѣсколько поверхность почвы, вслѣдствіе чего вспашка въ загонны можетъ подвергать какъ почву такъ и обнажающіяся при такой вспашкѣ къ разъемнымъ бороздамъ подземныя части многолѣтнихъ сорныхъ травъ усиленному дѣйствію мороза; но не увеличиваетъ этой поверхности на столько, чтобы это могло имѣть влияние на величину урожая, особенно, если принять во вниманіе, что пространство, производящее здѣсь урожай, уменьшается почти на все пространство земли, находящееся подъ разъемными бороздами; что же касается уничтоженія при этомъ многолѣтнихъ сорныхъ травъ, то на сколько онѣ находятъ себѣ мало благоприятныя условія и вслѣдствіе этого истребляются изъ разъемныхъ бороздамъ, на столько онѣ находятъ себѣ болѣе благоприятныя условія въ глубокомъ рыхломъ почвенномъ слой гребней, если этотъ послѣдній только достаточно влаженъ, и развиваются потомъ тѣмъ съ большой силой, если

только при послѣдующей вспашкѣ не рыхливается загонъ, не обнажаются такимъ образомъ въ свою очередь и не излагаются слѣдующимъ затѣмъ боронованіемъ подземныя ихъ части. Основаніемъ къ удержанію загоннаго паханія не можетъ также служить возможность пользоваться разъемными бороздами для болѣе равномернаго обсемененія поля при ручномъ посѣвѣ, такъ какъ для этого существуютъ другіе весьма легкіе и удобные приемы (см. ниже). Наконецъ, въ загонны, особенно если они узкіе, не смотря на потерю времени при заворотахъ съ плугомъ, можно вспахать скорѣе чѣмъ ровно, потому что значительныя полосы земли подъ гребнями загоновъ остаются неспаханными и служатъ рассадниками сорныхъ травъ; такъ что при нагонахъ въ 6 пластовъ можетъ остаться неспаханной почти что цѣлая треть поля. Поэтому ускореніе неспаханной почти что цѣлая треть поля. Поэтому ускореніе вспашки поля въ загонны происходитъ насчетъ качества вспашки, которая такимъ образомъ ухудшается.

Изъ этого сопоставленія хорошихъ и дурныхъ сторонъ загоннаго паханія вытекаетъ, что, если загонное паханіе и неосновательно примѣняется еще во многихъ случаяхъ, то все же нельзя отрицать существованія случаевъ, когда его примѣненіе необходимо. Постоянной вспашки въ болѣе узкіе загонны будутъ требовать поля страдающія отъ наливной воды, вслѣдствіе непронускающей воды подпочвы, такъ какъ возвышеніемъ гребней загоновъ можно образовать слой земли выше уровня грунтовой воды на столько, что эта послѣдняя не будетъ вредить корнямъ растеній; далѣе поля съ мелкимъ пахатнымъ слоемъ, потому что въ этомъ случаѣ приваливается хотя подъ гребень загона болѣе толстый слой земли. Временная же вспашка полей въ узкіе, не очень высокіе загонны можетъ быть умѣстна при вспашкѣ поля подъ зиму съ тѣмъ, чтобы подвергнуть большую поверхность почвы усиленному дѣйствію атмосферическихъ дѣйтелей, при необходимости уничтожить многолѣтнія сорныя травы, лучше разрыхлить почву и, если это позволяетъ направленіе разъемныхъ бороздъ, освободить ее пораньше весной отъ воды, а слѣдовательно и обогрѣть, въ особенности, если почва нѣсколько плотна и подготавливается подъ растенія, которыя, какъ напр. картофель, требуютъ болѣе разрыхленной, сухой почвы и которыя должны быть посажены или посеяны ранѣе весной. Съ этой послѣдней цѣлью папугъ поле иногда на зиму даже въ гребни. Но, вспашавъ поле на зиму въ узкіе загонны, не слѣдуетъ оставлять его въ такомъ видѣ при послѣдующихъ вспашкахъ, если только оно допускается и требуетъ этихъ послѣднихъ по времени занятія его растеніями; слѣдуетъ же перепашать его накрестъ или *соединить два загона въ одинъ*, обращая вниманіе на то, чтобы не получить при этомъ нѣсколько слѣдоватыхъ загоновъ съ углубленнымъ гребнемъ,

такъ какъ этотъ послѣдній придется у двойного загона на мѣстѣ разъемной борозды между двумя соединяемыми въ одинъ загонъ загонами предыдущей вспашки. Во избѣжаніе этого послѣдняго, можно, при соединеніи двухъ загонныхъ, брать пласты нѣсколько поуже и поглубже въ началѣ для образованія гребня и пока пласты отворачиваются въ противоположномъ предыдущей вспашки направленіи, отчего они станутъ нѣсколько на ребро; потомъ же, когда начнутъ отворачиваться пласты въ томъ же направленіи, какъ и при предыдущей вспашкѣ, брать ихъ нѣсколько пошире и помельче, дабы они ложились болѣе плашмя. При слѣдующей вспашкѣ можно повторить еще разъ соединеніе двухъ загонныхъ въ одинъ, съ той же предосторожностью относительно слѣдоватости загона, какъ и въ первый разъ, такъ чтобы къ посѣву поле представлялось по возможности выравненнымъ.

Но, если могутъ быть случаи умѣстнаго загоннаго паханія, то все же не слѣдуетъ ни въ какомъ случаѣ пахать въ слишкомъ широкіе или слишкомъ узкіе загоны, напр. въ загоны, которые при ширинѣ отъ 25 до 50 фут. и искусственномъ возвышеніи гребня, постоянно снашиваются. Такимъ загонамъ чрезвычайно трудно дать правильную выпуклость. Лучше же другихъ болѣе узкіе загоны, шириной отъ 10 до 18 футовъ, слегка выпуклые, съ нѣсколькими углубленными разъемными бороздами. Чтобы такая загонная вспашка удовлетворяла требованіямъ хорошей обработки почвы, необходимо правильно разбить поле подъ загонную вспашку (стр. 443), чтобы всѣ загоны имѣли одинаковую ширину; затѣмъ, подпахать землю подъ гребнями будущихъ загонныхъ за нѣсколько времени до вспашки поля, т. е. провести вдоль будущаго гребня борозду, отвернуть попласту на обѣ стороны отъ борозды *), а затѣмъ спустя нѣкоторое время пробороновать, чтобы уничтожить сорныя травы; при вспашкѣ въ загоны первые пласты въ гребнѣ загона сваливаются въ борозду подпашки, такъ что не остается нисколько неспаханной земли. Чтобы дать загону надлежащую выпуклость, необходимо первыя три борозды съ каждой стороны гребня загона брать глубже, а послѣднія борозды къ разъемной бороздѣ нѣсколько мельче средней глубины вспашки всего загона; такъ при средней глубинѣ вспашки въ 5 дюйм. первыя борозды слѣдуетъ брать глубиной отъ 7 до 8 дюйм., послѣднія же глубиной отъ 4 до 5 дюйм. при ширинѣ отворачивае-

*) Такъ какъ при этомъ равно какъ и при вспашкѣ въ двуластовые баля (загоны стр. 442) приходится возвращаться съ плугомъ въ ту же борозду, то во второй разъ плугъ нѣтъ опоры со стороны полевой доски; а потому, чтобы имѣть ее, вставляють плугъ въ землю во второй разъ нѣсколько, въ дюймъ, глубже, чѣмъ въ первый разъ.

мага пласта въ 4—5 дюйм., если пишется въ первый разъ жнилье или сколько нибудь задернѣлая почва, и въ 5—6 дюйм., если перепахивается поле. Послѣднихъ бороздъ ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ брать глубже предыдущихъ, такъ какъ иначе приподнимаются края загона въ разъемныхъ бороздахъ и тѣмъ затрудняется свободный стокъ воды отъ гребня къ разъемнымъ бороздамъ. Такая правильная вспашка требуетъ совершенно горизонтальнаго положенія подошвы плуга съ хорошо оборачивающимъ пластъ отвальномъ и съ передовыми колесами, изъ которыхъ бороздное колесо, идущее въ бороздѣ, должно быть большаго діаметра, чѣмъ полевое, идущее по неспаханному полю, и которые, еще лучше должны находиться на независимыхъ одна отъ другой осяхъ (стр. 269), такъ какъ при этомъ передокъ, а слѣдовательно и плугъ не толкается въ неспаханному полю и пластъ выходитъ одинаковой ширины. При нѣсколькихъ возвышенныхъ загонахъ не слѣдуетъ мѣнять направленіи загонныхъ, такъ какъ вслѣдствіе этого легко могутъ образоваться на полѣ неровности, которыя обуславливаютъ предный застои воды и требуютъ потомъ цѣлыя годы для своего устраненія.

Если, по соображеніи обстоятельствъ, на основаніи вышесказаннаго, слѣдуетъ перейти отъ загоннаго паханія къ ровному, то этотъ переходъ долженъ быть сдѣланъ съ соблюденіемъ нѣкоторыхъ правилъ, для того чтобы выравнить поле, болѣе или менѣе неровное вслѣдствіе загоннаго паханія. Переходъ можетъ быть сдѣланъ легко и скоро, если, какъ это наипаче дѣлается у насъ, поле нахлестъ въ сравнительно широкіе загоны и загоны иногда неспахиваются: въ этомъ случаѣ достаточно при послѣднемъ загонномъ паханіи, по возможности, не возвышать гребня и не углублять разъемныхъ бороздъ, а затѣмъ, пробороновать вспаханное такимъ образомъ поле, лучше всего наискось къ направленію предшествовавшей вспашки или поперегъ его, обработать его экскаваторомъ поперегъ направленія предшествовавшей вспашки, причемъ работникъ долженъ заставлять орудіе, нажатіемъ его, нѣсколько глубже забирать въ почву на гребняхъ, и потомъ снова выбороновать. Переходъ дѣлается болѣе затруднительнымъ, если поле нахлестъ въ узкіе загоны съ возвышенными гребнями и углубленными разъемными бороздами и загоны снашиваются; въ такомъ случаѣ необходимо предварительно распахать загоны, стараясь при этомъ по возможности понизить гребни загонныхъ и не углублять разъемныхъ бороздъ; дажде же поступать такъ какъ и въ предыдущемъ случаѣ. Если бы же этого было еще недостаточно для выравниванія поля, то повторяютъ еще разъ то же самое, или ставятъ рабочихъ съ лопатами или граблями для забрасыванія углубленій землей изъ гребней. Точно также для выполненія углубленій можно воспользоваться землей, которая получается при проведеніи подпочвенныхъ бороздъ (см. ниже).

Разрыхленіе земли съ оборотомъ пласта выполняется иногда, при обработкѣ небольшихъ земельныхъ участковъ ручными орудіями заступомъ (или вилой) — *перекоска* и мотыкой (киркой) — *мотыженіе*. Переканывается земля такъ: на одномъ изъ краевъ переканываемаго заступомъ участка роется канавка такой глубины, на какую долженъ быть обработанъ участокъ, и въ 1 — 1½ аршина ширины; земля изъ этой канавки выбрасывается въ сторону, противоположную той, въ которую должно продолжаться переканываніе и образуетъ вдоль канавы валъ. Вырывъ первую канаву, роютъ подлѣ нея вто-

рую таких же разрывов, причем землю из нее забрасывают первую канаву так, чтобы верхний слой ложился на дно канавы, средний снова в среднюю, а нижний в верхнюю часть канавы; затѣм роют третью канаву и землю из нее забрасывают вторую и т. д. до противоположного края участка, на котором последнюю канаву наполняют землей, выброшенной из первой канавы и подвезенной сюда в ручных или конных тачках. Если разбить участок, который должен быть перекопан на четное число широких полос и перекапывать его полосами, то можно значительно уменьшить перевозку земли или даже вовсе избежать ее, так как последнюю канаву первой полосы можно засыпать землей из первой канавы второй полосы, которая перекапывается в направлении противоположном направлению, в котором перекапывалась первая полоса, а последнюю канаву второй полосы землей из первой канавы первой полосы без всякой перевозки; тоже будет с 3 и 4 полосами и т. д. *Перекапывание*, как называют такой способ перекопки земли, можно перекапывать землю на глубину одной, двух, трех *лопаты* или *мотыков* т. е. на 6, 12, 20—24 вершка. Иногда, впрочем, при более глубокой перекопке, земля перекапывается и так, что нижний слой земли перекапывается на мѣсть без перекала или, если он слишком тверд, разрыхляется только ломом; перекапывают же только средний и верхний слои, причем верхним заполняется середина, а средним верх предвдущей канавы. Мотыженіе представляет способ обработки земли, худший чѣм перекопка; оно к тому же не бывает так глубоко как последнее. В исполненіи оно разнится от перекопки тѣм, что при нем вырываются менѣе широкія канавы, что мотыжащие землю рабочие обращены всегда спиной к взмотыженной землѣ, тогда как перекапывающие землю рабочие всегда лицом к перекопанной землѣ и что первые двигаются вперед лицом и забрасывают землей канавку, падающую к ним ближе открываемой, тогда как вторые двигаются вперед спиной и забрасывают землей канавку, заходящую от них за открываемой ими канавкой. Для того, чтобы рабочие не мешали друг другу, каждому работнику, при перекопкѣ или мотыженіи, отводится полоса земли шириной футовъ въ 6.

При паханіи, будет ли оно загонное или ровное, большей частью отрываются, по возможности, ровные пласты т. е. одинаковой толщины и ширины, причем гребни отвернутых пластов должны образовать совершенно параллельныя между собой линіи. Если бы же эти послѣднія не были параллельны, то это значитъ, что плугъ подрѣзывает пласты мѣстами или уже или шире, чѣм слѣдовало; въ послѣднемъ случаѣ, если не подрѣзывает всего пласта, то оставляет *огрѣхи* т. е. мѣста вспаханной земли. Если плугъ, въ особенности передковый, правильно устроенъ и установленъ, то онъ безъ особыхъ со стороны пахаря усилий, а болѣе тяжелый плугъ *)

*) Еслибы почва, которая наметя, имѣла вездѣ совершенно ровную поверхность и представляла вездѣ одинаковое сопротивленіе плугу, то хорошо построенный и установленный плугъ, даже легкий, не нуждался бы для вспашки такой почвы въ управленіи пахаря; этотъ послѣдній нуженъ былъ бы только для управленія животными. Но, поверхность почвы неровна и сопротивленіе ей плугу различно въ различныхъ частяхъ ее, такъ какъ измѣняется ее плотность, такъ какъ въ ней встрѣчаются корни растений, камни, ходы животныхъ и т. п.

(напр. YFRW стр. 275 рис. 21) даже способенъ безъ пахаря отрываться и отворачиваться совершенно ровные пласты, которыхъ гребни представляютъ линіи совершенно параллельныя между собою и даже совершенно прямыя, если только первая борозда проведена правильно и плугъ тщательно вставляется въ борозду. Дно борозды при паханіи такимъ плугомъ выходитъ совершенно горизонтальное какъ по длинѣ такъ и по ширинѣ; оно выходитъ совершенно чисто, если въ борозду не заваливается черезъ отвалъ земля, что бываетъ, если высота отвала менѣе ширины отрываемого пласта, между тѣмъ какъ пласты не имѣютъ надлежащей связности, или если падаетъ на несоотвѣтствующую плугу глубину, такъ какъ съ увеличеніемъ глубины вспашки или, что то же, толщины пласта должна увеличиваться до извѣстной степени и ширина пласта (см. ниже). Дурно устроенные или установленные плуги то забираютъ въ полевую сторону или вглубь (идутъ на носу), или высканиваютъ изъ земли въ бороздную сторону или вверхъ (идутъ на пятѣ); такъ что работнику приходится или налегать на правую ручку—наклонять плугъ вправо, чтобы заставить его забирать въ поле, или налегать на лѣвую ручку—наклонять плугъ лѣво, чтобы заставить его менѣе забирать въ поле, или приподнимать его за ручки, чтобы заставить его углубляться или же, наконецъ, надавливать на ручки, чтобы не позволить ему зарываться въ землю. Въ первыхъ двухъ случаяхъ дно борозды выходитъ негоризонтально въ ширину, въ послѣднихъ же двухъ—волнистымъ въ длину. Такое же дно борозды препятствуетъ свободному движенію по немъ воды. Впрочемъ, бываютъ случаи, когда пласты отрываются разной толщины и ширины, напр. при вспашкѣ поля въ загонъ (первые пласты, сваливаемые въ гребень), въ особенности узкіе (стр. 454), для того чтобы продать загону извѣстную выпуклость, или же при соединеніи загоновъ (стр. 453).

Въ устройствѣ плуга, опредѣляющемъ правильный его ходъ, весьма важно, чтобы подошва плуга отнюдь не представляла одной горизонтальной плоскости съ нижней поверхностью лемеха, но соединялась съ ней подъ тупымъ угломъ; такъ чтобы образуемый ими съ горизонтальной линіей почвы треугольникъ (рис. 187) имѣлъ вышины $\frac{3}{4}$ —1 вершка. Такъ какъ при этомъ плугъ идетъ на пятѣ и на носу, то эти части подвержены сильному стиранію; но мѣръ же того, какъ онъ стирается, уничтожается зазоръ нижней поверхности плуга, и плугъ начинаетъ плохо забирать въ землю. Въ такомъ случаѣ, напаче встрѣчающемся у плуговъ съ деревянной подошвой, чтобы заставить плугъ забирать въ землю, устанавливаютъ его глубже, или пахарь приподнимаетъ его постоянно за ручки; но какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ работа выходитъ дурная и по напраску теряется много рабочей силы.

Легкій плугъ требуетъ, вслѣдствіе этого, большаго управленія чѣмъ тяжелый, потому что на немъ отражаются измѣненія сопротивленія силѣе, чѣмъ на послѣднемъ.

должны ходить мѣрнымъ, покойнымъ шагомъ, почему для пахаты воды предпочтается часто лошадей.

При началѣ борозды пахарь, поставивши плугъ прямо по средней линіи, проходящей промежъ животныхъ, приподнимаетъ его пемного за ручей и затѣмъ трогаетъ лошадей—плугъ входитъ въ землю; при окончаніи же борозды, наклоняетъ плугъ нѣчто — плугъ выходитъ изъ борозды — и, понаклонивши его на лѣвую сторону, вытѣсняетъ па межу, гдѣ очищаетъ лемехъ, кожъ и отваль отъ приставшей земли, корпей, сорныхъ травъ, павоза, жпины и т. п., набившихся между лемехомъ и гридземъ, помощію *железной лопатки*, которая должна всегда находиться при плугѣ. Изъ сказаннаго выше слѣдуетъ, что, какъ бы ни былъ хорошъ плугъ, для выполненія хорошей пахаты тѣмъ пемнее не обходится хорошаго пахаря, который умѣлъ бы установить и провести хорошо плугъ. Къ образованію же такого пахара много могутъ содѣйствовать разумно устрояемыя *состязанія пахарей*.

Отношеніе ширины пласта къ его толщинѣ опредѣляетъ положеніе, которое принимаетъ отвернутый пластъ: ложится ли онъ болѣе или менѣе плашмя, болѣе или менѣе прикрывая собой предыдущій пластъ. При отношеніи ширины пласта къ толщинѣ его какъ 7 къ 5 (рис. 188 и 189), пластъ отворачивается такъ, что низшая поверхность обернутого пласта образуетъ съ горизонтомъ уголъ въ 45° ; при этомъ получается наибольшая поверхность соприкосновенія вспаханной почвы съ воздухомъ. При отношеніи ширины пласта къ его толщинѣ, болѣе чѣмъ 7 къ 5, напр., какъ 5 къ 9 (рис. 190)



Рис. 188.




Рис. 189.



Рис. 190.

дѣйствующей всѣхъ притертываемыхъ плугомъ сопротивленій, которая опредѣляется лучше всего опытомъ въ каждомъ частномъ случаѣ и находится у пахаря съ выпуклыми лемехомъ и отвалью приблизительно, по опивкѣ лемеха на высоту равной половинѣ глубины борозды; она въ зависимости отъ глубины паханія и ширины отрываемого пласта перемѣщается: при увеличеніи глубины паханія вверхъ и при увеличеніи ширины пласта вправо.

пластъ ложится болѣе плашмя; образуемые пластами гребни и борозды не такъ высоки и глубоки, и поверхность почвы, соприкасающаяся съ воздухомъ, меньше. При отношеніи же ширины пласта къ его толщинѣ, меньшемъ чѣмъ 7 къ 5, напр., какъ 6 къ 5, пластъ отворачивается весьма трудно, а при меньшемъ еще отношеніи вовсе не отворачивается; такъ можно пахать лишь рыхлую, но пезадернѣлую землю. Слѣдовательно положеніе отвернутого пласта будетъ опредѣляться плугомъ лишь на столько, на сколько имъ можно поднять пластъ той или другой ширины, той или другой толщины (стр. 274).

Первые четыре, шесть пластовъ (рис. 188, 189 и 190) при загонномъ паханіи трудно отваливаются: первый пластъ вслѣдствіе того, что онъ съ одной стороны не подрѣзанъ, а послѣдующіе вслѣдствіе того, что первые пласты опрокидываются на высоту вспаханной земли, а иногда ставятся еще круче для искусственнаго поднятія гребня загона; а потому, чтобы первыя пласты лучше оборачивались и оставались въ обороченномъ положеніи, необходимо, чтобы отваль не только опрокидывалъ ихъ но и надавливалъ бы нахъ болѣе или менѣе, а для этого хорошо, если устройство плуга позволитъ, при проведеніи этихъ первыхъ бороздъ, отклонять отваль вправо, соответственно удалять заднюю часть его отъ корпуса плуга вправо помощію винта, какъ это встрѣчается напр., у плуговъ Говарда, Рансона.

Отношеніе ширины пласта къ его толщинѣ опредѣляется главнымъ образомъ родомъ вспашки. Пластъ берется нѣсколько шире и мельче, такъ какъ онъ долженъ ложиться болѣе плашмя, если надобно прикрыть хорошо растительные остатки, дабы эти послѣдніе для своего разложенія могли пользоваться достаточно влагой; слѣдовательно, если производится *озметъ*, т. е. первая вспашка болѣе или менѣе задернѣлой земли или жпины; по той же причинѣ, если производится *навозная вспашка*, при которой запахиивается навозъ или подобное ему массивное растительное удобрительное вещество; если, наконецъ, пашии, при *засѣтѣ* *ся* *по* *пласту*, т. е. послѣ первой вспашки безъ перепашки, должна представлять возможно ровную поверхность съ возможно низкими гребнями и мелкими бороздами (рис. 190), дабы разсыпавшіяся сѣмена, запавъ при боронованіи ихъ въ борозды, не прикрылись слишкомъ глубоко землей. Пластъ долженъ становиться болѣе круто и для этого берется нѣсколько уже и глубже, если необходимо подпергнуть дѣйствію атмосферическихъ дѣйтелей возможно большую поверхность земли; такъ, при *двоеніи*, т. е. вспашкѣ почвы, производимой послѣ взмета, обыкновенно на зиму; при *мѣшаніи* или *троеніи*, которое слѣдуетъ за двоеніемъ и при которомъ нужно хорошенько искрошить землю, перемѣшать ея частицы какъ между собой, такъ и съ частицами вносимыхъ въ нее веществъ или уже прежде внесенныхъ и уже разложившихся ко времени вспашки (дернины, навоза); и наконецъ, при *постоянной вспашкѣ*, при которой прикрываются сѣмена или приготов-

ляется земля подъ посѣвъ сѣмянъ, закрываемыхъ, затѣмъ, бороной или экстирпаторомъ.

Вообще говоря, *ширина пласта* не должна быть значительна, потому что чѣмъ меньше она, тѣмъ лучше измѣлчивается почва, тѣмъ полнѣе открывается она дѣйствию атмосферическихъ дѣятелей, тѣмъ полнѣе и скорѣе замираютъ находящіеся въ ней растительные остатки и части многолѣтнихъ сорныхъ травъ, тѣмъ полнѣе проростаютъ находящіеся въ ней сѣмена сорныхъ травъ; тѣмъ ровнѣе выходитъ поверхность почвы. Поэтому пластъ долженъ быть уже на плотной, закрытой для доступа воздуха, почвѣ, на почвѣ засоренной, при посѣвнѣ вспашкѣ; онъ можетъ быть шире на почвѣ легкой, чистой отъ сорныхъ травъ, при остальныхъ вспашкахъ. Правда для вспашки одного и того же пространства на одинаковую глубину, при широкихъ пластахъ нужно сдѣлать менѣе проходовъ съ орудіемъ, чѣмъ при узкихъ пластахъ; но за то вспашка узкими пластами требуетъ запряжки въ орудіе меньшаго числа животныхъ, и если употребить для нея двухъ или трехкорпусный плугъ, то она не требуетъ и большаго числа рабочихъ рукъ чѣмъ вспашка широкими пластами. Если бы же эта послѣдняя за себѣ тѣмъ представляла нѣкоторое сбереженіе рабочей силы, то это сбереженіе далеко не въ состояніи окупить послѣдствій дурной обработки земли при этомъ. Это обстоятельство заслуживаетъ особеннаго вниманія нашихъ степныхъ хозяевъ, которые, въ видахъ выигрыша времени, употребляемаго на вспашку, съ особенной любовью относятся къ плугамъ, отворачивающимъ широкіе пласты въ 8 — 10 вершковъ; тогда какъ, въ видахъ хорошей обработки земли, не слѣдовало бы допускать пластовъ шире 4—5 вершковъ *).

Толщина пласта или *глубина* вспашки зависитъ, какъ мы видѣли, отъ ширины пласта; она должна составлять около $\frac{3}{4}$ этой послѣдней, чтобы пластъ свободно опрокидывался; при толщинѣ же пласта свыше $\frac{3}{4}$ его ширины, пластъ не можетъ опрокидываться свободно; такъ можетъ пахаться лишь рыхлая, не задержившая земля, которая, при этомъ взбивается наверхъ крутымъ и высокимъ отваломъ плуга (какъ напр. у плуговъ рис. 23, 24 и 34). Но при той пользѣ, какую представляетъ малая ширина пласта вообще и большая глубина вспашки, въ мѣстностяхъ съ сухимъ климатомъ, какъ, напр., нашъ степной, можетъ быть полезно, можетъ встрѣтиться необходимость въ вспашкѣ задерживающей землю, являясь узкими и толстыми пластами; въ такомъ случаѣ необходимо прибѣгнуть къ

*) Розенбергъ-Ливинскій не безъ основанія требуетъ, чтобы эта ширина не превышала въ тяжелыхъ (глинистыхъ и суглинистыхъ) почвахъ 4—5, а въ легкихъ 6 дюймовъ.

вспашкѣ плугомъ съ дернорѣзомъ (стр. 275 *) или двумя плугами, изъ коихъ одинъ съ болѣе отлогимъ отваломъ срѣзалъ бы мелко дернину, а другой съ болѣе крутымъ отваломъ, слѣдуя за первымъ въ ту же борозду, заваливалъ бы рыхлой землей дернъ, сваленный первымъ плугомъ на дво предыдущей борозды.

Чѣмъ глубже пашется земля, тѣмъ глубже она разрыхляется, тѣмъ глубже проникаетъ въ нее оплодотворяющій ее воздухъ, тѣмъ легче проникаетъ въ нее вода, такъ что, при недостаткѣ этой послѣдней, почва сохраняется долѣе влажной, потому что проникшая въ глубину вода испаряется труднѣе, а, при избыткѣ воды, почва менѣе страдаетъ отъ влаги, потому что вода распределяется на большую массу почвы, и потому скорѣе обогрѣвается, долѣе сохраняетъ теплоту; чѣмъ глубже пашется почва, тѣмъ безпрепятственнѣе могутъ проникать въ почву на большую глубину корни растений и тѣмъ больше становится, наконецъ, масса почвы, изъ которой растенія берутъ корнями пищу, а слѣдовательно, тѣмъ болѣе увеличивается количество пищи, которымъ могутъ располагать растенія.

Но глубокая вспашка, въ смыслѣ углубленія пахатнаго слоя, не всегда возможна и выгодна. Возможность и выгодность ея обуславливаются физическими и химическими свойствами болѣе глубокихъ слоевъ почвы или подпочвы. Углубленіе почвеннаго слоя не представляетъ никакой опасности, если подпочвенный слой такихъ же свойствъ какъ почва или лучше ея, такъ что, будучи припѣшанъ къ пахатному слою, способенъ улучшить его свойство, или, если неудлучить, то во всякомъ случаѣ увеличить его массу, не ухудшивъ ея; таковы въ большей части случаевъ почвенныя условія нашей черноземной полосы. Но подпочва не всегда такихъ благоприятныхъ качествъ; часто, не будище почвы питательными для растеній веществами, она содержитъ эти послѣдніе не въ томъ, однако, удобопріемлемомъ состояніи, какого требуетъ растеніе; кромѣ того содержитъ иногда вредныя для растеній вещества, напр. растворимыя соли закиси желѣза, и, по своимъ физическимъ свойствамъ, не только неспособна улучшить почву при смѣшеніи съ ней, но въ состояніи еще ухудшить ее. Глубокая вспашка въ этихъ случаяхъ, выворачивая наружу слой худшихъ, чѣмъ почвенный слой, качествъ, укладываетъ плодородный почвенный слой на такую глубину, на которой имъ могутъ и не пользоваться растенія и на которой онъ, особенно угнистыхъ почвъ, лишенный благотворнаго дѣйствія воздуха, можетъ до того ухудшиться, что вывернутый потомъ

*) Дернорѣзъ можно придавать къ каждому плугу, пашущему на глубину 4 вершковъ.

обратно наверхъ, уже не будетъ столь же плодороднымъ какъ прежде и, для возвращенія себѣ прежняго плодородія, потребуетъ снова болѣе или менѣе продолжительнаго времени. Въ этихъ случаяхъ углубленіе пахатнаго слоя требуетъ осторожности, чтобы не вывернуть земли дурныхъ качествъ наружу или не примѣшати ея къ почвѣ въ большемъ количествѣ. Чтобы въ подобныхъ условіяхъ воспользоваться хотя отчасти выгодами глубокой вспашки, можно прибѣгнуть къ *подпочвенному паханію*, при которомъ помощію подпочвеннаго влуга (стр. 285—286) разрыхляется подпочва безъ выворачиванія ея наружу. Вмѣсто подпочвеннаго паханія можно въ случаѣ возможности нѣсколько большихъ затратъ, разрыхлять дно открываемыхъ плугомъ бороздъ помощію ручныхъ вилъ; такимъ образомъ подпочва разрыхляется, конечно, сильнѣе, чѣмъ подпочвеннымъ паханіемъ. Подпочвенное паханіе, открывая подпочву дѣйствию атмосфернаго воздуха, можетъ на столько улучшить ее, что черезъ нѣкоторое время сдѣлаетъ не только возможнымъ, но даже выгоднымъ вывернуть нѣкоторую часть подпочвы наружу помощію глубокаго паханія. Глубокая же вспашка въ подобныхъ случаяхъ безъ предварительнаго улучшенія подпочвы подпочвеннымъ разрыхленіемъ возможна лишь при возможности подвергнуть вывороченную наружу подпочву усиленному дѣйствию атмосферическихъ дѣтелей или усиленно удобрить ее, предварительно занятія глубоко вспаханнаго поля растеніями. Но, усиленное дѣйствіе атмосферическихъ дѣтелей требуетъ времени, а усиленное удобрение — удобрительныхъ веществъ, тѣмъ въ большемъ количествѣ, чѣмъ болѣе толщина выворачиваемаго наружу, новаго слоя. А потому, углубленіе пахатнаго слоя должно производиться постепенно, сообразно тому, въ какой степени подпочва будетъ подготавливаться подпочвеннымъ плугомъ для выворота ея наружу; сообразно имѣющемуся запасу удобрительныхъ веществъ и сообразно продолжительности времени, въ теченіи котораго по экономическимъ соображеніямъ вывернутый слой можетъ подвергаться дѣйствию атмосферическихъ дѣтелей. Наиболѣе благоприятнымъ временемъ для этого послѣдняго представляются осень и зима, а потому наилучше производить глубокую вспашку, съ цѣлію углубленія пахатнаго слоя, похъ зиму, а чтобы увеличить время, въ теченіи котораго вывернутый слой можетъ подвергаться дѣйствию атмосфернаго воздуха безъ ущерба для полевыхъ урожаевъ, производить углубленіе пахатнаго слоя на полѣ, предназначенномъ подъ растенія, которыя требуютъ менѣе плодороднаго верхняго слоя, потому что, развиваясь изъ глубины или сѣмени съ большимъ запасомъ веществъ для развитія растенія, не нуждаются вовсе или мало нуждаются въ почвенныхъ питательныхъ веществахъ въ первое время своего развитія, пока не ра-

звиваютъ достаточно сильныхъ корней, способныхъ брать питательныя вещества и изъ большей глубины;—которыя развиваютъ большую или меньшую часть своихъ корней на значительной глубинѣ почвы; и которыя, наконецъ, допуская обработку почвы во время своего прорастанія, способствуютъ еще лучшему вывѣтриванію верхняго слоя. Во главѣ такихъ растеній стоитъ картофель, за которыми слѣдуютъ: конскіе бобы, кукуруза и т. д. Поэтому, глинистыя, болѣе плотныя почвы, въ которыхъ воздухъ проникаетъ весьма трудно на болѣе значительную глубину и которыя, поэтому, на глубинѣ подпочвы мало подготовлены или вовсе не подготовлены для питанія растенія и содержатъ нѣрѣдко вредныя для растеній соединенія, въ рѣдкихъ случаяхъ только можетъ быть полезно углублять за разъ болѣе чѣмъ на 1 дюймъ ($\frac{1}{2}$ вершка); другое дѣло песчанныя, болѣе легкія почвы, удобопроницаемыя для воздуха на значительную глубину, не содержащія на глубинѣ вредныхъ веществъ; онѣ могутъ быть углубляемы за разъ на 4—8 (2—4 вершка) и болѣе дюйм.

Если пахатный слой имѣетъ уже надлежащую глубину, то глубина вспашки должна сообразоваться съ *глубиной развитія корней* различныхъ растеній; она можетъ быть менѣе глубока для злаковыхъ чѣмъ незлаковыхъ растеній. Изъ первыхъ наиболѣе глубокой вспашки требуетъ овесъ, за которымъ слѣдуетъ пшеница, ячмень и рожь, требующая изъ названныхъ растеній наименѣе глубокой вспашки. Изъ незлаковыхъ растеній наибольшой глубины вспашки требуетъ люцерна, за которой слѣдуютъ: табакъ, крапль, ворсизьянишишка, свекловица, капуста, картофель, рапсъ, сурѣница, конскіе бобы, люпинъ, красный клеверъ, горохъ, вика, ленъ, который изъ растеній этой группы требуетъ наименѣе глубокой вспашки, и т. д. Между тѣмъ какъ для первыхъ вполне достаточно вспашка на глубину 4 верк., для послѣднихъ можетъ быть полезна или даже необходима вспашка на 5—6—8 вершковъ. Далѣе, глубина вспашки должна сообразоваться съ *временемъ года*—на зиму почва можетъ и должна быть вспахана глубже, чѣмъ въ другое время года, для того чтобы подвергнуть вывернутый изъ глубины слой земли болѣе усиленному вывѣтриванію и уничтожить многолѣтнія сорныя травы отчасти вымораживаніемъ, отчасти глубокимъ зарытіемъ частей ихъ размноженія (напр. корневищъ пырея) въ землю. На зиму глубина вспашки должна быть болѣе въ сухомъ (нашемъ степномъ), чѣмъ во влажномъ климатѣ, болѣе на легкой, сухой, чѣмъ на глинистой достаточно влажной почвѣ, для того чтобы весной задержать въ почвѣ болѣе влаги и на болѣе долгое время; слѣдовательно глубина вспашки сообразуется со *свойствами климата и почвы*. Наконецъ, она сообразуется и съ *родомъ вспашки*; взметъ, если только неп-

гому въ работѣ могутъ пройти безъ роздыха, слѣдовательно около 60 саж., или кратная этой, такъ какъ въ этомъ случаѣ лошади отдыхаютъ при запосѣ плуга и на отдыхъ ихъ не тратится лишняго времени; если же длина борозды менѣе того разстоянія, которое могутъ пройти лошади безъ роздыха, или кратнаго этого разстоянія, то на весь роздыхъ лошадямъ будетъ тратиться время сверхъ времени, необходимаго на заворотъ съ плугами. Конечно, такое соразмѣреніе длины борозды съ этимъ требованіемъ, опредѣляемымъ силой животныхъ, родомъ пахатнаго орудія, размѣрами пласта, величиной и шириной участка и т. д. невозможно, по принятію во вниманіе этого обстоятельства въ возможной мѣрѣ небезполезно. Короткія борозды особенно неудобны, когда паханіе производится плугами, запряженными нѣсколькими парами животныхъ; когда, слѣдовательно, тратится особенно много времени на завороты. Въ гористыхъ мѣстностяхъ, при паханіи вдоль ската, длина борозды должна быть по возможности менѣе въ предупрежденіе размывовъ почвы.

Наконецъ, къ обработкѣ отвальными орудіями принадлежитъ и *проведеніе водосточныхъ бороздъ* (стр. 328 и 448). Водосточныя борозды представляютъ неглубокія канавки, проводимыя обыкновеннымъ или двукрылымъ (окучникомъ стр. 283—285) плугомъ на вспаханномъ или еще чаще даже засѣянномъ уже полѣ для отвода съ поля верховой, дождевой и снѣговой воды. Въ предупрежденіе размыва почвъ, въ особенности слабыхъ, водосточныя борозды, какъ и открытыя канавы, не должны быть проводимы по направленію главнаго ската на поляхъ, которыхъ покатость превышаетъ 3—5°; въ этомъ случаѣ слѣдуетъ проводить ихъ перпендикулярно къ главному скату (рис. 191) или же, при необходимости провести ихъ вдоль




Рис. 191.

главнаго ската, проводить ихъ зигзагообразно, чтобы уменьшить скорость теченія по нимъ воды. Но, если съ одной стороны водосточныя борозды не должны имѣть слишкомъ большаго паденія, то съ другой—они должны имѣть достаточное паденіе для безпрепятственнаго движенія по нимъ воды, и это послѣднее тѣмъ важнѣе, что

въ водосточныхъ бороздахъ нуждаются наиболѣе малопокатые, ровныя поля. Разстояніе, на которомъ проводятся водосточныя борозды одна отъ другой, чрезвычайно различно; оно меньше (отъ 3 до 4 саж.) на почвахъ болѣе плотныхъ, сырыхъ и ровныхъ, чѣмъ на почвахъ рыхлыхъ, сухихъ и покатыхъ (отъ 6 до 8 саж.). Иногда (Исковская губ.) на ровновспаханномъ и засѣянномъ уже озимью полѣ проводятъ водосточныя борозды весьма часто черезъ каждыя, приблизительно, 2 сажени, и параллельно между собой, или, какъ говорятъ, *лемнѣ* поле, которое, въ этомъ случаѣ представляется какъ бы вспаханнымъ въ загоны, шириной 2 саж., съ той разницею, что здѣсь нѣтъ гребней, нѣтъ выпуклостей; но имѣются разъемныя, здѣсь водосточныя борозды, которыя, будучи проведены по соображенію паденія поля, освобождаютъ поле отъ верховой воды лучше, чѣмъ разъемныя борозды настоящей загонной вспашки, которыя могутъ и не имѣть наиболѣе выгоднаго для стока воды направленія (стр. 451), и не менѣе удобно, чѣмъ эти послѣднія, могутъ служить для прохода во время произрастанія растений на полѣ (стр. 451). При проведеніи водосточныхъ бороздъ слѣдуетъ имѣть особенно въ виду предупрежденіе застоя воды въ встрѣчающихся на поляхъ котловинахъ. Вообще, при хорошо проведенныхъ водосточныхъ бороздахъ ровно вспаханное поле ничѣмъ не отличается отъ загонно вспаханнаго въ отношеніи защиты отъ избытка верховой воды. Но, для хорошаго дѣйствія водосточныхъ бороздъ, необходимо, чтобы кромѣ надлежащаго направленія, паденія и числа ихъ, они были еще тщательно отхлѣбаны и вода имѣла безпрепятственный стокъ какъ по нимъ, такъ и къ нимъ съ соотвѣствующихъ частей поля. Для этого необходимо, чтобы земля, насыпающаяся при проведеніи ихъ, по сторонамъ ихъ въ видѣ вала, препятствующаго стоку къ нимъ воды, была тщательно разравнена граблями и метлами; чтобы земля, насыпающаяся при проведеніи бороздъ въ самыя борозды въ видѣ плотныхъ запружающихъ движеніе по нимъ воды, тщательно удалась изъ нихъ лопатами и разсыпалась точно также по полю. Последнее неизбежно случается въ мѣстахъ пересѣченія водосточныхъ бороздъ между собою или же, на вспаханномъ въ загоны полѣ, въ мѣстахъ пересѣченія ихъ съ разъемными бороздами. Перваго рода пересѣченій бываетъ на полѣ меньше чѣмъ послѣднихъ, а потому проведеніе водосточныхъ бороздъ на вспаханномъ въ загоны полѣ требуетъ большаго тщанія и большаго труда, чѣмъ проведеніе ихъ на ровномъ вспаханномъ полѣ. Далѣе необходимо не дѣлать водосточныхъ бороздъ слишкомъ длинными при маломъ паденіи ихъ, чтобы предупредить скорое запыливаніе ихъ и затраты, вслѣдствіе этого, на ихъ очистку; не оставлять концы водосточныхъ бороздъ глухими, какъ это часто бываетъ, а открывать свободный изъ нихъ стокъ

ноги въ открытыя канавы, наконецъ осматривать борозды при началѣ таянія снѣга и, въ случаѣ застою воды на полѣ отъ накопленія въ бороздахъ снѣга, льда, очищать ихъ отъ этихъ послѣднихъ. Наконецъ, съ цѣлью сохраненія тѣхъ плодородныхъ частицъ, которыя сносятся съ поля водами, стекающими по водосточнымъ бороздамъ, весьма хорошо, въ случаѣ большаго паденія водосточныхъ бороздъ, а слѣдовательно и большаго количества сносимыхъ частицъ, вырывать у основанія покатыхъ полей ямы (рис. 191), въ которыхъ родъ наконные пруды (стр. 428), въ которыя собиралась бы вода, стекающая по водосточнымъ бороздамъ. Эти ямы роются отъ 4 до 7 фут. глубины и такой ширины и длины, какой требуетъ количество накапливаемаго ила, различное въ различныхъ случаяхъ. Воду, когда она отстоится, спускаютъ изъ ямы, а осадокъ разбрасываютъ по полямъ, съ которыхъ онъ былъ снесенъ.

Водосточныя борозды проводятся на вспаханномъ по незапашному еще полѣ, преимущественно осенью, чтобы поле могло скорѣе освободиться отъ верховой воды весной и просохнуть для дальнейшей обработки; онѣ проводятся и на запашномъ уже полѣ, преимущественно съ осени высѣваемыми растениями, которымъ больше высѣваемыхъ весной, приходится страдать отъ верховой воды. Слѣдовательно, онѣ проводятся на полѣ, съ болѣе или менѣе разработанной разрыхленной почвой. Въ первомъ случаѣ, когда почва менѣе разработана и разрыхлена, употребленіе плуга для ихъ проведенія можетъ заслуживать предпочтенія; во второмъ же предпочтительнѣе окучникъ. Плугъ, снабженный хорошо рѣзкими рѣзцомъ и лемехомъ, лучше справляется съ менѣе разработанной землей, но при употребленіи его приходится проходить съ нимъ въ двухъ направленіяхъ, назадъ и впередъ, для проведенія борозды, съ одинаково покатыми берегами; или же довольствоваться водосточными бороздами, у которыхъ одинъ берегъ (съ полевой стороны плуга) будетъ почти отвѣсный, другой (съ бороздной стороны плуга) болѣе или менѣе покатый. Кромѣ того, плугъ насыпаетъ по одну или по обѣ стороны борозды большія количества земли, которыя требуютъ значительнаго труда на разравниваніе земли. Окучникъ, безъ рѣза и остраго лемеха, дурно справляется съ мало-разработанной землей, но за то на разрыхленной почвѣ открываетъ правильную борозду съ одинаково покатыми берегами и насыпаетъ сравнительно мало земли на стороны борозды. Въмѣсто окучника можно употребить, напр., мекленбургскую (рис. 192) или нашу обыкновенную соху съ переставной-палицей, если, принявъ прочъ палицу, навязать вмѣсто нея на плуху вѣвникъ или пукъ соломы.

Особенности обработки земли отвальными орудіями сравнительно съ обработкой ея другими разрыхляющими или разламывающими




Рис. 192.

пласть орудіями, заключаются въ оборотъ пласта, которое выполняется различными плугами, впрочемъ, чрезвычайно различно, какъ въ отношеніи чистоты, полноты оборота, такъ и въ отношеніи большаго или меньшаго разрыхленія оборачиваемаго пласта. Между тѣмъ какъ большая часть англійскихъ плуговъ (напр., рис. 1, 2 и въ особенности 29) оборачиваютъ пласть чрезвычайно чисто, полно, почти не кроша его, пѣмецкіе плуги типа рухадло (напр., рис. 34) отворачиваютъ его чрезвычайно нечисто, неполно, но за то превосходно крошатъ его и отчасти мѣшаютъ, особенно при нѣскольکو болѣе скоромъ движеніи орудія. Соединить оба дѣйствія, т. е. оборачиваніе и крошеніе, разрыхленіе пласта въ одномъ орудіи въ равно совершенной степени невозможно; каждое изъ этихъ дѣйствій требуетъ спеціальнаго устройства плуга, и потому попытки построить такіе плуги были безуспѣшными и почти совсѣмъ оставлены въ настоящее время. Наиболѣе полно соединяютъ еще эти оба дѣйствія плуги: Гриньонскій, Гогентеймскій и американскій Старбука или плугъ-оредъ, менѣе англійскихъ удалившіеся по своимъ формамъ отъ общаго ихъ прародителя, но всей вѣроятности, брабантскаго плуга. Въ видахъ же удешевленія инвентаря въ тѣхъ случаяхъ, когда необходимы оба дѣйствія плуга въ значительной степени, заслуживаютъ вниманія такіе плуги, которые, подобно

тому какъ плугъ Горскаго (въ механическомъ заведеніи Эйхманна въ Прагѣ), допускаютъ употребленіе одного и того же орудія съ разными отвалами: болѣе отлогими для преимущественнаго обрачиванія пласта и болѣе крутыми для преимущественнаго крошенія, разрыхленія пласта. Необходимость въ орудіяхъ, обрачивающихъ пласты, при приобретающемъ господство взглядѣ на обработку почвы, ограничивается сравнительно немногими случаями, а именно: если нужно хорошо прикрыть землей деряину, растительные остатки живныя, растительную массу растений, запахищаемыхъ въ зеленомъ состояніи съ цѣлью удобренія почвы (см. ниже), растительно-животную массу хлѣвнаго новоза, для того чтобы лучше сохранивъ въ ней влагу, необходимую для ихъ разложенія, не преграждая въ то же время доступа къ нимъ необходимаго для того же воздуха;—если необходимо выставить дѣйствію атмосферическихъ дѣятелей возможно-большую часть нижнихъ частицъ почвы заразы;—если находящаяся на той или другой глубинѣ слой почвы долженъ быть вывернутъ наружу, чтобы дать возможность прорости находящимся въ немъ сѣменамъ сорныхъ растений или же извлечь изъ него части корневища сорныхъ растений;—если, наконецъ, необходимо прикрыть сѣмена на болѣе значительную глубину. Еще меньше случаевъ, когда необходимо особенно полный, чистый оборотъ пласта, следовательно необходимы плуги съ особенно отлогими отвалами: они употребляются для вспашки плотныхъ, глинистыхъ и задерживающихъ почву, у которыхъ крошеніе пласта помощію отвала плуга требовало бы такого значительнаго усилія, что выгоднѣе искрошить его другими, преимущественно для того назначенными орудіями, когда онъ, обернутый плугомъ, вследствие дѣйствія атмосферическихъ дѣятелей на плотную минеральную часть почвы или замирания и разложенія связывающихъ пласты корней и корневищъ растений, сдѣлается болѣе удобоаразыхлимымъ. Плуги съ болѣе отлогими отвалами могутъ быть даѣе полезны въ тѣхъ случаяхъ, когда, какъ у насъ, при необходимости сократить время обработки, задерживая земля пашется довольно широкими пластами, по которымъ безъ давленійшей перепашки ихъ, производится посѣвъ. Во всѣхъ другихъ случаяхъ обработки почвы отвальными орудіями можно предпочитать употребленіе плуговъ съ менѣе отлогими отвалами. Затѣмъ

2. Обработка безотвальными орудіями

можно найти себѣ широкое примѣненіе въ тѣхъ случаяхъ обработки почвы, когда вовсе нѣтъ надобности въ оборотѣ пласта, необходимо же тщательное разрыхленіе земли и въ особенности смѣшеніе частицъ ея между собой и съ частицами внесенныхъ въ почву

удобрительныхъ веществъ. Объ одномъ изъ этихъ орудій подпопченія мы сказали выше (стр. 464), о другомъ—мотыгѣ, которая примѣняется послѣ засѣва поля, скажемъ ниже, здѣсь же разсмотримъ обработку экстирпаторомъ (грубберомъ), скаррифаторомъ, бороной и волокушей.

Дѣйствіе *экстиратора* (груббера), скоропашки довольно различно въ зависимости отъ формы лемеховъ (лапъ) и стоекъ и положенія послѣднихъ (стр. 295). Кроме того на дѣйствіе его имѣетъ вліяніе число лапъ и рядовъ, въ которыхъ первый расположенъ, и разстояніе между лапами: экстирпаторъ тѣмъ сильнѣе разрыхляетъ землю и перемѣшиваетъ ея частицы между собой, чѣмъ больше у него число лапъ и рядовъ лапъ и чѣмъ меньше разстояніе между его лапами. Но, такъ какъ не всегда требуется отъ экстирпатора одинаковое и одинаково сильное дѣйствіе, то особенно удобны такіе экстирпаторы, въ которыхъ возможно замѣна однихъ лапъ другими, увеличеніе или уменьшеніе числа лапъ и удаленіе лапъ одна отъ другой или сближеніе ихъ между собой, смотря по надобности. Экстирпаторомъ обрабатывается какъ взбороненная уже, такъ и находящаяся еще въ пластахъ земля; въ послѣднемъ случаѣ земля должна быть очень рыхлой. Экстирпаторъ пускается въ различныхъ направленіяхъ, смотря по надобности (см. ниже), если поверхность почвы совершенно гладкая; если же видно направленіе пластовъ, то непременно поперегъ этихъ послѣднихъ. При повтореніи обработокъ экстирпаторомъ, вторая обработка производится поперегъ направленія первой и нѣсколько глубже, чѣмъ первая. При однократной обработкѣ экстирпаторъ не пускается глубже 3 — 5 дюйм. На болѣе рыхлыхъ почвахъ экстирпаторъ, идущій нѣсколько глубже, можетъ замѣнить собой плужную обработку; онъ, не разрыхляя земли такъ глубоко какъ плугъ съ болѣе крутымъ отваломъ, не такъ пушитъ землю, какъ этотъ послѣдній, почему земля, послѣ обработки имъ, не такъ садится, какъ послѣ обработки крошащимъ плугомъ; а это заставляетъ предпочитать обработку имъ вмѣсто плуга, если нужно порыхлить и вымѣшать землю непосредственно передъ посѣвомъ. На плотныхъ почвахъ экстирпаторъ (грубберъ) можетъ быть употребленъ лишь послѣ предварительной обработки такой почвы плугомъ; здѣсь онъ крошитъ комья и глыбы, оставленные плугомъ и перемѣшиваетъ частицы почвы, хотя для достиженія такого результата, нерѣдко обработкѣ имъ долженъ предшествовать глыбодробъ (рис. 76). Съ осторожностью слѣдуетъ употреблять экстирпаторъ на почвахъ, которыя, будучи недавно удобрены или же раздѣланы изъ подъ многолѣтнихъ травъ или выгона, легко крошатся, такъ какъ экстирпаторъ, въ особенности многолапчатый, при несвоевременной обработкѣ имъ такой почвы, можетъ

легко привести ее въ порошкообразное состояніе; и онъ приводитъ ее отчасти въ такое состояніе, если она предварительно была уже хорошо искрошена плугомъ. Для порыхленія почвы оплотившейся въ верхней своей части, на несколько большую глубину, необходимо употребить эктирпаторъ съ настолько удаленными одна отъ другой лапами, чтобы разрыхленная одной лапой земля не попала въ пределы дѣйствія другой лапы. Если сама по себѣ рыхлая почва, несколько глыбиста вслѣдствіе вспашки, плугомъ въ слишкомъ влажномъ состояніи, то не слѣдуетъ прибѣгать къ обработкѣ ея эктирпаторомъ, какъ не слѣдуетъ дѣлать этого и тогда, если почва, вообще хорошо разработанная, сдѣлалась глыбистой, вслѣдствіе вспашки ея плугомъ въ полусухомъ состояніи; въ обоихъ этихъ случаяхъ эктирпаторъ можетъ отчасти крошить комья, но въ то же время онъ, приведетъ остальную часть почвы въ порошкообразное состояніе; такъ что эта послѣдняя собравшись внизу подъ комками, выброшенными эктирпаторомъ наверхъ, всегда готова къ уплотнѣнію и заплыванію. Употребленіе эктирпатора затрудняется и дѣлается даже невозможнымъ на почвахъ, въ которыхъ находится солоmistый, неразложившійся навозъ или большое количество растительныхъ остатковъ (живыхъ, корневищъ сорныхъ травъ и т. д.). Разрыхленіе рыхлой почвы эктирпаторомъ представляеть то важное преимущество передъ разрыхленіемъ ея плугомъ, что первое лучше сохраняетъ въ почвѣ воду отъ испаренія, чѣмъ послѣднее; это же особенно важно для сухихъ почвъ, къ тому же въ весеннее время, когда необходимо задержать въ такихъ почвахъ по возможности больше зимней влаги.

На всѣхъ болѣе легкихъ почвахъ вмѣсто эктирпатора можно употреблять *ланцетную борону* (стр. 299—300) для сравнительно мелкаго дѣйствія (на глубину 3—4 дюймовъ).

Скаррификаторъ (сар. 295) употребляется на полѣ преимущественно для подготовительной къ вспашкѣ плугомъ обработки задернѣлой почвы изъ-подъ многолѣтнихъ травъ и выгона. Поле прорѣзывается имъ поперегъ того направленія, въ которомъ предполагается вспахать его.

3. Боронование

(стр. 297—303)

слѣдуетъ обыкновенно за вспашкой и производится или только вдоль *продольное*, или только поперегъ—*поперечное*, или сперва вдоль, а потомъ поперегъ вспаханныхъ пластовъ—*боронование на-крестъ*; при этомъ поле боронуется или *въ одинъ слѣдъ*, проходя бороной слѣдъ къ слѣду, или въ *два слѣда*, проходя бо-

роной взадъ и впередъ по той же полосѣ, какъ это дѣлается напр. при боронованіи вдоль сѣта, причемъ первый слѣдъ дѣлается съ горы, а второй въ гору. Продольное боронование самое слабое, но необходимо при началѣ боронованія обвернутой дернины и даже вообще вспаханныхъ пластовъ, то борона быстро выравнила бы поверхность почвы, срывая сверху край пластовъ и заполняя ими углубленія между лапами, такъ что зубья, особенно легкой бороны, уже не доходили бы до этихъ углубленій. Поэтому въ видахъ лучшаго измельченія земли и очищенія ея отъ сорныхъ травъ, наиболѣе

дѣйствительно боронованіе на крестъ; но на участкахъ болѣе длинныхъ и узкихъ, которые пахнутся всегда въ одномъ направленіи, поперечное боронованіе, а слѣдовательно и боронованіе на крестъ неудобно, а потому въ такомъ случаѣ весьма удобно рекомендованное Конне *угловое боронование* (рис. 193). Кроме того употребительно боронованіе *спиральное* (рис. 194), которое производится въ одинъ или два слѣда, представляетъ большое удобство при заворачиваніи съ боронами и измельчаетъ почву весьма хорошо; и, наконецъ, *круговое*, (рис. 195), особенно пригодно для боронованія глинистыхъ почвъ полутяжелыхъ




Рис. 193.




Рис. 194.




Рис. 195.

ми или легкими боронами, когда имется въ виду разбить хорошенько комья. Круговое боронование, впрочемъ, чрезвычайно утомительно для лошадей, такъ какъ при этомъ боронованіи лошади, запряженные въ бороны, числомъ отъ 3 до 4, гоняются вокругъ работникомъ, помѣщающимся въ серединѣ бороноваемаго участка, причемъ лошади въ наружныхъ боронахъ обѣгаютъ рысью большіе круги, между тѣмъ какъ лошади во внутреннихъ боронахъ проходятъ шагомъ малые круги; поэтому, при переходѣ съ боронами на слѣдующій кругъ, переминаятъ мѣста лошадей: наружныхъ ставятъ внутрь, а внутреннихъ наружу круга.

Въ бороны впрягаются отъ пары лошадей въ три легкія до пары въ одну тяжелую борону, смотря по роду животныхъ и работъ. При этомъ, въ видахъ сбереженія рабочихъ рукъ, одинъ работникъ обыкновенно управляетъ нѣсколькими запряжками за разъ, если бороны болѣе легкія и должны дѣйствовать ударомъ, такъ напр., тремя средними боронами, нѣз коней каждая запряжена одной лошадыо, или же одной запряжкой 2 — 3-хъ лошадей въ 2 — 3 бороны, связанныя между собой и прикрѣпленныя къ одной общей пугѣ (рис. 61, стр. 301), какъ это предпочитается для тяжелыхъ бороновъ съ болѣе устойчивымъ ходомъ *). При большей части бороновъ работнику сподручѣнны сзади бороны; въ такомъ случаѣ онъ можетъ направлять ее посредствомъ привязанной къ ней веревки, а при накопленіи между зубьями сорной травы или другихъ растительныхъ частей, той же веревкой приподнять борону и очистить ее отъ травы. Боронование, съ цѣлю лучшаго разрыхленія земли, требуетъ скорѣе быстрого, чѣмъ медленнаго движенія бороны; въ потому для боронованія предпочитаютъ лошадей воламъ.

Употребленіе тѣхъ или другихъ бороновъ и примѣненіе того или другаго способа боронованія зависятъ, главнымъ образомъ, отъ цѣли боронованія.

Разрыхленіе почвы т. е. раздробленіе комьевъ требуетъ не столько тяжелыхъ бороновъ, сколько быстрого движенія ихъ. Употребляемыя съ этой цѣлю бороны имѣютъ различное разстояніе между зубьями въ зависимости отъ величины комьевъ разрыхляемой боронованіемъ почвы. Съ цѣлю болѣе быстрого движенія бороновъ заставляютъ запряженныхъ въ борону лошадей двигаться рысью; и, хотя это въ то же время предупреждаетъ забиваніе бороны на засоренныхъ пыреемъ почвахъ, слѣдовательно завакивание почвы бороной, и увязаніе бороны въ хорошо разрыхленной почвѣ, тѣмъ не менѣе оно опасно въ виду возможнаго при этомъ приведенія почвы въ пылеобразное состояніе, котораго по возможности слѣдуетъ избѣгать при боронованіи, въ особенности съ цѣлю прикрытія сѣмянъ, потому

*) Устойчивость движенія бороны требуетъ чтобы линія тяги пересѣкала центр тяжести бороны. Это одинаково важно какъ въ томъ случаѣ, когда рядъ зубьевъ бороны открываетъ одну борозду, такъ и въ томъ, когда каждый зубъ дѣлаетъ самостоятельную борозду. (Въ поясненіе того, что сказано на стр. 297, строк. 6 — 2 снизу включительно со словъ: «У бороны съ ромбoidalной...» до словъ: «другъ въ другъ»).

что оно подвергаетъ почву опасности болѣе легкаго образованія коры на ея поверхности при первомъ дождѣ. Поэтому, въ случаѣ необходимости измелченія слишкомъ глыбистой почвы, лучше пройти по ней предварительно боронованія глыбодробомъ (рис. 76, стр. 308), чтобы при послѣдующемъ затѣмъ боронованіи не имѣть уже болѣе надобности въ слишкомъ быстромъ движеніи бороны. Особою осторожности при боронованіи требуютъ легко рыхлящаяся и хорошо разрыхленные плугомъ почвы, затѣмъ хорошо разработанныя, хотя и нѣсколько глыбистыя почвы и, наконецъ, даже болѣе плотныя глыбистыя почвы въ первые годы по ихъ удобреніи или раздѣлки изъ-подъ многолѣтнихъ травъ или выгона; такъ какъ во всѣхъ этихъ случаяхъ излишнее, неосторожное боронованіе можетъ привести почву въ пылеобразное состояніе. Почвы болѣе плотныя, глыбистыя, особенно давно уже неудобравшіяся хлѣвнымъ навозомъ или давно раздѣланныя изъ-подъ многолѣтнихъ травъ и выгона, не только сносятъ, но даже требуютъ весьма сильнаго боронованія. Если вспаханная плугомъ почва должна оставаться безъ перепаханки до посѣва въ теченіи болѣе продолжительнаго времени, то для хорошаго высѣванія ее слѣдуетъ производить все требуемое ею боронованіе не за разъ, а черезъ извѣстные промежутки времени, которыхъ продолжительность различна въ различныхъ случаяхъ и зависитъ отъ состоянія поля, его свойствъ и своевременности потребленія всходовъ сорныхъ травъ. Если же произвести все необходимое боронованіе за-разъ, то чрезвычайно измелченная этимъ почва легко можетъ занять, оплотниться на поверхности и потребовать новаго порыхленія ея поверхности, чтобы открыть въ нее доступъ воздуха, столь необходимый для правильнаго высѣванія почвы. Производи боронованіе въ этомъ случаѣ не за-разъ, а въ нѣсколько приемовъ, слѣдуетъ каждый разъ измѣнять направленіе боронованія сравнительно съ направленіемъ предшествующаго боронованія.

Для уничтоженія коры или порыхленія оплотившейся почвенной поверхности боронованіе пригодно лишь въ томъ случаѣ, если оплотившейся или закоржавѣлый слой не толще 1 — 1½ дюйм. у болѣе плотной и 2½ дюйм. у болѣе легкой почвы. Смотри по толщинѣ оплотившагося слоя, слѣдуетъ употреблять болѣе или менѣе тяжелыя бороны для его порыхленія; въ тому же на легко рыхлящихся почвахъ необходимо употреблять для этого бороны съ нѣскольکو большимъ разстояніемъ между зубьями и заставлять ихъ двигаться медленно, такъ какъ эти почвы не только въ сухомъ, но даже въ средне-влажномъ состояніи легко приводятся въ пылеобразное состояніе; на болѣе же плотныхъ почвахъ и въ этомъ случаѣ возможно употребленіе болѣе сильно дѣйствующихъ бороновъ. До посѣва кора, образовавшаяся на вспаханной или уже и выборонованной почвѣ,

должна быть во всякомъ случаѣ уничтожена, какъ только дозволить это состояніе сухости почвы; такъ какъ отъ этого зависитъ прорѣживание и согрѣваніе почвы и такъ какъ этимъ устранится часто лишняя вспашка. Кору же, образовавшуюся тотчасъ послѣ посѣва, прежде нежели ростки успѣли выбиться наружу, не слѣдуетъ трогать, тѣмъ болѣе уничтожать боронованіемъ изъ опасенія, во-первыхъ: утоптать землю на значительную глубину, такъ что множество сѣмянъ не дастъ ростковъ, загниваетъ, вслѣдствіе ли недостаточнаго доступа къ нимъ воздуха или вслѣдствіе невозможности удаленія изъ ихъ окружности излишней влаги; во-вторыхъ: пообломать показавшіеся уже ростки. Когда же всходы появятся и разовьются два листика, тогда проборонованіе поля, смотря по свойствамъ почвы и состоянію ея сухости, можетъ съ успѣхомъ служить для уничтоженія коры, въ особенности если вслѣдъ за проборонованіемъ пройдетъ легкій дождикъ. Но для этого слѣдуетъ бороновать легкими боровами съ деревянными зубьями и въ томъ же направленіи, въ которомъ были заборонены въ разбросъ посѣвныя сѣмена; при ридномъ же посѣвѣ — въ направленіи рядовъ, чтобы меньше выдергать растений.

Боронованіемъ почва вымѣшивается не глубоко, но превосходно, въ особенности, если употребить для этого соответственно тяжелыя бороны съ малымъ разстояніемъ между бороздами, проводимыми ихъ зубьями. Поэтому-то борова, говоря вообще, представляютъ лучшее орудіе для прикрытія посѣвныхъ въ разбросъ сѣмянъ; но, чтобы хорошо прикрыть сѣмена боронованіемъ, необходимо приготовить почву къ посѣву такъ, чтобы затѣмъ для прикрытія разсыпанныхъ сѣмянъ можно было ограничиться проборонованіемъ почвы въ одинъ, много два слѣда, и такимъ образомъ избѣжать приведенія почвы въ пылеобразное состояніе; при этомъ направленіе боронованія довольно безразлично. Предварительная хорошая подготовка почвы для посѣва требуетъ тщательнаго боронованія поля, чтобы выравнять его и тѣмъ сдѣлать невозможнымъ западеніе сѣмянъ при ихъ прикрытіи въ углубленія, въ которыхъ они могли бы быть прикрыты землей слишкомъ глубоко. Излишнее же боронованіе послѣ посѣва вредно, потому что легко переводитъ почву, въ верхнемъ ея слое, въ пылеобразное состояніе, въ которомъ она, за отсутствіемъ комочковъ, дурно защищаетъ корни молодыхъ всходовъ отъ иссушающаго дѣйствія вѣтровъ и легко образуетъ на своей поверхности кору, затрудняющую выходъ ростка изъ земли. Конечно, избѣжать этого совсѣмъ иногда трудно, какъ напр., при болѣе глубокой задѣлкѣ сѣмянъ, какой требуютъ, напр. бобовыя растенія; но, все же слѣдуетъ и въ такомъ случаѣ стараться по возможности уменьшить зло, не бороня болѣе и не пуская бороны глубже того,

сколько нужно для прикрытія сѣмянъ. На полѣ, вспаханномъ въ болѣе узкіе загоны, избѣгаютъ иногда предварительнаго боронованія съ той цѣлю, чтобы уменьшить при заборониваніи сѣмянъ поперечнымъ боронованіемъ сваливаніе сѣмянъ съ гребней; но гораздо лучше выбороновать поле окончательно до посѣва, а затѣмъ, въ предупрежденіе сваливанія сѣмянъ прикрыть эти послѣдніе однократнымъ продолжнымъ боронованіемъ въ два слѣда.

Извлеченіе изъ разрыхляемаго бороной слоя почвы сорныхъ растеній съ неглубокими корнями, болѣе или менѣе длинныхъ оторванныхъ частей корней и корневищъ, живыхъ и т. д. производится лучше всего боровами съ нѣсколькими загнутыми впередъ зубьями. Извлеченія изъ почвы части, ударяясь въ разныхъ направленіяхъ о зубья бороны, освобождаются отъ приставшей къ нимъ земли, причемъ короткія изъ нихъ остаются на поверхности почвы, а болѣе длинныя увлекаются бороной. Для лучшаго извлеченія корневищъ, напр. пырея, изъ сильно засоренной пыреемъ почвы, при боронованіи вспаханнаго плугомъ поля, не слѣдуетъ при первоначальномъ боронованіи вдоль пластовъ выборонивать поля слишкомъ чисто; тогда слѣдующее затѣмъ поперечное боронованіе извлекаетъ большее количество корневищъ пырея наружу. Напротивъ, если нужно по возможности сохранить въ почвѣ растительные остатки, какъ напр. при боронованіи поля послѣ взмета дернины или живыхъ или запарки навоза, необходимо хорошенько разрыхлить почву при первоначальномъ продольномъ боронованіи, чтобы потомъ, при поперечномъ боронованіи, извлекать изъ почвы по возможности меньше связанныхъ растительныхъ остатковъ.

При боронованіи должно наблюдать, чтобы борова не забывались сорными травами, живьемъ и вообще разными растительными остатками, такъ какъ при этомъ она начинаетъ волочиться по поверхности земли, производя на этой послѣдней неровности, и переводя ее отчасти въ пылеобразное состояніе, отчасти же недостаточно чисто раздѣлявая ее. Особенно же вредно это при прикрытіи сѣмянъ на вспаханномъ въ узкіе загоны полѣ, такъ какъ при этомъ болѣе, чѣмъ обыкновенно на такихъ загонахъ и при поперечномъ боронованіи, стаскивается сѣмянъ съ гребней въ разъемныя борозды. А потому, въ случаѣ недостаточности очищенія бороны отъ того, что набиивается между ея зубьями, работникомъ идущимъ за бороной, необходимо имѣть особыхъ рабочихъ, вооруженныхъ граблями, по концамъ или даже и посреди боронуемой полосы для подвигія бороны, очищенія ихъ зубьевъ и сгребанія и сноса на сторону наволооченныхъ бороной растительныхъ остатковъ; иначе же послѣдніе могутъ быть снова растасканы бороной по полю.

Обработка почвы волокушей — *заволокиваніе почвы* выполняется

и действует на почву подобно боронованию, с той только разницей, что действие заволакивания в отношении разрыхления почвы, раздробления комьев гораздо мельче — оно ограничивается одной лишь поверхностью почвы, и слабее. Более тяжелые волокуши, как цепные бороны (рис. 69, стр. 304) в состоянии раздроблять довольно значительные и плотные комья, но более легкие, как плетеные (рис. 67, стр. 304) или брусчатые (рис. 68, стр. 304), раздробляют лишь легко рыхлящиеся комочки; за то волокуши лучше боронь выравнивают почву, меньше пушат ее, чем бороны, но и не уплотняют ее так как катки, хотя несколько придавливают ее, в особенности тяжелые из них. Поэтому-то волокуши особенно хороши, когда нужно выровнять почву без уплотнения ее, напр. после заделки озимого посева запашником или рядовой стальной; — когда нужно разровнять разсыпанное по поверхности земли вещество, напр. компост на клеверном поле; — когда нужно прикрыть мелкие семена; — когда нужно свалочить в кучи, которые легко было бы снести с поля, надерганные напр. экстирпатором (груббером) корневища пырея (цепная борона).

4. Укатывание.

Поле укатывается приблизительно также как и боронуется, причем если прикапывается поле, лежащее в невыровненных еще пластах плужной вспашки, то для более полного действия катка на почву, прикапывается поперек пластов. Каток, никогда не должен водочиться по полю, в особенности же при прикапывании им засеянного поля; и потому заворачиваться с катком следует всегда полого и к тому же вправо, если работник идет подлѣ животных *).

*) Если припряжка животного будет находиться на линии, соединяющей точку приложения силы (на высоту гуза у лошади) с центром оси катка, иначе линия влечения (соединяющая точку приложения силы с точкой припряжки), будет находиться в одной плоскости с осью (математической) оси катка, то сравнительно меньшая часть животной силы будет идти на влечение катка и сравнительно большая часть ее — на приподнятие катка; чем в том случае, если точка припряжки будет находиться выше линии, соединяющей центр оси катка с точкой приложения силы. В первом случае каток будет действовать на почву не на столько сильно своим грузом, как во втором. А потому, чтобы заставить каток действовать на почву по возможности полным своим грузом, поднимают точку припряжки над линией, соединяющей центр оси катка с точкой приложения силы на столько, что линия влечения становится горизонтальной, параллельной к поверхности земли на высоту гуза у лошади. Сказанное здесь должно служить в разъяснение приведенного на стр. 306, 13—17 строки сверху включительно, со слов: 4) «до слов: с осью катка», где к тому же слово «горизонтальной» должно быть совсем опущено.

До засева поля, укатывание этого последнего может производиться после вспашки, при которой запаханы дернины, живые или навоз, к тому же по предварительном пробороновании вспаханного поля или даже и без этого, с целью уплотнения почвы, которое, не препятствуя доступу воздуха в почву, увеличивает гигроскопичность верхнего слоя почвы и приводит в более тесное соприкосновение растительные остатки с земляными частями почвы, вследствие чего черные быстрее разлагаются (стр. 305). Такое уплотнение в несколько рыхлых почвах бывает полезно и после других вспашек; необходимо же оно после вспашки, подготовляющей почву под посев, если посев производится после последней вспашки ранне, нежели почва в состоянии была быть без прикатывания; так как посев в неуплотненную катком или неосынную почву может повлечь за собой то, что, вследствие осадания почвы посев всхода растений, могут обнажиться корни и погибнуть растения. Укатывание поля с целью уплотнения почвы требует употребления тяжелых гладких (стр. 307, рис. 72) или кольчатых (стр. 308, рис. 75) катков на менее рыхлых, но легко рыхлящихся почвах и кулачных * катков на более рыхлых почвах.

Поле, до засева его, может даже, укатываться с целью раздробления комьев (стр. 304), для достижения которой на менее плотных, легче рыхлящихся почвах достаточны гладкие и кольчатые катки, на более плотных, но несколько разрыхленных — действительные кулачные катки, на самых же плотных, вязких — необходимы глыбодобы (стр. 308, рис. 76) или, по крайней мере, корвешки бороны (стр. 309, рис. 77).

Катки с неровной поверхностью укатывают и крошат комки лучше, потому что груз их распределяется на меньшую поверхность, образуемую здесь концами выступающих частей, чем у гладких катков; и потому этой меньшей поверхностью (выступающими частями) каток тем сильнее входит в землю и в одном случае весьма сильно сжимает землю между своими выдающимися частями, в другом — раздробляет ребрами или остриями своих выдающихся частей комья и раздавливает уже части их еще далее между своими неровностями. К сожалению, катки с неровной поверхностью легко забиваются землей и сорными травами, почему в некоторых случаях требуют очистки от времени до времени, а в некоторых более крайних — даже вовсе не могут быть употреблены. Гладкие катки более вдавливают комки в землю, что обуславливает также распадение последних вносом (стр. 304). Такое прикатывание, поэтому, предшествуя боронованию, позволяет значительно ограничивать это последнее и тем предупреждает приведение почвы в неблагоприятное состояние, отнюдь не ослабляя хорошей разделки почвы.

*) Деревянный вал, на поверхности которого находится возможно много колючих куланов.

Наконецъ, поле, до засѣва его, прикатывается для уничтоженія не слишкомъ толстой коры, если бы такая образовалась; на легко рыхлящихся почвахъ, при самой незначительной толщинѣ коры, это достижимо уже помощію гладкаго катка, но, при нѣсколько большей толщинѣ коры, необходимъ для этого кольчатый или кулачный катокъ; на болѣе же плотныхъ почвахъ приходится прибѣгать къ глыбодробу или норвежской борошѣ. Уничтоженіе коры помощію катка представляетъ то преимущество сравнительно съ уничтоженіемъ ея борошю, что не приводитъ земли въ пылеобразное состояніе.

Послѣ засѣва, поле прикатывается или тотчасъ послѣ засѣва, или же спустя нѣсколько времени до появленія всходовъ и даже послѣ появленія ихъ и достиженія ими известной высоты. Прикатываніе поля тотчасъ послѣ засѣва его требуетъ большой осторожности; такъ какъ склонная къ пылеобразному состоянію почва, при первомъ сколько нибудь сильномъ дождѣ вслѣдъ за прикатываніемъ, но прежде нежели выйдутъ наружу ростки, можетъ запылить и оплотнѣть на поверхности и тѣмъ затруднить или даже сдѣлать не возможнымъ выходъ ростка наружу. Кромѣ того, оно уничтожаетъ даже малые комочки, которые защищаютъ молодые всходы отъ пагубнаго дѣйствія солнца и вѣтра и ослабляютъ дѣйствіе дождя на почву; большихъ же комьевъ на поверхности засѣянаго поля, при сколько нибудь тщательной подготовкѣ земли къ посѣву, не должно быть. Поэтому, если такое прикатываніе и способствуетъ (стр. 305) проставію въ сухое время сѣмянъ, въ особенности такихъ мелкихъ, какъ сѣмена алаковыхъ травъ и клевера, то все же на почвахъ, представляющихъ опасность образованія коры, можетъ быть лучше прикатать поле передъ посѣвомъ, съ тѣмъ чтобы неприкатывать его уже болѣе послѣ посѣва, или же, что почти всегда лучше не только въ отношеніи предупрежденія образованія коры, но и въ отношеніи лучшаго сохраненія влаги въ почвѣ,—снова проборошавать мелко поле, прикатанное послѣ посѣва. Во всякомъ случаѣ на вязкой, плотной почвѣ прикатываніе посѣва болѣе или менѣе рискованно. Но за то, въ случаѣ образованія коры или уплотненія почвы вскорѣ послѣ посѣва, однако прежде появленія всходовъ, или послѣ появленія всходовъ и достиженія ими известной высоты, катокъ можетъ быть употребленъ съ пользой и успѣхомъ для уничтоженія коры; въ особенности кольчатый съ нѣсколько закругленными ребрами въ первомъ и тяжелый гладкій во второмъ случаѣ; иногда, впрочемъ, какъ напр., у льна въ послѣднемъ случаѣ употребляютъ и рубчатый деревянный катокъ (стр. 308, рис. 74). Уничтоженіе коры въ это время другимъ способомъ неудобно, даже невозможно, потому что уничтоженіе ея ручной мотыгой, хотя бы и при рядовомъ посѣвѣ, невозможно вблизи молодыхъ растений по причинѣ опасности повредить ихъ;

тѣмъ болѣе невозможно оно борошю, которая можетъ выдержать много растений; между тѣмъ какъ катокъ ломаетъ кору сплошь, при чемъ, хотя и придавливаетъ растенія къ землѣ, но эти послѣднія въ томъ возрастѣ ихъ (напр. свекловица при 4-хъ листкахъ, лѣтъ вышиной 1 дюймъ), при которомъ прикатывается поле, скоро поднимаются снова.

Обработавъ участокъ земли борошю, эктиризаторомъ или каткомъ, не надобно забывать обойти ими, для окончательной отдѣлки поля, крайныя этого послѣдняго еще разъ, такъ какъ онѣ, при поворотѣ этихъ орудій, не вполне обрабатываются ими или затоптываются лошадьми.

5) *Время, повтореніе и послѣдовательность примѣненія различныхъ примѣсовъ обработки почвы.*

Чтобы указанными приемами обработки почвы подготовить надлежащимъ образомъ почву подъ успѣшное развитіе на ней того или другаго растенія, необходимо примѣнить, а если нужно то и повторить каждый изъ указанныхъ примѣсовъ обработки почвы въ свое время и въ нѣвѣстной послѣдовательности ихъ между собой; на это же имѣютъ вліяніе: состояніе почвы и погоды, продолжительность времени въ году, въ теченіи котораго можетъ обрабатываться почва и можетъ развиваться растеніе въ полѣ, удобреніе почвы хлѣвнымъ навозомъ, родъ воздѣлываемыхъ растеній, время посѣва и уборки того или другаго изъ нихъ и порядокъ, въ которомъ занимается различными воздѣлываемыми растеніями одно и то же поле.

Состояніе почвы, а именно: большая или меньшая влажность ея, большая или меньшая плотность или рыхлость ея и большая или меньшая засоренность ея, имѣютъ если не главѣйшее, то одно изъ главѣйшихъ вліяній на время, повтореніе и послѣдовательность примѣненія различныхъ примѣсовъ обработки почвы.

Мы можемъ различить въ отношеніи обработки почвы три состоянія *влажности* почвы: *средне-влажное* или *средне-сухое* (хорошо обсохшей почвы), въ которомъ почва содержитъ среднее количество влаги, весьма удобно обрабатывается и получаетъ, вслѣдствіе обработки, хорошее строеніе; у плотныхъ почвъ это наиболѣе удобное состояніе для обработки; *влажное* состояніе, въ которомъ почва содержитъ влаги болѣе предыдущаго, можетъ еще обрабатываться, но обработка ея въ этомъ состояніи даетъ плохіе результаты; и, наконецъ, *сухое* состояніе, въ которомъ почва содержитъ влаги менѣе нежели въ первомъ и въ которомъ плотная почва слишкомъ тверда, а рыхлая слишкомъ рыхла для обработки.

Вспаха плугомъ съ рыхлящимъ отваломъ рыхлыхъ, бѣдныхъ перегноемъ почвъ въ сухомъ состояніи еще болѣе сушитъ такую почву и сообщаетъ имъ излишнюю рыхлость, вредную особенно при вспашкѣ ихъ не задолго предъ посѣвомъ; болѣе удовлетворительно рыхлятся онѣ при вспашкѣ ихъ въ средне-влажномъ состоя-

він—інна, коли він знову обсохне після того, що були смочені; він можуть безъ вреда вспахиваться даже въ влізномъ состояні, особливо подъ зиму, хотя вспашка ихъ въ этомъ послѣднемъ состояніи требуетъ нѣсколько большаго расхода рабочей силы, такъ какъ одинъ и тотъ же объемъ рыхлой почвы въ влізномъ состояніи вѣситъ болѣе, чѣмъ въ сухомъ. Вспахка плугомъ съ рыхлящими отвалами плотной почвы какъ въ сухомъ такъ и влізномъ состояніи невозможна по большой вязкости между собой частицъ такой почвы въ этихъ состояніяхъ; плугомъ же съ оборачивающимъ пластъ отваломъ хотя и возможна вспашка такой почвы въ влізномъ состояніи, но она крайне затруднительна по причинѣ вязкости почвы въ этомъ состояніи; въ тому же отворачивающіеся при этомъ пласты, вслѣдствіе вязкости почвы и сжиманія ихъ орудіємъ, остаются до того связанными и плотными, что измельчаются потомъ лишь съ трудомъ. Поэтому, въ влізномъ состояніи плотная почва можетъ пахаться лишь подъ зиму, когда вязкие и плотные пласты такой вспашки измельчаются дѣйствіемъ мороза и измельчаются тѣмъ сильнее чѣмъ больше количество содержащейся въ почвѣ влаги (стр. 111). Поэтому же, наиболее благоприятнымъ для вспашки плотныхъ почвъ есть средне-влажное состояніе ихъ. Особенно часто погрязаютъ въ этомъ отношеніи весной, когда, изъ желанія поскорѣ приготовить землю къ посѣву и изъ опасенія, что могущіе наступить дожди помѣшаютъ вспашкѣ, пахуть плотную, вязкую почву въ перлые же весенніе ясные дни, не смотря на то, что почва еще недостаточно просохла. Но такую поспѣшностью ничего не выигрывается, потому что вспаханная такъ рано почва разрабатывается гораздо труднѣе впоследствии, чѣмъ вспаханная позже, даже въ дождливое время, когда, однако, бываютъ промежутки свободнаго отъ дождя времени, въ теченія которыхъ, при болѣе возвышенной въ это время температурѣ, почва скорѣ приходитъ въ благоприятное для ея обработки состояніе влажности. Почвы средней плотности и даже плотныя, но болѣе легко рыхлящіяся, вслѣдствіе большаго содержанія въ нихъ перегноя, менѣе чувствительны къ обработкѣ ихъ въ влізномъ состояніи, тѣмъ не менѣе при вспашкѣ ихъ въ такомъ состояніи на большую глубину плугами, какъ съ преимущественно рыхлящими, такъ и съ преимущественно оборачивающими пластъ отвалами, образуютъ слишкомъ большія глыбы или слишкомъ вязкіе пласты, которые разрабатываются далѣе довольно трудно. А потому и эти почвы лучше не пахать въ влізномъ состояніи на большую глубину; во влізное состояніе не препятствуетъ вспашкѣ ихъ на меньшую глубину, напр. когда дѣло идетъ о заметѣ живнѣ, или же о порыхленіи, въ тому же помощію рыхлящаго плуга, лишь оплотнившася верхняго слоя почвы, тогда какъ нижній ея слой сохраняетъ

еще хорошее строеніе; потому что въ первомъ случаѣ обернутый пластъ можетъ быть легко измельченъ бороной, а во второмъ вывернутыя глыбы могутъ быть легко измельчены каткомъ. Въ сухомъ состояніи болѣе рыхлыя изъ этихъ почвъ требуютъ нѣкоторой осторожности при вспашкѣ ихъ плугами съ рыхлящими отвалами: меньшей кривизны отвала или увеличенія ширины пласта, если это допускается другими цѣлями обработки; уменьшеніе быстроты движенія плуга, хотя также уменьшаетъ искрошеніе земли, но за то невыгоднымъ образомъ замедляетъ работу.

Экстирпаторомъ (грубберомъ) почва обрабатывается лучше всего также въ средне-влажномъ ея состояніи; хотя обработка ея въ влізномъ состояніи экстирпаторомъ гораздо менѣе вредна, чѣмъ плугомъ, и даже полезна, если предшествуетъ вспашкѣ плугомъ, потому что во всякомъ случаѣ открываетъ почвѣ доступъ воздуха и способствуетъ испаренію изъ неѣ воды. Экстирпаторъ (грубберъ) не въ состояніи совладать съ вязкой плотной почвой въ сухомъ состояніи; рыхлую же почву въ такомъ состояніи онъ можетъ привести въ порошкообразное состояніе, особенно если у него много лапъ и разстоянія между ними невелики.

Боронованіе очень рыхлыхъ почвъ возможно еще безъ вреда при самомъ влізномъ состояніи почвы; но плотныхъ и вязкихъ почвъ только при средне-влажномъ состояніи почвы, потому что, при влізномъ состояніи плотной почвы, борова не только не разбиваетъ комьевъ и глыбъ болѣе величины, но сбиваетъ еще маленькіе комочки въ большіе; при сухомъ же состояніи ея борова не можетъ разбить слишкомъ твердыхъ комьевъ. Средне-влажное состояніе почвы есть также лучшее для боронованія хорошо рыхлящихся среднихъ почвъ.

Прикатываніе полей возможно лишь тогда, когда земля обсохнетъ настолько, что не пристаєтъ къ катку. Особенно вредно скольконибудь влізное состояніе почвы для прикатыванія плотныхъ, вязкихъ почвъ. Но, за то сухое состояніе почвы не только не препятствуетъ, но даже дѣлаетъ особенно полезнымъ прикатываніе почвы, хотя для прикатыванія вязкихъ, плотныхъ почвъ въ сухомъ состояніи могутъ быть недостаточными гладкій и кольчатый катки и оказатися необходимымъ глыбодробъ, который въ состояніи раздробить даже почти какъ камень твердыя глыбы.

Большая или меньшая *плотность* почвы, какъ мы уже видѣли, имѣетъ выѣстъ съ влажностью почвы большое вліяніе на обработку почвы въ разсматриваемыхъ здѣсь отношеніяхъ; но кромѣ того болѣе плотныя почвы, говоря вообще, требуютъ, сравнительно съ болѣе рыхлыми почвами, повторенія различныхъ приѣмовъ обработки и часто въ большемъ числѣ разъ, чѣмъ болѣе рыхлыя почвы.

Третья, *многолѣтнія* сорныя травы размножаются также сѣмязами, но кромѣ того одѣ изъ нихъ имѣютъ многолѣтніе корни, которые до тѣхъ поръ, пока они не удалены изъ почвы, ежегодно даютъ отпрыски, другія же размножаются отъ *луковницъ*, *клубней* или *корневищъ*—подземныхъ частей стебля, имѣющихъ почки, которыя, при благоприятныхъ условіяхъ, образуютъ побѣги; такъ, каждая часть корневища съ почкой можетъ развиться въ новое растеніе. Для развитія корневыхъ почек у первыхъ, равно какъ и почек находящихся на корневищахъ у вторыхъ многолѣтнихъ сорныхъ травъ необходимъ доступъ воздуха въ известной степени точно также какъ и для проростанія сѣмянъ; а такъ какъ при нахожденіи ихъ въ почвѣ доступъ воздуха опредѣляется плотностію покрывающей ихъ почвы и глубиной, на которой они находятся, то развитіе ихъ будетъ возможно только при нахожденіи ихъ въ почвѣ на известной глубинѣ. Многолѣтніе корни имѣютъ слѣдующія сорныя травы: Бузина зеленая (*Sambucus ebulus*, L.), Вьюнокъ полевой (*Convolvulus arvensis*, L.), Горошекъ мышиный (*Vicia cracca*, L.), Дереза (*Sarothamnus scoparius*, Wimm.), Жминя цѣльнопольная (*Blitum bonus henricus*, C. A. M.), Заразиха (*Orobancha*): желтоокрасная (*O. elatior*, Sutt.), и обыкновенная (*O. vulgaris*, Poir.), Зятробой (*Hypericum*): обыкновенный (*H. perforatum*, L.) и четырехугольный (*H. quadrangulum*, L.), Крапива двудомная (*Urtica dioica*, L.), Крестовникъ желтуха (*Senecio jacobaea*, L.), Кривоцвѣтъ пашенный (*Achillea arvensis*, L.), Малина ежевика (*Rubus caesius*, L.), Мать-и-мачиха обыкновенная (*Tussilago farfara*, L.), Молочай обыкновенный (*Euphorbia esula*, L.), Одуванчикъ аптечный (*Taraxacum officinale*, Knaut.), Осотъ полевой (*Sonchus arvensis*, L.), Папоротники (*Filices*, L.), Попутники (*Plantago*): средний (*P. media*, L.) и ланцетовидный (*P. lanceolata*, L.), Поручейникъ серповидный (*Stium falcaria*, L.), Розанъ собачій-шиповникъ (*Rosa canina*, L.), Рыскуль обыкновенный-верескъ (*Calluna vulgaris*, Salisb.), Слива тернъ (*Prunus spinosa*, L.), Стальникъ ползучій (*Oxalis repens*, L.), Татарникъ полевой (*Cirsium arvense*, Scop.), Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea millefolium*, L.), Цикорій обыкновенный (*Cichorium intybus*, L.), Щавель (*Rumex*): морской (*R. maritimus*, L.), туполистный-конскій (*R. obtusifolius*, L.), водяной-зѣленикъ (*R. aquaticus*, L.), кислый (*R. acetosa*, L.) и малый (*R. acetosella*, L.) и Яснотка бѣлая-глухая крапива (*Lamium album*, L.). Слѣдующія три растенія какъ дву-, такъ и многолѣтнія: Короставникъ полевой (*Trichera arvensis*, Schrad.), Мелкоцвѣтникъ бѣлый (*Epigloss acriis*, L.) и Просвирникъ круглолистный (*Malva rotundifolia*, L.). Наконецъ, изъ многолѣтнихъ сорныхъ травъ: Лукъ песчаный (*Allium serotodorsum*, L.) размножается отъ луковичъ, Чина клубненосная (*Lathyrus tuberosus*, L.)—отъ клубней, а Пшеница пырей (*Triticum repens*, L.), Чалозочъ—ландикъ нахучій (*Hieracium odorata*, Wahlb.) и Хвощъ полевой (*Equisetum arvense*, L.)—отъ корневища. Многолѣтнія сорныя травы могутъ являться между всѣми воздѣлываемыми полевыми растеніями, если только обработка почвы не ставитъ корней, корневищъ, луковичъ или клубней ихъ въ условіи невозможности развитія почекъ, т. е. не зарываетъ ихъ слишкомъ глубоко, такъ что имъ недостаетъ воздуха, или же не выворачиваетъ ихъ совсѣмъ наружу, гдѣ они погибаютъ отъ недостатка влаги или отъ мороза; если обработкой почвы и работами по уходу за растеніями во время произрастанія не уничтожаются постоянно ихъ побѣги, такъ что они за недостаткомъ зеленыхъ частей, которыя могли бы приводить имъ пищу изъ воздуха, погибаютъ, или если полевыя растенія своими густыми ростомъ не заглушаютъ ихъ побѣговъ. Поэтому, многолѣтнія сорныя травы легче одолѣваются такія изъ воздѣлываемыхъ растеній, подъ которыми поле остается возможно долго безъ обработки, слѣдовательно многолѣтнія кормовыя травы, если только эти по-

слѣдствія не довольно густы, чтобы заглушить сорныя травы; это же бываетъ особенно часто съ многолѣтними кормовыми травами, когда они начинаютъ слабѣть на 2, 3, 4 году.

Сорныя, подобно тому какъ и воздѣлываемыя растенія, требуютъ известныхъ почвенныхъ условій для своего успѣшнаго произрастанія. Такъ, болѣе или менѣе *влажную* почву предпочитаютъ: Бузина зеленая, Вьюнокъ, Гречишка: почечуйная трава и водяной перещъ, Жабникъ итмевый, Костеръ ржаной, Лукъ песчаный, Лютикъ пашенный, Метлица полевая, Повилка, льняная, Подмаренникъ цѣлкий, Пунавка вонючая, Торица, Тысячелистникъ, Хвощъ, Щавель: морской, туполистный, водяной, кислый; болѣе же *сухую* почву любятъ: Жабникъ полевой, Зятробой обыкновенный, Попутники: большой и средний, Рядька полевая, Слива тернъ, Чертополохъ кивающій; остальные сорныя растенія суть растенія почвы средней сухости. Поля съ болѣе *песчаной*, рыхлой почвой засоряются: Василекъ полевой, Жабникъ итмевый, Лукъ песчаный, Мать полевой, Попутники: песчаный, Просо кроваво-красное, Пшеница пырей (если только почва плодородна и потна), Рыжей, Тысячелистникъ; при содержаніи извести въ почвѣ, сверхъ того: Роза собачья, Слива тернъ; съ *менѣе* *песчаной* почвой: Гречишка вьюнотъ, Короставникъ полевой, Костеръ мягкій; съ почвой *песчаной* и *сушистой*: Василекъ полевой, Воробейникъ полевой, Куколь, Метлица полевая, Торица, а, при содержаніи извести, особенно въ извѣстнаго года—Чечевича волосистая. Съ *сушистой* почвой: Гречишка птичья, Жабникъ полевой, Желтушникъ восточный, Костеръ мягкій, Марьянникъ пашенный, Многоцвѣтникъ бѣлый, Попутники: большой и средний, Рядька полевая; при болѣе плодородной, сверхъ того: Лопухъ, Просо колосистое, Татарникъ полевой; а, при содержаніи извести: Пунавка полевая. Съ *сушистой* и *глинистой* почвами: Бузина зеленая, Мать самосѣйка, Мать-и-мачиха обыкновенная, Молочай обыкновенный, Одуванчикъ аптечный, Никульникъ, Ромашка настоящая, Ярутка полевая; при болѣе плодородной, сверхъ того: Горчица полевая, а, при содержаніи извести въ почвѣ, Поповникъ полевой. Съ *глинистой* почвой: Гречишка развѣстная, Известь, Подмаренникъ цѣлкий; а, при болѣе плодородной: Осотъ. Довольно безразлично относительно болѣе или менѣе плотности почвы: Вьюнокъ полевой (если только почва плодородна), Дурнишники, Живокость полевая, Трилистникъ пашенный, Малина ежевика (если только въ подпочвѣ содержится известъ), Хвощъ полевой. Поля съ *богатой* *перегнойной*, *чернозёмной*, плодородной, рыхлой почвой засоряются: Димитрий, Жеминдой, Крапивами, Крестовникомъ обыкновеннымъ, Лебедами, Марьями, Молочасъ круглолистный, Сумочникомъ, Щерицей; съ *торфяной* почвой—Верескомъ, съ *мерзливой* почвой—Вьюнкомъ полевымъ, Горчицей полевой, Чинкой клубненосной, и съ *известковой* почвой—Желтушникомъ восточнымъ, Яруткой полевой.

Плѣть почвы, которая была бы совершенно свободна отъ сѣмянъ, корней, корневищъ или луковичъ сорныхъ травъ; но кромѣ находящихся уже въ почвѣ частей сорныхъ травъ, служащихъ для ихъ размноженія, въ почву могутъ заноситься и заносится болѣею частью эти части племъ: человекомъ съ высѣваемыми сѣменами воздѣлываемыхъ растеній и съ удобрительными веществами, преимущественно хлѣбнымъ навозомъ, пасущимися животными въ рояемыхъ или извергаемыхъ и вътрѣмъ съ мѣсяцъ, покрытыхъ лѣною растительностію: выгономъ, лугомъ, мѣдью и т. д. Поэтому и мѣры, предпринимаемыя для очищенія угодій (полей) отъ сорныхъ травъ, могутъ быть или *мѣры употребленія* для находящихъ на угодіи сорныхъ травъ, или *мѣры предупрежденія* заноса сорныхъ травъ на угодіе. Первые могутъ заключаться или въ *непосредственное* удаленіе полегающихъ сорныхъ травъ (полотѣй, вырваній многолѣтнихъ сорныхъ травъ, борозваній всходовъ, сгребаній

последовательность воздѣлыванія, *известное чередованіе* растений въ полѣ зависитъ отъ того, что 1, каждое растение съ одной стороны оставляетъ поле въ известное время и въ известномъ состояніи, съ другой—должно занять поле въ известное время и найти его въ известномъ состояніи; но 2-хъ многія изъ воздѣлываемыхъ растений немогутъ возвращаться на то же мѣсто иначе, какъ черезъ известный промежутокъ времени.

Время оставленія и занятія растеніемъ поля зависитъ отъ времени его вытѣва и продолжительности періода провѣрстанія, т. е. времени, въ теченіи котораго растеніе достигаетъ зрѣлости; на это, понятно, имѣютъ большое вліяніе климатъ и почва. Такъ, напр., гречиха и овесъ оставляютъ поле часто одновременно, между тѣмъ какъ періодъ провѣрстанія у овса (16—22 недѣль) гораздо продолжительнѣе, чѣмъ у гречихи (12—16 недѣль), потому что гречиха, болѣе чувствительная къ холодамъ, вытѣвается раньше на 6—10 дней овса. На влажной, тучной почвѣ, во влажномъ климатѣ періодъ провѣрстанія удлинняется—то же растеніе оставляетъ поле позже, чѣмъ на болѣе сухой, тощей почвѣ въ сухомъ климатѣ. У насъ, уже въ среднихъ губерніяхъ, напр., картофель оставляетъ поле слишкомъ поздно, въ сентябрѣ мѣсяцѣ, для того чтобы послѣ него можно было посѣять еще озимую рожь, которая должна быть посѣяна въ теченіи августа и даже въ первой половинѣ этого мѣсяца. Наши озимыя (вытѣваемые съ осени) и яровыя (вытѣваемые весной) растенія вообще оставляютъ поле въ средней Россіи слишкомъ поздно для того, чтобы послѣ нихъ можно было въ томъ же году взять съ поля урожай какаго либо еще растенія.

Различныя растенія оставляютъ поле въ различномъ состояніи:

1) Въ зависимости отъ развитія ихъ листьевъ и отъ густоты ихъ провѣрстанія, такъ какъ этимъ обуславливается большее или меньшее отбѣненіе почвы, следовательно большія или меньшія: рыхлость почвы, влажность ея въ верхнемъ слое (стр. 133), химическая подготовленность ея и чистота отъ сорныхъ травъ, которыя заглушаются тѣмъ познѣе, чѣмъ гуще ростъ полевого растенія и чѣмъ богаче это последнее листьями. Такъ, изъ-подъ широколиственныхъ растений, напр. гороха, гречихи, рапса или изъ-подъ густо провѣрстающихъ кормовыхъ злаковъ, болѣе густо сидящихъ: картофеля, рѣпы, поле, при хорошемъ провѣрстаніи этихъ растений, выходитъ съ болѣе рыхлой, болѣе потной, болѣе плодородной и болѣе чистой отъ сорныхъ травъ почвой, чѣмъ изъ-подъ колосовыхъ хлѣбовъ или рѣдко сидящихъ картофеля и рѣпы. Послѣ рѣпы и свеклы приходится производить глубокое разрыхленіе почвы раньше, чѣмъ послѣ рапса.

2) Въ зависимости оттого, сколько испаряется воды растеніями, (стр. 133). Такъ наблюденія показывали, напр., что ячменное растеніе испарило всего 249 граммовъ, тогда какъ гороховое испарило въ теченіи того же времени (2-хъ мѣсяцевъ) 446 грам. воды; что одно бобовое растеніе испарило 1040 грам. въ то время (въ теченіи 3-хъ мѣсяцевъ и 1-ой недѣли), какъ два выюныя растенія испарили 504, а два овсяныя 888 грам. воды. Чѣмъ болѣе испаряетъ растеніе воды, тѣмъ суше оставляетъ оно послѣ себя почву и чѣмъ глубже при этомъ углубляетъ оно въ почву свои корни, тѣмъ на большую глубину иссушается почва. Но, это обстоятельство важно лишь въ томъ случаѣ, если послѣдующее въ полѣ растеніе слѣдуетъ за иссушающимъ почву растеніемъ еще въ томъ же году, напр. если озимые хлѣба слѣдуютъ у насъ за выюной смѣсью, на западѣ за картофелемъ; опытъ показываетъ, что озимые хлѣба въ подобныхъ случаяхъ страдаютъ иногда. Если же за такими иссушающими растеніями слѣдуютъ яровыя растенія, вытѣваемые, следовательно, лишь слѣдующей весной, то въ теченіи осени, зимы и ранней весны почва, если она только достаточно глубоко разрыхлена, успѣваетъ снова заплестись влагой.

3) Въ зависимости оттого, что растенія берутъ у почвы. (см. таблицу стр. 494—497).

Понятно, что чѣмъ больше беретъ растеніе у почвы кали, известн., фосфорной кислоты и т. д., тѣмъ меньшее количество ихъ оставляетъ оно въ почвѣ; следовательно, одна и та же почва останется бѣднѣе кали послѣ спитія хорошаго урожая картофеля или клевера, чѣмъ послѣ спитія такого же урожая рапса или гречихи.

4) Въ зависимости оттого, что оставляетъ растеніе почвѣ въ своихъ урожайныхъ остаткахъ. Такъ,

слѣдующія ра- стенія:	оставляютъ на десятину фунтовъ:							
	Всего уро- жайныхъ ос- татковъ	въ нихъ						
		Органиче- скаго ве- щества.	Азота.	Кали.	Известн.	Магн.из.	Фосфорн. кислоты,	Сѣрной кислоты.
Люцерна	27720	24280	3440	105,5	564,0	70,0	113,0	53,5
Красный клеверъ ..	25580	20075	5505	234,5	751,0	141,5	215,0	74,5
Эспарцетъ	17005	14070	2935	122,5	338,0	91,0	85,5	59,5
Рожь	15095	10370	4725	90,0	210,5	41,5	73,0	35,0
Зеленый клеверъ	14350	11555	2795	74,5	390,5	51,5	69,5	39,0
Рапсъ	12785	11100	1785	135,5	355,0	37,5	92,0	89,5
Овесъ	10835	6695	4140	71,5	246,0	35,0	86,5	25,5
Копскіе бобы	10135	8555	1580	49,0	231,0	35,0	40,0	20,5
Пшеница	9970	6845	3125	53,0	220,5	49,5	34,0	21,5
Горохъ	9420	7315	1925	32,5	206,5	32,0	43,0	27,5
Серраделъ	8975	7410	1565	25,5	229,5	39,0	53,0	26,5
Гречиха	6295	4960	1335	26,5	230,0	21,0	37,5	19,5
Ячмень	5710	4620	1090	71,5	246,0	35,0	86,5	25,5

Слѣдовательно, въ урожайныхъ остаткахъ клевера, напимѣръ, остается поля гораздо менѣе органическаго вещества, по болѣе азота и зольныхъ составныхъ частей, чѣмъ въ урожайныхъ остаткахъ люцерны; рапсъ, въ меньшемъ на $\frac{1}{3}$ сравнительно съ рожью количествѣ урожайныхъ остатковъ, оставляетъ почвѣ кали, однако, въ $\frac{1}{3}$ раза болѣе, чѣмъ рожь и т. д. Растенія, воздѣлываемыя для корней или клубней (свекла, картофель и т. д.) и убираемыя выкапываніемъ, или растенія, которыя хотя не воздѣлываются для корней, но убираются выдергиваніемъ съ корнями, напр. ленъ, оставляютъ почвѣ весьма мало урожайныхъ остатковъ, въ видѣ болѣе тонкихъ развѣтлений корней; но, за то самымъ способомъ уборки ихъ, выкапываніе или выдергиваніе, способствуетъ разрыхленію земли. Урожайные же остатки рыхлятъ почву, открывая ее доступу воздуха, и обогащаютъ ее органическимъ веществомъ, которое въ продуктахъ своего разложенія: углекислотѣ, аммиакѣ и азотной кислотѣ, даетъ отчасти питательныя вещества, отчасти растворителей для другихъ питательныхъ веществъ, и зольными составными частями, взятыми иногда изъ болѣе глубокихъ слоевъ (стр. 133) почвы.

5) Въ зависимости оттого, въ какой степени растеніе, занимающее поле, способствуетъ, какъ во время занятія имъ поля, такъ и послѣ уборки его, приведенію почвы въ сѣное состояніе (стр. 436). Такъ, потная почва изъ-подъ широколиственныхъ растений (гороха, вики), которая, отънявъ ее, сохраняютъ ея рыхлость и умѣряютъ разложеніе въ ней органическихъ ве-

ществъ, будучи перепажана, достигаетъ снѣлости, при содѣйствіи значительнаго количества сравнительно легко разлагающихся урожайныхъ остатковъ, гораздо скорѣе, чѣмъ изъ-подъ колосовыхъ хлѣбовъ, подъ которыми она твердѣетъ, вслѣдствіе улюотненія ея дождями и вслѣдствіе быстрого разложения перегнойныхъ веществъ, поддерживающихъ, главнымъ образомъ, ея рыхлость.

б) Въ зависимости, наконецъ, оттого, въ какой степени оставляетъ растение почву чистой отъ сорныхъ травъ, отъ зародившейся паразитныхъ грибовъ, обуславливающихъ различныя болѣзни растений, и отъ вредныхъ наѣдокъ. Растения, воздѣлываемыя въ рядахъ, между которыми почва обрабатывается во время произрастанія ихъ, напр. картофеля, свекла, растения хорошо отбѣняющія почву, какъ широколиственные растения, напр. гречиха, или какъ густо-пышнѣющія и густо-произрастающія, напр. кормовыя растения — вико-сѣ-овсомъ; растения убиваемыя раннею полною зрѣлостію сѣмянъ, при которой могли бы достигать такой же зрѣлості, а слѣдовательно и осипать сѣмена сорныхъ травъ, напр. вико-сѣ-овсомъ на сѣно или зеленый кормъ; наконецъ всѣ растения вообще разводимыя безъ обработки почвы во время ихъ произрастанія, при хорошемъ урожаѣ, когда они лучше отбѣняютъ почву, чѣмъ при дурномъ урожаѣ, оставляютъ почву болѣе или менѣе чистой отъ сорныхъ травъ. Между тѣмъ, какъ растения, не воздѣлываемыя въ рядахъ, а потому болѣе частію не допускающія обработки почвы во время своего произрастанія, не отбѣняющія достаточно почвы и убиваемыя въ полною зрѣлості, напр. разводимыя посѣвомъ въ разбросъ зерновыя растения, преимущественно колосовыя хлѣба, наконецъ, всѣ растения вообще разводимыя безъ обработки почвы во время ихъ произрастанія, при дурномъ урожаѣ, оставляютъ почву болѣе или менѣе засоренной сорными травами. Что касается засоренія почвы зародившимися паразитныхъ грибовъ и вредныхъ наѣдками, то въ этомъ отношеніи мы не знаемъ болѣе того, что растения, при воздѣлываніи ихъ самихъ послѣ себя (см. ниже), подвергаются сильнѣе болѣзнямъ, причиняемымъ паразитными грибами, и вреднымъ наѣдками, нежели если они чередуются между собой въ полѣ. Впрочемъ, растения, произрастающія въ парѣ, и клеверное жнивье служатъ, по видимому, для бабочки хлѣбнаго червя (*agrotis segetum*), падающей на озимую рожь, особенно удобнымъ мѣстомъ для складки яицъ, изъ которыхъ выходитъ гусеница, кормящаяся, въ ожиданіи всходовъ ржи, разными дикорастущими растениями, произрастающими на межахъ и другихъ мѣстахъ по соседству, а затѣмъ поѣдающая всходы озимой ржи, слѣдующей въ полѣ за зеленымъ паромъ или клеверомъ. Этотъ объясняется, можетъ быть, почему въ мѣстностяхъ, часто посѣщаемыхъ этимъ наѣдомъ, или въ мѣстностяхъ даже его обиліе предпочитаютъ занимать поле, выходящее изъ-подъ клевера, яровымъ, а не озимымъ хлѣбомъ.

Понятно, однако, что состояніе, въ которомъ растение оставляетъ послѣ своей уборки поле, будетъ находиться въ зависимости отъ свойства почвы и климата. Не одно растение, сколько бы оно не рыхлило почвы своими урожайными остатками, не оставитъ плотной глинистой почвы въ томъ состояніи рыхлости, какое свойственно песчаной почвѣ по ея природѣ и въ какой остатокъ эту почву растения даже менѣе способныя содѣйствовать разрыхленію почвы. Почва, содержащая сама по себѣ много кали, будетъ содержать этого послѣднего послѣ растений наиболѣе обильнаго почву въ отношеніи кали, болѣе, нежели почва сама по себѣ бѣдная кали послѣ растений берушаго у почвы сравнительно мало кали. Почва сама въ себѣ заключающая условія быстрого подготовленія питательныхъ веществъ, какъ напр. наша черноземная почва, будетъ послѣ растений, наименѣе благоприятствующаго такой подготовкѣ, плодороднѣе, чѣмъ можетъ быть послѣ растений.

наиболѣе благоприятствующаго подготовкѣ, почва само по себѣ представляющая условія мало благоприятныя для ея подготовленія. Точно также ни одно сильно отбѣняющее растение, сколько бы оно ни занимало верхняго слоя почвы отъ высыханія, оно не въ состояніи сохранить почвѣ въ сухомъ климатѣ той степени влажности, которую будетъ имѣть такая же почва въ влажномъ климатѣ, выходя даже изъ-подъ растений, наименѣе отбѣняющаго ее.

Какъ различно состояніе одной и той же почвы, оставляемой тѣмъ или другимъ растеніемъ, такъ различно и состояніе почвы, котораго требуютъ различныя растенія; и это различіе зависитъ:

1) Отъ количества растительной массы, которую производятъ одинаково хорошіе урожаи различныхъ растений, отъ состава этой массы и отъ болѣе или менѣе продолжительности времени, въ теченіи котораго образуется эта масса (стр. 121—124 и 494—497). Такъ, напр., хорошіе урожаи ржи и гороха производятъ на десятинахъ 12000, картофеля—37500 люцерны—48000, кукурузы на зеленой кормъ—60000 и кормовой свекловицы—132000 фунт. растительной массы, въ составѣ которой

	у ржи, гороха.	карто- феля.	люцерн.	кукурузу- на вой- зеленый кормъ.	кормо- зы на вой- зеленый кормъ.
сухого вещества:	10284	10328	9000	11709	10680
Азота	96	236	129	323	144
Кали	86	120	206	211	235
Извести	36	135	46	375	85
Магнѣзін	17	35	33	47	75
Фосфорной кислоты	51	62	61	82	75
Сѣрной	10	25	27	47	21
					144986

Вытекающее отсюда различіе растеній въ требованіяхъ ихъ относительно пазкаваемой подъ нихъ почвы, вслѣдствіе различія въ составѣ образуемыхъ ими растительныхъ массъ, становится еще яснѣе, если сравнить эти растенія въ отношеніи количествъ составныхъ частей, которыя беретъ каждое изъ нихъ для образованія 1000 частей сухаго вещества:

	азота.	кали.	извест.	магне- зін.	фосфорн.	сѣрн.
рожь	9,3	8,6	3,5	1,8	5,0	1,0
горохъ	23,0	11,6	13,0	3,4	6,0	2,4
картофель	14,3	23,0	5,1	3,7	6,8	3,0
люцерна	27,7	18,0	32,0	4,0	7,0	4,0
кукуруза на зеленый кормъ	13,5	22,0	8,0	7,0	7,0	2,0
кормовая свекла	16,6	37,3	5,8	5,2	5,6	3,4

Слѣдовательно, для образованія 1000 част. сухаго вещества, требуетъ наиболѣе азота, извести, фосфорной и сѣрной кислоты люцерна, кали — кормовая свекла, магнѣзін — кукуруза на зеленый кормъ, меньше всего требуетъ этихъ составныхъ частей рожь. На 1 часть фосфорной кислоты требуютъ кали: рожь 1,7, горохъ 1,9, люцерна 2,3, кукуруза на зеленый кормъ 3,1, картофель 3,4, кормовая свекла 6,7; азота же — рожь и кукуруза на зеленый кормъ 1,9, картофель 2,1, кормовая свекла 3,3, горохъ 3,8, люцерна почти 4,0.

Если принять во вниманіе продолжительность періодовъ произрастанія этихъ растеній, въ теченіи которыхъ они должны получить изъ почвы эти составныя части ихъ растительной массы, то окажется, что она значительнѣе всего у люцерны, которая располагаетъ всѣмъ временемъ, благоприятнымъ

въ теченіи года для произрастанія растений; а это время въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ можетъ произрастать люцерна, перѣдко довольно продолжительно: 7—8 мѣсяцевъ. Затѣмъ, періодъ произрастанія уржи 40—42, кормовой свеклы 22—26, картофеля 18—26 и гороха 16—20 недѣль; наиболѣе же опыты братковъ у кукурузы на зеленый кормъ, всего 12 недѣль: такъ, что въ теченіи недѣли, при длинѣ періода произрастанія у люцерны въ 30, у кукурузы же на зеленый кормъ въ 12 недѣль, первая должна образовать 390, вторая 890 фунт. сухого вещества, среднимъ числомъ, и получить, среднимъ же числомъ, фунтовъ:

	азота.	калн.	известн.	магнєзін.	фосфорн.	сѣрн.
1-ая	11	7	13	2	3	2
2-ая	12	20	7	6	6	2

при этомъ калн, известъ магнєзію и фосфорную и сѣрную кислоты исключительно изъ почвы; азотъ же, весьма вѣроятно, въ пѣкоторой части изъ воздуха, и затѣмъ въ большей или меньшей части изъ почвы въ зависимости отъ свойства листовой поверхности.

2) Отъ различнаго свойства листовой поверхности, не только отъ величины ея, т. е. численности листьевъ и величины каждаго листа въ отдѣльности, но и отъ строенія листа, въ особенности отъ числа и устройства устьицъ—отверстій, посредствомъ которыхъ растеніе сообщается съ вѣнющимъ воздухомъ. Черезъ листья, а именно устьица поступаетъ внутрь растеній углекислота, которой углеродъ идетъ на образованіе органической массы растенія, состоящей приблизительно на половину изъ углерода. Поэтому, понятно, что чѣмъ больше поступаетъ углекислоты въ растеніе, тѣмъ больше должно поступать въ растеніе и соответствующихъ питательныхъ веществъ изъ почвы: калн, фосфорной кислоты, извести и т. д., для того чтобы могло образоваться надлежащее количество органической массы. Черезъ листья, вѣнѣмъ, растенія испаряютъ воду; количество испаряемой воды зависитъ между прочимъ отъ строенія листьевъ и отъ величины листовой поверхности (числа и рода устьицъ); чѣмъ больше же испаряется воды, тѣмъ больше растеніе требуетъ воды изъ почвы. При испареніи, дѣлѣе, какъ показали опыты, образуется на счетъ азота воздуха азотистокислый амміакъ, который можетъ служить источникомъ азота, необходимаго для образованія одной части органической массы растенія, главнымъ образомъ бѣлковыхъ веществъ. Можетъ быть, растенія усваиваютъ и прямо углекислый амміакъ, находящійся въ воздухѣ. Такимъ образомъ листья, черезъ которые въ томъ или другомъ соединеніи можетъ поступать въ растеніе азотъ изъ воздуха, опредѣляютъ, слѣдовательно, большую, или меньшую потребность растенія въ азотныхъ соединеніяхъ въ почвѣ. Такъ, бобовыя растенія, напр., несмотря на то, что урожай ихъ содержитъ гораздо большее количество азота чѣмъ урожай злаковыхъ растеній, требуютъ меньшаго количества азота въ почвѣ чѣмъ эти послѣднія. Наконецъ, испареніе воды черезъ листья заставляетъ отчасти поступать въ растеніе питательныя вещества изъ почвы: такъ что растенія, испаряющія больше воды, берутъ изъ почвы больше питательныхъ веществъ чѣмъ тѣ, которыя испаряютъ ея менѣе.

3) Отъ свойства корней: глубины развитія, развѣтвленія и способности ихъ болѣе или менѣе легко брать питательныя вещества изъ почвы. Наиболѣе глубоко развиваютъ свои корни бобовыя растенія (горохъ, вика и т. д.), изъ нихъ же въ особенности клеверныя (люцерна); наименѣе злаковыя (хлѣбныя растенія), но за то эти послѣднія, въ особенности овесъ, имѣютъ часто весьма развѣтвленные корни. Также сильно развѣтвляющія корни у бобовыхъ растеній, но они весьма слабо развѣтвлены у корнеплодныхъ растеній (свекла, морковь и т. д.). Развѣтвленіе же корней (стр. 121) имѣетъ

вліяніе на величину пріемлющей части корня, а величина этой послѣдней въ свою очередь въ количество поступленія питательныхъ веществъ изъ почвы въ растеніе. Наконецъ, различныя растенія имѣютъ, повидимому, различную способность *), прилегая своими корнями непосредственно къ частицамъ почвы (стр. 124), растворить изъ нихъ нерастворенныя, мало подготовленные еще для поступленія въ растеніе, питательныя вещества. Чѣмъ значительнѣе у растенія эта растворяющая способность и пріемлющая корневая поверхность, тѣмъ легче растеніе беретъ питательныя вещества изъ почвы. Въ отношеніи легкости, съ которой берутся питательныя вещества изъ почвы, можно расположить полевые растенія въ слѣдующемъ порядкѣ: корнеплодные растенія, какъ дѣлающія это нѣтруднѣе, затѣмъ масличныя растенія—лепъ—шпинатъ и ячмень—рожь и картофель—горохъ и шна—овесъ и конскіе бобы—гречиха—клеверныя растенія и кормовыя злаковыя травы, какъ дѣлающія это пѣнѣе.

4) Отъ той степени сѣблости почвы, которой требуютъ различныя растенія. Это требованіе можетъ быть различно у одного и того же растенія въ различныя періоды его развитія. На отношеніе растеній къ сѣблости почвы въ первый періодъ ихъ развитія, а именно періодъ ихъ проростанія, имѣетъ большое вліяніе свойство сѣмянъ растенія. Растенія сносятъ менѣе сѣблую почву, если сѣмена ихъ болѣе крупны и богаты содержаніемъ бѣлковыхъ веществъ, такъ что развивающіяся изъ нихъ молодыя растенія могутъ образовать довольно сильныя корни на счетъ запаса питательныхъ веществъ, отложившихъ въ самихъ сѣменахъ, неуждающъ для этого въ самое близкое послѣ проростанія сѣмени время въ питательныхъ веществахъ почвы. Напротивъ, растенія сносятъ несѣблѣй почвы, если сѣмена ихъ малы и бѣды содержаніемъ бѣлковыхъ веществъ, такъ что развивающіяся изъ нихъ молодыя растенія, уже тотчасъ послѣ проростанія сѣмени, нуждаются въ питательныхъ веществахъ почвы для достаточно сильнаго развитія корней. Такъ, клеверъ, рапсъ, которыхъ сѣмена очень малы, или хлѣбныя растенія, которыхъ сѣмена крупнѣе, но содержатъ всего 10—13% бѣлковыхъ веществъ, требуютъ болѣе сѣблѣй почвы, чѣмъ бобовыя растенія съ крупными сѣменами и съ 22—25% бѣлковыхъ веществъ. Въ послѣдующіе періоды развитія растеній, на отношеніе ихъ къ сѣблѣй почвѣ имѣетъ рѣшительное вліяніе способность ихъ корней извлекать питательныя вещества изъ почвы; чѣмъ сильнѣе эта способность, тѣмъ легче мирится растеніе съ несѣблѣй или мало сѣблѣй почвой. Бобовыя растенія, въ особенности клеверныя, злаковыя травы, изъ хлѣбныхъ злаковъ овесъ мирится легче съ несѣблѣй почвой, чѣмъ масличныя и корнеплодные растенія.

5) Наконецъ, оттого, въ какой степени чистой отъ сорныхъ травъ почвы требуютъ различныя растенія. Растенія, туго развивающіяся въ началѣ, напримѣръ просо, растенія, разводимыя для зеренъ и потому сравнительно рѣдкимъ посѣвомъ, напримѣръ масличныя растенія, или растенія, непропахиваемыя во время произрастанія, напр. зерновыя растенія вообще, боятся засоренной почвы болѣе, чѣмъ растенія быстро развивающіяся въ началѣ, напр. конопля, гречиха, чѣмъ растенія, разводимыя для стебленихъ и листовыхъ частей, слѣдовательно сражительно густымъ посѣвомъ, напр. кормовыя травы, или растенія, пропахиваемыя во время произрастанія, напр. корнеплодные растенія.

Такимъ образомъ различнаго состоянія, въ которомъ остаются различныя растенія почву и въ которомъ они ея требуютъ. Изъ сопоставленія тѣхъ

*) записываютъ, весьма вѣроятно, съ корневыхъ выдѣленій (можетъ быть углекислоты).

и других становится понятным, почему выгоднее бывает иногда воспользоваться тем состоянием поля, в котором оно оставлено известным растением, и занять поле растением, которому такое состояние его отвечает или для которого оно в таком состоянии может быть приспособлено с возможно малыми расходами на удобрение и обработку, чем для значительных затрат на эти последние для того, чтобы привести поле в состояние, требуемое другим растением, которому данное состояние поле отвечает весьма мало. Так, посев бобовых кормовых трав (люцерны, клевера), которые в своих урожайных остатках оставляют почву весьма значительное количество азота, выгодно занять поле злаковыми растениями, которые, хотя требуют азота сравнительно немного, но требуют его может быть исключительно из почвы; в особенности же пшеницею, которая, обладая небольшой разворающей корневой силой, может воспользоваться накопленным в почве азотом и как растворителем нужных ей, но не находящихся в почве в соответствующем для нее состоянии питательных веществ; но невыгодно занять поля картофеля или кормовой свеклой, требующими много кали, которого значительное количество требуют также бобовые кормовые травы, оставляющие между тем почве сравнительно малое количество кали в своих обильных урожайных остатках; к тому же соответствующая картофелю и кормовой свекле обработка поля, вышедшего из-под трав, крайне затруднительна и стоила бы дорого; а потому выгоднее занимать картофелем или кормовой свеклой поле из-под хвощных злаков, которые берут из почвы сравнительно мало кали, а оставляют его почве в своих, урожайных остатках в большем сравнительно с фосфорной кислотой количестве, чем бобовые кормовые травы.

Наконец, третья из причин необходимости чередовать растения в поле есть невозможность или, по крайней мере, невыгодность возвращения некоторых из полевых растений на то же место ранее истечения известного числа лет; так, напр. гороха ранее 6—9, клевера и льна ранее 6 лет. Это явление тождественно с явлением *утомления* почвы относительно того или другого растения, когда почва, производившая сперва известное растение в течение нескольких лет сряду или через известные промежутки времени, затем отказывается производить так часто, как прежде, или даже вовсе урожай его, означивающие затраты на его возделывание.

Эти явления суть следствие нескольких причин, действующих иногда в отдельности, иногда же и наизуше в том или другом сочетании между собой. Одной из главных причин, по всей вероятности, есть истощение почвы такими растениями на более значительной глубине; это вытекает из того, что растения, которая не могут возвращаться на то же место ранее известного, большей частью значительного числа лет, суть растения преимущественно с глубоко идущими корнями; — что некоторых из них, напр. люцерны, достигая своими корнями неблагоприятного для них слоя почвы, иногда на весьма значительной глубине, пропадают; это же доказывает, что питание их глубокими частями корня для них важно и не может ограничиваться только верхними, хотя и весьма обильными разветвлениями корня; — что химическое подоглощение почвы на глубинах слоях обыкновенно затруднительно, по ограниченности доступа воздуха туда без глубокой обработки; — что при глубокой обработке и соответствующем удобрении почвы на значительную глубину, эти растения могут гораздо скорее возвращаться на то же место; — что, наконец, на эти растения действует весьма хорошо внесение в почву таких веществ, которые, как питательная (азотная кислота) могут, не разлагаясь почвой, опускаться в почву более глубоко, или, как раздиратели, способство-

вать более глубокому оушеению в почве уже находящихся в этой последней питательных веществ. Следующей затем, весьма вероятной во многих случаях причиной невозможности возделывания растения на одном и том же месте два или большее еще число лет сряду, есть истощение почвы в отношении одного из питательных веществ; так как растения обдывают почву преимущественно в отношении известных веществ, а некоторые даже — преимущественно в отношении одного какого либо вещества, между тем как почва может не содержать этих веществ, или одного этого вещества в достаточном количестве вообще, или в достаточном количестве в удобусвояемой форме. Внесение в почву известного или известных питательных веществ часто дает возможность для неусоглаженного возделывания на одном и том же месте, то по крайней мере более частого возвращения на то же место известного растения; так, напр., внесение одного кали или кали и фосфорной кислоты оказывало такое действие на возделывание сахарной свекловицы. Весьма часто причиной таких же явлений может быть усиление животных или растительных вредителей, возделывавшихся на одном месте в течение нескольких лет, или возвращавшихся на то же место слишком часто. Так, напр. свекловица в Киевской, подсолнечник в Воронежской губ. и ворсильная пшеница в обрестностях Галле (Прусская Саксония), при возделывании их в течение двух или более лет сряду на одном и том же месте или даже при более только частом возвращении их на то же место, страдают весьма сильно: первая от жука (свинки — *Cleonus punctiventris*) и гусеницы бабочки (*Botys sticticalis*), второй от ржавчины, причиняемой паразитным грибом (*Puccinia Helianthi*) и, наконец, третья — от паразитного же гриба (*Perezopora Dipisci*). Наконец, причиной разнотравных явлений может быть также накопление в почве какого-либо вещества в избытке, вредном для развития известного растения; хотя нельзя указать на факты, прямо подтверждающие это, тем не менее мыслимо, напр., накопление в почве поля, незанимаемого весьма долгое время злаковыми (хлебными) растениями, удобопреходящей в растения кремневой кислоты, которая, при отсутствии у растений способности, в прямом значении слова, избирать себя или других из питательных веществ, находящихся в почве в одинаковом состоянии удобопоступления в растения, может быть вредна некоторым растениям, напр. льну, поступаая в них в количестве больше того, которого требует природа их или цель их возделывания (стр. 125—126).

Каждое растение, в известном климате и на известной почве имеет свое наиболее благоприятное время для посева, которое зависит с одной стороны: от количества влаги и тепла, требующегося для прорастания семян и дальнейшего развития растений, и от продолжительности периода произрастания растения, с другой — от свойств почвы, состояния влажности и температуры почвы и воздуха в течение времени благоприятного для развития растений и от продолжительности того времени в данной местности. А потому, освобождая поле в известное время и требуя окончания подготовки земли к известному времени, растение необходимо определяет время обработки земли, время применения приемов обработки. К тому же различные растения, в зависимости от требуемой ими различной степени рыхлости, влажности, сырости и чистоты

почвы отъ сорныхъ травъ, и того или другаго чередованія ихъ въ полѣ, по которому они слѣдуютъ въ полѣ за известными растеніями и предшествуютъ известнымъ растеніямъ, опредѣляютъ различіе въ повтореніи и послѣдовательности приемовъ обработки почвы.

Различныя приемы обработки почвы принимаются одинъ за другимъ черезъ известные промежутки времени; такъ, напр. почва бороуется послѣ вспашки и пашется послѣ боронованія, когда смена однолѣтнихъ сорныхъ травъ дадутъ всходы (стр. 490); впрочемъ, глинистая почва, при вспашкѣ ея въ болѣе сухое время, бороуется тотчасъ послѣ вспашки, потому что иначе пласты ея могутъ отвердѣть до того, что намельченіе ихъ боронованіемъ сдѣлается невозможнымъ. Точно также невозможно выжидать проростанія сѣмянъ сорныхъ травъ, для того чтобы приступить къ боронованію или пахоти, если своевременность посѣва заставляетъ сѣять окончаніемъ обработки къ известному времени. Почва вспаханная, какъ мы видѣли (стр. 436—437), должна оставаться нѣкоторое время безъ перепаши, для того чтобы достигнуть сѣлости.

Изъ этого видно, что для надлежащаго приготовленія земли необходимо известное время, особенно продолжительное тогда, если почва глинистая, которую (стр. 483—485) не всегда можно пахать, бороновать и т. д., или засоренная, которую для успешнаго истребленія сорныхъ травъ необходимо пахать въ известное именно время (стр. 490); и что въ странахъ съ короткимъ періодомъ времени благоприятнаго для обработки почвы, какъ напр. у насъ, для надлежащаго приготовленія земли, можетъ быть недостаточно промежутка времени между уборкой одного растенія и выѣздомъ другаго, слѣдующаго за первымъ въ полѣ такъ быстро, какъ только позволяютъ климатическія условія и свойства послѣдняго растенія. Понятно, что при такомъ условіи недостатка времени, нельзя обработать почву удовлетворительно и, если продолжать такую несовершенную обработку въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, то поле будетъ еще болѣе ухудшаться и потребуетъ, наконецъ, тѣмъ болѣе усиленной и хорошей обработки, для которой въ свою очередь понадобится еще болѣе продолжительное время. Поэтому, чтобы сдѣлать возможной такую усиленную, хорошую обработку, необходимо пожертвовать временемъ, въ теченіи котораго нужно было бы снять съ поля, требующаго такой усиленной обработки, урожай какого либо растенія, или же снять урожай растенія, хотя и менѣе цѣннаго но съ менѣе продолжительнымъ періодомъ произрастанія, вмѣсто другаго болѣе цѣннаго но съ болѣе продолжительнымъ періодомъ произрастанія. Такая жертва времени, такое оставленіе полевой земли неважною, тогда какъ она могла быть запята растеніемъ, называется паровымъ временемъ, оставленіемъ въ пару, а часть поля, оставленная въ пару, *паровымъ полемъ*

или просто *паромъ*. Кромѣ усиленной, главное же своевременной обработки, которая способствуетъ хорошему разрыхленію почвы, возстановленію ея плодородія путемъ выѣзтриванія и очищенію ея отъ сорныхъ травъ, оставленіе поля въ пару дѣлаетъ удобнымъ удобреніе почвы такими веществами, которые для ихъ воздѣйствія на почву требуютъ болѣе продолжительнаго времени; такъ, заблаговременное удобреніе хлѣбнымъ навозомъ, который, для болѣе полнаго дѣйствія на почву, а слѣдовательно и на посѣвующее растеніе, долженъ, во время посѣва этого послѣдняго, успѣть разложиться въ пѣветной степени.

Если обработка пароваго клѣна начинается уже съ осени и продолжается съ болѣе или менѣе продолжительными промежутками времени между отдѣльными обработками до времени посѣва слѣдующаго, обыкновенно озимаго растенія; такъ что въ теченіи этого времени паровое поле остается почти свободнымъ отъ всякой растительности—чернымъ, паръ называется *чернымъ*. Но, такое оставленіе части поля въ черномъ пару исключаетъ пользованіе этой частью въ теченіи почти цѣлаго года, а потому въ теченіи нѣкотораго времени пользуются паровымъ полемъ иногда какъ пастбищемъ, позволяя ему заростать травами и начиная его обработку только по окончаніи яровыхъ посѣвовъ. Такой паръ называется *зеленымъ*, потому что онъ представляется зеленымъ въ то время, когда покрывается растительностію, или иногда также *изаносымъ*, потому что обработка его въ болѣе сѣверныхъ мѣстностяхъ начинается около Иванова дня. Скотъ, въ особенности крупный, находитъ, однако, на полѣ въ зеленомъ пару болѣею частью дурное пастбище, такъ какъ оно покрывается обыкновенно весьма скудной растительностію; а потому такое пользованіе паровымъ полемъ удерживается еще нѣсколько долѣе въ сравнительно богатыхъ землей странахъ, съ болѣе легкой почвой, которая уплотняется отчасти насущимъ скотомъ, и преимущественно при содержаніи овецъ, для которыхъ болѣе доступна скудная растительность; въ странахъ же менѣе богатыхъ землей, при содержаніи крупнаго рогатаго скота, въ особенности молочнаго, оно уступаетъ мѣсто пользованію паровымъ полемъ посредствомъ занятія его такими растеніями, которые, при краткости своего періода произрастанія, оставляютъ еще достаточно времени для усиленной и своевременной обработки почвы и своевременнаго удобренія ея хлѣбнымъ навозомъ, или же, при болѣе продолжительномъ періодѣ произрастанія, допускаютъ продолженіе обработки почвы и подготовленіе навоза въ почву навоза для слѣдующаго за ними растенія во время своего произрастанія. Перваго рода растенія воздѣлываются обыкновенно на зеленый кормъ, такъ какъ этимъ обуславливается необходимая краткость періода ихъ произ-

растанія, и поэтому высѣваются густо, отбѣняютъ при хорошемъ урожаѣ почву, дѣйствуютъ на нее, въ отношеніи очищенія отъ сорныхъ травъ и поддержанія въ ней рыхлости, подобно пару. Паровое поле, занятое такими растеніями, находится въ *занятомъ* пару. Между растеніями втораго рода, которыя имѣютъ обыкновенно болѣе продолжительный періодъ пропастранія, какъ напр. свекловица, картофель и т. д., которыя допускаютъ обработку почвы во время своего произрастанія и которыя мы называемъ *паровыми растеніями*, имѣются растенія съ сравнительно короткимъ періодомъ произрастанія, который приближаетъ ихъ къ растеніямъ перваго рода, наприм. рѣпы (туркнепы); паровое поле, занимаемое такими растеніями, находится въ *полупарѣ*.

И такъ, поле, которое осебодждается у насъ изъ-подъ ярнаго хлѣба, напр., овса, въ концѣ августа или началѣ сентября,

	при оставленіи его въ				при занятіи его паровыми растеніями.
	зеленомъ п а р у:	черномъ	занятомъ	полупарѣ	
Осенью	остаётся безъ обработ- ки.	о б р а б о т ы	о б р а б о т ы	о б р а б о т ы	о б р а б о т ы
Весной до июня.	уногребляет- ся подъ вы- гонъ	обрабо- тывается	обработы- вается и за- нимается весьма рано растеніемъ	обработы- вается	обработы- вается и за- нимается весьма рано растеніемъ
Лѣтомъ съ іюня	о б р а б о т ы	о б р а б о т ы	о б р а б о т ы	о б р а б о т ы	о б р а б о т ы
Въ началѣ или поло- винѣ ав- густа	з а с ѣ в а е т с я	з а с ѣ в а е т с я	з а с ѣ в а е т с я	з а с ѣ в а е т с я	з а с ѣ в а е т с я

Эти различные виды пара неодинаково хорошо и полно разрѣшаютъ задачу оставленія поля въ пару. Достиженіе надлежащаго разрыхленія почвы болѣе затруднительно въ зеленомъ пару, потому что время для обработки почвы здѣсь весьма коротко и потому затруднительно произвести необходи- мое число обработокъ; главное же, произвести эти послѣднія своевременно. Напримѣръ, нельзя всахать землю съ осени, слѣдовательно нельзя подверг- нуть ее разрыхляющему дѣйствию морозовъ; не всегда можно обработать почву въ болѣе соответствующемъ для этого состояніи влажности, выждать проростанія сорныхъ травъ; въ тому же почва уплотняется насущимъ ско- томъ. При черномъ парѣ это совершенно иначе; здѣсь обработка поля начи- нается съ осени и продолжается во все время до посѣва озимаго въ августѣ слѣдующаго года, а потому земля можетъ быть здѣсь превосходно разрых- лена надлежащимъ числомъ обработокъ, обработкою почвы въ болѣе благопріятномъ ей для этого состояніи и рыхляющимъ дѣйствіемъ мороза. Занятый паръ, хотя и сокращается, сравнительно съ чернымъ, время, въ те-

ченіи котораго обрабатывается земля, на полтора, два мѣсяца, въ продолже- ній которыхъ поле занято, напр. кормовой смѣсью - виной съ овсомъ, зато разрыхляющее дѣйствіе на почву обработокъ и мороза усиливается значи- тельно отбѣняющимъ дѣйствіемъ на почву густо произрастающей кормовой смѣси, защищающей почву отъ уплотняющаго дѣйствія дождей, и значитель- нымъ количествомъ урожайныхъ остатковъ, которое оставляетъ въ почвѣ кор- мовая смѣсь.

Подготовленіе почвы вывѣтриваніемъ, т. е. разрушеніе минеральныхъ и органическихъ частей почвы, при которомъ образуются, съ одной стороны, удобоусвояемая для растеній питательныя соединенія, съ другой, въ особен- ности изъ органической части почвы, — растворители (углекислота, амми- ачнина и азотнокислыя соли) — происходитъ весьма слабо при зеленомъ парѣ, потому что почва, вслѣдствіе недостаточнаго и своевременнаго разрыхленія ее, дѣлается недостаточно доступной для атмосферическихъ дѣятелей вывѣ- триванія: недостаточно открывается дѣйствію кислорода, углекислоты и т. д., такъ какъ воздухъ проникаетъ въ нее лишь съ трудомъ въ то время, въ те- ченіи котораго она не только остается безъ обработки, но еще и уплотняется насущимъ скотомъ, т. е. съ осени и до іюня мѣсяца; поэтому же самому она недостаточно проищается влагой въ теченіи осени, зимы и ранней весны, между тѣмъ какъ, вслѣдствіе отчасти уплотненія верхняго слоя жи- вотными, отчасти испаренія воды покрывающими ее, хотя и въ скудномъ числѣ, растеніями, терпѣтъ сравнительно много влаги; такъ что въ резуль- татѣ можетъ страдать во многихъ случаяхъ отъ недостатка влаги. Правда, покрывающая почву растительность способствуетъ нѣсколько вывѣтриванію, такъ какъ растенія выбираютъ изъ почвы питательныя вещества, которыя, оставаясь, затѣмъ, почвѣ въ урожайныхъ остаткахъ, остаются въ болѣе до- ступной для перехода въ растенія формѣ; но дѣйствіе это, при такой скуд- ной растительности, какова покрывающая поле въ зеленомъ парѣ, весьма слаба. Въ черномъ парѣ, конечно, вѣтъ растительности, которая могла бы содѣйствовать вывѣтриванію, зато этому послѣднему въ высокой степени содѣйствуетъ усиленная и своевременная обработка, въ особенности рыхлѣ- ка подъ зиму, которая открываетъ почву для доступа воздуха въ теченіи весьма продолжительнаго времени и для доступа влаги: канально-жидкой — въ теченіи времени болѣе изобилующаго влагой (осенью, зимой и весной) и газообразной — въ сухое лѣтнее время. Эта влага, если только почва не перенашивается въ сухое время плугомъ, сохраняется въ почвѣ весьма хоро- шо и вывѣтъ съ удобопроницающимъ въ почву во всякое время воздухомъ обуславливаетъ весьма совершенное подготовленіе питательныхъ веществъ въ почвѣ къ переходу ихъ въ растенія. Въ занятомъ парѣ вывѣтриваніе поч- вы встрѣчается тѣже и даже болѣе благопріятныя условія, чѣмъ въ черномъ парѣ, не смотря на то, что почва остается здѣсь безъ обработки въ теченіи того времени, что поле занято кормовой смѣсью, потому что, при густомъ произрастаніи послѣдней, защищающей поверхность почвы отъ уплотненія, воздухъ проникаетъ въ почву, и вывѣтриваніе продолжается во время заня- тія поля кормовой смѣсью также свободно, какъ и при обработкѣ почвы въ теченіе того же времени въ черномъ парѣ. Вывѣтриваніе почвы усиливается здѣсь еще даже весьма значительной растворяющей силой корневыхъ такихъ растеній, какъ напр. вины и овесъ, и дѣйствіемъ продуктовъ разложенія органической массы урожайныхъ остатковъ, остающихся въ почвѣ послѣ кормовой смѣси; несмотря на то, что оно въ то же время ослабляется нѣсколько тѣмъ, что почва, занятая кормовой смѣсью, терпѣтъ довольно много влаги, особенно изъ болѣе глубокихъ своихъ слоевъ, вслѣдствіе испаренія большого количества воды большою массою листьевъ отчасти шаро- колистныхъ растеній (вины). Такъ можно думать, по крайней мѣрѣ, на

основаніи одного опыта, который изъ сравненія количествъ растворимыхъ минеральныхъ веществъ, находившихся въ кнѣцѣ опыта: съ одной стороны въ почвѣ и произведенной ею растительной массѣ, съ другой — только въ почвѣ, съ количествомъ ихъ, находившихся въ почвѣ до начала опыта, позволяетъ заключить, что почва, занятая растеніями, доставляетъ гораздо больше растворимыхъ минеральныхъ веществъ, чѣмъ почва, незанятая растеніями, въ продолженіи одного и того же времени и при равенствѣ всѣхъ другихъ условій.

Въ отношеніи очищенія отъ сорныхъ травъ почва находится точно также въ наименѣе выгодныхъ условіяхъ въ зеленомъ парѣ, такъ какъ недостаточное разрыхленіе почвы, недостатокъ влаги, быстро слѣдующій одна за другой обработки, въ тому же въ болѣе сухое время года, дѣлаютъ невозможнымъ болѣе полное проростаніе сѣмянъ сорныхъ травъ, а слѣдовательно и уничтоженіе однолѣтнихъ сорныхъ травъ; хотя способствуютъ въ нѣкоторой степени истребленію многолѣтнихъ сорныхъ травъ, которыя, вслѣдствіе недостаточнаго доступа воздуха и недостатка влаги, особенно въ сухіе годы, задерживаются въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи и частью погибаютъ. Особенно же способствуетъ истребленію многолѣтнихъ сорныхъ травъ въ зеленомъ парѣ пастьба скота, преимущественно овецъ, которыя, обѣдая постоянно вновь появляющіеся побѣги, въ тому же весьма близко къ поверхности земли, ослабляютъ растенія до того, что эти послѣднія погибаютъ. При черномъ парѣ своевременныя и въ большемъ числѣ обработки способствуютъ проростанію сѣмянъ сорныхъ травъ, извлекаютъ развивающіеся изъ нихъ однолѣтнія сорныя травы, корневища и не глубоко сидящія въ землѣ корни многолѣтнихъ сорныхъ травъ и повреждаютъ отчасти послѣдніе на столько, что растенія пропадають. Занятый паръ, близкій къ черному по очищающему отъ сорныхъ травъ дѣйствию его на почву, дѣйствуетъ въ отношеніи размножающихся отъ корневищъ многолѣтнихъ сорныхъ травъ, напр. паря, главнымъ образомъ, густыми произрастаніемъ кормовой смѣси, которыми весьма полно заглушаются эти травы.

Наконецъ, удобреніе хлѣбнымъ навозомъ поля, остающагося въ зеленомъ парѣ, происходитъ слишкомъ поздно, слишкомъ близко къ посѣву, такъ что навозъ, если онъ только нѣсколько соломыстъ, не успѣваетъ хорошо подготовиться въ почвѣ ко времени посѣва и засорять почву; потому что, при недостаточности и несвоевременности обработки поля въ зеленомъ парѣ, слабо проростаютъ сѣмена сорныхъ травъ, вносимыя въ почву въ большемъ или меньшемъ количествѣ вмѣстѣ съ соломыстымъ навозомъ. При черномъ парѣ навозъ, если только позволяютъ другія хозяйственныя соображенія, можетъ быть внесенъ въ почву еще съ осени, а въ занятомъ парѣ, гдѣ и въ удобреніе поле подъ кормовую смѣсь, онъ долженъ быть внесенъ не позже самой ранней весны, слѣдовательно въ обоихъ случаяхъ вносится за долго до посѣва озимы и потому можетъ успѣть хорошо подготовиться въ почвѣ: въ черномъ парѣ — при содѣйствіи времени и соотвѣтствующей обработки, а въ занятомъ — сверхъ того, при содѣйствіи отпавшей почвы кормовой смѣси съ большою растворяющей силой корневой.

Весьма сходно съ занятымъ паромъ дѣйствуетъ паръ съ занятіемъ паромъ поля растеніемъ на зеленое удобреніе, напр. гречихой, которая высѣвается въ этомъ случаѣ также густо и запахивается въ землю въ полномъ цвѣтѣ. Различіе заключается только въ томъ, что здѣсь вся растительная масса со всѣми взятыми ею у почвы веществами возвращается почвѣ, между тѣмъ какъ растительная масса кормовой смѣси идетъ на кормъ, слѣдовательно удаляется изъ почвы все количество взятыхъ ею у почвы питательныхъ веществъ, за исключеніемъ лишь той части ихъ, которая остается почвѣ вмѣстѣ съ ужасайными остатками. Но, зато викова смѣсь воздѣлывается

обыкновенно по удобренію хлѣбнымъ навозомъ, между тѣмъ какъ гречиха на зеленое удобреніе высѣвается обыкновенно безъ удобренія хлѣбнымъ навозомъ, которое она должна замѣнять.

Полунарь съ рѣной и паровымъ растеніемъ представляютъ почти тѣ же благоприятныя условія для достиженія цѣли оставленія поля въ парѣ какъ и черный паръ; такъ какъ обработка почвы, которая начинается здѣсь съ осени и продолжается въ полунарь безпрепятственно до времени посѣва рѣны въ концѣ мая, началѣ іюня мѣсяца и потому можетъ производиться въ достаточномъ числѣ разъ и исполнѣ своевременно; при паровыхъ же растеніяхъ, правда, всего до начала весны, когда поле заливается уже паровымъ растеніемъ, но зато продолжается въ послѣднемъ случаѣ дольше, чѣмъ въ первомъ въ продолженіи занятія поля растеніемъ, въ видѣ обработки между-рѣній.

Изъ этого сравненія различныхъ видовъ пара выходитъ, что зеленый паръ долженъ быть по возможности ограниченъ, особенно на плотныхъ глинистыхъ почвахъ, въ сухомъ климатѣ, при содержаніи крупнаго, въ особенности молочнаго скота, и можетъ быть сохраненъ при болѣе благоприятныхъ условіяхъ влажности климата, на легкихъ почвахъ, при содержаніи овецъ. Но чтобы сдѣлать зеленый паръ въ послѣднемъ случаѣ болѣе производительнымъ, хорошо прирѣзать четвертый клинъ къ тремъ клинамъ трехпольнаго хозяйства, въ которомъ преимущественно удерживается зеленый паръ, если только это позволяетъ достатокъ земли, и въ такомъ случаѣ подъ яровое, изъ-подъ котораго поле оставляется въ парѣ, подсеивать нѣсколько бѣлаго клевера. Вмѣсто озимаго, яроваго и пароваго (въ зеленомъ парѣ) клиновъ будутъ: озимый, яровой (съ подсеивомъ бѣлаго клевера подъ яръ), выгонный съ бѣлымъ клеверомъ и паровой (съ зеленымъ паромъ) клины. Если же нѣтъ земли для прирѣзки четвертаго клина, то слѣдуетъ или перерѣзать поле изъ трехъ клиновъ на четыре, такъ какъ во многихъ случаяхъ половина всего поля, при улучшеніи паровой обработки и увеличеніи кормовыхъ, а слѣдовательно и удобрительныхъ средствъ занятымъ паромъ и лучшимъ выгономъ, можетъ произвести столько же зерновыхъ растеній, сколько, при дурной паровой обработкѣ и недостаткѣ кормовыхъ средствъ, производилъ прежде двѣ трети всего поля. При этомъ слѣдуетъ принять во вниманіе также, что улучшеніе обработки обезпечивается возможностью употребить теперь на обработку половины поля то же количество рабочей силы, которое употреблялось прежде на обработку двухъ третей поля. Или, слѣдуетъ пожертвовать для выгона частью луговъ, частью получаемого съ нихъ сѣна и производить вмѣстѣ этого послѣдняго нѣкоторое количество его въ парѣ; или же, наконецъ, смотря по степени, въ которой необходимо уменьшить потребность въ выгонѣ, прибѣгнуть къ болѣе или менѣе полному стойловому кормленію скота съ выгономъ этого послѣдняго на скошеніе луга, живнѣе и т. д. Съ ограниченіемъ или устраненіемъ зеленого пара, мѣсто его должны занять черный и занятый пары; первый преимущественно на сѣверѣ и югѣ, второй же въ средней Россіи, въ предѣлахъ болѣе или менѣе отходящихъ на сѣверъ и югъ. Пригодность чернаго пара для сѣвера обуславливается, главнымъ образомъ, краткостью сѣвернаго лѣта, которая можетъ дѣлать невозможнымъ получение хорошаго урожая виконой смѣси и надлежащую обработку виковаго живнѣа ко времени посѣва озимы въ концѣ іюля, не позже первыхъ чиселъ августа; кроме того живнѣе виконой смѣси можетъ представлять благоприятное условіе для размноженія ржаного червя — гусеницы бабочки (*agrotis segetum*), поѣдающей въ нашихъ сѣверныхъ губерніяхъ (костромской) всходы озимы. Но, при возможности посѣва виконой смѣси въ первыхъ числахъ мая и уборки ея въ концѣ іюня, въ самыхъ первыхъ числахъ іюля, при возможности обработки поля послѣ хороша уро-

дншейся выковой смѣси, на нѣсколько лучше разработанныхъ, болѣе легкихъ почвахъ одноорью; наконецъ, при возможности того, что оныя и неоправданы предположенія о благоприятномъ вліяніи выковой смѣси на размноженіе хлѣбнаго червя, занятый паръ съ выковой смѣсью можетъ идти значительно далѣе на сѣверъ, чѣмъ онъ встрѣчается теперь. Пригодность чернаго пара для юга обуславливается, главнымъ образомъ, тѣмъ, что онъ при всѣхъ другихъ его хорошихъ сторонахъ, лучше всѣхъ другихъ видовъ пара занасаетъ и сохраняетъ въ почвѣ влагу, необходимую для успѣшнаго перваго развитія озимы; это же особенно важно въ южной Россіи, страдающей отъ засухъ. Но, если оныя покажутъ, что выковая смѣсь, при близости грунтовой воды въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, или при достаточно глубокой вснахѣ подъ нее почвы съ осени, неспушаетъ почвы преднымъ, для развитія озимей образомъ, то занятый паръ можетъ распространиться значительно далѣе на югъ. Конечно экономическія условія могутъ сдѣлать невыгоднымъ въ данной мѣстности и всѣ три вида пара, если только климатическія и почвенныя условія невооружаются прямо противъ котораго либо изъ нихъ. Напр., въ малоземельныхъ черноземныхъ губерніяхъ, гдѣ полевая земля чрезвычайно плодородна, но мало естественныхъ луговъ и вовсе нѣтъ естественныхъ выгоновъ, гдѣ цѣнность земли очень высока, рабочія руки дешевы и гдѣ, наконецъ, возможно уже послѣ озимыхъ послѣ уборки яровыхъ растений, даже корнеплодныхъ, можетъ быть выгодно, во первыхъ сократить паровое поле съ $\frac{1}{3}$ на $\frac{1}{4}$ всего полевого пространства, съ тѣмъ, чтобы при болѣе выгодности воздѣлыванія зерновыхъ хлѣбовъ и меньшей скотоводства и при возможности получать хорошіе урожаи при удобреніи не болѣе четвертой части поля, занятъ освободившуся изъ поля пара $\frac{1}{4}$ часть всего полевого пространства много лѣтними кормовыми травами, а во вторыхъ занятъ паровое поле кормовыми растениями: кормовой смѣсью или корнеплодами, преимущественно кормовой свеклой. Вообще же, занятый в черныя пары должны помочь намъ разработать нашу одичалую почву, поднять ея дѣятельность, очистить ее отъ сорныхъ травъ и только, по мѣрѣ достиженія нами этого результата, мы можемъ оставлять паръ съ тѣмъ, чтобы занять паровое поле паровыми растениями, если бы этого требовали экономическія условія. Занятый паръ долженъ доставить намъ кормовыя средства, въ которыхъ мы такъ часто нуждаемся и который онъ, пока наши земли неочищены хорошо отъ сорныхъ травъ и неразработаны на извѣстную глубину, доставитъ вѣрнѣе, чѣмъ послѣ многотѣльныхъ кормовыхъ травъ, которыхъ введеніе должно совершаться по мѣрѣ того, какъ почва улучшается хорошей разработкой и хорошимъ удобреніемъ (послѣднимъ въ особенности на нечерноземныхъ почвахъ). Занятый паръ, оставляющийъ почву значительное количество урожайныхъ остатковъ, долженъ снабдить наши нечерноземныя почвы органическимъ веществомъ, котораго недостаетъ имъ для улучшенія ихъ физическихъ свойствъ и для усиленія ихъ дѣятельности.

Сколько бы не было въ полѣ клиновъ (смѣсь, полей стр. 224), съ различными, такъ или иначе чередующимися между собой растениями, смотря по своеобразію, каждый кливъ, по главному характеру приѣмовъ воздѣлыванія въ немъ растений, принадлежитъ къ одному изъ слѣдующихъ четырехъ типовъ: собственно *полевому*, *паровому*, *выгонному* и *луговому*. Первыхъ двухъ типовъ клины встрѣчаются почти въ каждомъ полѣ; послѣднихъ же двухъ, при достаткѣ естественныхъ въ-полсовыхъ луговъ и выгоновъ, иногда не встрѣчается. Клины полевого типа можно различить еще далѣе на

озимые, которые занимаются озимыми, высѣваемыми съ осени растениями, и *яровые*, которые занимаются яровыми растениями, высѣваемыми весной. Воздѣлываніемъ растений пароваго клина достигаются въ отношеніи поля, въ которомъ они воздѣлываются, тѣ же результаты, что и оставленіемъ поля въ пару, и тоже разрыхленіе почвы, тоже подготовленіе въ почвѣ питательныхъ веществъ и тоже очищеніе ея отъ сорныхъ травъ; потому, что наиболѣе выгодное разведеніе этихъ растений требуетъ воздѣлыванія ихъ въ такомъ разстояніи отдѣльныхъ растений одно отъ другаго, которое позволяетъ необходимую для ихъ успѣшнаго проарстанія обработку промежутковъ между ними, иначе—продолженіе во время ихъ произрастанія паровой обработки, начатой при подготовленіи поля къ занятію его этими растениями. Между тѣмъ какъ выгодное разведеніе растений полевого, а тѣмъ болѣе луговаго или выгоннаго клиновъ недопускаетъ воздѣлыванія ихъ на такомъ разстояніи отдѣльныхъ растений одного отъ другаго. Изъ помѣщенной ниже таблицы со свѣдѣніями относительно полевыхъ растений видно, что между тѣмъ какъ пространство, котораго требуетъ паровое растение для своего полнаго развитія, составляетъ отъ 10 (морковь) до 289 (рѣпа, капуста, кукуруза) кв. дюймовъ и паровыя растения воздѣлываются обыкновенно въ рядахъ съ промежутками: между рядами отъ 9 (кукуруза на зеленый кормъ) до 30 (кукуруза, кормовая свекла) и между растениями въ ряду—отъ 4 (оз. рапсъ) до 24 (подсолнечникъ) дюйм., растения полевого клина требуютъ для своего полнаго развитія пространства не болѣе 1 (ленъ на волокно)—20 (горохъ) кв. дюйм. и, если воздѣлываются въ рядахъ, то, при промежуткахъ между рядами въ 4 (хлѣбные злаки)—20 (горохъ, макъ) дюйм., помѣщаются весьма густо, безъ опредѣленнаго разстоянія или иногда только на разстояніи 4 (горохъ)—20 (китайская рѣдка) дюйм.; а растения луговаго клина, можно сказать, не могутъ быть высѣваны достаточно густо и воздѣлываются въ рядахъ лишь въ видѣ исключенія, напр. рѣдка люцерны.

Пространство, которое должно занимать каждое отдѣльное растение, зависитъ отъ природы растения, отъ цѣли, для которой оно воздѣлывается, отъ свойствъ почвы и климата. Такъ, рапсъ съ болѣе отходящими отъ стебля вѣтвями чѣмъ сурѣница, требуетъ нѣсколько большаго пространства для каждаго отдѣльнаго растения, чѣмъ послѣдняя. Ленъ, воздѣлываемый для сѣмянъ, или свекла, воздѣлываемая для корма, требуютъ большаго пространства для каждаго отдѣльнаго растения, чѣмъ ленъ, воздѣлываемый на волокно, или свекловича, воздѣлываемая для полученія изъ нея сахара. Картофель, напр., какъ и многія другія растения, долженъ быть сажаетъ на плодородной почвѣ рѣже чѣмъ на тощей. Наконецъ, въ сухомъ климатѣ яровыя должны имѣть для каждаго отдѣльнаго растения пространство меньше того, въ какомъ нуждаются они въ болѣе влажномъ климатѣ, гдѣ развиваются гораздо роскошнѣе, вслѣдствіе достатка влаги. Природа и цѣль воздѣлыванія извѣстнаго растения въ данную минуту могутъ быть одни и

тѣ же для мѣстъ, весьма различныхъ по своимъ почвеннымъ и климатическимъ условіямъ. На плодородной почвѣ, при соответств. влажномъ климатѣ, растеніе можетъ развиваться до того роскошно, переставая отвѣчать цѣли его воздѣлыванія, что потребуетъ для каждаго отдѣльнаго растенія такого пространства, такихъ промежутковъ между отдѣльными растеніями, которые позволяютъ воздѣлываніе этого растенія въ паровомъ клинѣ, сдѣлаютъ это растеніе паровымъ. Между тѣмъ, тоже растеніе на той же почвѣ, въ болѣе сухомъ климатѣ, при своемъ скудномъ развитіи, можетъ быть воздѣлываемо въ такомъ лишь разстояніи отдѣльных растеній одного отъ другаго, которое отвѣдетъ ему мѣсто въ полево́мъ клинѣ. Такъ, напр., конскіе бобы, оз. рапсъ на хорошихъ земляхъ воздѣлываются паровыми растеніями, на менѣе хорошихъ—въ полево́мъ клинѣ. Точно также, въ одномъ и томъ же мѣстѣ, растеніе, воздѣлывавшееся въ полево́мъ клинѣ, съ улучшеніемъ почвы, можетъ воздѣлываться въ паровомъ клинѣ, такъ что, по мѣрѣ улучшения почвы, число паровыхъ растеній увеличивается, прекращается необходимость собственно въ парѣ; растенія, вслѣдствіе того что земля обрабатывается во время ихъ произрастанія, могутъ слѣдовать въ полѣ быстрее одно за другимъ; культура изъ полевой переходитъ въ огородную, особенно богатую паровыми растеніями. На сколько способны наши хлѣбные злаки сдѣлаться паровыми растеніями—трудно сказать; имѣются примѣры весьма успѣшнаго и выгоднаго воздѣлыванія ихъ съ весьма значительными промежутками между отдѣльными растеніями. Но растенія лугового клина никогда не сдѣлаются паровыми, потому что густота ихъ стоянія въ полѣ обусловливается не только массой, но и качествомъ получаемого при этомъ корма; при густотѣ стоянія ихъ кормъ получается пѣжикѣ. Но, если эти растенія не имѣютъ характера паровыхъ растеній, потому что не допускаютъ обработки земли между ними во время ихъ произрастанія, то они имѣютъ отчасти характеръ паровыхъ растеній, потому что отнимаютъ почву вслѣдствіе густаго ихъ произрастанія, а это, по своему дѣйствию на почву, походитъ на обработку почвы во время произрастанія паровыхъ растеній. Конечно, между растеніями различныхъ клиновъ нѣтъ рѣзкихъ границъ; такъ, однолѣтнія кормовыя травы (швергелъ, мотаръ) и придиальныя растенія (ленъ), разводимыя густымъ посѣвомъ въ полево́мъ клинѣ, представляютъ много сходнаго съ растеніями лугового клина, и первая изъ нихъ ирѣдко разводится въ занятѣмъ парѣ (ника съ овсомъ, гречиха).

Изъ предыдущаго слѣдуетъ, что время, повтореніе и послѣдовательность примѣненія различныхъ обработокъ будутъ различны, смотря потому, занимаетъ ли послѣдующее растеніе мѣсто предыдущаго а) непосредственно или б) по предварительномъ оставленіи поля въ парѣ. Мы рассмотримъ здѣсь обработку земли т. е. порядокъ слѣдованія взмета, двоевія, мѣшанія, навозной и посѣвной вспашекъ (стр. 461—462) въ обоихъ этихъ случаяхъ а) и б) отдѣльно, принимая во вниманіе большую или меньшую плотность и большую или меньшую засоренность почвы тѣми или другими сорными травами и удобряется ли почва хлѣбнымъ навозомъ или нѣтъ?

а) Обработка земли при непосредственномъ слѣдованіи изъ поля однихъ растеній за другими.

Растеніе, сходящее съ поля, оставляетъ въ почвѣ большее или меньшее количество урожайныхъ остатковъ; въ этомъ отношеніи

между полевыми растеніями можно различить: 1, растенія оставляющія почвѣ чрезвычайно незначительное количество остатковъ, можно сказать почти ничего ей неоставляющія; сюда принадлежатъ растенія, убираемыя выкапываніемъ (корнеплодные—свекла, морковь, рѣпа и клубненосныя растенія—картофель) и выдергиваніемъ (ленъ, конопля); 2, растенія, оставляющія почвѣ значительное количество урожайныхъ остатковъ, которые, однако, мало сплываютъ почву, растенія оставляющія то, что называютъ *жизнью*; сюда принадлежатъ озимыя и яровыя зерновые растенія (хлѣбные злаки, бобовыя растенія, масличныя растенія), равно какъ и однолѣтнія кормовыя травы (вика съ овсомъ); 3) растенія, оставляющія почвѣ большое количество урожайныхъ остатковъ, которые къ тому же сплываютъ болѣе или менѣе почву, въ зависимости отъ числа лѣтъ, которое они занимаютъ поле,—тѣмъ болѣе, чѣмъ долѣе занимаютъ его; сюда принадлежатъ многолѣтнія кормовыя травы (бобовыя—люцерна, клеверъ, преимущественно же злаковыя—тимотея трава, райграсы, *) которые оставляютъ почву, какъ говорятъ, болѣе или менѣе *задернутаю*.

Изъ-подъ растеній почти неоставляющихъ почвѣ урожайныхъ остатковъ почва выходитъ оплотнѣвшей болѣе или менѣе на большую или меньшую глубину, въ зависимости отъ болѣе или менѣе сухой погоды во время ихъ произрастанія и въ зависимости оттого, какъ велики были промежутки между отдѣльными растеніями, какъ полно растеніе укрывало почву по своей природѣ и своей урожайности и выкапывалось ли оно или выдергивалось и какъ выкапывалось. Чѣмъ болѣе были промежутки, чѣмъ менѣе укрывало растеніе почву, вслѣдствіе ли своихъ природныхъ свойствъ или дурнаго урожая, тѣмъ плотнѣе выходитъ почва изъ-подъ растенія, выдергивавшагося къ тому же а не выкапывавшагося многократной перепашкой. Во всякомъ случаѣ почва выходитъ изъ-подъ этихъ растеній сравнительно очень рыхлой, особенно рыхлой въ томъ случаѣ, если она подъ эти растенія, какъ это часто бываетъ (въ особенности съ корнеплодными), была непосредственно удобрена хлѣбнымъ навозомъ. По этой же послѣдней причинѣ почва изъ-подъ этихъ растеній остается па столько еще плодородной, что почти никогда не удобряется подъ послѣдующія растенія; она остается, наконецъ, чистой отъ сорныхъ травъ, потому что эти послѣднія истребляются здѣсь или обработкой промежутковъ между этими растеніями во время ихъ произрастанія или полостью или отѣненіемъ самихъ растеній; коротко, почва выходитъ изъ-подъ этихъ

*) Условія близкія къ условіямъ, представляемымъ болѣе или менѣе старой залежью (перелогомъ, цѣдной, степью).

растений на столько готовой къ посѣву, что если неудобриется подъ-послѣдующее растение хлѣвнымъ навозомъ, то требуетъ лишь порыхления, въ зависимости оттого, на сколько она уплотнилась и въ какой степени рыхлой почвы требуетъ послѣдующее озимое или яровое растение. Поэтому, рожь высѣвается иногда въ ту же осень послѣ картофеля, свекловицы, а овесъ въ слѣдующую весну послѣ картофеля по предварительномъ лишь проборонованіи почвы, въ послѣднемъ случаѣ уже весной. Большее уплотненіе почвы можетъ потребовать предварительнаго порыхления почвы эктирираторомъ (рис. 54, 55 и 56) вскорѣ послѣ уборки этихъ растений подъ озимыя и весной — подъ яровыя растения; такъ, иногда изъ-подъ конопля, льна, подъ которыхъ земля готовится большей частью хорошо и которые хорошо сохраняютъ почвѣ найденную ими рыхлость почвы на значительной глубинѣ, или изъ-подъ корнеплодныхъ и картофеля на уплотнившихся лишь поверхностно, болѣе легкихъ, разсыпчатыхъ но не мелкозернистыхъ почвахъ (ячмень послѣ картофеля). Но если бы на весьма хорошо разрыхленныхъ почвахъ обработка эктирираторомъ представляла опасность припеденія почвы въ пылеобразное состояніе, то лучше замѣнить ее вспашкой плугомъ съ неслишкомъ рыхляющимъ отваломъ (рис. 49). При болѣе глубокомъ уплотненіи почвы, какое встрѣчается даже послѣ картофеля, къ тому же на известной глубинѣ, несмотря на рыхлость почвы съ поверхности, необходимо перепашать поле плугомъ на полную глубину уплотненія: подъ озимыя точно такъ послѣ уборки предшествующаго растения, подъ яровыя, хотя и позже, но все же еще съ осени, чтобы дать почвѣ возможность запасть за зиму влагой на большой глубинѣ, что особенно важно въ сухомъ климатѣ; иначе, растения могутъ страдать отъ недостатка влаги, какъ это часто бываетъ съ озимыми (рожьей) послѣ картофеля. Для такого порыхления почвы подъ озимыя растения, въ случаѣ большей его глубины, лучше взять плугъ съ менѣе рыхляющимъ, болѣе обрабатывающимъ отваломъ (рис. 22, 27 или 32), чтобы, при невозможности, по недостатку времени, оградить осадка почвы до посѣва, неспустить слишкомъ земли, а по крайней мѣрѣ вывернуть наверхъ уплотненный нижній слой, который, затѣмъ, помощью катка и бороны, въ случаѣ же надобности даже эктириатора (груббера), можетъ быть вполне удовлетворительно подготовленъ къ засѣву озимью. Для порыхления же почвы подъ яровыя (съ осени), можно взять плугъ съ болѣе рыхляющимъ отваломъ (рис. 34 и 49). Такимъ порыхлениемъ съ осени довольствуется, напр., овесъ послѣ кукурузы или конскихъ бобовъ; ячмень же, напр. послѣ рпы, требуетъ сверхъ того еще весенней обработки эктирираторомъ. Вообще же, на сколько хороша можетъ быть плужная вспашка съ осени, открывающая водѣ доступъ въ почву

на большую глубину, на столько слѣдуетъ, въ особенности въ сухомъ климатѣ, прибѣгать ей весной и въ случаѣ надобности весенняго порыхления почвы, замѣнять ее обработкой эктирираторомъ, которая лучше сохраняетъ въ почвѣ влагу чѣмъ плужная вспашка (стр. 474). Въ предупрежденіе образования коры на поверхности почвы весной, весьма важно бороновать или обработать почву, вспаханную съ осени, тяжелой волокушей (рис. 68 и 69) весной, пока еще почва несомнѣнно отвердѣла; въ случаѣ же упущенія этого благопріятнаго момента и отвердѣнія почвы, необходимо, для уничтоженія образовавшейся уже коры, прибѣгнуть къ тяжелому рубчатому катку (рис. 75), послѣ котораго почва рыхлится уже довольно хорошо эктирираторомъ. Поле изъ-подъ свеклы, рпы и картофеля лучше всего пахать и обрабатывать эктирираторомъ (грубберомъ) поперегъ рядовъ или нискося къ нимъ, по диагонали.

Вообще, для приготовленія къ посѣву почвы, достаточно разрыхленной при мѣшаніи, необходимо только дать ей осѣсть и выравнять ее бороной или, если она болѣе легкихъ свойствъ, каткомъ. Когокъ можетъ быть употребленъ во всякомъ случаѣ, чтобы сдвинуть почву, способствовать ея осадкѣ. Всякая дальнѣйшая обработка почвы не только излишня, но даже чрезвычайно вредна. Иное дѣло, если почва послѣ мѣшанія (стр. 461) снова уплотнится дождями, что тѣмъ возможно, чѣмъ долѣе промежутокъ времени между мѣшаніемъ и посѣвомъ. Въ такомъ случаѣ, смотря по глубинѣ уплотненія и состоянію рыхлости и влажности почвы, необходимо прибѣгнуть къ боронованію или обработкѣ эктирираторомъ съ различно удаленными одна отъ другой лапами (стр. 473) или даже къ переносимъ легкимъ, слегка только рыхляющимъ, лучше всего дву- или трехкорпуснымъ плугомъ (рис. 47, 48 и 49).*) Очень плотная почва можетъ потребовать примѣненія катка (глубокобрана) и груббера, которыми почва разрыхляется лучше чѣмъ плужными вспашками. Плужная же вспашка можетъ понадобиться и быть умѣстной здѣсь въ томъ случаѣ, если почва, вслѣдствіе дождей, уплотнѣетъ на большую глубину, такъ что грубберомъ нельзя достаточно разрыхлить ее.

Изъ-подъ растений оставляющихъ живые — почва остается болѣе или менѣе рыхлой въ зависимости оттого, занимали ли эти растения поле непосредственно удобренное хлѣвнымъ навозомъ или вышедшее изъ-подъ многолѣтнихъ травъ, или же они занимали болѣе или менѣе давно неудобреннаго поле или болѣе или менѣе давно бывшее подъ многолѣтними травами; оставляютъ ли они большее или меньшее количество урожайныхъ остатковъ, содержащихъ

*) Въ дополненіе къ приведенному на стр. 291 относительно трехкорпусныхъ плуговъ Рансена (рис. 47) и братьевъ Эбергартъ (рис. 48) замѣтимъ, что послѣдній плугъ имѣетъ отвалы болѣе обрабатывающіе чѣмъ прешающіе землю, первый на оборотъ; — что у послѣдняго положеніе рамы слишкомъ низко, а потому онъ легко забивается живыми при нѣскольکو болѣе глубокой перепаши (на 3 — 3½ вершка); — что имѣетъ корпусовъ изъ земли у первого удобнаго, чѣмъ у послѣдняго, и что, наконецъ, переднее направляющее колесо у первого, которое должно идти всегда въ бороздѣ послѣдняго прохода съ плугомъ, даетъ этому плугу сравнительно съ плугомъ бр. Эбергартъ болѣе вѣрный ходъ.

большее или меньшее количество азота; какъ сильно отбѣняли они почву во время своего произрастанія. Кормовая смѣсь (сика съ овсомъ), заключающая въ себѣ бобовое растеніе—вику, воздѣлывающаяся большей частью по удобренію хлѣвнымъ навозомъ, рѣдко же и послѣ многолѣтнихъ травъ*), и убираемая до образования ея сѣмянъ, при хорошемъ урожаѣ ея, отбѣняетъ почву превосходно во время своего произрастанія и оставляетъ почву значительную массу урожайныхъ остатковъ, довольно богатыхъ содержаніемъ бѣлковыхъ веществъ (азота), а потому оставляетъ почву въ болѣе рыхломъ и легко рыхлящемся состояніи, чѣмъ всѣ другія растенія этой группы. Наихуже же дѣлаютъ это изъ растений этой группы хлѣбные злаки.

Изъ-подъ растений этой группы, сходящихъ съ поля, начиная съ ранняго лѣта (вики съ овсомъ) до ранней осени (напр. овса у насъ), поле можетъ поступать или подъ *яровыя растенія*, высѣваемые только еще слѣдующей весной, какъ это иначе бываетъ у насъ; или подъ яровыя же растенія, которыя высѣваются (поздно) и убираются еще въ томъ же году—это такъ называемыя *позднотравныя растенія* напр. рѣпа, рапсъ, шпигель, высѣваемые послѣ рано сходящихъ съ поля озимыхъ ячменя и ржи, или подъ *озимыя растенія*, напр. изъ-подъ виковой смѣси.

Обработка живыхъ подъ слѣдующее растеніе можетъ ограничиваться въ пѣкоторыхъ случаяхъ *одной* обработкой эстирпаторомъ или плугомъ съ рыхлящимъ отваломъ или плугомъ съ дернорѣзомъ. Эстирпаторъ (грубберъ рис. 54, 55 и 56) рыхлитъ или раздираетъ верхній уплотнившійся или только связанный корнями слой почвы и выдираетъ живые изъ почвы; послѣ этого поле, если только имѣется въ виду скоро засѣять его, боронуется, чтобы собрать живые**). Такъ можетъ быть обработана почва болѣе легкая, средней плотности и даже болѣе плотная, но хорошо разработанная почва, если она вышла изъ-подъ предидущаго растенія довольно рыхлой и чистой отъ сорныхъ травъ; напр., хорошо разрыхленная большей частью почва изъ-подъ масличныхъ растений, кукурузы, рапса, которыя воздѣлываются обыкновенно непосредственно по удобренію хлѣвнымъ навозомъ; при этомъ выдранное грубберомъ и собранное борой толстостебельное живое этихъ растений удаляется съ поля. Такъ можетъ быть обработано поле изъ-подъ кормо-

*) особенно, если эти послѣдніе оставляютъ въ почвѣ много корневищъ (напр. тимовая трава), которыя могутъ давать отростки и засорять слѣдующія зерновыя растенія; кормовая же сѣмя своимъ густымъ ростомъ заглушаетъ эти отростки.

**) Это приближается къ употребительному у насъ изводу посѣву (примущественно ржи) *наволокомъ*.

вой смѣси, если только это послѣднее не было посѣяно прямо по невозможной вспашкѣ; почва такого поля до того даже рыхла, что можетъ свести только мелкую обработку эстирпаторомъ съ плоскими лапами или лущеніе па глубину $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ дюйм. помощію лущильника (рис. 51 и 52). Но, въ большей части случаевъ такая обработка, замѣняющая собой отчасти взметъ, недостаточна, потому что неподготовленная почва на столько хорошо, чтобы можно было удовлетворительно задѣлать сѣмена, а потому оправдывается лишь спѣшностью, съ которой долженъ быть произведенъ посѣвъ слѣдующаго, большей частью позднеяроваго растенія, рѣдко примѣняемаго подъ озимыя и никогда непримѣняемаго подъ яровыя. Лучше обрабатывается живые плугомъ съ рыхлящимъ отваломъ (рис. 34 и 39), если почва болѣе рыхла и не очень связана корнями, какъ напр. послѣ конскихъ бобовъ или кормовой смѣси по навозной вспашкѣ. Наконецъ, если бы, почва, при нѣсколько меньшей даже рыхлости, чѣмъ въ предыдущемъ случаѣ, была болѣе связана корнями, слѣдуетъ предпочесть перепашку живыхъ плугомъ съ дернорѣзомъ (рис. 23 и 24 меньш. разм.); но чтобы при такой перепашкѣ хорошо рыхлилась земля и хорошо прикрывалось живое, дернорѣзъ какъ и самый плугъ должны имѣть довольно крутые отвалы и при этомъ дернорѣзъ долженъ идти въ землю глубже чѣмъ на $2\frac{1}{2}$ дюйм., а плугъ, при обработкѣ нѣсколько болѣе плотной почвы, долженъ имѣть рѣзецъ. Конечно, перепашка живыхъ плугомъ съ дернорѣзомъ можетъ быть замѣнена двумя обработками: обработкой эстирпаторомъ, который, выдирая живые и раздирая верхній слой почвы, связанный корнями, облегчаетъ прикрытие живыхъ при слѣдующей обработкѣ плугомъ съ болѣе оборачивающимъ, менѣе крошащимъ отваломъ; но такая двойная обработка стоитъ дороже обработки плугомъ съ дернорѣзомъ, а между тѣмъ рыхлится земля хуже, чѣмъ послѣдняя. Перепашка живыхъ какъ плугомъ съ рыхлящимъ отваломъ, такъ и плугомъ съ дернорѣзомъ замѣняетъ собой отчасти взметъ, насколько при ней запахивается въ землю живые, отчасти и мѣшаніе, на сколько земля рыхлится при этомъ; она особенно пригодна для приготовленія поля подъ спѣшный посѣвъ позднеяровыхъ растений, тѣмъ болѣе что эти послѣдніе большей частью воздѣлываются послѣ раносходящихъ озимыхъ хлѣбовъ, которые занимая обыкновенно если не непосредственно подъ нихъ, то во всякомъ случаѣ не такъ давно удобренное хлѣвнымъ навозомъ поле, оставляютъ это послѣднее въ довольно благоприятныхъ условіяхъ рыхлости почвы. Она же можетъ служить и для приготовленія поля подъ посѣвъ озимыхъ и даже, хотя болѣе рѣдко, яровыхъ растений будущаго года.

Приготовленіе живыхъ подъ слѣдующее растеніе *двукратной* обработкой (взметомъ и мѣшаніемъ) становится необходимымъ если

почва изъ-подъ предшествующаго растенія выходитъ нѣсколько отвердѣвшей и засоренной, такъ напр. хоть бы изъ-подъ приведенныхъ выше масляныхъ растеній, майса, рапса, въ случаѣ дурнаго ихъ урожая. При двукратной обработкѣ живья первая обработка можетъ заключаться: или въ собственно мелкомъ взметѣ на глубину 1—1½ верш. плугомъ хорошо оборачивающимъ пласть (рис. 19, 27 и 32), или въ замѣняющихъ взметъ: мелкой вспашкѣ въ балки (стр. 442) помощью хорошо оборачивающаго пласть плуга (рис. 19 и 32), при чемъ подрѣзается пласть нѣсколько шире остающейся неподрѣзанною полосы, для того чтобы первый возможно полно перекрывала послѣднюю, или мелкой обработкѣ эктиризаторомъ, или, наконецъ, лущеніемъ помощью лущильнаго плуга (рис. 51 и 52). Эта первая вспашка имѣетъ цѣлю открыть почву доступъ воздуха, способствовать замиранію и разложенію живья а также корней и корневищъ многолѣтнихъ сорныхъ травъ и проростанію однолѣтнихъ сорныхъ травъ. Мелкая вспашка живья (взметъ) обыкновеннымъ плугомъ, хотя и можетъ достигать этихъ цѣлей, но требуетъ устойчиваго плуга *) и сравнительно много времени. Мелкая вспашка въ балки дѣйствуетъ слабѣе, потому что при ней остается часть живья неподрѣзанной вовсе; хотя это и устранимо повтореніемъ вспашки въ балки, при чемъ во второй разъ подрѣзаются оставшіяся неподрѣзанными при первой вспашкѣ полосы и вновь подрѣзанные пласты съ опрокинутыми на нихъ прежде подрѣзанными опрокидываются въ бывшія мѣста послѣднихъ; но это увеличиваетъ работу и затягиваетъ обработку, что не всегда удобно. Обработка эктиризаторомъ, если только этотъ послѣдній будетъ имѣть плоскія рѣжущія лапы, можетъ быть вполнѣ удовлетворительной во всѣхъ отношеніяхъ. Но, когда поле засорено многолѣтними сорными травами, въ особенности пыреемъ, тогда обработку эктиризаторомъ съ плоскими рѣжущими лапами превосходитъ лущеніе, потому что при немъ не только хорошо подрѣзываются корни и корневища многолѣтнихъ сорныхъ травъ, но и дѣйствіемъ крутыхъ отваловъ лущильнаго плуга (рис. 51) срѣзанныя части настолько освобождаются отъ земли, что весьма скоро замираютъ. Но, успѣхъ лущенія требуетъ 1, чтобы корпуса лущильнаго плуга имѣли небольшую рѣжущую ширину и крутые отвалы и находились въ такомъ разстояніи одинъ отъ другаго и въ такомъ положеніи одинъ относительно другаго, чтобы промежутки между ними забывались растительными остатками; 2, чтобы лущильный плугъ не срѣзалъ пласта толще 2½, лучше же 1—1½ дюйм., и шире 9 дюйм. (3 дюйм.

*) Для этого, поэтому, очень удобны дву- (рис. 46) или даже трехкорпусные плуги.

на каждый корпусъ), потому что иначе нельзя достигнуть скорого и полного очищенія поля отъ пырея и чрезвычайно затрудняется дальнейшая обработка поля. Но, лущеніе невозможно на сколько нибудь плотной или сильно оплотнѣвшей почвѣ.

Затѣмъ, вторая обработка состоитъ въ мѣшаніи—перепашкѣ на большую глубину плугомъ съ крошащимъ отваломъ (рис. 34, 47 и 49), а если урожайные остатки были довольно обильны и хорошо еще разложились во времени второй вспашки, между тѣмъ какъ явилось много сорной травы, то лучше плугомъ съ дернорѣзомъ (рис. 23 и 24 только меньш. размѣр.).

Къ мѣшанію приступаютъ собственно тогда, когда достаточно перепашутъ въ почву растительные остатки (живые, хлѣвной навозъ и т. д.), слѣдовательно черезъ 4 инаго 5 и 6 недѣль послѣ первой вспашки (взмета) или заправки хлѣвнаго навоза. Почва вымѣшивается лучше всего плугомъ съ рыхлящимъ отваломъ (рис. 34), на полную глубину и узкими пластами, для того чтобы лучше искрошить плотную, но разрыхленную землю. При этомъ особенно важно, чтобы почва вымѣшивалась въ надлежащемъ состояніи влажности ея; при большей сухости болѣе плотная почва крошится неин влажностью ея; при большей сухости болѣе плотная почва крошится недостаточно хорошо, а менѣе плотная, хорошо разрыхленная частію крошится неравномѣрно, частію переводится въ пылеобразное состояніе. Въ послѣднемъ случаѣ можно предупредить отчасти исцѣпленіе почвы увеличеніемъ ширины пласта при вспашкѣ, хотя отъ этого становится еще менѣе равномернымъ искрошеніе почвы и почва вымѣшивается дурно; а потому, въ случаѣ невозможности другаго пріема, слѣдуетъ уменьшить дурныя послѣдствія его укатываніемъ. Если рыхлая почва слишкомъ влажна, а между тѣмъ время поспѣва невозможно откладывать мѣшанія въ ожиданіи надлежащей просушки ея, то необходимо вымѣшивать почву возможно узкими пластами, чтобы новозможности искрошить ее. Когда же она просохнетъ и будетъ еще время, тогда можно помощью эктиризатора исправить еще нѣсколько предыдущее мѣшаніе и докончить обработку почвы укатываніемъ, или же ограничиться однимъ укатываніемъ, если бы обработка эктиризаторомъ могла представить опасность исцѣпленія почвы. На тяжелыхъ, дурно разработанныхъ почвахъ, мѣшаніе, какъ вторая вспашка, слѣдующая за взметомъ или заправкой навоза, не приводитъ еще почвы въ надлежащее состояніе. Здѣсь необходимо затѣмъ еще обработка глыбодробомъ (рис. 76) или, за неимѣніемъ его, тяжелымъ гладкимъ каткомъ тяжелыми волокушами (рис. 69), грубберомъ и бороной. Такая плотная почва, тотчасъ же послѣ мѣшанія ихъ плугомъ съ менѣе крошащимъ отваломъ для рыхлыхъ почвъ, нѣсколько обрабатывающимъ пласть отваломъ (рис. 22, 27 и 32) инаго (если бы нельзя было употребить плуга съ болѣе крошащимъ отваломъ), прикатываются и оставляются затѣмъ нѣсколько въ покоѣ, чтобы дать возможность недостаточно разложившимся еще растительнымъ остаткамъ разложиться далѣе. Если для прикатыванія былъ употребленъ глыбодробъ, то весьма хорошо прикатывать почву вслѣдъ за этимъ гладкимъ каткомъ, чтобы новозможности выровнять поверхность и вдавить въ землю оставленные червями на поверхности земли комья и черезъ то облегчить дальнѣйшее искрошеніе послѣднихъ. За каткомъ, черезъ нѣкоторое время, слѣдуетъ грубберъ, а за грубберомъ борова. Въ случаѣ особенной вязкости почвы, можетъ быть необходимо повторить нѣсколько разъ укатываніе и обработку грубберомъ, причемъ каждому укатыванію и каждой грубберной обработкѣ предшествуетъ боронованіе. Вся эта

работа значительно облегчается, если тяжелая почва, предварительно удобрения хлѣбнымъ навозомъ, была вспахана болѣе глубоко (см. ниже).

Двукратная обработка применяется большей частью при приготовленіи поля подъ озимыя, но нерѣдко также и подъ яровыя растенія будущаго года.

Наконецъ *троекратная* обработка (взметъ, двоеіе и жѣсаніе) живыя применяется на почвахъ плотныхъ, глинистыхъ, дурно разработанныхъ, сырыхъ, преимущественно при приготовленіи поля подъ яровыя посѣвы будущаго года, когда почва, разработанная съ осени, утрачиваетъ за зиму отчасти результаты осенней обработки и требуетъ весной новой обработки. При этомъ въ первый разъ живые обрабатываются грубберомъ (вмѣсто взмета), во второй (иногда двоеіе) и третій разъ (жѣсаніе) плугомъ: во второй—глубже, рѣже мельче, чѣмъ въ третій разъ, плугомъ оборачивающимъ пластъ (рис. 19, 27 и 32), въ третій—на такую же глубину или мельче, рѣже, глубже, чѣмъ во второй, плугомъ съ болѣе крошачиымъ отваломъ (рис. 33 и 34). Впрочемъ, почвы очень одичавшія, сильно запорѣвшія, плотныя и сырыя полезно бываетъ пахать въ первый разъ (вторая обработка), подъ зиму, въ высокие гребни. Такъ напр., для очищенія почвы отъ пырея оказывается весьма дѣйствительнымъ средствомъ вспашка подъ зиму предварительно лущеннаго и выбороннаго поля въ узкіе, двупластовые свалы (балки, гребни) такъ, чтобы одинъ пластъ переворачивалъ другой на подобіе того, какъ это бываетъ при сваливаніи первыхъ пластовъ загоннаго гребня. Пырей несноситъ, какъ извѣстно, свѣта и воздуха и большей частью скоро замираетъ и согниваетъ въ почвѣ, разрыхленной морозомъ и переходами отъ тепла къ холоду и отъ сырости къ сухости. Весной гребни, когда они достаточно просухнутъ, но прежде нежели зазеленѣютъ, разбираются весьма сильно и затѣмъ обрабатываются поперегъ эстирпаторомъ, или же перепашиваются плугомъ подъ посѣвъ. Иногда, при болѣе глубокой вспашкѣ плугомъ (вторая обработка) подъ зиму, третья обработка, весной, производится снова грубберомъ а не плугомъ, для лучшаго сохраненія влаги въ почвѣ (стр. 474). Если бы же, послѣдствіе болѣе глубокаго уплотненія за зиму почвы, вспаханной уже разъ плугомъ съ осени, весной понадобилась новая вспашка съ плугомъ, то эта послѣдняя, въ видѣхъ лучшаго сохраненія почвенной влаги, дѣлается неглубокой, и во всякомъ случаѣ неглубже осенней, для того чтобы невывернуть слоя, засореннаго семенами однолѣтнихъ сорныхъ травъ, могущихъ сдѣлаться чрезвычайно обременительными для колосовыхъ хлѣбовъ и мѣше, конечно, для корнеплодовъ, которыхъ междурадія обрабатываются во время произрастанія.

Обработка живыя должна начинаться тѣмъ скорѣе, чѣмъ скорѣе

должно быть занято поле посѣвными растеніемъ; скорѣе всего, следовательно, подъ пожнивныя растенія, затѣмъ подъ озимыя и позже всего подъ яровыя будущаго года. Но, если почва изъ-подъ предыдущаго растенія вышла рыхлой, то необходима во всякомъ случаѣ немедленная обработка живыя, чтобы не дать почвѣ снова уплотниться; если же она вышла болѣе плотной, то при слѣдованіи въ поле яроваго будущаго года, можетъ быть безразлично произвести первую обработку живыя нѣсколько ранѣе или нѣсколько позже, первую обработку живыя неосталась на зиму совершенно яетрутой и нелишь бы почва неосталась вѣ зиму поставлена въ невозможность завестись за зиму влагой на нѣкоторой глубинѣ. Впрочемъ, еще важнѣе въ этомъ отношеніи, чтобы на зиму была произведена, по возможности, плужная, болѣе глубокая (на 4—5 верш. въ нашихъ степныхъ, страдающихъ отъ засухи мѣстностяхъ) вспашка (вторая, если двѣ или три обработки и первая если всего одна обработка), такъ какъ она даетъ возможность почвѣ еще лучше завестись влагой. Вторая обработка (первая плужная вспашка) должна слѣдовать за первой по возможности не раньше того, какъ подъ влияніемъ кислорода, влажности и теплоты перепрѣютъ въ достаточной степени корни живыя, такъ что почва въ состояніи хорошо рыхлиться; это наступаетъ позже всего у живыя хлѣбныхъ злаковъ, скорѣе у живыя бобовыхъ растеній и еще скорѣе у живыя кормовой смѣси. Но, въ тоже время, если почва готовится подъ озимыя посѣвы, вторая вспашка должна быть произведена на столько ранѣе посѣва, чтобы земля могла еще осѣсть достаточно ко времени посѣва; для пожнивныхъ растеній, каковы: кормовая смѣсь, рѣпа, гречиха это неважно—они могутъ довольствоваться предварительно укатанной почвой; при приготовленіи же поля подъ яровыя будущаго года, плужной вспашкой можно не торопиться: она можетъ быть произведена даже весной, хотя лучше произвести ее съ осени.

Послѣ первой обработки почвы эстирпаторомъ и лущильникомъ или взмета плугомъ или вспашки въ балки, почва обыкновенно боронуется, съ цѣлю освободить еще полѣе подрѣзанныя растительныя части отъ земли и тѣмъ ускорить ихъ засыханіе, или же выдернуть взшедшія однолѣтнія сорныя травы, или лишить зеленыхъ частей отрастающія многолѣтнія сорныя травы (пырей), или же, наконецъ, порыхлить уплотняющую поверхность почвы, которая должна всегда оставаться открытой для болѣе скорого разложенія остающихся въ землѣ корней. На почвахъ болѣе тяжелыхъ дурно разработанныхъ, приходится между указанными обработками прибѣгать, смотря по обстоятельствамъ, къ катку, эстирпатору и боровъ для измельченія комьевъ, открытія почвы дѣйствию воздуха, извлеченія сорныхъ травъ и т. д.

Особенно усиленныхъ работъ требуетъ въ промежутокъ времени между лушениемъ и плужной вспашкой почва, засоренная пыреемъ. Въ этомъ случаѣ подрѣзанный лушительнымъ пласты сильно боронуется, чтобы освободить отъ земли подрѣзанныя верхушки и извлеченныя лушительнымъ и бороной болѣе крупныя части пырейныхъ растений, которыя, вслѣдствіе этого засыхаютъ и замираютъ, а оставшіяся въ землѣ пырейныя части обыкновенно отрастаютъ весьма слабо и только въ рѣдкихъ случаяхъ болѣе спѣло. Если бы же черезъ недѣлю, двѣ появились вновь зеленые листики пырея, то необходимо тотчасъ же пробороновать поле еще разѣ, чтобы оборвать нѣжные листики и засыпать ихъ землей или, покрайней мѣрѣ, ослабить ихъ ростъ. такъ какъ весьма важно имѣть отъ 3 до 4 недѣль времени до вспашки плугомъ для болѣе вѣрнаго задушенія пырея. При появлении лишь нѣсколькихъ отростковъ, безъ чего, конечно, никогда не обходится, можно приступить къ слѣдующей вспашкѣ, при которой можетъ быть даже заложена навозъ; но, при этомъ необходимо лишь до вспашки очистить отъ пырея мѣста, по которымъ должны въслѣдствіе пройти водосточныя борозды, а во время вспашки, при которой засохшія пырей запахищаются вмѣстѣ съ навозомъ, собирать (для этого достаточно ребенка за каждымъ плугомъ) еще живущій пырей и спосить его на обочины, для удаленія его въслѣдствіемъ совѣтъ съ поля. Если же пырей отрастаетъ очень сильно, то до вспашки и прежде нежели онъ окончательно осилитъ поле, слѣдуетъ выгнать на поле овецъ, которыя опшиваютъ концы листьевъ, а затѣмъ тотчасъ же обработать его эстирпаторомъ по диагонали. Если при лушеніи и послѣдующемъ боронованіи вадергалось бы слишкомъ много пырея, тогда только тогда необходимы бываютъ согребаніе и свозка пырея до обработки эстирпаторомъ, который иначе забивался бы сильно пыреемъ между лапами. Эстирпаторъ, входя въ землю на 2 — 3 дюйма, большей частью вытаскиваетъ остальные корневища пырея, такъ что не приходится болѣе повторять этой обработки. Пырей же, вытаскиваемый вновь при боронованіи, слѣдующемъ за обработкой эстирпаторомъ, совершенно замираетъ, такъ что вслѣдъ за боронованіемъ можно приступить къ перенашивъ поля плугомъ; засохшія пырей загребается при этомъ въ борозды, а находящійся въ бороздахъ еще живымъ, собирается дѣтьми и бросается на вспаханную землю, гдѣ онъ, если наступитъ нѣсколько дней сухой погоды, засыхаетъ на солнцѣ и вѣтрѣ для въ два. Только въ исключительныхъ случаяхъ бываетъ необходимо повтореніе лушенія и обработки эстирпаторомъ, которыя производятся въ такомъ случаѣ въ противоположномъ предыдущему направленіи. Такимъ образомъ послѣ одного или двухъ боронованій или послѣ боронованія, эстирпирования и боронованія производится вспашка плугомъ.

Изъ-подъ многолѣтнихъ кормовыхъ травъ почва выходитъ болѣе или менѣе рыхлой, болѣе или менѣе оплотнѣвшей, болѣе или менѣе связанной корнями и болѣе или менѣе засоренной сорными травами, смотря потому бобовыя это или злаковыя травы, какое число лѣтъ они произрастали на томъ же мѣстѣ и хорошо или дурно они произрастали; поэтому, приготовленіе выходящаго изъ-подъ нихъ поля подъ послѣдующія растенія, озимыя или яровыя, можетъ потребовать одно-, двух-, трех- и болѣе кратной обработки почвы (стр. 359).

Однократная обработка почвы (взметъ) — приготовленіе однопорья поля изъ-подъ многолѣтнихъ травъ возможно при посѣвѣ пре-

имущественно яровыхъ растеній (овса, пшеницы, проса, льна) по пласту. Въ такомъ случаѣ взметъ поля производится на глубину не менѣе $2\frac{1}{2}$ — 3 вершк. плугомъ хорошо обрабатывающимъ довольно широкіе пласты (рис. 19, 20, 21, 22, 27 и 32), которые возможно полно перекрываютъ другъ друга, оставляя между своими гребнями возможно мелкія борозды. Однако, на нѣсколько плотной, болѣе задержившей землѣ, при употребленіи даже самаго лучшаго плуга, трудно достигнуть такого правильнаго обрабатыванія пластовъ и плотнаго прилеганія ихъ одного къ другому, чтобы корневища травъ не дали отростковъ при влажной погодѣ; даже при хорошемъ перекрытіи пластовъ одного другимъ, при плотномъ ихъ прилеганіи другъ къ другу, верхнія отрѣзанныя части корневищъ, заключенныя въ толстые спаянные пласты, находятся въ весьма благоприятныхъ условіяхъ для отращиванія; мелко же вспахать не возможно, потому что не достанетъ земли для прикрытія сѣмянъ, посѣянныхъ по пласту. На болѣе легкихъ, мало-задерживающихъ почвахъ однократная вспашка можетъ дать лучшіе результаты, потому что здѣсь для вспашки можно употребить плугъ съ дернорѣзомъ и, слѣдовательно, произвести вспашку болѣе узкими пластами, при которой дернорѣзъ укладываетъ дернину на дно борозды, а плугъ засыпаетъ ее довольно глубоко рыхлой землей; такъ что при послѣдующемъ затѣмъ боронованіи борона вовсе не достаетъ дернины. Такая обработка годится и подъ посѣвъ озимой.

Затѣмъ въ большей части случаевъ потребуются *двукратная обработка* (взметъ и мѣшаніе) почвы изъ-подъ многолѣтнихъ травъ; причѣмъ первая обработка можетъ быть взметъ плугомъ на глубину $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ дюйм; или вспашка въ балки на глубину $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ дюйм; или лушеніе на глубину $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$, при ширинѣ пласта въ 3 (2) дюйма (стр. 518). Изъ этихъ способовъ послѣдній заслуживаетъ наибольшаго вниманія, если выполняется лушительнымъ плугомъ (рис. 51), потому что лушеніе, только при выполненіи его такимъ орудіемъ (стр. 518), открываетъ почву довольно полно дѣйствию атмосферическихъ дѣателей, срѣзаетъ хорошо верхнія части многолѣтнихъ травъ, освобождаетъ ихъ значительно отъ земли, что доканчиваетъ, впрочемъ, слѣдующее тотчасъ же за лушеніемъ боронованіе, и ставитъ ихъ въ условія весьма скорого засыханія и замиранія. Такихъ результатовъ далеко не достигаешь лушеніемъ обыкновеннымъ плугомъ, который, будучи ли онъ съ болѣе обрабатывающимъ или болѣе крошащимъ отваломъ, легко выскакиваетъ изъ борозды при такомъ маломъ нахлѣдѣ, особенно при болѣе сильной задерживающей почвѣ, и потому не только подрѣзаетъ дернину, которая вслѣдствіе этого, при благоприятной погодѣ, снова отрастаетъ. Такіе же неудовлетворительные результаты даетъ взметъ и вспашка въ балки; дерновая ра-

стительность отроастаетъ при первомъ не только что приведеннымъ причинамъ; при второмъ, вслѣдствіе неплотнаго прилегания обороченнаго пласта къ неподрызанной дернинѣ; повтореніе вспашки въ балки (стр. 518) можетъ помочь этому, но сопряжено съ проволочкой времени. Впрочемъ, на слишкомъ отвердѣвшихъ или задернѣлыхъ почвахъ лушеніе дѣлается невозможнымъ; такъ напр. сильно отвердѣвшая плотная почва, какъ она выходитъ въ сухое время изъ-подъ дурно пропаставшаго многолѣтняго клевера, допускаетъ только взметъ.

Взметанная, вспаханная въ балки или лушенная изъ-подъ многолѣтнихъ травъ почва, чрезъ болѣе или менѣе продолжительное время, въ послѣднемъ случаѣ недѣль черезъ 4—5 при благоприятныхъ условіяхъ, иногда же и позже, когда растительные остатки достаточно пересыхаютъ и почва разрыхляется, перепашивается на большую глубину плугомъ съ болѣе крошащимъ отваломъ (рис. 33 и 34); при чемъ, если бы растительные остатки недостаточно перепрѣли, лучше употребить плугъ съ дерновѣзомъ (рис. 23 и 24 меньш. разм.). Послѣ многолѣтнихъ травъ, богатыхъ корнями, земля рыхлится при второй вспашкѣ не рѣдко не хуже, чѣмъ послѣ удобренія почвы хлѣвнымъ навозомъ. Впрочемъ, почва взметанная нѣсколько глубже съ осени подъ посѣвъ яровыхъ будущаго года (см. выше), можетъ требовать и довольствоваться весной порыхленіемъ ея экипаторомъ.

Если бы почва изъ-подъ многолѣтнихъ травъ, между которыми преобладаютъ злаковыя, представлялась до того задернѣвшею, что не только не допускала лушенія, но даже и при взметѣ дѣлалась бы невозможнымъ хорошее прикрытіе дернины, тогда необходимость можетъ заставить прибѣгнуть къ двойному паханію (стр. 463 и 466), при которомъ первый плугъ пускается на глубину $3\frac{1}{2}$ —5 дюйм., а второй такъ глубоко, чтобы дернина, отворачиваемая первымъ плугомъ въ борозду вторымъ достаточно хорошо прикрывалась землей. Но и эта обработка, при этихъ условіяхъ выходитъ до того мало совершенной, что допускаетъ посѣвъ на обработанной такимъ образомъ почвѣ лишь менѣе требовательныхъ въ этомъ отношеніи растений: овса, рьпы, гречихи или, при влажной погодѣ, виконой смѣси, смотря по времени производства такой вспашки.

При приготовленіи поля изъ-подъ многолѣтнихъ травъ подъ яровыя растенія рѣдко можетъ понадобиться трех- и даже четырехкратная обработка. Такъ, если почва взметана уже поздней осенью, дернина не разлагается за зиму, къ тому же почва запыливается на поверхности, весной могутъ потребоваться двѣ вспашки — одна помельче, чтобы хорошенько, но неглубоко прикрыть дернину, которая должна подвергнуться еще разложенію; другая — по глубже, чтобы смѣшать разложившуюся дернину съ болѣе глубоко разрыхленной почвой. Такия же двѣ весеннія вспашки могутъ понадобиться въ

томъ случаѣ, еслибы тяжелая, страдающая отъ сырости почва была вспахана подъ зину въ высокіе гребни (стр. 520), которые весной предварительно разваливаются.

При приготовленіи почвы изъ-подъ многолѣтнихъ травъ подъ озимь нужно сплнить первой обработкой, чтобы имѣть возможность произвести вторую вспашку не раньше того, какъ достаточно разложатся растительные остатки, и за столько времени до посѣва, сколько нужно, для того чтобы почва могла осѣсть. Поэтому то у насъ (Московская, Смоленская, Могилевская губ., напр.), при посѣвѣ озими послѣ клевера, трудно въ годъ посѣва озимы взять еще укосъ клевера; необходимо же ограничиться выгономъ на клеверномъ подѣ съ ранней весны до окочанія яровыхъ растений будущаго года; въ этомъ случаѣ обработка можетъ быть начата нѣсколько позже, такъ что на луговомъ клинѣ, поступающемъ въ слѣдующемъ году подъ яровыя, рѣдко можно, даже у насъ, взять не только укосъ, но еще и пользоваться выгономъ послѣ укоса. Хотя и здѣсь, въ виду того, что весной необходимо сплнить работами для своевременнаго выполненія яровыхъ посѣвовъ, — что повтому весной некогда бываетъ ждать разложенія дернины и что зимой дернина разлагается плохо, необходимо стараться, чтобы вторая обработка, болѣе глубокая плужная вспашка, была произведена еще съ осени; чтобы, впрочемъ же случая, дернина не оставалась на зиму вовсе необработанной, а была бы покрайней мѣрѣ взметана или вспахана въ балки, гребни; на легкой же почвѣ даже хотя бы разодрана грубберомъ, для того чтобы открыть почву дѣйствию воздуха.

Почва изъ-подъ многолѣтнихъ травъ, если только позволяетъ погода, тотчасъ же боронуется послѣ лушенія, впрочемъ не болѣе того сколько нужно, чтобы освободить срызанные растительныя части отъ земли и тѣмъ умертвить ихъ; если бы же наступила дождливая погода, то боронованіе необходимо оставить до болѣе сухой погоды. Смотря по состоянію погоды (солнечнаго привгрѣванія и т.п.), черезъ 2—4 дня снова боронуютъ ее, затѣмъ повторяютъ боронованіе еще нѣсколько разъ, пока растительные остатки не уменьшатъ значительно своего объема, вслѣдствіе отдѣленія отъ нихъ земли, и не засохнутъ совершенно. Небольшіе дожди въ это время содѣйствуютъ еще отдѣленію земли боронованіемъ; сильные же или продолжительные, въ то время когда дернина еще незасохла, могутъ оживить ее, такъ что она зазеленѣетъ и начнетъ укореняться; тогда необходимо проборонованіе тяжелыми боронами или повтореніе мелкаго лушенія или обработки экипаторомъ. При боронованіи и обработкѣ экипаторомъ необходимо приподнимать и очищать бороны и экипаторы, чтобы предупредить ихъ забиваніе дерниной; набирающі-

яса при этомъ кучи разбрасываютъ впоследствии по полю вилами или граблями. Такъ какъ не все куски дернины могутъ быть извлечены на поверхность почвы бороной, многие же втаптываются въ землю животными, другие засыхаютъ рыхлой землей, то лучше оставить лущенное и выборонованное поле въ такомъ состояніи на 4—6 и болѣе недѣль, если только позволяетъ время, и, по истеченіи этого времени только, приступить къ обработкѣ его эскапаторомъ, или плугомъ или къ удобрению; за то въ теченіи этого времени почва дѣйствіемъ атмосферическихъ дѣятелей и повторяющагося чрезъ извѣстные промежутки времени боронованія превосходно разрыхляется на глубину 5—9 дюймовъ. Когда дернина вполне засохнетъ, тогда почва, свободная отъ травы, удобрится хлвннымъ навозомъ или перенахивается на большую глубину, при чемъ дернина загребається въ бороны граблями, если имѣется въ виду вторичная перепашка поля; если же почва вторично не перенахивается плугомъ, то дернина удаляется съ мѣстъ будущихъ водосточныхъ бороздъ. Послѣ вмета дернины обыкновенными плугами, особенно на плотныхъ, одичалыхъ почвахъ, весьма хорошо прикатать поле каткомъ, къ тому же тяжелымъ, рубчатымъ (рис. 75) поперегъ пластовъ, а, спустя нѣсколько времени, слегка пробороновать его вдоль пластовъ; вслѣдствіе этого дернина лучше прилегаетъ пластъ къ пласту, лучше закрывается землей и потому скорѣе прѣетъ; это можетъ быть одинаково хорошо, какъ въ томъ случаѣ, если производится посѣвъ по пласту, такъ и въ томъ, если вметанная дернина перенахивается затѣмъ еще разъ на большую глубину. Вообще хорошо по возможности поддерживать доступъ къ дернинѣ воздуха, и потому, въ случаѣ уплотненія почвы, пробороновать или даже обрабатывать лапчатой бороной обернутую дернину. Послѣ вспашки въ балки съ осени, весной распахиваются гребни.

До сихъ поръ мы рассматривали обработку почвы изъ-подъ однихъ растений подъ другія безъ удобрения ее хлвннымъ навозомъ, но не рѣдко примѣняется удобрение хлвннымъ навозомъ и въ этотъ короткий сравнительно промежутокъ времени, который остается для обработки почвы между двумя, непосредственно одно за другимъ слѣдующими въ полѣ растеніями.

Хлвной навозъ, при удобрении имъ почвы, долженъ быть поставленъ въ условія влажности и доступа къ нему воздуха, благоприятныя для возможно полнаго и скораго его разложенія, а потому онъ запахивается плугомъ (рис. 22, 27 и 32) съ хорошо оборачивающимъ отваломъ (чтобы, при возможно хорошемъ прикрытіи землей, достаточно пользоваться влагой) и неглубоко (чтобы возможно полно пользоваться доступомъ воздуха): мельче (не глубже $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ вершковъ при ширинѣ пласта въ 4 вершка) въ влажную погоду и на болѣе плотныхъ почвахъ и глубже (до 3-хъ вершковъ) въ сухую погоду и на болѣе легкихъ почвахъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, напр. подъ растенія, глубоко развивающія свои корни, напр. марену можетъ быть полезнымъ удо-

бреніе почвы на нѣсколько большую глубину 6—8 вершковъ; это достигается при соблюденіи вышеприведеннаго правила относительно неглубокой заправки навоза, такимъ образомъ, что навозъ запахивается въ почву въ два приѣма: одна часть его, запаханная сперва мелко, запахивается затѣмъ глубоко, а другая — запахивается тогда перенрѣбѣ достаточно въ верхнемъ слое почвы, и остается въ верхнемъ слое почвы. Если бы мелко, послѣ глубокой вспашки и остается въ верхнемъ слое почвы. Если бы навозъ, при запаханіи его въ землю, почему либо прикрывался несовсѣмъ хорошо, напр. при нѣсколько болѣе сжатости его или при болѣе узкомъ пластѣ заправки, то слѣдуетъ поставить особыхъ рабочихъ (по полуработнику — мальчику или женщинѣ передъ каждымъ плугомъ) для загребанія его ку — мальчику или женщинѣ передъ каждымъ плугомъ) для загребанія его подъ опрокидываемый пластъ, но не въглубь борозды; отъ лучше прѣетъ, будучи заключенъ между двумя прилегающими другъ къ другу пластами. Такъ какъ навозъ, при загонной заправкѣ его, растаскивается или сбивается на обочинахъ плугомъ или животными, то лучше удобрять обочины послѣ вспашки участка, или же запахать навозъ на обочинахъ предварительно вспашки участка. При такой заправкѣ навоза, если она только выполнена хорошо, навозъ будетъ распределенъ довольно равномерно находится главнымъ образомъ заключеннымъ между соприкасающимися поверхностями пластовъ и прикрытъ нетолстымъ связнымъ пластомъ земли. Пластъ, прикрывающій навозъ, не долженъ быть слишкомъ испрошенъ, потому что иначе почва сильнѣе провѣтривается и просыхаетъ; навозъ же, при высыханіи, труднѣе отнимается у почвы гигроскопическую влагу, слѣдовательно, труднѣе сохраняется влажнымъ; при болѣе же влажности навоза, почва, прилегающая къ нему весьма неплотно, трудно отнимаетъ у него излишекъ воды, такъ какъ вода трудно распространяется въ комковатой почвѣ съ комочка на комочекъ. Дождь, на почвахъ нѣсколько мелкозерныхъ, смываетъ частицы комочковъ въ углубленія, на поверхность навоза, который такимъ образомъ заносится и теряетъ условія, благоприятныя для его разложенія. Поэтому, напротивъ, хорошо прикатать почву точно такъ же послѣ заправки навоза, чтобы привести его въ болѣе тѣсное соприкосновеніе съ частицами почвы (стр. 305 и 481); а затѣмъ, въ случаѣ уплотненія поверхности почвы отъ дождей, открыть воздуху доступъ въ нее боронованіемъ, какъ только она достаточно обсохнетъ для этого. Въ случаѣ же еще болѣе уплотненія, какому можетъ подвергнуться почва, вспаханная при заправкѣ навоза слишкомъ широкими пластами или по свойству своему нѣсколько илистая, мелкозерная, необходимо перенахать, но перенахать на большую той глубины, на которую былъ запаханъ навозъ, дабы вымочиваемый теперь еще неразложившимся навозъ былъ снова прикрытъ слоемъ земли; въ виду этого, особенно въ томъ что приведенныхъ почвахъ, весьма важна болѣе мелкая заправка навоза первоначально.

Прежде удобрения хлвннымъ навозомъ почва должна быть разрыхлена и очищена отъ сорныхъ травъ (пырей); а потому почва удобряется хлвннымъ навозомъ обыкновенно послѣ вмета, вспашки въ балки или лущенія, при которыхъ уничтожаются главнымъ образомъ сорные травы; но до болѣе глубокой вспашки (мѣшанія). Исклѣченіе изъ этого составляютъ, попервыхъ чистыя отъ сорныхъ травъ, легкія почвы, которыя допускаютъ удобрение хлвннымъ навозомъ не только живыми, но даже мало задернѣвшимъ полемъ изъ-подъ многолѣтнихъ травъ безъ предварительной ихъ обработки; во вторыхъ, плотныя глинистыя, труднопроницаемыя для воды почвы; нѣсколько болѣе глубокая вспашка этихъ послѣднихъ до удобрения хлвн-

нымъ навозомъ, допускаетъ прониканіе влаги, выделяющейся навозъ, въ разрыхленный, ниже навоза лежащій слой, который отъ этого еще болѣе разрыхляется, и освобождаетъ верхній слой ихъ отъ избытка влаги, который вредно дѣйствуетъ на ходъ разложения навоза, и, наконецъ, въ случаѣ оплотнѣнія ихъ, облегчаетъ вторичную перепашку ихъ на большую той глубины, на которую былъ запаханъ навозъ. Но удобрение хлвннымъ навозомъ ни въ какомъ случаѣ не должно предшествовать вспашкѣ, при которой углубляется пахотный слой (стр. 463 и 464); она должна всегда слѣдовать за этой послѣдней.

Особенной послѣдности требуетъ удобрение хлвннымъ навозомъ подъ пожнивныя и озимыя растенія. Въ этихъ случаяхъ, конечно, самое лучшее употребить навозъ уже болѣе или менѣе перепрѣвшій, не солоmistый (см. ниже). Правда, можно дать перепрѣть солоmistому навозу разрушеннымъ на полѣ, но это требуетъ времени и благоприятной для этого умеренно теплой и влажной погоды, которая не всегда бываетъ въ это время года. Навозъ запахивается въ этомъ случаѣ лучше всего плугомъ съ столько же оборачивающимъ, сколько крошащимъ пластъ отваломъ (рис. 22 и 27) на полную глубину, такъ чтобы не могла достать его затѣмъ борова, при узкомъ пластѣ съ загребаніемъ его въ борозду. На почвахъ болѣе глинистыхъ, заплывающихъ, требующихъ удобрения болѣе солоmistымъ навозомъ, необходимо употребить въ такомъ случаѣ плугъ съ болѣе оборачивающимъ землю отваломъ (рис. 19 и 32) и обратить особенное вниманіе на тщательное загребаніе навоза въ борозду. Такъ удобрится земля, напр., подъ поживный рапъ, оз. ячмень: пшеница и рожь легко полегаютъ при такихъ условіяхъ. Если погода неблагоприятна, то навозъ, запаханный такимъ образомъ, можетъ недостаточно разложиться подъ первымъ растеніемъ, и тогда, при обработкѣ почвы преимущественно крошащимъ, мало оборачивающимъ пластъ отваломъ, чтобы невывернуть дурно разложившагося навоза наружу. Вообще этого способа удобрения хлвннымъ навозомъ непосредственно подъ посѣвъ слѣдуетъ, по возможности, избѣгать на болѣе плотныхъ почвахъ. Удобрение хлвннымъ навозомъ подъ озими дѣлается болѣе удобнымъ, если можно произвести его возможно рано подъ высѣвающуюся нѣсколько позже озимъ; такъ, напр., при возможности удобрить безъ предварительной обработки легкую, мало задержившую, чистую отъ сорныхъ травъ почву, выходящую изъ-подъ многолѣтнихъ травъ, давшихъ въ томъ году одинъ только укосъ или даже служившихъ только для выгона на нихъ скота, подъ позже высѣвающуюся пшеницу или даже ранѣе высѣвающуюся рожь. Въ такомъ случаѣ, послѣ мелкой запашки навоза, можно, дождавшись, его разло-

женія, вымѣшать почву за столько времени до посѣва, что почва успѣетъ еще осѣсть.

Удобрение хлвннымъ навозомъ подъ яровыя будущаго года представляетъ уже гораздо менѣе затрудненія. На болѣе плотныхъ почвахъ, хорошо, если еще до зимы не только можетъ быть запаханъ хлвнный навозъ послѣ лущенія, взмета или вспашки въ бабки, но и можетъ быть вымѣшана еще почва, спустя отъ 4 до 6 недѣль послѣ запашки навоза; на болѣе же легкой почвѣ или послѣ болѣе глубокой вспашки, при которой углубляется пахотный слой, достаточно, если только навозъ будетъ запаханъ съ осени, но онъ долженъ быть запаханъ неглубоко, чтобы растворимыя изъ него влагой вещества не могли проникнуть очень глубоко въ землю; посѣвъ этого весной можно вымѣшать почву на полную глубину, прямо подъ посѣвъ; если бы же нельзя было запахать навоза съ осени, то можно разбросать его въ это время и запахать неглубоко весной, какъ только просохнетъ почва, если время посѣва яровыхъ весной позволяетъ, выждавъ достаточнаго разложенія навоза, вымѣшать почву на большую глубину; иначе, лучше запахать его прямо подъ посѣвъ, на столько глубоко, что бы не захватывала его потомъ борова. Удобрение весной на почвахъ болѣе плотныхъ возможно только подъ растенія не требующія сѣлости, какъ напр. копскіе бобы, виковую смѣсь; на легкой же почвѣ оно возможно для всѣхъ растеній, которыя сносятъ непосредственное удобрение хлвннымъ навозомъ. Для картофеля возможно весеннее удобрение въ ту же борозду, въ которую укладываются клубни, хотя, современіи появленія картофельной болѣзни, этого способа удобрения почвы подъ картофель стали избѣгать.

б) Обработка земли въ пару.

Въ пару поле оставляется, большей частью, послѣ колосоваго хлба и готовится къ посѣву преимущественно озимаго только нѣзѣдка яроваго растенія. Поэтому, обработка почвы въ пару имѣетъ дѣло съ живьемъ (при черномъ и зеленомъ парѣ, въ полупарѣ и паровыхъ растеніяхъ), рѣже съ почвой, вышедшей изъ-подъ многолѣтнихъ травъ (при такъ называемомъ клеверномъ парѣ). Обработка почвы въ паровомъ клинѣ, при черномъ и занятомъ парахъ, при полупарѣ и при занятіи его паровыми растеніями, начнется еще осенью; при зеленомъ же и такъ называемомъ клеверномъ парѣ, — съ іюня мѣсяца слѣдующаго года или нѣсколько раньше, смотря по мѣстности, обыкновенно послѣ окончанія яровыхъ посѣвовъ.

Осенняя обработка пароваго клина различается числомъ вспашекъ и тѣмъ, удобрится ли онъ съ осени или нѣтъ. Лучше, если съ

осени могут быть произведены две вспашки, особенно на более плотной и засоренной преимущественно многолетними сорными травами (пыреем) почве; одна более мелкая—в виде взмета на 1½—2 вершка, при ширине пласта в 4—5 вершка (рис. 19, 22, 27, 32, 46 и 48), или в виде мелкой вспашки в бабки (рис. 19, 22, 27 и 32), или в виде лущения (особенно при засорении почвы пыреем стр. 518), или в виде обработки экипатором (рис. 54, 55 и 56) или даже лапчатой бороной (рис. 57, 58 и 59), тотчас же по оставлении поля предшествующим растением; другая более глубокая (на 4—5 перши.) вспашка плугом (двоем или мшаном), когда несколько разложится живые и поистребятся боронованием сорные травы. Большая глубина этой вспашки особенно важна в сухом климате, где почва должна запасть влагой за зиму. На почвах несколько сыроватых и засоренных пыреем (стр. 520) может быть полезно замкнуть эту вторую вспашку более глубокой вспашкой в бабки или гребни (двоем). При этой же вспашке весьма удобно углубление пахатного слоя (двоем). При недостатке времени для двух обработок, на почвах более легких, чистых от сорных трав и богатых содержанием перегноя (черноземных) можно ограничиться одной вспашкой (взмет и двоем) на полную глубину (4—5 верш.), помощью к тому же плуга с дерновником (рис. 23 и 24 меньш. разм.) для лучшего прикрытия живых.

Что касается удобрения парового клина хлвным навозом с осени, где возможно по хозяйственным соображениям, то лучше всего производить его на чистой от сорных трав, более легкой почве под взмет, если только после этого, выждав достаточного разложения навоза, можно еще до зимы вымывать почву, перепашав ее на полную глубину; так как в этом случае навоз будет поставлен в такие же благоприятные условия для своего разложения как и живые. Но, если почва более плотных свойств или засорена, так что, предварительно удобрения ее хлвным навозом, требует для своего порыхления и очищения от сорных трав лущения или по крайней мере обработки экипатором, или же после такой первой обработки понадобится произвести такую глубокую вспашку на зиму (напр. в сухом климате или при углублении пахатного слоя), под которую нельзя, но после которой только можно удобрить почву хлвным навозом,—то удобрение хлвным навозом придется так поздно, что потребуются особенно благоприятных климатических условий, чтобы все еще можно было запахать навоз мелко и, выждав его разложения, вымывать затем более глубоко землю до зимы. В этих случаях необходимо ограничиться мелкой запашкой навоза или даже прибегнуть к растреск его, но только по незамерзшей еще почве.

Итак, к весне, когда могут начаться полевые работы, паровое поле в черном и занятом парах, в полупаре и при поступлении его под паровые растения, обыкновенно вспахано один, два или три раза и удобрено или удобрено, при чем навоз, вывезенный с осени, или тогда же запахан или растреск только по поверхности поля. Поле же в зеленом и так называемом клеверном парах, оставшееся без обработки с осени, представляется к весне: первое поросшим скудной растительностью между выбитым скотом и перепрившим отчасти живым; второе—покрытым отстояющим клевером. Впрочем, может быть поле подвергать паровое поле, вышедшее из под ярового хлба, даже в зеленом пару, к какой обработкой с осени, а именно боронованию простой или лапчатой железной бороной (рис. 57, 58) или обработкой экипатором (груббером рис. 54, 55 и 56) и 59) или сохой, в сырую погоду, если бы лапы экипатора забивались слишком живым; так как при этом истребляется, по крайней мере, часть грубейших сорных трав, земля делается более доступной действиям атмосферы и, таким образом, лучше подготавливается к весенней обработке ее, между тем как поле не только не теряется для подножного корма, но еще улучшается в этом отношении, вследствие усиливающегося развития самородной мелкой травы. Такою обработкой в крайнем случае может ограничиться осенняя обработка поля даже в занятом пару под зимнюю вывозку навоза и весеннюю растреску и запашку его.

Весенняя обработка парового поля разнится, смотря по роду пара, в котором поле находится. Вообще можно сказать, чем лучше поле было обработано с осени, тем меньше приходится обрабатывать его весной.

Затем, паровое поле, назначаемое под паровые растения особенно корнеплоды (свекловицу, морковь и т. д.), если только удобрится хлвным навозом, то удобрится обыкновенно с осени. Исключение составляют: картофель, конские бобы, кукуруза и рьба, под которые, если не всегда, то весьма часто поле удобрится хлвным навозом с весны. У картофеля он вляется в борозду вместе с клубнями (стр. 529), у конских бобов запахивается вместе с семенами, у кукурузы же и рьбы запахиваются до высадки первой и посева второй. Паровые растения высвываются обыкновенно довольно рано, так что весной, особенно в более северных местностях, приходится спешить обработкой под них почвы и, при этом, особенно в сухих климатах, стараться сохранить в почве влагу; а потому весной почва обрабатывается почти исключительно бороной и экипатором; плугом же перепашивается разве в том только случае, если удобрится по весне хлвным навозом, ко-

торый должен быть запахан и после которого может понадобиться вымывать почву, или же почва, при глинистых ее свойствах, слишком отвердевает в неблагоприятную погоду, или, при недостаточной обработке с осени, засорится многолетними сорными травами, которые, при благоприятной для них погоде, отрастают иногда очень сильно. Поэтому, если вспаханное с осени поле не удобряется, то оно боронуется, или обрабатывается волокушей как только просохнет, а за тем рыхлится эктирпатором и, по вторичном пробороновании, готово для посадки или посева. Если же удобряется, то, по запахиву навоза, раструженного по вспаханному с осени полю осенью или весной, на такую глубину, чтобы нельзя было захватить навоза при последующих боронованиях или обработке эктирпатором, забороновывается и затем, если бы потребовалось порыхление поверхности эктирпатором и вследствие этого нового проборонования, засаживается или засевается соответствующим растением.

Поле в занятом пару почти всегда удобряется; к тому же, особенно в наших условиях, приходится обыкновенно сжечь посевом растения (сжечь вики с овсом), занимающего поле, местами для того, чтобы можно было раньше убрать растение и успеть хорошо приготовить землю под посев озими; местами же для того, чтобы захватить в почву весеннюю влагу, необходимую для успешного развития виковой смеси. Поэтому, если поле нельзя удобрить с осени, по недостатку времени или недостатку навоза, то приходится удобрить его весной навозом, вывезенным в конце зимы. В средней и частью северной полосах России, где прежде всего должен быть найден себе применение пар, занятый виковой смесью, полевые работы открываются, можно считать, в течение апреля месяца, где в начале, а где и в конце апреля; дальше на север — даже редко раньше 1 мая, между тем как виковая смесь должна быть высеяна не позже как в первых числах мая, потому что она должна быть убрана на сно не позже самых первых чисел июля, на зеленый корм — даже в конце июня; иначе, трудно справиться с обработкой почвы под посев озими, который должен быть произведен в первых числах августа. Поэтому, при краткости в большей части случаев весеннего времени для обработки почвы под виковую смесь и при необходимости к тому же произвести весной удобрение хитрым навозом, выполнение посева виковой смеси представляет не совсем легкую задачу, которой разрешение, впрочем, значительно облегчается неприхотливостью вики; она может быть высеяна на менее хорошо разработанную, несколько влажную почву и мирится весьма хорошо с еще малоразложившимся навозом, но за то весьма чувствительна к надлежащему прикрытию ее

землей; а потому, если почва сколько нибудь суха и стоит сухая погода с холодными ветрами, необходимо более глубокое прикрытие ее. Руководясь этими соображениями, можно поступать так: если поле удобряется навозом, вывезенным зимой, то следует разбросать навоз как только просохнет земля на столько, что можно бороновать его; боронование необходимо, если вспаханное с осени поле представляет недостаточно ровную поверхность. Если же осенняя вспашка была произведена плугом с дернорезом или обыкновенным плугом, но не широкими пластами, на глубину по крайней мере 3—3½ вершков, к тому же по предварительной мелкой запахиву жнивью или даже обработки его эктирпатором, то поле выходит на столько ровным, при неслишком связанной почве, что можно разбросать навоз без предварительного проборонования, а это особенно важно, потому что раньше можно приступить к растружу навоза. Затем, по разбросанному навозу производится посев вики с овсом, которые запахиваются вместе с навозом плугом (рис. 27), хорошо обрабатывающим пласт (на глубину 2-х вершков), и запахиваются весьма удовлетворительно, если навоз неслишком соломыст, а потом забороновывается, и, если нужно прикатывается. Это самый скорый и надежный способ посева виковой смеси. Также почти скоро можно произвести посев если запахать навоз несколько глубже (вершка на 2½), затем разбросать вику с овсом, забороновать и, если погода стоит несколько сухая, прикатать; но, так как такая заделка семян виковой смеси может быть вполне удачной лишь тогда, если стоит несколько влажная и теплая погода, то на несколько более легкой, не очень тощей почве, в случае сухой погоды, можно, запахав навоз несколько глубже (на 2½—3 вершка), забороновать поле и засеять виковой смесью под эктирпатор. Если поле в занятом пару было удобрено с осени и навоз тогда же запахан или поле вовсе не удобряется, тогда дело значительно упрощается: пробороновать вспаханное с осени поле, можно засеять его виковой смесью под эктирпатор, если бы оплотнение или засорение поля не потребовали в крайнем случае еще одной плужной перепахки. В последнем случае можно посеять виковую смесь, в зависимости от состояния погоды, или по плужной вспашке под борону или же, пробороновав вспаханное поле, — под эктирпатор. Посев виковой смеси производится в количестве 6—8 четвериков вики и 4—6 четвериков овса на каз. десятину. Чем более засорена почва, тем менее плодородна она, тем менее можно рассчитывать на благоприятную погоду и хорошую заделку семян (так напр. при заделке семян вместе с навозом), тем гуще следует сеять. В техническом отношении, можно сказать, нельзя произвести слишком

май или началъ июня, смотря по мѣстности, вывозится навозъ, рас-
трушивается по полю и запахивается плугомъ съ хорошо обрачи-
вающимъ пластъ отвалою (рис. 19, 27 и 32). Такой приемъ, если
только почва чиста отъ сорныхъ травъ (пырея) и скорѣе мѣсяе чѣмъ
болѣе плотна, можетъ быть хорошъ, но, при засоренности почвы или
большей ея плотности, лучше, предварительно вывоза навоза, обра-
ботать почву: душильнымъ (рис. 51), обыкновеннымъ плугомъ
(взметъ—рис. 19, 27 и 32) или хотъ эктирпаторомъ (рис. 54, 55 и
56), смотря по имѣющимся въ распоряженіи времени и рабочимъ
силамъ, въ зависимости отъ мѣстныхъ климатическихъ и экономи-
ческихъ условий. Навозъ раскрушивается въ послѣднемъ случаѣ,
послѣ соответствующаго очищенія почвы отъ сорныхъ травъ и ея
разрыхленія, и запахивается въ обоихъ случаяхъ неглубоко ($1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ вершка при ширинѣ пласта въ $4\frac{1}{2}$ в.): глубже на легкой,
мельче на плотной почвѣ; повторомъ случаѣ—глубже первой обработки
(особенно взмета), чтобы невывернуть наружу неперепрѣваго
жнивья, если удобреніе произведено раньше чѣмъ перепрѣло жнивье,
какъ это наичаще бываетъ. Послѣ прикатыванія навоза, необходи-
мости почвы открытой и удаленія всходовъ сорныхъ травъ, почва
перепашивается—вымѣшивается на полную глубину, снуся 4—6
недѣль, когда навозъ достаточно перепрѣетъ. Послѣ вымѣшанія, почва
остается, по возможности, безъ перепашки до посѣва озими. Въ
рѣдкихъ случаяхъ, особенно если поле удобряется хлѣвнымъ наво-
зомъ, можно ограничить обработку поля въ зеленомъ пару одной
плужной вспашкой—болѣе глубокимъ взметомъ, безъ всякой пред-
варительной обработки но съ обработкой поля послѣ этого, до вре-
мени посѣва, развѣ только бороной и эктирпаторомъ.

Наконецъ, обработка клевернаго пара начинается около того же
времени какъ и поля въ зеленомъ пару, при чемъ раздѣливается
какъ поле, выходящее изъ-подъ многолѣтнихъ травъ, подъ озимое
или яровое растеніе (стр. 522—526).

Паровое поле рѣдко поступаетъ подъ посѣвъ яровыхъ; въ ме-
нонестныхъ хозяйствахъ у насъ, въ Таврической, губ. впрочемъ,
сѣютъ послѣ чернаго пара яровую пшеницу; чаще встрѣчаются по-
сѣвы яровыхъ послѣ зеленаго пара; такъ, въ нашемъ трехпольномъ
хозяйствѣ сѣютъ иногда яровую пшеницу послѣ пара, да кромѣ того
во многихъ нашихъ свеклосахарныхъ хозяйствахъ сѣютъ сахарную
свекловичу послѣ зеленаго пара. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ: за-
пахиваютъ навозъ при первой вспашкѣ, которую производятъ въ
маѣ и юнѣ, на глубину $2\frac{1}{2}$ —3 верш. плугами съ обрачивающимъ
отваломъ (рис. 19, 27 и 32), а затѣмъ черезъ 4—6 недѣль, когда
перепрѣетъ нѣсколько навозъ, перепашиваютъ поле—вымѣшиваютъ

на глубину 8 вершковъ плугами съ болѣе рыхлящими отвалами (маг-
дебургскими, Графа Бобринскаго) и оставляютъ такъ до весны,
когда обрабатываютъ преимущественно волокушей, бороной и
эктирпаторомъ подъ посѣвъ свекловицы. Во всѣхъ другихъ слу-
чаяхъ посѣва яровыхъ послѣ пара можно оставлять поле на зиму,
предшествующую посѣву яровыхъ, вымѣшаннымъ на полную глу-
бину съ тѣмъ, чтобы весной можно было ограничиться однимъ лишь
поверхностнымъ разрыхленіемъ почвы бороной и эктирпато-
ромъ *).

Надлежащая культура (извѣстное чередованіе растеній, оставленіе поля
въ пару и обработка почвы) много способствуетъ истребленію сорныхъ
травъ; съ нею немирятся: мари, одуванчикъ, попутникъ, тысячелѣтникъ,
шершцы, яснотки. Нѣкоторые изъ сорныхъ травъ особенно чувствительны
къ извѣстнымъ приѣмамъ культуры. Такъ, правильное чередованіе растеній
въ полѣ изгоняетъ маля, поповникъ, никульникъ, рѣдкую полевую, сумоч-
никъ, арутку. Съ введеніемъ чернаго пара исчезаютъ: горчица полевая, ды-
мянникъ, желтушникъ, короставникъ, просо, рѣдка полевая, чина, щавель
малый; съ введеніемъ паровыхъ, плужнолозныхъ растеній, между которыми
обрабатываются ряды во время ихъ произрастанія,—визюгъ, горчица по-
левая, дымянникъ, ежевика, желтушникъ, заразиха, осоты, никульникъ, про-
свириакъ, рѣдка полевая; съ введеніемъ занятаго пара—бѣлокопытникъ, ва-
сильскъ, визюгъ, воробейникъ, живокость, лебеда, ланушникъ, мать-и-ма-
чиха, осотъ, торня, хвощъ; съ введеніемъ посѣва кормовыхъ травъ—папо-
ротники, хвощи, чечевича; съ оставленіемъ поля подъ болѣе или менѣе продол-
жительный выгонъ—бѣлокопытникъ, визюгъ полевой, ежевика, звѣрбой,
ланушникъ, мать-и-мачиха, осотъ, погребель, попутникъ песчаный, хвощъ,
чина, щавель малый (особенно овцами). Напоротники пропадаютъ, если еди-
ничная засоренная ими мѣста покрыты футою на $1\frac{1}{2}$ верскаго, соломою,
чтобы они заглохли подъ этой покрывкой, оставляемой до осени. Глубокая
вспахивка истребляетъ лузъ, который закапывается при этомъ глубоко, ве-
рескъ и, въ соединеніи съ уборкой копей при вспашкѣ,—бузину, гречиху
водяной перецъ, напоротники, розу собачью, сливу теряя, хвощи: вспашка
поля на зиму въ гребни, балки—визюгъ полевой, лузъ; вспашка подъ сухую
попуду—визюгъ полевой, гречиху водяной перецъ, лузъ; пожниная вспашка
(возможно скорая, мелкая перепашка жнивья)—визюгъ, гречихи: птичьей и
визюгъ, жабникъ, живокость. Высто перепашки жнивья можетъ быть уда-
лено выжиганіемъ, при которомъ истребляется также много сорныхъ травъ.
Наконецъ, все, что удаляетъ излишнюю сырость изъ почвы, удаляетъ въ тоже
время: гречихи, жабникъ, костеръ, метлицу, клеверъ и т. д.—растенія, лю-
бящія влажную почву (стр. 489).

*) Ссылки на помѣщенные раньше въ этой книгѣ рисунки въ соответствую-
щихъ мѣстахъ статьи о приѣмахъ обработки почвы предназначаются са-
мостоятельно для нагляднаго показанія тѣхъ требованій, которымъ должно удовле-
творять орудіе предназначающагося для выполненія извѣстной работы, но не для
того чтобы указать единственное пригодное для этой цѣли орудіе. Иногда и
другое имѣющееся уже въ хозяйствѣ орудіе можетъ служить для той же цѣли
или можетъ служить для той же цѣли орудіе, котораго приобрѣтеніе указы-
вается другими еще потребностями хозяйства. Въ этихъ видахъ сдѣланы иногда
ссылки на нѣсколько рисунковъ.

Удобрения почвы.

(Периодическая химическая обработка)

1. Задача удобрения.

Растение, для образования известного урожая (известного количества растительной массы), при данных условиях почвы, влажности, теплоты и света, требует известного количества почвенных питательных веществ (стр. 121). Но, так как сказанные условия различны не только в различных местностях, но даже в одной и той же местности в различные годы, то понятно, что количество питательных веществ, находимое нами в зольном урожае какого либо растения в данном году и в данной местности, может только приблизительно определять количество тех же питательных веществ, которого потребует тоже растение для производства такой же величины урожая в другой местности и в другом году; тем более, что некоторая часть питательных веществ, заключающихся в зольном урожае, может быть случайной, поступившей в растение не в силу требований этого последнего, а в силу избытка того или другого питательного вещества в почве (стр. 126). Но, положим, что рожь (стр. 494—495), для производства среднего хорошего (в сложности десяти лет) урожая в 100 пуд. зерна и 200 пуд. соломы на десятины, требует действительно 400 фунтов зольных составных частей, в том числе: 86 фунт. кали, 30 фунт. извести, 17 фунт. магния, 51 фунт. фосфорной и 10 фунт. серной кислоты, которых, средним числом, содержит такой величины урожай ржи; все же, почва, которая на пространстве одной десятины, в слое глубиной, примерно, в 1 фут (полагая, что рожь выбирает нужные ей питательные вещества, главным образом, из слоя не глубже этого), заключала бы питательных веществ не больше того, сколько содержится их средним числом в хорошем урожае ржи, не в состоянии была бы произвести такой урожай ржи, ни при каких условиях почвы (остальных физических), влажности, теплоты и света. Мы находим даже в действительности, что такого урожая не производят почвы, которые содержат питательных веществ во много раз больше того количества их, которое содержится в таком урожае. И это понятно; во первых, корни растений прилегают приемлющей своей частью (стр. 121) к сравнительно малой части почвенной массы и, следовательно, берут питательные вещества из небольшой только части почвы; между тем как питательные вещества, сравнительно мало подвижны в почве, должны находиться распределенными во всей почвенной массе, для того чтобы корни растений

могли найти питательные вещества там, где им нужно, и к тому же равномерно, для того чтобы корни растений везде в почве могли найти одинаково благоприятные условия питания; во вторых, корни растений не могут выбрать из почвы до чиста всех питательных веществ, даже из тех мест почвы, к которым они прилегают приемлющей частью своей поверхности, потому что в растение поступают только удобоусвояемые для растения питательные вещества, т. е. находящиеся в растворенном или растворимом состоянии (стр. 128), при содействии всегда присутствующих в почве в большем или меньшем количестве растворителей. Поэтому, в том слое почвы, из которого растение берет почвенные питательные вещества, этих последних в удобоусвояемом для растений состоянии должно находиться во много раз больше того, сколько находится их в среднем хорошем урожае для того чтобы почва могла произвести этот последний. Но, во сколько раз больше должно находиться их, этого мы не знаем, как не знаем и того, сколько нужно их растению для производства известного количества растительной массы. Однако, мы можем с большей или меньшей вероятностью сказать, что, для получения известного урожая, в почве должно находиться питательных веществ в удобоусвояемом для растений состоянии сравнительно с тем количеством их, которого требует растение для производства этого урожая, тем больше, чем меньше приемлющая часть корневой поверхности растения сравнительно со всей его растительной массой, напр. для свекловицы, ржи больше, чем для картофеля;—чем меньше продолжительный период произрастания растения, напр. для ярового ячменя с 9—14 недельным больше, чем для овса с 16—22 недельным периодом произрастания;—чем благоприятнее условия климата и погоды, напр. в западной Европе с умеренно влажным и теплым климатом и у нас в умеренно влажные и теплые годы меньше, чем у нас и у нас в сухие, холодные годы;—чем больше задерживает питательные вещества почва, чем труднее, вследствие этого, перемещаются они в почве и чем меньше растворителей в почве, напр. в песчаной почве меньше, чем в глинистой, и в почве богатой органическими остатками меньше чем в почве бедной ими. Что касается количества нерастворимых (стр. 128), неудобоусвояемых для растения в данную минуту питательных веществ в почве, то их может вовсе не быть в почве (так можно себя, по крайней мере, представить), если в этой последней достаточно удобоусвояемых для растения питательных веществ. В действительности, конечно, в почве всегда находятся нерастворимые питательные вещества, и некоторая часть их, под влиянием воздуха, влаж-

ности и теплоты, постоянно переходить въ удобоусвояемое для растений состояние, хотя различно быстро (стр. 129) въ зависимости отъ химической природы нерастворимыхъ соединений, въ которыхъ они находятся, отъ силы, съ которой дѣйствуютъ дѣтели выветриванія при тѣхъ или другихъ физическихъ свойствахъ почвы, и отъ обилія дѣтелей выветриванія, образующихся въ самой почвѣ; такъ что количество удобоусвояемыхъ питательныхъ веществъ въ почвѣ увеличивается постоянно, хотя и различно быстро. Въ виду этой прибыли удобоусвояемыхъ питательныхъ веществъ во время произрастанія растений, это послѣднее можетъ, для произведенія известнаго урожая, довольствоваться ко времени занятія имъ почвы болѣе или менѣе меньшимъ количествомъ удобоусвояемыхъ для него почвенныхъ питательныхъ веществъ, чѣмъ въ томъ случаѣ, еслибы такой прибыли небыло. Поэтому нерастворимыя питательныя вещества въ почвѣ неостаются совершенно безъ вліянія на настоящій урожай, хотя болѣе значительно и существенно вліяніе ихъ (стр. 131) въ отношеніи будущихъ урожаевъ.

Если, затѣмъ, мы представимъ себѣ почву *) ко времени занятія ея растеніемъ съ такимъ какъ-разъ содержаніемъ удобоусвояемыхъ питательныхъ веществъ, какова достаточно для произведенія хорошаго урожая каковаго либо полевого растенія, и равномернымъ распределеніемъ ихъ, то, по снятіи съ этой почвы урожая растенія, состояніе почвы въ отношеніи количества и размѣщенія питательныхъ веществъ и растворителей ихъ будетъ уже не то, каковыя оно было во времени занятія ея растеніемъ. Во 1-хъ, въ почвѣ уменьшится количество удобоусвояемыхъ питательныхъ веществъ на количество ихъ а) равное заключающемуся въ снятомъ урожаѣ зерна и соломы растенія; б) выщелоченное водой (известь, азотная и сѣрная кислоты преимущественно) изъ верхняго растительнаго слоя въ подпочву и ниже, которое конечно, не всегда бываетъ значительно; и в) улетучившееся (углекислый амміакъ) изъ почвы въ атмосферу, которое обыкновенно бываетъ весьма незначительно. Во 2-хъ, въ почвѣ увеличится количество удобоусвояемыхъ питательныхъ веществъ на количество ихъ, а) которое образуется во время произрастанія на ней растенія изъ нерастворимыхъ питательныхъ веществъ; б) которое останется почвѣ въ части урожайныхъ остатковъ (подземныхъ частей) растенія, образовавшейся на счетъ атмосферныхъ питательныхъ веществъ (амміака); и в) которое поднято въ верхній растительный слой изъ подпочвы водой* и которое, конечно, въ рѣдкихъ случаяхъ достигаетъ значительной величины (стр. 130). Въ 3-хъ,

*) Говоря здѣсь о почвѣ, мы понимаемъ всегда растительный слой ея, т. е. слой, въ которомъ преимущественно развиваются корни растений.

въ почвѣ измѣнится размѣщеніе питательныхъ веществъ, вслѣдствіе того, что корни снятаго растенія взяли эти питательныя вещества изъ известныхъ мѣстъ почвы; смотря по тому, какое это растеніе, они взяли ихъ изъ большаго или меньшаго числа различно удаленныхъ другъ отъ друга мѣстъ почвы въ горизонтальной плоскости (напр. у свекловицы изъ меньшаго числа болѣе удаленныхъ одно отъ другаго мѣстъ, чѣмъ у кормовой травы) и изъ болѣе или менѣе толстаго слоя почвы (напр. у злаковъ изъ менѣе толстаго, чѣмъ у бобовыхъ растеній); кромѣ того дѣйствіемъ корней растенія подняты нѣкоторыя питательныя вещества снизу вверхъ (стр. 132). Въ теченіи этаго же времени измѣнилось и количество растворителей питательныхъ веществъ въ почвѣ; оно уменьшилось, главнымъ образомъ, на количество ихъ разложившееся (перегнойныя кислоты), улетучившееся (углекислота, амміакъ) и выщелочившееся (азотная и сѣрная кислоты) изъ почвы, и увеличилось на количество ихъ, которое можетъ доставить, главнымъ образомъ, разложеніе органической части урожайныхъ остатковъ.

Вслѣдствіе приведенныхъ измѣненій, почва, въ которой было удобоусвояемыхъ питательныхъ веществъ и растворителей какъ разъ столько, сколько нужно для произведенія известной величины урожая, можетъ, послѣ снятія съ нея такого урожая, остаться или съ такимъ же количествомъ удобоусвояемыхъ для растеній питательныхъ веществъ и растворителей ихъ какъ и до занятія поля растеніемъ, или съ меньшимъ или даже съ большимъ этаго послѣдняго количествомъ ихъ, если прибыль удобоусвояемыхъ веществъ и ихъ растворителей изъ приведенныхъ источниковъ въ теченіи того времени, что растеніе занимало поле, будетъ равна убыли тѣхъ же веществъ въ теченіи того же времени, или будетъ меньше или даже больше этой послѣдней. Третій случай, въ которомъ плодородіе (стр. 131) почвы послѣ снятія урожая сравнительно съ плодородіемъ ея до занятія ея растеніемъ, давшимъ этотъ урожай, увеличивается, какъ послѣдствіе увеличенія количества удобоусвояемыхъ питательныхъ веществъ, такъ и вслѣдствіе увеличенія количества растворителей, облегчающихъ переходъ питательныхъ веществъ въ растеніе, болѣе рѣдокъ; онъ наблюдается послѣ снятія урожая бобовыхъ кормовыхъ травъ. Подъ первый случай подходитъ состояніе многихъ изъ нашихъ черноземныхъ почвъ, которыя производятъ нерѣдко въ теченіи долгаго времени неумывающіеся урожаи полевыхъ растеній—сохраняютъ свое плодородіе. Наконецъ, второй случай, когда по снятіи урожая уменьшается плодородіе, наиболее частъ. Понятно даже, что нѣтъ почвы, которая, при вышеприведенныхъ источникахъ пополненія въ ней удобоусвояемыхъ питательныхъ веществъ и при снятіи съ нея не одного, а многихъ урожаевъ, одного

вслѣдъ за другимъ безъ промежутокъ времени, или съ промежутками времени, въ теченіи которыхъ она остается незанятою растеніемъ (паръ, залежь), неуменила бы, наконецъ, своего плодородія. Разница между почвами въ этомъ отношеніи можетъ быть только по времени; для однихъ наступаетъ, при сказанныхъ условіяхъ, уменьшеніе плодородія раньше, для другихъ позже. Наконецъ, для каждой почвы, при тѣхъ же условіяхъ, раньше или позже можетъ наступить такое уменьшеніе плодородія ея, такое *истощеніе* ея, что она не въ состояніи больше производить урожаявъ, которые оплачивали бы издержки производства ихъ (расходы на обработку почвы, уборку растеній, наемъ земли и т. д.). Въ различныхъ странахъ, мѣстностяхъ различны издержки производства урожаявъ, въ зависимости отъ величины наемной платы за землю, заработной платы и т. д., а потому должны быть различны и величины наименьшаго урожая, оплачивающаго издержки, и плодородіе почвы, производящее такой наименьшій урожай. Поэтому, почва, истощенная для условій одной страны, можетъ не быть еще такой для условій другой страны; слѣдовательно, *истощеніе почвы есть понятие экономическое и относительное*.

Но истощеніе почвы наступаетъ гораздо раньше того времени, когда изсякаютъ въ почвѣ неудобусвояемыя для растенія питательныя вещества, которые, переходя въ удобусвояемыя, пополняютъ убыль этихъ послѣднихъ въ такомъ количествѣ, въ какомъ требуется этого полученіе оплачивающихъ издержки производства урожаявъ; оно наступаетъ раньше этого, вслѣдствіе того, что убыль удобусвояемыхъ питательныхъ веществъ не покрывается достаточно полно переходомъ въ удобусвояемое состояніе нерастворимыхъ питательныхъ веществъ. Да и между питательными веществами, находящимися въ удобусвояемомъ состояніи, есть по всей вѣроятности разница, въ отношеніи легкости, съ которой они переводятся въ растеніе. Между тѣмъ какъ одни легко переходятъ въ растеніе (растворимыя), другія (поглощаемыя—въ особенности фосфорная вислота) переходятъ труднѣе, при содѣйствіи можетъ быть растворителей (углекислоты, азотнокислыхъ, амміачныхъ и др. солей); слѣдовательно большая или меньшая доступность для растенія даже удобусвояемыхъ питательныхъ веществъ зависитъ, можетъ быть отъ различнаго ихъ состоянія и присутствія въ различномъ количествѣ тѣхъ или другихъ растворителей, а потому истощеніе почвы можетъ наступить даже раньше, чѣмъ количество удобусвояемыхъ питательныхъ веществъ достигнетъ наименьшей величины, необходимой для полученія оплачивающаго издержки производства урожая, вслѣдствіе того, что въ растеніе будетъ переходить недостаточное количество удобусвояемыхъ питательныхъ веществъ, по недо-

статку ихъ въ почвѣ въ болѣе благоприятномъ для перехода въ растеніе видѣ. Такое истощеніе почвы, обуславливающееся неблагоприятнымъ состояніемъ питательныхъ веществъ въ почвѣ, можно назвать *качественнымъ* въ отличіе отъ истощенія почвы, которое есть слѣдствіе содержанія въ почвѣ питательныхъ веществъ въ недостаточномъ количествѣ и которое можно назвать *количественнымъ*.

Мы сказали выше, что снятіе съ почвы урожая измѣняетъ распределеніе питательныхъ веществъ въ почвѣ, какъ въ горизонтальной плоскости, такъ и въ отвѣсномъ направленіи внизъ. Послѣдствія нарушенія надлежащаго распределенія питательныхъ веществъ, какъ въ томъ такъ и въ другомъ направленіи, устраняются болѣе или менѣе полно механической обработкой почвы въ томъ слѣѣ почвы, который обрабатывается орудіями. Но, при воздѣлываніи растеній съ глубокопронизующими корнями и при сравнительно мелкой обработкѣ почвы, нарушеніе надлежащаго распределенія питательныхъ веществъ въ вертикальномъ направленіи и въ горизонтальной плоскости въ слѣѣ ниже обрабатывающагося можетъ имѣть послѣдствіемъ истощеніе почвы въ нижнихъ слояхъ для растеній съ глубокопронизующими корнями (стр. 500 и 502). Такое истощеніе почвы въ извѣстныхъ ея частяхъ можно назвать *мѣстнымъ* въ отличіе отъ *общаго* истощенія почвы во *всѣхъ ея частяхъ*.

Все, что мы сказали выше объ истощеніи почвы въ отношеніи всѣхъ питательныхъ веществъ вообще, остается совершенно вѣрнымъ и для каждаго питательнаго вещества въ отдѣльности; такъ какъ растеніе не можетъ развиваться, а слѣдовательно и дать какой либо урожай безъ котораго либо изъ питательныхъ веществъ (стр. 121) и, для образованія своей растительной массы, требуетъ извѣстнаго количественнаго отношенія между различными питательными веществами (стр. 123). Поэтому, почва, которая не въ состояніи доставить растенію котораго либо или нѣкоторыхъ изъ питательныхъ веществъ въ количествѣ, достаточномъ для полученія оплачивающаго издержки производства урожая, находится въ состояніи *частнаго истощенія* относительно одного или нѣсколькихъ питательныхъ веществъ—въ состояніи, которое слѣдуетъ отличать отъ состоянія *общаго истощенія во отношеніи всѣхъ питательныхъ веществъ*. Почва, истощенная частно въ отношеніи котораго либо или нѣкоторыхъ изъ питательныхъ веществъ, можетъ быть истощена такъ въ отношеніи всѣхъ растеній, (преимущественно при истощеніи ея въ отношеніи фосфорной кислоты), или же въ отношеніи какого либо одного или нѣкоторыхъ растеній, сохраняя въ тоже время свою производительность въ отношеніи другаго или другихъ растеній (преимущественно при истощеніи ея въ отношеніи кали или извести,

когда почва перестает производить растения требующія много кали: гречиху, свекловицу или требующія много извести — бобовыя растения, сохраняя въ то же время свою производительность относительно злаковыхъ растений, требующихъ сравнительно мало кали и извести). На этомъ основывается чередованіе растений (стр. 499).

Почва можетъ недовольствовать растенію достаточнаго количества котораго либо или изъ которыхъ изъ питательныхъ веществъ, или потому что она не содержитъ ихъ въ достаточномъ количествѣ вообще, или потому что не содержитъ достаточнаго количества ихъ въ удобоусвояемомъ для растений или въ удобномъ для перехода въ растеніе состояніи, по недостатку этихъ веществъ въ такомъ состояніи или по недостатку растворителей для нихъ въ почвѣ. Следовательно и *частное истощеніе* почвы можетъ быть *количественнымъ* или *качественнымъ*.

Сельскій хозяинъ не всегда довольствуется оплачивающими издержки производства урожаемъ, а следовательно и состояніемъ почвы, обезпечивающимъ такіе урожаи; онъ стремится получать возможно большіе урожаи при наименьшихъ издержкахъ производства; тѣмъ болѣе, что съ увеличеніемъ урожая многія издержки производства остаются тѣ же (рента, налогъ, обработка), что и при меньшемъ урожаѣ; многія, правда, увеличиваются, но увеличиваются меньше нежели урожай (уборка); нѣкоторыя же даже могутъ уменьшаться (полотье); такъ что съ увеличеніемъ урожая та же сумма издержекъ распределяется на сравнительно большое число четвертей, пудовъ и т. д. А потому, почва хотя неистощенная и произвождающая оплачивающіе издержки производства урожаи, можетъ въ глазахъ сельскаго хозяина быть все такъ *недостаточно производительной* и требовать усиленія ея производительности. Причины недостаточной производительности почвы тѣ же, что и истощенія; недостаточная производительность почвы можетъ происходить также отъ недостаточнаго количества одного, нѣсколькихъ или всѣхъ питательныхъ веществъ вообще или въ удобоусвояемомъ и въ удобномъ для перехода въ растеніе состояніи, въ извѣстныхъ только или во всѣхъ частяхъ почвы.

Возвратъ истощенной почвѣ утраченной ею способности производить оплачивающіе издержки производства урожаи или усиленіе производительной способности почвы, на сколько это зависитъ отъ количества, качества и размѣщенія питательныхъ для растенія веществъ въ почвѣ, — составляютъ *задачу удобрения почвы*.

Удобреніе почвы разрѣшаетъ свою задачу различными средствами, смотря по причинѣ истощенія или недостаточной производительности почвы. Если почва истощена или недостаточна произвождательна потому, что въ ней нѣтъ достаточнаго количества одного

или нѣсколькихъ или всѣхъ питательныхъ веществъ вообще для произведенія оплачивающаго издержки производства или большаго сравнительно съ прежнимъ урожаемъ, то удобреніе почвы въ состояніи возстановить или увеличить производительность почвы только внесеніемъ въ почву одного или нѣсколькихъ или всѣхъ питательныхъ веществъ въ недостающемъ почвѣ количествѣ. Если же почва истощена или недостаточно произвождательна потому, что въ ней нѣтъ только достаточнаго количества питательныхъ веществъ въ удобоусвояемомъ состояніи и растворителей, которые бы облегчали переходъ питательныхъ веществъ въ растеніе, то удобреніе почвы, смотря потому, что выгоднѣе въ данномъ случаѣ, можетъ возстановить или увеличить производительность почвы двоякимъ образомъ, или внесеніемъ въ почву недостающаго ей количества питательныхъ веществъ въ удобоусвояемомъ состояніи и растворителей, или же усиленіемъ (помощію механической обработки, улучшенія физическихъ свойствъ почвы) въ почвѣ процесса выветриванія, который обогатилъ бы почву какъ питательными веществами въ удобоусвояемомъ состояніи насчетъ нерастворимыхъ питательныхъ веществъ почвы, такъ и растворителями преимущественно на счетъ органическихъ остатковъ почвы. Если, наконецъ, почва истощена или недостаточно произвождательна потому, что почвѣ недостають въ извѣстныхъ только частяхъ ея достаточнаго количества питательныхъ веществъ, или вообще или въ удобоусвояемомъ состояніи, и растворителей, то удобреніе почвы для возстановленія или усиленія производительности почвы можетъ прибѣгнуть или къ внесенію недостающаго количества питательныхъ веществъ и растворителей въ истощенныя или недостаточно произвождательныя мѣста, или къ внесенію въ тѣ части почвы, которыя имѣютъ достаточное количество питательныхъ веществъ, такихъ веществъ, которыя способствовали бы распространенію питательныхъ веществъ на всѣ, а следовательно и на истощенныя и недостаточно произвождательныя части почвы, или, наконецъ, (помощію механической обработки) къ успешнѣйшему процессу выветриванія въ истощенныхъ или недостаточно произвождательныхъ частяхъ почвы или къ тщательному смѣшенію этихъ послѣднихъ съ неистощенными и достаточно произвождательными частями почвы.

Что касается средствъ къ возстановленію и усиленію производительности почвы, которыя находятъ удобреніе почвы въ процессѣ выветриванія подъ влияніемъ механической обработки почвы (стр. 436) и отгненія почвы растеніемъ (стр. 133 и 437), то объ этомъ мы говорили выше равно какъ и о томъ, какъ механическая обработка почвы способствуетъ равномерному распределенію питательныхъ веществъ въ почвѣ (стр. 438 и 464). Поэтому, здѣсь мы ска-

жемь лишь о томъ, чего достигаетъ удобрение почвы помощью внесения въ почву питательныхъ веществъ и ихъ растворителей и перемѣстителей. При удобрении почвы питательныя вещества и ихъ растворители и перемѣстители рѣдко вносятся въ почву въ видѣ тѣхъ соединений, въ которыхъ они дѣйствуютъ, такъ какъ это стоило бы слишкомъ дорого; большей же частью вносятся въ смѣсь съ другими болѣе или менѣе полезными, а иногда и совершенно индифферентными для цѣлей удобрения веществами, часто даже вносятся и не въ видѣ тѣхъ соединений, въ которыхъ дѣйствуютъ, а въ видѣ другихъ, изъ которыхъ лишь въ самой почвѣ образуются первыя; они вносятся въ видѣ, такъ называемыхъ, *удобрительныхъ веществъ*.

2. Удобрительныя вещества.

Число удобрительныхъ веществъ весьма велико, а потому обзоръ ихъ требуетъ известной ихъ классификаціи, группировки. Основаніемъ этой послѣдней весьма удобно можетъ служить происхождение удобрительныхъ веществъ, которыя доставляются или тремя царствами природы: минеральнымъ, растительнымъ и животнымъ, или заводами и фабриками въ видѣ отбросовъ и употребляются человекомъ для цѣлей удобрения въ сыромъ или болѣе или менѣе измѣненномъ видѣ, отдѣльно или въ смѣсь между собой. А потому, мы рассмотримъ удобрительныя вещества въ слѣдующихъ пяти группахъ: а, *удобрительныя вещества царства минеральнаго*, б, *удобрительныя вещества царства растительнаго*, в, *удобрительныя вещества царства животнаго* г, *удобрительныя вещества, получаемыя изъ отбросовъ скотоводства; заводовъ и фабрикъ и д, *смысленныя удобрительныя вещества*.*

а) Удобрительныя вещества царства минеральнаго.

аа) Известняки (стр. 69), известковые желваки, известковые туфы и мѣль состоятъ, главнымъ образомъ, изъ *углекислой извести*, къ которой примѣшиваются иногда: углекислая магнезия, глина въ болѣе значительномъ—а сѣрнистое желѣзо (желѣзный колчеданъ, пиритъ), фосфорная кислота, щелочи (каль), органическое вещество въ менѣе значительномъ количествѣ.

Между плотными известняками различаютъ *обыкновенные* съ содержаниемъ углекислой извести не менѣе 80%, *доломитовые* *) и *гидравлическіе* съ значительнымъ содержаниемъ: первыя углекислой магнезии, вторые—глины и кремнезема (свыше 10%).

*) Доломитовый известнякъ вскипаетъ съ кислотой труднѣе обыкновеннаго; иногда только по измелеченію его въ порошокъ. Известняки вообще отличаются отъ сходныхъ съ ними иногда кварцевыхъ и полевошпатныхъ горныхъ породъ меньшей твердостью—первыя чертаются ножомъ, чего не дѣлаютъ послѣднія, и вскипаніемъ, которое замѣчается у первыхъ при облитіи ихъ кислотой.

	ИЗВЕСТНЯКИ:				Доломитовый.	Гидравлический.	Известковые желваки.	Мель.
	обыкновенные.							
углекислой извести	98,5	81,70	81,49	97,31	45,79	61,78	86	98
" магнезии	—	1,56	1,33	—	48,72	4,63	—	1
кремнистаго вещества	—	12,43	14,91 ¹⁾	—	—	—	11	—
глины	1,5	—	—	1,31	1,77	27,53	—	—
кремнезема		—	—				—	—
глинозема	—	—	1,65	0,03	1,33	2,82	—	1
окиси желѣза	—	—	—	—	—	—	—	—
желѣзнаго колчедана	—	2,70	—	—	—	—	—	—
сѣрнистой извести (гипса)	—	0,08	—	—	—	—	—	—
фосфорной кислоты	—	—	—	1,22	—	—	—	—
органическаго вещества	—	1,30	—	—	—	—	—	—
воды	—	—	—	—	2,01	3,24 ²⁾	—	—
	100,0	99,83	99,38	99,872	99,62	100,00	97	100

¹⁾ въ томъ числѣ 0,4% щелочей (0,3% кали и 0,1% натра) ²⁾ въ томъ числѣ и прочаго.

Для удобрения употребляются, однако, не известняки, а приготовляемая изъ нихъ *жирная известь*. Известняки обжигаются въ ямахъ, кучахъ, напольныхъ или особыхъ известко-обжигательныхъ печахъ (см. ниже), которыя устраиваются для періодическаго или для непрерывнаго обжиганія, помощью каменнаго угля, кокса, торфа, дровъ и даже вереска, дрока и т. д.; при чемъ топливо сжигается съ известняками или нѣтъ. Смотря по роду известняка, употребленнаго для обжиганія, по роду топлива и по способу обжиганія, получается болѣе или менѣе *жирная*, болѣе или менѣе *тощая*, болѣе или менѣе свободная отъ разныхъ примѣсей известь.

Жирная известь, получающаяся изъ болѣе чистыхъ известняковъ, содержащихъ 95—99% углекислой извести, бѣлаго цвѣта, при гашеніи ея поглощаетъ воды больше тощей (въ 2½ раза своего вѣса, при этомъ значительно увеличиваетъ свой объемъ (въ 3½ раза) и сильно разгорячается. Тощая же известь, которая получается изъ менѣе чистыхъ известняковъ, содержащихъ всего отъ 50 до 80% углекислой извести, болѣе частью желтоватого цвѣта, при гашеніи вбираетъ воды менѣе жадно чѣмъ жирная, увеличивая при этомъ свой объемъ (въ 1½ раза, и разгорячается слабѣе жирной). Тощая известь можетъ быть обыкновенная, доломитовая или гидравлическая, смотря потому, изъ какого известняка она получена. Впрочемъ, она можетъ быть получена и изъ болѣе богатаго углекислой известью, обыкновеннаго известняка, если при обжиганіи не было принято предосторожностей, обуславливающихъ полное выдѣленіе углекислоты и предупреждающихъ сплавленіе углекислой извести или слишкомъ значительное образование и сплавленіе кремнистой извести. Жирная известь, кромѣ примѣсей, содержащихся въ ней по происхожденію ея изъ того или другаго известняка, приобретаетъ, вслѣдствіе обжиганія, еще новыя въ водѣ топлива (см. ниже),

если обжигается въ смѣси съ топливомъ. Кромѣ того обжиганіе измѣняетъ находящіяся въ ней примѣси; такъ, превращаетъ сѣру колчедана въ сѣрную кислоту, которая, соединяясь съ известью, образуетъ гипсъ, или дѣлаетъ болѣе растворимыми щелочи находящіяся въ известнякахъ силикаты, вѣдѣствіе дѣйствія на эти послѣднія извести при болѣе высокой температурѣ.

Известь вывозится въ поле для удобренія *гашеной* или *негашеной*. Негашеная (комовая, кипѣлка) известь имѣетъ видъ тѣхъ кусковъ известняка, изъ которыхъ она получена обжиганіемъ, и если эти куски намочить водой, то они, разгоричаясь, распадаются въ самый мелкій порошокъ болѣе или менѣе полно, смотря по чистотѣ извести и полнотѣ обжиганія; если же при этомъ, несмотря на достатокъ воды, остаются нераспадающіеся въ порошокъ куски, то, значитъ, известь нечиста или же не вполне обожжена. Распадающійся въ порошокъ часть извести соединяется химически съ извѣстнымъ количествомъ воды: 3 фунта чистой негашеной, ѣдкой извести поглощаютъ 1 фунтъ воды и даютъ 4 фунта гашеной извести или, химически, *гидрата извести*; то же количество воды, которое требуется для гашенія извести сверхъ этого послѣдняго, испаряется въ большомъ количествѣ, вѣдѣствіе развивающейся при гашеніи высокой температуры. Жженая, ѣдкая известь, соединившись съ водой или превратившись въ гидратъ, начинаетъ поглощать углекислоту изъ окружающаго ее воздуха, превращаясь снова въ углекислую известь. Впрочемъ, жженая известь, оставаясь на воздухѣ, сама притягиваетъ изъ воздуха влагу, иначе *гасится произвольно*; если такое произвольное гашеніе происходитъ не подъ наѣсомъ, что требуетъ значительнаго помѣщенія, то известь можетъ гаситься и дождевой водой, при чемъ, въ случаѣ избытка влаги, она легко сваливается въ комокъ. Самопроизвольное гашеніе вообще невыгодно тѣмъ, что оно происходитъ медленно и много извести теряетъ свои ѣдкія свойства, превращаясь въ углекислую. Поэтому, самопроизвольному гашенію предпочитаютъ гашеніе полавкой и въ особенности погруженіемъ подъ воду, такъ какъ въ этихъ случаяхъ гашеніе происходитъ быстрѣе и можетъ быть употреблено надлежащее количество воды. Погруженіемъ известь гасится удобнѣе всего такъ: помѣщенная въ ивовыя корзины, вмѣщающія отъ 40 до 50 фунт. ея, она погружается въ наполненный водой чанъ такъ, чтобы быть совершенно покрытой водой. При этомъ замѣчается вначалѣ выдѣленіе заключающагося въ извести воздуха въ видѣ большихъ пузырей, которое черезъ 3—4 минуты почти совершенно прекращается—признакъ, что известь поглотила все нужное ей для гашенія количество воды. Тогда вынимаютъ корзину изъ-подъ воды и выбрасываютъ изъ нея известь въ кучу, въ которой она, по истеченіи $\frac{1}{4}$ часа, распадается въ мельчайшій порошокъ.

66) Гипса волокнистаго, зернистаго (алебастръ) или землянистаго строенія состоитъ преимущественно изъ *водной сернокислой извести* съ примѣсью весьма незначительнаго количества постороннихъ веществъ.

Такъ напр. одинъ образецъ гипса содержалъ: кристаллическаго воднаго гипса 92,6%, глина 3,9%, углекислыхъ: извести 1,3% и магнезій 0,1%, желѣзнаго колчедана 0,8%, свободной сѣры (?) 0,7%, кремнезема 0,1% и гигроскопической воды 0,4%; потери при анализѣ составляла 0,1%. Гипсъ отличается отъ известняка меньшей твердостью—онъ чертится ножомъ, известнякъ нѣтъ; растворимостью въ водѣ—онъ хотя мало но растворяется въ водѣ (1 часть его въ 400—500 част. воды), тогда какъ углекислая известь почти нерастворима въ водѣ; наконецъ, нескиппаніемъ съ кислотами—гипсъ несовсѣмъ чистый, вскипаетъ съ кислотами лишь въ началѣ *). Кромѣ того, хотя рѣже, употребляется для удобренія плотный, кристаллическій значительно твердый *ангидритъ*—безводная серновислая известь.

Для удобренія употребляется *обоженный* (лишенный воды) или *необоженный* гипсъ довольно безразлично, хотя многіе избѣгаютъ употребленія перваго, который, отвердѣвая съ водой, легко образуетъ помки и потому можетъ быть вреденъ на влажной почвѣ; но какъ тотъ такъ и другой—всегда въ возможно мелко измелченномъ состояніи. Обжиганіе же облегчаетъ измелченіе, хотя требуется вѣнковаго расхода на топливо.

Гипсъ обжигается въ уфренномъ жару, несвыше 160° Ц. Небольшія количества гипса, по предварительномъ измелченіи, обжигаются въ желѣзныхъ котлахъ или на плоскихъ желѣзныхъ протинахъ при постоянномъ помѣшаніи; обжиганіе оканчивается, если холодная металлическая пластинка, которую держатъ надъ гипсомъ, не покрывается болѣе водой, есиа, значитъ, удалена изъ гипса вся вода. Большія же количества его обжигаются въ печахъ подобныхъ хлѣбопечарнымъ или, даже, въ самыхъ хлѣбопечарныхъ печахъ, по вынутіи хлѣбовъ. По истопленіи печи дровами, какъ для печенія хлѣбовъ, очищаютъ подъ печи отъ угля, когда температура достаточно высока, и разсыпаютъ гипсъ въ несильномъ большихъ кускахъ. Затѣмъ, закрываютъ всѣ отверстія въ печи, за исключеніемъ одного въ верхней части топочнаго отверстія, и вынимаютъ гипсъ, когда онъ выдѣлитъ всю воду, въ чемъ убѣждаются помощію холодной металлической пластинки, вносимой черезъ оставленное отверстіе. Послѣ этого печь можетъ быть снова вытоплена и т. д. Гипсъ можно обжигать и въ известко-обжигательныхъ печахъ, особенно периодическихъ съ зольникомъ. Здѣсь, какъ и при обжиганіи извести, сперва выводится сѣмъ изъ большихъ камней, а затѣмъ панозняется печь камнями такъ, чтобы большіе изъ нихъ приходились ближе къ топкѣ и въ срединѣ печи, а меньшіе наверху и у стѣнъ печи. По наполненіи печи, поддерживается уфренный огонь помощію легкаго дерева, хвороста до тѣхъ поръ, пока освобождающійся изъ печи воздухъ небудетъ содержать болѣе влаги, что узнается прежде указаннымъ способомъ. Но, даже при самомъ старательномъ управленіи огнемъ, всегда близшіе къ огню камни лагрѣваются слишкомъ сильно, такъ что спекаются или даже сплавляются на поверхности. Для обжиганія гипса употребляютъ также четырехугольныя пространства, глубиной 18 и шириной 9 фут.,

*) Для различенія химическимъ путемъ можно руководствоваться слѣдующимъ: на стр. 161.

окружения тремя стѣнами, вышиной въ 9 фут., и покрыты легкой крышей. Въ этомъ пространствѣ параллельно боковымъ стѣнамъ, устраиваются очелки изъ болѣе крупныхъ камней и пространство поверхъ ихъ накладывается камнями. Въ очелкахъ помощью хвороста поддерживается умирный огонь. Конечно, удобнѣе вмѣсто такой открытой середи печи, устраивать печь съ четырьмя стѣнками, подобную кирпиче-обжигательной безъ зольника. Безъ сомнѣнія выгоды сжигать топливо въ печи съ зольникомъ, а потому печь для обжига гиса можетъ совершенно походить на кирпиче-обжигательную печь съ зольниками, или можно даже весьма хорошо употребить для обжига гиса небольшую кирпиче-обжигательную печь. Гисъ измельчается въ малыхъ количествахъ въ ступѣ, въ большихъ—подъ бѣгунами.

в) *Поваренная соль*, употребляющаяся для удобрения, содержитъ всегда 0-бокъ съ хлористымъ натріемъ, ея главной составной частью, большее или меньшее количество естественныхъ (сѣрнокислыхъ и хлористыхъ извести, магнезін, кали и натра, углекислой извести, песку глины, воды и т. д.) или искусственныхъ (папр. уголь, точеный кирпичъ) примѣсей; такъ какъ для удобрения, въ виду высокой цѣны болѣе чистой соли по причинѣ употребленія ея въ пищу и существованія анциза, употребляется или мѣтѣ чистая отъ природы или же свободная отъ анциза, испорченная искусственными подмѣсями соль.

Такъ, удобрительная соль изъ Велички, испорченная искусственной подмѣсью угля, содержитъ: 90% хлористаго натріа, 0,5% гиса, 2% угля и 7,5% постороннихъ веществъ.

г) *Съемочная соль*, которую доставляютъ верхніе слои нѣкоторыхъ залежей каменной соли иногда весьма значительной толщины, напр. въ 760 фут. въ Прусскихъ Стассеуртскихъ копяхъ, и которая содержитъ въ себѣ большее или меньшее, но всегда значительное количество сѣрнокислыхъ и хлористыхъ солей кали, *) натра, магнезін и извести, составляющихъ обыкновенно примѣси нечистой поваренной соли.

Эти соли образуютъ различные минералы: *каинитъ* (сѣрнокислыя: кали и магнезін, хлористый магній и вода), *полигалитъ* (сѣрнокислыя: известъ, магнезін и кали, хлористый магній и вода), *карналитъ* (хлористые кали и магній и вода) и содержатся въ различныхъ частяхъ слоя съемочной соли въ весьма различныхъ количествахъ, вѣкъ показываютъ слѣдующіе анализы четырехъ образцовъ съемочной соли.

Углекислой извести	—	—	4,4	0,33
Сѣрнокислой "	—	—	19,1	2,00
Борнокислой магнезін	—	—	—	4,10
Сѣрнокислой "	—	—	2,4	—
Хлористаго магнія	31,49	20,80	—	22,73
натрія	2,69	38,48	57,5	29,08
Сѣрнокислаго кали	15,79	9,28	2,0	19,20
" натра	14,34	10,88	1,9	17,21

*) Залежь калиевыхъ солей открыта также въ Величкѣ (Галиція), легко можетъ быть открыта и у насъ.

Песку и глины	—	1,09	5,6	1,76
Воды	35,72	19,47	7,1	3,58

Въ послѣднее время изъ различныхъ минераловъ, паходящихся въ слояхъ съемочной соли, стали готовить: 1) сырое сѣрнокислосое кали, 2) концентрированный калиевый соли: а) трехъ и б) пятиконцентрированную, 3) сырую кали-магнезін, называемую также калиевымъ удобрениемъ, 4) очищенное сѣрнокислосое кали и б) очищенную сѣрнокислую кали-магнезін—туки, въ которыхъ гарантируется известное содержаніе кали *), которые продаются въ состояніи мелкаго порошка, но которыхъ названіе не всегда отвѣчаетъ химическому составу, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	1.	2 а.	2 б.	3	4.	5.
Сѣрнокислой извести	3,18	3,27	0,36	—	0,09	—
" магнезін	4,38	8,63	0,69	34,90	—	37,0
Сѣрнокислаго кали	8,25	—	—	5,26	89,84	54,0
" натра	—	—	—	—	5,39	—
Хлористаго магнія	9,52	1,78	1,62	—	—	—
" натрія	48,00	26,83	15,00	34,00	1,06	2,5
" калия	7,47	47,23	76,00	19,37	—	—
Извести	0,95	—	—	—	—	—
Магнезін	2,40	0,75	—	1,21	1,56	—
Окиси желѣза	—	0,34	—	—	—	—
Окиси желѣза и глинозема	0,73	—	—	—	—	—
Сѣрной кислоты	2,67	—	—	—	—	—
Песку	3,67	1,47	0,57	—	—	—
Глины, желѣзистаго золь	—	—	—	3,50	—	—
Легучей золь	—	—	—	—	0,35	—
Нерастворим. сост. частей	—	—	—	—	0,71	—
Воды	8,77	8,91	5,76	1,76	—	3,0
	100,00	99,21	100,00	100,00	99,00	100,0

*) выхъ съ взвѣсомъ и т. д.

д) *Апатиты, фосфориты, самородъ* (рогачъ, черный камень), *остеолиты и копролиты*, содержащіе фосфорнокислую известъ въ большемъ или меньшемъ количествѣ различныхъ примѣсей.

Апатитъ (стр. 70) встрѣчается въ видѣ правильныхъ кристалловъ, въ видѣ только кристаллической массы, въ видѣ волокнистой, листоватой, грубозернистой массы или даже въ видѣ круглыхъ зеренъ бѣлаго, сѣраго, желтаго, зеленого, синяго, свѣтло-краснаго до свѣтло-бураго и даже краснаго цвѣта. Въ болѣе чистомъ видѣ онъ состоитъ изъ нерастворимой (трехосновной) фосфорнокислой извести (92,81%) и фтористой извести (7,69%) или изъ первой (89,38%) и хлористой извести (10,62%); въ мѣтѣ чистомъ аморф-

*) Въ заводѣ Д-ра А. Франка въ Стассеуртѣ 1 таможенн. центнеръ или пудъ съ гарантированными % кали 10-12% 30-33% 50-53% 16-18% 38% или 50-52% 28-30% стоимость грошей или коп. 15 50 80 25 100 147 1/2 85 считая по металлическому или нормальному курсу, приблизительно.

номъ видѣ апатитъ встрѣчается въ видѣ массы различнаго цвѣта и плотности, называемыхъ *фосфоритами*. *Остеолитами* и *копролитами* называютъ также менѣ чистыя фосфорнокисло-известковыя массы, встрѣчающіяся въ видѣ окаменѣлыхъ костей допотопныхъ животныхъ (остеолиты), или почковидныхъ массъ величиной отъ лѣнаго орѣха до куриного яйца и болѣе, окрашенныхъ въ болѣе или менѣ темные желтый, даже черноватый цвѣтъ, и представляющихъ или окаменѣлыя изверженія допотопныхъ животныхъ (собственно копролиты) или фосфорнокисло-известковыя сростки (называемые иногда также копролитами). Фосфорнокислая известь нерѣдко служитъ цементомъ, связываетъ песчинки (кварцевыя), образуя сростки въ видѣ плитъ коричневаго цвѣта или двойнаго рода кругляковъ: сѣраго, сѣропато-чернаго, зеленовато-чернаго и коричневаго цвѣта, съ гладкой, какъ-бы полированной поверхностью и съ ровнымъ изломомъ землистаго сложенія и сѣраго цвѣта, переходящаго на краяхъ въ черный; или зеленовато-чернаго, коричневаго или сѣраго цвѣта съ неровной поверхностью или съ покрывающей ихъ блестящей поливой, если они обтерты, и съ неровнымъ песчанистымъ изломомъ. Такая плита и такіе кругляки подъ названіемъ *саморода, чернаго камня, рота* встрѣчаются въ большемъ количествѣ у насъ, иногда непосредственно подъ верхнимъ слоемъ земли, между рѣками Десной и Волгой, въ губерніяхъ: Смоленской, Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Симбирской и Саратовской, преимущественно же въ Орловской, Курской, и Воронежской губ. и въ меньшемъ количествѣ по берегамъ Урала и въ губерніяхъ: Нижегородской, Московской, Ярославской, Новгородской, С.-Петербургской, Гродненской, Подольской и Киевской.

Слѣдующая таблица показываетъ составъ этихъ различныхъ минеральныхъ массъ, употребляемыхъ для удобренія почвы подъ различными названіями. (См. 553 стран.).

Эти минеральныя вещества въ ихъ естественномъ видѣ непригодны для удобренія, такъ какъ нераспределены въ почвѣ съ тою равномерностію, которой требуетъ задача удобренія, и мало доступны растворителямъ. А потому, для устраненія этихъ послѣднихъ неудобствъ, они подвергаются или *одной механической обработкѣ* или *механической и затѣмъ еще химической обработкѣ*. Механическая обработка можетъ заключаться или въ одномъ измѣщеніи ихъ. (напр. апатитовъ, болѣе богатыхъ содержаніемъ фосфорной кислоты фосфоритовъ, копролитовъ) помощью особенныхъ дробильныхъ машинъ и жернововъ, при чемъ получается минеральное вещество въ состояніи *болѣе или менѣ мелкаго порошка*, или въ измѣщеніи и подстигиваніи продуваніи (напр. саморода, менѣ богатыхъ фосфорной кислотой фосфоритовъ), которымъ отдѣляются болѣе мелкія, содержащія фосфорную кислоту частички (цемента саморода) отъ болѣе крупныхъ, не содержащихъ фосфорной кислоты (песокъ саморода), при чемъ получается *болѣе мелкій порошокъ* минеральнаго вещества, *болѣе или менѣ обогащенный въ содержаніи фосфорной кислоты* сравнительно съ минеральнымъ веществомъ въ его естественномъ состояніи. Измельченіе и подстигиваніе—механическая обработка, измѣлчая минеральное вещество, увеличиваетъ поверхность его, на которую могутъ дѣйствовать растворители, и увеличивая въ немъ

	Апатиты.	Фосфориты.	Остеолиты.	Копролиты.	Саморода							
					кругляки.				плиты.			
Фосфорной кислоты	41,54	43,28	19,41	47,16	25,32	6,99	26,75	17,90	22,07	28,65	13,20	14,25
Извести	53,46	53,50	24,20	48,16	35,42	12,26	45,39	33,58	37,90	43,60	22,40	22,85
Фосфорнокислой извести, вычисленной по фосфорной кислотѣ	90,66	94,48	42,37	92,03	55,27	15,25	58,39	39,08	48,13	62,54	28,81	31,06
Окиси желѣза	1,79	—	0,86	1,56	2,07	—	1,87	—	—	—	—	—
Глинозема	—	—	4,61	—	2,30	—	2,57	0,53	1,07	2,00	0,25	0,30
Фосфорнокислой окиси желѣза и глинозема	—	—	—	4,97	—	—	—	—	—	—	—	—
Углекислоты	—	—	—	2,21	6,98	3,45	5,13	—	—	—	—	—
Углекислой извести, вычисленной по углекислотѣ	—	—	—	—	15,87	8,84	11,66	—	—	—	—	—
Кали	—	—	—	0,06	4,69	—	0,84	—	—	—	—	—
Натра	—	—	—	—	—	—	0,70	—	—	—	—	—
Магnezия	—	—	1,27	0,75	1,31	0,48	0,44	0,44	0,90	0,25	0,25	—
Закиси желѣза	—	—	13,17	—	—	—	1,06	—	—	—	—	—
Сѣрной кислоты	—	—	—	—	—	—	4,95	—	—	—	—	—
Фтора и потери	—	—	—	—	14,67	—	—	—	—	—	—	—
Фтористой извести	3,07	сѣды	8,39	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Хлористаго кали	4,17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— натрия	—	—	—	—	—	1,96	сѣды	—	—	—	—	—
Силиката и кремневой кислоты	—	0,29	13,72	4,97	—	—	6,22	—	—	—	—	—
Нерастворимаго кварцеваго песку	—	—	—	—	—	—	—	34,69	25,87	9,15	57,10	53,70
Нерастворимаго въ кислотѣ органическаго вещества	—	—	—	—	—	—	—	—	0,53	1,00	0,30	0,40
Органическаго вещества	—	—	9,93	—	—	74,03	—	—	—	—	—	—
Воды	—	—	1,90	1,31	2,70	—	4,01	—	—	—	—	—

Содержаніе большого или меньшаго количества (отъ 15 до 30%) фосфорной кислоты въ самородѣ опредѣляется содержаніемъ въ этомъ послѣднемъ большого или меньшаго количества цемента (который почти всегда содержитъ одинаковыя количества фосфорной кислоты — около 30%) сравнительно съ количествомъ зеренъ песка, который онъ связываетъ.

содержаніе фосфорной кислоты, дѣлаетъ его удобо-распределѣнѣе и доступнѣе для растворителей. Но, растворимость фосфорной кислоты въ такомъ минеральномъ веществѣ можетъ быть еще болѣе увеличена, если измѣнить химическую природу соединенія, въ которомъ находится въ немъ фосфорная кислота, обработкой его обогащеннаго порошка сѣрной кислотой. Эта послѣдняя переводитъ нерастворимую (трехосновную) фосфорнокислую известь минеральнаго вещества

при содержаніи растворимой фосфорнокислой извести.	8,90%	12,00%	18,30%
» » » фосфорной кислоты.	5,35%	7,25%	11,00%
» » нерастворимой фосфорнокислой извести.	25,45%	0,45%	6,3%
» » » фосфорной кислоты.	11,87%	14,73%	3,35%

ее) *Чилийская* (натровая, кубическая) селитра, накопленная природой въ большихъ количествахъ въ Чили, въ томъ нечистомъ состояніи, въ которомъ продается для удобрительныхъ цѣлей, содержитъ 0-бокъ съ преобладающимъ въ ней азотнокислымъ натромъ, состоящимъ изъ 63,53% азотной кислоты, въ томъ числѣ 16,47% азота, и 36,47% натра, отъ $\frac{1}{2}$ до 5% примѣсей (поваренной соли, серновислого натра, песку, воды...). Она употребляется для удобрения въ видѣ мелкаго порошка.

б) Удобрительныя вещества царства растительнаго

могутъ быть: или *убранная съ известнаго мѣста различнаго рода растительная масса* (солома, листья и т. д.), которая употребляется большей частью для удобрения не того мѣста, съ котораго она взята; или *урожайные остатки*, въ видѣ жнивья, дернаши, идущіе на удобрение мѣста произрастанія оставляющихъ ихъ растений; или же, такъ называемое, *зеленое удобрение*, т. е. растения, нарочно высажены на мѣстѣ, которое предполагается удобрить ими, и достигшія уже значительной степени развитія, большей частью цвѣтущія.

Изъ перваго ряда удобрительныхъ веществъ царства растительнаго назовемъ: соломы разныхъ полевыхъ растений, воздѣлывающихся для зерна (напр. хлѣбныхъ злаковъ) или для листьевъ и цвѣтовъ (напр. табака, хмѣля); листья и стебли корнеплодныхъ (свеклы, моркови и т. д.) и клубневыхъ растений (картофеля, земляной груши); листья лиственныхъ и хвойныхъ деревьевъ (лисной соръ), верескъ, папоротники, хмь, различныя полевые сорные травы, дерезу (*Spartium scoparium* L.), вѣйникъ, камышъ, осоки, ситники, хвощи и морскія водоросли. Составъ этихъ различныхъ веществъ видѣнъ изъ помѣщенной въ приложеніи къ этой книгѣ таблицы химическаго состава кормовыхъ и подстилочныхъ средствъ. Эти вещества, за исключеніемъ морскихъ водорослей, употребляются для удобрения почти всегда въ смѣси съ другими удобрительными веществами, преимущественно животными изверженіями, какъ подстилочные средства, почему о нихъ будетъ рѣчь ниже.

Впрочемъ, у насъ съ одной стороны встрѣчается такое изобиліе соломы, что, при недостаточномъ скотоводствѣ, все количество имѣющейся соломы не можетъ быть употреблено въ кормъ или подстилку и такимъ образомъ переработано въ удобрительное вещество; съ другой — у насъ есть немало нечерноземныхъ почвъ, нуждающихся для своего улучшенія въ значительномъ увеличеніи въ нихъ содержанія органическаго вещества, а потому нелишнимъ будетъ привести здѣсь сдѣланный въ Швеціи опытъ успешнаго превращенія соломы въ удобрительное вещество поммо скотнаго двора и давно употребительный во Франціи способъ Жоффре превращенія въ удобрительное вещество поммо же скотнаго двора другихъ растительныхъ массъ. Въ первомъ случаѣ солома была сложена въ кучу 6—8 фут. вышины, промочена, затѣмъ, водой, въ которой размочены и изболтаны были рапсовыя жмыхи, и прикрыта, наконецъ, для удержанія газовъ, развивающихся во время броженія внутри кучи, слоемъ земли въ 4—5 дюйм. толщины. По истеченіи мѣсяца, куча была перекопана и снова промочена и оставлена въ покое до тѣхъ поръ, пока масса не оказалась пригодной для вывозки въ поле какъ хлѣвнаго навоза. Изъ 30 возовъ соломы и 9 пудовъ рапсовыхъ жмыховъ было получено, такимъ образомъ, черезъ 2½ мѣсяца, около 30 возовъ удобрительнаго вещества, который (1) по сравненію съ хлѣвнымъ навозомъ (2) содержалъ:

	1	2
воды	74,36 %	79,30 %
органическаго вещества	15,63 „	14,01 „
зола	10,01 „	6,69 „
въ томъ числѣ: азота	0,23 „	0,41 „
фосфорной кислоты	0,10 „	0,20 „
кали	0,17 „	0,50 „

Десятина земли, при вывозѣ на нее 2400 пуд., этого навоза (1) сравнительно съ такимъ же количествомъ хлѣвнаго навоза (2), получила бы:

	1	2
переизбытка органическаго вещества	375,0 пуд.	338,0 пуд.
золистыхъ частей	240,0 „	160,0 „
азота	5,7 „	9,6 „
фосфорной кислоты	2,4 „	4,8 „
кали	4,0 „	12,0 „

Недостающее въ соломенномъ навозѣ, сравнительно съ хлѣвнымъ, количество азота, фосфорной кислоты и кали можетъ быть пополнено прибавленіемъ соответствующаго количества доневыхъ жмыховъ, фосфорновислого известковыхъ тувова и зола. Второй способъ Жоффре разнится отъ предпущаго тѣмъ: 1) что превращается въ навозъ не одна солома, но и различныя растительныя вещества, какъ-то: сорные травы, верескъ, дрокъ, тростникъ, даже древесныя вѣтви, при чемъ болѣе грубыя, твердыя вещества должны быть изрѣзаны на части (2, 3 пал. болѣе) или же размяты, напр. повозками при настлѣкѣ ихъ на проѣзжихъ мѣстахъ. 2) Для смачиванія растительной массы употребляется жидкость, приготовляемая изъ различныхъ способныхъ ускорить разложеніе растительной массы веществъ, напр. изъ воды, въ которой гноятся болѣе сочныя травянистыя растенія, напр. крапива, молочай, огуречная трава, живокость и т. д. и въ которой затѣмъ растворяются: животныя изверженія, сажа, гипсъ, известь, зола и т. д.; или, что проще, изъ человеческихъ и прочихъ изверженій, извести и зола, которые распускаются въ водѣ. Такъ, напр., если взять по $\frac{1}{4}$ четверти названныхъ веществъ, то, при достаточномъ количествѣ воды, можно превратить или въ навозъ около

50 пудовъ вереска, тростника, дрова и другихъ подкустарныхъ растений и около 25 пуд. соломы. 3) На несколько покатомъ, хорошо утрамбованномъ мѣстѣ, окруженномъ небольшою земляною валомъ, въ предупрежденіе стеканія съ него дождевой воды и употребляемой для поливки жидкости, и находящемся вблизи воды, чтобы устранивъ расходы на подвозку этой послѣдней, растительныя вещества, предварительно хорошо промоченныя въ жидкости находящейся въ резервуарѣ, помѣщаемомъ возлѣ мѣста закладки кучи, въ самомъ низшемъ мѣстѣ этого послѣдняго, укладываются по-слоино и возможно плотно въ цилиндрическую кучу вышиною 6—9 фут., заливаются хорошенько жидкостью, прикрываются соломой, травами или досками и убиваются хорошенько дощатой по окружности кучи. Къ концу вторыхъ сутокъ масса приходитъ въ броженіе, такъ что температура внутри ея повышается до 12—16°. а къ концу пятыхъ начинаетъ издавать запахъ навоза; въ это время если только прекратилось истеченіе жидкости изъ кучи, производятъ первую поливку ея, помощью насоса или ведеръ, жидкостью изъ того же резервуара, въ которомъ смачивались растительныя вещества и въ который добавляютъ воду, по мѣрѣ убыли ея изъ него для поливки; предварительно поливки снимаютъ покрывку и порыхляютъ вилами поверхность кучи, а когда окончится поливка снова прикрываютъ кучу. Въ седьмые сутки, примерно, и въ девятые когда температура внутри кучи достигаетъ температуры 60°, повторяютъ поливку, при чемъ, раскрывъ каждый разъ кучу, производятъ поливку въ дыры, продѣлываемыя въ кучѣ: въ первый разъ на глубину 1½ арш., а во второй глубже; по окончаніи же поливки, утаптываютъ каждый разъ кучу, задымываютъ дыры и снова прикрываютъ кучу. Послѣ послѣдней поливки температура массы понижается до 48° и даже 40°; броженіе стихаетъ и масса остается въ такомъ состояніи нѣкоторое время, прежде нежели будетъ употреблена для удобренія. Вообще броженіе можетъ быть ослаблено и даже остановлено сильной поливкой. Все время приготовления навоза необходимо наблюдать за тѣмъ, чтобы стекающая жидкость не терялась, а, стекая въ резервуаръ, могла бы служить для новыхъ поливокъ.

Конечно, способъ этотъ въ описанномъ видѣ требуетъ много рабочихъ рукъ и потому едва ли можетъ найти большое примѣненіе у насъ, но онъ можетъ служить въ нѣкоторой степени руководствомъ въ подобныхъ случаяхъ полезнаго обращенія растительныхъ массъ въ навозъ помимо скотнаго двора. Такое превращеніе растительныхъ массъ въ навозъ, требуя извѣстнаго тепла, для успѣха своего выполненія не можетъ производиться въ теченіи зимы, а должно происходить въ теченіи весны, лѣта или осени; что еще болѣе затрудняетъ, конечно, его примѣненіе, такъ какъ въ это время рабочія руки менѣе свободны; но бывають все же свободны.

Морскія же водоросли въ прибрежныхъ странахъ употребляются перфдо сами по себѣ въ сѣбжеомъ состояніи, въ какомъ они выбрасываются моремъ на берегъ или собираются съ выходящихъ изъ моря свалъ, или же въ вышечечномъ дождями и болѣе или менѣе сухомъ состояніи. Масса морскихъ водорослей обыкновенно пропитана въ большемъ или меньшемъ количествѣ морской солью и содержитъ примѣсь частей рыбныхъ организмовъ и полиповъ, раковинъ и т. д.

Составъ втораго ряда удобрительныхъ веществъ царства растительнаго видѣнъ изъ приведенныхъ на стр. 493 цифръ. Урожайные остатки употребляются, конечно, въ дѣло въ томъ видѣ, въ которомъ они остаются растениями.

Наконецъ, для зеленого удобренія употребляются весьма различныя растенія; главнымъ образомъ, однако: изъ бобовыхъ растений

люпинны, бѣлый и желтый, конскіе бобы, пика, мясокрасный клеверъ (инкарнатъ); изъ крестоцвѣтныхъ—бѣлая горчица, рапсъ и сурфинна; изъ гречишныхъ—гречиха; изъ гвоздичныхъ—шпергель (то-рица) и изъ злаковыхъ—рожь.

Растеніе тѣмъ лучше для зеленого удобренія; 1) чѣмъ болѣе оно, при со-отвѣтственности его данному климату, мирится съ малоплодородной почвой въ силу способности его корней легко выбирать пищу изъ почвы (стр. 500); 2) чѣмъ болѣе корни его углубляются въ почву и обогащаютъ, вслѣдствіе этого, верхніе слои почвы питательными для растенія веществами на счетъ нижнихъ; 3) чѣмъ болѣе растительная масса, которую оно образуетъ и чѣмъ лучше отбѣгаетъ оно почву; 4) чѣмъ легче разлагается образуемая имъ растительная масса, слѣдовательно чѣмъ болѣе содержитъ она воды, бѣловыхъ веществъ (азота) и чѣмъ менѣе—древесины и кремневой кислоты (стр. 91); 5) чѣмъ быстрее образуетъ оно эту массу, слѣдовательно чѣмъ короче періодъ его произрастанія и 6) наконецъ, чѣмъ дешевле стоятъ его сѣмена, что обусловливается въ значительной степени количествомъ сѣмянъ потребныхъ для обсемененія десятины.

Вотъ порядкомъ, въ которомъ можно размѣстить выше приведенныя растенія, начиная съ наиболѣе и кончая наименѣе удовлетворяющимъ изъ нихъ требованіямъ зеленого удобренія, въ каждомъ изъ шести отношеній:

въ первомъ:		во второмъ:		въ третьемъ:		пудовъ зеленой массы, средняго числѣмъ съ де- сятины.
люпинъ	особенно на песчаной почвѣ.	люпинъ	конскіе бобы инкарнатъ-кле- веръ	люпинъ—2000	конскіе бобы гречиха рапсъ горчица сурфинна вика—1000 инкарнатъ-клеверъ 900 рожь шпергель } 600	
гречиха		ника		1260		
шпергель		ника		1000		
конскіе бобы на глинистой.	{на сугли- нистой.	ника	рапсъ сурфинна горчица гречиха шпергель рожь	900		
вика		рапсъ				
инкарнатъ-клеверъ		сурфинна				
рожь на песчаной и сугли- нистой.	на суглинистой	горчица	шпергель	600		
горчица		инкарнатъ-клеверъ				
сурфинна		рожь				
рапсъ						

въ четвертомъ отношеніи растенія характеризуются числами слѣдующей таблицы, показывающими составъ ихъ зеленой растительной массы.

въ зеленой раститель- ной массѣ:	воды	бѣловыхъ веществъ	древес- ины	зола въ су- хомъ веще- ствѣ	кремневой кислоты въ золѣ.
Люпинъ	86,9	2,8	2,8	4,96*	4,98
Конскихъ бобовъ	87,3	2,8	3,5	5,35*	7,37
Вики	82,0	3,7	6,0	10,05	5,86
Инкарнатъ-клевера	82,0	2,8	6,2	6,08	16,25
Рапса (приблизительно тоже сурфинны)	86,0	2,9	4,2	8,10	4,74
Бѣлой горчицы	87,4	3,3	3,8	—	—
Гречихи	85,0	2,4	4,3	8,15*	5,56
Шпергеля	80,9	2,3	5,6	6,76	1,46
Рожь	76,0	3,3	7,9	1,60	32,50

* Звѣздочкой отмѣченныя числа показываютъ содержаніе золы въ со-ломѣ, за немѣнѣемъ чиселъ для содержанія золы въ цѣломъ, зеленомъ ра-стеніи.

измельчению, съ тѣмъ чтобы увеличить поверхность соприкосновенія костной массы съ дѣйтелями ея разрушенія; или же *механической и затѣмъ еще химической обработки*, чтобы превратить хрящ или фосфорнокислую известь измельченныхъ костей въ болѣе растворимыя соединения; или же почти одной *химической обработки*, которая, измѣняя свойства хряща, до того разрушаетъ строеніе костной массы, что требуетъ затѣмъ уже самой ничтожной механической обработки массы.

Измельченіе сырыхъ костей чрезвычайно затруднительно, требуетъ особенныхъ, дорогихъ машинъ, которыя приводятся въ движеніе водой или паромъ—для животной силы онѣ слишкомъ тяжелы, и потому производится болѣею частью на специально устроенныхъ для этого заводахъ.

Для измельченія сырыхъ костей необходимо нѣсколько паръ, обыкновенно три, чугунныхъ зубчатыхъ цилиндровъ, поставленныхъ такъ, чтобы въ каждой парѣ цилиндры зубцы одного цилиндра приходились промежъ зубцовъ другаго, чтобы цилиндры второй пары были сближены между собой болѣе чѣмъ первой, третьей болѣе чѣмъ второй, и чтобы цилиндры одной пары вращались въ противоположныя стороны. Кости, раздробившаяся между двумя первыми парами цилиндровъ подбавляются, такъ что между цилиндрами третьей пары проходитъ лишь та часть ихъ, которая осталась на рѣшетѣ. Получающаяся такимъ образомъ болѣе или менѣе мелкая костяная дробь измельчается дальше въ порошокъ, смотря по ея крупности, между одной или двумя парами обыкновенныхъ мельничныхъ жернововъ; причемъ, въ случаѣ измельченія между двумя парами, жернова второй пары сближены между собой болѣе чѣмъ жернова первой. Сырые кости измельчаются трудно въ мелкій порошокъ между жерновыми, потому что, вслѣдствіе содержанія въ нихъ жира и воды, измельчаемая масса начинаетъ мазаться; во избѣжаніе этого прибавляютъ иногда къ костямъ небольшое количество гипса.

Подобно же костямъ измельчаются и фосфорнокисло-известковые минералы (апатиты, фосфориты, копролиты, самородъ стр. 552) съ той разницей, однако, что для перваго раздробленія пропускаютъ ихъ не между зубчатыми цилиндрами, а между желобоватыми чугунными плитами, которыя установлены такъ, что разстояніе между ними вверху нѣсколько болѣе разстоянія между ними внизу, и двигаются такъ, что попеременно, то сближаются вверху и расходятся внизу, то расходятся вверху и сближаются внизу. По этому онѣ, то раздавливаютъ попавшій между ними минералъ, то пропускаютъ куски его внизъ, пока эти послѣдніе, достигнувъ известной величины, не выпадутъ изъ промежутка между плитами черезъ щель, которую образуютъ плиты внизу, сближавшіяся здѣсь до разстоянія между ними, опредѣленнаго наименьшей величиной кусковъ, на которые дробится минералъ. Въ промежуткахъ между измельченіями минерала между плитами, затѣмъ зубчатыми, цилиндрами, вертикальными (бѣгунами) *) и горизонтальными жерновыми, продукты измельченія подбавляются на рѣшеткахъ, а по окончательномъ из-

*) У этихъ болѣе употребительныхъ жернововъ нижнякъ или неподвижный жерновъ покрывается чугунной плитой, а бѣгуны — вертикальные жернова или сосѣднѣ чугунные или каменные, оправленные въ чугунныя кольца, 1 1/2 дюйм. толщины, такъ что изнашивание происходитъ между чугунномъ.

мельченію между жерновыми подбавляются на ситахъ или продуваются подобно тому какъ продувается мука на крупчаткахъ.

Проще, хотя зато и медленнѣе, измельчаются кости на толчеяхъ. Толчеи устраиваются, напр., изъ деревянныхъ пестовъ съ чугунными наконечниками, по 2 пуда вѣсомъ каждый, которые послѣдовательно поднимаются кулаками пращающаго вада и падаютъ на оправленную въ деревянное корыто, наклонно-установленную чугунную плиту, толщиной въ 5 дюйм. Кости всыпаются въ корыто подъ пестъ, падающій на высшую точку чугунной плиты, в. переходя по наклонной плоскости, постепенно подвергаются ударамъ послѣдующихъ пестовъ, измельчаются и изъ-подъ послѣдняго песта, падающаго на низшую точку плиты, высыпаются на прифланное у этаго мѣста сито. Сотрясательнымъ движеніемъ, въ которое приводится сито посредствомъ рычага, соединеннаго съ паломъ, размельченныя кости просѣваются, мука изъ-подъ сита сыпается въ кучи, а грубая часть съ сита вмѣстѣ съ новыми костями поступаетъ вторично подъ песты. Такая толчея изъ 8 пестовъ приготовляетъ въ сутки отъ 3 до 3 1/2 четвертей костной муки. Въ такомъ родѣ костомольни и костоголчи могутъ во многихъ случаяхъ устраиваться и въ самыхъ хозяйствахъ, располагающихъ дешевой водяной силой или свободной въ извѣстное время шаровой силой, еслита послѣдняя имѣется уже въ хозяйствѣ съ другой цѣлью, напр. для молотбы хлѣба.

Поджариваніе кости, т. е. сильная просушка кости до побурѣнія можетъ значительно облегчить измельченіе кости; поджаренная кость безъ труда разбивается отъ руки молоткомъ въ мелкую дробь, которая затѣмъ уже окончательно превращается въ муку на хорошей толчѣе или на обыкновенной мельницѣ. А такъ какъ поджаривать кость можно въ простыхъ русскихъ печахъ, то этотъ способъ облегченія измельченія сырыхъ костей довольно сподрученъ для хозяйствъ, имѣющихъ нужду въ приготовленіи небольшого количества костной муки.

Еще болѣе облегчается измельченіе костей предварительнымъ *распариваніемъ* ихъ; но такъ какъ это послѣднее требуетъ пароваго котла, жернововъ и т. д., то этотъ способъ облегченія измельченія костей болѣе примѣняется на заводахъ специально устроенныхъ для приготовленія костной муки, чѣмъ въ хозяйствахъ.

Для распариванія въ небольшихъ размѣрахъ доступныхъ для хозяйства могутъ быть употреблены небольшіе цилиндрическіе котлы, напр. 6 фут. длины и 3 фут. 4 дюйм. въ діаметрѣ. На передней сторонѣ котла находится въ разстояніи 9 дюйм. отъ дна, 13 1/2 дюйм. отъ верха или крыши котла и 12 1/2 дюйм. отъ каждой стороны отверстіе, служащее для наполненія котла костями и для выгрузки ихъ послѣдствіемъ. Отверстіе это, по наполненіи котла закрывается желѣзной плитой при помощи задвижки и боата и замазывается котомъ тѣстомъ изъ овсяной и конопляной муки. Внутри котла, непосредственно подъ упомянутымъ только что отверстіемъ, укрѣплено ровное, ложное дно изъ дырчатой плиты, на которую владутся кости. Тотчасъ надъ дѣйствительнымъ дномъ котла устроены снаружи кранъ, который служитъ для спуска жидкости по окончаніи выпариванія. Кроме этого крана на лицевой сторонѣ котла есть еще два крана: одинъ на равной высотѣ съ ложнымъ дномъ, другой же на 10 дюймовъ выше перваго; это пробные краны: первый для того, чтобы видѣть на какой высотѣ стоитъ накаченная въ котелъ вода, выше или ниже крана? другой же для

Азота органического вещества . . .	4,00	—	—	—	4,0	3,3	3,0	2,4	—	—
Песку . . .	4,40	0,28	11,48	1,07	3,3	1,8	0,6	1,3	4,45	20,24
			(мазана кирпичу)							9,2

Примечание. Заключенные в скобки числа для золы вычислены в виде разницы за вычетом воды, органического вещества и песка из общего количества вещества; для фосфорнокислых щелочных земель и фосфорной кислоты по составу трехосновной фосфорнокислой извести.

Сравнивая между собой различные способы приготовления костей к измельчению, мы должны отдать преимущество распариванию, потому что оно, помимо того, что удалением жира и изменением свойства хряща, облегчает измельчение костей, увеличивает еще разложимость хрящевой массы костей и, следовательно, ускоряет образование из нее растворителей (аммиака) для фосфорнокислой извести; между тем как сопряжено лишь с небольшой потерей органического вещества. Поджаривание копытливо и сравнительно меньше облегчает измельчение, а обжигание не только удаляет почти совсем органическое вещество и таким образом лишает фосфорнокислую известь растворителей в продуктах разложения органического вещества, но и дѣлает фосфорнокислую известь труднее растворимую, подвергая ее действию довольно высокой температуры. Если не принимать в расчет встраивающихся подмѣсей, то костяная мука из жженных костей самая богатая фосфорнокислой известью и самая бедная органическим веществом; мука из сырых костей наоборот, а мука из распаренных костей занимает место между первыми двумя, ближе подходя по составу, однако, к последней *).

Приготовление из костей удобрительных веществ, однако, не всегда останавливается на получении болѣе или менѣе мелкой костяной муки; оно нередко подвергает костяную муку еще дальнейшей обработке *помощью брожения*, которое дѣйствует преимущественно на органическую часть, ускоряя ее разложение, образование из нее растворителей для фосфорнокислой извести, или помо-

*) Сырые кости стоят у насъ отъ 15 (рѣже дешевле) до 35 коп. за пудъ, смотря по удаленію отъ мѣстъ уснаженнаго на нихъ спроса, какъ напр. отъ сахарозаводовъ, которые потребляютъ костяной уголь и которыхъ вліяніе на цѣну костей все болѣе и болѣе распространяется съ развитіемъ желѣзнодорожной сѣти. За разломъ костей, напр. на фермѣ при Горьковскомъ Земледѣльческомъ училищѣ (г. Горки, Могилевск. губ.) брали 20 коп. за пудъ, при чемъ муку получалось на 10% менѣе противъ вѣса костей. Пудъ костяной муки стоитъ у насъ, смотря по мѣстности и качеству муки, отъ 60 коп. за болѣе грубую муку (напр. въ Москвѣ въ комитетѣ сельскохозяиства, консулѣ-таціи, Смоленскій бульв. д. Зсидел. школы) до 90 коп. за болѣе тонкую муку съ гарантированнымъ содержаніемъ до 25% фосфорной кислоты и 4 1/2 % азота (напр. въ Рязи; у К. Х. Шмидта (Торенберга) и Рихарда Томсена).

шю *кислотъ*, преимущественно *сѣрной*, которая дѣйствуетъ на минеральную часть—нерастворимую фосфорнокислую известь, превращая ее въ растворимую (стр. 543—4), а костяную муку въ *суперфосфатъ*.

Въ первомъ случаѣ поступаютъ такъ: смѣшиваютъ костяную муку приблизительно съ равнымъ объемомъ древесныхъ опилокъ или хорошей земли, начинаютъ смѣсь умышленно навозной жижей или водой, скидываютъ ее довольно плотно въ небольшую, заостренную кучу и, покрывъ слегка землей и посыпавъ даже гипсомъ, съ тѣмъ чтобы удержать могущій улечься аммиакъ, оставляютъ ее въ защищенномъ отъ дождя мѣстѣ дней на 8. По истеченіи этого времени, разбрасываютъ кучу, перемѣшиваютъ хорошенько всю массу и просѣиваютъ такъ, чтобы получить рыхлый, умышленно влажный, хорошо разсыпавшійся порошокъ. Примѣсь овечьего или козьего помета (только не соломенстаго, короткаго) еще болѣе ускоряетъ разложение. Впрочемъ, можно кости сплести въ конической кучѣ безъ предварительнаго болѣе мелкаго измельченія ихъ, если предварительно варить ихъ, разбитыя на сравнительно большіе куски. Кости вывариваются въ открытомъ, кругломъ, суживающемся къ низу желѣзномъ котлѣ съ выпуклымъ дномъ, который до половины своей высоты, приблизительно, ввязывается въ печь и въ который, на высотѣ 1 фута отъ дна, вѣсколку выше той части его, которая непосредственно нагревается пламенемъ, вкладывается рѣшетка для помѣщенія на ней костей, въ предупрежденіе ихъ подгорания. Такіе котлы на заводахъ дѣлаются такой величины, что вмѣщаютъ въ себя заразъ до 75 пуд. костей. Помѣщенные въ котелъ кости обливаются, для выварки ихъ, водой, такъ чтобы эта послѣдняя покрывала ихъ, приблизительно, на 1/2 фута; вареніе продолжается отъ 1 до 2 часовъ, при чемъ постепенно доводится убывающая изъ котла, вслѣдствіе испаренія, вода. По окончаніи варки, устранивъ огонь и оставивъ котелъ на часъ слишкомъ въ покое; послѣ чего счерпываютъ собравшійся на поверхности жидкости толстый слой жира. При вареніи костей еще разъ въ той же жидкости выдѣляется изъ нихъ еще небольшое количество жира. Въ предупрежденіе подгорания, лучше вываривать кости помощью пара, особенно если уже имѣется паровикъ для другихъ цѣлей. Въ такомъ случаѣ для выварки костей могутъ служить деревянный чанъ или желѣзный ящикъ, со вторымъ рѣшетчатымъ деревяннымъ или желѣзнымъ дномъ. Сверху въ чанъ, вертикально около стѣнки его, опускается открытая на концѣ мѣдная паропроводная трубка, которая падъ самымъ почти рѣшетчатымъ дномъ загибается горизонтально прямымъ или кругообразнымъ колѣномъ, съ продиранными въ горизонтальномъ колѣнѣ стѣнками. Такъ какъ вывариваніе костей имѣетъ, главнымъ образомъ, въ виду извлеченіе жира изъ нихъ, то съ этой цѣлью весьма хитро прибавляютъ къ водѣ, которой обливаются кости въ котлѣ или чанѣ, продажной соляной кислоты (уд. в. 1,16) въ количествѣ приблизительно 6 фунт. на вышеприведенные 75 пуд. костей, или сѣрной кислоты (уд. в. 1,5) въ количествѣ 1 ч. на 10 ч. воды. Весьма выгодно употребить для вывариванія костей нѣсколько разъ одну и ту же жидкость, такъ какъ при этомъ экономятся тѣ пары (а следовательно и топливо), которые нужны для доведенія жидкости до кипѣнія; потому что при вторичномъ и послѣдующихъ употребленіяхъ той же жидкости, эта послѣдняя имѣетъ уже температуру кипѣнія. Для этого, однако, необходимо особое приспособленіе, которое заключается въ томъ, что кости помѣщаются не на рѣшетчатое дно чана, а въ корзинку изъ полосоваго желѣза; корзинка, наполненная костями, опускается въ чанъ подвѣшенною на вращающемся небольшомъ краѣ, который укрѣпляется надъ котломъ. По вываркѣ изъ костей жира, счерпываютъ этотъ послѣдній

какъ обыкновенно, а затѣмъ принимаютъ корзинку изъ чана, спорожниваютъ ее, наполняютъ снова костями и снова опускаютъ въ чанъ. Получающійся при вареніи костей отваръ, который содержитъ немного клея (сѣддонательно и азота), растворимыя соли золь костей и, если кости варились съ кислотой то и небольшое количество фосфорной кислоты, можетъ быть употребленъ для поливки навоза или компоста, если это допускаетъ близость нахождения навозныхъ или компостныхъ кучъ отъ мѣста вывариванія костей.

Во второмъ случаѣ, при заводскомъ приготовленіи суперфосфатовъ, костяная мука одна или въ смѣси съ фосфоритнымъ порошкомъ (иногда и одинъ фосфоритный порошокъ), смѣшивается съ сѣрной кислотой или въ ямахъ, выкопанныхъ кирпичемъ, или въ металлическихъ цилиндрахъ или въ чугунномъ корытѣ подъ бѣгунами. Яма углубляется въ землю и дѣлается круглой, суживающейся къ низу, около $4\frac{1}{2}$ арш. въ верхнемъ и 4 арш. въ нижнемъ диаметръ и $1\frac{1}{2}$ арш. глубиной. Стѣнки и дно ямы выкладываются изъ хорошаго обожженного кирпича на обыкновенномъ известковомъ цементѣ, въ $\frac{1}{2}$ кирпича толщиной; а поверхность земли, на $1\frac{1}{2}$ —3 арш. вокругъ ямы, вымощивается для большей прочности съ небольшою покатою къ ямѣ. Въ такую яму входитъ около 100 пуд. сырого матеріала. При приготовленіи въ ней суперфосфата поступаютъ такъ: вокругъ ямы, по краю ея, разбрасываютъ отбѣшенное количество матеріала для разложения, а въ яму вливаютъ необходимое для разложения этого матеріала количество сѣрной кислоты; затѣмъ всыпаютъ въ яму сырой матеріалъ возможно скоро и стараются возможно равномерно распределить его по всей поверхности кислоты, между тѣмъ какъ рабочій, помощью гребла, употребляемаго при твореніи известки, перемѣшиваетъ массу возможно тщательно. Во второмъ случаѣ, тотъ или другой сырой матеріалъ падаетъ въ нѣсколько наклоненный свинцовый цилиндръ, длиной около сажени и полусажени въ диаметръ, черезъ воронку, находящуюся у верхняго конца цилиндра. Внутри цилиндра находится четырехгранный валъ съ крыльями, расположенными такъ, что они образуютъ архимедовъ винтъ. Этотъ винтъ мука или порошокъ нѣсколько смоченный водой смѣшивается съ притекающей же въ цилиндръ сѣрной кислотой. Въ 5—6 минутъ готовится такимъ образомъ до 18 пуд. суперфосфата. Въ третьемъ случаѣ, костяная мука или фосфоритный порошокъ или смѣсь ихъ смѣшивается съ сѣрной кислотой въ чугунномъ кругломъ корытѣ, по которому двигаются небольшіе бѣгуны изъ камней 2 фут. въ диаметръ, окруженныхъ толстою полосой желѣза. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ разложение происходитъ лучше, употребляется меньше сѣрной кислоты и получается болѣе сухой суперфосфатъ чѣмъ въ первомъ. Если суперфосфатъ готовится изъ сильно распаренныхъ костей, то можно смѣшивать эти послѣднія тотчасъ же по выходѣ ихъ изъ котла, сѣдовательно свѣже распаренныя, безъ всякой предварительной просушки, съ надлежащимъ количествомъ сѣрной кислоты подъ бѣгунами. Полученная такимъ образомъ смѣсь складывается въ кучу, въ которой и просыхаетъ по истеченіи нѣсколькихъ недѣль. Вообще, суперфосфаты просушиваются на солнцѣ или въ сушильняхъ, при чемъ образуютъ болѣе или менѣ комковатую массу, которая измельчается подъ бѣгунами или обыкновенными жерновами въ мелкій порошокъ. Для приготовления суперфосфата на заводахъ, которые въ то же время производятъ сѣрную кислоту, во избѣжаніе расходовъ на сжиганіе кислоты, употребляютъ камерную сѣрную кислоту уд. в. 1,5—1,6. *) которая содержитъ 60—69% гидрата сѣрной кислоты, 49—56% безводной

*) Слабѣ английской, которая содержитъ 92% гидрата или 75% безводной.

сѣрной кислоты. При обработкѣ копрелитнаго порошка кислотой уд. в. 1,57 берутъ ея равное по вѣсу съ порошкомъ количество; въ другихъ же случаяхъ берутъ по расчету (стр. 554), при чемъ прибавляютъ къ ней столько воды, чтобы ея достаточно было для доставленія кристаллизационной и конституционной воды образующимся при этомъ сѣрнокислой и кислой фосфорнокислой известкѣ. Впрочемъ, приготовленіемъ суперфосфата, несмотря на неурядицы его и осторожность, которой оно требуетъ, вслѣдствіе бѣднаго дѣйствія сѣрной кислоты, въ случаѣ нужды, можетъ заняться и самъ сельскій хозяинъ, поступая при этомъ, напр. такъ: изъ смѣси просѣянной золь и земли образовать па току круглую насыпь, внутри ее оставить углубленіе такой величины, чтобы въ него можно было помѣстить фунтовъ 100 костяной муки; для того же, чтобы насыпь могла выдержать при дальнейшей обработкѣ костяной муки, слѣдуетъ плотно притоптать ее и обить доской. Далѣе просеять костяную муку и самый мелкій порошокъ отложить въ сторону, а болѣе крупный всыпать въ углубленіе, обить его затѣмъ, постоянно перемѣшивая его дошпатель, сперва 6 фунтами воды, а потомъ 11 фунтами сѣрной кислоты. Смѣсь при этомъ сильно псушивается, вслѣдствіе выдѣленія углекислоты, но не переходитъ, однако, за насыпь, если сѣрная кислота прибавляется понемногу. По прошествіи сутокъ снова обить муку 6 фунтами воды и 11 фунтами сѣрной кислоты и оставить затѣмъ оную на сутки въ покое. Наконецъ, прибавить оставленную вначалѣ мелкую муку и перемѣшать разложенную муку съ золой и землей насыпъ возможно равномерно, такъ чтобы вышла буроватый, легко разсыпавшійся порошокъ. Такъ какъ зола содержитъ очень много углекислыхъ солей, которыя потребляютъ значительное количество сѣрной кислоты, то указаннаго количества сѣрной кислоты можетъ быть недостаточно для полного разложения фосфорнокислой известки костяной муки; но если костяная мука груба, такъ что недостаточна во всѣхъ своихъ частяхъ для сѣрной кислоты, то при употребленіи всего количества сѣрной кислоты, которое нужно было бы для полного разложения, могло бы остаться большее или меньшее количество свободной сѣрной кислоты, что было бы вредно. Въ виду потребленія золой большого количества сѣрной кислоты, можно было бы замѣнить золу въ этомъ способѣ перемѣшанной землей. По этимъ причинамъ этотъ способъ можетъ быть замѣненъ другимъ, болѣе выгоднымъ—обработкой муки сѣрной кислотой въ кадкахъ или бочкахъ, вмѣстимостію отъ 20 до 25 педеръ. Въ такую кадку помѣщаютъ около 4 пудовъ костяной муки, затѣмъ прибавляютъ столько воды, чтобы вся мука была равномерно увлажнена и, наконецъ, по частямъ надлежащее количество сѣрной кислоты. Масса остается въ бочкахъ въ теченіе нѣсколькихъ дней, хорошо перерабатывается нѣсколько разъ и, спустя нѣсколько дней, готова для разсыпки. Вотъ составъ нѣсколькихъ суперфосфатовъ:

	изъ свѣжихъ костей		изъ смѣси костей съ ко- прелитамъ		изъ копро- литовъ		изъ пороченныхъ подмѣскахъ	
	1	2	1	2	1	2	1	2
Воды	14,41	4,05	17,98	21,04	8,43	23,78	11,80	14,40
Органическаго вещества	10,18	26,00	17,29	12,42	0,00	1,70	5,21	8,93
Кислой фосфорнокислой								
известки	18,50	9,92	21,22	10,16	15,37	10,24	2,58	3,60
Нерастворимой фосфор- нокислой известки . .	6,35	20,43	3,41	9,58	15,07	7,95	0,06	6,83

содержащего воду гипса	38,63	31,29	20,82	33,90	36,03	38,56	74,98	44,20
свѣрпой кислоты . . .	—	—	5,19	3,94	11,24	4,15	—	—
щелочныхъ солей. . .	3,65	6,34	6,13	2,46	1,60	7,58	0,37	2,52
песку, глины и проч. .	9,98	1,97	7,96	6,50	12,26	6,06	5,07	19,50
аммиака	неопредѣлено 3,24 1,66 1,10 0,00 0,45 0,44 0,10.							

Безъ предварительнаго измельченія можно приготовить изъ костей удобораспреѣлимое удобрительное вещество помощью *жидкой щелочи*, которая разлагаетъ органическое вещество кости (хрящъ), вслѣдствіе чего фосфорнокислая известь освобождается въ видѣ тончайшаго порошка.

Для этого необходима кадка, если удобрительное вещество приготовляется въ небольшомъ количествѣ; а если въ большомъ количествѣ, то яма вырытая лучше всего въ плотной глинистой почвѣ, съ хорошо убитыми двоями и стѣнами, выложенная плотно досками, или, что еще лучше, кирпичемъ на глини или даже на цементѣ. Въ кадку или такую яму, падающуюся, если возможно, подъ навѣсомъ, кладутъ разбитыя на малые куски кости, такъ чтобы эти послѣднія имѣли болѣе проникаемой для жидкости поверхности, и пересыпаютъ послойно смѣсью золы съ жидкой известью, наблюдая, чтобы осталось достаточно смѣси къ концу, для покрытія верхняго ряда костей верхня на 2. Затѣмъ, смѣсь заливаютъ такимъ количествомъ воды, чтобы она хорошо смочила, и поддерживаютъ постоянно сырой, подливая по временамъ воды. Когда нижній слой костей (вѣдла черезъ 3) разложится, тогда массу перекадываютъ въ другую кадку или яму такъ, чтобы верхнія кости легли внизъ, и оставляютъ стоять еще вѣдла 2 или 3. По окончаніи разложенія, массу вываливаютъ изъ кадки или выбираютъ изъ ямы лопатой тщательно перемѣшиваютъ и разбиваютъ или разбрызгиваютъ лопаткой размякшіяся кости. Разложившіяся кости представляютъ щелочную, бѣлую, творогообразную массу, отдающую сильный запахъ аммиака; она есть смѣсь студенистой массы (оссеина), отчасти разложившейся съ отдѣленіемъ аммиака, съ тончайшимъ порошкомъ фосфорнокислой извести.

Разложение костей всегда произойдетъ, хотя не всегда одинаково скоро, если въ массѣ, дѣйствіемъ жидкой извести на углекисное калии золы, образуется достаточно крѣпкій растворъ *жидкого кали*; если *щелокъ невязкость* изъ кадки или неперосаждается изъ ямы въ землю; если масса поддерживается достаточно влажной и если она находится въ достаточно теплѣ по крайней мѣрѣ немерзаетъ. Крѣпость щелока зависитъ отъ качества и количества употребленныхъ золы и извести. Если зола березовая, которая содержитъ отъ 10 до 12% поташу, то достаточно взять на 100 пуд. костей 100 пуд. золы, а такой золы, какъ трещинная, подсолнечниковая или ильоторыхъ сорныхъ травъ (крапивы, лебеды), которая содержитъ 13% и болѣе поташа, достаточно даже 75 — 50 пудовъ. Хуже березовой золы золы другихъ листовыхъ породъ: осины, ивы, ольхи и пр. но она лучше золы хвойныхъ деревьевъ, которая содержитъ такъ мало поташа, что смѣшавшаяся съ известью, недействуетъ на кости. Вообще золу, содержащую болѣе 5% поташа можно еще употреблять для разложенія костей одну, увеличивая лишь соотвѣтственно ея количество; но зола содержащая меньше 5% поташа должна быть слабѣе приравнена прибавкой поташа. Жидкой извести слѣдуетъ брать по вѣсу вдвое противъ количества поташа, содержащагося въ употребленной золѣ; слѣдовательно при употребленіи золы съ 10% поташа слѣдуетъ взять на 100 пуд. костей 100 пуд. золы и 20 пуд. жидкой извести. Если гашенная, жидкая известь долго лежала на воздухѣ

и поглотила нѣсколько углекислоты, то извести слѣдуетъ положить болѣе. Избытокъ извести не можетъ поглотить. Воды нужно наливать столько, чтобы масса была совершенно мокра, для чего достаточно примѣрно 15 ведеръ или пудовъ воды на каждый пудъ чистаго поташа или заключающагося въ золѣ. Такъ, слѣдовательно, для заливки 100 пуд. костей пересыпанныхъ смѣсью изъ 100 пуд. золы съ 10% поташа, и 20 пуд. извести, достаточно 150 ведеръ воды. Наконецъ при закладкѣ костей въ болѣе холодное время хорошо прикрыть яму досками и завалить павозомъ, соломой, листьями, а кадку зарыть въ павозъ или вкопать въ землю и также закрыть павозомъ.

Если представляется возможность имѣть суперфосфатъ, то неизбежно прибавить его къ полученной такимъ образомъ щелочной массѣ до кислой реакціи, вслѣдствіе чего цѣнность удобрительнаго вещества повышается. Разложившуюся массу костей можно употреблять въ видѣ *жидкаго удобрения* или въ видѣ *сухаго порошка*. Для приготовления перваго, разложившуюся массу костей слѣдуетъ разбавить съ водой, навозной жижей или другимъ жидкимъ удобреніемъ. Для приготовления же *сухаго удобрения*, разложившую массу костей можно или прямо высушить на воздухѣ и затѣмъ (такъ какъ она при высыханіи получается въ видѣ комьевъ) разбить цѣпами, или растереть вальками, подъ бѣгунами или между жерновами. Растираніе и измельченіе высохшей массы разложившихся костей представить гораздо менѣе затрудненія чѣмъ растираніе распаренныхъ костей. Въ предупрежденіе потерн аммиака при высушиваніи массы можно поступать такъ. Когда кости разожжались, тогда разложившуюся массу, отдающую сильный запахъ аммиака, вынуть изъ кадки или ямы и перемѣшать съ перегнойной землей или мелкимъ торфомъ, смѣсью древесныхъ опилокъ съ землей, мелкимъ навозомъ и т. н. веществами, сложить эту смѣсь въ кучу подъ навѣсомъ и оставить на нѣсколько дней. Послѣ же этого хорошенько перелопатить, прибавить къ ней при этомъ сухой земли или торфа, перелопатить и опять оставить полежать въ кучѣ, потомъ опять перелопатить, прибавить сухой земли или торфу и продолжать такъ, пока не получится равномерно перемѣшанный, довольно сухой, удобораспреѣлимый порошокъ.

Этотъ способъ приготовленія костей для удобрения, кромѣ того, что дѣлаетъ ненужнымъ предварительное, весьма затруднительное измельченіе костей въ порошокъ, и потому примѣнимъ въ каждомъ хозяйствѣ, располагающимъ недорогими золой и известью, попогнѣетъ еще туже въ отношеніи кали, котораго недостаетъ костянымъ тукамъ. Вотъ анализъ двухъ образцовъ приготовленнаго вышеописаннымъ образомъ тука въ большихъ (1) и малыхъ (2) размѣрахъ.

	1.	2.
Воды	5,54	8,01 (въ томъ числѣ летучихъ веществъ аммиака 0,965%)
Органическаго азотистаго вещества. . .	19,63	18,10
Фосфорно-кислой извести и магнезін. .	36,76	(24,70)
Углекислой извести.	18,98	(30,89)
Извести.	—	32,29
Магнезін.	2,20	3,44
Окиси желѣза и глинозема.	1,36	3,32
Кали.	—	2,90
Натра.	5,46	2,36
Хлора.	—	0,17
Углекислоты.	—	13,55
Фосфорной кислоты.	—	11,94

Сырной	0,25	0,35
Кремневой	—	2,49
Песку и глины	9,14	2,75
	99,30	101,67

Растворимых в водѣ органических веществ	6,17	—
неорганических веществ	10,25	—

Наконецъ, испытано было не безъ успѣха разложение неизмельченныхъ костей одной ёдкой *известью*.

Для этого земля, кости и ёдкая негашенная известь были сложены перемежающимися слоями, въ 6 дюйм. толщины каждый, въ кучу, которая покрыта была въ заключение толстымъ слоемъ земли. Затѣмъ, черезъ продѣланную въ покрывшій слой была влита необходимая для гашенія извести вода. На 1 объемъ костей было взято 2 объема извести. Теплота, развитая гашеищемъ извести, равно какъ образовавшееся ёдкое известковое молоко превратили кости въ рыхлую, легко измельчимую массу. Заложенная такимъ образомъ изъ 250 пуд. костей куча въ теченіи 6 недѣль оставалась въ броженіи и сохранила значительную температуру. По окончаніи разложения куча была перекопана и хорошо перемѣшана.

Кровь костей животных организмъ состоитъ изъ нѣсколькихъ тканей и жидкостей. Изъ нихъ непосредственно и отдѣльно отъ другихъ частей организма употребляется почти лишь одна жидкость — *кровь*; изъ остальныхъ же нѣкоторые употребляются для удобрения, хотя и непосредственно но не отдѣльно отъ другихъ частей организма, а въ смѣси съ ними напр. различные ткани мускульная, соединительная и т. д., проникнуты различными жидкостями: кровью, желчью и т. д. въ видѣ *маса* или *цѣлыхъ труповъ*, другія же — хотя и отдѣльно, но не непосредственно, а какъ отбросы дальнейшей обработки ихъ для другихъ цѣлей, напр. роговые стружки, обрѣзки костей, шерстяные отбросы и т. д.

66) *Кровь* употребляется для удобрения далеко не въ такихъ количествахъ, какъ кости.

Кровь, какъ известно, состоитъ изъ жидкой части — *плазмы* и взмученныхъ въ этой послѣдней *красныхъ тѣлецъ* (шариковъ). Кровь лошади, исследованная въ одномъ случаѣ, оказалась состоящей на 1000 частей изъ 673,8 ч. плазмы (612,1 ч. воды + 61,7 ч. тверд. вѣщ.) и 326,2 ч. красныхъ тѣлецъ (184,3 ч. воды + 141,9 ч. тверд. вѣщ.), или 796,4 ч. воды и 203,6 ч. твердыхъ веществъ. Въ другомъ случаѣ, при исследованіи крови животныхъ, убитыхъ въ живодернѣ, найдено въ 1000 ч. крови:

	лошади	вода	телячья	овцы	свиные
воды	604,75	799,56	826,71	827,72	763,95
красныхъ шариковъ	117,13	120,87	102,50	92,42	145,53
бѣловины	67,58	66,93	56,41	68,77	72,87
волоконны	2,41	3,62	5,76	2,57	3,95

жира	1,31	2,04	1,62	1,61	1,95
растворимыхъ солей (зола)	6,82	6,98	7,00	6,91	6,75
Зола же *) крови на 100 частей состоитъ изъ хлористаго натрія	48,67	52,67	54,86	53,86	45,41
калія	13,02	—	—	—	—
натра	11,41	17,93	10,40	13,37	6,48
калія	6,84	7,25	10,77	6,61	20,37
извести	2,41	0,86	1,72	1,05	1,55
магнѣзія	0,98	0,58	1,17	0,56	1,08
окиси желѣза	4,70	8,85	7,98	8,93	9,30
фосфорной кислоты	5,62	4,88	7,54	5,10	12,52
сѣрной	1,28	2,18	1,27	1,78	1,54
кремневой	0,29	1,91	—	—	—
угольной	3,43	5,02	3,67	6,72	0,52

Впрочемъ, составъ крови непостояненъ даже у животныхъ одного и того же рода; такъ въ другихъ случаяхъ было найдено въ 100 частяхъ сѣрной (1—6) и угольной (7).

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	вода	телячья	валуха	истощенныхъ лошадей	сѣбояны	неизвѣстной	
воды	72,61	83,52	79,80	82,50	81,00	79,00	—
зола	0,87	1,12	1,00	—	—	—	4,4
азота	—	—	—	2,71	2,95	3,50	15,1

Но кровь, выпущенная изъ кровеносныхъ сосудовъ, свертывается, вслѣдствіе выдѣленія изъ жидкой части ея волоконны (фибрино), который захватываетъ при этомъ кровяныя тѣльца и, сжимаясь, образуетъ *красную сгустку*; жидкая же часть крови, не выдѣленная изъ ея волоконны, представляетъ *сыворотку*. Кровь лошади даетъ, примѣрно, около $\frac{1}{3}$ своей массы сгустка и около $\frac{2}{3}$ — сыворотки, если въ 326,2 ч. красныхъ шариковъ (см. выше) приписать 9,2 ч. волоконны, заключавшейся въ плазмѣ. При этомъ промытый сгустокъ содержитъ отъ 0,43 до 1,38%, а сыворотка 0,75% зола. Составныя части кровяной зола распределяются между золой сыворотки (1) и сгустка (2) неодинаково, какъ это видно изъ слѣдующихъ чиселъ:

	хлористыхъ натрія	калія	натра	изве-	магне-	окиси	кислотъ				
	натрія	калія		сти.	зип.	желѣза.	Фосфор-	сѣр.	крем-	уголь-	
1.	72,88	—	2,95	12,98	2,28	0,27	0,26	1,73	2,10	0,20	4,40
2.	17,36	29,87	22,36	3,55	2,58	0,53	10,43	10,64	0,09	0,42	2,01

Кровь весьма рѣдко употребляется для удобрения въ жидкомъ состояніи; гораздо чаще изъ нея приготовляются сухіе, порошкообразные туки.

Въ первомъ случаѣ она разводится водой для поливки ею прямо напашни или же только навоза. Для приготовленія же сухаго, порошкообразнаго тука

*) Составъ кровяной зола лошади вычисленъ изъ послѣдующаго состава зола сыворотки и сгустка, принявъ отношеніе между ними въ крови лошади какъ 2 къ 1 и количественно зола въ первой въ 0,75%, а во второй въ 1,16%. Составъ кровяной зола другихъ животныхъ есть средній: у телятъ, овецъ и свиней изъ двухъ, а у быковъ изъ четырехъ анализовъ.

поступают различно: или *нагревают кровь* в особенных чанахъ, подобныхъ тѣмъ, въ которыхъ выпариваютъ кости (стр. 567), при чемъ рѣшетчатое дно покрывается сквозной тканью или новой плетянкой. Водяной паръ, пускаемый въ чанъ, при постоянномъ помѣшиваніи крови, нагреваетъ эту послѣднюю до 60° Ц., когда свертывается фибриноза и сгущается жидкость; полученная густая масса просушивается прямо въ сушильняхъ, или ее предварительно наполняютъ холщевые мѣшки, которые помѣщаются подъ прессомъ съ прокладкой между ними дощечекъ плетянокъ; и затѣмъ полученнымъ такимъ образомъ тонкія, красноватого цвѣта лепешки, которые содержатъ почти все твердое вещество крови, за исключеніемъ большей части растворимыхъ въ водѣ солей кровяной золь (хлористыхъ натрія и калия и т. д.) и достаточно еще воды, просушиваются въ сушильняхъ съ нагрѣтымъ воздухомъ; лепешки дѣлаются твердыми, ломкими, стекловидными и превращаются въ порошокъ на мельницахъ. Изъ 4—5 частей жидкой крови получается 1 часть свернутой паромъ и высушенной крови. Свернутая паромъ кровь убитыхъ лошадей, по просушкѣ ея, содержала воды 17%, фосфорнокислой извести 0,3%, солей и землестыхъ веществъ 4,7% и животного вещества 78%, въ томъ числѣ 15% азота. Вотъ анализы двухъ, по всей вѣроятности, приготовленныхъ вышеописаннымъ образомъ туковъ, можетъ быть, съ примѣсью въ некотораго количества костяной муки или другаго какого либо фосфорнокислаго вещества, судя по значительному количеству содержащейся въ нихъ фосфорной кислоты:

	1.	2.		1.	2.
воды	5,30	14,1	магnezинъ	0,19	0,1
органическаго вещества (въ немъ азота)	90,91	79,1	фосфорнокислыхъ щелочныхъ земель	0,53	—
золь	3,59	6,8	окиси желѣза	—	0,1
(въ ней: кали	0,12	0,7	фосфорнокислой окиси желѣза	0,43	—
натра	0,09	—	фосфорной кислоты	0,50	1,0
хлористаго натрія	—	1,0	сѣрной >	0,33	0,4
извести	0,58	0,7	кремневой >	0,20	—
			песку и пр. >	0,62	2,1
			потери	—	0,2

Или *прибавляютъ къ жидкой крови* (на 1 ведро, примѣрно) камерной сѣрной кислоты (2—3 фунт.), или *желѣзнаго купороса* (3½—5 фунт.) въ растворѣ или красной жидкости *двухлористой кислой стронкистой окиси желѣза* *) (2—3 фунта); отчего кровь свертывается въ болѣе или менѣе густую массу, которая, по отдѣленіи ея отъ жидкости, просушивается въ нагрѣтомъ воздухѣ. Впрочемъ, отъ прибавленія послѣдней жидкости кровь свертывается немедленно въ густую, черноватую, безъ запаха, хорошо сохраняющуюся массу, которая, по вынутіи ея изъ жидкости, представляется самой себѣ подъ навѣсомъ, при чемъ она, выдѣляя сперва изъ себя жидкость, просыхаетъ, затѣмъ, на столько, что можетъ быть истерта въ порошокъ какъ комъ земли; въ этомъ состояніи она досушивается на солнцѣ разсыпанной и помѣшиваемой по чаще, а когда высохнетъ, сохраняется до употребленія въ сухомъ мѣстѣ въ бочкахъ или мѣшкахъ.

*) На 1 пай основанія 2 пай кислоты; получается настояе воднаго раствора средней стронкистой окиси желѣза (на 1 пай основанія 3 пай кислоты) на окиси желѣза или гидратѣ окиси желѣза.

Или, самую свѣжую кровь *смѣшиваютъ* съ порошкомъ *пѣдой гашеной извести* (на 100 част. крови отъ 3 до 5 ч. извести), и покрываютъ еще тонкимъ слоемъ извести (около 1%), отчего, спустя короткое время (24 часа), кровь сгущается въ болѣе или менѣе твердую массу, черноватого цвѣта, которая затѣмъ раздробляется и просушивается.

Или, наконецъ, кровь *смѣшивается* съ сухой землей (на 1 об. первой 6—8 об. второй) гдѣ либо подъ навѣсомъ, гдѣ и остается для просушки; при чемъ, конечно, получается масса, содержащая еще достаточно влаги, для того чтобы туки могъ претерпѣть потери отъ разложенія при долгомъ его сохраненіи. Или же, въ предупрежденіе этого, смѣшиваютъ кровь съ свободной отъ комьевъ землей (на 1 об. 4—5 об. земли), которая просушивается сперва, при помѣшиваніи ея отъ времени до времени кочергой, въ печи, по вынутіи хлѣбовъ, затѣмъ выгребается напередъ печи и горючая поливается кровью при помѣшиваніи лопатой, а потомъ снова загребаются въ печь и снова помѣшивается кочергой до окончательной просушки. Сохраняется полученный такимъ образомъ туки въ бочкахъ или ящикахъ.

в) *мясо*, представляеть вещество весьма измѣнчиваго состава.

Такъ во 100 частяхъ мяса содержится:	лошади	волы	теленка	свиньи
Воды	—	отъ 72,63 до 80,00	76,1—78,2	78,3
Азотистаго органическаго вещества (мясныхъ волококовъ, клей дающаго вещества, фибринозы, креатина)	—	„ 18,27 „ 22,20	—	—
Съ нимъ азота	—	„ 2,86 „ 3,66	—	—
Молочной кислоты жиры	—	„ 2,10 „ 2,98	—	—
Золь	—	2,20	3,1	—
Золь въ сухомъ веществѣ	7,22	6,02	6,9—8,3	—
Золь во 100 част. состоитъ изъ:				
Кали	39,95	37,45	44,81—34,40	35,83
Натра	5,64	6,58	—	7,96
Извести	1,80	5,09	0,83	1,99
Магnezинъ	3,88	2,35	2,11	1,45
Окиси желѣза	1,00	0,96	0,75	0,27
Фосфорной кислоты	46,74	39,28	33,06	48,13
Сѣрной >	0,30	1,77	3,52	—
Кремневой >	—	1,52	2,26	0,81
Хлора >	0,89	6,42	6,10	5,61

Мясо обыкновенно готовится для удобренія, такъ какъ въ сѣтѣмъ состояніи его трудно распределить въ почвѣ равномерно; мелко запаханное, оно привлекаетъ воронъ, которые вредятъ при этомъ посявамъ, и распространяетъ зловоніе, а не въ землѣ оно дурно сохраняется, подвергается быстрому разложенію.

Подготовка можетъ быть весьма различна: или разстѣкаютъ на куски трупъ животного, которое пало въ хозяйствѣ (только не отъ заразной болѣзни) или приобретено охотой, какъ старое истощенное, негодное болѣе для работы животное и съ котораго предварительно снята шкура; затѣмъ, укладываютъ куски въ неглубоко вырытую яму, пересыпаютъ ихъ при этомъ порошкомъ *пѣдой гашеной извести* для ускоренія ихъ разложенія, и, наконецъ, засыпаютъ все землей вынутой изъ ямы, такъ чтобы земля образовала

холодъ надъ ямой, для воспринятія доступа къ ямѣ собакамъ. Спускаются, два, вскрываютъ яму, выбираютъ кости изъ мясной массы, которая имѣетъ лишь слабый запахъ; затѣмъ смѣшиваютъ мясо и известь, которой оно было пересыпано, какъ между собой такъ и съ *горючей землей*, которой для этого не была достаточно хороша земля, которою была присыпана яма, и ссыпаютъ смѣсь въ кучу, въ которой оставляютъ ее еще на мѣсяцъ и которую передъ употребленіемъ въ дѣло перемѣшиваютъ еще разъ хорошенько. Смѣшиваютъ мясо также съ сѣвжымъ *жидкимъ навозомъ* въ ямѣ, въ которой перемѣшиваютъ его почаше (ежедневно), съ прибавленіемъ каждый разъ новыхъ количествъ сѣвжаго навоза. Смѣшиваютъ его вмѣсто навоза съ *дубовымъ корнемъ*, которое предупреждаетъ развитіе зловонія, но зато разлагается очень медленно. Наконецъ, погружаютъ мясо иногда въ *навозную жижу*, въ которой оно, разлагаясь, почти совсѣмъ распускается, такъ что можетъ употребляться какъ жидкое удобрение.

Но, въ послѣднее время мясо подготавливается для удобрения иначе *сущеніемъ* и послѣдующимъ затѣмъ *измельченіемъ*, особенно при заводскомъ приготовленіи изъ него туковъ. Для облегченія же его просушки и измельченія: или варятъ туку въ водѣ съ прибавленіемъ небольшого количества сѣрной кислоты (на 20-25 част. воды 1 ч. кислоты) — послѣ 2—3 часового кипяченія мясо легко и скоро отдѣляется отъ костей; или, укладываютъ ихъ въ круглые, герметически закрывающіеся чаши, въ которые, по наполненіи и герметическомъ закрытіи ихъ, пускаютъ водяные пары, и варятъ въ теченіи 20—24 часовъ подъ давленіемъ, неперевышающимъ $1\frac{1}{2}$ атмосферъ; или же, погружаютъ на часъ, на два, смотря по величинѣ кусковъ, въ воду, содержащую въ растворѣ желѣзный купоросъ или соду, или подкисленную соляной кислотой. Въ первомъ и второмъ случаѣ, по окончаніи варенія, мясо, вынутое изъ котловъ, отжимается подъ прессомъ для удаленія изъ него излишней воды, затѣмъ просушивается въ печахъ или въ металлическихъ чашахъ или на большихъ сковородахъ при постоянномъ помѣшаніи, и, наконецъ, хорошо просушенное по еще горячее измельчается жерновами. Сваренное такимъ образомъ, по просушенное только на воздухѣ лошадиное мясо содержало на 100 частей:

Воды	10,0%	фосфорнокислой известн ¹⁾ . . .	2,4
животнаго вещества	84,8%	землистыхъ составныхъ част. . .	2,8
(въ немъ азота)	(13,28%)		

Получающаяся при вареніи жидкость, по охлажденіи ея и снятіи съ нея жира, употребляется какъ жидкое удобрение или для непосредственнаго удобренія ею нашин или же для поливки компостныхъ кучъ, такъ какъ она содержитъ растворимыя соли и часть азотистаго клей-дающаго вещества мяса. Въ третьемъ случаѣ мясо вынутое изъ раствора просушивается затѣмъ на воздухѣ или въ сушильнѣ съ нагрѣтымъ воздухомъ и измельчается въ толчеѣ. Изъ 1 части сѣвжаго мяса выходитъ $\frac{1}{4}$ ч. примѣрно сущенаго и превращающаго въ порошокъ мяса.

гг) Гораздо чаще для приготовленія туковъ или рѣже для непосредственнаго удобренія употребляются *цѣлые* или *почти цѣлые* *животные организмы*, изъ крупныхъ животныхъ преимущественно *лошадей*, рѣже другихъ млекопитающихъ; изъ болѣе мелкихъ — *рыбъ, раковъ, морскихъ звездъ, раковина, наскомыхъ* и т. д.

¹⁾ Въ послѣднее время подобнымъ же образомъ перерабатываютъ и *китовыя* мясо и кости, сходныя по составу съ костями и мясомъ другихъ млекопитающихъ, въ туку, называемый *китовымъ гуано*.

Перыма, преимущественно туку лошадей перерабатываются въ туку, известнымъ подъ названіемъ *мясной порошка и муки*, такимъ образомъ: животное убиваютъ, если въ заводъ поступаетъ еще живое, негодное больше для работы животное, и по вынудѣ изъ него крови, которую ступаютъ или продаютъ въ жидкомъ видѣ, снимаютъ съ него кожу, поступающую въ продажу, отдѣляютъ концы, которые идутъ на заводы кровяночечныхъ солей, и раздѣляютъ туку на четыре части, которые поступаютъ въ герметически закрывающіеся котлы, могущіе выдержать въ себѣ до 5 лошадиныхъ туковъ за разъ. Прежде варки, вымываютъ изъ туки кровь, при чемъ получается жидкость поступающая точно также для удобренія. Варка продолжается 6—8 часовъ подъ давленіемъ 2—3 атмосферъ. Жиръ, собирающійся въ первое время варки, спускается чрезъ особый кранъ и продается на мыловаренные заводы для приготовления мыла лучшаго качества; выпаривающійся, затѣмъ, уже изъ костей жиръ, продается для приготовленія мыла качества *мыла*; наконецъ, спускается вываривающійся при болѣе долгомъ вареніи *клей* (большой частью изъ сухожилий, кожистыхъ частей, хряща, и частью также и изъ костей — костяного хряща) который, обрабатывается иногда такъ, что поступаетъ на суковныя фабрики для отдѣлки *суковъ*. Послѣ этого принимается изъ котла животная масса, лишняя жира, отчасти *клей* и растворимыхъ солей, просушивается въ сушильнѣ нагрѣтымъ воздухомъ до того, что легко растирается между пальцами. Просушенное такимъ образомъ мясо вмѣстѣ съ костями, которые стали совершенно хрупкими, смалывается въ мельчайшій порошокъ желтоватаго цвѣта. Вотъ составъ трехъ образцовъ такой мясной муки и одного образца *китового гуано* (4) съ различныхъ заводовъ въ Германіи. 100 частей ихъ содержали частей:

влагн	13,00	6,91	5,68	5,35
органическаго сгораемаго и летучаго вещества	68,38	52,95	56,87	62,35
(съ нимъ азота)	(8,66)	(7,44)	(6,53)	(7,63)
зола	18,62	38,91	37,45	32,30
(съ нею фосфорной кислоты)	(7,58)	(14,90)	(13,91)	(13,45)
37,45 частей зола третьяго образца мясной муки состояли изъ:				
28,34 фосфорнокислой известн ¹⁾	0,82	натра		
0,57	"	магнѣзін	1,04	сѣрной кислоты
0,98	"	окиси желѣза	0,46	углекислоты
2,21 известн ¹⁾			0,23	хлора
0,41 магнѣзін			1,72	нерастворимаго остатка
0,33 кали			0,34	штери

Рыбы и рыбные остатки превращаются въ туку, известнымъ подъ названіемъ *рыбнаго гуано*, нѣсколько сходнымъ съ предыдущимъ способомъ. Они кладутся въ подвѣшенные, опрокидывающіеся котлы съ двойными стѣнками, которые, по наполненіи ихъ рыбой, плотно закрываются крышками; затѣмъ, черезъ трубку впускаются между двойными стѣнками котла пары въ $3\frac{1}{2}$ атмосферныхъ давленій (140° Ц). Паръ обрабатывается сперва между стѣнками котла, а затѣмъ въ трубѣ, которая составляетъ часть котла, образуя продолженіе его стѣны. На закрытомъ концѣ этой трубки находится кранъ, черезъ который, до закрытія котла крышкой, выпускается воздухъ, выгоняемый парами. Для выварки достаточно одного часа, до истеченія котораго выпускаютъ пары черезъ кранъ, опрокидываютъ котелъ легкимъ поворотомъ его около шиповъ, на которыхъ онъ подвѣшенъ; при этомъ сваренная рыбная масса выпадаетъ изъ котла, съ котораго снята крышка, и тотчасъ же переносится рабочими въ корзинахъ къ находящимся вблизи котла винтовымъ прессамъ, гдѣ выбрасывается въ помѣщенный подъ прессомъ приправлен-

удобрения, подождялась полного их разложения, спустя несколько месяцев; дальнейшее разложение происходит уже в земле. Вот состав приготовленного таким образом компоста, пролежавшего 2 (1) и 16 (2) месяцев:

воды	26,8	22,5	кальц.	0,72	1,07
хитина	17,2	3,7	натра	0,41	0,32
остального органиче- ского вещества	5,3	11,4	фосфорной кислоты	0,57	0,50
(аммиака)	(0,41)	(0,06)	известн. глины и песку	49,50	60,80
(всего азота)	(1,53)	(0,89)			

Если сравнить между собой удобрительные вещества, доставляемые тремя царствами природы, то, несмотря на отсутствие резких границ между ними в отношении состава их, все же можно указать на некоторые весьма характерные различия между ними. Между тем как удобрительные вещества царства минерального почти вовсе не содержат или содержат весьма мало воды и органического вещества, удобрительные вещества царства растительного и животного содержат их очень много; к тому же, (за исключением костей) животные удобрительные вещества богаче ими и следовательно беднее неорганическими веществами чем растительные. Далее, органическое вещество животных удобрительных веществ богаче органического вещества растительных удобрительных веществ азотом; вследствие чего, при одинаковой плотности строения, животные вещества разлагаются скорее растительных. Что касается, наконец, солевых составных частей, то, вообще говоря, зола животных удобрительных веществ отличается богатством фосфорной кислоты, серной кислоты, иногда щелочей (часто хлористых) и реже извести (кости) и отсутствием или малым содержанием кремневой кислоты; зола же растительных удобрительных веществ отличается, сравнительно с животными а иногда и абсолютно, большим содержанием кремневой кислоты, щелочных земель, иногда и щелочей.

Некоторые из названных выше удобрительных веществ не всегда поступают непосредственно для удобрения земли; но, подобно многим еще другим животным, растительным и минеральным веществам, употребляются в корм животным или служат сырым материалом на различных фабриках и заводах, и, при переработке их в животные или различные фабричные и заводские продукты, дают

г) Отбросы,

которые употребляются уже для целей удобрения. Между отбросами первое место, по обширности употребления, занимают отбросы, получающиеся при переработке животными кормовых веществ растительного и животного происхождения —

а) Извержения животных.

Кормовые вещества — пища (II ч., стр. 140 и след.) поступает прежде всего в полость рта, где измельчается: механически — разжевывается и истирается зубами, если она твердая, и химически смывающейся с ней слюной; затѣм, переходит в желудок, где, измельчаясь далее механически — стираясь движениями желудка, и химически призмывающимися в ней желудочным соком, превращается в кашу (химу), которая поступает, наконец, в кишки и, смывающаяся здесь с измельчающимися ея химически: желчью, панкреатической жидкостью и кишечным соком, образует молоко, млечный соев — хилус. Желудок и кишечный канал окружены млечными (лимфатической системы) и кровеносными сосудами, которые всасывают хилус из кишок; а составные части пищи, которая поступает в организм растворенными или растворяется уже раньше действующими силами в желудочного сока, всасывают на пути еще из кишок из желудка. Всасываемое не кровеносными, а млечными сосудами, претерпев дальнейшие изменения в этих последних, поступает затѣм все же в кровеносные сосуды. Составные части пищи, нерастворенные пищеварительными соками, вместе с частью пищеварительных соков, поступают в прямую кишку, которую выносятся вон из организма через заднепроходное отверстие и образуют твердые извержения животного — кал. Кал состоит, поэтому, (ч. II, стр. 145) из непереваренных, хотя и переваренных веществ (мышечных волокон, жировых клеток и кислот, зерен крахмала, льмена, овса и т. д.), непереваренных веществ (клетчатки растительных клеток, хлорофилла, растительного воска, пробкового вещества, энтермы, нерастворимых протеиновых тел и трудно растворимых и нерастворимых минеральных веществ, как напр. фосфорнокислых солей, окис железа, извести и магнези, кремневой кислоты и небольшого количества животных выделений: составных частей желчи, энтерогли, слизи. Растворенные составные части пищи, поступившие в кровеносные сосуды — вены прямо или через посредство млечных сосудов, пройдя через печень и легки, делятся составными частями артериальной крови, которая питает все части тела, уступая им необходимые для их обновления вещества, взамен продуктов разрушения тела жизненным процессом, который делятся составными частями венозной крови и, отчасти, пройдя путь растворенных составных частей пищи, входят вновь в состав артериальной крови, отчасти же, окисляясь еще выше содержащимся в крови кислородом, выступают, наконец, из тела через кожу, легки и почки; через последние в виде жидких извержений животного — мочи. Моча, поэтому, содержит: вновь образовавшиеся, главным образом, органические тела — мочевины, гиппуровую (у плотоядных еще и мочеую) кислоту, красильное вещество мочи, небольшое количество углекислого аммиака, молочной, а иногда и бензойной кислоты, и кроме того: щелочи, щелочная земли, хлор, серную и кремневую кислоты и только (за исключением овец и свиней) следы фосфорной кислоты. Так как у птиц твердые и жидкие извержения смываются при самом выходе из животного организма, между тем как у млекопитающих они выходят раздельно, то мы рассмотрим сперва извержения млекопитающих, а затѣм извержения птиц и некоторых из млекопитающих, которых только твердые извержения употребляются для удобрения.

аа) Твердые и жидкие извержения млекопитающих.

Взрослое животное, при нормальном кормлении, или вовсе не-

увеличиваетъ вѣса своего тѣла въ малые промежутки времени, или изменяетъ его только незначительно. Следовательно, *отъ выделения животного въ совокупности, а именно; твердыхъ и жидкихъ извержений его и весьма значительныя газообразныя выделения черезъ кожу и легкія должны представлять нѣтъ вещества, которыя животное приняло въ себя въ видѣ пищи.* Изъ этого составляютъ исключеніе: съ одной стороны откармливаемые животные, подростки, беременныя самки и матки дающія молоко, изъ которыхъ первыя и вторыя потребляютъ большую или меньшую часть пищи на увеличеніе своего вѣса, третья — на развитіе зародыша, и послѣднія на образованіе молока, а потому отдають въ своихъ выделенияхъ *меньше* того, что получали въ пищу; съ другой — старые животные, изъ которыхъ выделениями выводится *болѣе*, чѣмъ вносится въ нихъ пищею.

Опытъ показатъ, что, при нормальномъ кормленіи взрослыхъ животныхъ, не увеличивающихъ своего вѣса, черезъ кожу и легкія теряется, среднимъ числомъ:

	у лошади:	у крупной ро- гатой скотины:	у овецъ:
сухого вещества корма.	52,6%	52,2%	50,7%
углерода	57,4%	55,9%	—
водорода	55,6%	52,2%	—
кислорода	немного меньше, чѣмъ нужно для образованія съ углеродомъ и водородомъ углекислоты и воды.		

азота и серы. вовсе не теряется или исчезающее мало.
минеральныхъ веществъ (зола) вовсе не теряется.

Следовательно, сухое вещество твердыхъ и жидкихъ извержений животныхъ, при вышеприведенныхъ условіяхъ, содержитъ сухое вещество корма, уменьшенное на 50—53% въ отношеніи углерода о водорода, выдѣлявшихся черезъ кожу и легкія въ видѣ углекислоты, воды и, можетъ быть, частию углеводорода.

У откармливаемыхъ о растущихъ 6 и +

ныхъ, относительно которыхъ неимѣется данныхъ прямого ихъ изслѣдованія; вычислено изъ процентнаго содержанія этихъ частей въ твердыхъ и жидкихъ изверженіяхъ отдѣльно, принимая указанное въ послѣднемъ ряду этой таблицы приблизительное количественное отношеніе между доставляемыми каждымъ животнымъ твердыми и жидкими изверженіями, съ поправкой нѣкоторыхъ цифръ на основаніи цифръ приведенныхъ въ земледѣльческой химіи Гофмана. Во второй (Б) же таблицѣ показаны приблизительно количества изверженій, доставляемыхъ различными животными въ сутки и въ годъ, и главнѣйшихъ, наиболѣе важныхъ для питанія растеній составныхъ частей ихъ; причемъ количества составныхъ частей въ твердыхъ и жидкихъ тукахъ выдѣств не суть суммы, а вычислены на основаніи процентнаго состава ихъ, приведеннаго въ первой таблицѣ. (См. стран. 584 и 585).

Изъ этихъ таблицъ оказывается что изверженія могутъ быть поставлены въ такомъ порядкѣ по количеству содержащихся въ нихъ:

Сухого вещества			азота въ комѣ			зола въ комѣ		
въ тверд.	жидк.	смѣшан.	тверд.	жидк.	смѣшан.	тверд.	жидк.	смѣшан.
человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.
человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.
человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.
человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.
человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.
человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.
человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.
человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.	человѣч.

Конский и овечій пометы, вслѣдствіе сравнительно болѣе сухости ихъ, малой теплоемкости ихъ, какъ въ сухомъ (высушенномъ при 100 Ц.) такъ и въ свѣжемъ состояніи, и значительномъ содержаніи азота, быстро разлагаются и развиваютъ значительное количество тепла, почему и отличаются названіемъ *горячихъ пометовъ*, между тѣмъ какъ пометы свиной а въ особенности крупнаго рогатаго, при противоположныхъ предъидущимъ качествахъ разлагаются сравнительно медленно и развиваютъ меньше теплоты, почему извѣстны какъ *холодные пометы*. Впрочемъ, свиной навозъ, въ сухомъ состояніи имѣетъ меньшую теплоемкость чѣмъ овечій пометъ; а потому, при

А.	Человѣкъ			Лошади		
	твер- дыхъ.	жид- кихъ.	смѣ- шан- ныхъ.	твер- дыхъ.	жид- кихъ.	смѣ- шан- ныхъ.
100 частей свѣжихъ извержений содер- жать приблизительно:						
воды	77	95	93	76	91	78
сухого вещества ..	23	5	7	24	9	22
100 частей сухого вещества содержать приблизительно:						
азота	7	19	15	2	17	3
зола	15	22	20	13	27	14
100 частей зола содержать приблизи- тельно:						
каль	14	16	16	11	57	18
извести и магнези ..	28	2	7	9	27	12
фосфорной кислоты ..	30	19	17	9	свѣдѣ	8
сѣрной	2	3	8	2	5	3
хлора	1	40	80	свѣдѣ	0.5	свѣдѣ
При отношеніи количества твердыхъ и жидкихъ извержений между собой, какъ	1:	9	—	1:	0,25	—

Б.	Человѣкомъ		Ло- (вѣс. ок.)
	сутки.	годъ.	сутки.
Выдѣляется, приблизительно въ изверженіяхъ:	золотн.	фунт.	золотн.
твердыхъ ..	32	120	3198.4
жидкихъ ..	288	1080	787.2
тѣхъ и другихъ вмѣстѣ ..	320	1200	3985.6
Въ томъ числѣ: въ изверженіяхъ:			
сухого вещества			
твердыхъ ..	8.7	27.6	758.4
жидкихъ ..	14.4	54.0	67.2
тѣхъ и другихъ вмѣстѣ ..	23.1	84.0	864.0
азота			
твердыхъ ..	0.6	1.9	15.2
жидкихъ ..	2.8	10.3	11.4
тѣхъ и другихъ вмѣстѣ ..	3.4	12.6	25.9
зола			
твердыхъ ..	1.2	4.1	98.6
жидкихъ ..	3.2	11.9	18.1
тѣхъ и другихъ вмѣстѣ ..	4.4	16.8	121.0
каль			
твердыхъ ..	0.2	0.8	10.9
жидкихъ ..	0.5	1.9	10.2
тѣхъ и другихъ вмѣстѣ ..	0.7	2.7	21.6
фосфора. кислоты			
твердыхъ ..	0.4	1.2	8.8
жидкихъ ..	0.8	2.3	—
тѣхъ и другихъ вмѣстѣ ..	0.8	2.9	9.7

Крупной рогатой скотины			Овцы			Свиньи		
твер- дыхъ.	жид- кихъ.	смѣ- шан- ныхъ.	твер- дыхъ.	жид- кихъ.	смѣ- шан- ныхъ.	твер- дыхъ.	жид- кихъ.	смѣ- шан- ныхъ.
84	93	86	65	87	67	80	98	82
16	7	14	35	13	33	20	2	18
1.5	8	2.5	2	10	3	3.5	12	4
11	45	17	14	30	17	30	43	31
15	43	30	5	40	15	5	75	12
24	9	16	20	12	18	5	5	5
9	свѣдѣ	5	13	0.5	9	4	13	5
3	6	4	3	9	5	1	5	1
2	10	6	1	37	11	свѣдѣ	1	свѣдѣ
1:	0.4	—	1:	0.5	—	1:	0,67	—

шадью 20—25пуд.)	Крупной рогатой скотиной (вѣс. ок. 20 пуд.)		Овецъ (вѣс. ок. 60 фунт.)		Свиней (вѣс. ок. 100 фунт.)	
годъ.	сутки.	годъ.	сутки.	годъ.	сутки.	годъ.
фунт.	золотн.	фунт.	золотн.	фунт.	золотн.	фунт.
12000	5260.8	20000	211.2	800	470.4	1800
3000	2102.4	8000	105.6	400	326.4	1200
15000	7363.2	28000	316.8	1200	796.8	3000
2880	841.8	3200	76.8	280	96.0	360
270	144.0	560	9.6	52	9.6	24
3300	1027.2	3920	105.6	396	144.0	540
56.6	12.7	48.0	1.5	5.6	3.4	12.6
45.9	1.2	44.8	1.0	5.2	1.2	2.9
99.0	25.7	98.0	3.3	11.9	5.8	21.6
374.4	92.9	352.0	10.8	39.2	28.8	108.0
72.9	64.8	252.0	2.9	15.6	4.1	10.3
462.0	174.6	666.4	18.0	67.3	44.8	167.4
41.2	13.9	52.8	0.8	2.0	1.4	5.4
41.6	27.8	108.4	1.1	5.9	3.1	7.7
83.2	52.4	199.9	2.7	10.1	5.4	20.1
33.7	8.4	31.7	1.3	5.1	1.2	4.3
—	—	—	0.02	0.2	0.6	1.3
37.0	8.7	38.3	1.6	6.1	2.2	8.4

смѣси твердыхъ и жидкихъ изверженій такъ называемаго *ночного золота*; или въ видѣ твердыхъ и жидкихъ изверженій отдѣльно; или наконецъ, въ высушенномъ видѣ, въ видѣ такъ называемаго *пудрета*.

Въ первомъ видѣ — въ видѣ клоачныхъ водъ изверженія получаютъ, главнымъ образомъ, въ городахъ, гдѣ господствуетъ ватерклозетная система отхожихъ мѣстъ (Англія) и канализационная система удаленія изъ города человѣческихъ изверженій, при которой эти послѣдніе, смѣшиваясь, при самомъ прохожденіи ихъ, съ большимъ количествомъ воды, проходятъ тотчасъ же въ стоки и по нимъ выбѣтъ съ другими городскими водами: банными, кухонными, фабричными и омывающими улицы, удаляются изъ города. Вслѣдствіе этого составъ клоачныхъ водъ весьма разнообразенъ, какъ это явствуетъ изъ слѣдующихъ чиселъ: на 1 миллионъ частей клоачныхъ водъ стекающихъ изъ:

содержать:	Лондона:				Ругби въ Англіи.	Парижа:	
	1.	2.	3.	4.		1.	2.
твердыхъ веществъ	2960	1374	1282	1400	1400	2014	2800
въ нихъ:							
органическихъ веществъ	1144	559	427	440	440	772	766
въ нихъ амміака	(257)	(126)	(99)	(118)	(103)	(57)	(45)
въ немъ азота	(211)	(103)	(81)	(97)	(85)	(47)	(37)
неорганическихъ веществъ	1816	815	855	—	960	1242	2030
въ нихъ кали	(45)	(46)	(42)	(15)	(36)	—	(30)
фосфорной кислоты	(60)	(24)	(14)	(26)	(23)	—	(15)
сѣрной кислоты	(56)	(102)	—	—	—	—	—
угольной	(180)	—	—	—	—	—	—
извести	(225)	(152)	—	—	—	—	—
магнѣзій	(1)	(33)	—	—	—	—	—
окиси желѣза и глинозема	(38)	(110)	—	—	—	—	—
натра	—	(18)	—	—	—	—	—
хлористаго натрія	(120)	(272)	—	—	—	—	—
растворимой кремневой кислоты	(143)	(17)	—	—	—	—	—
песку	(647)	(11)	—	—	—	—	—

Часть этихъ веществъ падается взмученной, часть — растворенной; и вотъ какъ приведенныя части распределяются между взмученными и растворенными частями клоачныхъ водъ Лондона — при первомъ приведенномъ (1) и при двухъ другихъ (2 и 3) неприведенныхъ выше изслѣдованіяхъ — у клоачныхъ водъ Ругби (4) и Парижа (5) — при второмъ приведенномъ изслѣдованіи. Слѣдующія числа показываютъ въ тоже время содержаніе составныхъ частей въ миллионѣ частей клоачныхъ водъ:

	1.	2.	3.	4.	5.
всего твердыхъ веществъ	2960	2016	—	1400	2800
въ нихъ:					
взмученныхъ:					
всего	745	813	—	700	1800
органическихъ веществъ	223	506	—	300	505
въ нихъ амміака	—	—	(16—41)	(26)	(20)
въ немъ азота	—	—	(13—34)	(21)	(16)
неорганическихъ веществъ	522	307	—	400	1314
въ нихъ фосфорной кислоты	2215	—	—	—	(15)
растворенныхъ:					
всего	—	1203	—	700	1000
органическихъ веществъ	—	402	—	140	261
въ нихъ амміака	—	—	(51—86)	(77)	(26)
въ немъ азота	—	—	(42—71)	(64)	(21)
неорганическихъ веществъ	—	801	—	560	116
въ нихъ кали	—	—	—	—	(30)

На каждого жителя города, при среднемъ расходѣ на него, примѣрно, 4,200 ведеръ воды въ годъ (что выходитъ въ Лондонѣ и Ругби), клоачныя воды доставляютъ около 236 фунтовъ твердыхъ веществъ, изъ томъ чиселъ: около 14 фунтовъ амміака (или 12 фунтовъ азота), 4,5 фунта кали и 3,5 фунта фосфорной кислоты въ годъ, если основать расчетъ на среднихъ изъ приведенныхъ выше чиселъ для состава клоачныхъ водъ. Если возможны вообще какія либо сравненія въ виду такихъ приблизительныхъ исчисленій, то изъ сравненія этихъ чиселъ съ числами таблицы на стр. 584, выходило бы, что вещества, уносимыя клоачными водами сверхъ человѣческихъ изверженій, увеличиваютъ собой содержаніе въ клоачныхъ водахъ значительно твердыхъ веществъ и кали и незначительно — фосфорной кислоты; причемъ абсолютное количество азота клоачныхъ водъ остается приблизительно какъ-бы тоже, что и смѣшанныхъ человѣческихъ изверженій, но если имѣть въ виду примѣшавшіяся вещества, то скорѣе уменьшается, вслѣдствіе весьма вѣроятнаго улетучиванія образующагося при разложеніи азотистыхъ веществъ амміака.

Клоачныя воды большей частью еще спускаются въ рѣки, что представляетъ два неудобства; во первыхъ рѣки, въ особенности при небольшой и сравнительно медленно движущейся массѣ воды, совсѣмъ занятыя осадками изъ стекающихъ въ нихъ клоачныхъ водъ, заражающими къ тому же рѣчную воду и воздухъ окрестностей зловонными и зловредными для здоровья населенія продуктами гніенія; во вторыхъ совершенно терпятъ для цѣлей удобренія такіа важныя для питанія растеній питательныя вещества, какъ тѣ, которыя, напр., заключаются въ человѣческихъ изверженіяхъ и уносятся въ рѣки, а затѣмъ въ море. Устраненія этихъ неудобствъ канализационной системы удаленія нечистотъ изъ города вслѣдствіе пока еще имѣть въ двухъ средствахъ: во первыхъ въ *очищеніи клоачныхъ водъ*, т. е. въ осаждевіи изъ нихъ взмученныхъ, а частью растворенныхъ въ нихъ веществъ прежде спуска ихъ въ рѣки; во вторыхъ — въ *примѣненіи клоачныхъ водъ для орошенія земельныхъ угодій*.

Для очищенія клоачныхъ водъ рекомендовано было много средствъ, изъ которыхъ многія неспытывались въ послѣднее время, но, собственно говоря, въ одно изъ нихъ не нашло и не находитъ себѣ болѣе значительнаго примѣненія, отчасти вслѣдствіе неполноты очищенія ими клоачныхъ водъ, отчасти же вслѣдствіе дороговизны ихъ и затруднительности ихъ примѣненія. Изъ испытывавшихся въ послѣднее время средствъ наибольшее вниманіе обра-

щало на себя средство *Сюверна*, состоящее въ прибавленіи въ kloачной водѣ смѣси (изъ 100 част. ѣдкой извести, отъ 20 до 70 част. кристаллическаго или вдвое менѣе безводнаго хлористаго магнія и отъ 6 до 7 частей каменноугольнаго дегтя *), въ количествѣ отъ 1 части на 100 част. до 1 част. на 100 част. kloачной жидкости, смотря по количеству содержащихся въ жидкости твердыхъ веществъ вообще. Смѣсь, для прибавленія ея въ kloачный водамъ, размѣшивается съ водой (въ количествѣ $2\frac{1}{2}$ —10 част. воды на 1 часть смѣси) въ болѣе или менѣе жидкую кашку. Опытъ показалъ, что kloачная вода, если она только негуще, примѣрно, ночнаго золота, разведеннаго въ 10 разъ большимъ количествомъ воды, очищается смѣсью *Сюверна* довольно удовлетворительно; известь и магнѣя прибавленной смѣси образуютъ съ разнообразными растворенными органическими и минеральными веществами объемистую, хлопковидную массу **, которая захватываетъ съ собой всѣ взмученныя вещества и, осаждавшись на дно стоковъ, уливается съ водой въ бассейны; эти послѣдніе необходимы для освобожденія воды отъ осадка, задержанія его и превращенія, безъ всякихъ дальнѣйшихъ затратъ, въ удобрительную массу, легко обрабатывающуюся лопатой и свободную отъ всякаго зловонія. По опытамъ, смѣсь *Сюверна* выделяетъ изъ kloачныхъ водъ слѣдующее количество растворенныхъ и взмученныхъ въ нихъ веществъ: твердыхъ вообще до 80%, въ томъ числѣ органическихъ отъ 50 до 80% и неорганическихъ отъ 40 до 60%; въ числѣ первыхъ азота отъ 35 до 50% и въ числѣ вторыхъ всю фосфорную кислоту и отъ 20 до 25% кали. По выделеніи хлопковидной массы, жидкость стекаетъ изъ бассейна довольно прозрачной, безцвѣтной, съ слегка дегтярнымъ запахомъ, щелочной отъ присутствія ѣдкой извести и совершенно свободной отъ органическихъ веществъ, способныхъ загнивать, и организмовъ, способныхъ вызвать гниеніе. Известь совершенно убиваетъ развившіеся въ kloачной водѣ организмы и предупреждаетъ ихъ появленіе, по недолге какъ дней на десять, въ теченіи которыхъ заключающаяся въ жидкости ѣдкая известь, продолжая превращаться въ углекислоту, обращаетъ постоянно выделяющіеся осадки, увлекающіе съ собой и потребляющіе вновь образующіеся организмы. Деготь задерживаетъ развитіе этихъ послѣднихъ на нѣсколько болѣе долгое время, по истеченіи котораго, особенно при теплой погодѣ, жидкость, даже освобожденная отъ осадка, снова наполняется организмами (бактеріями), снова окрашивается и начинаетъ распространять зловоніе. Поэтому, если бы очищенная жидкость не должа была сохраняться болѣе долгое время въ резервуарахъ, а могла бытъ спускаема въ рѣку, то можно обойтись и безъ прибавленія дегтя, который вреденъ даже для осадка, если этотъ послѣдній долженъ служить для удобренія. Послѣ средства *Сюверна* съ наибольшимъ успѣхомъ испытыва-

*) Въ Германіи пудъ хлористаго магнія стоитъ 30—35 коп., а пудъ каменноугольнаго дегтя около 10 коп. по металлическому курсу.

**) Благодаря гидратамъ извести и магнѣя, послѣдній образуется изъ хлористаго магнія, вслѣдствіе уступки вѣтъмъ послѣднихъ хлора ѣдкой извести съ образованіемъ хлористаго магнія, и представляетъ самъ по себѣ уже объемистую, хлопковидную массу, которая еще болѣе увеличивается частью такого же качества осадками. Въ видѣ которыхъ гидраты извести и магнѣя выделяются въ нерастворимомъ состояніи изъ органическихъ веществъ: богатыхъ азотомъ бѣлковыхъ веществъ, пектиновыхъ веществъ, крахмала, камеди, дубильную, шавердиную, винную, бензойную, образующія мыло жирныя, перегнойныя и гипсуровую кислоты и цѣлый рядъ органическихъ красящихъ веществъ; изъ неорганическихъ же: угольную, кремневую и фосфорную кислоты и амміакъ (въ видѣ фосфорнокислой и углекислой амміакъ-магнѣзій) глинозема, магнѣзію и окислы металловъ.

лись для очищенія kloачныхъ водъ соли глинозема *); по способу *Ленка*—растворъ сѣрниокислаго глинозема и квасцовъ; по способу *Дюма*—смѣсь изъ сѣрниокислыхъ солей глинозема, окиси и закиси желѣза, роснувшая въ водѣ до мутно-желтоватой жидкости, и по способу *Форбеса* и *Прайса* размеленный естественный фосфатъ глинозема **, обработанный 7% сѣрною или соленою кислотой и разведенный водой до густоты кашицы, которая прибавляется къ очищаемой kloачной водѣ въ количествѣ 1 ч. фосфата на 1500 част., между тѣмъ какъ первыхъ двухъ жидкостей, около 1 части на 1000 част. kloачной жидкости. Изъ этихъ средствъ, по отзывамъ наблюдавшихъ ихъ дѣйствіе, лучше всего очищаютъ первое и третье; они, по прибавленіи ихъ къ жидкости, освѣтляютъ эту послѣднюю весьма быстро, въ особенности первое, которое зато не такъ хорошо очищаетъ жидкость какъ третье, превращающее грязную жидкость въ воду безъ всякаго запаха и непріятнаго вкуса, мало отличающуюся отъ обыкновенной рѣчной воды; хотя для устраненія изъ воды послѣднихъ слѣдовъ нечистоты, оказывалось необходимымъ очищеніе еще вслѣдъ затѣмъ, известковымъ молокомъ. Второе средство оставляетъ жидкость млечно-мутной; муть все болѣе и болѣе увеличивается, несмотря на то остается ли жидкость въ соприкосновеніи съ воздухомъ или нѣтъ; и жидкость спустя дней 8, начинаетъ вонять, а спустя дней 14, покрывается даже плѣсеньными массами. Что касается осадковъ, то растворъ *Ленка* осаждастъ изъ kloачной жидкости губчатую свѣжистую массу, содержащую много воды и органическаго вещества, отдающую сѣрнистый водородъ, а при сушкѣ теряющую амміакъ, хотя въ незначительномъ количествѣ. Смѣсь *Дюма* выделяетъ изъ жидкости слѣдующее количество растворенныхъ и взмученныхъ веществъ: твердыхъ веществъ вообще отъ 50 до 55%, въ томъ числѣ органическихъ веществъ отъ 60 до 70%, и содержащегося въ нихъ азота около 80%; изъ неорганическихъ всю фосфорную кислоту, до 10% извести и 15% магнѣзію. При употребленіи какъ перваго раствора, такъ и послѣдней смѣси, которыя содержатъ сѣрниокислыя соли, изъ этихъ послѣднихъ, вслѣдствіе разложенія ихъ щелочами (кали, натромъ, амміакомъ) и щелочными землями (известью, магнѣзій) выделяется нерастворимая хлопковидная масса глинозема и окиси желѣза, которая увлекаетъ съ собой, главнымъ образомъ, органическія вещества и фосфорную кислоту, находившіеся въ водѣ, причемъ фосфорная кислота получается въ осадкѣ въ соединеніи съ глиноземомъ и окисью желѣза, тогда какъ, при очищеніи по способу *Сюверна*, фосфорная кислота получается въ осадкѣ въ видѣ известковой и магнѣзійной солей. Образующіяся же сѣрниокислыя соли щелочей и щелочныхъ земель растворяются въ водѣ, уносятся ею и, въ случаѣ новаго затгниванія ея, служатъ причиной развитія ядовитаго сѣрнистаго водорода. Осадокъ образующійся черезъ нѣсколько болѣе продолжительное время при очищеніи по способу *Форбеса* и *Прайса* содержитъ все взмученное въ водахъ, много органическаго вещества и все количество фосфата. Въ растворѣ же переходятъ сравнительно съ предыдущими двумя случаями менѣе сѣрниокислыхъ солей, такъ какъ ихъ менѣе содержитъ употребляемое при этомъ для очищенія жидкости вещество. Вотъ сравнительный составъ сухаго вещества осадковъ, полученныхъ по способамъ *Сюверна* (1) и *Ленка* (2) изъ одной и той же, по способамъ *Сюверна* (3) и *Дюма* (4) также изъ одной и той же, но отличной отъ первой и, наконецъ по способу *Форбеса* и *Прайса* (5)—изъ третьей kloачной жидкости.

*) Первые двѣ соли частью въ видѣ основныхъ солей; составъ смѣси—сѣрни. кисл. 34,3%, глиноземъ 11,95%, окиси желѣза 6,17, закиси желѣза 1,24 и вода 46,30%; примѣнялось въ Анверѣ для очищенія сточныхъ водъ Париза.

**) Изъ Вестъ-Индій, гдѣ встрѣчается въ значительномъ количествѣ.

своей поглотительной способности. Одни люди допускаютъ болѣе постоянное орошеніе; для того же, чтобы и поле могло служить постояннымъ потребителемъ сточныхъ водъ, необходимо, чтобы оно было занято разнообразными культурами: напр., многолѣтнихъ травъ, капустъ, кормовыхъ корнеплодовъ, картофеля, конопли, табаку или даже зерновыхъ растений. Впрочемъ, имѣющіеся до сего времени въ небольшомъ числѣ опыты удобренія полевыхъ растений клоачными водами позволяютъ признать успѣшнымъ его дѣйствіе только на многолѣтнія травы, преимущественно злаковыя и въ особенности итальянскій райграсъ, да и тотъ перѣдко полегаетъ къ первому укосу послѣ зимняго удобренія его клоачными водами. О-бокъ съ полемъ и лугомъ можно имѣть огорода, такъ какъ на многія изъ огородныхъ растений (воздѣлываемыхъ для людей (землянику), листьевъ (въ особенности крессъ и корей) такое удобрение дѣйствуетъ довольно благоприятно. Поэтому, при возможности возвращаться на тоже мѣсто съ орошеніемъ до 3 разъ въ годъ, Дюнкельбергъ полагаетъ достаточнымъ уже съ небольшимъ 14 десятиатъ (или 1 десят.) для использованія клоачныхъ водъ, доставляемыхъ населеніемъ въ 80000 (или 5741) жителей. Это число приближается къ 1 десят., которой дѣйствительно обходится для использованія сѣточного количества клоачныхъ водъ, доставляемыхъ 5333 жителями въ Кройдонъ; между тѣмъ какъ Лаусъ, производившій опыты въ Рутби, полагаетъ, что поле, занимаемое посѣвомъ хлѣба, корнеплодами и т. д., недопускаетъ использованія болѣе 869162 куб. фут. на десятину, и слѣдовательно для использованія клоачныхъ водъ необходимо 1 десятъ такого поля на каждыя 500 жителей. Что касается зимняго орошенія, то въ западной Европѣ допускается возможность орошенія въ это время года не только незанятой растеніями почвы, такъ какъ болѣе высокая температура клоачной воды можетъ предохранять почву отъ промерзанія и, слѣдовательно, поддерживать проницаемость ея для воды; но даже и занятой растеніями земли: въ рѣдкихъ случаяхъ озимыхъ полей, но чаще луговъ, которые, безвредно для роста травы, могутъ быть орошаемы большими количествами воды, даже во время сильныхъ холодовъ, если только позаботиться о томъ, чтобы подъ образующимся ледянымъ покровомъ постоянно и толстой струей текла вода до тѣхъ поръ, пока не наступитъ оттепель и не настѣтъ ледяной покровъ.

Въ виду возможной необходимости значительныхъ пространствъ земли для использованія клоачныхъ водъ помощью орошенія и въ виду того, что, въ особенности въблизи большого города, не всегда можетъ найтись достаточное количество пригодныхъ для орошенія земельныхъ угодій, заслуживаетъ вниманія предлагаемая, какъ удобное къ орошенію средство, фильтрація клоачныхъ водъ черезъ землю, съ тѣмъ чтобы, задержавъ возможно большее количество твердыхъ частей ихъ въ землѣ, спустить воду, болѣе или менѣе чистую, болѣе или менѣе освобожденную отъ взмученныхъ и растворенныхъ веществъ въ рѣку. При этомъ, или можно спускать на глубину 1 фута верхній слой земли, насыщенный задержанными изъ клоачныхъ водъ веществами, и употребить для удобренія другихъ мѣстъ, а нижній, еще ненасытившійся, но достаточно обогащенный имъ, занять, напр., огородной культурой; или можно спускать болѣе глубокой, на аршинъ и болѣе, верхній слой земли для той же цѣли, какъ и въ первомъ случаѣ, а образовавшіеся, вслѣдствіе этого, яму наполнить уличнымъ соромъ, каменноугольной золой, землей изъ подваловъ, строительнымъ мусоромъ, мелкимъ торфомъ и другими подобными земляными веществами, которая въ большихъ городахъ можно получать постоянно почти даромъ, и сквозь эту насыщенную массу продолжать фильтрацію клоачныхъ водъ, а, по насыщеніи ея, выбрать ее, свести и, снова наполнить яму и т. д. Если, для такой фильтраціи клоачныхъ водъ, перекопать аршина на 1½ землю, одреннированную на глубину 3 арш., то на про-

странствѣ 1 десят. получится масса земли въ 2400 куб. саж., которая въ состояніи задержать въ себѣ громадное количество твердыхъ веществъ; между тѣмъ какъ въ дренажныхъ трубахъ пройдетъ вода совершенно очищенная, неунесшая съ собой ничего или уносящая очень мало важныхъ для питанія растеній веществъ. Впрочемъ, клоачная вода, особенно богатая содержаніемъ твердыхъ веществъ, иногда, предварительно употребленія ея для орошенія, фильтруется съ цѣлю полученія твердаго тула, который можетъ оплатить издержки фильтраціи (Крайдонъ въ Англіи), и съ цѣлю уменьшенія концентрации жидкости; такъ какъ менѣе концентрированная клоачная вода скорѣе теряетъ зловоніе *) при употребленіи ихъ для орошенія и становится безвредными для поверхностнаго орошенія земли, запятой уже растеніями (см. ниже).

Но, отищеніе клоачныхъ водъ, примѣненіе ихъ для орошенія земельныхъ угодій и фильтрація ихъ, устраняя два главныхъ недостатка канализаціонной системы, неустраняютъ еще одного, весьма существеннаго, а именно: зараженія воздуха, почвы, и грунтовой (колодезной) воды; первого — аловонными газами, развивающимися изъ движущихся по клоакамъ органическихъ веществъ, въ особенности человеческихъ изверженій; второй и третьей — органическими веществами и продуктами ихъ гніенія, которые проникаютъ въ почву изъ клоакъ или же образуютъ въ этихъ послѣднихъ осадки. Это зло значительно уменьшается при возможной непроницаемости для клоачной жидкости стѣнокъ сточныхъ трубъ (клоакъ); затѣмъ, при соотвѣтственной быстротѣ движенія нечистотъ по трубамъ (3 фута въ секунду), которое зависитъ, при надлежащихъ направиленіи и профилѣ клоакъ, отъ достаточнаго паденія стоковъ (неменѣе 0,0012—0,0075 для главныхъ стоковъ) и достаточнаго количества воды въ пользованіи городского населенія (5 куб. фут. или 11½ ведеръ на человѣка въ сутки, при чемъ 2 куб. фут. или 4½ ведра собственно для ватерклозета); далѣе, при устройствѣ хорошей вентиляціи стоковъ и наконецъ, при закладкѣ клоакъ ниже подвальныхъ этажей, ниже уровня грунтовой воды. Долженъ ли быть пониженъ заложеніемъ клоакъ уровень грунтовой воды и на сколько, зависитъ отъ наибольшей и наименьшей высоты его, отъ санитарныхъ требованій и отъ влияния, которое можетъ имѣть пониженіе на количество воды въ городскихъ колодезяхъ, въ которыхъ, вслѣдствіе этого, не только можетъ уменьшиться количество воды, но вода можетъ даже совсѣмъ исчезнуть.

Самъ по себѣ значительный расходъ на канализацію города у величивается тогда, когда, при недостаткѣ естественнаго паденія, какъ это часто случается (Лондонъ), для отвода клоачныхъ, особенно зловонныхъ водъ какъ тѣ, въ которыхъ спускаются человеческія изверженія, на болѣе далекое разстояніе за городскую черту, приходится создавать искусственное паденіе съ одной стороны: устройствомъ глубокаго бассейна для пріема водъ, стекающихъ изъ города, съ другой — постановкой сильныхъ паровыхъ машинъ для подъема водъ изъ бассейна на высоту, допускающую дальнѣйшее движеніе ихъ (приблизно, на 5 футовъ для каждой версты дальнѣйшаго дви-

*) Съ этою цѣлю иногда употребляютъ дезинфицирующія средства, которые примѣшиваютъ къ клоачнымъ водамъ точно такъ по выходѣ ихъ изъ городскихъ стоковъ, напр. (Барлисъ въ Англіи) жидкость, содержащую 2% извести и 1% селеновой кислоты (средство Макъ-Дугалла, сходное съ газовой известью; см. ниже)

жения). Хорошо устроенным, городским клоаки необходимы в каждом благоустроенном городе для отвода: дождевой, кухонной, фабричных вод; по ценности их устройства значительно увеличивается при спуске в них сверху скапливаемых вод и человеческих извержений, вследствие необходимости: большей непроницаемости стенок каналов, увеличения их отверстий, устройства главного, выходящего из города сточные воды, канала закрытым; большого удаления их за черту города. Кроме того канализационная система удаления из города человеческих извержений сопряжена с расходами на доставление лишнего 2 куб. фут. воды на человека, в день, на немало стоящих первоначальное устройство ватерклозетов и последующее содержание их в таком состоянии, чтобы они несколько принимали извержения и проводили их в клоаки, но и разбирали возможно полно (вполне это трудно достижимо) воздух жилых помещений с воздухом, наполняющим клоаки.

Также полно и почти также быстро, как при водной канализации, удаляются из жилищ человеческие извержения при так называемой *пневматической канализации* — изобретении *Диржура*; но, при последней, в отличие от первой, они удаляются без примеси к ним воды. Эта система, при полном проведении ее в городе, представляется в следующем виде. В удобном месте города помещается здание (машинное) с воздушным насосом, который приводится в действие паровой машиной и выкачивает воздух, примерно до $\frac{3}{4}$ безвоздушного пространства, из находящегося под давлением чугуна, герметически закрытого *центрального резервуара*. Из этого последнего, как из общего центра, направляются во все стороны по главным улицам, подобно радиусам, *центральные трубы*, которые, помощью находящихся в здании кранов, могут быть сообщаемы и разобщаемы с *центральным резервуаром*. У центральных труб, под уличной мостовой, находятся в известном расстоянии друг от друга *промежуточные или уличные резервуары*, которые точно также помощью кранов могут быть сообщены (через свое дно) с *центральными трубами* и разобщены с ними. От уличного резервуара на главной улице идет вдоль боковой улицы *главная труба*, в которую у самого входа ее в уличный резервуар, вделан край и которая в свою очередь отделяется от себя вправо и влево *побочными трубами*, сообщающимися посредством дальнейших своих *разветвлений* с отхожими местами прилегающих к ним домов; между *побочными трубами* и их *разветвлениями*, равно как между первыми и *главными трубами* устраиваются *самодействующие запоры* различного устройства. Затем, извержения удаляются из отхожих мест таким образом. При постоянном действии в течение дня воздушного насоса, в *центральной резервуар* постоянно поддерживается безвоздушное пространство, а потому, если помощью соответствующих кранов сообщить уличный резервуар с *центральной трубой*, а эту последнюю с *центральным резервуаром*, то можно всегда сдвигать безвоздушным пространством в том или другом уличном резервуаре; а, сдвигая это, для удаления извержений из отхожих мест, останется лишь поворачивать у уличных резервуаров попеременно то край главной, то край центральной трубы, начав с первого; так как с открытием первого внешнего давлением наружного воздуха извержения из всех отхожих мест, сообщавшихся с известным уличным резервуаром, вгоняются в этот последний, а с открытием второго они давлением, которое вызывается постоянно действующим насосом, продавливаются далее в *центральную трубу* и, наконец, в *центральный резервуар*, при чем в уличном резервуаре снова образуется безвоздушное пространство; и потому с новым открытием кра-

на главной трубы, по закрытии крана *центральной трубы*, уличный резервуар наполняется снова извержениями из сообщавшихся с ним *отхожих мест* и т. д. *) Каждое поворачивание крана требует не более $\frac{1}{4}$ минуты времени. Извержения из *центрального резервуара*, в который они собираются из всего города, или части города или группы домов, поднимаются давлением же наружного воздуха, в другой точно также герметически закрытый *переливочный резервуар*, из которого выкачать воздух **) и который находится выше первого сажени на дв. Это для того, чтобы из этого *переливочного резервуара* можно было действием одной лишь силы тяжести наполнять извержениями *перевозочные бочки*, в которых извержения отвозятся уже в места дальнейшего их употребления. Наполнение *перевозочных бочек* из *переливочного резервуара* происходит помощью рукава (2 дюйм. в диаметре), который выходит из *переливочного резервуара* и надвигается на отверстие крана, плотно вставляющегося во втулочное отверстие бочки; между тем как на другое отверстие того же крана надвигается другой рукав (0,5 дюйма в диаметре), через который воздух выгоняемый втекающими в бочку извержениями, выходит из *перевозочной бочки* и входит в *переливочный резервуар* через верхнюю часть его, так что при этом нет никакого аловония. Вставляющийся во втулочное отверстие бочки край представляет еще ту особенность, что делает невозможным переполнение бочки жидкостью через край; бочка какой бы небыла величины, наполняется как раз на столько, что бы можно было удобно забить втулку. Из *переливочного резервуара* за раз можно наполнять 4 и более бочек, при чем подвоз бочки, установка крана, привертывание рукавов к бочке берет не более 2-х минут времени; столько же времени требует снятие рукавов, вынуте крана и забивка втулки; наполнение же бочки, в 12 ведер примерно емкости, продолжается 12 минут. Поэтому два работника в течение 10 рабочих часов могут наполнить около 300 бочек суточным количеством извержений приблизительно 45000 человек.

Конечно, пока нет *центрального воздушного насоса*, пока неокончена *пневматическая канализация* всего города, необходимо выкачивание воздуха из отдельных уличных резервуаров помощью передвижного воздушного насоса приводимого в движение локомотивом ***); на это уходит от $\frac{1}{4}$ до $1\frac{1}{4}$ минуты, считая времени необходимого на разведение паров.

Несомненными преимуществами *пневматической канализации* сравнительно с *водной* заключаются в том, что она доставляет человеческие извержения, неразжиженные водой, следовательно более ценные в сельскохозяйственном отношении и что удаляет их из города без заражения воз-

*) Желательны трубы *пневматической канализации* не прямые, а колычатые, которые представляют ряд наклонных труб, прерываемых вертикальными, подземными трубами, для того чтобы твердые и жидкие вещества, разлитые вначале, двигались одновременно; поэтому вначале (в разветвлениях с 0, 1—0, 2) наклонные трубы круче, а потом по мере того, как масса двигается однороднее, вследствие более полного смешения твердых и жидких веществ между собой, наклонные трубы становятся положе (в *побочных* с 0, 02, в *главных* с 0, 01, а в *центральных* даже с 0, 002 падения).

**) С проводом выкачиваемого воздуха в топку для предупреждения аловония, такое выкачивание происходит менее чем в минуту.

духа, почвы или грунтовой воды *). В числе же недостатков этой системы сравнительно с водной канализацией приводить, главным образом то, что она требует более дорогой очистки городов от нечистот вообще, так как служить для удаления человеческих извержений, между тем как для удаления дождевой, кухонных, фабричных вод остаются все же необходимыми каналы—стоки, которые, при удалении извержений помощью водной канализации, служат в тоже время и для удаления извержений; и что различные части сложившихся сооружений, особенности автоматические залоры подвержены частой порче. Но, эти недостатки оспариваются; первый на том основании, что пневматическая канализация не только окупается выручкой за доставляемые ею извержения и сбережениями, которые представляет, при ее существовании, устройство водной канализации с целью отвода лишь дождевой, кухонных, фабричных вод сравнительно с устройством этой последней для одновременного удаления с названными подами и человеческих извержений (стр. 593), но доставляет еще чистый доход. Второй же недостаток оспаривается на основании опыта, который показывает, что в тех немногих местах, где имются приметы пневматической канализации (Амстердам, Лондон, Прага, Вена) сооружения этой системы не подвергаются особенно значительной порче.

Пневматическая канализация оставляет человеческие извержения в ближайшем соседстве с жилыми помещениями лишь на самое короткое время, при чем они могут быть дезинфицируемы, и доставляет их сельскому хозяйству в том виде, в котором мы отличили их названием вочного золота, к тому же в возможно сильном и свободном от посторонних примесей состоянии. По быстроте удаления извержений из предельных жилых помещений она приближается к водной канализации, уступая ей только в отношении качества же доставляемых ею извержений она походит к отвозной системе удаления человеческих извержений, т. е. к отвозу на лошадиных смывальных (твердых и жидких вместе) или только твердых человеческих извержений, которые, в виде ли почва золота с большим или меньшим количеством посторонних примесей, или только твердых извержений, накапливаются и остаются в ближайшем соседстве с жилыми помещениями более или менее долгое время. Накапливаются человеческие извержения в этом случае или в больших ямах, углубляющихся в землю под отхожими местами,—это одно из самых распространенных как на западе так и у нас, как в городах, так и в деревнях, систем накопления человеческих извержений, которая может быть названа ямной или системой постоянных ям; или же, в переносных емкостях, подставляемых под отхожие места,—эта система может быть отличена названием бочечной или системы подвижных ям.

В постоянные ямы, кроме различных по своему составу (стр. 584) человеческих извержений попадают, большей частью, помойные воды и другие жидкие и твердые нечистоты. Вследствие же этого, рано как и вследствие различной продолжительности времени, в течение которого—и условий (напр. температуры), при которых извержения остаются в яме, состав накапливающейся в ямах разных мест массы чрезвычайно разнообразен, как это видно из следующей таблицы числовых результатов анализа вочного золота из отхожих мест:

*) Конечно, в каналы ее попадает также некоторое количество воды помимо извержений, потому что трудно удержать затоп, чтобы в отхожее место не выливалось никогда и ничего; но попадающее таким путем количество воды ничтожно по сравнению с тем, с которым смешиваются извержения при водной канализации. Точно также могут иногда из пневматических каналов попадать зловонные газы в жилища, но это только случайно.

	в Петербурге			в Париже	в Берлине	в Кельне	на заводе
	сам- большее	на- меньшее	сред- нее *)	ри- ан.	Бер- лине	арестан- ском до- мѣ **).	Крупна, в Эссене.
	содержание.						
Воды	954,8	852,5	911,9	930,5	959,5	942,7	382,5 (в аммиаке)
Твердых веществ	147,5	45,2	88,2	69,5	40,5	57,3	617,5
В них:							
органических веществ	126,9	22,2	67,4	—	22,8	42,1 (в лету- нках)	88,0
в них:							
азота	6,3	1,7	3,9	—	0,7	0,9	—
азота в виде свободного							
аммиака или аммиачных							
солей	5,4	3,6	5,1	—	3,4	3,5	—
азота всего	11,7	5,3	9,0	9,3	4,1	4,4	—
зола	24,0	9,3	15,8	—	17,3	15,1	529,5
в ней:							
каль	3,2	1,8	2,1	2,0	1,4	22,2	0,9
натра	0,6	0,0	0,2	—	2,9	4,6	0,5
поваренной соли	9,3	2,3	4,9	—	—	—	—
окиси железа	1,5	0,3	0,5	—	—	0,2	26,5 (в хлор- иде)
известня	1,5	0,5	1,0	—	—	0,7	26,5
магния	2,7	0,5	1,3	—	—	0,4	—
фосфорной кислоты	6,2	1,3	2,9	2,7	1,9	1,6	0,6
свободной	1,0	0,2	0,2	—	—	0,1	2,8
кремневой	0,7	0,1	0,4	—	—	—	2,8
угольной	0,6	0,0	0,2	—	—	4,8 (в хлоре)	21,0
хлора и серы	—	—	—	—	—	—	0,3
нерастворимых веществ	6,0	0,6	2,1	—	—	—	—
песка, угольной пыли и т. д.	—	—	—	—	—	0,6 (в крем- невом)	348,9
шлаков и камешков	—	—	—	—	—	—	53,9
каменного угля	—	—	—	—	—	—	44,8

Если мы возьмем среднее из чисел 3, 4, 5, и 7 столбцов **), то получим в круглых числах, приблизительно, следующий средний процентный состав золота в отношении важнейших в сельско-хозяйственном отношении составных частей его:

Воды	94%
Твердых веществ	6%
В них: органических веществ	3,5%
в них: азота	0,2%
аммиака свободного или в амми- ачных солях	0,5%
в нем азота	0,4%
всего азота	0,6%
зола	2,0%
в ней: каль	0,2%
фосфорной кислоты	0,2%

*) из 16 анализов **) среднее из 5 анализов.

***) Числа 1 и 2 столбцов исключены как послужившие уже для вычисления средних чисел 3 столбца, а числа 6 столбца слишком исключительны.

Ночное золото, оставаясь на воздухе, особенно при несколько возвышенной (летней) температурѣ, измѣняется не только въ наружномъ видѣ, дѣлается темнѣе, но и въ своемъ составѣ; оно разлагается, тернетъ при этомъ едкую кислоту, аммиакъ и азотъ органическихъ веществъ и образуетъ вредные газы — углекислоту, углеводороды, аммиакъ, и едкий азотъ, которые, улетучиваясь въ видѣ углекислоты, углеводородовъ, углекислого аммиака, едкого азота и едкого водородного едкого аммония, зачумляютъ воздухъ жилищъ и т. д. Такъ, напр. при одномъ изслѣдованіи ночного золота, пробывшаго на воздухѣ, въ лѣтнее время въ теченіи двухъ мѣсяцевъ, оказалось, что оно потеряло приблизительно немного менѣе $\frac{1}{2}$ азота органическихъ веществъ, немного болѣе $\frac{1}{2}$ едкой кислоты и почти $\frac{2}{10}$ аммиака.

Различныя вещества изверженій, прежде нежели они образуютъ названныя конечные газообразные продукты разложенія, проводятъ большей частью еще черезъ нѣкоторые промежуточные соединенія; такъ, азотосодержащія органическія вещества образуютъ первоначально вещества отчасти весьма сильнаго ядовитаго дѣйствія безъ запаха и цвѣта, которые разрушаются лишь трудно, напр. неразрушаются температурой кипяченія и, въ концентрированномъ растворѣ, дѣйствуютъ на животный организмъ также сильно, какъ самыя сильныя растительныя яды. Отсюда понятно, что вещества, образующіяся при разложеніи изверженій могутъ быть одной изъ причинъ развитія холерной и тифозной эпидемій.

Количество ночного золота, доставляемое однимъ человекомъ въ годъ, до того различно, что можно привести лишь самое приблизительное среднее его выраженіе. На 1 человека приходится ночного золота, среднимъ числомъ, въ годъ: въ Парижѣ 14,7 въ Мюнхенѣ 12,0, въ баденскихъ казармахъ 16,4 и въ Кельнскомъ арестантскомъ домѣ 23,5 пал., круглымъ среднимъ числомъ изъ этихъ чиселъ, 16 куб. фут. = 37 ведеръ = 1100 фунт., если, безъ большой погрѣбности для такихъ приблизительныхъ вычисленій, принять плотность ночного золота, содержащаго среднимъ числомъ 94% воды, равную плотности воды. Это среднее число, однако, вдвое меньше того, которое можно вычислить изъ приведеннаго на стр. 584 средняго суточнаго количества твердыхъ и жидкихъ изверженій человека въ сутки (3,33 фунта), если прибавить къ этому послѣднему, для полученія круглаго числа, 2,67 фунт. воды, которые, примѣрно расходуются однимъ человекомъ въ день на умываніе и попадають также въ отхожее мѣсто. Въ этомъ случаѣ 6 (3,33+2,67) фунт. твердыхъ и жидкихъ веществъ, доставляемыхъ ежедневно въ отхожее мѣсто, должны бы были образовать въ годъ 2190 фунт. = 73 ведра = 32 куб. фут. ночного золота.

Система постоянныхъ ямъ представляетъ, главнымъ образомъ, слѣдующія неудобства: очистка ихъ, въ особенности дочиста, крайне затруднительна и потому производится черезъ сравнительно большіе промежутки времени; это же имѣетъ послѣдствіемъ то, что какъ при очисткѣ такъ и въ промежуткахъ времени между очистками постоянныя ямы распространяютъ въ жилищныхъ зловоніе. Далѣе, стѣны ямъ, большей частью, на столько проникнуты, что остающееся въ нихъ продолжительное время золото проникаетъ въ почву и дѣлается источникомъ зараженія воздуха и грунтовой (колодезной) воды. Наконецъ, постоянныя ямы, въ которыхъ попадаетъ много постороннихъ жидкостей, съ одной стороны доставляютъ нѣрѣдко весьма мало цѣнное удобрительное вещество, которое сельскіе хозяева затрудняются брать для удобренія, особенно на нѣсколько большихъ разстояніяхъ отъ города; съ другой — недопускаютъ совсемъ такого общаго пользованія водой, какое связывается, напр., съ устройствомъ ватерлозетовъ, потому что разжиженіе золота, въ такомъ случаѣ, было бы такъ ве-

лико, что дѣлало бы удаленіе его гужемъ совершенно невозможнымъ для цѣлей удобренія на счетъ сельскихъ хозяевъ и, слѣдовательно, крайне дорогимъ для городского населенія. А потому, о-боко съ постоянными ямами благоустройство города требуетъ все-же и каналовъ для отвода фабричныхъ, дождевой, ваннхъ и даже кухонныхъ водъ.

Конечно, эти недостатки если не совсѣмъ то до нѣкоторой степени устраняемы устройствомъ возможно непроницаемыхъ стѣнокъ и дна ямъ, напр. изъ кирпича или камня сложенного на гидравлическомъ цементѣ съ заливкой швовъ дномъ между сложенными стѣнками и землей глины и съ покрытіемъ стѣнокъ и дна изнутри тѣмъ же цементомъ, а по немъ камнемъ угольнымъ дежею; но такая обѣлка ямы стоитъ недешево. Далѣе, *улучшеніемъ способовъ очистки ямъ* замѣной обыкновеннаго способа очистки помощью черпаковъ и отвоза ихъ въ дурныхъ, неплотно закрывающихся бочкахъ, ящикахъ или даже открытыхъ вѣдрахъ, какъ это употребительно еще во многихъ мѣстахъ у насъ, открытой ямы помощью *барометрическихъ бочекъ* (Парижъ, Лейпцигъ) или хорошихъ *насосовъ*, напр. системы Штуттинера (Висбаденъ, Москва). Барометрическія бочки суть бочки, изъ которыхъ выкачанъ воздухъ и отъ которыхъ въ очищаемую яму опускается рукавъ съ дырчатыми расширившимися наконечникомъ для предупрежденія засоренія рукава какими либо крупными предметами, случайно попавшими въ яму. Очистка помощью барометрическихъ бочекъ производится чрезвычайно быстро — стоитъ только открыть крышку бочки, внутренность бочки съ наивысшимъ на нее рукавомъ, какъ давленіемъ наружнаго воздуха бочка почти мгновенно наполняется золотомъ; послѣ чего рукавъ снимается, наивысшій конецъ бочки погружается въ яму доволно значительное количество золота, такъ какъ рукавъ барометрической бочки втягиваетъ золото до тѣхъ поръ только, пока отверстія ея наконечника покрыты золотомъ. Очистка этимъ способомъ производится чрезвычайно чисто, такъ что можетъ быть производима даже черезъ нарядное крыльцо, если бы этого требовало положеніе ямы, и не сопровождается ни малѣйшимъ зловоніемъ. Но употребленіе барометрическихъ бочекъ сопряжено съ нѣкоторыми неудобствами; такъ, послѣ каждого употребленія бочки нужно возвращаться въ дено для выкачанія изъ бочки воздуха, поэтому приложеніе этого способа возможно лишь при условіи, что дено бочки, въ которомъ изъ нея выкачивается воздухъ, находится по соседству съ мѣстомъ выгрузки золота изъ бочекъ; далѣе, трудно произвести въ бочкахъ всегда одинаковое разряженіе воздуха *), а при неодинаковомъ разряженіи неодинаковымъ выходитъ и количество золота, которое вывозится въ бочкѣ. Вотъ, почему этотъ способъ обходится нѣрѣдко очень дорого. Дешевле гораздо очищеніе ямъ помощью насоса; онъ можетъ быть перевезенъ прямо отъ одной очищенной ямы въ другой, которой предстоитъ очистка, и при употребленіи его точно также избѣгается всякое зловоніе, если газы, вытѣсняемые изъ бочки, наполняемой золотомъ, проводятся въ тонкую переносную печку. Затѣмъ, система постоянныхъ ямъ можетъ быть *улучшена употребленіемъ дезинфицирующихъ средствъ*, между которыми первое мѣсто, по своей примѣнимости, занимаетъ *железный купоросъ*; онъ

*) Онъ производится выкачиваніемъ воздуха (Парижъ) или вытѣсненіемъ воздуха водянымъ паромъ (Лейпцигъ), которыми, случаясь, оставляютъ почти пространство разряженнаго воздуха.

всегда уже содержит прихвсь соли окиси железа и имеет кислую реакцию, которая постоянно усиливается, вследствие того, что она продолжает жадно поглощать кислород из воздуха под образованием с одной стороны: желтовато-бурой, осаждающейся из раствора основной сѣрнистой окиси железа, с другой—бурой, остающейся в растворе средней сѣрнокислой соли. В силу этой кислой реакции, желтый купорос препятствует разложению извержений и связывает образовавшийся уже углекислый аммиак и сѣрнистый водород превращением их в сѣрнистый аммиак и сѣрное железо. Для дезинфицирования свежих извержений достаточно в сутки приблизительно 2 лота купороса на 1 человека; при чем извержения предохраняются в теченіи цѣлых мѣсяцев от аммиачнаго разложения. Но, принимая во вниманіе, что разложение приостанавливается ходомъ в зимніе мѣсяцы, можно полагать достаточнымъ в годъ на человека около 20 фунтовъ (на 60 коп. примѣрно). Желтый купорос прихвсь в растворе (1 часть его растворяется в 1,6 ч. воды). Желтый же купорос входит в составъ дезинфицирующаго порошка Гюнтера (сѣрнокислой закиси железа 16,08, сѣрнокислой окиси железа 36,00, сѣрнокислой извести 8,51, свободной сѣрой кислоты 3,96, нерастворимаго 15,77 и воды 21,52). Употребляющаяся у насъ иногда для дезинфекціи жидкая жидкость содержитъ о-бокъ съ углекислыми солями закиси и окиси железа еще нѣкоторые смолистые вещества; она дѣйствуетъ подобно раствору желѣзнаго купороса съ присоединеніемъ къ нему дѣйствія смолистыхъ веществъ, покрывающаго зловоніе. Такъ какъ дезинфицирующее дѣйствіе желѣзнаго купороса основывается главнымъ образомъ, на кислой его реакціи, способности уничтожать щелочную реакцию разлагающихся извержений, то подобно ему и даже лучше его могли бы дезинфицировать свободная кислоты; но минеральныя (сѣрная, соляная) портятъ сосуды, въ которыхъ пакопляются изверженія, бѣже или мѣте, смотря по роду материала, изъ котораго сдѣланы сосуды, и развиваютъ сѣрнистый водородъ изъ гниющихъ уже веществъ. Карболовая же или феноловая кислота, продуктъ перегонки каменноугольнаго дегтя, можетъ быть употребляема безопасно съ этой стороны для дезинфекціи; она дѣйствуетъ лишь нѣсколько на известковый цементъ—но стоитъ дорого. Для предохраненія отъ разложенія суточныхъ извержений 8 человекъ нужно около фунта ея раствора, а 1 ч. ея растворяется въ 20 ч. воды*). Карболовая же кислота очень слабая кислота, но она, кромѣ того, что представляетъ противуположное средство, покрываетъ своимъ запахомъ зловоніе, развиваемое изверженіями. Она же въ видѣ известковой соли и въ смѣси съ сѣрнокислой магнезіей составляетъ дезинфицирующее средство Микс-Дуалли**). Изъ того, что было сказано выше, слѣдуетъ, что вещества щелочныхъ свойствъ вообще негодятся для дезинфекціи человеческихъ извержений; но бѣдала известъ, по своей способности связывать большое количество воды и по своему дѣйствію на азотосодержа-

* Пудъ ея стоитъ въ Москвѣ 8 руб.

** Пудъ этого порошка въ Англіи стоитъ около рубля по металлическому курсу. Впрочемъ, анализироваанный въ Германіи подъ этимъ именемъ порошокъ состоялъ изъ сѣрнокислой (3,83) и сѣрнатовислой (14,33) извести, углекислыхъ извести (22,83) и магнезіи (10,23), въдкихъ извести (14,23) и магнезіи (14,69), шеста (7%), воды и летучихъ органическихъ веществъ (12,83) и слѣдовъ карболовой кислоты. По составу и запаху онъ походить на газовую известь и задерживаетъ гніеніе въ силу содержанія въ немъ ѣдкой и сѣрнокислой извести, магнезіи и карболовой кислоты; но за то содержащаяся въ немъ ѣдкая известь изгоняетъ аммиакъ изъ аммиачныхъ соединений.

ща вещества, можетъ быть употребляема съ этой цѣлю, впрочемъ, не въ большихъ количествахъ, слѣдовательно не въ постоянныхъ ямахъ, въ которыхъ изверженія остаются болѣе долгое время до ихъ отвоза; потому что она предохраняетъ отъ гніенія лишь свѣжія изверженія, изъ болѣе же старыхъ оно вытѣсняетъ образовавшійся уже аммиакъ. Наконецъ, весьма хорошо дезинфицируются человеческія изверженія связистыми массами, которыя сильно поглощаютъ газы, жидкости и задерживаютъ растворенными вещества, какъ напр., углемъ и землей.

Наконецъ, было испытано, въ видахъ уменьшенія неудобствъ постоянныхъ ямъ, раздѣленіе твердыхъ и жидкихъ извержений; такъ какъ легкая разложимость азотосодержащихъ веществъ мочи, какъ-то: мочевины, крапсигаго вещества мочи, гиппуровой кислоты значительно ускоряетъ и усиливаетъ разложение смѣшанныхъ извержений, а слѣдовательно и образование при этомъ зловонныхъ газовъ. Раздѣленіе твердыхъ отъ жидкихъ извержений можетъ производиться тремя образамъ: или помощью перемалыванія, при которомъ жидкія части, собирающіяся наверху, переливаются черезъ стѣнку въ другое отдѣленіе; или помощью процеживания, при которомъ жидкія части проходятъ въ другое отдѣленіе черезъ дырчатую стѣнку съ болѣе или менѣе величины отверстіями; или, наконецъ, помощью воловности, при которой жидкія изверженія отдѣляются отъ твердыхъ при самомъ ихъ происхожденіи, стекая по стѣнкамъ въ одинъ сосудъ, между тѣмъ какъ твердые падаютъ прямо внизъ, въ другой сосудъ (устройство по Тудисму). При послѣднемъ способѣ изверженія жидкія и твердыя вовсе не смѣшиваются между собой; при двухъ первыхъ же способахъ, они, предварительно ихъ раздѣленія, смѣшиваются и къ тому же при первомъ—остаются смѣшанными довольно долго; такъ что первымъ способомъ наименѣе достигается вышеуказанная цѣль раздѣленія. Между тѣмъ какъ погнѣ всего она достигается послѣднимъ способомъ. Всѣми тремя способами можетъ быть, за то, достигнуто уменьшеніе массы, которая должна быть отвезена, если жидкая часть извержений спускается въ общіе съ другими водами стоки. Конечно, въ этомъ послѣднемъ случаѣ терится много добраго; въ особенности при первыхъ двухъ способахъ, гдѣ стекающія жидкія изверженія уносятъ съ собой взмученными болѣе или менѣе частицы твердыхъ извержений; при второмъ способѣ это происходитъ въ особенности тогда, когда отверстія дырчатой стѣнки, черезъ которую процеживаются жидкости, въ предупрежденіе ихъ засоренія, закупориваются твердыми изверженіями, дѣлаются нѣсколько болѣе величины. Правда, менѣе величины отверстія можно защищать нѣсколько отъ засоренія помощью соломенныхъ щитовъ; но это очень хлопотно, потому что требуетъ частой промывки щитовъ и даже замѣны ихъ новыми. При послѣднемъ способѣ терится меньше всего, но зато практическое выполненіе его, особенно въ многочисленныхъ зданіяхъ, чрезвычайно затруднительно. Къ тому же раздѣленіе твердыхъ отъ жидкихъ извержений въ постоянныхъ ямахъ дѣлаетъ даже опасною очистку этихъ послѣднихъ съ помощью твердыхъ извержений, которыя при невозможности ихъ перемѣшиванія, не могутъ быть дезинфицируемы. А потому раздѣленіе извержений при наводненіи ихъ въ постоянныхъ ямахъ почти нигдѣ непримѣняется.

Отвозная система удаленія человеческихъ извержений изъ города много выгоднѣе при наводненіи извержений не въ постоянныхъ, а въ подвижныхъ ямахъ—ящикахъ или бочкахъ; потому что въ этомъ случаѣ невозможно ни зараженіе почвы, а слѣдовательно и грунтовой воды, ни зараженіе воздуха, такъ какъ при непродолжительномъ сравнительно пребываніи извержений въ соседствѣ съ живыми помѣщеніями, при употребленіи вышеуказанныхъ

дезинфицирующих средств (стр. 600) и при устройстве хорошей вентиляции, извержения развиваются весьма малозловонных газов, да и те могут быть удалены довольно быстро из соседства жилья помощью хорошо устроенной вентиляции. Конечно, необходимость при подвижных ямах стоков для удаления других вод, значительная стоимость бочек, их ремонта, частой замены наполненных бочек порожними и отвоза бочек дѣлают систему подвижных ям довольно дорогой, но за то доставляемое ею удобоудерживающее вещество имеет значительную ценность. Какъ часто нужно замѣнять наполненные бочки порожними, зависитъ отъ величины бочекъ, отъ числа людей, для которых они служатъ и отъ того, въ какой степени свободными отъ примѣсей, въ особенности жидкихъ, накопляются извержения. Наиболее удобна величина бочки, при которой она, наполненная извержениями, можетъ быть внесена двумя людьми, следовательно вместимостью около 240 фунт. или $4\frac{1}{2}$ куб. фут. (хотя дѣлаются бочки вместимостью до 14 куб. фут. или 740 фунт.). Полагаю количество сѣмшанных извержений человека въ сутки въ $3\frac{1}{2}$ фунта (стр. 584), можно считать такую бочку достаточной для одного человека на 72 сутокъ или на одинъ сутки для 72 человекъ. Удобство помѣщенія такихъ бочекъ въ зданияхъ, въ интересахъ какъ чистоты такъ и удобства обыва бочекъ, требуетъ по возможности меньшаго числа ихъ въ домѣ; а потому на одну бочку должно приходиться нѣсколько сточныхъ, съ которыми сообщеніе бочки необходимо требуетъ длинныхъ и колѣчатыхъ трубъ; эти же постройки, представляя значительныя препятствія къ движению по нимъ извержений, требуютъ въ свою очередь, для усиленія этого движения и удаления частей извержений, которыми могутъ пристать къ ихъ стѣнкамъ и сдѣлаться источникомъ развития зловонія, — употребленія воды, значительно увеличивающее массу извержений (до 6 фунт. на человека въ сутки стр. 598); такъ что въ этомъ послѣднемъ случаѣ бочки приведенныхъ размѣровъ достанутъ для одного человека лишь на 48 сутокъ или на одинъ сутки лишь для 48 человекъ. Такое увеличеніе массы извержений, вслѣдствіе употребленія воды, дѣлаетъ необходимымъ раздѣленіе твердыхъ и жидкихъ извержений, которое выполняется здѣсь почти исключительно помощью процеживания. Наиболее удобны бочки изъ гальванизированнаго желѣза, въ видѣ стоячаго цилиндра (выш. въ 1, 6 разъ больше діаметра дна), который, если въ немъ накопляются извержения безъ раздѣленія, можетъ весьма удобно суживаться сверху въ видѣ горла бутылки. Горло облегчаетъ спораживание цилиндра и очень удобно для плотнаго скрѣпленія, помощью винтовъ или завертокъ и прокладокъ гуттаперчоваго или войлочнаго кружка, съ трубой, которая проводитъ извержения изъ-подъ сточника въ цилиндръ и которая должна быть по возможности гладкая внутри — желѣзная или изъ обожженной глины съ поливой внутри, и не менѣе 4 дюйм. въ діаметрѣ, хотя нѣсколько уже горла цилиндра, для того чтобы извержения могли надать изъ нея прямо во внутренность цилиндра. Если же извержения накопляются сѣмшанными или наполняются только твердыя изъ нихъ, а жидкія спускаются въ стоки, то цилиндръ несуживается сверху, а закрывается обыкновенно плотно (помощью завертокъ) крышкой съ отверстіемъ по срединѣ ея, къ которому плотно же (помощью также завертокъ) приставляется труба, проводящая извержения изъ-подъ сточника. Въ цилиндрѣ, къ одной сторонѣ его, въ нѣмѣющійся въ его стѣнкахъ назнъ подвигается дырчатая стѣнка, такъ называемый раздѣлитель (diviseur); черезъ него жидкая часть извержений проходитъ изъ большаго отдѣленія въ меньшее, нѣмѣющее въ наружной стѣнѣ у дна боковое отверстіе, которое можетъ закрываться по надобности и на которое навивается труба, проводящая жидкія извержения въ другой — нижній цилиндръ, подобный верхнему, или выводящая ихъ въ стоки. Когда

цилиндръ наполняется извержениями, тогда замѣняютъ его порожнимъ, закрываютъ верхнее отверстіе его плотно крышкой, помощью завертокъ или винтовъ и прокладокъ между крышкой и краями закрываемаго отверстія войлочнаго или гуттаперчоваго кольца, и уносятъ на пазлахъ, продѣлающихся въ нѣмѣющіеся съ боковъ цилиндра уши или кольца. Въ такихъ цилиндрахъ извержения, если они только накопляются не слишкомъ продолжительное время, къ тому же накопляются съ раздѣленіемъ и употребленіемъ дезинфицирующихъ средствъ, накопляются и удаляются безъ всякаго зловонія *).

Употребленіе известки, отчасти какъ дезинфицирующаго средства, отчасти какъ средства для приготовленія изъ извержений сухаго, удобоперевозимаго тука, при наскеленіи ихъ съ раздѣленіемъ въ цилиндрахъ приблизительно вышеописаннаго устройства — составляетъ способъ Моссельмана, при которомъ нижній цилиндръ, назначающійся для приема жидкихъ извержений, также раздѣленъ на два отдѣленія — большее и меньшее дырчатой перегородкой; большее отдѣленіе наполняется негашеной известью, которая гасится жидкостью, протекающей изъ верхняго цилиндра въ малое отдѣленіе и поднимающейся отсюда въ большее отдѣленіе. Когда такимъ образомъ наполняется цилиндръ, тогда отвозятъ ихъ въ мѣсто приготовленія тука, гдѣ, на токъ изъ плотно-убитой глины, подъ навѣсомъ, насыпаютъ сперва известки изъ нижняго цилиндра, спораживаютъ на нее верхній цилиндръ и вокругъ массы твердыхъ извержений изъ каждого цилиндра насыпаютъ изъ той же известки валъ вышиною въ 4; а затѣмъ помощью деревянныхъ лопахъ обваливаютъ твердыя извержения известью такъ, что они образуютъ желваки или большія зерна, которыми можно удобно брать въ руки, сохранять въ сѣмшаныхъ и отпущать въ продажу, какъ удобоудерживающее вещество — известковый пудреть (сѣмшанъ animalisé) и которыхъ внутреннее содержимое, если разломать ихъ, представляетъ болѣе или менѣе свѣжія извержения. Кроме того, негашенная мочею известка (hydratée d'urine) можетъ вобрать въ себя еще равный себѣ объемъ мочи, чтобы, по просушкѣ, образовать, такъ называемую пересыщенную мочею известку (сѣмшанъ super-saturée d'urine). Но, способъ Моссельмана представляетъ два существенныя недостатка: во первыхъ, онъ требуетъ большаго количества известки **); во

*) Въ Парижѣ такіе цилиндры помѣщаются подъ домами въ дворахъ, которые черезъ короткій подземный, перекрытый сводомъ ходъ сообщаются съ проходящимъ, подъ сводомъ же, посрединѣ улицы стокомъ. Цилиндры, наполненные извержениями, выносятся въ стоки, вытаскиваются изъ него на улицу черезъ отверстіе въ перекрывающемъ стоки сводѣ и устанавливаются въ закрытый фургоны. Такая очистка производится днемъ же и безъ всякаго зловонія. Накопляются только твердыя извержения, жидкія же спускаются въ стоки.

**) Если одинъ человекъ, половяя, доставляетъ въ годъ круглыми числомъ, 122 фунт. = 1,85 куб. фут. твердыхъ и 1093 фунт. = 16,73 куб. жидкихъ извержений, то населеніе въ 600000 человекъ, примерно населеніе Москвы, доставитъ 18300000 пуд. = 3236 куб. саж. первыхъ и 16425000 пуд. = 29300 куб. саж. послѣднихъ и потребуетъ для накопленія и обработки ихъ по способу Моссельмана около 5422500 пуд. = 10845 куб. саж. негашеной известки, по слѣдующему расчету: твердыя извержения, для превращенія ихъ въ известковый пудреть, потребуютъ равнаго съ ними объема или 3236 куб. саж. (лѣтомъ даже менѣе, только $\frac{1}{4}$ своего объема) гашеной известки, на приготовленіе которой идетъ 1294 куб. саж. негашеной известки и 647 куб. саж. мочи. Затѣмъ, слѣдовательно, остальные 28653 куб. саж. мочи, для превращенія ихъ въ пересыщенную известку, потребуетъ вътрое меньшаго по объему или 9551 куб. саж. негашеной

вторых, удобрение почвы получающимся по его способу туком, вносить в почву пепоморно больших количества извести *). А потому на незначительное и постоянное применение, особенно в больших городах способ Моссельмана претендовать не может; но нельзя сказать, чтобы он, в настоящем его виде или с некоторыми изменениями, напр. приготовления одного лишь пудрета, не мог найти себе в хозяйствах, напр. при существовании заводского населения, временного применения в известных разборах, напр., пока и пасекой почва нуждается в известковом удобрении. Состав Моссельмановских туков чрезвычайно различен в зависимости от различия обрабатываемых известий извержений, от количества и качества употребляемой для обработки извержений жженой извести и от степени просушки туков; так произведенные анализы этих туков в различных случаях, показали что пудреть можно содержать:

от 14 до 50% воды,	от 45,0 до 75,0% зола
" 50 " 86% твердых веществ	" 0,1 " 6,8% кали
" 1,6 " 30% органических и летучих веществ	" 25,0 " 41,0% извести
" 0,4 " 1% азота в них.	" 0,2 " 2,0% фосфорной кислоты
	" 1,0 " 12,0% примесей (несу, глины и т. д.);

пересыщенная же известь: — 56,0% воды, 0,08% азота, следы кали, 0,01% фосфорной кислоты и 43,9% свободной и углекислой извести и пр.

извести. Сказанное количество извержений и извести доставить 2524302 пуд. = 5661 куб. саж. известкового пудрета (так как твердые извержения перерабатываются в пудреть выветрив с 20% по объему или 21% по весу мочи, потребляют при этом извести 35% того, что выветрив с 21% мочи, и доставляют пудрета на 14% меньше того что выветрив и на 46% больше того объема, который занимают они выветрив с 21 — 20% мочи) и 10266048 пуд. = 23790 куб. саж. пересыщенной извести (так как моча требует 30% своего веса извести для того чтобы образовалось количество пересыщенной извести на 36% меньше ее веса и на 17 занимающее меньше ее места), или обоим тукам выветрив 12890350 пуд. = 29448 куб. саж. или 71% того что выветрив и 90% того объема, который занимает ночное золото, употребленное на их приготовление. Так что способ Моссельмана на столько же с одной стороны увеличивает производимые издержки на привоз в город необходимой для приготовления его туков извести, на сколько с другой стороны уменьшает их на отвоз значительно меньшего по весу и незначительно — по объему количества тука сравнительно с ночным золотом, которое иначе пришлось бы отвезти. Если же туки нехорошо просушиваются, как это часто бывает, то объем его может даже превосходить объем золота и даваться туки неудобоперевозимым на более далекие расстояния. Если же в ямы против извержений попадет вода, тогда количество извести, потребной для приготовления туков, еще увеличивается.

*) В приведенном выше количестве обоих туков содержится 5432500 пуд. = 10345 куб. саж. извести. Если, поэтому, выветрив этих туков, смешанных в той пропорции, в какой они получаются, от 1/2 до 3 куб. саж. на десятину, то для приготовления их потребуется от 9816 до 19632 десят.; при чем на каждую десятину придется от 276 до 552 пуд., что составляет весьма сильное удобрение известью, которое повторяется на одной и той же земле, примерно, каждые 15 лет и отвечает лишь более плотным, глинистым почвам.

Применение извести с углем для дезинфекции твердых извержений при отбрасывании наконечников их от жидких, составляет основание способа Мюллера-Шюра, по которому твердые извержения накапливаются в эмалированных из тонкого чугуна ведрах, подставляющихся под отверстие столичакового сиденья, а моча, через воронку, придвинутую к передней части ведра, собирается в особый, приставляющийся к ведру, почкообразный сосуд из такого же металла как и ведро. Под сиденьем столичака имеется прибор, из которого на твердые извержения вымывается около 1 1/4 лота дезинфицирующего порошка каждый раз, как только поднимается с сиденья пользовавшийся столичаком. Порошок состоит из смеси грубо измельченной жженой извести (100 част.) и мелко истолченного угля (15 част.); его расходуется в год на человека около 15 фунт. Ведра, вместимостью с небольшим в 1 куб. фут, достаточно для 5 человек по крайней мере на 4 недѣли. Твердые извержения, для удаления их из жилища, лучше всего перемалываются в другое ведро, в котором выносятся на двор и сваливаются в бочку, защищающуюся в защищенном от дождя месте, где, если нужно, принимаются сверху еще небольшим количеством порошка. Из бочки же они от времени до времени выбираются козлами для непосредственного удобрения или полей или же заводчиками для приготовления из них тука. Моча удаляется из-под столичака ежедневно и выливается на двор в особо устроенный фильтр: изтенную новую корзину (напр. из употребляющихся для бутылей с едвой кислотой), наполненную до 3/4 мелким торфом, смешанным с отбросами заводов, приготовляющих соду или искусственные минеральные воды (кислой, едвой, углекислой магнелией), или с кислой водой, получающейся на заводах, очищающих растительные масла. Под корзину подкладываются камни, так чтобы пробиралась через нее, свободная от всякого запаха жидкость могла безпрепятственно стечь в канавку. Содержимое корзины-фильтра возобновляется каждые 4—6 недѣль, при чем выбираемое из корзины точно также берется для сельскими хозяевами для непосредственного удобрения их почвы, или заводчиками для приготовления из него тука. Для получения лучшего тука лучше всего смешать обр. получающийся массу между собой, по предварительной просушке их на воздухе, измельчить и просеять. Способ Мюллера-Шюра представляет то неудобство, что он требует особых приемников для извержений под каждый небольшой столичак; к тому же приемников, в которые твердые извержения попадают бы без посредства труб, в особенности колбчатых; так как в трубах могла бы застрять масса сравнительно бедная влагой; а потому этот способ и неприменим в больших, многолюдных городских домах; но за то имеет большее значение имеет он для небольших сельских домов с отхожими местами в пользовании сравнительно небольшого числа людей. Главное же достоинство этого способа заключается в том, что он значительно уменьшает количество требующей отвоза массы и, уничтожая зловоние *), сохраняет вносимую удобрительную ценность извержений, как

*) Для вентиляции в дно столичака вдвигается 4 полудюйм. жестианые трубочки, а в заднюю стенку его, непосредственно под выбрасывающим порошок прибором — дюймов. трубка, которая соединяется с конической трубкой или выводится через наружную стену, для того чтобы извержения, оставшаяся организм с температурой крови, неосаждала внутри столичака водных капель.

доказывать это следующие числовые результаты анализа собранных по этому способу извержений:

гигроскопической воды.	24,04	фосфорнокислой окиси железа	1,29
органического сгораемого вещества.	27,00	углекислой магнезии.	0,90
азота.	2,01	извест.	27,26
нерастворимых в солях.		едкой	5,23
кисл. веществ.	5,42	глинозема.	0,18
трехосновной фосфорнокислой извести	3,00	щелочей (хлористых).	3,01

Наконец, употребление земли в особенности глинистых свойств или, еще лучше, просеянной и просушенной огородной, содержащей большое количество перегноя для дезинфекции извержений, собираемых без разделения, составляет основание способа *Генри Муле*, пригодного, впрочем, для собирания небольших количеств извержений в небольших, преимущественно сельских домах, когда поблизости можно иметь землю и недалеко приходится вывозить смывания с землей извержения. При этом способе в спичей столбика помещается ящик с землей, а под столбиком ведро; при закрытии крышки столбика после каждого употребления этого последнего, скатывается в ведро на свисах извержения известное количество земли из ящика снизу, по специальному желобу. Иногда, надаря в ведро извержения даже смываются с землей помощью особенного вилка, который приводится в действие давлением сидящего на столбик. По наполнении ведра, наполненное закрывается порожком. В небольших домах, каковы деревенские, земля может насыпаться на дно четырехугольного ящика, сложенного под отхожим местом из кирпича, с непроницаемым для жидкости дном и с дверью в задней стенке. Под эту дверь находится под навесом деревянный ящик с двумя отделениями, из которых каждое вмещает в себя, примерно, тачку земли. Земля, насыщенная влагой, смывается с извержениями и выгребается из-под отхожого места в одно из отделений деревянного ящика, между тем как на ее место поступает из другого отделения свисающая земля. В первом отделении земля остается пока она не просохнет и не порожнится другое отделение, а тогда просохшая земля из первого отделения может быть снова употреблена для дезинфекции, между тем как из-под отхожого места земля, вобравшая новое количество влаги, выгребается во второе отделение и т. д. Одно и то же количество земли может служить для дезинфекции извержений от 5 до 7 раз, после просушки его каждый раз; и при таком условии одной тачки земли достаточно на 2—3 человека в течение 6—12 месяцев, для того чтобы совершенно устранить зловоние.

Вместо земли *Станфорд* (в Англии, Шотландии) употребляет уголь, которого нужно в 5 раз меньше чем земли и который лучше чем земля поглощает газы, а потому доставляет более ценное удобрительное вещество. Уголь, помощью особенного прибора, вымывается на извержения, который собираются в каменных, цементированных ямах, от времени до времени извлекаются из ям и обугливаются на заводах в вращающихся ретортах. Получается уголь похожий на костяной и содержащий все количество находящихся в извержениях фосфатов, калиевых и натровых солей.

В заключение приведем, по *Беркли (В)* и *Лернуру (Л)*, сравнительные числа (в копейках по металлургическому курсу) приходящихся на одного городского жителя: 1) расход на накопления и удаления извержений, 2) теоретиче-

ской ценности их, вычисленной на основании цен, по которым продаются находящиеся в составе извержений вещества, как-то: азот, фосфорная кислота, кали и т. д. 3) цен, по которым действительно продаются извержения и вытекающих из сравнения чисел первого и третьего столбца 4) убытка или 5) дохода, который доставляют извержения при различных способах собирания и накопления их, рассмотрению которых мы отвели несколько больше места по особенному значению этого вопроса и по особенной бедности относительно его нашей литературы.

	1.	2.	3.	4.	5.
При водной канализации по Б.	15 ¹ / ₂	2 ⁰	15	—	—
" пневматической " " Л.	56 ¹ / ₂	?	56	—	—
" постоянных ямах без разделения	74	250	48—212	26 или 138	—
" постоянных ямах с разделением, накапливаются только твердые, а жидкие спускаются.	" Б.	65—82 ¹ / ₂	45 ³ / ₄	19 ¹ / ₄ —36 ³ / ₄	—
" подвижных ямах без разделения	" Б.	20	71 ¹ / ₄	87	—
" подвижных ямах без разделения	" Б.	214 ¹ / ₂	45 ³ / ₄	168 ³ / ₄	—
" подвижных ямах с разделением	" Л.	225 ¹ / ₂	48—212	13 ¹ / ₂ —177 ¹ / ₂	—
" подвижных ямах с разделением: накапливаются одни твердые, а жидкие спускаются.	" Б.	63 ³ / ₄	71 ¹ / ₄	37	26 ³ / ₄
накапливаются отбросы: твердые извержения.	" Б.	63 ³ / ₄	71 ¹ / ₄	37	26 ³ / ₄
жидкие " " Б.	116 ³ / ₄	178 ³ / ₄	29 ¹ / ₂	159 ³ / ₄	—

1) В счет поставлено только 5 куб. фут. воды на человека в сутки.
2) В счет поставлены: вода (15¹/₂ коп.), стоимость увеличения разбрызгивания стоков (18³/₄ коп.), ремонт ватерклозетов (9¹/₄ коп.), и стоимость выводного капала (12¹/₂ коп.); стр. 594. 3) Настоящей цен нет; по действительному же орошению в Кройдон вычитывается в 31 коп.; а плата в 3 коп. с небольшим за 60 пуд. этого тука, который требует Лондонское акционерное общество Мейллингских нескот и которая составила бы вырчку в 123 коп. в год на каждого жителя, невыгодна для фермера, так как он, употребив 900000 пуд. жидких вод на десятину, стоимостью в 461 руб., возвращает в стоимости получаемого с этой десятины сена, едва плату за удобрение и аренду всего 556 руб.

Судаясь из городов или жилищ человеческими извержениями поступают различно: или принимают их (жидкие воды, рже почвопозолоты) непосредственно для удобрения почвы; или сливают их (почвопозолоту) в особые ямы, в которых оставляют бродить в чистом виде или с примесью; или же, наконец, перерабатывают их (почвопозолоту, твердые извержения) в более или менее сухие туки — нудреты, таффе компосты.

О первом случае мы скажем ниже в статье о применении удобрительных веществ; здесь же рассмотрим дальнейшую обработку человеческих извержений в видах приготовления их для удобрения почвы. Броже-

иногда приготавливаются человеческия изверженія во Фландриі, гдѣ каждый хозяинъ имѣетъ въ близости или на окраинѣ поля, лежащаго въ близости дороги, нѣсколько ямъ, вырытыхъ въ глинистомъ, непроницаемомъ для воды грунтѣ и закрытыхъ досками, или, что лучше, одну или нѣсколько систеръ, вмѣстимостью отъ 1,200 до 9,000 куб. фут. или отъ 2,500 до 20,000 ведеръ, тоже ямъ, но только съ двумя, вымощенными камнемъ и стѣнами, выведенными изъ кирпича и сведенными въ покрывающей систеру сводѣ. Каждая сторона имѣетъ два отверстія: одно большое вверху, посреди свода, служащее для наполненія систеры золотомъ и вычищиванія изъ нея золота; другое же меньшее, съ боку, съ сѣверной стороны для притока воздуха, необходимого для броженія. Въ такія систеры или ямы сваливаютъ ночное золото, за которыми посылаютъ въ ближайшій городъ въ то время, когда въ холмистѣ имѣтъ сибирскихъ работъ, и которое привозятъ въ бочкахъ, емкостью въ 7½ куб. фут. или 17 ведеръ каждая, укладываемыхъ до пяти рядомъ въ длину на дрогахъ. Ночное золото остается въ ямѣ пока перебродитъ. Если оно жидко *), то къ нему прибавляютъ малоцѣнныхъ жмыхъ рисовыхъ, ржиновыхъ; если же оно густо, то разводятъ его водой или навозной жидкостью. Доброкачественность *фламандскаго тука* (адю) — такъ называютъ перебродившее въ ямѣ золото — узнается по его запаху, вязкости и по солевому и острому его вкусу. Такой тукъ содержитъ до 0,2% азота. Изъ ямы тукъ никогда не вычерпывается вполне; нѣкоторое количество остается его какъ бы завыской для новыхъ количествъ золота.

Главное неудобство человеческихъ изверженій особенно въ томъ видѣ, въ какомъ они получаютъ изъ постоянныхъ ямъ въ городахъ, въ которыхъ они накапливаются безъ раздѣленія, есть ихъ водянистость и скорая разложимость, сопровождающаяся зловоніемъ и потерей важныхъ для цѣлей удобренія веществъ (азота, сѣры). Уменьшить эти неудобства стремятся, какъ мы видѣли, большою частью способами собиранія и удаленія изверженій изъ городовъ; но это дѣлается главной задачей приготвленія сухихъ туковъ, которые, поэтому, главнымъ образомъ, облегчаютъ примѣненіе человеческихъ изверженій на болѣе далекомъ сравнительно разстояніи отъ мѣста ихъ происхожденія. Человѣческія изверженія превращаются въ болѣе сухую массу или помощью выдѣленія изъ нихъ части влаги — приготвленіе собственно пудретовъ **) или же помощью распредѣленія содержащейся въ нихъ влаги на большую массу сухаго вещества примѣшиваніемъ къ нимъ другихъ болѣе сухихъ веществъ — *приготвленіе собственно компостовъ*. Выдѣленіе влаги производится или испареніемъ ея помощью искусственной теплоты или на воздухѣ или же отставиваніемъ и отдѣленіемъ болѣе жидкой части изверженій отъ отстоявшейся болѣе густой части ихъ ***). Устраненіе же зловонія и со-

*) Хорошее неразведенное водой золото должно имѣть удѣльный вѣсъ по крайней мѣрѣ 5° по Боже.

**) Пудреты и ураты — два названія, которыя употребляютъ иногда безразлично; иногда же послѣднее названіе присваиваютъ преимущественно тукамъ приготавливающимся изъ мочи, но имѣютъ неупотребительный.

***). Къ этимъ способамъ сущенія человеческихъ изверженій слѣдуетъ причислять также *вымораживание* ихъ, которое, какъ показывается опытомъ, значительно увеличиваетъ содержаніе твердыхъ веществъ въ части жидкости, остающейся незамороженной; такъ, напр., навозная жидка уд. вѣса 1,0147, содержащая 1,54% твердыхъ веществъ и 0,498% амміака, при замерзаніи, въ незамороженной части ея показывала уд. в. 1,0295 и содержала 2,56% твердыхъ веществъ и 0,875% амміака. Вымораживаніе, хотя практически еще неразрѣшенное, заслуживаетъ, однако вниманія особенно въ нашихъ условіяхъ.

храненіе въ изверженіяхъ важныхъ для цѣлей удобренія веществъ достигается примѣшиваніемъ къ нимъ веществъ, связывающихъ или поглощающихъ газы.

Удаленіе влаги, *высушивание* человеческихъ изверженій помощью искусственной теплоты оставлено, потому что при разнообразіи и неопредѣленности состава изверженій, особенно водянистыхъ, наклоняющихся въ постоянныхъ ямахъ, получавшихся изъ нихъ этимъ путемъ разнообразный, неопредѣленного состава, малоцѣнный часто тукъ неоплачивалъ издержекъ его производства, преимущественно издержекъ на топливо. А потому, въ послѣднее время приготвленіе пудретовъ заключается, главнымъ образомъ, въ просушкѣ на воздухѣ болѣе густыхъ изверженій, напр. твердыхъ, собираемыхъ отдѣльно отъ жидкихъ, или въ предвѣдительно отставиваніи болѣе жидкихъ изверженій и просушкѣ затѣмъ уже осадка на воздухѣ; въ обоихъ случаяхъ къ просушиваемой на воздухѣ массѣ прибавляютъ иногда связывающее амміакъ вещество, болѣе частью сѣрную кислоту. Для отставиванія болѣе жидкихъ изверженій изъ бочекъ, въ которыхъ они вывозятся изъ города, спараниваются въ плоскія, земляныя, иногда обложенныя досками ямы — резервуары: изъ этихъ же послѣднихъ, по осажденіи туки, болѣе жидкая часть изверженій переносится естественнымъ паденіемъ или счерпывается архимедовымъ винтомъ въ другія, изъ этихъ въ третью и т. д. резервуары до пяти, шести разъ, когда, по возможности освобождаясь отъ вмученныхъ частей, спускается въ рѣку или идетъ еще иногда на заводы для добыванія амміачныхъ солей (Нарингъ-Бонди). Когда въ резервуарѣ накопится достаточно осадка (а это наступаетъ скорѣе въ первыхъ, чѣмъ въ послѣднихъ резервуарахъ; между тѣмъ какъ изъ первыхъ осадокъ выбирается 2—3 раза въ годъ, изъ послѣднихъ онъ выбирается разъ въ 2—3 года), тогда или вывозятъ его изъ резервуара на тачкахъ и распускаютъ въ близъ лежащей площадкѣ нетолстымъ слоемъ, перемѣшиваютъ и доревораживаютъ его (обновляемъ) для ускоренія его просушки; затѣмъ, когда онъ достаточно просохнетъ, складываютъ его въ кучи, изъ которыхъ, спустя нѣкоторое время, снова разсыпаютъ мелкимъ слоемъ, размельчаютъ его, выбираютъ изъ него болѣе грубыя, неразмельчающіяся примѣсы и, просѣявъ, ссыпаютъ, наконецъ, въ большія кучи (иногда до 300 куб. саж.), въ которыхъ онъ продолжаетъ бродить съ выдѣленіемъ водяныхъ и амміачныхъ паровъ и изъ которыхъ онъ поступаетъ въ продажу. Или, осадокъ, по спускѣ съ него жидкости, обрабатывается въ резервуарѣ еще сѣрною кислотой (Лейпцигъ) для удержанія амміака при просушкѣ и затѣмъ высушивается на плетенкахъ подъ навѣсами, размельчается и просѣивается.

Иногда, при приготвленіи пудретовъ примѣшиваютъ къ изверженіямъ нѣкоторыя вещества, отчасти чтобы увеличить ихъ удобрительную цѣнность, напр. фосфорновислого-известковый порошокъ, кровь, голубиный пометъ, мясо; отчасти чтобы облегчить превращеніе ихъ въ сухую массу, напр. гипсъ, торфяную или бурого угля золу. Такіе пудреты приближаются уже къ приготвлившимся изъ золота компостамъ, отъ которыхъ отличаются лишь количествомъ примѣсей, всегда большимъ въ послѣднихъ, чѣмъ въ первыхъ. Для смѣшенія съ такими веществами, золото фильтруется иногда предварительно для выдѣленія изъ него крупныхъ примѣсей и дезинфицируется, а самое смѣшеніе производится помощью машинъ, и полученная масса просушивается въ особыхъ, вебогрѣваемыхъ искусственно сушильных: просушенная масса складывается, затѣмъ, въ кучи для броженія и, наконецъ, по окончаніи броженія, размельчается въ порошокъ и просѣивается. Пудреть, приготвленную такимъ образомъ съ сухими веществами, называется иногда

да *таффе*, хотя так называются собственно кирпичи, *) приготовляемые из смеси человеческих извержений с сухой глиной или сухим суглинком. Понятно, что в зависимости от различия извержений, способный приготовления из них пудрета и употребления тех или других примесей, должно находиться различие в составе пудретоу, как это показывают следующие числа.

Пудреть:	Воды.	органич. вещества.	азот.	зола.	фосфорной кислоты.	свободной нитратной кислоты.	кальц.	извест.	песку.
Московские **) с примесью:									
1) голубиного помета.	24,6	40,6	4,3	27,3	1,0	—	0,3	5,5	19,2
2) крова.	25,2	36,1	3,6	27,6	0,9	—	0,5	2,8	22,8
3) мяса и рыбы.	19,0	24,6	4,6	43,7	1,1	—	0,2	3,0	39,5
Парижский	28,0	29,0	1,8	43,0	8,5	2,3	0,4	3,8	24,8
							(раствор. нитрат. соед.)		
Бельгийский	12,8	36,2	2,0	51,0	3,0	—	0,6	—	29,3
Лейпцигский	3,4	31,2	2,1	55,4	3,0	—	0,6	1,1	—
Берлинский с примесью торфяной и бурого угля зола	4,2	6,0	0,4	89,8	1,1	—	2,3	22,6	36,1
Дрезденский с примесью крови	—	49,9	3,6	—	6,5	—	5,4	—	30,5
							(щелочи. соед.)	(примес. извест.)	
Басельск. Топа ***) { отъ 11,5 27,7 3,7 49,1 7,2 15,0 1,5 2,6 1,6									
{ до 16,8 40,7 6,1 11,5 3,0									

Это различие в составе пудретоу представляет большое затруднение к их употреблению — затруднение, которое может быть устранено лишь тщательным перебиранием больших партий пудрета, определением состава каждой такой партии, разбивкой ее соответственно составу и продажей пудрета с гарантией известного его состава.

*) В последнее время готовят (Петри в Берлине) кирпичи из дезинфицированных человеческих извержений для употребления как топлива, но, конечно, такое употребление их не отвечает вполне интересам сельского хозяйства, хотя это последнее и в этом случае может еще пользоваться золой.

**) Приготавливаются Височ. утвержд. Московск. тов. ассенизации и продаются за пуд: 1-го—20, 2-го—25 и 3-го—30 коп. и 3 коп. с пуда за укладку при покупке не менее 500 пуд.; при покупке же большего колич. за укладку ничего не платится. Провоз с пуда от 1³/₄ до 2 коп. за 100 верст, смотря по тарнеу желѣзной дороги. Азавач произв. г. Гедвилло в Москвѣ. В Орлѣ приготавливается пудреть г. Полторацки по 20 коп. за пуд.

***) Приготавливается по сохраняемому в тайне способу из смеси извержений, свободных от всяких примесей, по всей вероятности помощью обработки их серной кислотой, как это можно судить по большому содержанию в нем свободной кислоты и растворимой фосфорной кислоты (около 1/2 веса количества).

Наконец, для приготовления компоста в больших городах (Кельн, Лейпциг) смешивают золоту или с уличной грязью, золой и др. подобными городскими нечистотами, с прибавлением иногда каменноугольного дегтя для уничтожения зловония, в находящихся за городом ямах; или же съезжей. В последнем случае можно поступить так, если имеется проселочная дорога, которая, как это за частую бывает, врезывается в землю, называется стекающей на нее с колеи дождевой водой, и, вследствие этого, весьма легко дѣлается тонкой. Вдоль края такой дороги, между нею и полем, поднимают рядою плугом полосу земли в 24 фута ширины на 1 футу глубины; затем, доплатами перебрасывают разрыхленную землю с полосы, прилегающей к полю, на половину полосы прилегающую к дороге, так что получается куча рыхлой земли в 12 фут. ширины, 2 фута вышины и произвольной длины. В этой куче выкапывают углубления в 4 фута ширины, 10 фут. длины и 3/4 фут. глубины и получающиеся при этом землю возвышают краем углублений, так что образуются небольшие бассейны с хорешими стѣнками, в которых хорошо задерживается влажная и жидкая масса. От дороги продвигаются в каждый бассейн, в равном от краев его расстоянии, два выезда шириной в ширину хода бочья, чтобы облегчить спораживание этих последних. Таким образом, получается произвольно длинный ряд земляных куч, в 0,42 куб. саж. (6 фут. шир., 12 фут. длины и 2 фут. выш.), с необходимыми между ними промежутками в 2 фут. По наполнении углублений (с вылитием туда около 68 ведер золоты), посыпая поверхность золоты гисом (в колич. 1/2 куб. фута или с небольшим пуда), и когда жидкость вберется, перекапывают комкистую кучу, так чтобы, по возможности, вывернуть нижнюю землю вверх и уложить верхнюю вниз. После перекопки устраивают снова бассейны подобно тому как и в первый раз и, спустя несколько недѣль, вторично наполняют их и вторично перекапывают, так что послѣ этого тоже количество (0,42 куб. саж.) земли будет уже смешано с двойным количеством золоты (136 вед.—около 100 пуд.). Наконец, куча перекапывается второй, третий раз и т. д., пока компост не вполне посидит. Старательное перекапывание компоста, тщательное размельчение его и безпрепятственный доступ к нему атмосферного воздуха составляют необходимые условия хорошаго приготовления компоста. Готовый компост представляет рыхлую массу темнаго цвѣта, которая увеличивается в объем какъ тѣсто. Компост много сдѣлывается прибавлением к нему хлѣбнаго павоза и материалов, содержащих фосфорную кислоту и кали; первый ускоряет его посидѣние и пополняет его содержание в отношеніи недостающихъ ему составныхъ частей, что, впрочемъ, гораздо полѣе дѣлаютъ еще послѣдніе. Если бы необходимо для приготовления компоста земли нельзя было взять с придорожныхъ мѣстъ, то можно взять ее с полевыхъ возвышеній; а, при невозможности найти большее количество земли, можно вышеприведеннымъ количествомъ (0,42 куб. саж.) земли обработать двойное количество (около 272 вед.—200 п.) золоты. Полоса поля вдоль дороги, длинная своего верхняго слоя, при глубокомъ почвенномъ слое, легко исправляется в теченіи одного года, если ее удобрить хлѣбнымъ соломеннымъ павозомъ с осени, а весной засѣять возможно густо сильно отбѣлающими растѣніями (вилой сѣюсомъ).

Исследование компоста, приготовляемаго первымъ способомъ в Кельнѣ, показало содержание в немъ: 0,24% азота, 0,22% фосфорной кислоты, 1,85 кали, 0,6 натра, 2,14% известн., 3,02% гиса и 91,93% органическаго вещества, песка и земли на 100 ч. сухаго вещества.

Извержения домашнихъ животныхъ также употребляются

иногда въ чистомъ видѣ, напр. при удобреніи почвы толочкой (см. выше) или при системѣ примѣненія жидкаго удобренія *), когда изверженія животныхъ, стоящихъ въ хлѣвахъ на рѣшетчатомъ полу, проваливаются въ яму подъ полоть, смѣшиваются тамъ съ водой, отчасти употребляемой для обжыванія пола въ хлѣвахъ, отчасти нарочно прибавляемой для разжиженія массы съ цѣлью употребленія ея какъ жидкаго удобренія. Но эта система, возникшая въ Англіи, была большей частью оставлена даже и тамъ по причинѣ ея расходливости и неудобнопримѣнимости жидкаго удобренія подлѣ всѣхъ полевыхъ растений, въ особенности при влажномъ климатѣ и на болѣе плотныхъ почвахъ.

66. Изверженія птицъ и летучихъ мышей. Гуано.

Изверженія домашнихъ птицъ рѣдко накапливаются въ большомъ количествѣ, потому что они затаскиваются птицами, да и содержатся въ хозяйствѣ обыкновенно небольшое число птицъ. А потому употребленіе ихъ для удобренія довольно ограничено, не смотря на ихъ значительную удобрительную цѣнность, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы, въ которой о-бокъ съ составомъ изверженій птицъ показанъ составъ изверженій летучихъ мышей, накапливающихся въ пещерахъ **), въ довольно значительномъ количествѣ, обыкновенно въ пещерахъ, и превосходящихъ, по удобрительной цѣнности, изверженія домашнихъ птицъ.

	у курицы.	утки.	гуси.	голубя.	летучихъ мышей****)
Годовое количество изверженій въ фунтахъ	13,5***)	20,2	28,0	6,8	—
Во 100 част. изверженій содержится:					
воды	60,9	46,7	77,1	58,3	—
песку	6,7	10,8	5,7	7,0	2,9
Во 100 част. сухаго вещества, за исключеніемъ песка, содержится:					
органическихъ веществъ и амміачныхъ солей	59,3	85,0	74,9	81,5	68,3
въ нихъ азота	1,9	1,6	3,2	6,2	10,9
фосфорновислыхъ солей . .	13,8	7,4	5,2	7,8	—
въ нихъ фосфорной кислоты	—	—	—	—	3,5

*) Система Кеннеди, удерживавшаяся еще въ Триптриголь-серіи известнаго Лондонскаго Олдермена Мекки.

**) Венгрія, Сардинія, южная Франція, Алжиръ, Египетъ.

***) Индѣйскій птухъ 28 фунт.

****) Среднее изъ 3 анализовъ; изверженія не свѣжія съ содержаніемъ воды отъ 13 до 59%.

щелочныхъ солей	3,4	0,5	19,8	5,8	—
въ нихъ кали и натра . . .	—	—	—	—	2,2
сѣрноукислой извести . . .	—	—	—	5,0	—
сѣрной кислоты	—	—	—	—	1,9
углекислой извести	23,6	7,1	—	—	—
извести и магнезій	—	—	—	—	4,1

Изверженія домашнихъ птицъ употребляются для удобренія или въ болѣе или менѣе чистомъ, сухомъ и измельченномъ видѣ (голубиный *), куриный пометъ) или въ смѣси съ другими веществами въ компостѣ (см. ниже).

Гораздо большее значеніе нежели изверженія домашней птицы, питающейся преимущественно растительной пищей, имѣютъ изверженія морскихъ птицъ, питающихся животной пищей (рыбами). Изверженія морскихъ птицъ, накопившіяся въ теченіе долгаго времени и теперь еще накапливающихся на островахъ различныхъ морей и берегахъ различныхъ материковъ, известны подлѣ именемъ *гуано*. Кромѣ изверженій, въ образованіи гуано участвуютъ болѣе или менѣе перья, кости, яйца и цѣлые трупы птицъ и даже большихъ морскихъ животныхъ. Множество различныхъ сортовъ гуано, употребляющихся въ настоящее время для удобренія, можно различить на двѣ группы. Къ первой группѣ принадлежатъ сорта гуано, **) болѣе богатаго азотомъ (отъ 7 до 14 и даже 19%) и щелочами и бѣднаго фосфорной кислотой (отъ 7 до 13%); оно образовалось въ тепломъ и сухомъ климатѣ, такъ что за недостаткомъ влажности, могло уберечь азотистыя вещества отъ разложенія, а растворимыя отъ выщелачиванія. Ко второй группѣ принадлежатъ сорта гуано ***) болѣе бѣднаго азотомъ (отъ 0,1 до 3%) и щелочами и болѣе богатаго фосфорной кислотой (отъ 13 и даже 4 до 40%), которое образовалось въ тепломъ же, во влажномъ климатѣ, такъ что потеряло значительныя количества азотистыхъ веществъ отъ

*) Употребленіе голубиного помета довольно распространено у насъ, въ особенности въ окрестностяхъ Москвы. Пудъ его стоитъ на мѣстѣ его накопленія, на колокольняхъ, чердакахъ нѣрѣдко 5 и менѣе копѣекъ.

**) Перуанское (преимущественно съ острововъ Хинхасъ близкое къ источенію), Ангамоское съ Иабеллонъ-де-Пина, Лобоское съ остр. Пунта-де-Добосъ, Балестаское съ остр. Балестасъ, Гуакасское съ остр. Гуанапескихъ и др. въ Южной Америкѣ у береговъ Перу; Ихабовское, Сальдальга-байское, Шайское изъ Южной и Египетское изъ Сѣверной Африки.

***) Патагонское, Боливское, Мендосинское съ береговъ Боливіи, Мараканское или Монское съ береговъ Венесуэлы изъ Южной и Мексиканское изъ Сѣверной Америки; Сомбреросское и Новаска-востокъ съ остр. Сомбреро и Нозаса изъ Вестъ-Индіи; Бакаръ, Джервисъ, Гауландъ, Мальденъ и Старбукское съ острововъ Тихаго океана того же имени; Австраійское изъ Шаркз-Бай и Сванъ-Исландъ въ Австраліи; и Коорія-Мооріанское изъ Азіи.

разложения и растворимых отъ выщелачивавія. Границы между этими группами, конечно, не такъ рѣзкі; имѣются сорта гуано *) съ 3—6% азота и 11—15% фосфорной кислоты, которые образуютъ, такъ сказать, переходъ отъ одной группы въ другую. Слѣдующая таблица (стр. 615) показываетъ составъ нѣсколькихъ наиболее вѣстныхъ сортовъ изъ каждой группы.

Сорта гуано первой группы, въ особенности перуанское, представляютъ довольно однообразную порошкообразную массу отъ свѣтлаго коричнево-желтаго до коричневаго цвѣта, съ особеннымъ запахомъ, который усиливается при увлажненіи ея и происходитъ не столько отъ амміака сколько отъ содержащихся въ ней вѣстныхъ жирныхъ кислотъ. Гуано содержитъ мочевую, шавельную и жирныя кислоты, смолы и другія азотистыя (гуанины) и сѣрнистыя органическія вещества, фосфорнокислыя щелочныя земли (известъ и магнезію) и щелочи (амміакъ и кали), сѣрнокислыя и хлористыя щелочи и вѣснова кремневой кислоты и песку. Самое большое количество азота гуано содержитъ въ видѣ мочевой кислоты и амміака въ соединеніи съ мочевой, шавельной, фосфорной, сѣрной, соляной и угольной кислотами и незначительныя количества его въ видѣ другихъ органическихъ соединений и азотной кислоты (отъ 0,1 до 0,3 селитры). Гуано содержитъ тѣхъ менѣе мочевой, чѣмъ болѣе шавельной кислоты, которая есть продуктъ разложения первой; содержаніе же летучаго углекислаго (собственно полуторно углекислаго) амміака увеличивается въ немъ, въ случаѣ его подмочки, напр. морской водой во время провоза его какъ балласта въ нижнихъ частяхъ кораблей. Въ порошкообразной массѣ гуано примѣшаны обыкновенно такъ называемыя *гуановыя желваки* или отдѣльныя кристаллы (напр. углекислаго амміака въ Шайскомъ гуано) или перья, костяныя частицы, камни и т. д. Желваки представляютъ собой сростки различной величины (отъ кулака до рисоваго сѣмена), плотные или легко растворяющіеся, кристаллическаго (листовато-, лучисто-) или полукристаллическаго полужемлистата сложенія, матовые или блестящіе, бѣлаго, сѣровато-бѣлаго, красноватаго, коричневаго цвѣта. Составъ ихъ менѣе или болѣе удаляется отъ состава гуано: они состоятъ иногда почти изъ одной поваренной соли или одного двууглекислаго амміака, иногда же, главнымъ образомъ, изъ сѣрнокислаго кали или фосфорнокислаго амміака съ другой изъ этихъ солей, съ сѣрнокислыми натромъ и амміакомъ, фосфорнокислыми, шавельнокислыми и хлористымъ амміакомъ и поваренной солью. Составъ какъ основной массы гуано, такъ и примѣшавшихся къ нему желваковъ разнится по глубинѣ нахожденія ихъ въ гуановой залежѣ; наиболѣе богаты амміакомъ гуано изъ средняго слоя залежи, въ которомъ задерживается амміакъ какъ выщелачивающійся изъ верхнихъ болѣе свѣтлыхъ такъ и улетучивающійся изъ нижнихъ болѣе темныхъ слоевъ. На составъ гуано вливаютъ слоевъ имѣютъ вліяніе трупы большихъ животныхъ, погребенныхъ подъ гуановой залежью. Желваки гуано вѣстныхъ слоевъ преимущественно изобилуютъ сполнаюшимися здѣсь солями щелочей и щелочнымъ землемъ, въ особенности сѣрнокислымъ кали. Изъ сказаннаго видно, что гуано содержитъ много азота и фосфорной кислоты въ легко растворимыхъ соединеніяхъ, слѣдовательно въ удобовоспріимомъ для растений состояніи. Хорошее гуано этой группы, по сожженію его, оставляетъ около 3/4 своего вѣса чистой бѣлой зола.

*) Чилийское изъ Южной и Калифорское и съ острова Пасога изъ Северной Америки. У насъ есть малозвѣстное Вломорское гуано.

	1 группы.			Калифорское.	2 группы.							
	Английское.	Перуанское.	Саламанка-бѣлое.		Мексиканское.	Джарвисское.	Маллорское.	Маллорское.	Новосса-фосфатъ.)	Сомбрерское.)	Валморское.	
Воды.....	7,4	14,8 ¹⁾	11,4 ²⁾	25,0	29,6	12,1	34,0	4,4	3,5	9,0	4,0	
Органическаго вещества и аммиачныхъ солей.....	64,8	52,4	36,6	33,0	7,7	6,0	—	8,1	4,6	0,2 ³⁾	7,8	
Въ нихъ всего азота.....	19,3	14,4	9,0	5,7	0,2	0,7	—	0,4	—	—	1,0	
Зола.....	27,8	32,8	44,8	42,0	62,7	81,9	—	87,5	91,9	90,8	88,2	
Въ ней фосфорнокислыхъ солей.....	15,5	29,5	20,1	26,0 ⁴⁾	8,5 ⁴⁾	38,6	63,5	73,4	77,7	86,5	88,0	
Въ нихъ фосфорной кислоты.....	7,1	13,5	9,5	11,9 ⁵⁾	3,9 ⁵⁾	17,7	33,0	33,6	35,6	39,6	40,3	
известъ.....	5,1	11,0	7,9	—	28,1	34,8	—	43,2	38,4	38,6	43,4	
магнѣзій.....	1,1	1,2	0,5	—	—	0,6	26,0	1,5	1,7	—	2,2	
окиси желѣза.....	0,9	0,3	0,4	—	—	0,1	3,0	0,7	3,4	—	0,1	
глинозема.....	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	7,1	—	
каль.....	2,6	2,3	1,3	—	—	0,5	—	0,2	0,3	—	0,2	
натра.....	0,6	1,4	0,3	10,2	2,9	0,3	0,2	1,3	0,3	0,6	0,7	
хлора.....	1,7	1,3	0,5	—	—	0,2	0,3	1,0	0,1	0,9	0,1	
сѣрной кислоты.....	1,3	2,1	0,4	—	—	27,0	—	0,8	0,2	0,8	0,9	
угольной.....	—	—	—	—	22,0	—	—	5,5	2,6	2,2	—	
временной.....	0,4	0,1	0,2	3,8	—	—	—	—	1,3	—	—	
Песку.....	6,5	1,7	22,6	—	—	0,3	1,0	—	1,3	1,0	—	
							(нерастворимаго.)			(остаточнаго.)		
Каменшоль, перья, корней и т. д.	—	—	7,3	—	—	—	2,5	—	—	—	—	
							(остаточнаго и потерн.)					

¹⁾ Среднее изъ 8 и ²⁾ изъ 2 аналитовъ. ³⁾ Ключево-кислый амміакъ. ⁴⁾ За исключеніемъ этихъ двухъ чиселъ, всѣ остальные въ этомъ ряду вычислены изъ содержанія фосфорной кислоты въ видѣ трехосновной фосфорнокислой извести, а для меллоресскаго гуано въ видѣ трехосновной фосфорнокислой магнезіи. ⁵⁾ эти два числа вычислены изъ количества фосфорнокислыхъ солей, содержащихся въ гуано, предполагая эти послѣднія трехосновной фосфорнокислой известью.

*) Сомбрерское гуано считается некоторыми за особенный минералъ Сомбреритъ подобно тому какъ и Новосса-фосфатъ съ острова Новосса въ Вестъ-Индіи же. Образовавшіеся при участіи коралловой извести острововъ, на которой отлагались изверженія птицъ, они содержатъ углекислую и сѣрнокислую извести, глиноземъ и окиси желѣза, которой особенно много въ послѣднихъ. Они представляютъ несъма различнаго вида массы: Сомбреритъ — зернистую свѣлыхъ: желтаго, зеленого, желтовато-зеленаго, розоваго и голубоватаго или болѣе темнаго фиолетоваго цвѣта или болѣе плотную, однообразную массу бѣлаго или желтовато-бѣлаго цвѣта. Новосса-фосфатъ — зернистую массу или конгломератъ зеренъ, связанныхъ фосфорнокислой известью или земляistou массу отъ бѣлаго до красноватаго цвѣта.

Между тѣмъ какъ сорты гуано первой группы сходны по своему составу съ туками, которые приготавливаются изъ дѣлныхъ животныхъ организмъ и называются часто, въ силу этого сходства, гуано (напр. рыбное гуано), сорты второй группы приближаются къ фосфорнокисло-известковымъ минераламъ; они представляютъ весьма разнообразныя массы: или порошкообразную, землястую массу, походящую болѣе или менѣе на гуано первой группы (напр. Боливское гуано, гуано съ острововъ Тихаго океана), свѣтло-желтаго (Старбукское), бураго (Бакерское) и даже чернаго (Джервисское) цвѣта; или болѣе или менѣе легко растирающуюся плотную массу болѣе или менѣе темнаго бураго цвѣта, или даже походящую на песчаную массу. Нѣкоторые изъ нихъ (напр. Монское) образуютъ большіе плотные комки спаружа бѣлые, какъ бы эмалированные, внутри же шоколаднаго цвѣта, а между этими частями — бурые поздраватаго строенія. Къ порошкообразнымъ сортамъ этого гуано точно также примѣшиваются камни, болѣе или менѣе твердые куски (въ Бакерскомъ гуано желтовато- и сѣроваго-бураго цвѣта), обломки коралловой известки (Бакерское), зерна кристаллической фосфорнокислой амміакъ-магнезии (Меллонесское), перья, костяныя части, остатки рыбъ (Монское), корни (въ особенности португала въ Бакерскомъ) и т. д.

Приготовление гуано для удобренія заключается въ измельченіи его и тщательномъ смѣшеніи разнородныхъ его частей, съ цѣлю получения болѣе удобораспредѣлимаго порошка съ возможно равномернымъ составомъ во всей его массѣ; или же, въ просушѣ, измельченіи и обработкѣ его послѣдъ затѣмъ сѣрной кислотой — въ приготовленіи такъ называемыхъ *фосфо-гуано* изъ гуано первой группы и *суперфосфатовъ* изъ гуано второй группы, особенно бѣднаго органическимъ веществомъ. Измельченными только употребляются преимущественно сорты гуано первой и отчасти порошкообразныя второй группы, напр. Меллонесское гуано. Сѣрной же кислотой обрабатываются преимущественно сорты второй группы, въ особенности представляющіе почти чистую фосфорнокислую известку или магнезію, напр. Новасса-фосфатъ, Сомбреритъ, Меллонесское гуано; а иногда и сорты первой группы, особенно если они подмочены.

Обработка сѣрной кислотой переводитъ нерастворимую фосфорную кислоту въ растворимую (стр. 554), что особенно важно у сортовъ гуано второй группы; у сортовъ же первой группы это менѣе важно, потому что въ нихъ и безъ того достаточно растворимой фосфорной кислоты; изъ нихъ растворяется фосфорная кислота, не только соединенная съ щелочами, но и соединенная съ щелочными землями въ трехосновныя соли въ присутствіи находящихся тутъ же растворителей — щелочныхъ солей, которыми сравнительно богаты эти сорты гуано; особенно же въ присутствіи щавельно-кислаго амміака и сѣрнокислыхъ щелочей — послѣднія, при достаткѣ влаги, переводятъ въ растворъ фосфорнокислую известку, изъ которой щавельно-кислый амміакъ осаждастъ щавельнокислую известку съ образованіемъ растворимаго фосфорнокислаго амміака. Тѣмъ не менѣе обработка сѣрной кислотой этихъ сортовъ гуано увеличиваетъ содержаніе въ нихъ растворимой фосфорной кислоты, но еще важнѣе то, что она переводитъ азотъ мочевои кислоты въ сѣрнокислый амміакъ — въ удобоусвояемый для растений видъ, предупреждаетъ, слѣдовательно, образование летучаго углекислаго амміака и связы-

ваетъ образовавшееся уже количество этого послѣдняго; это же послѣднее имѣетъ особенное значеніе для подмоченнаго гуано. Наконецъ, обработанное сѣрной кислотой гуано приводится въ мелкій, нѣсколько влажный порошокъ, болѣе удобный для распредѣленія, чѣмъ сырое гуано, обыкновенно комковатое, которое легко переходитъ въ пылеобразное состояніе при измельченіи его, необходимомъ для удаленія изъ него комьевъ, а потому легко разсыпется вѣтромъ при разбрасываніи его по полю. Измельченіе гуано и обработка его сѣрной кислотой составляютъ обыкновенно заводское производство.

6. Отбросы заводской и фабричной переработки

а) животныхъ веществъ.

Костяной уголь, употребляемый для очищенія сахарныхъ соковъ, готовится изъ костей, которые для этого или сперва обжигаются разбитыя на большіе куски и затѣмъ уже обожженные измельчаются въ зерно, или же, какъ это стали дѣлать въ послѣднее время, предварительно измельчаются въ зерно и затѣмъ уже обжигаются. Въ первомъ случаѣ, при поджиганіи угля, получается много пыли, (муки) и болѣе крупныхъ костяныхъ частей, которые употребляются для удобренія, если неидутъ для приготовленія ваксы, краски и т. д.; въ послѣднемъ же случаѣ получается мало пыли и еще менѣе болѣе крупныхъ частей, которые почти всегда идутъ на приготовленіе краски. Затѣмъ, костяной уголь, при употребленіи его, на сахарныхъ заводахъ, задерживаетъ изъ сахарнаго сока различныя вещества и терпѣть, вслѣдствіе этого, свою освѣтляющую сокъ силу; а потому, для возвращенія ему этой силы, подвергается оживленію, т. е. броженію, обработкѣ кислотами, промывкѣ и новому обжиганію, при чемъ пылеватыя части его уносятся водой и въ влажномъ или просушенномъ видѣ поступаютъ на заводы удобрительныхъ веществъ подъ названіемъ *промыннаго* или *иловатаго* угля; туда же поступаетъ, наконецъ, подъ именемъ *бытоваго въ употребленіи угля* и тотъ зернистый уголь, который, послѣ нѣсколькихъ оживленій, невозстановляется уже болѣе въ своей очищающей сокъ силѣ новыми оживленіями. При каждомъ обжиганіи тернется нѣсколько органическаго вещества и преимущественно заключающагося въ немъ азота; при обработкѣ кислотами часть фосфорной кислоты дѣлается растворимой, а при промывкѣ теряются растворимыя составныя части, и костяная пыль смѣшивается съ посторонними примѣсями, напр. пескомъ; при употребленіи угля для освѣтленія сока, къ нему приливаются задерживаемыя имъ вещества, преимущественно известъ и органическія, какъ содержащія азотъ, такъ и не содержащія его вещества, въ особенности же первые, если какъ, при разжиженіи, онъ смѣшивается съ кровью, которая, впрочемъ, на нѣкоторыхъ заводахъ уже болѣе неупотребляется для этой цѣли. Поэтому,

составъ различныхъ костяноугольныхъ отбросовъ весьма различенъ, какъ это показываютъ слѣдующія числа сравнительно съ составомъ свѣжаго костянаго угля.

Костяной уголь:

	Органич. вѣщ. и угл.	въ нихъ азотъ,	фосфорной кислоты, въ нихъ фосфорной кислоты,	углекислоты извест.	растворимыхъ солей.	песку, глины, окиси железа и пр.
Свѣжій (средній составъ)	9,6%	—	79,3% ⁽¹⁾	36,4%	8,2%	1,8% ⁽²⁾
бывшій въ употребленіи (среднее изъ 7 анализовъ)	9,5% ⁽³⁾	—	49,7	22,8*	6,0	1,8
зернистый, бывшій въ употребленіи (среднее изъ 3 анализовъ)	30,2	—	82,5	37,8*	14,3	8,1
мучистый, (среднее изъ 6 анализовъ)	20,1	—	65,0	29,8*	10,2	4,7
порошкообразный свѣжій	4,7	0,5	56,6*	25,9	—	5,9
бывшій въ употребленіи	6,3	0,9	73,8*	33,8	—	12,0
свѣжій	5,4	0,7	65,3*	29,9	—	8,0
бывшій въ употребленіи	1,4	0,1	23,6*	10,8	—	5,0
свѣжій	4,1	0,5	73,3*	33,6	—	25,3
бывшій въ употребленіи	2,9	0,3	54,6*	25,0	—	13,6
свѣжій	11,3	1,2	72,2	33,1*	5,3	9,5
бывшій въ употребленіи	32,0	2,8	53,7	24,6*	4,9	7,9
свѣжій	42,2	3,6	46,0	21,0*	3,3	7,1

*) Обозначенные * числа вычислены по трехосновной фосфорнокислой извест.

**) Въ томъ числѣ 1,3% фосфорнокислой магнезии; *) въ томъ числѣ 0,3% фосфорнокислой извест., 1,0% щелочей, сѣры и пр., 0,5% поваренной соли; *) въ томъ числѣ 0,3% окиси-закиси железа.

Костянымъ углемъ заканчивается рядъ удобрильныхъ веществъ, которые доставляютъ преимущественно фосфорнокислую известъ для удобренія и къ которымъ, слѣдовательно, принадлежатъ: фосфорнокисло-известковые минеральные вещества (апатиты, фосфориты, копролиты, самородъ), кости, костяная зола, гуано и преимущественно гуано второй группы и костяной уголь. Опытъ показываетъ, что фосфорная кислота растворяется труднѣе всего изъ фосфорнокисло-известковыхъ минераловъ, затѣмъ изъ костяной золы и костянаго угля, костей и легче всего изъ гуано.

Такъ, если положить растворимость фосфорной кислоты въ чистой водѣ изъ костяной золы равной 1, *) то въ одномъ случаѣ растворимость ея изъ другого сорта костяной золы была 1,6, изъ фосфорнокисло-известковыхъ минераловъ отъ 0,1 (эстремадур-фосфоритъ) до 0,5 (кембриджскіе копролиты);

*) 100 милл. частей воды растворили 168 част. фосфорнокислой извест. изъ костяной золы.

изъ гуано второй группы отъ 0,7 (Сомбрерита) до 1,1 (Коорія-Моорія); изъ перуанскаго гуано — 2,1, изъ свѣже осажденной фосфорнокислой извест. во влажномъ еще состояніи — 4,8, прокаленной и измельченной въ порошокъ — 1,9; изъ свѣже осажденной фосфорнокислой магнезии въ влажномъ еще состояніи 12, прокаленной и измельченной въ порошокъ 6. Въ другомъ случаѣ *), въ которомъ, сравнительно съ первымъ, изъ костяной золы растворилось въ чистой водѣ почти въ 4 раза больше фосфорной кислоты, изъ костянаго угля въ 1,5, изъ костяной муки въ 7,5, изъ гуано второй группы (Бакеръ и Джервисъ) въ 26 и изъ свѣже осажденной фосфорнокислой извест. въ 92 раза больше чѣмъ изъ костяной золы въ этомъ второмъ случаѣ. При соприкосновеніи воды съ этими веществами болѣе надѣли, въ теченіе трехъ недѣль до четырехъ мѣсяцевъ, было замѣчено уменьшеніе растворимости фосфорной кислоты. При изслѣдованіи въ лабораторіи Петровской академіи растворимости фосфорной кислоты въ водѣ насыщеннѣйшей углекислотой, оказалось, что на 1 часть **) фосфорной кислоты растворившейся изъ костяной золы растворилось 0,8 изъ костянаго угля, 2 изъ Дмитровскаго (Московск. губ.) фосфорита, 5,2 изъ костяной муки, 10 изъ азотированнаго фосфоритнаго порошка и 30,5 частей изъ свѣже осажденной фосфорнокислой извест.

Малая растворимость фосфорной кислоты изъ костянаго угля побуждаетъ къ обработкѣ его сѣрной кислотой, къ приготовленію изъ него суперфосфата, исполняемому обыкновенно на заводахъ удобрильныхъ веществъ; при этомъ иловатый уголь обрабатывается безъ всякаго подготовленія. Неменьшая растворимость фосфорной кислоты изъ костянаго угля, чѣмъ изъ костяной золы дѣлаетъ излишнимъ озоленіе костянаго угля, какъ это дѣлается иногда съ цѣлю увеличенія удобрильной его цѣнности.

Роговыя стружки (болѣе мелкія называются у насъ *тернужиной*) получаютъ при выдѣлкѣ изъ рога различныхъ роговыхъ издѣлій (напр. гребней) и, если неидутъ на заводы для полученія синильнаго кали, то (преимущественно мелкія стружки) употребляются для удобренія и представляютъ удобрильное вещество значительной цѣнности, такъ какъ 93% сухаго вещества ихъ состоятъ изъ 68% органическаго вещества (въ томъ числѣ 10% азота), и 25% золы (въ томъ числѣ 6,6% извест., 5,5% фосфорной кислоты, 11,0% кремниевой кислоты и песку). Впрочемъ, рога перѣдко съ костяными частями, копыта, роговая стружка перерабатываются на заводахъ въ такъ называемую *роговую муку*, ***) для чего роговая масса предварительно *поджаривается* или *распаривается*.

Поджариваніе состоитъ въ сильномъ нагрѣваніи на желѣзныхъ противняхъ на въ плоскихъ чугунныхъ котлахъ, въ которыхъ роговая масса рас-

*) 100 миллион. частей воды растворили 625 частей фосфорной кислоты изъ костяной золы.

**) 100 миллион. частей воды насыщеннѣйшей углекислотой растворили 130—260 ч. фосфорной кислоты.

***) Въ Ригѣ у Р. Томсена, съ 5 1/2% фосфорн. кислот. и 12% азота, стоятъ 1 руб. за пудъ.

пускается нетолстым слоем и постоянно помѣшивается въ предупредительные подгорания, сопряженнаго съ потерей азота. Для мелкой роговой массы, напр. стружек достаточно даже, вмѣсто поджариванія, болѣе продолжительное пагряваніе на полу жарко натопленной сушильни. Вѣзданіе поджариванія роговая масса темнѣет и, по охлажденіи, становится ломкой, легко измѣлчающей. Распариваніе производится въ дигесторахъ (стр. 564), употребляемыхъ также для распариванія костей. Роговая масса, распарившаяся въ теченіи 2 часовъ, подъ давленіемъ 2—3 атмосферъ, имѣетъ видъ каучука и, по просушкѣ въ сушильнѣ, превращается въ черную, стекловатую массу, легко измѣлчающуюся на костемоляхъ въ муку. Вотъ составъ двухъ образцовъ такой муки, въ коихъ первая происходитъ изъ роговой массы съ примѣсью костяныхъ частицъ.

Вода	Органич. веществ.	въ немъ азота.	фосфорно-кисл. щелочныхъ земель.	въ немъ фосфорной кислоты.	круглыхъ и неправильныхъ веществъ.	песку.
I — 9,48	71,75	13,07	(11,46)	5,54	7,93	5,28
II — 9,61	81,99	—	—	2,38	3,72	2,30

1) Кроме извести и магнезіи, соединенныхъ съ фосфорной кислотой, сѣрнистой извести 1,66%, углекислой извести 0,37%; 2) извести 2,9%, магнезіи 0,11%, глинозема и окиси желѣза 0,26%, и проч. 0,45%.

Жидкость, получающаяся при распариваніи роговой массы, содержитъ иногда 11% сухаго вещества, въ томъ числѣ около 2% азота, и прибавляется иногда нѣсколько сгущенной (до $\frac{1}{2}$) къ костяному суперфосфату для увеличенія содержанія въ немъ азота.

Обрѣзки кожи, особенно новой, содержащей отъ 7 до 11% азота въ сухомъ веществѣ (сухое вещество старой, пошеенной кожи содержитъ азота не болѣе 4—5%), могутъ служить съ пользою для приготовленія туковъ, если не находятъ себѣ другаго, болѣе выгоднаго употребленія.

Ихъ распариваютъ или поджариваютъ для превращенія въ порошокъ. Но, хотя распариваніемъ обрѣзковъ, за которыми слѣдуетъ просушка, получается черпобурая, легко истирающаяся въ порошокъ масса съ 91% органическаго вещества, содержащаго 17,5% азота, и 6% золы, состоящей преимущественно изъ фосфорнокислой извести; тѣмъ не менѣе при распариваніи кожаныхъ обрѣзковъ получается такой массы сравнительно мало, такъ какъ значительная часть кожи растворяется въ горячей водѣ; къ тому же распаренная масса содержитъ неразрушенное дубильное вещество кожи и весь песокъ, который былъ примѣшанъ къ обрѣзкамъ; а потому содержаніе азота въ муку изъ распаренныхъ кожаныхъ обрѣзковъ колеблется между 8—9%. Поджариваніемъ кожаныхъ обрѣзковъ получается также дурныхъ качествъ мука, хотя при поджариваніи почти не теряется азота или теряется его гораздо менѣе тѣмъ при распариваніи. Поэтому слѣдуетъ предпочесть этимъ способамъ превращенія кожаныхъ обрѣзковъ въ муку обработку ихъ щелочами (напр. смѣсью глауберовой соли съ фѣвкой известью) или англійской сѣрной кислотой; такъ какъ изъ кожаныхъ отбросовъ, оставшихся въ теченіи нѣсколькихъ дней въ соприкосновеніи съ 5% растворомъ кристалли-

ческой соды или 20—40% сѣрной кислоты при обыкновенной температурѣ, перешло въ растворъ: въ первомъ случаѣ 29% и во второмъ 23—29%, тогда какъ изъ распаренныхъ кожаныхъ отбросовъ растворилось въ кипящей водѣ всего 16% кожаной массы. Если кожаные отбросы нагрѣть до кипѣнія вмѣстѣ съ соотвѣствующимъ количествомъ сѣрной кислоты 50—60° по Боме, въ свинцовомъ или даже чугунномъ котлѣ, паромъ, проведеннымъ между стѣнами двойнаго дна или въ змѣевидную трубку, то они растворяются въ темнобурюю жидкость, которую можно спустить черезъ нѣбьющую въ котлѣ пробѣ и употребить какъ обыкновенную сѣрную кислоту для разложенія костей. При этомъ сохраняется весь азотъ кожаныхъ отбросовъ, между тѣмъ какъ дубильная кислота ихъ разрушается, а примѣшанный къ нимъ песокъ осадаетъ на дно.

Изъ весьма различныхъ отбросовъ кожевенныхъ заводовъ могутъ служить для удобренія волоса и шерсти, снимаемая со шкуръ, и известковые остатки изъ известковыхъ имъ, въ которыхъ бучать шкуры.

Объ удобрительной цѣности первыхъ, въ которыхъ найдено отъ 5,5 до 8% азота, въ зависимости, конечно, отъ количества постороннихъ примѣсей къ нимъ, можно судить потому, что овечья шерсть, напр., состоитъ изъ:

10,44% воды	0,19 кали
27,02 жира	0,03 натра
59,60 чистой шерсти	0,01 хлора
0,18 окиси желѣза	0,03 углекислоты
0,25 извести	0,03 фосфорной кислоты
0,06 магнезіи	0,25 сѣрной „ и

1,91% песку; даѣе, потому что волоса содержатъ отъ 1 до 4% (а у человека даже до 5%) сѣры и отъ 0,54 до 1,85 золы, которая состоитъ изъ преобладающихъ количествъ сѣрникоислыхъ солей (калии или натра) или кремнезема, меньшихъ — фосфорнокислой извести (0,1—0,2% золы и еще меньшихъ — сѣрникоислой и углекислой извести, окиси желѣза, углекислыхъ натра и магнезіи и поваренной соли; наконецъ, потому что органическое вещество волосъ содержитъ до 18% азота. Удобрительную цѣнность втораго отброса можетъ испити анализъ слѣдующихъ двухъ образцовъ его:

Воды	7,0—5,6	фосфорнок. извести	6,2—3,8
Органич. вещества	48,3—45,6	углекислой „	34,2
въ немъ азота	2,8—3,4	магнезіи	4,3

Къ отбросамъ по переработкѣ шерсти принадлежатъ: 1) осадки изъ промывныхъ водъ, служившихъ для промывки шерсти до приданія въ слабый щелокъ и сушки до валенія его; 2) шерстяная пыль и болѣе крупные шерстяные отбросы, получающіеся при трепленіи шерсти на водѣ-машинѣ, разчесываніи ея, выщипываніи узелковъ, коновъ и постороннихъ тѣлъ изъ твари, при стрижкѣ сулла и т. д. 3) шерстяное тряпье отъ стараго изношеннаго платья, негодныхъ болѣе для употребленія пресовыхъ салфетокъ и т. д.

известковых частей, равно как осадок из воды, в которой отмывались переваривающиеся на клей вещества от извести, употребляются для удобрения: первый под названием *клеяного тука* (3) а второй — *известкового тука* (4).

Вотъ составъ ихъ:	1.	2.	3.	4.
влаги	26,10	4,10	37,26	37,92
сгораемаго вещества } —	57,00	57,00	35,47	3,35
изъ нихъ азота	(2,68)	(2,10)	(1,80)	(—)
кальц	0,21	0,32	0,15	—
натра	0,29	0,11	0,14	—
извести	32,06	27,54	12,23	25,00
магнѣзін	0,99	0,42	0,53	1,08
окиси желѣза	2,81	—	0,21	—
глинозема	—	0,35	0,15	—
фосфорной кислоты	28,18	0,96	1,09	0,32 ²⁾
сѣрной „	1,22	1,29	0,29	—
углекислой „	0,38	13,00	9,86	20,55
кремневой „	—	0,83	—	—
хлора	2,28	—	—	—
нерастворимаго остатка	5,53	12,20	2,70	11,88

4) Содержание азота въ остаткахъ этого рода доходить иногда до 2%, а фосфорной кислоты до 3%, но за то и падаетъ первого до 1,2%. 2) Вычислено изъ фосфата, предполагая его известковымъ.

Салотопки даютъ шкварки, которые остаются по вытопленіи сала, состоятъ преимущественно изъ животныхъ тканей и богаты азотомъ (при 8,2% воды 11,9% азота), а если сало вытапливается съ подкисленной водой, какъ это дѣлается въ Западной Европѣ, то получается *кислая жидкость*. Если шкварки, по значительному содержанию въ нихъ азота, идутъ на приготовленіе тука, то они по возможности освобождаются отъ жира и превращаются въ туку подобно другимъ животнымъ тканямъ (мясу и т. д.); что же касается кислой жидкости, то она можетъ быть превращена въ сухой туку насыщениемъ ея известію и послѣдующей затѣмъ просушкой (отчасти выпариваніемъ).

Вотъ составъ жидкости (I) и получающагося изъ нея тука (II):

	водѣ.	органич. веществъ.	всего азота.	фосфорной кислоты.	сѣрной кислоты.	углекислой кислоты.	извести.	окиси желѣза и глинозема.	песку и проч.
I.	74,14	20,15	(1,80)	0,33	2,59	2,80(возм)			
II.	12,33	50,84	(5,02)	6,54	(2,9)	13,40	(7,88)	3,40	2,93 1,46 8,90

Кромѣ того, при солениі сельдей (и другой рыбы) получаютъ остатки

рыбной массы (часть шеи съ внутренностями), которая равно какъ и *селенный разсолъ* могутъ быть употреблены съ пользою для удобренія земли: о составѣ первой можно судить по даннымъ стр. 578, а второй въ 31,8% сухаго вещества содержитъ 25,5% поваренной соли, 0,4% фосфорной кислоты и 0,6% азота.

Наконецъ, при выщелачиваніи горячей водой сплавленную съ поташемъ азотосодержащаго угля (приготавлиаемаго изъ рога, вронн, копытъ, кожаныхъ остатковъ, шерстяной пыли и проч.) для полученія *синильнаго кали*, получается остатокъ, который, по значительному содержанию въ немъ: кали (12%), фосфорной кислоты (6%) азотосодержащаго угля (10—11%) можетъ имѣть немалую цѣнность для сельскаго хозяйства; по этотъ остатокъ, предварительно употребленія его для удобренія, долженъ подвергнуться дѣйствию воздуха, дабы содержащаяся въ немъ въ значительномъ количествѣ, вредная для растений закиси желѣза (8%) и сѣрнистое желѣзо (4%) могли окислиться выше въ окись желѣза и сѣрную кислоту. При этомъ лежаніи на воздухѣ нѣсколько уменьшается содержаніе кали (на 1,5%), азотосодержащаго угля (на 1%) и нѣкоторыхъ другихъ растворимыхъ соединений (на 5%).

66) Растительныхъ веществъ.

Отбросы заводской или фабричной переработки растительныхъ веществъ, при всей полезности ихъ для удобренія земли, употребляются, однако непосредственно для удобренія сравнительно рѣдко, потому что употребляются съ большей пользою для другихъ цѣлей, какъ напр. въ кормъ или подстилъ скоту и т. д. Первое мѣсто между этими отбросами занимаютъ конечно *жмыхи*, какъ отбросы *маслобоянь*, которые доставляютъ также *грязный осадокъ и жидкость*, получающіеся при очисткѣ-рафинированіи растительныхъ массъ. Изъ помѣщенной въ приложеніяхъ таблицы химическаго состава кормовыхъ и подстилочныхъ средствъ видно, что встрѣчающіеся у насъ жмыхи содержатъ отъ 10% (маковыхъ) до 15% (рапсовыхъ) воды, отъ 7,5% (конопачныхъ) до 12,5% (орѣховыхъ) жира, отъ 4,5% (льняныхъ) до 5,5% (подсолнечниковыхъ) азота, *) отъ 5,4% (въ сухомъ веществѣ орѣховыхъ) до 10,6% (въ высушенныхъ на воздухѣ подсолнечниковыхъ) зола, отъ 0,3% (маковыхъ) до 1,8% (орѣховыхъ) кали и отъ 1,4% (конопачныхъ) до 3,6% (маковыхъ) фосфорной кислоты.

Такой составъ жмыховъ, впрочемъ, вполне объясняется изъ того, что они получаютъ изъ семянъ масличныхъ растений, изъ которыхъ при добываніи масла, обогатъ съ меньшимъ или большимъ количествомъ жира, смотря по способу добыванія, удаляется частію раствореннымъ, частію взмученнымъ небольшое количество другихъ органическихъ веществъ. Эти вредныя для масла примѣсы

*) Показанное въ этой таблицѣ процентное число бѣловыхъ веществъ нужно разделить на 6,25, чтобы получить нѣблизительное содержаніе азота для сравненія съ другими удобрительными веществами въ отношеніи содержанія азота.

удаляются при очищении (рафинировании) масла обыкновенно помощью сѣрной кислоты, которая смѣшивается съ масломъ и обугливается при кипячении въ маслу органическія вещества, осаждающіяся вслѣдъ затѣмъ на дно; стерпяемое же масло промывается теплой водой.

Получающійся такимъ образомъ осадокъ содержитъ довольно много фосфорной кислоты и азота, какъ это видно изъ слѣдующаго состава его:

Воды	12,0	сѣрной кислоты	27,7,
органическаго углѣстаго вещества	23,8	фосфорной кислоты	3,6
(съ нимъ азота)	(0,7)	окиси желѣза, глинозема, извести, щелочей, кремневой кислоты	9,4.
жирнаго масла	23,5		

Жмыхи или измельчаются для разбрасыванія ихъ въ порошкообразномъ состояніи; или же распускаются въ навозной жижи (стр. 608), въ которой оставляются нѣкоторое время для примѣшенія въ жидкомъ состояніи; или же, измельченные и смѣшанные съ землей, смачиваются нѣсколько съ задержаніемъ образующагося при гніеніи амміака помощью земли или гипса. Последніе два способа предпочтительны въ томъ отношеніи, что предупреждаютъ вредное дѣйствіе, которое производитъ жмыхи въ полѣ при быстромъ своемъ разложеніи, быстротѣ и обильномъ, слѣдовательно, развитіи амміака. Осадокъ, получающійся при очищеніи масла, пригоденъ для непосредственнаго употребленія его на удобреніе, такъ какъ содержитъ масло и свободную сѣрную кислоту, но можетъ быть употребленъ въ компостъ. Промывная же вода, содержащая сѣрную кислоту, можетъ быть употреблена для поливки навоза въ хлѣвахъ съ цѣлю удержанія амміака.

Изъ той же таблицы въ приложеніи видѣтъ составъ солодовыхъ ростковъ, которые отдѣляются отъ пророшеннаго ячменя — солода, и *низкой дробины* получающихся при пивовареніи; *свекловичной*, *картофельной* и *ржаной барды*, получающихся при винокурении изъ свекловицы, картофеля или ржи, и *остатковъ крахмального производства: картофельной волокни*, получающейся при производствѣ крахмала изъ картофеля, и *дробины*, получающейся при производствѣ шеничнаго крахмала. Кроме того вода, въ которой намачивались зерна пшеницы или ржи съ цѣлю полученія крахмала, имѣетъ также нѣкоторую удобрительную цѣнность, потому что содержитъ отъ 2 до 4% твердыхъ веществъ, въ томъ числѣ 1,5—2,5% органическихъ веществъ и съ ними отъ 0,6 до 0,8% всего азота. Всѣ эти отбросы, за исключеніемъ послѣдняго, поступаютъ преимущественно въ кормъ; но иногда это невозможно, потому что озоленные ростки, напр., бывають загрязнены слишкомъ нескотомъ, а остальныхъ отбросовъ бываетъ столько, что нельзя ихъ всѣхъ скормить: чаще случается это съ крахмальными отбросами, которые немогутъ сохраняться долго безъ разложенія; а у насъ, при недостаточномъ скотоводствѣ, случается тоже и съ бардой. Употребленіе солодовыхъ ростковъ въ этихъ случаяхъ не представляетъ затрудненій — ихъ можно употреблять для разсики по полю безъ всякаго подготовленія хотя и они съ большою пользою еще могутъ служить частью компостнаго матеріала; по употребленіи воднистыхъ туковъ, каковы крахмальные отбросы и въ особенности барды,

весьма трудно, тѣмъ болѣе, что эти отбросы получаютъ у насъ преимущественно въ такое время, когда нельзя примѣнить ихъ тотчасъ же для поливки земли; да и вывозка такого воднистаго тука въ поле сопряжена съ большимъ расходомъ рабочей силы. А потому, для болѣе жидкихъ изъ нихъ: воды, въ которой намачиваются зерна, и барды, въ особенности *картофельной*, слѣдовало бы испытать, смотря по времени года ихъ накопленія и условіямъ хозяйства, примѣненіе въ жидкомъ видѣ для непосредственнаго удобренія земли, фильтрацію (стр. 592), отстаиваніе въ резервуарахъ и смѣшеніе затѣмъ съ сушными и задерживающими дѣтутіе продукты разложенія веществъ, поливку компостныхъ кучъ изъ веществъ, собирающихъ въ себя много влаги, напр. сгущиваніе (стр. 557) помощью ихъ, въ особенности барды, *соломы*, которой у насъ нѣрѣдко очень много, и вымачиваніе (стр. 608). Болѣе густыя изъ этихъ отбросовъ, напр. пивная дробина и крахмальные отбросы могутъ поступать въ компостныя кучи.

Свеклосахарные заводы даютъ нѣсколько отбросовъ, какъ-то: *свекловичный жомъ*, если сокъ извлекается изъ свекловицы прессованіемъ, или *диффузионные* или *мацерационные остатки*, если онъ извлекается *диффузіей* или *вымочкой*; далѣе, *последнюю патоку (мелассу)*, которая если перекуривается на спиртъ, даетъ въ отбросъ *паточную (мелассовую) барду*; наконецъ, *дефекационную грязь* и *осадки изъ различныхъ грязныхъ водъ*, спускаемыхъ съ заводовъ, а именно: *водъ*, служившихъ для промывки свекловицы, *каменнаго угля*, *газа* и т. д., часто жидкости отхожихъ мѣстъ. Что касается первыхъ и вторыхъ отбросовъ, то составъ ихъ видѣтъ изъ приложенной въ концѣ книги таблицы химическаго состава кормовыхъ средствъ. Первые отбросы употребляются преимущественно въ кормъ; если бы же почему либо могли быть обращены хотя отчасти для удобренія почвы, то лучше всего могутъ служить однимъ изъ компостныхъ матеріаловъ. Употребленіе въ кормъ вторыхъ отбросовъ, въ особенности же мелассовой барды, болѣе ограничено по большому содержанію въ нихъ солей; а потому патока, если она получается въ такихъ небольшихъ количествахъ, что немогутъ быть употреблена болѣе выгоднымъ образомъ — для винокурения, равно какъ и чрезвычайно разжиженная и потому псевдобоуперевозимая на дальніе разстоянія *паточная барда*, если патока перекуривается, могутъ служить для приготовленія *паточнаго* или *паточно-барднаго* угля, который употребляется для удобренія непосредственно или поступаетъ въ компостныя кучи *внѣшностию его вида* или *выщелоченномъ* съ цѣлю полученія изъ него предварительно поташа. Впрочемъ, патока, дѣйствіе которой даже сильнѣе чѣмъ *паточнаго угля*, можетъ быть употреблена въ необуглевномъ состояніи для непосредственнаго удобренія земли или какъ компостный матеріалъ; а *паточная барда* — подобно другимъ бардамъ (см. выше). *Паточный уголь* содержитъ 24—42% кали, а составъ невыщелоченнаго (I) и выщелоченнаго мѣтѣ (II) и болѣе (III) *паточно-бардоваго угля* видѣтъ изъ слѣдующихъ чиселъ.

	Вода.	Угль.	Кали.	Натр.	Извест.	Магне- вий.	Олеин. матер.	Кислоты.					Песку.	Други.
								Хлора.	Сѣрой.	Угль. ной.	Фосфор- ной.	Бром- ной.		
I.	17,7	9,2	33,0	4,0	2,1	0,4	1,5	4,7	1,2	20,0	сѣды	0,7	8,0	0,8
II.	35,1	13,7	3,6	2,7	12,3	0,3	5,0	0,3	0,6	9,8	1,7	0,6	13,9	—
III.	30,8	9,0	сѣды		7,9	0,9	18,3	сѣды		6,4	1,5	0,6	23,6	—

Выщелоченный паточно-бардшый уголь нефтью (напр. III) содержит значительное количество сернистых соединений, а потому, для окисления этих последних, прежде нежели они придутъ въ соприкосновение съ растеніями, необходимо дать выветриться углю въ перекачиваемыхъ отъ времени до времени кучахъ. Наконецъ, третьи отбросы свеклосахарныхъ заводовъ: дефекационная грязь и осадки изъ грязныхъ водъ, которыхъ чрезвычайно измѣнительный составъ (у первой—смотри по способу добыванія и очищенія сахарного сока, а у вторыхъ—смотри по роду грязныхъ водъ и примесей къ осадкамъ изъ нихъ) видны изъ нижеслѣдующей таблицы. (стр. 629) употребляются для удобрения въ видѣ просушенныхъ на воздухѣ и хорошо вымѣшанныхъ массъ, или же сверхъ того еще въ смѣшеніи съ другими веществами въ компостъ. При просушкѣ на воздухѣ, съ потерей воды дефекационная грязь теряетъ немного и азота; такъ, въ одномъ случаѣ, масса просохшая съ 46% до 37% содержащая воды потеряла 0,03% азота.

Виноградные, яблонные и сливовые опилки, получающіеся при добываніи вина изъ винограда, сидра изъ яблокъ, масла изъ однихъ содержатъ много азота и кали; первая, которыхъ болѣе точный составъ находится въ вышеупомянутой помѣщенной въ концѣ книги таблицѣ, содержатъ 1,71% азота при 51,5% сухого вещества, вторые 0,59% азота при 93,6% сухого вещества и третьи—0,99% азота, 0,41% кали и 0,30% фосфорной кислоты при 87,2% сухого вещества 6,16% золь. Эти вещества рѣдко употребляются непосредственно для удобрения (изъ первыхъ, напр., получаютъ иногда предварительно водку или уксусъ); но если употребляются, то употребляются лучше всего какъ компостный матеріалъ.

Обработка льна доставляетъ два отброса одинъ твердый — *кострику*, другой жидкій *мочильную воду*. Кострика представляетъ древесинную часть льняного стебля, лишенную растворимыхъ органическихъ и неорганическихъ составныхъ частей, которые переходятъ въ мочильную воду вмѣстѣ съ такими же частями изъ коры и лубяной ткани (собственно водокна) льна. Кострика состоитъ главнымъ образомъ изъ клетчатки, содержитъ всего около 0,7% золь, въ томъ числѣ 0,4% извести, 0,09% кали и 0,05% фосфорной кислоты и представляетъ собой весьма медленно разлагающееся вещество, которое можетъ быть употреблено и непосредственно для удобрения, но лучше готовится предварительно или гноеніемъ въ навозѣ

	Дефекационная грязь.			Компостъ изъ дефекационной грязи, остатокъ свежій в земледѣльнической навозной кучѣ.	Грязные воды.		Осадки изъ грязныхъ водъ.		
	Меньше.	Больше.	Среднее изъ 9 анализовъ.		1.	2.	Меньше.	Больше.	Среднее изъ 5 анализовъ.
Воды	4,45	55,27	41,08	24,00	994,54	998,67	2,77	24,10	10,49
Органическаго вещества	5,29	44,85	19,17	12,77	1,17	0,53	3,78	9,38	7,08
(въ томъ числѣ азота)	(0,15)	(1,60)	(0,65)	(0,63)	(0,04)	(0,10)	(0,17)	(0,44)	(0,32)
Песку и глины ..	23,06	51,90	39,85	39,18	1,67	0,80	54,26	84,15	73,25*
Минеральных солей				24,05	2,63		5,12	20,07	11,76
въ томъ числѣ:									
калий	0,14	0,46	0,21	0,51	0,07	0,05	0,01	1,00	0,40
извести	15,16	26,60	19,98	8,63	0,26	0,27	0,73	5,99	2,28
углекислоты	0,77	19,13	9,37	5,25	0,10	—	0,17	2,99	1,05
фосфорной кислоты ...	0,31	1,90	1,19	0,26	?	0,01	0,09	3,09	0,91

* Среднее только изъ 4 анализовъ.

(въ видѣ подстилки) или въ компостныхъ кучахъ или сама по себѣ въ кучахъ, поливаемыхъ различными ускоряющими разложениіе жидкостями, какъ-то: навозной жижей, бардой и т. д. Мочильная вода, которая содержитъ около 0,6% твердыхъ веществъ, въ томъ числѣ 0,06% азота, 0,03% золь, 0,01% кали, 0,005% извести и 0,004% фосфорной кислоты, представляетъ собой чрезвычайно разжиженный растворъ хотя и очень цѣнныхъ веществъ, а потому можетъ быть съ пользою употреблена для непосредственнаго удобрения земли (орошенія); тѣмъ болѣе что она получается какъ разъ въ соответствующее для сего время года.

При *лѣсопиленіи* изъ пазаводской распиловки дерева получаютъ *опилки*, которые если только не смѣшиваются съ опилками отъ коры, содержатъ всего отъ 1/4 до 1% чистой золь, состоящей главнымъ образомъ изъ извести (30—60%), а затѣмъ кали (7—38%) и фосфорной кислоты (2—5%), в сѣдовѣтельно преимущественно состоятъ изъ органическаго вещества—древесины тѣмъ болѣе трудно разлагающейся, что она мало содержитъ азота, а иногда (изъ хвойныхъ породъ) много смолы. Употребленіе для удобрения опилокъ сходно съ употребленіемъ кострики для той же цѣли.

Бумагопрядильныя и табачныя фабрики доставляютъ соръ, который состоитъ у первыхъ (I) изъ остатковъ плодовыхъ коробочекъ, сѣмянъ, пыли и песка, у вторыхъ (II) — изъ обломковъ табачныхъ листьевъ среди другихъ различныхъ веществъ, и можетъ быть въ некоторую удобрительную цѣнность, какъ въ этомъ убѣждаютъ слѣдующія числа:

	Воды.	Органич. веществ.	Всего азота.	Золы.	Щелочи.	Ваш.	Извест.	Фосфор-ной кис-лоты.	Песку и глин.
I.	—	42,71	2,45	57,29	0,95	0,62	2,52	2,07	45,64
II.	32,16	10,60	0,28	57,24	1,77	больш. част. глин.	7,46 (и магнезин.)	0,80	38,51

Наконецъ, производство древесной уксусной кислоты (сухая перегонка дерева) даетъ отбросъ, который содержитъ 46% гипса и 2% углекислой извести, а болѣе съ 26,5% песку и глинѣ, 20% угля и 1% окиси желѣза и гипозема.

вв) Минеральныхъ веществъ.

Между отбросами этой группы видное мѣсто занимаютъ отбросы заводовъ, добывающихъ освѣтительный газъ, а именно: *газовая вода* и *газовая известь*, получающіяся при очищеніи освѣтительнаго газа.

Газовая вода содержитъ аммиакъ въ видѣ различныхъ солей, какъ это видно изъ слѣдующихъ чиселъ, показывающихъ количество этихъ солей въ 1000000 вѣс. частей газовой воды удѣльнаго вѣса:

сѣрноватокислаго патра.	1,6	1,5	1,9
сѣрноватокислаго амміака.	648	1085	2648
двууглекислаго "	656	980	1290
углекислаго "	2850	5120	1642
сѣрновислого "	289	572	695
сѣрнистаго аммоніа.	213	431	3275
хлористаго "	12809	4747	1971
всего азота.	4670	3829	3784

Изъ этихъ газовыхъ водъ **) добывается сѣрнистый аммиакъ въ болѣе или менѣе чистомъ видѣ. Вотъ составъ четырехъ образцовъ сѣрнокислаго амміака, изъ коихъ первый есть образецъ побочнаго продукта газового завода—зеленоватой, порошкообразной, довольно сухой массы съ сильнымъ дегтирнымъ запахомъ, второй и третій—буровато-красной соли сѣрнокислаго амміака нечистотнаго, хотя вѣроятно отчасти того же происхожденія, и четвертый—довольно чистаго продажнаго сѣрнокислаго амміака.***)

	I.	II.	III.	IV.
Воды.	8,7%	4,9	1,5	0,3
хлористаго аммоніа.	—	—	4,2	—
сѣрнокислаго амміака.	17,8	14,9	84,5	99,3
сѣрновислой закиси желѣза.	15,6	—	—	—
нерастворимыхъ азотистыхъ соединений (циановатаго желѣза).	5,4	—	—	—

*) Богатый гипсомъ (51%) отбросъ получается также при производствѣ стевариновыхъ свѣчей, онъ содержитъ кромѣ того 22% углекислой извести и 17% органическихъ веществъ.

**) Равно какъ изъ жидкости, спускаемой съ осадка отстоявшейся жидкой части человеческихъ изверженій (стр. 609).

***) Чистый сѣрно-кислый аммиакъ состоитъ въ 100 част. изъ 60,6% сѣрной кислоты и 39,4 окиси аммоніа съ 21,2% азота; онъ растворяется въ 2 ч. холодной и 1 ч. кипящей воды.

сѣры.	10,7	—	—	—
растворимыхъ въ эфирѣ и алкоголь (родани- стыхъ соединений и дегта).	1,3	73,9 (радианитоваго аммоніа)	5,4	—
извести и органическихъ веществъ.	14,8	—	—	—
закиси желѣза и сѣрнистаго желѣза.	22,3	—	—	—
окиси желѣза.	—	6,3	0,2	—
нерастворимаго остатка (песку глинѣ).	3,5	3,4	0,3 (и гли- са)	—
всей золы.	26,4	—	—	—
всего азота.	7,1	30,4	21,5	21,1

Сѣрно-кислый аммиакъ употребляется для удобренія въ смолотомъ видѣ. Газовая известь имѣетъ слѣдующій составъ:

	I.	II.	III.		I.	II.	III.
Воды.	4,0	7,2	3,4	сѣрнистаго кальція.	0,5	—	3,2
органическихъ веществъ.	1,1	—	1,3	магнезинъ.	—	—	0,5
углекислой извести.	25,0	49,4	20,2	щелочей.	—	—	2,5
сѣрновислой "	46,3	18,2	48,7	окиси желѣза и глино-	—	—	0,2
сѣрновислой "	23,3	4,6	16,2	зема.	—	—	1,2
сѣрновислой "	—	15,2	5,0	нерастворимаго остатка.	—	—	0,3

Непосредственнаго употребленія для удобренія газовой воды, менѣе чистыхъ сортовъ сѣрновислого амміака (напр. I и II) и газовой извести слѣдуетъ избѣгать, потому что газовая вода и нечистый сѣрновислый аммиакъ содержатъ сѣрнистыя соединения: первая—аммиака, второй—желѣза, да еще сѣрновислую окись желѣза, циановыя и въ особенности роданистыя (сѣрно-циановыя) соединения (послѣднія сѣрновислый аммиакъ, напр. образецъ II, содержатъ иногда въ значительномъ количествѣ), а газовая известь—сѣрнистый кальцій; все соединения, которыя въ большихъ количествахъ могутъ быть вредны для растительности. А потому газовую воду лучше употреблять для полученія изъ нея сѣрнокислаго амміака, чѣмъ для непосредственнаго удобренія, нечистый же сѣрновислый аммиакъ и газовую известь—подвергать предварительной дѣйствию воздуха (первый въ смѣси съ другими веществами, напр. хорошей землей), для того чтобы вредныя сѣрнистыя соединения могли окислиться въ сѣрновислые и сѣрновислые соединения.

Кромѣ этого, заводы, приготовляющіе минеральные воды, даютъ отбросы, содержащія много сѣрновислой извести и сѣрновислой магнезинъ, смотря по тому выделяется ли сѣрной кислотой углекислота, необходимая для пригото- вленія воды, изъ углекислой извести съ большимъ или меньшимъ количе- ствомъ углекислой магнезинъ; да еще годные для удобренія отбросы даютъ со- довые заводы (1), известно-обжигательныя печи (мусоръ—2) и солеварни (традирный или черноватый камень—лишь 3 и 4). Составъ этихъ отбросовъ ви- дѣть изъ слѣдующей таблицы:

	1.	2.	3.	4.
Воды.	10,0	—	15,1	18,8
органическихъ веществъ.	14,4 (уголь)	—	7,9	3,3
углекислой извести.	48,1	21,8	52,8	70,1
сѣрновислой "	2,4	—	—	—
сѣрновислой "	—	8,7	—	—
сѣрнистаго кальція.	7,2	—	—	—
углекислой магнезинъ.	—	—	0,4	0,3
сѣрновислой "	—	—	1,9	0,2
хлористаго магніа.	—	—	1,3	0,2

щелочей	11,0	—	15,2 ¹⁾	2,5 ²⁾
окиси железа	3,7	2,2	0,7	0,4
глинозема	3,0	55,5	2,3	1,6
нерастворимого остатка	3,0	55,5 (в воде)	1,8	2,0
(песку, глины и т. д.)				

¹⁾ в том числе 3,04 хлористого калия и 1,23 сернокислого калия.

²⁾ в том числе 0,13 хлористого калия и 1,44 сернокислого калия.

Отбросъ содовых заводовъ долженъ также подвергнуться действию воздуха предварительно употребленія его для удобренія, такъ какъ онъ также содержитъ сернистый кальцій.

в) Разные другие отбросы.

Къ этой группѣ удобрительныхъ веществъ относятся:

а) прежде всего зола и сажка, какъ отбросы, получающіеся при сжиганіи различнаго рода топлива, какъ-то: дровъ, соломы, кизяка (приготовляемаго изъ навоза), торфа, бурого и каменнаго углей. Слѣдующая таблица (стр. 634 и 635) показываетъ составъ ихъ въ частныхъ и среднихъ числахъ.

Составъ этихъ отбросовъ различается петодько въ зависимости отъ различія горючаго матеріала, но и отъ способовъ собиранія и сохраненія этихъ отбросовъ, при которыхъ возможна большая или меньшая примѣсь въ нихъ постороннихъ веществъ, большая или меньшая утрата изъ нихъ растворимыхъ составныхъ частей ихъ выщелачиваніемъ, напр. дождевой водой. Такъ какъ растворимыя части (щелочи) особенно важны въ золѣ, какъ въ заводскомъ сыромъ матеріалѣ и какъ въ удобрительномъ веществѣ, то необходимо собирать ее въ особыхъ крытыхъ помѣщеніяхъ, защищенныхъ отъ атмосферной воды, лучше всего каменными стѣнами, такъ какъ зола большей частью выгребается изъ-подъ толки горячей съ тлѣющими еще углями.

бб) Затѣмъ слѣдуетъ: подзола — отбросъ приготовленія щелока изъ золы преимущественно лиственныхъ древесныхъ породъ для мыловаренія, мытья бѣды; въ первомъ случаѣ, для полученія бѣды щелока, щелокъ готовится съ прибавленіемъ бѣдой извести; далѣе, отбросы выщелачиванія золы преимущественно травянистыхъ сухопутныхъ растений, какъ-то: гречихи, подсолнечника, различныхъ дикопрорастающихъ растений, напр.: крапивы, полыни, лебеды и т. д. для полученія поташа; и наконецъ, отбросы выщелачиванія сырой варековой соды или келна (келповой соды), т. е. золы морскихъ водорослей или растений морскаго побережья (напр. Сольниковъ однолѣтняго и европейскаго — *Salicornia annua* и *euroaea*) или солощевыхъ почвъ (напр. Солины содовой и калиевой — перекати поле, курай — *Salsola soda*, *tragus* и *kali*). Эти отбросы отличаются

отъ золъ тѣмъ, что, сравнительно съ этими послѣдними, бѣдны растворимыми веществами, слѣдовательно преимущественно щелочами, которые выщелочены изъ золы съ той или другой цѣлю.

вв) Наконецъ, такіе отбросы какъ дорожная грязь, шоссезная пыль, прудовой ил и мусоръ изъ помойныхъ ямъ, которыхъ составъ видѣнъ изъ слѣдующей таблицы.

	Подзола съ мыловаренныхъ заводовъ.		Калийная зола.	Сырая варековая сода, сырой остатокъ).	Дорожная грязь.	Бѣдочная шоссезная пыль.	Прудовой ил.			Бѣдочный черкасскъ.	Мусоръ изъ помойныхъ ямъ, С.-Петербурга.
	частный случай.	средний составъ.					1.	2.	3.		
Воды		20,0				8,1	5,5	45,6			52,5
Органическаго вещества	7,4 ¹⁾	5,0			11,9 ²⁾	4,8	72,3	4,3	87,4		8,5
(Въ немъ азота).					(0,24)	(0,06)	—	0,86	(0,15)	(2,20)	
Всѣхъ	82,6	75,0	100,0			87,1	22,2	54,4	95,7	12,6	
Нерастворимыхъ въ соляной кислотѣ	33,5		1,3		73,7	31,4 (крупныхъ)	10,5	39,6	80,4	7,7 (песку, окиси железа и др.)	
Растворимыхъ въ соляной кислотѣ	59,1		98,7	100,0		55,8 (мелкихъ)	11,7	14,8	19,5		12,8 ³⁾
Въ послѣднихъ:											
Кали	1,1	2,5	36,9 ⁴⁾	13,0	0,6	1,0	1,00	0,42	0,19	0,01	0,16
Натра	1,4	1,3	—	22,0	0,0	1,7	—	0,46 ⁵⁾	—	0,01	0,09 ⁶⁾
Извести	30,6	24,5	15,2	13,6	2,7	4,0	0,68	1,35	слѣды	4,14	1,67
Магнезіи	0,2	2,5	10,4	8,2	0,1	1,6	0,02	0,21	0,17	0,07	0,26
Окиси железа	1,3	—	1,7	0,8	5,2	12,2	—	—	—	—	0,83
Глинозема	2,7	—	—	—	14,0	5,1	3,54	—	13,70	—	—
Фосфорной кислоты	0,7	6,0	13,3	3,1	слѣды	0,1	1,45	0,29	0,12	0,24	0,40
Серной кислоты	0,8	0,3	5,9	21,5	0,1	0,4	0,82	—	0,60	0,44	0,05
Угльной кислоты	22,6	—	9,9	—	0,7	—	0,53	—	—	—	0,78
Кремневой кисл.	0,4	20,0	6,1	2,1	0,2	29,1	3,57	—	—	—	8,56
		(внеску)				(и нерастворимые въ кислотѣ)					
Хлора	0,9	—	—	17,9	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Морскія растенія, изъ которыхъ получается варевая сода (пред. стр.), содержатъ отъ 11,3 до 29,4 среднихъ числомъ 21% (среднее изъ 3 анализовъ) сухаго вещества, въ которомъ отъ 0,15 до 1,81 средн. числ. 1% (изъ 8 анал.) азота и отъ 7,6 до 45,2 средн. числ. 15% (изъ 4 анал.) золы; въ золѣ же кромѣ показанныхъ составныхъ частей находится: песку и угля отъ 0 до 24,7 средн. числ. 9% (изъ 12 анал.), углекислоты отъ 0 до 24,4 средн. числ. 5,75% (изъ 16 анал.), йода отъ 0,18 до 5,5 средн. числ. 1,4% (изъ 16 анал.), и брома отъ 0,3 до 1,1 средн. числ. 0,7%.

		Древесная зола.						
		Частный состав			Средний состав зола лиственных пород.	Частный состав		Средний состав зола хвойных по- род.
		березовой зола среднее из 2 анализов.	оспилов зола.	дубовой зола.		еловой зола проделанной.	сосновой зола.	
Минераль- ные вещества.	Воды		0,1		5,0			5,0
	Органического вещества (угля) (в нем азота)				5,0			5,0
	Нерастворимых в кисло- тах (глины, песка и т. д.)		2,2	0,2		31,2		
	Растворимых в кисло- тах:				90,0			90,0
	Кали	100,0	97,7	99,8		68,8	100,0	
	Натра	13,3	10,4	5,6	10,0	3,2	6,9	6,0
	Извести	0,6	6,0	3,7	2,5	2,5	7,3	2,0
	Магнесия	34,5	42,6	50,0	30,0	25,3	31,8	35,0
	Окиси железа	5,7	3,7	3,0	5,0	3,2	9,3	5,0
	Глинозема	1,9	1,8	0,4	—	3,4	3,3	—
	Глинозема	0,3	—	—	—	—	—	—
	Закиси окиси марганца	4,5	1,6	—	—	0,4	—	—
	Фосфорной кислоты	7,1	5,9	2,3	6,5	2,4	2,0	4,5
	Серы	1,6	0,9	0,8	1,6	1,3	2,1	1,6
	Углеродной	22,6	24,8	33,4	—	20,7	31,0	—
Кремневой	7,8	1,8	0,6	18,0 (и песку)	6,2	5,8	18,0 (и песку)	
Хлора	сидан	0,5	сидан	0,3	0,1	0,5	0,3	

Остаток от добывания йода из калпа весьма богат поваренной солью, как это показывает анализ одного образца такого остатка, в котором оказалось:

17,15 воды	10,40 сернистого патра
51,09 поваренной соли	14,50 углекислого "
6,66 сернистого кали	0,20 нерастворимых веществ.

Что касается дорожной грязи, шоссеной пыли, прудового ила, то, конечно, состав этих масс может быть чрезвычайно различен: дорожной грязи и шоссеной пыли в зависимости от грунта дороги, от рода камня употребленного для шоссевания дороги и от величины прохода, следовательно прироста большего или меньшего количества роняемых животными

(из 5 анал.) и сернистого натрия 3,66% в 1 случае. *) Потеря от прокалывания. *) В том числе 9,74 хлористого калия. *) В том числе 0,03 хлористых щелочей. *) Кроме того 26,2 крупных частей (камней, черепков посуды), так как в помойных ямах сваливается сор с улиц, дворов и из конвоя, зола из печей, разный мусор, остатки от овощей и мяса и т. д. *) В том числе 0,09 хлористого натрия.

Соломенная зола.			Кизяковая зола.	Торфяная зола.			Бурого угля зола.		Каменного угля зола.		Сажа.		
Подолжичская (тебля)	Гречинная, среднее из 5 анализов.	Ржаная, среднее из 5 анализов.		Из 5 анализов ¹⁾			Средний состав.	Частный случай.	Средний состав.	Частный случай.	Средний состав.	Дорожная.	Каменноугольная.
				железа.	пшеница.	среднее.							
52,4	4,9	1,3	1,2	38,0	75,3	57,2	5,0	40,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
											5,0	71,8	70,2
												(1,3)	(2,5)
47,6	95,1	98,7	94,9	62,0	24,7	42,8	95,0	59,9	95,0	8,1	90,0	23,2	24,8
14,0	25,5	19,6	11,3	0,4	2,5	0,9	1,5	1,9	0,5	0,1	0,1	2,4	0,1
0,3	0,3	1,6	0,1	сидим	0,6	0,2	0,8	0,7	0,4	0,1	0,1	0,5	—
7,6	24,5	8,5	8,5	сидим	26,4	5,8	?	4,1	?	2,9	?	10,0	4,0
4,0	7,6	1,4	2,3	0,1	6,0	2,3	1,5	0,6	3,2	0,5	3,0	1,5	1,5
2,4	1,6	1,2	—	16,3	54,9	31,7	—	44,0	—	21,0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—
0,8	7,8	4,7	4,8	сидим	2,0	0,7	0,6	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4	—
2,2	1,6	3,3	2,1	0,1	2,8	0,9	1,3	8,1	8,5	40,1	5,0	0,3	1,7
14,4	22,9	2,6	—	0,0	0,6	0,4	—	0,4	—	—	—	—	—
0,8	1,8	53,0	11,0	сидим	0,2	0,1	?	0,1	?	1,1	?	4,0	16,0
												(в песку)	
1,5	0,8	2,8	1,7	сидим	0,1	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—

извержений; а прудового ила — от свойства окружающих прудов и мест: почвы, растительности и т. д. Так как с дорог шоссеванных самородом (Курская губ.) должна быть богата фосфорной кислотой.

Эти разные отбросы употребляются для удобрения большей частью без всякой подготовки или же с весьма незначительной, которая состоит в просушке одних из них (напр. подзола с мыловаренных заводов), в проветривании в кучах других с перекопкой от времени до времени (напр. прудового ила), в подсывании тростяных (напр. золы) с целью выделения из них малодвижных крупных частей, препятствующих равномерному распределению их в почву, и в хорошем смешении массы. Все эти

¹⁾ Сухое вещество торфяных масс, которым принадлежат эти золы, содержат от 33,6 до 96,0 средним числом 75% органического вещества; от 0,7 до 2,2 средним числом 1,2% азота; торф высушенный на воздухе содержит около 17% влаги; торфяная зола содержит иногда до 63% углекислой, до 29% сернистой (гипса) и до 9,5—15,0% фосфорнокислой извести.

отбросы, особенно при имѣнн ихъ въ сравнительно небольшихъ количествахъ, могутъ быть весьма годными компостными матерьялами.

д. Смѣшанные туки.

При разсмотрѣнн удобрительныхъ веществъ предыдущихъ группъ мы видѣли, что многія изъ нихъ употребляются лишь въ смѣшенн между собой—въ видѣ *смѣшанныхъ туковъ*, между которыми мы можемъ различить *хлѣной навозъ*, какъ продуктъ смѣшенн, совершающагося неединственно въ интересахъ удобрения, и *жомности*, какъ продуктъ смѣшенн, имѣющаго въ виду исключительно цѣль удобрения почвы.

а. Хлѣной навозъ.

Изверженн нашихъ домашнихъ животныхъ, въ особенности жидкн, содержатъ сравнительно много быстро разлагающихся азотистыхъ веществъ; а потому разлагаются довольно быстро во всей своей массѣ и собираются, въдствіе этого, обыкновенно въ смѣсн съ твердыми большей частью веществами, которыя умѣряютъ ихъ разложение и задерживаютъ летучіе и растворимые продукты ихъ разложения. Эти вещества называются *подстилочными средствами* потому что въ тоже время имѣютъ назначеніе доставлять скоту мягкое, сухое и чистое ложе.

Подстилочными средствами служатъ большей частью растительныя вещества, а именно: *солома* разнаго рода, преимущественно хлѣбныхъ злаковъ, но также и другихъ растений: гречишн, бобовыхъ, крестоцвѣтныхъ (масличныхъ) растений и т. д., если она только не употребляется въ кормъ скоту за излишествомъ или по большой жесткости и малой питательности ея, или вслдствіе порчи ея отъ болѣзни (ржавчпы) или сырости (сопрѣвшан солома); дагѣ *сопрѣвшее сѣно* (напр. овѣршье); *древесные листья* и *хвои*, которые вмѣстѣ съ мхомъ, верескомъ и т. д. образуютъ также такъ называемый *лѣсной соръ*; *древесный опилъ*, *лапка* (вѣтви хвойныхъ деревьевъ); дикорастущія сухопутныя растенія, какъ-то: *пыпоротники*, *верескъ*, *мохъ*; прѣсноводныя растенія, напр. *тростники*; *морскія растенія* (стр. 588 и *торфъ*; нѣкоторые заводскіе отбросы, какъ-то: *древесный опилъ*, *кострика*, *корье*, *дернъ* и, наконецъ, *земля*, *песокъ*.

Подстилочное средство удовлетворяетъ своему двойному назначенію тѣмъ полнѣе, 1) чѣмъ упруже и мягче оно, потому что тѣмъ мягче доставляемое имъ скоту ложе и тѣмъ лучше смѣшивается оно съ твердыми изверженіями; 2) чѣмъ полнѣе и скорѣе вбираетъ оно воду, потому что тѣмъ полнѣе и скорѣе вбираетъ оно жидкн изверженн и, слѣдовательно, тѣмъ суше доставляемое имъ скоту ложе, тѣмъ лучше предупреждаетъ оно утрату растворимыхъ составныхъ

частей изверженн и тѣмъ полнѣе проникается жидкими изверженіями, которыя содѣйствуютъ его собственному разложенію; 3) чѣмъ умѣреннѣе до извѣстной степени его разложимость, потому что тѣмъ лучше умѣряетъ оно быстрое разложеніе изверженн, но въ тоже самое время само достаточно быстро подготавливается для цѣлей удобренн, достаточно быстро накопляетъ въ себѣ вещества (перегнойныя кислоты), связывающія летучіе продукты разложения изверженн; наконецъ 4) чѣмъ болѣе содержитъ оно само питательныхъ для растенн веществъ, потому что тѣмъ менѣе разжижаетъ оно, такъ сказать, изверженн сравнительно богатыя питательными для растенн веществами.

Сравнивая различныя подстилочные средства въ каждомъ изъ этихъ отношенн отдѣльно, мы находимъ, что въ первомъ отношенн, какъ показываютъ опытъ, первое мѣсто принадлежить солонѣ хлѣбныхъ злаковъ, въ особенности озимыхъ, за которой слѣдуютъ: *пыпоротники*, *верескъ*, *солома бобовыхъ растенн*, *тростникъ*, *болотистыя растенія*, *мохъ*, *листья*, *песокъ*, *торфъ* и, наконецъ, *земля*, какъ наименѣе упругое вещество, хотя въ тоже время болѣе мягкое, чѣмъ, напр., *лапка*, *пыпоротники*, *толстые и жесткіе бобовыя*, *ябсовыя* или *подсолнечниковыя стебли*, которые, поэтому, предварительно употребленн ихъ въ подстилъ, хороши и даже необходимо переминавать, разрубать на болѣе мелкія части или раздавливать подъ колесами телегъ; этимъ достигается и лучшее смѣшенн ихъ съ изверженіями; съ другой стороны вещества, которыя, особенно въ увлажненномъ состоянн, такъ легко сваливаются въ плотную массу, какъ *листья*, *кострика*, худо смѣшиваются съ изверженіями.

Во второмъ отношенн подстилочные средства могутъ быть помѣщены въ такомъ порядкѣ въ слѣдующихъ трехъ рядахъ:

100 вѣсов. частей:	100 объемовъ:	увеличиваютъ (+) или уменьшаютъ (—) первоначальную плотность навозной жижи = 1,0187 въ части ея остающійся не поглощенномъ.
поглощаютъ 000 вѣсов. част. навозной жижи.	поглощаютъ 000 объемовъ навозной жижи.	
сосновой лапки *) 25	сосновой лапки . 100	земля — 0,0059
еловой " 36	еловой " . 150	торфъ — 0,0010
земли 55	ржаной соломы . 461	корье + 0,0012
коры 215	бобовой " . 598	древесная опилка + 0,0018
ржаной соломы . 300	земли 626	ржаная солома . . + 0,0023
лѣснаго сора . . 308	лѣснаго сора . . 731	лѣсной соръ . . . + 0,0026
бобовой соломы . 330	древесн. опилокъ 790	еловая лапка . . . + 0,0026
древесн. опилокъ 357	коры 826	сосновая " + 0,0027
древесн. листья 433	торфа 825	древесные листья + 0,0040
торфа 448	древесн. листья 1038	бобовая солома . . + 0,0052

*) Между тѣмъ какъ хвоя въ другомъ случаѣ задержала воды: еловая 308, сосновая—221 вѣс. части, въ то время какъ буковые листья задержали ея 442 вѣс. части на 100 ч. своей массы.

изъ которыхъ слѣдуетъ, что наибольшее жидкости поглощаютъ торфъ и древесные листья: первый вълѣдствіе волосности, опредѣляемой содержаниемъ въ немъ большаго количества перегнойныхъ веществъ (стр. 106) и его большою свжажностью, а послѣдніе вълѣдствіе принаианія жидкости въ значительной величинѣ смачивающейся поверхности; наименѣе же жидкости поглощаютъ ланки; ржаная солома занимаетъ среднее мѣсто. При этомъ земля и торфъ, въ особенности же первая, задерживаютъ изъ павозной жижи растворенныхъ въ ней веществъ больше, чѣмъ отдаютъ ей растворимаго изъ нихъ, а потому уменьшаютъ удѣльный вѣсъ части павозной жижи, остающейся непоглощенной сравнительно съ первоначальнымъ удѣльнымъ вѣсомъ павозной жижи, приведенной съ ними въ соприкосновение; между тѣмъ какъ всѣ остальные подстилочные средства, въ особенности же бобовая солома, отдаютъ павозной жижи растворимаго изъ нихъ болѣе, чѣмъ задерживаютъ раствореннаго въ ней, такъ что, напротивъ, увеличиваютъ сравнительно съ первоначальнымъ удѣльный вѣсъ остающейся непоглощенной павозной жижи. Для сравненія нѣкоторыхъ соломы между собой въ отношеніи способности ихъ поглощать воду, мы нѣмѣе еще другія числа, которыя показываютъ, что изъ четырехъ соломы: шпешичной, ржаной, овсяной и гороховой наибольшее количество воды — 281 вѣс. част. поглотила гороховая солома, оставленная погруженною въ воду въ теченіи 24 час.; между тѣмъ какъ въ тоже время и при тѣхъ же условіяхъ ржаная солома поглотила 241, шпешичная 226, а овсяная только 221 вѣс. част. на 100 част. ихъ массы. Изъ поглощеннаго количества воды будучи оставлены, но вынуты изъ воды, на воздухѣ въ теченіи 44 часовъ, къ концу этого времени потеряли: гороховая 92, ржаная 68, шпешичная 55 и овсяная 40, т. е., солома поглотила наибольшее количество воды и потеряла наибольшее количество воды въ теченіи, приблизительно, первыхъ двухъ сутокъ. Но, полнота поглощенія жидкихъ изверженій подстилочными средствами обуславливается не только влагею этихъ послѣднихъ, но и скоростью, съ которой подстилочное средство вбираетъ поглощаемое имъ количество влаги; въ этомъ отношеніи солома, которая поглощаетъ воды въ 5—6 разъ больше чѣмъ земля, вбираетъ ее гораздо медленнѣе чѣмъ земля *), потому что и трубчатая полость ея стеблей, обуславливающая главнымъ образомъ большую ея влагею, мало доступна для воды; впрочемъ, доступъ въ нѣе можетъ быть увеличенъ разсѣченіемъ стеблей, превращеніемъ подстилочной соломы въ неслишкомъ мелкую сѣчку (въ 6—8 вершк.), иначе соломенная масса потеряетъ значительную часть своей упругости. Этимъ же достигается и лучшее смѣшеніе соломы съ изверженіями и послѣдующее равномерное распредѣленіе навоза въ почвѣ.

Порядокъ, въ которомъ слѣдуютъ подстилочные средства въ послѣднихъ двухъ отношеніяхъ, опредѣляется ихъ составомъ: въ третьемъ отношеніи — содержаніемъ азота, кремневой кислоты, смолистыхъ и дубильныхъ веществъ при большемъ или меньшемъ содержаніи воды и болѣе или менѣе рыхломъ строеніи вещества, и болѣе или менѣе теплоемкостью его. Въ четвертомъ же отношеніи — содержаніемъ преимущественно азота, кали и фосфорной кислоты, какъ наиболѣе важныхъ питательныхъ для растенія веществъ. Подстилочное средство разлагается тѣмъ быстрѣе, чѣмъ больше содержитъ оно воды, азота, щелочей; чѣмъ меньше, напротивъ, — кремневой кислоты, смолистыхъ и дубильныхъ веществъ и чѣмъ рыхлѣе его строеніе. Оно тѣмъ цѣннѣе какъ примѣсь къ изверженіямъ для цѣлей удобренія, чѣмъ болѣе

*) Конечно, употребляющейся въ подстиль, т. е. средней плотности и даже рыхлой предпочтительно съ значительнымъ содержаніемъ перегноя.

оно содержитъ наиболѣе существенныхъ для растенія питательныхъ веществъ азота, кали и фосфорной кислоты. На основаніи данныхъ, помѣщенныхъ на стр. 132—133 относительно состава земли и въ таблицѣ химическаго состава кормовыхъ и подстилочныхъ средствъ (въ приложеніяхъ) относительно состава другихъ подстилочныхъ средствъ, мы можемъ разбить слѣдующія, взятая для примѣра двадцать четыре изъ наиболѣе употребительныхъ подстилочныхъ средствъ въ такомъ порядкѣ по содержанію въ сухомъ веществѣ, въ процентахъ его:

	Азота.	Золы.	Кали.	Фосфорной кислоты.	Кремневой кислоты (растворимой въ соляной кислотѣ).
I Земля	0,02	IV—0,40	XXIV—0,01	IV—0,02	I—0,02
II Кострика	?	II—0,78	II—0,04	II—0,09	XXI—?
III Мохъ	0,30	XIII—0,80	IV—0,04	I—0,10	XXIV—?
IV Сосновые и еловые опилки	0,23	XVII—2,08	XIII—0,08	III—0,12	XXII—?
V Солома оз. шпешичн.	0,32	XI—2,50	X—0,10	XVII—0,14	XXI—0,09
VI " " ржи	?	X—2,56	XI—0,11	X—0,15	IV—?
VII Тростникъ	0,40	XIV—3,50	XII—0,16	XXI—0,20	XIII—0,11
VIII Солома яр. овса	0,48	XXIII—3,50	XX—0,19	XIV—0,20	XXIII—0,15
IX " " ячменя	0,70	XXI—4,00	XIV—0,20	VIII—0,22	XVIII—0,31
X Лѣсной соръ	0,70	VII—4,47	XVII—0,27	IX—0,22	XIX—0,35
XI Ланка	0,81	VIII—4,70	III—0,35	XXIV—0,24	XVII—0,62
XII Дубовые листья отжавшіе	0,95	VI—4,79	XXI—0,64	VI—0,25	III—0,74
XIII Сосновые иглы свѣзья	?	IX—4,80	V—0,74	V—0,26	XIV—1,20
XIV " " (сосновая подстиль)	?	XII—4,90	VII—0,83	XV—0,28	XVI—1,37
XV Еловые иглы (еловая подстиль)	?	XIX—5,13	VI—0,92	VII—0,28	XII—1,59
XVI Папоротники	1,00	V—5,37	VIII—1,04	XII—0,40	VIII—2,28
XVII Верескъ	1,00	XV—5,82	IX—1,10	XII—0,40	VII—2,44
XVIII Морская растенія	1,17	XXII—6,00	I—1,17	XIX—0,41	IX—2,50
XIX Гороховая солома	1,20	XVI—6,76	XIX—1,18	XXIII—0,43	VI—2,70
XX Торфъ	1,32	XXIV—12,57	XXIII—1,19	XVIII—0,47	V—3,65
XXI Березовые листья свѣзья	1,44	XVIII—14,91	XVIII—1,94	XXII—0,51	X—?
XXII Солома смѣшанная	1,61	XX—25,00	XVI—2,41	XVI—0,55	XI—?
XXIII Дубовые листья въ августѣ	2,20	I—94,00	XXII—2,76	XXI—0,72	XV—4,12
XXIV Болотный черноземъ					

Что же касается содержанія въ подстилочныхъ средствахъ воды, смолистыхъ и дубильныхъ веществъ, строенія и теплоемкости ихъ, то за не имѣніемъ болѣе точныхъ въ этомъ отношеніи данныхъ, замѣтимъ, что подстилочные средства употребляются обыкновенно въ высушенномъ на воздухѣ состояніи съ содержаніемъ отъ 5—15% (соломы, листья) до 15—25% (лѣсной соръ, ланка, болотный черноземъ, торфъ) воды; что вересъ, дубовые листья, верескъ, папоротники содержатъ много дубильныхъ веществъ, а хвон, ланка,

сосновыя опилки, верескъ, напоротники — много смолистыхъ веществъ. Наконецъ, о строеніи подстилочныхъ средствъ мы можемъ судить отчасти по способности этихъ веществъ вбирать большее или меньшее количество воды — чѣмъ больше они вбираютъ воды, тѣмъ рыхлѣе ихъ строеніе; а о теплоемкости ихъ — по плотности (удѣльному вѣсу) ихъ, съ которымъ теплоемкость находится въ известномъ отношеніи — уменьшается съ увеличеніемъ плотности; поэтому теплоемкость весьма вѣроятно будетъ возрастать въ слѣдующемъ ряду подстилочныхъ средствъ: песокъ, земля, торфъ, листья, болотныя и сорныя травы, тростники, солома.

Изъ сравненія же подстилочныхъ средствъ въ означенныхъ отношеніяхъ въ совокупности оказывается, что первое мѣсто между ними принадлежитъ *соломѣ озимыхъ хлѣбныхъ злаковъ*, потому что она, при ея упругости, доставляетъ весьма сухое и мягкое ложе для скота и хорошо смѣшивается съ твердыми изверженіями; при ея значительной влагоемкости, хотя медленно, но тѣмъ не менѣе въ значительномъ количествѣ поглощаетъ жидкія изверженія и потому, провякаясь хорошо твердыми и жидкими изверженіями и имѣя довольно рыхлое строеніе, она съ одной стороны разлагается умѣренно быстро, не смотря на замедляющія ея разложеніе значительную теплоемкость ея и малое содержаніе воды и азота и большое — кремневой кислоты; съ другой предупреждаетъ достаточно хорошо утрату твердыхъ и жидкихъ изверженій и растворимыхъ и летучихъ продуктовъ ихъ разложенія, связывая эти послѣдніе (углекислый аммиакъ) помощію образующихся при ея разложеніи перегнойныхъ кислотъ. Ея значительная влагоемкость и теплоемкость и умѣренная разложимость способствуютъ также уравниванію температуры хлѣва, такъ какъ, поглощая много влаги и теплоты и замедляя разложеніе изверженій, солома предупреждаетъ развитіе значительной температуры въ слѣдствіе разложенія; а сохраняя долго теплоту, способствуетъ обогреванію хлѣва. Наконецъ, по содержанію питательныхъ веществъ кали и фосфорной кислоты, она занимаетъ среднее между подстилочными средствами мѣсто. Остальныя подстилочные средства менѣе соломы озимыхъ хлѣбовъ удовлетворяютъ своему назначенію, потому что представляютъ: или мало упругія, быстро разлагающіяся вещества, доставляющія недостаточно чистое, сухое ложе и сохраняющія недостаточно хорошо изверженія (напр. соломы яровыхъ хлѣбныхъ злаковъ, листья, мохъ и т. д.); или же слишкомъ жесткія, дурно вбирающія влагу, медленно разлагающіяся вещества и потому также дурно сохраняющія изверженія (напр. лапка, напоротники, хвоя, верескъ, стебли конскихъ бобовъ и подсолнечника и т. д.); или, наконецъ, бѣдныя питательными веществами массы (напр. опилки, кострика и т. д.). А потому, всѣ эти вещества, въ случаѣ недостатка озимой соломы, могутъ быть употреблены для зашиты отчасти или даже всей соломы, но не замѣняютъ ея вполне. У насъ въ этомъ

отношеніи заслуживаютъ особеннаго вниманія лапка, верескъ, лѣсной мохъ и торфъ.

Торфъ равно какъ и земля могутъ даже значительно удобрить соломенную подстилку, такъ какъ, въ противоположность соломѣ, они вбираютъ весьма быстро жидкія изверженія и, уменьшая, слѣдовательно, единственныя, можно сказать, недостатки соломы, какъ подстилочнаго средства, способствуютъ тѣмъ лучшему сохраненію изверженій. Торфъ и земля, для употребленія ихъ въ подстилку, должны быть возможно жидкими до полнаго ихъ состоянія поглотить возможно большее количество жидкости до полнаго ихъ насыщенія этой жидкостью. Поэтому, необходимо занасать ихъ преимущественно лѣтомъ, когда бѣтъ сѣвнскихъ работъ, напр. во время между окончаніемъ яровыхъ посѣвовъ и сѣпкосомъ. Для земляной подстилки можно брать почву, которая выносятся плугомъ на окраину поля; подпочву, которая выворачивается наверхъ при глубокомъ наханіи; землю, которая получается при срываніи кочекъ или срытіи возвышеній на лугахъ, дерновую землю и даже уличную грязь, если эта послѣдняя достаточно рыхлая. Въ случаѣ же неимѣнія этихъ источниковъ земли, можно поступить такъ: поднять плугомъ или сохой отдѣльный для этого участокъ поля въ сухую погоду, проробновать его затѣмъ въ несколько разъ и, наконецъ, прикатать, чтобы привести въ возможно мелкое состояніе слой земли, который снимается послѣ этого для подстилки. Полученная тѣмъ или другимъ образомъ земля складывается лучше всего подъ крышей или на возвышенномъ мѣстѣ около скотнаго двора въ кучу, которую покрываютъ досками или соломой, а на зиму непосредственно даже слоемъ конскаго навоза, чтобы предохранить ее отъ промерзанія, потому что земля, въ особенности, суглинистая или содержащая много органическихъ остатковъ, промерзая, уменьшаетъ свою влагоемкость, а при оттаиваніи въ хлѣвахъ, значительно охлаждаетъ эти послѣдніе. Впрочемъ, если бы экономическія соображенія требовали подвозки торфа къ скотному двору зимой, въ свободное отъ полевыхъ работъ время, то можно оставить его до перевозки на мѣсть его полученія сложеннымъ въ кучи съ нѣкоторой защитой отъ влаги. Но замѣна значительной части соломы этими подстилочными средствами затруднительна — такъ какъ для поглощенія одного и того же количества влаги требуется земля съ влагоемкостью въ 55% по вѣсу почти въ шесть разъ больше, а песка съ влагоемкостью въ 22.5% почти въ 12 разъ больше чѣмъ соломы съ влагоемкостью въ 30.9%. Между тѣмъ, почва и въ особенности песокъ бѣды, нѣе соломы (стр. 639) болѣе важными питательными для растенія веществами (азотомъ, калиемъ*), фосфорной кислотой, слѣдовательно земляная подстилка болѣе соломенной уменьшаетъ въ навозѣ, сравнительно съ изверженіями животныхъ, процентное содержаніе питательныхъ для растенія веществъ, а потому навоза съ земляной отчасти подстилкой нужно будетъ болѣе для произведенія того же дѣйствія, чѣмъ навоза съ исключительно соломенной подстилкой; такъ что употребленіе земляной подстилки увеличиваетъ значительно какъ издержки привоза въ хлѣвъ земли въ большемъ сравненіи съ соломою количествомъ и обыкновенно съ болѣе далекаго сравненіи съ соломою разстоянія, такъ и издержки вывоза въ поле соломенного навоза въ сравненіи болѣе въ большемъ количествѣ чѣмъ чистого соломеннаго. Торфа съ влагоемкостью въ 448% нужно почти въ полтора раза меньше чѣмъ соломы для поглощенія одного и того же

*) Считая только кали, содержащееся въ части почвы, растворимой въ соляной кислотѣ.

количества влаги; въ тому же, торфъ бѣдѣе соломы только кали (всегда и фосфорной кислотой (не всегда), азотомъ же онъ богаче ея, такъ что уменьшаетъ въ навозѣ, сравнительно съ извержениями, содержание кали и фосфорной кислоты болѣе нежели солома, а азота менѣе нежели солома; а потому навоза съ торфяной отчасти подстилкой нѣрѣдко нужно не болѣе того, сколько нужно и навозъ съ исключительно соломенной подстилкой для произведенія одного и того же дѣйствія. Слѣдовательно, употребленіе торфа въ подстилку увеличиваетъ издержки только привоза въ хлѣвъ торфа сравнительно съ привозомъ соломы, къ тому же лишь на столько, на сколько торфъ (съ мѣста его добыванія) подвозится обыкновенно съ большого чѣмъ солома (съ гумна) расстоянія. Но употребленіе торфа въ подстилку, въ количествѣ небольшемъ того, въ которомъ онъ замѣняетъ солому по влагоемкости, при значительной величинѣ этой послѣдней у торфа, грязнитъ хлѣвъ, если имъ замѣняется сколько нибудь значительная часть соломенной подстилки, особенно же въ хлѣвахъ, въ которыхъ помѣщаются животныя, получающія много жидкаго корма и потому отдѣляющія много мочи, напр. воды, откармливающіеся бардой. А потому торфъ употребляется обыкновенно для замѣны лишь небольшой части соломенной подстилки, къ тому же въ большемъ количествѣ нежели нужно для замѣны соломы по влагоемкости и преимущественно въ овчарняхъ, такъ какъ овцы отдѣляютъ мало мочи; но въ этихъ случаяхъ, за то онъ какъ подстилочное средство, представляетъ почти тѣ же недостатки какъ и земля, хотя въ меньшей степени.

Смѣсь животныихъ изверженій съ подстилочными средствами называется *хлѣвнымъ навозомъ* или просто *навозомъ* и можетъ быть весьма различна въ зависимости отъ различій въ качествахъ изверженій, въ качествахъ подстилочныхъ средствъ, въ количествѣ ихъ по отношенію къ количеству смѣшивающихся съ ними изверженій, въ продолжительности времени, въ теченіи котораго навозъ накапливается до примѣненія его въ полѣ, и въ способѣ накопленія навоза.

Въ зависимости отъ качества изверженій различаютъ главнымъ образомъ, навозы: *крупнаго рогатаго скота, овечій, конскій и свиной*.

Твердые составныя части раздѣлены гораздо мельче въ калахъ крупнаго рогатаго скота и овечьемъ, чѣмъ въ конскомъ и свиномъ; такъ что, при большемъ содержаніи въ тому же водѣ въ калахъ крупнаго рогатаго скота и свиномъ, чѣмъ въ конскомъ и овечьемъ, кало крупнаго рогатаго скота представляетъ наиболѣе плотную, кашеобразную массу, мало пропускающую для воздуха и, при равенствѣ остальныхъ условий, смѣшивается лучше, тѣснѣе съ подстилкой, чѣмъ свиное — съ болѣе крупными твердыми частицами, но, зато, водянистое; чѣмъ овечье — съ болѣе мелкими твердыми частицами, но сухое, и чѣмъ, наконецъ, конское — съ болѣе крупными твердыми частицами и въ то же время сухое. Если же принять во вниманіе, что овечія, конскія и въ особенности свиныя, какъ твердыя такъ и жидкія, изверженія богаче азотомъ, чѣмъ такія же изверженія крупнаго рогатаго скота; что моча крупнаго рогатаго скота, по сущности раствора, превосходитъ лишь свиную и то не всегда, но за то уступаетъ въ этомъ отношеніи овечьей и конской; и что большее содержаніе азота въ изверженіяхъ и большая сгущенность мочи обуславливаютъ болѣе быстрое разложеніе не только самихъ изверженій, но и подстилочныхъ средствъ, съ которыми смѣшиваются изверженія; — то дѣлается понятнымъ, почему навозъ крупнаго рогатаго скота сравнительно *холодеетъ*, т. е., находясь въ большихъ кучахъ, сгребается не

такъ скоро и сильно какъ другіе навозы; почему разложеніе его или обра- зование въ немъ удобоусвояемыхъ для растенія питательныхъ веществъ про- исходитъ обыкновенно очень медленно; почему навозъ крупнаго рогатаго скота легко образуетъ комковатые массы, которыя затрудняютъ равномерное распределеніе его въ почвѣ и которыя, спустя еще нѣсколько лѣтъ послѣ внесенія его въ почву, обрѣтаются въ этой послѣдней въ полуобугоренномъ состояніи; почему свиной навозъ въ своихъ свойствахъ наиболѣе прибли- жается въ большей части случаевъ къ навозу крупнаго рогатаго скота, по- чему онъ также холодеетъ; между тѣмъ какъ навозы овечій и въ особенно- сти конскій горячи; овечій навозъ болѣе рыхлый, разлагается легче и скорѣе предѣльныхъ навозовъ и не образуетъ такъ легко комковатыхъ массъ какъ эти послѣдніе; конскій же навозъ въ этомъ же отношеніи составляетъ совер- шенную противоположность навозу крупнаго рогатаго скота и требуетъ, по- тому, особенной тщательности въ уходѣ за нимъ, чтобы предупредить по- тери важныхъ питательныхъ веществъ, возможные при быстромъ его разло- женіи въ кучахъ. Конечно, навозы — въ особенности свиной и затѣмъ круп- ваго рогатаго скота, менѣе овечій и конскій — могутъ быть различны въ сво- ихъ свойствахъ въ зависимости отъ различія въ свойствахъ изверженій этихъ животныихъ, которыя, вслѣдствіе различія въ кормленіи, могутъ быть глав- нымъ образомъ болѣе или менѣе богаты сухимъ веществомъ и азотомъ. Такъ, свиныя, откармливаемые концентрированными кормовыми средствами, на- комы, напр. богаты азотомъ и фосфорной кислотой зерна бобовыхъ растеній, маслячныя жмыхи, пивная дробина и т. д. даютъ болѣе чѣмъ обыкновенно концентрированную и богатую азотомъ мочу, такъ что навозъ отъ такихъ сви- ней, въ быстротѣ своего разложенія и дѣйствія на растенія, не уступаетъ дру- гимъ навозамъ.

Слѣдующая таблица показываетъ средній составъ (на 1000 ч.) главнѣй- шихъ родовъ навоза, вычисленный изъ среднихъ количествъ твердыхъ и жидкихъ изверженій, доставляемыхъ соответствующими животными въ сутки, и средняго составатихъ изверженій въ предположеніи, что у крупнаго рогатаго скота, свиной и лошади теряется въ слѣдовательно не поступаетъ въ навозъ $\frac{1}{3}$ отдѣляемой ими мочи и что въ сутки каждая штука крупнаго рогатаго скота получаетъ 10, каждая лошадь — $7\frac{1}{2}$, свиная — 5 и овца $\frac{3}{4}$ фунта пшеничной соломы ¹⁾ въ подстилку.

Навозы.	Воды.	Органиче- ского вещества.	Азота.	Зола.	Кали.	Натра.	Магнезія.	Извести.	Фосфорной кислоты.	Серной кис- лоты.	Кремнево- й кислоты.	Хлора.
Крупнаго рогата- го скота.	775 (770) ²⁾	203	3,4 (3,0)	21,8 (23,0)	4,0 (5,2)	1,4 (2,0)	1,1 (0,9)	3,1 (0,8)	1,6 (1,3)	0,6 (0,8)	8,5 (10,8)	1,0 (1,7)
Свиной	724 (566)	250	4,5 (4,6)	25,6 (44,0)	6,0 (6,3)	2,0 (2,2)	0,9 (1,8)	0,8 (3,3)	1,9 (2,4)	0,8 (1,5)	10,8 (14,7)	1,7 (1,7)
Овечій	616 (620)	318	8,3 (7,0)	35,6 (43,0)	6,7 (6,0)	2,2 (1,0)	1,8 (1,4)	3,3 (2,1)	2,3 (2,8)	1,5 (0,7)	14,7 (17,7)	1,7 (0,4)
Конскій	718 (681)	254	5,8 (5,5)	32,6 (32,0)	5,3 (5,3)	1,0 (1,4)	1,4 (2,1)	2,1 (2,3)	2,8 (2,3)	0,7 (0,7)	17,7 (17,7)	0,4 (0,4)

¹⁾ которая въ 86% сухаго вещества содержитъ среднимъ числомъ 0,3% азота и 4,3% зола, въ томъ числѣ: 0,5% кали, 0,1% натра, 0,1% магнезія, 0,3% извести, 0,2% фосфорной, 0,1% серной и 3,0% кремневой кислоты. ²⁾ Числа

Качество и количество подстилочныхъ средствъ, примѣняющихся къ известному количеству изверженій, какъ это видно изъ того, что было сказано выше относительно различныхъ подстилочныхъ средствъ (стр. 637—642), должны имѣть большое влияние на качества навоза. Несмотря на это, однако, мы неимѣемъ употребительнаго различія навозовъ въ этомъ отношеніи; что происходитъ вслѣдствіе того, что всѣ подстилочные средства, за исключеніемъ соломы хлѣбныхъ злаковъ, употребляются сравнительно съ этой послѣдней весьма рѣдко вмѣстѣ съ ней и еще рѣже одни сами по себѣ. При употребленіи же въ подстиль сравнительно большаго количества соломы хлѣбныхъ злаковъ получается чрезвычайно *соломистый навозъ*.

Какъ увидимъ ниже, вывозка навоза въ поле въ *сѣтжѣ состояннѣй*, такъ сказать, почти непосредственно послѣ смѣшенія изверженій съ подстилью, не всегда возможна и разсчитыва, потому что не во всякое время подлежащее удобренію поле свободно для удобренія, не всегда имѣется свободная рабочая сила для вывозки такого громаднаго удобрительнаго вещества какъ хлѣбной навозъ; наконецъ, не всегда пригодно для почвы и растенія удобреніе сѣтжѣй хлѣбнымъ навозомъ. А потому большою частію приходится накапливать навозъ въ усадьбѣ въ теченіи болѣе или менѣе продолжительнаго времени (въ теченіи 2—3 и болѣе мѣсяцевъ); и *время, въ теченіи котораго навозъ накапливается, равно какъ и способъ его накопленія имѣютъ существенное влияние на качества навоза*.

Подъ влияніемъ воздуха накопленнѣй тѣмъ или другимъ способомъ навозъ постепенно разлагается: составныя части его *сгниваютъ* (раскисляются), побуждаемыя къ тому находящимися въ воздухѣ зародышами органической природы, и *сгниваютъ* (окисляются) подъ влияніемъ кислорода воздуха. Кромѣ доступа воздуха ходъ разложенія навозной массы зависитъ отъ известной степени влажности и теплоты. Излишекъ свободнаго доступа воздуха, напр. при рыхлости разлагающейся навозной массы, недостатковъ влаги, который обнаруживается появленіемъ въ навозѣ плѣсени, и чрезвычайно высокая температура, напр. во время лѣтнихъ жаровъ, чрезвычайно усиливаетъ разложеніе, такъ что растворимые въ водѣ продукты разложенія могутъ не находить достаточно воды для своего растворенія и, при своей летучести, теряться изъ навоза. Напротивъ, недостаточный доступъ воздуха, напр. вслѣдствіе излишней влажности навоза, избытокъ влаги въ навозѣ или слишкомъ низкая температура, напр. во время зимнихъ холодовъ, замедляютъ, отчасти приостанавливаютъ разложеніе навоза. Въ первомъ случаѣ уплотненіе и поливка навозной массы, уменьшающія доступъ воздуха и температуру

въ сѣткахъ вычислены на основаніи таблицы на стр. 584—585 въ предположеніи того же количества поступающей въ навозъ мочи и тѣхъ же количествъ подстилочной соломы, но только ржаной, а не пшеничной, хотя составъ ихъ приблизительно одинаковъ. Первая въ отличіе отъ второй въ 85 ч. сухаго вещества содержитъ среднимъ числомъ 0,2% азота и 4,1% зола, въ томъ числѣ: 0,8% кали и 2,4% кремневой кислоты.

и увеличивающія влажность навоза, а во второмъ—складка навоза въ кучи болѣею величиною, въ которыхъ разложеніе болѣею массы увеличиваетъ количество развивающагося при разложеніи тепла, могутъ привести разложеніе навоза къ надлежащей мѣрѣ. При разложеніи навоза измѣняются какъ азотистыя, такъ и безазотистыя органическія составныя части его. Скорѣе всего разлагаются азотистыя вещества мочи, медленнѣе ихъ азотистыя вещества кала и наимедленнѣе азотистыя вещества подстилочныхъ веществъ. Конечные продукты разложенія азотистыхъ органическихъ веществъ навоза составляютъ о-бокъ съ водою: сѣрнистый водородъ, аммиакъ и его соли, въ особенности двууглекислота, какъ продукты гніенія, и угольная, азотная и сѣрная кислоты какъ продукты гнѣнія. Небольшая часть азота улетучивается даже въ видѣ свободнаго азота. Изъ безазотистыхъ органическихъ составныхъ частей навоза, какъ то: клетчатки, крахмала, жира и т. д. образуются вслѣдствіе гніенія о-бокъ съ летучими углеводородами различныя перегнойныя вещества (стр. 90), обуславливающія чернѣющій цвѣтъ разложившагося навоза, и вслѣдствіе сгниванія вода и углекислота. Эти же измѣненія органическихъ составныхъ частей навоза обуславливаютъ раствореніе неорганическихъ составныхъ частей навоза съ образованіемъ въ то же время перегнойнокислыхъ, углекислыхъ и аммиачныхъ солей.

Такимъ образомъ, навозъ, при разложеніи его, во-первыхъ, становится бѣднѣе углеродомъ, водородомъ, кислородомъ, сѣрой и азотомъ, вслѣдствіе выдѣленія изъ него воды, углекислоты, углеводорода, сѣрнистаго водорода и аммиака, если не принимается никакихъ мѣръ для удержанія этихъ летучихъ веществъ въ навозѣ; во-вторыхъ, уменьшается какъ въ объемѣ, такъ и въ вѣсѣ, вслѣдствіе разложенія органическихъ составныхъ частей его и испаренія воды, которому содѣйствуетъ развивающагося при разложеніи навоза теплота. За неимѣніемъ болѣе точныхъ изслѣдованій можно полагать, среднимъ числомъ, потерю навоза, разлагавшагося въ теченіи 2—3 мѣсяцевъ и представляющаго къ концу этого времени однородную, рыхлую массу, въ 16—20% или въ $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{4}$, потерю же навоза, пролежавшаго еще долѣе до образованія имъ болѣе плотной, маслянистой сальной массы, въ 30—40% первоначальнаго вѣса или объема свѣжаго навоза. По мѣрѣ того какъ навозъ уменьшается въ массѣ, возвышается содержаніе въ немъ сухаго вещества и онъ становится, слѣдовательно, процентно богаче питательными для растенія веществами, какъ неизмѣняющимися минеральными, такъ и азотомъ, при умѣломъ обращеніи съ этимъ послѣднимъ; но въ это же время онъ бѣднѣетъ въ отношеніи содержанія органическаго вещества. По этому, по степени разложенія навоза, накоплавшагося въ теченіи болѣе или менѣе продолжительнаго времени, можно различить слѣдующіе роды навоза: *сѣтжѣй* или *соломистѣй*, въ которомъ подстилочная солома, сохраняющаяся еще болѣе или менѣе полно свое строеніе, смѣшана съ изверженіями настолько неполно, что навозъ представляетъ мало однородную, рыхлую массу; *полуперепрѣтѣй*, въ которомъ подстилочная солома уже настолько разложилась, что, при довольно тѣсномъ смѣшеніи ея съ изверженіями,

навозъ представляет довольно однородную, хотя еще рыхлую массу; наконецъ, *перепрѣвшій*, въ которомъ подстилочная солома дотога уже разложилась и тѣсно смѣшалась съ изверженіями, что едва различима и навозъ представляет однородную, маслянистую, рѣжущуюся какъ сало массу. Вытекающее отсюда различіе въ свойствахъ этихъ трехъ родовъ навоза дополняется еще слѣдующими средними числами ихъ химическаго состава:

1000. Частей навоза.	Воды.	Органическа- го вещества.	Азота.	Зола.	Каль.	Магн.	Извест.	Магнезіи	Фосфорной кислоты.	Серной кис- лоты.	Кремнелой кислоты.	Хлора.
Свѣжаго.	710	246	4,5	44,1	5,2	1,5	5,7	1,4	2,1	1,2	12,5	1,5
Полуперепрѣваго.	750	192	5,0	58,0	6,3	1,9	7,0	1,8	2,6	1,6	16,8	1,9
Перепрѣваго.	790	145	5,8	65,0	5,0	1,3	8,8	1,8	3,0	1,3	17,0	1,6

Эти данныя относительно измѣненія навоза необходимо имѣть въ виду какъ при оцѣнкѣ дѣйствія навоза такъ и при опредѣленіи количества навоза въ тѣхъ различныхъ состояніяхъ, въ которыхъ онъ вывозится въ поле, по количеству его въ свѣжемъ состояніи, вычисленному изъ корма и подстилки (стр. 254—257.)

Но, въ теченіи одного и того же времени накопленія, конечно можетъ быть полученъ навозъ весьма различнаго качества въ зависимости отъ способа его накопленія. Навозъ, до вывоза его въ поле, накапливается или въ *хлѣвахъ подѣ скотомъ* или въ *гноищахъ*, въ которыхъ онъ, извлекаемый изъ хлѣвовъ отъ времени до времени, складывается или *поверхъ земли въ видѣ навозныхъ кучъ* (рис. 196), или




Рис. 196.

же въ выкопанныя въ землѣ, такъ называемыя *навозныя ямы* (рис. 197—въ планѣ, рис. 198 въ поперечномъ разрѣзѣ по линіи *pq* и рис. 199—въ продольномъ разрѣзѣ по линіи *mn*) или же въ видѣ *навозныхъ кучъ*, лежащихъ своей нижней частію въ *ямѣ*. (рис. 200).




Рис. 197.




Рис. 198.




Рис. 199.

При накопленіи навоза, какимъ бы то ни было способомъ, необходимо стремиться къ тому во первыхъ, чтобы накопить навозную массу возможно полно безъ утраты какой либо ея части; во вторыхъ, чтобы получить ее возможно однородной, въ состояніи возможно полнаго разложенія, соответствующаго продолжительности




Рис. 200.

времени, въ теченіи котораго накопится навозъ. Навозная масса можетъ утрачиваться или въ твердомъ видѣ послѣдствіе раструски ея при перемѣщеніи; или въ жидкомъ видѣ послѣдствіе высе-

ачиванія ея водой, напр. дождевой, или неполнаго собиранія мочи; или, наконецъ, въ газообразномъ состояніи послѣдствіе улетучиванія газообразныхъ продуктовъ ея разложенія.

При накопленіи и сохраненіи навоза подъ скотомъ въ хлѣвахъ, первая изъ указанныхъ цѣлей, а именно возможно полное, безъ всякой утраты, накопленіе навозной массы достигается употребленіемъ достаточнаго большаго количества подстилки, измельченіемъ подстилочной соломы, надлежащимъ устройствомъ пола и употребленіемъ средствъ, удерживающихъ летучіе продукты разложенія въ навозѣ; вторая же цѣль—полученіе возможно однородной, въ надлежащей степени разложившейся навозной массы—равномернымъ распределеніемъ подстилки и равномернымъ утаптываніемъ навоза скотомъ.

При недостаткѣ водостилочныхъ средствъ, твердыхъ изверженій, послѣдствіе недостаточной примѣсы къ нимъ умягчающихъ ихъ разложеніе подстилочныхъ средствъ, образуютъ слишкомъ быстро и большое количество летучихъ продуктовъ разложенія, для удержанія которыхъ въ то же время не образуется достаточно перегнойныхъ веществъ; а жидкія изверженія, недостаточно быстро и полно задерживаемыя водостилью, проникаютъ въ полъ; такъ что много цѣнныхъ веществъ терится для цѣлей удобренія. Для полнаго же сбора и сохраненія всѣхъ изверженій какъ жидкихъ такъ и твердыхъ необходимо большое количество подстилки (ч. II стр. 85); а потому для достиженія этого, о-боку съ соломой, особенно въ случаѣ недостатка ея, необходимо употреблять въ подстилку другія еще подстилочныя средства, какъ-то: земля, торфъ и т. д. (стр. 640—642). Эти послѣднія настилаются въ хлѣвахъ или только однажды, при началѣ каждаго новаго періода навозовленія навоза (напр. земля, торфъ), а затѣмъ уже во время всего періода накопленія настиляется одна лишь солома. Или они настилаются однажды на нѣсколько (2—3) періодовъ накопленія хлѣвнаго навоза, если подстилочное средство, какъ напр. верескъ, принадлежитъ къ числу трудно разлагающихся средствъ, а періодъ накопленія мало продолжителенъ, напр. не долѣе 4—6 недѣль, такъ какъ иначе, въ теченіи одного періода накопленія трудно разлагающееся подстилочное средство не успѣло бы достаточно пропитаться изверженіями и разложиться. Въ обоихъ этихъ случаяхъ они настилаются болѣе толстымъ слоемъ, примѣрно въ 1 футъ. Или, наконецъ, они настилаются не только въ началѣ періода накопленія болѣе толстымъ слоемъ, но и впоследствии, въ теченіи всего періода навозовленія навоза, ежедневно (напр.

земля, торфъ у крупнаго рогатаго скота, овецъ) или черезъ болѣе или менѣе продолжительные промежутки времени (напр. черезъ каждыя 14 дней у свиней) попеременно съ соломой. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ при послѣдующихъ постилкахъ они постилаются болѣе тонкими слоями (напр. въ количествѣ отъ $\frac{1}{2}$ до $1\frac{1}{4}$ — 1 $\frac{1}{2}$ куб. фут. земли ежедневно на 1 штуку крупнаго рогатаго скота или 30 штукъ овецъ), при чемъ они каждый разъ перекрываются соломой, а не на оборотъ. Подъ первоначальную настилку болѣе толстаго слоя земли или торфа весьма удобно покрывать полъ хлѣва слегка соломой, преимущественно соломенной сѣчкой, для того чтобы впоследствии, при выборкѣ навоза изъ хлѣва, не повредить пола вилами. Изрѣзка подстилочной соломы въ сѣчку, длинной въ 5—6 дюйм., не только ускоряетъ поглощеніе подстилкой жидкихъ изверженій и, послѣдствіе того, уменьшаетъ количество потребной подстилки, но и облегчаетъ выборку навоза изъ хлѣва, распределеніе его по полу и запашку въ землю (стр. 526 — 527). Для того чтобы жидкость стекающая изъ навоза не могла проникать въ полъ и не застаивалась на немъ, необходимо сдѣлать его возможно ровнымъ и непроницаемымъ для воды, по крайней мѣрѣ изъ глины*), которая набивается слоемъ до 1—1 $\frac{1}{2}$ фут. толщины на мѣсто выпущенной на ту же глубину земли. Въ случаѣ же накопленія навоза подъ скотомъ при употребленіи въ подстилку одной соломы, а тѣмъ болѣе при недостаточномъ количествѣ ея необходимо дать полу, кромѣ того, значительную покатость (около 4 дюйм. на погон. саж.) къ канавкѣ (* рис. 201—поперечный разрѣзъ скотнаго двора), по которой стекающая съ навоза жидкость могла бы собираться въ особый резервуаръ или колодезь; стѣнки этого послѣдняго, равно какъ и стѣнки канавки,




Рис. 201.

*) Конечно, лучше выложить полъ по глинянымъ камнямъ и швы между ними залить даже смесью изъ каменноугольнаго дегтя, смолы и песку; еще же лучше выложить полъ кирпичемъ, плашмя или въ елку, смотря по требованію меньшей или большей непроницаемости, на известковомъ цементѣ съ заливкой верхней части расширяющихся швовъ гидравлическимъ цементомъ и съ покрытіемъ, затѣмъ, пола горячимъ асфальтомъ.

должны быть точно также непроницаемы для воды. Для удержания летучих продуктов разложения кроме насыпки навоза или переслойки его глинистой или богатой перегноем землей, торфом, которые задерживают летучие аммиак и углекислый аммиак могут служить еще: поддержание навоза влажным, в случае надобности даже поливка его водой (напр. в овчарниках особенно в жаркое время), посыпка влажного навоза песком (стр. вносной известью) в количестве 1—2% или поливка его сирной кислотой, разведенной *) 100 част. воды по объему, в количестве, примерно, от $\frac{1}{2}$ до 1% против веса навоза (стр. 256).

Равномерность распределения подстилки и хорошее утаптывание навоза животными обуславливают с одной стороны хорошее смятение извержений с подстилкой, следовательно однородность навозной массы, с другой — ухлощение навозной массы, следовательно ограничение доступа воздуха внутрь ее, сохранение в ней влаги и удержание, вследствие этого, разложения ее в образовании летучих продуктов, так что эти последние усваиваются растворяться влагой навоза и связываются перегнойнными веществами, образующимися при разложении преимущественно подстилочной соломой. Для равномерного распределения подстилки весьма хорошо настлать ее чаще сравнительно небольшими количествами, а для равномерного утаптывания навоза животными, необходимо, чтобы животным могли свободно двигаться, следовательно содержались не на привязи, воодиночно в стойлах, а свободно по нескольку (4—6) штук в одном, достаточно обширном отделе. Животное, содержащееся на привязи, обыкновенно собирает навоз неродными ногами взад и утаптывает его только задними ногами; поэтому, в этом случае, при накоплении навоза под скотом, необходимо выравнивать поверхность навоза несколько раз в день и следовательно тратить лишние руки.

Указанные выше цели хорошего накопления и сохранения навоза в гноище достигаются выбором надлежащего места для гноища, надлежащим устройством гноища и надлежащим уходом за навозом в гноище.

Лучшее место для устройства гноища по близости скотного двора, к тому же с северной стороны этого последнего и, по возможности, несколько возвышенное относительно ближайших окрестностей гноища; потому что такое положение гноища уменьшает расход рабочих рук на извлечение навоза из скотного двора на гноище и защищает навоз в первую очередь от сильного нагревания его солнечными лучами, а следовательно и от скорого высыхания на поверхности, во вторую очередь от подмыва его и выщелачивания верховой водой с окружающих гноище мест. Но последнее вредно тем, что при таком значительном количестве воды, которое может попасть таким образом в кучу, потребовалось бы слишком значительного сборника для хранения всей жидкости, — чрезвычайно разведенной, а потому мало ценной и трудно применимой для удобрения, — которая могла бы получиться от такого выщелачивания навоза.

*) Смятение воды с сирной кислотой, возмещение несчастия, должно быть производимо очень осторожно, так как происходящее при этом значительное возвышение температуры может обусловить местное образование паров, которыми легко может разбрасываться сирь; поэтому надо вливать кислоту тонкой струей в кяду с водой, при частом помешивании деревянной палкой. Употребление с этой целью соляной кислоты вместо сирной неудобно, потому что соляная кислота образует с аммиаком удушливые пары нашатыря.

Гноище устраивается обыкновенно четырехугольной формы; для него или вовсе не роится собственно ямы, или же вырывается более или менее глубокая яма, смотря потому, должен ли весь навоз находиться выше или ниже поверхности земли, или же часть его должна находиться ниже, а часть выше поверхности земли. Во всяком же случае для гноища делается повалость (от 4 до 6 дюйм. на погон. саж.); так что оно понижается или от средин в стороны, или от сторон к средине, или от трех сторон к средине четвертой его стороны. В первом случае, когда весь навоз складывается в кучу поверх земли, гноище окружается канавкой, по которой стекающая из навоза жидкость собирается в сборник или колодезь, помешиваемый вил гноища. В двух остальных случаях, в нижайшем месте для навоза делается сборник или колодезь для сбора просачивающейся через навоз и стекающей по дну гноища жидкости, к тому же так что или весь сборник находится под навозом, который защищается в таком случае находясь в нем жидкость от замерзания, или только часть его находится под навозом, а другая вил гноища; это последнее делается преимущественно тогда, когда над этой частью резервуара, не покрытом навозом, помешается иногда отхожее место, так что человеческие извержения, падающие в сборник для жизни, смываются с этой повалостью. Как дно гноища, так и дно и стеньги сборника и стеньги канавок, проводящих жидкость в сборник, должны быть непроницаемы для воды: первое и последнее по крайней мере убиты глиной **), а дно же и стеньги сборника выложены по глине камнем или кирпичом ***) на гидравлическом цементе. Сверху сборник покрывается толстыми досками для предупреждения испарения влаги, засорения навозом и возможных несчастных случаев. Гноище, для защиты его от затека в него верховой воды с окружающего его места, если бы оно не было защищено от этого уже своим несколько возвышенным над ближайшими окрестностями положением, окружается или одной канавкой, отводящей от гноища притекающую к нему верховую воду, или же кроме канавки еще невысоким земляным валом или невысокой (в $\frac{1}{2}$ — 1 арш. высоты) каменной стеньгой (б — рис 197 и 200); последней особенно если гноище устраивается в виде навозной ямы (рис. 194), которая, на подобие варка, служит для выгона на него по временам скота. Наконец, для отгнетения гноища, для защиты его от нагревания солнечными лучами, обсаживают его быстро растущими тополями (лучше всего *Populus alba* и *canescens*), которые выносят в ночь присутствие большого количества растворимых частей навоза. Гноище обсаживается, впрочем, деревьями так, что бы деревья по стеньгам движения по нем не мешали, если оно представляет навозную яму, и чтобы корни деревьев не доходили до стеньг ямы и не повреждали их. Для еще большего отгнетения навоза и защиты его от непосредственно выпадающей на гноище атмосферной воды устраивают иногда над гноищем навес. Но с одной стороны устройство такого навеса, в особенности же ремонт его, вследствие быстрого его разрушения в соприкосновении с чрезвычайно влажной атмосферой, богатой содержанием разных газов, требуют значительных расходов, с другой — отгнетение гноища достигается дешевле обсадкой его деревьями, а в защите навоза от непосредственно выпадающей на гноище атмосферной воды вил надобности, так как количество ее сра-

*) Лучше же укреплены как в хлывах (стр. 649); при чем, если дно гноища выкладывается кирпичем, то непременно в стыки на местах, по которым необходимо проложить тележки; **) лучше всего пропитанным в разогретом состоянии и сложеным на разжиженной нагреванием сирью каменно-угольного дегтя, смолы и песку.

внительно весьма незначительно, в том же она может быть даже полезна в видах увлажнения навоза, а образуемый ею раствор различных питательных веществ из навоза, при сравнительно небольшом его количестве, может быть сохранен для лучшей удобрения сбором его в колодезях для навозной жижи. А потому, настил над гноищами устраивается лишь в случаях загона на гноища скота во время жаров, когда они служат следовательно навозом. Пространство гноища (стр. 179) определяется количеством навоза *), получающегося от различных животных во время нахождения их в хлевках при различных кормах и подстилке (стр. 254—257), продолжительности времени, в течение которого навоз остается в гноище до выноса его на поле, в том куб. саж. навоза (см. ниже), и высотой, которую должен иметь сложенный в гноище навоз. Эта высота не должна превышать 5—6 фут., так как при большей высоте, навоз чрезмерно нагревается, трудно проливается жидкой при поливке и неравномерно разлагается—чем выше навозная масса, тем более различия в степени разложения навоза в различных слоях его. Величина сборника (стр. 179) для навозной жижи, которой плотность приблизительно можно считать равной плотности воды, определяется количеством мочи, выделяемой различными содержащимися в хозяйстве животными во время нахождения их в хлевках; количеством выпадающей на поверхность навозной кучи атмосферной воды; количеством воды, испаряющейся из навоза снова в атмосферу, которое у нас можно считать равным, примерно, $\frac{2}{3}$ предыдущего количества; продолжительности времени, в течение которого навозная жижа сохраняется в резервуаре и, наконец, глубины колодезя, которая, для удобства опораживания и очистки колодезя, не должна превышать 7 фут.; ее не должна быть много меньше этого, так как с уменьшением глубины резервуара для того же количества навозной жижи увеличивается площадь резервуара, иначе поверхность соприкосновения жижи с атмосферой, а следовательно усиливается испарение и разложение жижи, образование и потеря летучих продуктов ее разложения. Гноище устраивается таких размеров, чтобы удобно был уход за навозом (равномерная укладка и поливка его, выборка и т. д.). Поэтому гноища, в которых навоз складывается выше поверхности земли и на которых следовательно нельзя избывать с телегами, получают вид удлиненного четырехугольника, не более 2 саж., так чтобы удобно было накладывать навоз на телеги, стоящие по обеим сторонам гноища. Поэтому же, при необходимости в гноище больших размеров, устраи-

*) Это количество может быть исчислено для крупного рогатого скота, лошадей и овец более точно по формуле $D = T \cdot a + S$, так как в ней приняты во внимание влажность корма, род животных и подстилка. В этой формуле D —есть количество навоза, получаемое от одного животного в сутки; T —количество сухого вещества корма, получаемого животным ежедневно; a —множитель, на который должно быть помножено сухое вещество корма, чтобы получить соответствующее количеству сухого вещества количество извержений животного, и который составляет: для лошадей 2,1, для крупного рогатого скота 3,8 и для овец 1,84; S —количество подстилки, которое у лошадей и крупного рогатого скота равно $\frac{1}{3}$ сухого вещества корма, т. е. $\frac{T}{3}$, а для овец— $\frac{2}{3}$ фунта в сутки. По объему получается, средний числом, в сутки от одного штуки крупного рогатого скота $2\frac{1}{4}$, от лошади $\frac{3}{4}$, от овцы (включая потерю во время работы) $\frac{1}{4}$ —1, от свиньи $\frac{1}{8}$ и от овец неважного меньшего $\frac{1}{16}$ куб. фута.

вать его из нескольких отделений (напр. двух, рис. 196) с соответствующим распределением колодезей, для большого удобства ухода за навозом вообще и для того чтобы иметь возможность отдельного ухода за навозом различной старости.

Прежде складки навоза на гноище, весьма хорошо покрыть дно гноища слоем земли в $\frac{3}{4}$ фута, которая вбирает просачивающуюся снизу навозную жижу и при свозке навоза с гноища употребляется особо от навоза. Навоз выбирается из хлевных выходов и в ручных тачках (если нельзя устроить вывозки навоза в небольших вагонах, поставленных на рельсы) вывозится на гноище, по которому старается распределять его равномерно. При складке навоза ниже поверхности земли в навозную кучу, при складке навозной кучи, которая углубляется в землю, нет необходимости хлопотать о боках кучи, которые плотно прилегают к стенкам амб, вырытой в земле; но, при складке навоза в навозную кучу поверх земли, необходимо наблюдать, чтобы бока эти, вертикальные или наклоненные в направлении снизу вверх внутри кучи (рис. 200), были по возможности плотны и гладки. Для этого навоз накладывается слоями полойно и в каждом слое сперва по краям кучи; при чем, работнику, положив навоз на край кучи так, чтобы некоторая часть его свиснула через край кучи, заворачивает свиснувшую часть внутрь и притаптывает ее ногой; а потом, обойдя таким образом весь край кучи, выполняет навозом образовавшееся внутри кучи углубление. Так продолжается кладка до тех пор, пока вышина кучи не достигнет 5—6 футов, когда покрывают ее слоем земли, торфа или грязи в 5—6 дюйм. толщины, и куча готова. Иногда же, по складке слоя навоза толщиной в $\frac{1}{4}$ —1 фут., перекрывают его снова землей, в том же не только сверху, но и с наклоненных внутри кучи боков, а затем складывают второй слой навоза и т. д. до надлежащей высоты кучи. Таким употреблением земли достигаются за раз три цели: во 1, земля, особенно содержащая много перегноя, вполне поглощает летучий аммиак; во 2, образуя сплошной покров, она препятствует непосредственному действию на навоз воздуха и лучей солнца; в 3, наконец, она равномерно уплотняет массу навоза своим грузом. Если имеются навозы различных животных, то весьма хорошо переслаивать их между собой при складке их на гноище. Дальнейший уход за навозом в гноище заключается в утаптывании его, поливке и употреблении веществ задерживающих летучие продукты разложения навоза. Утаптывание навоза для утраты доступа в него воздуха и лучшего сохранения в нем влаги, производится или рабочими (навозная куча) при каждой вывозке навоза на гноище, или же животными, которые выгоняются на гноище (навозную лму стр. 651). Для поддержания в навозной массе надлежащей степени влажности, утраты теплоты, развивающейся при разложении навоза особенно в жаркое время и для разложения и удержания летучих веществ, навоз, как только поверхность кучи окажется сухой—т. е. чаще (до одного раза в день), зимой реже (до двух раз в неделю, а то так и вовсе не поливается, напр. у паск)—поливается навозной жижей, а за недостатком ее даже и чистой водой. Для поливки навоза навозной жижей над сборником для этой последней устанавливается пасос, лучше всего *плотной* *) или *четкой* (рис. 202), по-

*) у Ф. В. Гракова в Риге плетные насосы $2\frac{1}{2}$ дюйм. в диаметре, длиной сунтов: 10 12 13 14; в сунтах 230 240 250 263 за каждый сунт больше; стоят рублей: 40 42 45 48 2 руб. больше, в $3\frac{1}{2}$ дюйм. в диаметре на $\frac{1}{2}$ дороже.




Рис. 202.

оставлять часть растворенных в ней веществ (аммиак) и из которого, взаимно оставленных, растворит другие вещества (фосфорную кислоту, известь) и стекает из навоза в вид, так называемой, *навозной жижи* *). Навозная жижа, по своему составу отличается от мочи; она беднее селитрой твердыми, растворимыми веществами и азотом, но зато между растворимыми веществами богаче последней фосфорной кислотой, а иногда и известью. Средним числом, можно считать, что навозная жижа содержит 1,8% твердых веществ, которые на половину состоят из минеральных, на половину из органических веществ; половину (50%) первых составляет ка-

* Жижей называют всякую выделенную мочу, хотя бы изменение состояло лишь в разжижении ее водой.

средством которого при диаметре его в 2½ дюйм., 1 человек может поднять на высоту почти 2-х сажень около 45 ведер в час. Жижа, извлекаемая из сборника насосом, распределяется равномерно по гноищу помощью продырявленных деревянных желобов, поддерживаемых деревянными же крестовинами. Стекающая прямо из хлбвов жижа (моча) проводится помощью закрытых каналов (из гончарных труб) или в тот же сборник, который назначен для сбора жидкости, стекающей из навоза, или, что лучше, в особый колодезь по близости же гноища, и употребляется точно также для поливки куч. Уплотнение и поливка навоза производятся путем образования навозом *плех*; плехами называются куски навоза, плотно оплетенные грибами плесневого гриба, который развивается в полостях с влажной и теплой атмосферой, образующихся в неплотно сложенном навозе, при недостаточной влажности, в особенности летом. Плехи затрудняют разложение навоза и разстройку его на поля. Наконец, для удержания легучих веществ, кроме переслойки навоза землей и поливки его, можно с успехом употреблять посылку гипсом и поливку разведенной серной кислотой (стр. 650). Кроме того, к навозу примешивают иногда фосфорнобиселую известь в различных видах, увеличивая грязь, воду и т. д. для удобривания навоза питательными для растений веществами, но это составляет переход к компостам (см. ниже).

Из приведенного видно, что моча животных почти не собирается чистой; большей же частью смешивается с водой (дождевой и т. д.), проникает навоз, в котором

ли, остальное же — небольшие количества фосфорной кислоты и других минеральных веществ; четвертую часть (25%) органических веществ составляет азот. Ценность навозной жижи весьма различна и зависит: во первых, от степени разжижения ее водой; во вторых, от старости ее; в третьих, от жары, принятых для удержания азота в жиже. Во всяком случае ценность ее весьма значительна и полнота сбора ее в значительной степени обуславливает успех хорошего накопления и сохранения навоза.

Чем старее навозная жижа, тем беднее она азотом, так как азотистые вещества мочи превращаются довольно быстро в улетучивающийся аммиак и одновременно с этим развиваются в жиже еще другие конючие продукты гниения азотистых веществ (сернистый аммоний) и перегнойные вещества, которые сообщают навозной жиже темный цвет; иначе, навозная жижа бродит или гниет. Для удержания азота в навозной жиже лучше всего серная кислота*), которая связывает аммиак без образования осадка. Соляная кислота действует тоже, но образует с аммиаком нашатырь, менее полезный (а иногда и вредный) для растительности, чем сернокислый аммиак (см. ниже). Гипс же и железный купорос, связывая аммиак, образуют осадки, которые трудно выбирать из колодезя. К тому же, осадок, образуемый железным купоросом, прежде внесения его в почву, должен быть подвергнут действию воздуха, потому что, состоя главным образом из гидрата окиси железа, он содержит иногда сернистое железо, которое на воздухе переходит во вредную для растений растворимую сернокислую закись железа, превращающуюся лишь при дальнейшем действии кислорода воздуха в безвредную для растений сернокислую окись железа. Гипс образует осадок, осадая сам, вследствие малой своей растворимости и осаждавая углекислую известь, как продукт взаимного разложения его с углекислым аммиаком. Ценность навозной жижи может быть увеличена погружением в нее обломков (щебня) легко разрушающихся горных пород, как то графита, базальта и т. д., из которых навозная жижа растворяет большее или меньшее количество питательных для растений веществ (см. известь стр. 77); или примесью в ней человеческих извержений (стр. 651) или извержений домашних животных, как это делается напр., в некоторых местностях Швейцарии и Баварии, где почти все количество твердых извержений, для сбережения подстилки, поступает в сборник навозной жижи, вытесняясь водой, в которой она скисается подстилкой, бывшая уже под скотом и затем вновь подстилкаемая скоту. Смесь навозной жижи с твердыми извержениями, прежде употребления ее, подвергается брожению в течение 4—6 недель в закрытых сборниках.

Из сказанного о вышеприведенных способах накопления и сохранения навоза, равно как из прямых наблюдений над действием навоза, накопленного различными способами, выходит,

*) Употребление серной кислоты требует, однако, большой осторожности, так как, попав на кожу, она может произвести опасные ожоги. В случае ожога необходимо прежде всего удалить серную кислоту с раны помощью пропускной бумаги или сухого полотна, которая вбирает ее, и затем прикладывать рану водой.

воздѣлывается много озимыхъ колосовыхъ хлѣбовъ, гдѣ слѣдовательно достаточно подстилочныхъ средствъ; гдѣ рабочія руи дороги; гдѣ суровыя зимы требуютъ большаго обогрѣванія хлѣбовъ; гдѣ, наконецъ, не дороги строительные матеріалы, соответствующіе требованіямъ постройки такого хлѣва. Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ, накопленіе и сохраненіе навоза въ гноищахъ можетъ заслуживать предпочтеніе. Слѣдовательно, въ нашихъ хозяйственныхъ условіяхъ еще много основаній для накопленія и сохраненія навоза подъ животными.

6. Компостъ

есть смѣшанный тукъ (стр. 636), который готовится изъ смѣси различныхъ веществъ съ цѣлю, съ одной стороны: воспользоваться для цѣлей удобренія веществами, которыя (какъ напр. кровь, трупы павшихъ животныхъ, пометъ домашнихъ птицъ и т. д.) накапливаются въ хозяйствѣ въ сравнительно небольшомъ количествѣ, затрудняющемъ примѣненіе ихъ самихъ по себѣ, или которыя (какъ напр. кровь, почное золото, разная мезга и т. д.) въ настоящемъ ихъ видѣ неудобны для удобренія, или для дальнѣйшаго ихъ сохраненія, въ случаѣ невозможности немедленнаго употребленія ихъ для удобренія; съ другой — сохранить эти вещества безъ всякой утраты важныхъ для растенія составныхъ частей ихъ и превратить ихъ въ такой тукъ (компостъ), который, представляя совершенно однородную и приготовленную разложениемъ массу, удобно и равномерно распределялся бы по полю и доставлять бы удобряемому растенію всѣ необходимыя для этого послѣдняго питательныя вещества въ состояніи наибольшей ихъ усвояемости для растенія.

Для приготовленія компоста употребляются вещества минеральнаго, растительнаго и животнаго происхожденія или отбросы фабричной, заводской или скотоводственной обработки ихъ, разсмотрѣнные нами выше какъ удобрительныя вещества вообще. Всѣ эти вещества, какъ компостный матеріалъ, могутъ быть различены: во-первыхъ, на такія, которыхъ (какъ напр. животные трупы, мясо, кровь, золото, сорныя травы) употребленіе для удобренія безъ предварительной подготовки ихъ и смѣшенія съ другими веществами неудобно или даже невозможно, и на такія, которыя (зола, костяная мука, известь) могутъ быть употреблены для удобренія и сами по себѣ, но употребляются въ компостъ для сдѣлыванія его питательнымъ для растенія веществами, а иногда (костяная мука), впрочемъ, играютъ даже сами отъ этого ихъ примѣненія для удобренія, вслѣдствіе ускоренія ихъ разложенія. Во вторыхъ, на вещества различ-

ной степени разложимости: сравнительно легко и быстро разлагающіяся (кровь, мясо, золото, свѣжая растительная масса) и сравнительно трудно и медленно разлагающіяся (рога, кости, шерсть, сухая растительная масса — дрепесные опилки, кострика). Въ третьихъ, по преимущественному, если неисключительному назначенію ихъ при приготовленіи компоста, на такія, которыя назначаются для снабженія компоста питательными для растенія веществами (азотистыя животныя вещества, кости, зола); далѣе, на такія, которыя (известь, зола, навозная жижа) ускоряютъ разложеніе трудно и медленно разлагающагося компостнаго матеріала и, наконецъ, на такія, которыя служатъ для умѣренія разложенія быстро разлагающагося матеріала и для поглощенія продуктовъ разложенія (опилки, кострика, земля).

Компостъ, подобно навозу въ гноищахъ, готовится въ кучахъ или ямахъ, преимущественно въ первыхъ, если компостъ готовится въ главной массѣ изъ медленно разлагающихся веществъ, и преимущественно во вторыхъ, если преобладаетъ быстроразлагающійся компостный матеріалъ (пчное золото). Компостныя кучи закладываются лучше всего на нѣсколько возвышенномъ, тѣпистомъ мѣстѣ или по близости скотнаго двора или навозныхъ гноищъ, для того чтобы удобно было пользоваться навозной жижей для поливки навозныхъ кучъ; или по близости мѣста, доставляющаго компостный матеріалъ или назначеннаго для удобренія компостомъ (напр. дуга), для того чтобы избѣжать отчасти расхода рабочей силы на перевозку нерѣдко весьма громадскаго компостнаго матеріала (дерна, земли). Приготовленіе пола подъ компостную кучу ограничивается большей частью удаленіемъ дерна и выравниваніемъ; иногда же убиваютъ его слегка глиной и весьма рѣдко укрѣпляютъ его выкладкой камнемъ и кирпичемъ, такъ какъ весьма рѣдко употребляютъ такую сильную поливку компостныхъ кучъ, чтобы съ нихъ вытекала жижа; въ случаяхъ же этого послѣдняго, необходимо укрѣпленіе пола, подобное укрѣпленію его въ гноищахъ, и устройство сборника для жижи (стр. 558). Компостныя кучи дѣлаются обыкновенно съ четырехугольнымъ, продолговатымъ основаніемъ и суживаются вверху, представляя собой пирамиду со срызанной верхушкой. Величина кучъ измѣняется, смотря по обстоятельствамъ; среднимъ числомъ, однако, можно считать ее въ 3—4 фута вышины и 8—12 фут. длины и 5—6 фут. ширины въ основаніи.

При постоянномъ употребленіи компостнаго удобренія, необходимо имѣть въ хозяйствѣ нѣсколько компостныхъ кучъ какъ различной сѣлести, такъ и различныхъ по употребленію для ихъ закладки компостному матеріалу; во первыхъ, потому что, компостъ

требуется для своего выпивания больше или меньше продолжительного времени, от нескольких месяцев до двух лет, смотря по роду употребленного для его приготовления материала и климатическим условиям, так как посывание компоста есть процесс разложения, находящийся в зависимости от теплоты и влажности; во вторых, потому что было бы невыгодным замедлением в обороте удобрительного капитала, если бы сбросить сейчас же в одну компостную кучу как быстро, так и медленно разлагающиеся вещества; так как в таком случае первые, посывающие для удобрения, например, через 3—4 месяца, должны бы были, так сказать, оставаться без действия в течение года и больше, быть может, пока поснут для удобрения вторые. А потому, из более медленно разлагающихся веществ, как-то: земли, ила, торфа, дерна, дорожной грязи, древесных опилок, известкового мусора, иногда с ускоряющими их разложение веществами, напр. известью, закладывают отдельную кучу и затем уже пользуются продуктом ее, называемым *компостной землей*, или прямо для удобрения, например, компостом из торфа или дерновой земли (кочев) с известью, или для образования из него сперва с быстро разлагающимися веществами *главной компостной кучи*.

Некоторые компостные материалы, прежде помещения их в кучу, требуют иногда некоторой подготовки, как-то: измельчения (просушивания, просивания, раздробления лопатой, вилами) напр. земля, ил, торф, шоссе́йная и дорожная грязь, известковый мусор, зола, или варки (кости—стр. 567, трупы—стр. 577) или обработки известью (коровы—стр. 575) и т. д. При закладке же различных материалов в компостную кучу следует руководствоваться следующими общими правилами: во первых, по возможности перемешивать между собой различные материалы, в особенности материалы различной степени разложимости; при этом, иметь в виду, что излишнее преувеличение содержания в куче трудно разлагающихся веществ сравнительно с содержанием в ней легко разлагающихся веществ значительно замедляет посывание кучи; во вторых, приводить в возможно полное прикосновение между собой материал, требующий ускорения его разложения и материал ускоряющий разложение; в третьих, перекрывать и прикрывать слои, развивающие летучие продукты разложения слоями из веществ, задерживающих эти последние, а иногда даже посыпать первые связывающим аммиак гипсом; наконец, в четвертых, помещать в основание кучи материалы, медленно разлагающиеся, сильно и скоро поглощающие как жидкие так и газообразные вещества, лучше всего землю, компостную землю, дерн, и такими же материалами прикрывать кучу. При помещении в компост более жид-

ких масс, следует делать под них слой из сухого компостного материала с возвышенными краями.

Компостные кучи нередко остаются без всякого ухода до времени употребления их для удобрения; но, отсутствие ухода не только замедляет посывание компоста, но даже делает невозможным получение вполне хорошего, однородного компостного тука, подготовленного во всех частях его одинаково; а потому, может быть оправдано в некоторых случаях только разв. экономическими соображениями, делаящими невыгодным расход на уход за компостной кучей. Уход за компостной кучей должен заключаться, главным образом, в перекопке от времени до времени компостной кучи, в особенности дающей компостную землю, и в поливке ее. При перекопке перемешиваются хорошо составленные кучи слои, и из смеси образуется новая компостная куча. Перекапывание, начинаясь, спустя 4—8 недель после закладки, повторяется два, три, четыре раза до наступления окончательной спелости компоста, смотря по материалам, из которых заложена куча, и состоянию погоды; чем быстрее разлагаются заложенные в кучу материалы и чем теплее при достатке влаги погода, тем скорее может быть перекопана куча и тем меньшее число раз нужно перекапывать ее. Поливка компостной кучи предпринимается не только с целью пополнения необходимой для разложения компостных материалов влаги, но и для введения в кучу ускоряющих разложение компоста веществ; почему для поливки употребляется преимущественно содержащая азотистые вещества навозная жижа, но не простая вода. Компостной кучей можно пользоваться, во время ее посывания, для разведения на ней тыквы, кукурузы; что не только украшает, но и отнимает кучу, доставляя в то же время хотя небольшой доход. На зиму хорошо прикрывать компостные кучи дурными проводниками тепла, напр. картофельной ботвой, пыреем, хворостом, в некоторых случаях даже навозом, для того чтобы предохранить кучу от промерзания; что особенно важно тогда, когда компост должен быть развезен из кучи зимой, чтобы воспользоваться более свободной в это время рабочей силой хозяйства.

При разнообразии материалов, закладываемых в компостные кучи, невозможно привести никакого даже в средних числах выраженного химического состава компоста. При этом разнообразии материалов может быть полезным для удобрения перемешивать иногда продукты различных компостных куч между собой и сдабривать их еще прибавлением в них костяной муки или других богатых фосфорной кислотой веществ; при чем складывать такую смесь еще раз в кучу на 4—6 недель и поливать ее в течение этого времени навозной жижой.

3. Дѣйствіе удобрительныхъ веществъ.

Для выясненія себя дѣйствія удобрительныхъ веществъ (туковъ), необходимо различать съ одной стороны: *образъ, быстроту и продолжительность дѣйствія туковъ*, съ другой — *постоянное дѣйствіе туковъ*, которыми эти послѣдніе различаются между собой, и *измѣняющееся дѣйствіе* одного и того же тука въ различныхъ условіяхъ.

Образъ, быстрота и продолжительность постоянного (абсолютнаго) дѣйствія туковъ зависятъ отъ природы самихъ туковъ, т. е. отъ ихъ механическаго строенія, физическихъ и, главнымъ образомъ, химическихъ свойствъ.

Тотъ или другой тукъ, примѣшиваясь къ почвѣ, дѣйствуетъ механическимъ своимъ строеніемъ *непосредственно* на механическое строеніе почвы и на болѣе или менѣе равномерное распредѣленіе въ почвѣ заключающихся въ туѣ питательныхъ для растенія веществъ. Въ отношеніи механическаго строенія, мы можемъ различить: туки *жидкіе, порошкообразные* (землистые) съ болѣе или менѣе крупностью частицъ, и *грозоздкіе**) (соломистые). Послѣдней категоріи туки, къ которымъ принадлежатъ, главнымъ образомъ, свѣжіе и сухіе растительныя массы (зеленое удобреніе, торфъ), отбросы переработки растительныхъ массъ (опилки, кострика) и жѣвотной навозъ (благодаря растительному происхожденію подстилки), производятъ наибольшее и весьма продолжительное измѣненіе въ механическомъ строеніи почвы, разрушая ее яетолько непосредственно примѣсью къ ней своей массы, но и впоследствии дѣйствіемъ газовъ, развивающихся при ихъ разложеніи; но, зато, заключающіеся въ нихъ питательныя для растенія вещества распредѣляются въ почвѣ наименѣе равномерно, вслѣдствіе невозможности болѣе тѣснаго смѣшенія грозоздкихъ туковъ съ частицами почвы. Менѣе и менѣе продолжительное (за небольшими исключеніями — известъ) измѣненіе въ механическомъ строеніи почвы производятъ порошкообразные (въ остальныхъ твердые) туки, которые допускаютъ, зато, болѣе равномерное (тѣмъ болѣе равномерное, чѣмъ мельче представляемый ими порошокъ) распредѣленіе въ почвѣ заключающихся въ нихъ питательныхъ для растенія веществъ. Наконецъ, жидкіе туки производятъ яезамѣтное, быстро исчезающее измѣненіе механическаго строения почвы, допуская, зато, самое равномерное распредѣленіе содержащихся въ нихъ питательныхъ веществъ. Измѣняя механическое строеніе почвы непосредственно, *посредственно* туки вѣляютъ, конечно, на физическія свойства почвы, опредѣляемая механическимъ строеніемъ почвы, какъ то: связность, отношеніе почвы къ газамъ, влагъ и теплотѣ, такъ и на химическія свойства ея, находящіеся подъ вліяніемъ отношенія ея къ воздуху, влагъ и теплотѣ. Такое посредствующее дѣйствіе будутъ оказывать преимущественно тѣ туки, которые сильнѣе другихъ измѣняютъ механическое строеніе почвы, слѣдовательно *грозоздкіе*.

Далѣе, тотъ или другой тукъ, примѣшиваясь къ почвѣ, дѣйствуетъ физическими своими свойствами *непосредственно* на физическія свойства почвы; онъ вѣмѣняетъ вѣтъ почвы, ея удѣльный вѣсъ, ея нагрѣваемость, гигроскопичность и т. д. Такъ, всѣ удобрительныя вещества, отличающіяся темнымъ

цвѣтомъ, преимущественно вслѣдствіе обильнаго содержанія перегноя, углестыхъ частей, какъ-то: жѣвотной навозъ, въ особенности болѣе перепрѣвшій, костяной уголь, или отличающіяся болѣе свѣтлымъ цвѣтомъ, какъ напр. бѣлая известъ, дѣлаютъ почву темнѣе или свѣтлѣе и тѣмъ увеличиваютъ или уменьшаютъ ея нагрѣваемость. Или, растворимыя въ водѣ удобрительныя вещества, какъ-то: гипсъ, чилийская селитра, поваренная соль и т. д. увеличиваютъ гигроскопичность почвы (стр. 108) и уменьшаютъ испареніе воды растеніями, пронизывающимися на удобренной ими почвѣ. Измѣняя физическія свойства непосредственно, *посредственно* туки вѣляютъ, конечно, и на химическія свойства почвы и даже на механическое строеніе ея. Такъ, съ болѣе связными и скорымъ нагрѣваніемъ усиливается химическіе процессы, напр. разрушеніе силикатовъ, образующихъ песчаную или крашеватую часть почвы; съ разрушеніемъ же этихъ послѣднихъ умельшается песчаная и увеличивается иловатая часть почвы, слѣдовательно измѣняется строеніе почвы.

Наконецъ, тотъ или другой тукъ, примѣшиваясь къ почвѣ, дѣйствуетъ химическими своими свойствами *непосредственно* на химическія свойства почвы; вносятъ въ почву полезныя для растенія вещества (питательныя и растворители, какъ-то: соли, аммиака, кали, натра, известъ, магнезія, жѣлѣза и фосфорной, сѣрной, азотной, соляной и угольной кислоты), или безразличныя для растенія вещества (глиноземъ, кремнеземъ (?), или даже вредныя для нихъ иногда вещества (соли закиса жѣлѣза, хлористыя соединенія, преимущественно хлористые кальцій и магній). Или, туки, способствуютъ разрушенію находящихся въ почвѣ обломковъ горнокаменныхъ породъ и органическихъ остатковъ дѣйствіемъ той или другой изъ своихъ составныхъ частей (стр. 77): на первые преимущественно перегнойнокислыхъ солей и жѣвотной известъ, на послѣдніе же жѣвотной известъ и углекислыхъ щелочей и щелочныхъ земель; при этомъ образуются водныя, кремнекислыя (цеолиты) и перегнойнокислыя соли, которыхъ прѣвѣсъ въ почвѣ усиливаетъ задерживаніе почвой питательныхъ веществъ (стр. 114—115). Или, туки (поваренная соль, гипсъ, известъ, чилийская селитра, сѣрнокислый аммиакъ и туки содержащіе эти и подобныя пмѣ соединенія) высвобождаютъ задержанныя почвой вещества; такъ, напр. при удобреніи гипсомъ или суперфосфатомъ, приготовленнымъ съ сѣрной кислотой, высвобождаются полезныя для растенія сѣрнокислыя соли: кали, аммиака, магнезія, а при удобреніи поваренной солью, стасфуртскими препаратами, содержащими хлористый кальцій, или суперфосфатомъ, приготовленнымъ съ соляной кислотой, — вредныя для растенія, хлористые кальцій и магній. Или, туки способствуютъ растворенію питательныхъ веществъ, содержащихся въ почвѣ въ трудно растворимомъ состояніи, напр. трехосновной фосфорнокислой известъ; такъ дѣйствуютъ, напр., гипсъ, поваренная соль, чилийская селитра, сѣрнокислый аммиакъ, туки, содержащіе перегнойнокислыя соли. Туки, оказывающіе послѣднія два дѣйствія, способствуютъ въ тоже время передвѣженію питательныхъ веществъ въ почвѣ, слѣдовательно распространяенію ихъ въ почвѣ, проливленію пглубь почвы (удобренію подпочвы) и равномерному распредѣленію ихъ въ почвѣ. Или, наконецъ, туки уничтожаютъ вредное дѣйствіе нѣкоторыхъ составныхъ частей почвы на растенія, нейтрализуя кислоты (известъ) или (известъ же) вѣсѣняя пѣз вредныхъ растворимыхъ солей закиса жѣлѣза эту послѣднюю, превращающуюся затѣмъ, въ безвредный для растенія гидратъ окиси жѣлѣза. Дѣйствуя на почву непосредственно химически, *посредственно* туки дѣйствуютъ также на физическія свойства почвы и на механическое строеніе ея. Такъ, внося въ почву органическія остатки или вещества, способствующія разложенію этихъ послѣднихъ (известъ), туки способствуютъ обогрѣванію почвы, вслѣдствіе усиленнаго разложенія органическихъ остатковъ и увеличенія содержанія въ почвѣ темныхъ перегнойныхъ веществъ, какъ продукта

*) Малого сравнительно явса въ единицѣ объема.

разложенія органическихъ остатковъ; или, тупѣе, разрушающіе силикатовый песокъ въ почвѣ, увеличиваютъ содержаніе извѣстной и уменьшаютъ содержаніе песчаной части почвы, слѣдовательно измѣняютъ строеніе почвы.

Все туки, слѣдовательно, дѣйствуютъ на почву въ указанныхъ трехъ отношеніяхъ, но дѣйствуютъ далеко не одинаково во всѣхъ трехъ отношеніяхъ; за небольшими исключеніями химическое дѣйствіе ихъ на почву преобладаетъ надъ остальнымъ ихъ дѣйствіемъ на почву. Исключеніе составляютъ хлѣбной навозъ (вообще громоздкіе туки) и извѣсть, которыхъ физическое дѣйствіе на почву чрезвычайно значительно и которые, поэтому, приближаются къ веществамъ, употребляемымъ для кореннаго улучшенія почвъ въ ихъ физическихъ свойствахъ (навозка земель); тѣмъ болѣе что они примѣняются подобно этимъ послѣднимъ также въ значительныхъ количествахъ и чрезъ сравнительно болѣе продолжительные промежутки времени.

Непосредственные дѣйствія тука наступаютъ скорѣе посредственныхъ; но и первыя, въ особенности химическое, наступаютъ различно скоро въ зависимости: отъ степени подготовленности тука, слѣдовательно растворимости (вълѣдствіе ли растворимости формы соединенія, въ которомъ находится питательное вещество въ туки, напр. фосфорновислой извѣсти въ суперфосфатѣ, или вълѣдствіе присутствія въ туки растворителей для заключающихся въ немъ нерастворимыхъ питательныхъ веществъ, напр. азотистыхъ веществъ для фосфорновислой извѣсти въ гуано, стр. 616), подвижности въ почвѣ и доступности для растений содержащихся въ туки питательныхъ веществъ.

Такъ, перуанское гуано, бакеръ-гуано, постылая мука и фосфоритный порошокъ—все туки, доставляющіе фосфорную кислоту, по растворимости фосфорной кислоты въ этихъ тукахъ далеко неодинаковы (стр. 618—619). Или, чилийская селитра, сѣрновислый амміакъ, кровь, мука изъ паревыхъ костей, торфъ, мука изъ нераспаренныхъ костей, шерсть, рога—все туки, доставляющіе азотъ, по подготовленности, растворимости азота, находящагося въ этихъ тукахъ весьма различны. Между тѣмъ какъ въ первыхъ двухъ азотъ находится уже въ формѣ удобовоспринимаемой для растенія, растворимыхъ: азотной кислоты и амміака; въ остальныхъ онъ находится въ соединеніяхъ, которыя должны еще предварительно подвергнуться разложенію, чтобы образовать амміакъ и азотную кислоту. Въ тому же, разложеніе азотистыхъ веществъ этихъ туковъ происходитъ различно быстро. Между тѣмъ какъ азотистое вещество крови разлагается весьма быстро, азотистое вещество рога разлагается чрезвычайно медленно; азотъ, находящійся въ торфѣ, принимаетъ форму амміака или азотной кислоты медленно, чѣмъ азотъ муки изъ распаренныхъ костей, но быстрѣе, чѣмъ азотъ муки изъ нераспаренныхъ, сырыхъ костей и т. д.

Кромѣ вышеприведеннаго дѣйствія, нѣкоторые туки (свѣжій хлѣбной навозъ въ особенности свиной) и вообще туки, въ составъ которыхъ входятъ сорные травы, легко могутъ вносить въ почву сѣмена сорныхъ травъ, ипаче засорять почву, если только предварительнымъ высеянъ ихъ въ почву разложеніемъ этихъ туковъ не уничтожена способность прорастанія этихъ сѣмянъ.

Образъ и быстрота измѣняющагося дѣйствія туковъ зависятъ отъ почвы, которая удобряется, отъ растенія, подъ которое—и отъ климата, въ которомъ удобряется почва и, наконецъ, отъ способа примѣненія тука.

Удобреніе почвы имѣетъ въ виду приспособить *почву* (стр. 544) къ требованіямъ *растенія*, которое должно образовать извѣстное количество растительной массы; а потому, для благоприятнаго дѣйствія удобрения, необходимо, чтобы оно было сообразно съ требованіями растенія и состояніемъ почвы. Съ одной стороны растеніе, для образованія извѣстнаго количества растительной массы, требуетъ отъ почвы извѣстнаго количества извѣстныхъ питательныхъ веществъ (стр. 121), которыя должны находиться въ почвѣ въ наиболѣе благоприятныхъ для поступленія въ растеніе соединеніяхъ *) и въ опредѣленномъ количественномъ отношеніи между собой (стр. 123—124 п. 528—546). Растеніе требуетъ отъ почвы въ наибольшемъ количествѣ азотъ, кали, фосфорную кислоту, иногда же и извѣсть (напр. бобовыя растенія; въ меньшемъ—магнѣзій, желѣзо и сѣрную кислоту; въ хлорѣ, натрѣ и кремневой кислотѣ оно не всегда даже нуждается, а въ углекислотѣ, которую оно получаетъ въ достаточномъ количествѣ изъ воздуха, оно, можетъ быть, вовсе не нуждается отъ почвы. Кромѣ того растенія, въ зависимости отъ различной способности выбирать изъ почвы питательныя вещества (стр. 501), относятся различно къ внесенію въ почву тука въ томъ или другомъ состояніи подготовленности. Съ другой—почва содержитъ, обыкновенно (стр. 132—133), наибольшее количество кремневой кислоты; гораздо меньшее—желѣза, извѣсти, магнѣзи (послѣднихъ двухъ за исключеніемъ известковыхъ, мергельныхъ и доломитовыхъ почвъ) кали и натра, еще меньшее—фосфорной и сѣрной кислотъ и азота и наименьшее хлора вообще; въ растворимомъ же (въ солевой кислотѣ) состояніи почва содержитъ часто въ наибольшемъ количествѣ желѣзо, извѣсть и магнѣзій; въ меньшемъ—фосфорную и сѣрную кислоты, кали и натръ, въ наименьшемъ—кремневую и угольную кислоты, азотъ и хлоръ. Къ этому же слѣдуетъ принять во вниманіе, во первыхъ, что извѣсть, магнѣзій, сѣрная кислота, хлоръ и азотъ въ видѣ азотной кислоты или задерживаются почвой сравнительно слабо, или вовсе не задерживаются ею (стр. 113), послѣдствіе чего перемѣщаются въ почвѣ легко, легко поступаютъ въ растенія, но, зато, легко вымываются изъ почвы; тогда какъ азотъ въ видѣ амміака, кали и фосфорная кислота задерживаются почвой весьма сильно, почему трудно перемѣщаются, трудно переходятъ въ растеніе, но зато не вымываются изъ почвы; во-вторыхъ, что соли, извѣсти (гипсъ), магнѣзи (сѣрнокислая магнѣзія), натръ (поваренная соль), амміакъ (сѣрновислый амміакъ), хлора, сѣрной и азотной (чилийская селитра) кислоты и углекислота способствуютъ растворенію, а слѣдовательно и передвиженію питательныхъ веществъ (въ особенности кали и фосфорной кислоты) въ почвѣ.

*) Весьма вѣроятно, что питательныя вещества принимаются въ видѣ тѣхъ соединеній, въ которыхъ мы можемъ предполагать ихъ находящимися въ почвѣ и которыя при этомъ растворимы въ водѣ сами по себѣ или же при содѣйствіи находящихся въ почвѣ растворителей (углекислоты, поваренной соли, аммиачныхъ и азотножелезыхъ солей) или растворяющей силъ корней. Такъ, кали, амміакъ, натръ, извѣсть, магнѣзій съ одной стороны, и фосфорная, сѣрная и азотная кислоты и хлоръ съ другой—принимаются въ соединеніяхъ между собой, въ видѣ соотвѣствующихъ солей; причемъ, однако, натръ и хлоръ поступаютъ, по всей вѣроятности, преимущественно въ видѣ поваренной соли, а сѣрная кислота—преимущественно въ видѣ гипса. Желѣзо принимается, весьма вѣроятно, въ видѣ фосфорновислой окиси желѣза.

Изъ этого слѣдуетъ, что если почва, вполне способная удовлетворить различнымъ требованіямъ надлежащаго питания растений, не нуждается въ удобреніи, то въ такой почвѣ туки могутъ оказаться безъ всякаго дѣйствія на растеніе; напротивъ, если почва, несостоятельная въ удовлетвореніи различныхъ требованій надлежащаго питания растений, нуждается въ удобреніи, то туки окажутъ на нее или *непосредственное* дѣйствіе на растеніе пополненіемъ содержанія въ почвѣ того питательнаго вещества или тѣхъ питательныхъ веществъ, котораго или которыхъ недостаетъ почвѣ для того, чтобы остальные, находящіеся въ ней питательныя вещества, могли быть возможно полно употреблены растеніемъ; или *посредственное* — измѣненіемъ механическаго строенія и физическихъ свойствъ почвы и раствореніемъ и перемѣщеніемъ въ почвѣ того питательнаго вещества или тѣхъ питательныхъ веществъ, котораго или которыхъ недостаетъ въ почвѣ въ удобоусвояемомъ и передвижимомъ состояніи для надлежащаго питания растений. Кроме того посредственное дѣйствіе туковъ, на культурныя растенія заключается, можетъ быть, въ истребленіи некоторыхъ сорныхъ травъ, которыхъ семена, находящіеся въ почвѣ, утрачиваютъ способность проростанія въ непосредственномъ соприкосновеніи съ некоторыми туками (поваренной солью). Къ *непосредственно дѣйствующимъ* тукамъ относятся: хлѣбной павозъ, человѣческія изверженія, компостъ (доставляющія всѣ питательныя вещества); сѣрнистый аммиакъ, чилийская селитра, газовая вода и шерстяные, кожаные, клееные, роговые и ворсовые отбросы (доставляющія азотъ); перуанское, рыбное и летучихъ мышей гуано, птичьи изверженія, масляные жмыхи, крошечной туки, мясная мука (доставляющія азотъ и фосфорную кислоту); различные сорта гуано второй группы, измельченные фосфорнокислые ископаемые, фосфоритный суперфосфатъ, костяная зола, осаждаемая фосфорнокислая известь (доставляющія фосфорную кислоту); мука изъ сырыхъ и распаренныхъ костей, костяной суперфосфатъ, пухляты (доставляющія фосфорную кислоту и азотъ); стассфуртскія соли, отбросы приготвленія вина (доставляющія кали), навозная жижа (доставляющая кали и азотъ) и зола (доставляющая кали и фосфорную кислоту). Къ *посредственно дѣйствующимъ* тукамъ принадлежатъ: гнасъ, известь, поваренная соль, зеленое удобреніе. Впрочемъ, нѣрѣдко одинъ и тотъ же туки (напр. чилийская селитра) можетъ дѣйствовать на растеніе какъ непосредственно, такъ и посредственно. Непосредственно дѣйствующіе туки могутъ быть или *полные* туки, если они (хлѣбной павозъ, человѣческія изверженія, навозная жижа, компостъ) доставляютъ растенію всѣ необходимыя для этого сходящаго питательныя вещества; или *неполные* (всѣ остальные), если они доставляютъ растенію только одно или некоторые изъ необходимыхъ для него питательныхъ веществъ *). Изъ сказаннаго же слѣдуетъ далѣе, что, хотя всѣ

*) Полные туки называются также *абсолютными*, потому что они, доставляя растенію всѣ необходимыя для него питательныя вещества, дѣлаютъ его до некоторой степени независимымъ отъ находящихся въ почвѣ питательныхъ веществъ; неполные же — *относительными*, такъ какъ дѣйствіе ихъ относительно, находится въ зависимости отъ питательныхъ веществъ, находящихся въ почвѣ; *основательными*, такъ какъ они только помогаютъ дѣятелю полныхъ туковъ; *концентрированными*, потому что содержатъ какое-либо питательное вещество въ большемъ процентѣ чѣмъ главный туки; *спеціальными*, потому что удовлетворяютъ спеціальной потребности въ томъ или другомъ питательномъ веществѣ, *искусственными*, потому что представляютъ большей частью продукты искусственнаго приготовленія, и *торговыми*, потому что приобретаются большей частью покупкой, а не производятся въ хозяйствѣ, и потому обращаются въ торговлю.

питательныя вещества одинаково необходимы для полнаго развитія растенія, тѣмъ не менѣе не всѣ онѣ, а слѣдовательно не всѣ туки имѣютъ одинаковое значеніе для удобренія. Изъ непосредственно дѣйствующихъ туковъ значаще приходится употреблять являющіе въ почву азотъ, фосфорную кислоту и кали, такъ какъ растенія требуютъ эти вещества въ значительномъ количествѣ, почва же содержитъ ихъ въ сравнительно небольшомъ количествѣ особенно въ растворимомъ состояніи; къ тому же азотъ въ удобоусвояемой для растенія формѣ отчасти выщелачивается, а фосфорная кислота и кали весьма мало подвижны въ почвѣ. Азотистые туки, кромѣ того, дѣйствуютъ и какъ растворители преимущественно труднорастворимыхъ фосфорнокислыхъ солей. Изъ посредственно дѣйствующихъ въ особенности употребляются туки, содержащіе органическія вещества, которыя въ продуктахъ своего разложенія, доставляютъ растворителей — углекислоту, аммиакъ и азотную кислоту и значительно влияют на измѣненіе физическихъ свойствъ почвы; известь, измѣняющая физическія свойства почвы и содѣйствующая вытравиванію свлѣжковой части почвы и разложенію органическихъ веществъ, и гнасъ и поваренная соль для растворенія и перемѣщенія заключающихся уже въ почвѣ питательныхъ веществъ. Наконецъ, изъ вышеприведеннаго же слѣдуетъ, что туки въ зависимости отъ растенія и почвы будутъ дѣйствовать тѣмъ быстрее, чѣмъ сильнѣе способность растенія выбирать изъ почвы питательныя вещества и чѣмъ рыхлѣе почва, слѣдовательно чѣмъ доступнѣе она для воздуха и чѣмъ слабѣе задерживательная ея способность; на песчаныхъ почвахъ быстрее чѣмъ на глинистыхъ. Конечно, это не относится къ измѣненію туками физическихъ свойствъ почвы.

Послѣ почвы и растенія дѣйствіе тука зависитъ въ значительной степени отъ климата, погоды, которыми опредѣляется та степень влажности и теплоты, при которыхъ туки дѣйствуютъ на растеніе и которыя влияют прежде всего на подготовленіе тука и взаимодействие его съ почвой, слѣдовательно на растворимость внесенныхъ съ нимъ питательныхъ веществъ, а затѣмъ и на самое раствореніе и размѣщеніе растворимыхъ питательныхъ веществъ въ зависимости отъ количества попадающей въ почву метеорной влаги. Говоря вообще, неподготовленные туки, содержащіе мало растворителей и трудно растворимыя, сильно задерживаемыя почвой питательныя вещества, дѣйствуютъ весьма слабо и медленно въ сухихъ климатахъ или въ сухіе годы; они дѣйствуютъ сильнѣе и скорѣе въ климатахъ влажныхъ и во влажные годы, и наиболѣе сильно и быстро во влажныхъ и теплыхъ климатахъ, во влажные и теплые годы. Поэтому, напр. костяная мука безъ всякой подготовки или сѣрнистый аммиакъ, изъ котораго почва задерживаетъ аммиакъ, дѣйствуютъ лучше въ влажные, чѣмъ сухіе годы. Когда успѣшно дѣйствуютъ суперфосфаты съ растворимой фосфорной кислотой или чилийская селитра, изъ которой незадерживаемая почвой азотная кислота, могущая легко выщелачиваться изъ почвы въ возбудящую влагой воды.

Наконецъ, на дѣйствіе туковъ на растеніе оказываетъ большое влияние

4. Способъ примѣненія туковъ,

а именно предварительное внесеніе въ почву; *подготовленіе* туковъ; *форма* примѣненія тука; *количество*, въ которомъ туки примѣняются на единицу пространства (десятину), иначе *интенсивность* удобренія; *толщина* слоя, съ которымъ смѣшивается туки; *глубина*, на которую вносятся туки въ почву; *распределеніе* тука на поверхности почвы; *смѣшеніе* его съ почвой и *посторонне* удобренія.

Подготовка туковъ, предварительно внесенія ихъ въ почву, имѣть тройную цѣль, а именно: переводъ заключающихся въ нихъ питательныхъ веществъ въ возможно доступное для растеній состояніе; затѣмъ, возможно равномерное распредѣленіе туковъ въ почвѣ и тѣсное смѣшеніе ихъ съ почвой; наконецъ, устраниеніе вреднаго дѣйствія нѣкоторыхъ туковъ на растеніе. Первая цѣль достигается измельченіемъ удобриательныхъ веществъ (напр. стр. 562), поджариваніемъ, распариваніемъ (стр. 619), гноеніемъ (стр. 567), обработкой кислотами (стр. 563) или щелочами (стр. 570) и смѣшеніемъ ихъ съ растворителями, напр. туковъ, заключающихъ нерастворимую фосфорновислую известь, съ сѣрнокислымъ амміакомъ, поваренной солью—растворителями нерастворимой фосфорнокислой извести. Подобное же этому послѣднему происходитъ и въ томъ случаѣ, если вносить въ почву фосфоритный порошокъ или костяную муку одновременно съ хлѣбнымъ навозомъ или зеленымъ удобреніемъ (см. ниже), дающими растворителей для фосфорнокислой извести. Вторая цѣль достигается измельченіемъ туковъ (стр. 616), поджариваніемъ съ цѣлю выдѣленія изъ туковъ крупныхъ частей, просушкой (стр. 635), поджариваніемъ, распариваніемъ, обработкой кислотами и щелочами и обжиганіемъ (стр. 547), которые облегчаютъ измельченіе затѣмъ туковъ; разбавиваніемъ и раствореніемъ въ водѣ или другой какой-либо жидкости (стр. 571) и, наконецъ, смѣшеніемъ туковъ гуано, сѣрнокислаго амміака и т. д.) съ 2, 3, 4-мъ количествомъ веществъ, лучше всего имѣющихъ также удобрительное значеніе (компостомъ, землей, опилками), для того чтобы увеличить массу тука. Примѣняющагося въ сравнительно маломъ количествѣ на десятину и тѣмъ облегчить равномерное распредѣленіе его въ почвѣ. Для такого смѣшенія необходимо, однако, выбрать вещества, по возможности, одинаковаго удѣльнаго вѣса съ тукомъ, или же такіа, которыхъ частицы имѣютъ болѣе сильное сдѣленіе съ частицами тука; такъ какъ, иначе, при разбрасываніи смѣси, частицы веществъ сапикомъ различнаго удѣльнаго вѣса легко могутъ раздѣляться между собой и распредѣляться при паденіи на землю, собираясь вмѣстѣ въ силу одинаковости своего удѣльнаго вѣса. Чѣмъ подготовленіе тука и чѣмъ равномернѣе распредѣленъ онъ въ почвѣ, а слѣдовательно и смѣшанъ съ ней, насколько это послѣднее зависитъ отъ его распредѣленія, тѣмъ быстрѣе его дѣйствіе на растеніе и тѣмъ быстрѣе оборотъ заключающагося въ немъ капитала. Это же особенно важно въ интенсивныхъ хозяйствахъ (стр. 6), въ которыхъ капиталъ, заключающійся въ тука, примѣняемомъ на десятину, особенно значителенъ. Поэтому, чѣмъ выше состояніе сельскохозяйственной промышленности, чѣмъ патенсивнѣе хозяйство, тѣмъ сильнѣе употребленіе подготовленныхъ туковъ, компостовъ, перепрѣвшаго или даже превращающаго въ компостъ навоза, тѣмъ болѣе что почвы такихъ хозяйствъ обладаютъ обыкновенно такими физическими свойствами, которыя не требуютъ для своего улучшения внесенія въ почву громадныхъ туковъ, содержащихъ малоразложившіяся растительные остатки, напр. солоmistого хлѣбнаго навоза, торфа. Пока же хозяйству недостаеетъ такой интенсивности, пока почва его не обладаетъ надлежащими физическими свойствами, до тѣхъ поръ случается необходимость въ менѣе подготовленности тука, въ сѣвѣжѣ, солоmistомъ навозѣ, который, разлагаясь въ почвѣ (стр. 662), способствуетъ разрыхленію плотной почвы. Наконецъ, для достиженія третьей цѣли, туки подвергаются броженію въ чистомъ состояніи или въ смѣси съ другими веществами (стр. 636) или окисленію на воздухе (стр. 632), или разводится водой (стр. 573); такъ, навозная жижа, если она употребляется для удобренія занятой уже растеніями, къ тому же сухой почвы, разводится равнымъ ей количествомъ воды, такъ какъ иначе, особенно въ сѣвѣжѣ, непереводившемъ состояніи дѣйствуетъ вѣдо на нѣжныя растенія

Туки примѣняются въ различное время въ зависимости: отъ подготовленности, иначе быстроты дѣйствія тука; отъ растенія, подъ которое удобряется почва; отъ состоянія почвы и погоды и отъ экономическихъ соображеній.

Чѣмъ подготовленнѣе тука, т. е. чѣмъ растворимѣе заключающіяся въ немъ дѣйствующія вещества (т. е. питательныя или растворители) и чѣмъ удобоприспособленнѣе онъ, тѣмъ ближе ко времени занятія почвы растеніемъ можно примѣнить его, потому что тѣмъ менѣе нужно времени для тщательнаго смѣшенія тука съ почвой и подготовленія его въ почвѣ къ дѣйствію на растеніе. Туки, содержащіе питательныя вещества въ растворимомъ состояніи, — вслѣдствіе ли растворимости соединений, въ которыхъ они находятся, или вслѣдствіе достатка находящихся въ тукахъ вмѣстѣ съ ними растворителей (копность, гипсъ, сѣрнокислый амміакъ, чинийская селитра, паровая жижа, гуано), — могутъ быть примѣняемы даже какъ *поверхностное удобрение*, т. е. разсыпаны или разлиты въ то время, когда почва покрыта уже растеніями; потому что растворенныя въ нихъ или растворенныя изъ нихъ жидкой водой вещества легко проникаютъ въ почву. Туки же, которые содержатъ растворимыя и незадерживаемыя почвой питательныя вещества, какъ чинийская селитра азотную кислоту, должны быть примѣняемы такимъ образомъ, если имѣется въ виду непосредственное дѣйствіе ихъ — доставленіе азота растенію въ первое время его развитія, когда его корни находятся еще въ самомъ верхнемъ слое почвы, такъ какъ иначе это растворимое питательное вещество могло бы выщелочиться изъ почвеннаго слоя, прежде нежели имъ воспользуется растеніе. Примѣняемый такимъ образомъ гипсъ, вслѣдствіе невыясненныхъ еще причинъ, дѣйствуетъ на растенія (кормовыя, мотыльковыя, въ особенности клеверъ) палачише въ томъ случаѣ, если разсыпается по нимъ, когда они только что укроютъ землю. Затѣмъ, жидкіе (навозная жижа) и порошкообразные (костяная мука) туки вносятся въ почву перѣдко вмѣстѣ съ сѣменами, если только соприкосновеніе отихъ послѣднихъ съ такими туками не вредитъ проростанію сѣмянъ, и если послѣдніе изъ нихъ настолько подготовлены, что могутъ доставить растенію необходимыя для него въ данномъ случаѣ питательныя вещества тотчасъ же по появленіи всходовъ. Такъ, не слѣдуетъ вносить одновременно съ сѣменами жмыховъ и поваренной соли, такъ какъ отъ соприкосновенія съ ними сѣмена утрачиваютъ способность проростанія. Наконецъ, мало подготовленные, неудобоприспособимыя туки, содержащіе питательныя вещества въ нерастворимомъ состояніи и бѣдные растворителями, вносятся, по возможности заблаговременно до занятія почвы растеніями, дабы они имѣли достаточно времени хорошенько распредѣлиться въ почвѣ и перевести въ удобоусвояемое для растеній состояніе заключающіяся въ нихъ питательныя вещества ко времени занятія почвы растеніемъ. Съ этой цѣлю такіе малоподготовленные, трудно-растворимыя туки, какъ костяной уголь, фосфоритный порошокъ, даже хлѣбной навозъ весьма хорошо вносить заблаговременно до занятія почвы растеніемъ (напр. сахарной свекловицей), на которое должны дѣйствовать заключающіяся въ этихъ тукахъ питательныя вещества (напр. фосфорная кислота); къ тому же вносить подъ засѣвъ почвы растеніемъ (напр. гречихой) для зеленого удобренія (стр. 558—560), для того чтобы перевести часть внесенныхъ съ тукомъ питательныхъ веществъ въ удобоусвояемое состояніе, частью проводить ихъ черезъ растеніе зеленого удобренія, частью обогащеніемъ почвы растворителями въ продуктахъ разложенія растительной массы зеленого удобренія.

Растенія вліяютъ на время внесенія туковъ въ почву, вслѣдствіе того, что имѣютъ различную способность выбирать питательныя вещества изъ почвы

(стр. 501) и берутъ ихъ съ различной глубины; дѣлѣе, требуя количественнаго отношенія между питательными веществами, необходимыми для ихъ усиленнаго развитія, страдаютъ отъ избытка въ почвѣ того или другаго изъ питательныхъ веществъ; наконецъ, относятся различно къ засоренію почвы сорными травами. Такъ, растеніе тѣмъ болѣе извлекаетъ выгоды изъ непосредственнаго удобренія подъ него мало подготовленными туками, чѣмъ значительно его способность выбирать изъ почвы питательныя вещества; поэтому викивалъ смѣсь, конские бобы, кукуруза извлекаютъ еще пользу изъ непосредственнаго подъ нихъ, весенняго удобренія почвы свѣжимъ хлѣвнымъ навозомъ. Растенія съ сравнительно глубоко идущими корнями (напр. свекловича) и потому требующія питательныхъ веществъ на извѣстной глубинѣ, требуютъ чтобы удобреніе подъ нихъ почвы туками, (напр. стассфуртскими солями), содержащими хотя и растворимыя но задерживаемыя почвой питательныя вещества (каліи), производились заблаговременно (напр. рано весной или даже съ осени), для того чтобы питательныя вещества имѣли время проникнуть на необходимую глубину, если не вносится на такую глубину прямо, что не всегда возможно. Растенія, воздѣлываемыя для углеводовъ, какъ-то: сахара (сахарная свекловича), крахмала (картофель), несутъ въ почвѣ излишка удобоусвояемаго азота или хлора, а мѣлъ, поздѣлываемый на волюно, — избытка извести; а потому, не слѣдуетъ удобрять почву непосредственно подъ перья растенія туками, обогащающими почву преимущественно въ отношеніи удобоусвояемаго азота (напр. свѣжимъ хлѣвнымъ навозомъ, аммиачными солями) или хлористыми солями (напр. поваренной солью, нѣкоторыми стассфуртскими солями), а подъ мѣлъ — известью. Но, туки, вредны въ первое время своего дѣйствія преимущественно однимъ какимъ-либо питательнымъ веществомъ (свѣжій хлѣбной навозъ азотомъ), могутъ впоследствии оказать полезное дѣйствіе, присоединивъ къ прежнему дѣйствію одного питательнаго вещества дѣйствіе другихъ еще питательныхъ веществъ (свѣжій хлѣбной навозъ въ дѣйствіе азота дѣйствіе фосфорной кислоты, кали, извести и т. д.), вслѣдствіе ли перехода своихъ собственныхъ составныхъ частей въ растворимое состояніе или же вслѣдствіе перевода въ такое состояніе другихъ находящихся въ почвѣ питательныхъ веществъ и вслѣдствіе лучшаго распредѣленія въ почвѣ растворенныхъ питательныхъ веществъ. А потому, вышеприведенными туками подъ названнаго растенія необходимо удобрить почву заблаговременно; такъ, подъ первыя растенія — по крайней мѣрѣ съ предшествующей ихъ посѣву осени или даже подъ предшествующее имъ растеніе (напр. хлѣбный злакъ), которое снеситъ непосредственное подъ него удобреніе почвы такими туками, вслѣдствіе того, что сноситъ вызываемый этими туками избытокъ питательнаго вещества въ почвѣ или даже требуетъ его; подъ мѣлъ же, воздѣлываемый на волюно, слѣдуетъ удобрять почву даже дѣлѣе за семь до замятія почвы льномъ. Такими заблаговременными удобреніемъ: во первыхъ, дается туку время своимъ подготовленіемъ въ почвѣ и взаимодействіемъ съ почвой возвысить содержаніе въ почвѣ другихъ питательныхъ веществъ въ удобоусвояемомъ состояніи въ соответствіе съ внесенными въ избытокъ; во вторыхъ, предоставляется предшествующему или предшествующимъ растеніямъ возможность выбрать изъ почвы съ пользой для себя вредный для даннаго растенія избытокъ питательнаго вещества (напр. кормовая смѣсь изъ пшеницы съ овсомъ выбираетъ излишній азотъ); въ третьихъ, дается вредный для даннаго растенія соединеніямъ, каковы, напр., образующіеся при удобреніи почвы поваренной солью хлористые кальціи и магній, время выщелочиться дождевой и снѣговой водой изъ того слоя почвы, въ которомъ должны развиваться несносимыя избытка этихъ соединеній растенія. Наконецъ, растенія, развивающіяся медленно вначалѣ (напр. просо, ар-ишеница) и недопускающія обработки почвы между ними во время ихъ про-

растанія, чрезвычайно чувствительны къ засоренію почвы сорными травами, а слѣдовательно и къ удобренію почвы такими туками, которые какъ напр. свѣжій хлѣбной навозъ, въ особенности свиной, содержатъ большее или меньшее количество смѣси сорныхъ травъ, неутрачившихъ способности проростанія. А потому, свѣжимъ хлѣвнымъ навозомъ подъ приведенныя растенія слѣдуетъ удобрять возможно заблаговременно, лучше даже подъ предшествующее паровое растеніе (стр. 511—512).

Время удобренія должно быть соображаемо съ положеніемъ и состояніемъ почвы, т. е. съ естественной ея вязкостью, со степенью разрыхленія ея обработкой и чистоты отъ сорныхъ травъ и съ содержаніемъ въ почвѣ большаго или меньшаго количества растительныхъ остатковъ (перенной). Говоря вообще, наиболѣе благоприятнымъ временемъ для удобренія можно считать то, когда почва находится въ состояніи хорошаго разрыхленія, потому что въ этомъ состояніи она допускаетъ наилучшее смѣшеніе съ собой тука; слѣдовательно, когда она готова уже къ посѣву, — для быстродѣйствующихъ туковъ (гуано, костной муки, золы и т. д.) или въ пару, за болѣе или менѣе долгое время до посѣва, — для туковъ, дѣйствующихъ менѣе быстро и посредственно (известь), которые нуждаются еще нѣсколько въ болѣе или менѣе продолжительномъ времени, для того чтобы самимъ подвергнуться извѣстнымъ измѣненіямъ въ почвѣ, или же вызвать такіе измѣненія въ питательныхъ веществахъ почвы. Но, такъ какъ туки, которые вносятся въ почву въ сравнительно мало подготовленномъ состояніи, требуютъ нѣкотораго болѣе или менѣе значительнаго времени для своей подготовки въ почвѣ, то, если бы всегда вносить ихъ въ хорошо уже разрыхленную почву, могло бы потребоваться иногда столько времени на все подготовленіе почвы къ посѣву, до внесенія тука и послѣ внесенія его, что, при краткости періода времени, благоприятнаго для проростанія растеній, можно было бы запоздать подготовленіемъ почвы къ своевременному посѣву. А потому, мало подготовленные (хлѣбной навозъ), трудно растворимые (фосфоритный порошокъ) туки, примѣняющіеся въ томъ же въ большихъ количествахъ на десятину, вносятся иногда въ почву еще тогда, когда она мало разрыхлена, даже вовсе еще не разработана; такъ какъ хорошее смѣшеніе ихъ съ почвой въ этомъ случаѣ достигается нѣсколькими обработками, которыхъ требуетъ разрыхленіе почвы и которыя производятся въ такой промежутокъ времени, въ теченіи котораго внесенный туки успѣваетъ подготовиться въ надлежащей степени, хорошо смѣшаться съ почвой и распредѣлиться въ ней. Такъ, хлѣбной навозъ вносится въ почву иногда при взмѣтѣ (стр. 536), известь или фосфоритный порошокъ разсыпается по живиной кормовой травѣ. Внесеніе такихъ туковъ при взмѣтѣ имѣетъ то хорошее, что нѣкоторые изъ нихъ (хлѣбной навозъ, известь) ускоряютъ разложеніе растительныхъ остатковъ и облегчаютъ чрезъ то какъ механическую обработку почвы изъ подъ живиной дернины, такъ и химическую (известь) подготовку ея продуктами разложенія растительныхъ остатковъ; другіе же (фосфоритный порошокъ) сами растворяются и распредѣляются въ почвѣ отчасти дѣйствіемъ продуктовъ разложенія растительныхъ остатковъ (живиная). Туки, подобные хлѣвному навозу, по внесеніи ихъ въ почву, съ одной стороны должны найти условія благоприятныя для своего разложенія (влажность) и потому не допускаютъ въ теченіе извѣстнаго времени затѣмъ перешапки землей; съ другой — поддерживаютъ въ почвѣ условія (влажность, доступъ воздуха), благоприятныя для развитія корневыхъ многолетнихъ сорныхъ травъ (пырея), если таковыя находятся въ почвѣ, а потому должны быть вносимы въ почву тогда, когда почва уже очищена до извѣстной степени отъ этихъ сорныхъ растеній (стр. 527). Почвы вязкія, не разрыхленныя, при покатомъ положеніи, не должны быть удобряемы безъ прикрытія тука землей,

подъ влажное время, съ осени; такъ какъ въ этомъ случаѣ растворимыя вещества тука легко могутъ быть смесены съ почвой метеорными водами. Точно также не должны быть удобряемы въ такое время легкія почвы, съ малой задерживающей способностью, растворимыми, въ особенности незадерживаемыми къ тому же почвой туками (напр. чилийской селитрой), если бы даже эти туки и могли быть прикрыты землей, такъ какъ растворимыя вещества въ такомъ случаѣ могли бы быть вымелочены изъ почвеннаго слоя обильными метеорными водами прежде, нежели ими воспользуются растенія. Лучшее время для удобрения такихъ почвъ такими туками есть время предъ самымъ засѣвомъ почвъ; между тѣмъ какъ почвы пазкиа, съ большой задерживающей способностью, могутъ быть удобряемы такими туками не только за нѣсколько времени до посѣва, но даже и предъ наступленіемъ влажнаго времени (осени, зимы). Наконецъ, тѣмъ възвѣс почва, тѣмъ менѣе открыта она доступу воздуха и тѣмъ сильнѣе задерживательная ея способность, тѣмъ заблаговременнѣе до занятія почвы растеніемъ долженъ быть внесенъ въ почву тукъ, въ особенности мало подготовленный, и на оборотъ.

Туками, которые нуждаются еще въ подготовленіи себя въ почвѣ, въ особенности же такіе громоздкіе, какъ свѣжій хлѣбной навозъ, которые вносятся въ почву не только для пополненія въ почвѣ недостающихъ питательныхъ для растенія веществъ, но и для разрыхленія почвы, — лучшее всего удобрить почву въ такое время, когда можно рассчитывать на достаточное количество влаги и теплоты для необходимаго разложенія внесенныхъ въ почву туковъ. Слѣдовательно, осенью, пока еще достаточно тепло, и весной когда уже достаточно тепло и земля достаточно просохла, для того чтобы внести въ нее навозъ. Но такое время удобрения пригодно не для всѣхъ растеній (стр. 670), если оно дѣлается непосредственно подъ засѣвъ почвъ. Удобрение навозомъ въ исходъ лѣта или въ началѣ осени не всегда можетъ рассчитывать на благоприятныя для разложенія навоза влажность и теплоту; еще менѣе можно рассчитывать на это удобрение среди лѣта, въ сухую погоду. Жидкими и порошкообразными туками, содержащими большое количество дѣйствующихъ веществъ въ растворимомъ состояніи, лучше удобрить глинистыя почвы въ влажную погоду или передъ наступленіемъ влажной погоды; легкія же почвы — въ болѣе сухую погоду въ особенности если растворимое дѣйствующее вещество тука (напр. азотная кислота чилийской селитры) къ тому же еще незадерживается почвой, для того чтобы въ первомъ случаѣ достигнуть лучшаго разрыхленія питательныхъ веществъ въ почвѣ, во второмъ же избѣжать вымелачиванія питательныхъ веществъ изъ почвы. Гипсъ, по необъясненному еще указанію опыта, при разсыпкѣ его по растеніямъ (стр. 669), покрывающимъ уже почву, дѣйствуетъ наилучше, если разсыпанъ въ тихую, теплую весеннюю погоду, пока растенія не обсохли еще отъ покрывающей ихъ росы (рано утромъ) или отъ смочившаго ихъ дождя, такъ что можетъ задержаться на листьяхъ.

Но время наилучшаго примѣненія тука въ зависимости отъ подготовленности тука, отъ растенія и отъ состоянія почвы и погоды можетъ подлежать измѣненію въ извѣстной степени, смотря по экономическимъ соображеніямъ — возможности имѣть тукъ и свободной рабочей силы въ извѣстномъ времени; такъ, удобрение такими громоздкими туками, какъ хлѣбной навозъ, котораго вывозка требуетъ большой рабочей силы, можетъ затрудняться въ исходъ лѣта и осенью немнѣннѣе какъ навоза такъ и свободной рабочей силы въ это время.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ удобрение почвы подъ извѣстное растеніе производится не сразу, а въ два, даже три срока или приема.

Это дѣлается наипаче тогда, если почва удобряется нѣсколькими туками; въ такомъ случаѣ менѣе подготовленнымъ тукомъ (напр. хлѣбнымъ навозомъ) почва удобряется заблаговременно (стр. 669), а болѣе подготовленнымъ тукомъ (напр. гуано) — передъ самымъ посѣвомъ или даже поверхностно. Такъ поступаютъ наипаче съ озимыми растеніями, подъ которыя въ первый разъ почва удобряется въ предшествующее лѣто; а во второй разъ весной по растеніямъ, пережившимъ зиму, особенно если онѣ нѣсколько слабоваты. Впрочемъ, удобрение въ два срока примѣняется даже и тогда, если почва удобряется однимъ только тукомъ; при чемъ наипаче, если этотъ тукъ содержитъ легко растворимыя и даже незадерживаемыя почвой дѣйствующія вещества; такъ, преимущественно чилийскій селитрой, но также и гуано почва удобряется разъ предъ посѣвомъ, другой разъ поверхностно по взшедшимъ уже растеніямъ, которыя такимъ образомъ въ состояніи познѣе воспользоваться растворенными питательными веществами, особенно если они, какъ хлѣбные злаки, берутъ питательныя вещества преимущественно изъ верхняго слоя. Удобрять въ два срока почву даже хлѣбнымъ навозомъ, но это преимущественно тогда, когда растенія (озимы, луга, многолѣтнія травы), нуждаются весной во вторичномъ по поверхностному удобренію а между тѣмъ для этого не имѣется другого тука кромѣ хлѣбнаго навоза; въ такомъ случаѣ берутъ самый мелкій навозъ. Наконецъ, въ два и даже три срока удобряютъ почву тогда, когда долженъ быть удобренъ значительной толщины слой и, для достиженія этого, тукъ долженъ быть внесенъ въ почву въ нѣсколькихъ, въ различное время производимыхъ обработкахъ (см. ниже).

Количество, въ которомъ тукъ долженъ быть внесенъ въ почву, зависитъ главнымъ образомъ отъ двухъ обстоятельствъ: во первыхъ, оттого, *въ какомъ отношеніи* несоотвѣтствуетъ требованіямъ даннаго или данныхъ растеній состояніе почвы въ извѣстное время — въ отношеніи ли своихъ физическихъ свойствъ или въ отношеніи содержанія того или другаго изъ необходимыхъ для растенія питательныхъ веществъ; во вторыхъ, оттого, *на сколько* въ послѣднемъ случаѣ содержаніе въ почвѣ необходимыхъ для растенія питательныхъ веществъ въ удобоусвояемомъ состояніи не соотвѣтствуетъ требованіямъ даннаго или данныхъ растеній. То, что нужно почвѣ для удовлетворенія требованій растенія, можетъ быть опредѣлено болѣе или менѣе вѣрно на основаніи состава золы растеній (стр. 494—497 и таблица состава кормовыхъ и подстилочныхъ средствъ въ приложеніяхъ), результатовъ, которые могутъ дать опыты удобрения, приведенные на стр. 162—163, и соображеній, приведенныхъ на стр. 163—164. Но, этихъ основаній совершенно недостаточно для опредѣленія того, въ какомъ количествѣ нужны почвѣ вещества, которыя должны быть внесены въ нее при удобрении, иначе — какими количествами тука на десятину должна быть удобрена почва. Точное опредѣленіе этого невозможно въ настоящее время; но такъ какъ практика все же нуждается въ опредѣленіи количества тука на десятину, то, для приблизительнаго опредѣленія его, кромѣ указанныхъ основаній, можно руководствоваться еще опытами данными относительно низшихъ, среднихъ и высшихъ коли-

чество (см. нижеследующую таблицу), въ которыхъ применяются различные туки на десятину, именно: тѣмъ въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ удобораспределимѣ туки; чѣмъ больше процентное содержаніе въ немъ дѣйствующихъ частей, ради которыхъ вносятся туки въ почву, вообще и въ растворимомъ состояніи въ частности; чѣмъ меньше рассчитывается на измѣненіе физическихъ свойствъ почвы при удобреніи; чѣмъ меньше продолжительно время, на которое рассчитывается дѣйствіе тука; чѣмъ рыхлѣе почва; чѣмъ слабѣе задерживающая ея способность и чѣмъ лучше состояніе разрыхленія почвы; чѣмъ совершеннѣе способъ распредѣленія тука и смѣшенія его съ почвой; и чѣмъ, наконецъ, меньше толщина слоя почвы, съ которымъ смѣшивается туки. Въ противоположныхъ этимъ обстоятельствахъ туки применяются тѣмъ въ большихъ количествахъ.

Кромѣ этого для ближайшаго опредѣленія количества тука на десятину, которое должно быть внесено въ почву въ данномъ случаѣ, полезно произвести сравнительный опытъ надъ дѣйствіемъ тука, призваннаго, на основаніи вышеприведенныхъ соображеній, необходимымъ для внесенія въ данную почву подъ данное растение, въ различныхъ количествахъ на десятину, начиная съ среднего количества, указываемаго опытными данными или того количества тука, которое содержитъ требуемое питательное вещество въ томъ же количествѣ какъ и среднее количество хлѣбнаго навоза на десятину, употребляемое съ усѣхомъ въ данной мѣстности. Затѣмъ, другіе опыты количества тука на десятину опредѣляются въ $\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 и т. д. раза болѣе среднего, принимаемаго за единицу, если приведенныя выше соображенія указываютъ на то, что въ данномъ случаѣ можно ожидать хорошихъ результатовъ отъ количества тука на десятину, большихъ или меньшихъ среднего. Такъ напр. въ 2400 пуд. полуперепрѣвшаго хлѣбнаго навоза, которое вывозится, среднимъ числомъ, на десятину, содержится, среднимъ же числомъ, 6 пуд. фосфорной кислоты (стр. 646); а потому, если бы необходимо было испытать, какое количество, положимъ, обогащеннаго порошка саморода (стр. 544—545) наиболѣе отвѣчаетъ въ данномъ случаѣ требованіямъ растений и состоянію почвы, то за среднее количество обогащеннаго порошка саморода мы могли бы принять то, которое содержитъ тѣ же 6 пуд. фосфорной кислоты, что и 2400 пуд. навоза, т. е. 30 пуд.; а затѣмъ испытать количества его въ 2, 3, 4 раза большія среднего, но не меньшія этого послѣдняго, такъ какъ фосфорнокислая известь саморода весьма слабо растворима. Конечно, такіе опыты дадутъ весьма медленно свои результаты, а потому въ известномъ видѣ*) они должны производиться въ хозяйствѣ постоянно, а не тогда, когда нужно разрѣшеніе какого-либо вопроса въ отношеніи удобренія. Производя ихъ постоянно, можно всегда руководствоваться ихъ результатами для избранія наилучшихъ примесей удобренія. Такіе опыты должны служить въ тоже время для опредѣленія выгоды примѣненія тука, которая одна опредѣляетъ употребленіе тука; потому что недостаточно, чтобы внесеніе въ почву того или другаго тука увеличивало урожай растений, подъ которымъ удобряется почва; необходимо въ тоже время, чтобы обусловливаемый имъ избытокъ урожая съ избыткомъ уплачивалъ расходы на его примѣненіе.

*) Какъ напр. наиболѣе доступными по цѣнѣ туками, содержащими азотъ, фосфорную кислоту и кали, въ чистомъ видѣ и смѣшенія между собой и съ навозомъ, сравнительно съ навознымъ удобреніемъ.

НАЗВАНІЕ ТУКОВЪ.	Вѣсъ 1 куб. фута въ пудахъ.	Количество тука на десятину въ пудахъ.		
		нижнее.	среднее.	высшее.
Известь жженая, негашенная	1,4—1,6	20	50	200
Гипсъ обожженный и истолчен	2,1	10	15—20	40
Поваренная соль	3,6—3,8	10	20	75
Сырое сѣрнокисл. кали	—	25	35	50
Чилийская селитра	—	6	10	14
Морскія водоросли просушен.	—	—	—	2400
Зеленое удобрение (стр. 559)	—	600	1300	2000
Костяная мука:				
изъ сырыхъ костей	1,0	25	40—50	75
„ распаренныхъ костей	—	—	35	—
Суперфосфатъ	—	15	20	40
Кровь свѣжая	—	—	75	—
Кровяной туки	—	35	40	50
Мясной порошокъ	—	—	35	—
Клоачная вода	С м.	с т р.	591.	—
Ночное золото:				
неразведенное	1,8	—	600—650	—
разведенъ 3—4 колѣч. воды	—	800	1200	1500
Фламандскій туки	1,8	175	1000	3500
Гуано	1,5	10	25	50
Голубный пометъ сухой	0,7—0,8	30	50—60	150
Костяной уголь	1,6	25	40—45	85
Роговая стружка	0,4	80	70	80
Шерстяное тряпье	—	100	200	300
Кисевой туки	—	30	35	40
Жижи	—	25	50—75	150
Солодовые ростки	—	40	70	100
Сѣрнокислый аммиакъ	—	6	10	14
Зола: древесная	0,8—0,9	100	170	240
торфяная	0,9	150	500	1200
Подзолъ (озолки)	1,2—1,3	100	200	300
Сажа	0,5	25	50—75	100
Хлѣбный навозъ:				
свѣжій	0,5—0,8	1200	2400—3600	свыше 3600
полуперепрѣвшій	1,0—1,4			
перепрѣвшій	1,8			
Навозная жижа	1,7	2000	3000—4000	5000

Поверхностное удобрение (стр. 669) хорошо тогда, когда необходимо быстрое дѣйствіе питательныхъ веществъ на растенія, покрывающія почву (озими весной), или когда внесеніе тука въ почву уже невозможно. А потому, для такого примѣненія тука пригодны особенно жидкіе туки, которые, если они къ тому же представляютъ мало концентрированные растворы, дѣйствуютъ на растенія въ тоже время доставляемой ими водой; изъ сухихъ же туковъ—

только тѣ, которые содержатъ легко растворимыя дѣйствующія вещества. За исключеніемъ этихъ сравнительно немногочисленныхъ случаевъ, туки всегда вносятся въ почву на болѣе глубокую или меньшую глубину, смѣшиваются съ почвой, прикрываются яемлей.

Толщина слоя, съ которымъ смѣшивается тукъ, зависитъ отъ толщины обрабатываемаго слоя, опредѣляемой (стр. 462—466) свойствами почвы и глубиной развитія корней растенія, и отъ количества тука, въ которомъ онъ примѣняется на десятину. Чѣмъ глубже пахатный слой и чѣмъ болѣе количество тука, которое можетъ быть примѣнено на десятину, тѣмъ болѣе толще можетъ быть слой, съ которымъ смѣшивается тукъ. Глубина же внесения тука зависитъ отъ толщины слоя, съ которымъ смѣшивается тукъ; чѣмъ толще слой, тѣмъ болѣе глубина внесения тука. Но, если тукъ смѣшивается съ пахатнымъ слоемъ не по всю толщину этого послѣдняго, а лишь съ нѣкоторыми, болѣе или менѣе глубоко лежащими частями этого слоя, тогда глубина внесения тука зависитъ отъ растенія, которое, сообразно состоянію почвы, можетъ требовать внесения тука на ту или другую глубину, иначе — пополненія или растворенія питательныхъ веществъ въ пахатномъ слое преимущественно на той или другой глубинѣ. Отъ почвы, такъ какъ тукъ, требующій подготовки себя помощью разложенія (стр. 526—527), долженъ быть внесенъ мельче въ болѣе плотную почву, чѣмъ въ болѣе рыхлую, потому что въ послѣдней онъ найдетъ достаточный для своего разложенія доступъ воздуха на такой еще глубинѣ, на какой не найдетъ его уже въ первой; далѣе, тукъ, содержащій много растворимыхъ веществъ, въ случаѣ необходимости въ глубокомъ его дѣйствіи, можетъ быть внесенъ въ болѣе рыхлую почву мельче нежели въ болѣе плотную, потому что содержащіеся въ немъ растворимыя вещества распределяются въ первой легче чѣмъ въ послѣдней; наконецъ, тукъ, содержащій растворимыя, но въ тоже время слабоудерживаемыя или вовсе незадерживаемыя дѣйствующія вещества, въ предупрежденіе выщелачиванія растворимыхъ веществъ изъ почвы, необходимо долженъ быть внесенъ возможно мелко въ почву, если вносится въ болѣе рыхлую почву, въ томъ же подвѣтряную погоду. Отъ погоды, такъ какъ разложеніе туковъ, требующихъ подготовки въ почвѣ, и распространеніе въглубь содержащихся въ тукахъ растворимыхъ веществъ обуславливаются влажностью, то въ влажную погоду или подвѣтряное время туки могутъ быть вносимы мельче, чѣмъ въ сухую погоду. Наконецъ, отъ свойствъ тука, такъ какъ туки, требующіе подготовки разложеніемъ, зависящимъ отъ доступа воздуха, не могутъ быть вносимы такъ глубоко, какъ туки ненуждающіеся въ такой подготовкѣ; а туки, содержащіе растворимыя, а тѣмъ болѣе слабо задерживаемыя или вовсе незадерживаемыя дѣйствующія вещества, должны быть вносимы мельче, чѣмъ туки, содержащіе вещества, хотя и растворимыя, но сильно задерживаемыя почвой, а тѣмъ болѣе трудно растворимыя, если дѣйствіе ихъ необходимо на нѣсколько болѣе глубинѣ.

Распределение тука зависитъ отъ строенія тука, отъ количества тука на десятину, отъ состоянія погоды, отъ растенія и способа распределенія. Выше (стр. 662) уже мы сказали, что наиболѣе удобораспределимы жидкіе туки; менѣе — порошкообразные въ зависимости отъ крупности ихъ частицъ и сухости тука — чѣмъ суше и мельче порошокъ, тѣмъ лучше и легче распределяется онъ; и наименѣе удобораспределимы громоздкіе туки, содержащіе много растительныхъ остатковъ (жѣвнотной навозъ). Тукъ вообще распре-

дѣляется тѣмъ легче и равномернѣе, чѣмъ болѣе количество его на десятину (стр. 668); такъ, напр. равномерное распределеніе жѣвнотнаго навоза, въ особенности нѣсколько солоmistаго, въ количествѣ, меньшемъ 2,400 пуд. на десятину, уже довольно затруднительно, а въ количествѣ, меньшемъ 1,200 пуд. даже невозможно. Хорошее распределеніе порошкообразныхъ туковъ затрудняется вѣтряной погодой, такъ что, при сильномъ вѣтрѣ, дѣлается совершенно невозможнымъ безъ машины, а при менѣе сильномъ требуетъ осторожности, чтобы тукъ остался на удобряемомъ полѣ и не летѣлъ на разбрасывающаго. Для того, чтобы растеніе могло возможно полно использовать питательныя вещества, вносимыя въ почву съ туками, необходимо, чтобы эти питательныя вещества были распределены въ почвѣ возможно равномерно, такъ чтобы корни растенія, гдѣ-бы они не находились въ почвѣ, могли вездѣ найти одинаково благоприятныя условія питанія. Такое же распределеніе питательныхъ веществъ, при малой подвижности болѣе части ихъ въ почвѣ (стр. 538—539), достигается лишь возможно равномернымъ распределеніемъ тука и имѣетъ особенное значеніе для такихъ растеній, которыхъ развитіе должно быть возможно вырощенное въ отдѣльныхъ экземплярахъ (прядильныхъ — льна). А потому, на всѣ такія растенія оказываютъ самое благоприятное дѣйствіе удобораспределимыя жидкіе туки; наименѣе же благоприятное — трудно распределимыя, громоздкіе туки, особенно если они вносятся недостаточно долго до занятія почвы этими растеніями, такъ что нѣтъ времени поправить дурное распределеніе питательныхъ веществъ при распределеніи малоподготовленнаго тука обработкою почвы въ послѣдствіи, когда тукъ уже нѣсколько разложится, разрыхлится въ почвѣ (стр. 526—529). Особенно трудно достигается такое распределеніе питательныхъ веществъ при распределеніи сравнительно небольшого количества тука на десятину. Но, въ этомъ послѣднемъ случаѣ, подѣ растенія, которыя, требуя болѣе пространства для развитія каждаго отдѣльнаго ихъ экземпляра, воздвѣшаются съ большими промежутками между отдѣльными экземплярами (стр. 511) и спосать непосредственное подѣ ихъ удобреніе (стр. 670), можно замѣнить сплошное удобреніе почвы, при которомъ удобряется вся почва сплошь, мѣстнымъ удобреніемъ въ ряды или лунку, т. е. удобреніемъ тѣхъ только мѣстъ, на которыхъ высѣваются или высаживаются растенія.

Способы распределенія туковъ различны, смотря по строенію тука. Жидкіе туки вывозятся на поле въ деревянныхъ бочкахъ (рис. 203) или желѣзныхъ бочкахъ или ящикахъ, называемыхъ также тачками, или, если они густы, какъ оламандскій тукъ, то и въ телегахъ, высланныхъ плотнымъ холстомъ. Вывезенные на




Рис. 203.




Рис. 204.

поле въ бочкахъ менѣе густые туки, какъ напр. навозная жижа, распределяются по полю прямо изъ бочекъ, съ которыми протягаютъ по полю слѣдъ къ слѣду, помощью подвѣшенныхъ къ бочкамъ досокъ, на которыя—или помощью продыренныхъ жолобовъ, въ которые они выливаются черезъ находящіяся въ бочкахъ отверстія; болѣе же густые туки, какъ фламандскій, спо-

ражниваются предварительно у поля изъ бочекъ въ ушаты (рис. 204), въ которыхъ помощью двухъ палокъ, подкладываемыхъ подъ ушки ушата, относятся затѣмъ на поле и разливаются по полю уже черпаками (рис. 205) съ длинными рукоятками. Такими же черпаками разливается по полю жидкій тукъ, вывезенный на поле въ телегѣ, но уже прямо изъ телеги, съ которою протягаютъ по полю слѣдъ къ слѣду.

Хороши 1) Говардовская желѣзная тачка для навозной жижи (рис. 206), въ 20 ведеръ емкости на 1 лошадь (цѣна 610 марокъ или около 138 руб. на мѣстѣ) съ насосомъ и рука-




Рис. 205.




Рис. 206.

вомъ для наполненія тачки жидкостью (ц. 610 марокъ или около 138 руб. на мѣстѣ). 2) Бочка для той же цѣли Колямона и Мортюма такой же емкости (цѣна около 85 руб., съ насосомъ же около 105 руб. на мѣстѣ).

Если жидкій тукъ примѣняется въ большихъ размѣрахъ, какъ напр. тогда, когда въ видѣ такого тука примѣняются не только жидкая но и твердая изверженія животныхъ (стр. 612) или когда примѣняются клеочные воды, то онъ проводится подземными трубами на удобряемое поле, прямо изъ резервуара, въ которомъ онъ накопляется и готовится, если этотъ послѣдній лежитъ настолько выше черпаго, что имѣется достаточно паденія для свободнаго движенія жидкости и выхода ея наружу изъ-подъ земли съ извѣстной силой; въ противномъ же случаѣ жидкій тукъ изъ резервуара, въ которомъ онъ накопляется, поднимается паровымъ насосомъ сперва въ особый резервуаръ, искусственно поднятый на извѣстную высоту для образованія достаточнаго паденія отъ него къ удобряемому мѣсту. Жидкость, достигшая удобряемаго мѣста, выводится наружу изъ-подъ земли помощью вертикальныхъ трубъ, сообщавшихся съ горизонтальными, открывающихся наружу на извѣстномъ разстоянн одна отъ другой и снабженныхъ кранами, и, подъ напоромъ силы, съ которой вытекаетъ изъ трубъ, разливается по полю посредствомъ навѣшивающихся на концы вертикальныхъ трубъ рукавовъ. Но эта система удобренія жидкими туками, извѣстная подъ названіемъ системы Кеннеди, примѣняется весьма рѣдко, такъ какъ устройство и поддержаніе ея стоятъ довольно дорого, особенно если при искусствѣнномъ поднятіи резервуара, изъ котораго направляется жидкость въ поле, необходимо накачивать въ него жидкость паровымъ насосомъ.

Порошкообразные, земляные туки распределяются различно в зависимости от количества, в котором они разсыплются на десятину, от крупности их частиц и от большей или меньшей сухости их. Туки, которые применяются в значительных количествах на десятину, как компост, известь, и в том же еще содержат много крупных частиц, вывозятся на поле в телегах или, что еще лучше, в тачках (ратнах; рис. 207 *), в ко-




Рис. 207.

торых, для выгрузки клада, задний ступенька выдвигается и ящик опрокидывается назад. Из телег или тачек туки разсыплются по полю лопатой, при чем тачка медленно подвигается вперед, проходя поле след за следом, или складывается предварительно в кучи, правильно располагаемые на поле в таком числе, на десятину и таком расстоянии одна от другой, чтобы, при данной пятнистости удобрения, было удобно разсыпать туки из кучи возможно равномерно на соответствующую кучу площади. Так, для извести ведале 20 фт. кучи от кучи под раскладку куч лучше разбить поле на прямоугольники (лучше квадраты) перекрещивающимися бороздами, для того чтобы кучи, складываемые посреди прямоугольников или на перекрестках борозд, находились бы в более одинаковых одна от другой расстояниях.

Представителями порошкообразных туков, применяющихся в большом сравнительно количестве на десятину, служат известь и компост. Известь вывозится в поле гашеной или негашеной. Гашеная распыливается при на-

*) Ся надблкой (койкой) для перевозки спонков, стна и т. п., которая свивается прочь, когда перевозятся такие вещества, как навоз, известь, компост, и с винтом, посредством которого при подъеме на гору и при спуске нагруженный ящик поддерживает и постоянно в горизонтальном положении.

грузке ее в телеги, в дороги и при разбрасывании ее по полю *); кроме того при вывозе гашеной извести приходится перевозить значительное количество воды (стр. 548). А потому предпочтается вывозить в поле негашеную известь и гасить ее в поле, особенно если необходимая для гашения извести вода находится вблизи поля. В этом последнем случае раскладывают негашеную (комовую) известь в соответствующей величины кучи и, всплеснув на кучу сколько нужно воды, прикрывают ее рыхлой землей, которую берут тут же, под кучи. В таких кучах известь остается больше или меньше долгое время (от нескольких часов до 2—3 недель, в зависимости от того, какое количество воды употреблено было для ее гашения до прикрывания землей: все ли необходимое для гашения, или только часть его) и оттого, употребляется ли в последнем случае вода для полива кучи после прикрывания кучи землей и, если употребляется, то в каком количестве, и как часто и сильно смачивается куча метеороной (дождевой) водой. При достатке влажности в самом начале известь гасится скорее, при недостатке влаги—медленнее; но избыток влаги при гашении вреден, потому что может превратить известь в комковатую, тлстообразную массу, делающую невозможным равномерное распределение и смешивание извести с почвой, между тем как от этого последнего зависит в значительной степени успех известкования (удобрения известью). Гашение извести без полива, самопроизвольным гашением (стр. 548) медленно и примывается разве только тогда, когда известь смешивается с землей в больших кучах, складываемых на окраинах поля, в которых можно безпрестанно выжидать ее гашения таким медленным способом; при складке же извести в меньшие кучи (чтобы облегчить впоследствии распределение тука) на самом поле, хотя бы и паровом, во уже приготовленном настольно, чтобы можно было хорошо смешать известь с почвой (стр. 671), нельзя ожидать исхода погашения так долго, как этого требует произвольное гашение. Во время захождения извести в кучах, прикрытых землей, необходимо засыпать землей тропинки, которые образуются в земляной покрывке от вадутя гашающейся извести, для того, чтобы в случае дождя, в избытке попавшая в кучу вода не превратила извести в комковатую тлстообразную массу. Когда известь погасится, смешивают ее с землей и смешанную с землей разбрасывают по полю лопатой.

В меньшем количестве применяющиеся порошкообразные туки, при сплошном удобрении ими почвы, разбрасываются руками, если они не вредны для человеческой кожи и применяются в чистом состоянии (напр. гуано, костяная мука). Если же они вредны (напр. зола, суперфосфаты) и смешиваются с другими веществами с целью увеличения их массы для более равномерного распределения их (стр. 668), то разбрасывают их и с лопаты. Но качество распределения при таких способах разбрасывания туков

*) В видах меньшего распыливания извести (при вывозе ее в поле гашеной), вредного, по бедности извести, как для людей, так и для лошадей (у работников прикрывают лицо экраном, лошадей и сбрую—полотном) предпочитают гашение в корзинках (стр. 548), так как из горловины извести вывозится прямо в тачку, а разбрасывание извести производят в такую погоду или, в случае разбрасывания при несколько ветреной погоде, собираются с наветренной стороны ветра, так чтобы поднимавшаяся ветром известковая пыль прививала напавшие прочь от людей и лошадей.

слишкомъ зависить отъ состоянія погоды и искусства рабочаго; въ вѣтряную погоду разбрасываніе если не всегда невозможно, то всегда затруднительно, а потому небольшія количества порошкообразныхъ туковъ, въ особенности жидкихъ и примѣняющихся въ чистомъ состояніи, разбрасываются гораздо удобнѣе особенными машинами.

Рис. 208 изображаетъ такую машину Чамберса, которая особенно хороша тогда, когда приходится разбрасывать нѣсколько сыроватые порошкообразные туки (напр. трудно просушивающіеся суперфосфаты). Она изготовляется у Гаррета въ Англіи, у Элкверта (стр. 276), у Кюне (стр. 292) и стоитъ отъ 125 до 150 руб. на мѣстѣ. При длинѣ ящика въ 8 фут., ея можно разбросать туки въ 10 рабоч. часовъ на 3—4 десят. Нѣсколько легче ея, но въ остальномъ довольно сходна съ ней, машина Смита, изготовляемая у Смита въ Англіи и у Циммермана въ Германіи (Галле) и стоящая около 150 руб. на мѣстѣ при длинѣ ящика въ 7½ фут.




Рис. 208.

Прв *мѣстнымъ* удобренію почвы порошкообразными туками, эти послѣдніе разсыпаются въ борозды или лунки, изъ которыхъ сѣваются семена или высаживаются растенія, руками или машинами, которыя въ тоже время служатъ для расѣла сѣмянъ (рядовыми сѣлками и сажальными машинами. (См. ниже.)

Наконецъ, громоздкіе туки, какъ напр. хлѣвной навозъ, вывозител въ поле на телегахъ или въ тачкахъ (рис. 207) сбрасываются сперва въ малыя, равномерно распределенныя по полю кучи (стр. 681), изъ которыхъ уже вслѣдъ за тѣмъ, тотчасъ же или спустя нѣкоторое время, раструсиваются по полю вилами.

Навозъ, при вывозѣ его на полъ, долженъ выбираться изъ хлѣва или конюшни не горюватыми, а инертными словами, чтобы тѣмъ обра-

завъ лучше перемишать между собою верхніе слои менѣе разложившагося съ нижними слоями болѣе разложившагося навоза. Слѣжавшійся въ плотную массу навозъ отрѣзаетъ особой лопатой съ короткой рукояткой и сердцеобразнымъ наконечникомъ или даже навознымъ пожомъ, похожимъ на свиной. Въ случаѣ вѣзды на навозъ съ телегами, при выборѣ навоза, хорошо, въ предупрежденіе растраты навоза, очистить колеса телеги отъ приставшаго къ нимъ навоза при съѣздѣ съ навоза. Навозъ, по вывозѣ его въ поле, складывается иногда въ малыя или *болышия кучи*, въ которыхъ оставляется болѣе или менѣе долгое время до раструски его по полю. Сложенный въ большія кучи, онъ продолжаетъ разлагаться и разлагается тѣмъ быстрѣе, тѣмъ больше кучи, потому что тѣмъ болѣе возвышается въ нихъ температура. Образующіеся при этомъ летучія вещества съ сохраняющейся въ нихъ влагой. Образующіеся при этомъ летучія вещества могутъ теряться въ воздухъ, особенно, если навозъ попеременно то смачивается, то просыхаетъ; растворимыя же вещества, выщелачиваемыя водой, проникаютъ въ то мѣсто почвы, на которомъ сложена куча; такъ что удобряемое такимъ образомъ поле, удобряется неравномѣрно—нѣкоторые мѣста его будутъ удобрены только выщелоченнымъ навозомъ, другія—выщелоченными изъ навоза веществами или этими послѣдними и выщелоченнымъ навозомъ. Кромѣ того равномерная раструска навоза изъ большіхъ кучъ довольно затруднительна, особенно если нельзя произвести ее иначе какъ руками. Поэтому, складка вывозимаго въ поле навоза въ большія кучи можетъ быть допущена въ тѣхъ только случаяхъ, когда съ одной стороны навозъ долженъ быть вывезенъ, напр., у лѣсъ, чтобы воспользоваться свободной рабочей силой въ концѣ зимы (стр. 532—533), а между тѣмъ поле несвободно для раструски по нему навоза—заплато растеніями или открыто сѣномъ. Въ первомъ случаѣ навозъ складывается на обочинахъ, оврагахъ или для умѣренія его разложенія и задержанія летучихъ продуктовъ его разложенія, переслаивается и перекрывается землей или торфомъ. Во второмъ случаѣ, навозъ складывается на полъ на мѣстахъ расчищенныхъ отъ сѣна или же на мѣстахъ, на которыхъ утонуты сѣтки, для того, чтобы не развалилась куча, когда начнетъ таять снѣгъ, и для умѣренія его разложенія, переслаивается сѣномъ. Но, распредѣленіе навоза изъ большіхъ кучъ въ этомъ послѣднемъ случаѣ затрудняется тѣмъ, что нельзя развозить его по полю въ телегахъ пона не обсохнуть и не окрѣпнуть поверхность почвы; и, слѣдовательно, при необходимости ранней раструски, приходится раструсивать навозъ руками, при помощи ручныхъ носилокъ, что сопряжено съ большимъ расходомъ рабочихъ рукъ. Въ этихъ случаяхъ только, въ тому же при избыткѣ навоза, можно допустить складку навоза въ малыя кучи, облегчающія раструску навоза, но зато представляющія въ другихъ отношеніяхъ еще большіе недостатки, нежели большія кучи. При складкѣ навоза въ малыя кучи поле удобряется еще нестрѣе; потеря летучихъ веществъ усиливается, вслѣдствіе увеличенія поверхности навоза, соприкасающейся съ воздухомъ; хотя нѣсколько ослабляется въ тоже время, особенно въ сухую погоду, вслѣдствіе того что навозъ сильнѣе просыхаетъ, тѣмъ въ большіхъ кучахъ, слѣдовательно медленнѣе разлагается и не такъ сильно нагревается. Поэтому, лучше всего, вывезши навозъ въ поле, тотчасъ же раструсить его и, если почва суха и стоятъ сухія погоды, то тотчасъ же и запахать его; по крайней мѣрѣ въ этомъ случаѣ навозъ не сохраняется въ навозѣ необходимая для его разложенія влага и особенно хорошо разрыхляется болѣе плотная почва. Если же оставить навозъ незапаханнымъ въ такихъ условіяхъ, то все же навозъ не подвергнется сколько нибудь значительной уtratѣ изъ него питательныхъ веществъ, такъ какъ, высохнувъ, лишается необходимаго для его разложенія условія—влаги. Если же время стоитъ влажное и достаточно теплое, то даже лучше оставить

навозъ на нѣкоторое время незапаханнымъ, чтобы дожди выщелочили его (летучія вещества при этомъ тоже растворяются) и выщелоченныя вещества равномерно распредѣлились въ почвѣ; при этомъ почва рыхлится подъ навознымъ отбѣниемъ, да и самъ навозъ становится рыхлѣе, такъ что значительно ускоряется разложеніе его, по запаху его въ почву. Если бы такой способъ примѣненія хлѣбнаго навоза осенью, дѣлалъ невозможнымъ запахать навозъ до зimy, то можно оставить его незапаханнымъ даже на зиму. Вообще этотъ послѣдній способъ удобрения хлѣбнымъ навозомъ хорошъ тогда, когда почва сама по себѣ не слишкомъ влажна, такъ какъ онъ затрудняетъ въ этомъ случаѣ просыханіе почвы, что особенно неудобно, если почва удобряется такимъ образомъ съ осени подъ посѣвъ рано всѣвшагося весной растенія; затѣмъ если почва незасорена пыреемъ, потому что этотъ способъ удобрения, способствуя сокращенію въ почвѣ влаги и поддерживая въ ней рыхлость, способствуетъ въ тоже время размноженію пырея; даѣе, если почва, особенно нѣсколько плотная, не слишкомъ мокрая, такъ какъ иначе выщелачиваемыя изъ навоза питательныя вещества, особенно при удобрѣніи съ осени, могутъ сноситься съ поверхности почвы преимущественно весенними водами; наконецъ, если почва достаточно рыхлая, разрыхлена предшествующими обработками, для того чтобы безпрятственно вобрать въ себя выщелачиваемыя изъ навоза вещества. Конечно, для оставленія навоза разславленнымъ не всегда есть время весной, когда при краткости весенняго времени, благоприятнаго для обработки почвы, необходимо смѣшаніе удобрѣній для посѣва; не всегда есть время и осенью, такъ какъ иногда не смотря на краткость благоприятнаго для обработки почвы осенняго времени, необходимо бывать до наступленія времени, прекращающаго обработку, нѣтъ только запахать навозъ но и вымѣшанъ еще почву (стр. 528—529).

Иногда, распределеніе по полю удобрительныхъ веществъ (твердыхъ и жидкихъ изверженій) предоставляется животнымъ; это при, такъ называемомъ, удобрѣніи почвы *толокой* (стр. 612), когда животные, помощи переносныхъ деревянныхъ, веревочныхъ или проволоочныхъ загорожекъ, собираются на извѣстной части поля, не занятого растеніями или даже и покрытаго растеніями (кормовыми травами) и остаются здѣсь на почвѣ, въ теченіи которой получаютъ корма, или даже въ теченіи дня и ночи, когда кормятся кормовыми средствами, доставляемыми частію удобряемымъ полемъ, (турнепсы въ Англіи, кормовыя травы) частію со стороны. Для удобрѣнія толокой употребляютъ преимущественно овецъ, но только не токорунныхъ, особенно въ суровомъ климатѣ. Ово примѣняется преимущественно на болѣе рыхлыхъ почвахъ; на плотныхъ же только послѣ глубокой вспашки и хорошаго разрыхленія ихъ, такъ какъ почва должна легко вбирать ровными животными изверженія, чтобы предупредить потерю летучихъ продуктовъ ихъ разложенія. Оставленные животными изверженія запахиваются возможно скоро, особенно на болѣе рыхлыхъ почвахъ. Сила удобрѣнія толокой зависитъ отъ числа животныхъ, сосредоточиваемыхъ на десяткахъ, и отъ продолжительности времени, въ теченіи котораго животные остаются на томъ же мѣстѣ. Сильнымъ удобрѣніемъ считается удобрѣніе, оставляемое 12000, слабымъ—оставляемое 9000 овецъ

на десятки въ теченіи 12—14 часовъ пребыванія ихъ на одномъ мѣстѣ. При этомъ изверженіями одной овцы удобряется въ первомъ—0,2, во второмъ же—0,25 кв. сажени. Удобрѣніе толокой сберегаетъ расходы на вывозку тука изъ поля.

Туки, въ случаѣ примѣненія ихъ изъ видѣ поверхностнаго удобренія, не смѣшиваются съ почвой. Во всѣхъ же остальныхъ случаяхъ они смѣшиваются съ болѣе или менѣе толстыми почвеннымъ слоемъ, на болѣе или менѣе глубинѣ. Жидкіе и порошкообразные туки смѣшиваются съ почвой помощью экиртаторовъ или боронъ, смотря по толщинѣ почвеннаго слоя, съ которымъ долженъ быть смѣшанъ тукъ. Чтобы достигнуть возможно равномернаго смѣшенія тука съ почвой, необходимо слѣдовать правилу: не смѣшивать туковъ, особенно если они примѣняются изъ сравнительно малыхъ количествахъ на десятину, съ перваго же раза съ слишкомъ толстымъ почвеннымъ слоемъ. Въ случаѣ же необходимости смѣшенія тука съ почвеннымъ слоемъ болѣе толщины, можно, внесъ тукъ сразу при первой мелкой обработкѣ, производить дальнѣйшее смѣшеніе постепенно, углубляя на сколько нужно слѣдующія обработки; или, что даже лучше, можно внести туки по частямъ; такъ, при двухъ частяхъ—одну часть запахать отвальнымъ орудіемъ на полную глубину, какая требуется толщиной слоя; другую смѣшать, затѣмъ, съ верхнимъ слоемъ почвы безотвальнымъ орудіемъ; или, при трехъ частяхъ—запахать первую часть на полную глубину, какъ и въ первомъ случаѣ; вторую—на среднюю глубину, меньшую первой также отвальнымъ орудіемъ и, наконецъ, третью—смѣшать съ самымъ верхнимъ слоемъ помощью безотвального орудія. Отвальное орудіе необходимо для внесенія тука въ почву, если этотъ послѣдній вносится въ почву прямо на значительную глубину, или если тукъ вносится въ необработанную еще землю (при зметѣ) или, наконецъ, если вносится громадный тукъ, который, при своей неподготовленности (хлѣбной навозъ), требуетъ не смѣшенія его съ почвой, а прикрытія землей, чтобы попасть въ условія благоприятныя для его разложенія (стр. 526).

Подготовленіе тука, предшествующее внесенію этого послѣдняго въ почву, измѣняетъ тукъ химически, измѣняетъ форму соединеній, въ которой находятся дѣйствующія въ тукахъ вещества; время внесенія тука обуславливаетъ влажность и теплоту, подъ влияніемъ которыхъ тукъ претерпѣваетъ измѣненія въ почвѣ и дѣйствуетъ на почву; интенсивность удобренія влияетъ на измѣненіе процентнаго химическаго состава почвы, на характеръ химическихъ процессовъ въ почвѣ, на сколько этотъ послѣдній зависитъ отъ величинъ массъ, вступающихъ въ химическое взаимодействие *), и на количе-

*) Такъ, напр., большое количество углекислой извести растворяетъ фосфорную кислоту изъ фосфорнокислой окиси железа, чего не дѣлаетъ малое количество ея.

ственное отношеніе между физическимъ и химическимъ дѣйствіями тука на почву; толщина почвеннаго слоя, съ которымъ смѣшивается тукъ, опредѣляетъ количество почвы, съ которымъ тукъ вступаетъ во взаимодействіе, а глубина внесенія тука въ почву доступъ воздуха, влажность и теплоту, подъ влияніемъ которыхъ происходитъ измѣненіе тука и тукъ дѣйствуетъ на почву; наконецъ, распредѣленіе тука и смѣшеніе его съ почвой влияют на полноту взаимодействія тука съ почвой. Все же влияет на распредѣленіе питательныхъ веществъ въ почву, на время, въ которое — форму соединений в количествѣ, въ которыхъ — и быстроту, съ которой поступаютъ питательныя вещества въ растеніе.

А потому способъ примѣненія тука вообще имѣетъ большое влияние какъ на образъ такъ и на скорость дѣйствія тука, на послѣднюю въ особенности. Если тукъ вносится въ почву подготовленнымъ, въ соотвѣтствующее время и въ болѣе значительномъ количествѣ, не переступая предѣловъ полезнаго; если онъ смѣшивается съ почвеннымъ слоемъ такой толщины и вносится на такую глубину, какихъ требуетъ растеніе, подъ которое удобряется почва; если онъ, наконецъ, возможно равномерно распредѣлится и возможно тщательно смѣшивается съ почвой, то онъ дѣйствуетъ гораздо скорѣе, быстрѣе, чѣмъ если онъ примѣняется въ противоположныхъ этимъ условіяхъ.

Продолжительность же дѣйствія тука зависитъ непосредственно отъ скорости дѣйствія тука и слѣдовательно посредственно отъ всего того, что опредѣляетъ эту послѣднюю. Поэтому говоря вообще, *чѣмъ быстрѣе* дѣйствуетъ тукъ, тѣмъ скорѣе, такъ сказать исчерпывается его дѣйствіе. *тѣмъ менше* оно, слѣдовательно, продолжительно и наоборотъ. Подъ это общее выраженіе пѣзъ обстоятельствъ опредѣляющихъ скорость и продолжительность дѣйствія тука не подходитъ лишь количество тука на десятину, которое, увеличиваясь, увеличиваетъ скорость дѣйствія тука, но и не уменьшаетъ въ тоже время, какъ другія вліющія обстоятельства, а увеличиваетъ продолжительность дѣйствія тука.

Такъ опытъ показываетъ, что, при удобреніи почвы средними количествами на десятину приведенными на стр. 675, можно полагать продолжительность дѣйствія костяной муки и хлѣвнаго навоза 4, гуано 3, гипса, чилийскаго селитры, поваренной соли, сѣрноокислаго амміака 1 годъ; при чемъ дѣйствіе

	считается въ 1-мъ	2-мъ	3-мъ	4-мъ году.	
навоза	> въ 25%	25%	10%	5%	} всего дѣй- ствія..
костяной муки	> » 25—30%	25—30%	20—25%	10—15%	
гуано	> » 60%	25%	15%	0%	

Дѣйствіе известно, при удобреніи его въ количествѣ напр. 1000 пуд. на десятину, продолжается, какъ считаютъ до 30 лѣтъ.

Удобрение, сказали мы, есть періодическая химическая обработка почвы, т. е. пріемъ, повторяющійся черезъ болѣе или менѣе короткіе промежутки времени. Какъ скоро повторяется удобрение вообще и въ частности тѣмъ или другимъ тукомъ, зависитъ отъ

продолжительности дѣйствія тука (см. выше), отъ качества воздѣлываемыхъ растеній и отъ интенсивности хозяйства. Удобрение производится тѣмъ чаще, чѣмъ менѣе продолжительно дѣйствіе туковъ, чѣмъ болѣе воздѣлывается корнеплодовъ и зерновыхъ растеній и менѣе кормовыхъ травъ и чѣмъ интенсивнѣе хозяйство. Въ поясненіе этого можно привести нашъ аякогда неудобряющіяся поля переложной системы на черноземной почвѣ, которая въ теченіи 7—8—9 лѣтъ сряду производятъ урожай преимущественно хлѣбныхъ злаковъ, снабжал эти растенія питательными веществами, освобождающимися изъ мен процессомъ вытѣриванія въ теченіи 12—15 лѣтъ нахожденія ея подъ перелогомъ; далѣе, нашъ же полъ въ трехпольной системѣ на черноземной и нечерноземной почвѣ, производящій, послѣ годоваго пребыванія въ зеленомъ парѣ, два года сряду преимущественно хлѣбные же злаки, при чемъ первый удобряется хлѣбнымъ навозомъ разъ въ 12—9—6 лѣтъ, а второй же разъ въ 9—6—3 года, и, наконецъ, поля Бельгіи, которыя въ плодопеременной системѣ производятъ безъ пара, напр., въ 1-мъ—году—картофель, во 2-мъ—ленъ, въ 3-мъ—рожь и пожнивную рѣпу, въ 4-мъ—овесъ, въ 5-мъ—клеверъ, въ 6-мъ—рожь и въ 7-мъ—рожь и пожнивную рѣпу съ ежегоднымъ удобреніемъ въ 1, 4 и 7-мъ—годахъ хлѣбнымъ навозомъ, во 2, 3 и 6-мъ—навозной жижей и въ 5-мъ—золой.

УХОДЪ ЗА РАСТЕНІЯМИ.

Обнимаетъ приемы культуры растений со времени внесенія въ почву частей растенія, служащихъ для его размноженія, до приведенія урожая растений въ то состояніе, въ которомъ онъ или точнее же съ поля поступаетъ въ кормъ животнымъ, на заводы, соединенные съ хозяйствомъ, или въ продажу или же сохраняется въ хозяйствѣ до получения, одного изъ указанныхъ назначеній. Между тѣмъ какъ приемы, составляющіе раздѣлку новыхъ мѣстъ, коренныя улучшенія, обработку и удобреніе почвы, направляются преимущественно, если не исключительно, на почву, приемы ухода за растеніями направляются преимущественно на самое воздѣлываемое растеніе и только отчасти на почву въ то время, когда эта послѣдняя уже занята воздѣлываемымъ растеніемъ, и на растенія и животныхъ, которые предятъ воздѣлыванію растенію.

Приемы ухода за растеніями, въ видахъ большаго удобства ихъ разсмотрѣнія, могутъ быть весьма удобно-различены на двѣ главныя группы: приемы ухода за полевыми растеніями и приемы ухода за луговыми растеніями.

Уходъ за полевыми растеніями.

Приемы этой группы можно подраздѣлить еще даѣе на 4 группы: 1) приемы внесенія въ почву частей размноженія въ почву растений—посѣвъ и посадку; 2) приемы защиты растений отъ разныхъ вредныхъ вліяній и направленія развитія растений—ухода за растеніемъ во время его произрастанія; 3) приемы удаленія съ поля созрѣвшихъ растений и приведенія урожая растений въ то состояніе, въ которомъ онъ поступаетъ на кормъ скоту, на заводы или въ продажу—уборка растений, и 4) приемы сохраненія урожая въ различныхъ видахъ.

Вотъ списокъ главнѣйшихъ полевыхъ растеній, которыя мы будемъ имѣть въ виду при разсмотрѣніи *) ухода за полевыми растеніями, съ различеніемъ ихъ по климату (стр. 510—511), въ которыхъ онъ воздѣлывается; затѣмъ по частямъ ихъ (стр. 491), для которыхъ онъ воздѣлывается и, наконецъ, по времени, когда онъ высѣвается (стр. 510—11) и долговѣчности **).

I. Воздѣлывающіяся въ паровомъ климатѣ:

- а) для клубней.
1. Картофель. *мн.* (*Solanum tuberosum*).
 2. Земляная груша (топинамбуръ). *мн.* (*Helianthus tuberosus*).
- б) для корней.
3. Свекла кормовая. *дв.* (*Beta vulgaris*).
 4. Свекла сахарная. *дв.* (*Beta vulgaris*).
 5. Морковь обыкновен. *дв.* (*Daucus Carotta*).
 6. Пастернакъ огородн. *дв.* (*Pastinaca sativa*).
 7. Цикорій обыкновен. *дв.* (*Cichorium Intybus*).
 8. Брантъ (марена). *мн.* (*Rubra tinctorum*).
 9. Брюква (рутабага). *дв.* (*Brassica napus esculenta s. rapifera*).
 10. Рѣпа (турнепсъ). *дв.* (*Brassica rapa esculenta s. rapifera*).
 11. Кольраби. *дв.* (*Bras. oleracea caulogara*).
- в) для листьевъ и стеблей.
12. Капуста огородная. *дв.* (*Brassica oleracea*).
 13. Кукуруза на зелен. кормъ. (*Zea Mays*).
- г) для листьевъ.
14. Табакъ (*Nicotiana: macrophylla, tabacum, rustica*). *дв.*
- д) для цвѣторасположеній.
15. Ворсинчатая шипка (*Dipsacus fullonum*).
- е) для зеренъ.
16. Кукуруза (Маисъ). (*Zea Mays*).
 17. Сорго обыкновенное. (*Sorghum vulgare*).
 18. Копеки бобы. (*Vicia faba*).
 19. Фасоль (турецк. бобы). (*Phaseolus vulgaris*).
 20. Репсъ озимый. (*Brassica napus oleifera*).
 21. Подсолнечникъ. (*Helianthus annuus*).

II. Воздѣлывающіяся въ полевомъ климатѣ:

а) для зеренъ, содержащихъ:

а. ВРАЖДАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВЪ ВОЛКОВЫЯ ПЕЩЕСТВА.

Озимая:

22. Пшеница обыкновен. (*Triticum*) (*T. vulgare*).
23. Полба. (*Triticum spelta*).
24. Эммеръ (крахмальная пшеница).

Яровая:

25. Пшеница обыкновен. (*T. vulgare*).
26. Пшеница английская. (*T. turgidum*).
27. Пшеница твердая. (*T. durum*).
28. Пшеница польская. (*T. polonicum*).
29. Ячмень. (*Hordeum*).
30. Ячмень крупный (двух-строчный). (*H. distichum*).
31. Ячмень мелкій. (*H. vulgare*).
32. Ячмень шестистрочн. (*H. hexastichum*).

*) Въ приводимыхъ ниже таблицахъ растеній приводятся въ порядкѣ этого списка **). (Растенія, многолѣтнія) отличены буквами *мн.* (двухлѣтнія)—*дв.* (озимыя)—*оз.* (однолѣтнія) и (яровыя) безъ всякой отмѣтки.

Озимыя:	Яровыя:	
(Triticum amyleum).	29. Полба. (Triticum spelta).	33. Овесъ. (Avena).
25. Однозернянка. (Triticum monocosum).	30. Эммеръ (Triticum amyleum).	простой, метельчатый. (A. sativa). косой, одногранный. (A. orientalis).
26. Рожь. (Secale cereale).	31. Рожь. (Secale cereale).	
27. Ячмень мелкій (четырёхстрочный). (Hordeum vulgare).		34. Просо обыкновенное. (Panicum millaseum).
		35. Гречиха обыкновенная. (Polygonum fagopyrum).

б. крахмалъ и преимущественно белковые вещества.

36. Горохъ. (Pisum sativum).	38. Вика. (Vicia sativa).	40. Бараний горошекъ (Нутъ). (Cicer arietinum).
37. Чечевица. (Ervum lens).	39. Чина. (Lathyrus sativa).	41. Люпинъ желтый. (Lupinus luteus).

в. жирное масло преимущественно и белковые вещества.

42. Репсъ яровой. (Brassica napus oleifera).	45. Горчица бѣлая. (Sinapis alba).	49. Макъ. (Papaver somniferum).
43. Сурьпинца озимая. (Brassica rapa oleifera).	46. Горчица черная. (Sinapis nigra).	50. Ленъ. (Linum usitatissimum).
44. Сурьпинца яровая. (Brassica rapa oleifera).	47. Рыжикъ. (Camelina sativa).	51. Конопля. (Cannabis sativa).
	48. Китайская рѣдька. (Raphanus sativus oleiferus).	

г. эфирное масло.

52. Тминъ (ос. и яр.). <i>дв.</i> (Carum Carvi).	53. Анисъ. (Pimpinella anisum).	55. Коляндръ. (Coriandrum sativum).
	64. Укропъ <i>мн.</i> (Foeniculum officinale).	

б) отчасти для стеблей (волокна), отчасти для зеренъ.

56. Ленъ. (Linum usitatissimum).	57. Конопля. (Cannabis sativa).

в) для цветковыхъ частей, содержащихъ красильное вещество.

58. Сафлоръ. (Carthamus tinctorius).

г) для стеблей и листьевъ или только листьевъ.

а. РАДИ КРАСИЛЬНАГО ВЕЩЕСТВА.

59. Черва. <i>дв.</i> (Reseda luteola).	60. Красильная греча. (Polygonum tinctorium).	61. Вайда. <i>дв.</i> (Isatis tinctoria).

б. РАДИ ПИТАТЕЛЬНЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ (кормовыя травы).

62. Озимая рожь. (Secale cereale).	64. Вика. (Vicia sativa).	65. Птиценожка. (Ornithopus perpusillus).
63. Могаръ. (Setaria germanica).		66. Шпергель. (Spergula arvensis).

III. Воздѣлывающіяся въ луговомъ нѣмнѣ.

67. Клеверъ красный. <i>мн.</i> (Trifolium pratense).	71. Люцерна обыкновен. <i>мн.</i> (Medicago sativa).	75. Итальянскій райграссъ. <i>мн.</i> (Lolium italicum).
68. Клеверъ пиведскій. <i>мн.</i> (Trifolium hybridum).	72. Люцерна хмѣлевидн. <i>мн.</i> (Medicago lupulina).	76. Англійскій райграссъ. <i>мн.</i> (Lolium perenne).
69. Клеверъ бѣлый. <i>мн.</i> (Trifolium repens).	73. Эспартеръ. <i>мн.</i> (Onobrychis sativa).	77. Французскій райграссъ. <i>мн.</i> (Arrhenaterum elatius).
70. Клеверъ масо-красный. <i>од. и дв.</i> (Trifolium incarnatum).	74. Тимофеева трава. <i>мн.</i> (Phleum pratense).	78. Ежа обыкновенная. <i>мн.</i> (Dactylis glomerata).

Посѣвъ и посадка.

Въ почву, приготовленную механической и химической обработкой ея, вносятся служащія для размноженія растений части этихъ послѣднихъ, какъ-то: *сѣмена, стеблевая (черенки, луковичы, корневища) и корневая (черенки)* части растений или выведенныя изъ сѣмянъ цѣлыя, молодые растеньица — *саженцы, рассада*. При размноженіи растений стеблевыми и корневыми частями получаютъ новыя растения, стоящія обыкновенно ближе къ растеніямъ, отъ которыхъ взяты эти части, чѣмъ при размноженіи сѣменами; такъ что первымъ способомъ размноженія можно довольно полно сохранить за потомствомъ растения перѣдко весьма цѣнные качества этого послѣднего, приобретенныя имъ лишь послѣдствіе культуры, тогда какъ при второмъ способѣ это вовсе не возможно или очень не вѣрно. Такъ, форма картофельнаго клубня, свойства клубневой кожцы, рассыпчатость его мяся не сохраняются у картофельнаго растения при разведеніи его изъ сѣмянъ, но сохраняются болѣе или менѣе прочно при разведеніи его отъ клубней.

Но, какими бы изъ названныхъ способовъ хозяинъ не размножалъ разводимыя имъ растенія, онъ размножаетъ ихъ все-же почками, которыя представляютъ зародыши — растеніе въ зачаткѣ, на той ступени развитія, которой оно можетъ достигнуть только, оставаясь въ связи съ иными развитыми материнскими растеніемъ. Достигнувъ этого, зародышъ приобретаетъ способность отдѣльнаго отъ матери, самостоятельнаго развитія, которое первоначально, пока изъ зародыша не разовьется растеніе съ корнями и зелеными листьями, способное принимать пищу изъ почвы и воздѣхъ и усвоить ее, нуждается лишь въ влагѣ, теплотѣ и кислородѣ воздуха; такъ какъ въ отношеніи необходимыхъ въ это время питательныхъ веществъ оно обезпе-

чено запасом их в окружающих зародыше частях растений, а свет для него в это время даже вреден. Впоследствии же, с появлением корней и зеленых листьев, развитие растений, кроме влаги, теплоты и кислорода воздуха, требует еще почвы и света. Запас питательных веществ *, который обеспечивает первоначальное развитие зародыша и который этот последний снабжен еще во время связи его с материнским растением, находится у семян или в так называемом *блэке*, которым окружается зародыш (напр. у семян хлебных злаков) или который окружается зародышем (напр. у свекловицы), или в первых листиках самого зародыша (напр. у бобовых растений); у клубня, корневища, черевка — в стеблевой части, на которой находятся глазки; у луковицы — в составляющих ее, главным образом, мясистых листиках. Чем больше запасы питательных веществ, тем дольше может пользоваться ими развивающееся из зародыша растение, тем дольше может оно обходиться без других источников питательных веществ или же, по крайней мере, довольствоваться более скудным посторонним источником (стр. 501). Так, картофельное растение исчерпывает запасы питательных веществ в клубне, из которого развивается, только ко времени своего цветения. Бобовые и злаковые растения пользуются запасами питательных веществ в их семенах дольше, нежели рисовое или ржаное растение, потому первый развивается без перерыва, замечаемого в развитии последнего, которое исчерпывает запасы своего небольшого семени, прежде нежели молодые корни его в состоянии принять, а листочки принять и переработать достаточное количество веществ для их замкнутого безостановочного роста.

Растения, возделываемые на полях и дугах, размножаются преимущественно семенами, реже клубнями (картофель, земляная груша), луковицами (шафран), корневыми черенками (пшеница) и т. д. Зародыш семени состоит из стеблевой почки или *перышка* и корневой или *корешка*, развивающихся в противоположные стороны. Из них первая представляет уже несколько большее развитие, чем вторая; она уже окружена одним (у односемядольных растений, напр. злаков) или двумя (у двусемядольных, напр. бобовых растений) первыми листочками — *семядолями*.

Различные семена, в зависимости от своей величины, слога состава и свойств своей оболочки, требуют для своего *проростания* (развития находящегося в них зародыша) различных количеств влаги, теплоты и кислорода, как об этом можно судить по приводимым данным, собранным отчасти в следующей таблице.

*) Азотистые вещества находятся у безбланных семян в семядолях; у семян же с бланком — в тканях бланка, в семядолях и в клейковинном слое, окружающем бланк и находящемся под самой семенной кожцей. Безазотистые же вещества (крахмал или жирное масло или оба вместе) находятся у семян в бланке или семядолях. Безазотистые вещества (крахмал у картофеля, инулин у земляной груши, вещество, подобное виноградному сахару в луковице лука, кристаллический сахар в корнях свекловицы) находятся в стеблевых и корневых частях, служащих для размножения, обок азотистыми веществами, которые большей частью отличаются в наружных слоях клеточек или в наиболее сосудистого нутра этих частей.

СЕМЕНА:

СЕМЕНА:

Отношение семян к воде.

Отношение проростания семян к теплоты.

Проростание семян — количество теплоты, необходимой для проростания в % от веса семян

Проростание семян — количество влаги, необходимой для проростания в % от веса семян

Проростание семян — количество воздуха, необходимого для проростания в % от веса семян

Проростание семян — количество света, необходимого для проростания в % от веса семян

Предельная температура проростания.

Предельная температура проростания.

Ускорение проростания с возмущением температуры; число дней, через которое семена прорастают, т. е. называемая корешком при температурах в

3,16°

8,36°

12,49°

14,8°

СЕМЕНА:	Проростание семян — количество теплоты, необходимой для проростания в % от веса семян	Проростание семян — количество влаги, необходимой для проростания в % от веса семян	Проростание семян — количество воздуха, необходимого для проростания в % от веса семян	Проростание семян — количество света, необходимого для проростания в % от веса семян	Предельная температура проростания.	Предельная температура проростания.	Ускорение проростания с возмущением температуры; число дней, через которое семена прорастают, т. е. называемая корешком при температурах в	3,16°	8,36°	12,49°	14,8°
Свекловицы	8,0	121	10*	4—8°	—	—	—	22	9	3,75	3,75
Моркови	—	—	—	5°	30°	13°	20°	—	6,75	4,25	3,25
Цикория	—	—	—	—	35°	13°	25°	—	—	—	—
Кресс	—	—	—	—	30°	25°	25°	—	—	—	—
Рыжи	5,5	63	1	4—5°	30°	20°	25°	—	—	9	6,25
Табак	—	—	—	8°	30°	20°	25°	—	—	—	—
Воробьиной сныги	—	—	—	—	40°	13°	25°	—	—	—	—
Кукурузы	6,8	44	4	7—8°	40°	20°	30°	—	11,25	3,25	3
Сорго обыкновенное	—	—	—	—	40°	20°	30°	—	11,5	4,75	4
Сахарного	—	—	—	—	40°	20°	30°	—	25	7,25	6
Конских бобов	4,5	104	3	5—8°	30°	20°	25°	7	6,5	4,75	4,25
Фасоль	2,9	92	5	7—8°	—	20°	30°	—	3	3	2,75
Рис оз.	4,7	51	—	4°	—	—	—	6	2	1	1
Подсолнечника	3,8	57	5	5—6°	35°	13°	25°	—	25	3	2
Пшеницы оз.	5,7	45	2	4°	30°	13°	25°	6	3	2	1,75
Ржи	5,1	57	2	4°	30°	13°	20°	4	2,5	1	1
Ячменя	6,2	48	2	0—4°	30°	13°	20°	6	3	2	1,75
Пшеницы яр.	5,7	45	2	4°	30°	13°	25°	6	4	2	1,75
Ржи	5,1	57	2	4°	30°	13°	20°	4,5	2	1,5	1
Ячменя	8,3	48	2	0—4°	30°	13°	20°	6	3	2	1,75
Овса	5,5	59	2	4°	30°	13°	25°	7	3,75	2,75	2
Просы обыкновенной	8,6	25	4	8°	40°	20°	30°	—	13,25	3,25	3
Гречишной	9,0	46	2	7°	35°	20°	30°	8	4,5	3,5	3
Гороха	7,7	107	—	4—8°	31°	—	—	5	3	1,75	1,75
Чечевицы	1,9	93	—	4°	—	—	—	6	4	2	1,75
Вика	11,5	75	2	4°	30°	13°	20°	6	5	2	2
Чины	—	—	—	—	30°	13°	20°	—	—	—	—
Бараньего коренья	—	—	—	—	30°	13°	20°	—	—	—	—
Лопуха	—	—	—	—	35°	20°	30°	—	—	—	—
Рыжика	5,2	60	1	—	25°	13°	20°	—	—	—	—
Горчицы белой	—	—	—	0—4°	30°	13°	25°	2	1,5	1	0,75
Китайской редьки	6,5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Маис	3,5	91	2	4—7°	30°	13°	20°	10	4,75	2,5	2
Льна	4,7	—	—	1,5—4°	30°	13°	20°	8	4,5	2	2
Конопли	1,7	44	1	4°	40°	25°	35°	3	2	1	1

*) Как исключение между приведенными здесь растениями семена свекловицы прорастают гораздо позже чем насыщенные калийной водой.

Тына	—	—	—	—	30°	13°	20°	—	—	—	—
Укропа	—	—	—	—	30°	13°	20°	—	—	—	—
Боянды	—	—	—	—	—	13°	20°	—	—	—	—
Вайди	—	—	—	—	—	20°	25°	—	—	—	—
Могара	—	—	—	4°	40°	20°	30°	24	7,5	2,75	2
Шпергеля	—	—	—	—	35°	13°	20°	—	—	—	—
Клевера крысваго	6,5	118	—	4°	35°	20°	30°	7,5	3	1,75	1
„ былага	2,7	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ мяскокра- снаго	—	—	—	—	35°	20°	30°	—	—	—	—
Люцерна обыя	3,2	56	—	4°	35°	20°	30°	6	3,75	2,75	2
Эскариета	—	—	—	—	—	—	—	—	7,25	3,5	3
Гипофевки	—	—	—	—	30°	20°	25°	—	—	—	—
Англійскаго рай- граса	—	—	—	—	30°	20°	25°	10	5,5	3,75	3
Французскаго рай- граса	—	—	—	—	—	—	—	9	7,5	4,5	3

Сімена, кромѣ влаги, которую онѣ содержатъ по просушкѣ ихъ на воз-
духѣ (см. ниже), поглощаютъ еще большее или меньшее количество газооб-
разной воды изъ атмосферы насыщенной водяными парами, но, какъ пока-
зываетъ опытъ, этой воды недостаточно для ихъ проростанія, хотя изъ
этого не слѣдуетъ, чтобы газообразная вода, поглощаемая сіменами въ силу
ихъ гигроскопичности, не имѣла вліянія на ихъ проростаніе и не пополняла
собой отчасти того общаго количества воды, котораго требуютъ сімена для
своего проростанія. Сімена, для своего проростанія, требуютъ непрерывно
капельножидкой воды и притомъ для скорого и сильнаго проростанія въ ко-
личествѣ, необходимомъ для полнаго ихъ насыщенія водой; при меньшемъ
же нежели это количество воды они могутъ проростать, но проростаютъ
медленно и слабо. Поглощеніе сіменами газообразной и капельножидкой
воды происходитъ быстрой всего въ первые часы; но затѣмъ оно окончи-
вается: первой черезъ 5, второй же черезъ 1—3 дней; причемъ быстрота по-
глощенія независитъ отъ количества поглощаемой воды. Сімена проростаютъ
тѣмъ скорѣе, чѣмъ скорѣе поглощаются ими вода. Поглощеніе воды уско-
ряется съ возвышеніемъ температуръ и проростаніе начинается обычно-
венно съ окончаніемъ поглощенія капельножидкой воды (у свекловича го-
раздо позже).

Предѣлы температуры возможнаго проростанія сімянъ, особливо у пѣ-
которыхъ растений довольно значительны; гораздо уже ихъ предѣлы наиболѣе
благопріятной для проростанія сімянъ температуры. Температуры
ниже 0° остаются безъ вліянія на развитіе зародыша сімянъ, т. е. не вредятъ
и не способствуютъ ему. Вредятъ же развитію зародыша во влажной
почвѣ: во-первыхъ, температуры между 0° и низшей возможнаго проростанія,
къ тому же пѣ тѣмъ болѣе чѣмъ выше низшая температура возможнаго про-
ростанія; во-вторыхъ, температуры между низшей возможнаго проростанія
и высшей благопріятной для проростанія, если они продолжаютъ болѣе
длгое время, такъ какъ при такихъ условіяхъ загниваютъ сімена и ослаба-
ютъ зародыши; въ-третьихъ, наконецъ, всѣ температуры выше наивысшей
благопріятной для проростанія, такъ какъ они замедляютъ проростаніе.
Полезны развитію зародыша температуры между низшей и высшей благо-
пріятными для проростанія сімянъ температурами; въ этихъ предѣлахъ
температуры тѣмъ болѣе ускоряютъ проростаніе, а слѣдовательно тѣмъ бо-

лѣ полезны ему, чѣмъ они выше, вслѣдствіе того, что съ возвышеніемъ тем-
пературы ускоряются отчасти поглощеніе воды сіменами, отчасти химиче-
скіе процессы, сопровождающіе проростаніе. Наиболѣе благопріятными для
проростанія сімянъ болѣе части нашихъ полевыхъ растений можно счи-
тать температуры между 12° и 15° P.

Относительно количества кислорода, котораго требуютъ различныя сі-
мена для своего проростанія, свѣдѣнія наши весьма органичны. По всей
вѣроятности, это количество зависитъ отъ величины и состава сімянъ и
невелико, какъ объ этомъ можно судить потому, что сімена фасоли и коп-
свихъ бобовъ, для своего проростанія, требуютъ кислорода $\frac{1}{100}$ своего вѣса,
а сімена пшеницы, ячменя и нѣкоторыхъ другихъ и того менѣе.

Скорость проростанія сімянъ, т. е. время, котораго требуютъ
сімена для развитія зародышевыхъ частей, различна у различныхъ
растений въ зависимости отъ свойства сімянъ, различна у одного и
того же растенія въ зависимости отъ совокупнаго вліянія влаги,
теплоты и кислорода воздуха.

Такъ, напр. имѣющіяся наблюденія показываютъ, что при температурѣ
почвы въ 4—6° P. сімена пшеницы и ячменя проросли черезъ 40—45; при
температурѣ почвы въ 7—9° P. сімена гречихи — черезъ 15 — 20, ржи и
ячменя — черезъ 20—25; при температурѣ почвы въ 8—10° P. сімена чече-
вицы — черезъ 15—20, фасоли — черезъ 50—60; при температурѣ почвы въ
10—12° P. сімена горчицы, рѣпы, рѣдьки, люцерны, клевера проросли черезъ
8—10, гречихи и сахарной свекловичи — черезъ 12—15, пшеницы — черезъ
20—25, майса — черезъ 30—35 и фасоли — черезъ 30—40; при температурѣ
почвы въ 14—16° P. сімена гороха, чечевицы, конскихъ бобовъ — черезъ
10—12; при температурѣ почвы въ 16—18° P. сімена майса — черезъ 25—30;
при температурѣ почвы въ 18—20° P. сімена фасоли — черезъ 15—20, и при
температурѣ 23—30° P. сімена пшеницы и ячменя — черезъ 10—12 и майса
черезъ 7—8 дней послѣ посадки ихъ сухими въ землю.

Сімя, поставленное въ благопріятныя условія влажности, теплоты
и пользованія кислородомъ, вбираетъ въ себя влагу — разбухаетъ и,
при содѣйствіи кислорода и теплоты, измѣняетъ записенную для за-
родыша пищу химически и физически; такъ что зародышъ, всасы-
вая ее растворенной и питившей ею, начинаетъ образованіе новыхъ клѣ-
точекъ — увеличивать свою массу. Это послѣднее обнаруживается
прежде всего въ развитіи корневой почки — корешка, который, раз-
рывая размягченную оболочку, выходитъ наружу и начинаетъ весь-
ма скоро брать пищу изъ почвы; говоритъ, сімя проросло. Затѣмъ,
развивается стеблевая почка — перышко, выходитъ стебель съ по-
выми настоящими листьями, которыя начинаютъ принимать и усваивать
газообразную пищу изъ воздуха.

Развившееся такимъ образомъ зародышное растеніе вѣситъ меньше, все-
го 75—80% вѣса сімени, котораго оболочка, частью же, можетъ быть, и
болѣе важныя составныя части разрушаются, переходя въ углекислоту, воду
а иногда и амміакъ, какъ это замѣчено при искусственно продолженномъ
проростаніи сімянъ, богатыхъ содержаніемъ азота, напр. гороха. Молодое
растеніе вѣситъ тѣмъ меньше сравнительно съ вѣсомъ сімени — другими
словами, тѣмъ болѣе разрушается вещества сімени, не поступающія въ молодое
растеніе, чѣмъ продолжительнѣе проростаніе, напр. вслѣдствіе несоответ-

ственно низкой температуры; такъ молодое растение пшеицы, какъ результатъ 51 дневнаго проростанія, имѣло всего 43% всѣхъ сѣмени.

Развитіе корневой почки у односѣменодольныхъ растений, напр. хлѣбныхъ злаковъ, вскорѣ прекращается; и тогда, по выходе корешка, пазъ части между корневой и стеблевой почками, развиваются боковые корни (рис. 209 *), у двусѣменодольныхъ же растений, напр. бобовыхъ, оно продолжается и образуетъ главный корень (рис. 210 *).

Боковые корни изъ первомъ случаѣ и главный корень во второмъ — развиваются далѣе пазъ образующихся на нихъ, всегда случайныхъ почекъ, а пазъ верхней кожицы (эпидермы) — растительной ткани, покрывающей всѣ корни вообще, на болѣе молодыхъ нижнихъ частяхъ корни и его раздѣлений, больше, однако, конца ихъ, образуются большей частью однокѣточные полоски — *мочки* (стр. 121), которыми растение и припнмаетъ просачивающуюся въ нихъ пазъ почвы пищу. У нѣкоторыхъ растений корень (крупна) пазъ особенности та часть его, которая переходитъ въ подземный




Рис. 209.




Рис. 210.

стебель, такъ называемая *корневая шейка* (напр. у клеверныхъ растений), обладаетъ большою способностью производить почки, развивающіяся, послѣ сръзки или отмиранія главнаго стебля, въ корневые *отпрыски*, побѣги, которые иногда образуютъ свои собственные корни.

Стебель, развиваясь далѣе, также развивается образуетъ вѣтви, побѣги или, что болѣе обыкновенно, пазъ *пазушныхъ почекъ*, которые образуются въ пазухѣ листьевъ, пазъ, что рѣже, изъ *случайныхъ*

*) Разрѣзъ овсянаго зародыша; *r* — корешокъ, *n* — первый узелъ, *in* — первое междоузліе; *pv* — первый влагалищный листъ; *f* — второй неразвитый листъ; *ro* — почечная почка (конусъ произрастанія); *st* — сѣменодоль; *av* — первый побочный корень, вышедшій изъ перваго узла (узла 8 разъ).

*) Молодая растеньица рапса. *A* еще не совсѣмъ сбросило сѣмянную оболочку; *t*, *kk* — сѣменодоль; *r* — корешокъ съ мочками. *B* болѣе развитое растеньице; *kk* — сѣменодоль; *r* — развитый корешокъ.

стеблевыхъ почекъ, которые могутъ образоваться на любомъ мѣстѣ стебля. *Побѣг* или *отпрыскъ* развивается пазъ почки, образующейся на стеблѣ или корнѣ. Въ первомъ случаѣ онъ отличается отъ вѣтви тѣмъ, что укореняется, образуетъ особые корни (изъ земли), такъ что рано или поздно можетъ вести самостоятельную, независимую отъ материнскаго растения жизнь; во второмъ — онъ не образуетъ иногда (при развитіи изъ корневой шейки) особыхъ для себя корней, пекореняется. У растений съ клубнями *) (картофель) и корневищами (пырей) побѣги развиваются пазъ пазушныхъ почекъ, сидящихъ въ пазухѣ недоразвитыхъ листьевъ; у клубней, слѣдовательно, пазъ такъ-называемыхъ глазковъ, которые состоятъ изъ нѣсколькихъ почекъ. Эти побѣги укореняются, образуютъ корни изъ случайныхъ корневыхъ почекъ, которые развиваются у ихъ основаній, а у клубневыхъ побѣговъ даже по всей части побѣга, прикрытой землей. Точно также пазъ пазушныхъ почекъ развиваются побѣги у нѣкоторыхъ растений (какъ-то клеверныхъ) на нижней части главнаго стебля, составляющей продолженіе корневой шейки; они развиваются даже прѣжде нежели отмеръ или сръзавъ главный стебель и образуютъ свои собственные корни, укореняются или вѣтви. Изъ случайныхъ стеблевыхъ почекъ развиваются побѣги у злаковыхъ растений (нашихъ хлѣбныхъ злаковъ) на узлѣ, лежащемъ непосредственно подъ и надъ поверхностію или у поверхности почвы (см. рис. 211 **), слѣдовательно находящемся въ соприкосновеніи съ почвой. При благоприятныхъ условіяхъ, эти первичные побѣги, въ свою очередь, могутъ изъ такихъ же почекъ образовать у своего основанія новые, вторичные побѣги, вторичные же — третичные, а эти послѣдніе даже побѣги четвертаго порядка; такъ что образуется, наконецъ, кустъ побѣговъ четвертаго порядка; такъ что образуется, наконецъ, кустъ (рис. 211). Образованиемъ злаковыми растениями такихъ кустовъ извѣстно подъ именемъ *кущенія*. Всѣ эти побѣги укореняются — образуютъ у своего основанія корни, развивающіеся изъ случайныхъ почекъ на узлѣ, соприкасающемся съ землей. Этими, такъ-называемыми *вершинными корнями* (*d* — рис. 211) припнмаетъ пищу злаковое растение, такъ какъ ихъ боковые зародышные корни (*b* — рис. 211) весьма скоро отмираютъ.

*) Клубень, корневище и луковича суть подземные части стебля; у клубня и луковицы, въ особенности же у лука, преимущественно развита стеблевая часть, но неразвита незеленые листья, которые у клубня имѣютъ видъ рубцовъ или складокъ, прикрывающихъ отчасти глазки — углубленія, въ которыхъ находится почка; у корневища же — видъ чешуекъ. У луковичи мало развита стеблевая часть, но за то преимущественно развита незеленые листья.

**) Ржаное растеніе, котораго сѣмя *a* — прикрито на глубину 2½ дюйм.; *b* — зародышные корни; *c* — стеблевое междоузліе въ землѣ; *d* — вершинные корни, выходящіе изъ узла лежащаго непосредственно у поверхности почвы.




Рис. 211.

Главный стебель и вѣтви (надземная часть) покрываются листьями, большей частью зелеными, которые принимают газобразную пищу из воздуха и перерабатывают ее вместе с пищей, поступающей через корни из почвы, в органические вещества (стр. 120), необходимые для увеличения массы растений, при помощи влаги, света и теплоты. Главный стебель и вѣтви образуют, наконец, почки, из которых развиваются цвѣты и плоды с семенами.

Несколько различны от природы растения, но даже одно и то же растение, под вліяніемъ вѣдущихъ условий (почвы, воздуха, влаги, теплоты, света и культурныхъ приемовъ) своего произрастанія, представляет большія или меньшія различія въ способѣ развитія: не только въ числѣ, величинѣ и формѣ своихъ частей, но и въ анатомическомъ строеніи и химическомъ составѣ ихъ. Такъ, опытъ показываетъ, что рыхлость почвы, богатство ея питательными промежуточными и, вслѣдствіе этого, большая доступность ея для воздуха (кислорода) или провѣтриваемость способствуетъ особенно развитію корней и подземныхъ частей стебля (клубней, корневищъ, луковичъ), вслѣдствіе уменьшенія механическихъ препятствій къ ихъ развитію и усиленія доступа кислорода въ почву и перехода питательныхъ веществъ въ почву въ доступное для растений

состояніе. Большая глубина разрыхленія почвы увеличиваетъ корневую массу въ глубь, удлиняетъ корни. Плодородіе почвы вообще увеличиваетъ массу растенія во всѣхъ ея частяхъ. Обиліе въ почвѣ легко доступнаго для растеній азота способствуетъ особенно развитію стебля — удлиненію или развѣтвленію (кущенію) его и, можетъ быть, накопленію масла въ сѣменахъ масличныхъ растеній. Обиліе азота, при достаткѣ сѣры (сѣрной кислоты), которая вместе съ азотомъ входитъ въ составъ бѣлковыхъ веществъ, вызываетъ обильное образованіе бѣлковыхъ веществъ; но такъ какъ это послѣднее происходитъ въ листьяхъ, преимущественно пока они молоды, а развитіе листьевъ нуждается въ извѣсти, которая нейтрализуетъ органическія кислоты,

развивающіяся при образованіи клетчатки главнаго строительнаго матеріала растеній, то обильное образованіе какъ бѣлковыхъ веществъ, такъ и листьевъ будетъ обуславливаться обиліемъ въ почвѣ извѣсти о бока съ азотомъ и сѣрой. Впрочемъ, нейтрализація органическихъ кислотъ извѣсткою не всегда выгодна при желаніи вызвать развитіе листьевъ; такъ табачные листья, отъ накопленія въ нихъ органическо-кислыхъ известковыхъ солей, пріобрѣтаютъ дурную сгораемость и потому требуютъ нейтрализація кислотъ помощью кали, котораго органическо-кислыя соли улучшаютъ сгораемость листьевъ. Фосфорная кислота и кали способствуютъ особенно передвиженію бѣлковыхъ веществъ и, вслѣдствіе этого, образованію корней, подземныхъ частей стебля и сѣмянъ, такъ какъ эти послѣднія могутъ образоваться и развиваться лишь при перемѣщеніи въ мѣста ихъ образованія бѣлковыхъ веществъ изъ листьевъ — мѣста образованія бѣлковыхъ веществъ. Углегидраты (крахмалъ, образующійся въ листьяхъ, преимущественно когда они постарше, и сахаръ и клетчатка, образующіеся уже изъ крахмала), образуются въ растеніи въ большемъ или меньшемъ количествѣ въ зависимости отъ большаго или меньшаго развитія тѣхъ частей, въ которыхъ они накапливаются (слѣдовательно крахмалъ въ зависимости отъ развитія клубней, сѣмянъ; сахаръ — корней), и отъ нахождения въ почвѣ, какъ кажется, въ большемъ или меньшемъ количествѣ кали и углекислоты. Содержаніе въ почвѣ большаго количества хлора, преимущественно въ видѣ поваренной соли, повидимому, содѣйствуетъ развитію: листьевъ у однихъ (напр. свекловицы), сѣмянъ у другихъ (напр. у гречихи) и клубней у третьихъ (напр. у льна) растеній; но вредитъ образованію крахмала и сахара и качеству табачныхъ листьевъ и корней сахарной свекловицы, ослабляя образованіе первыхъ, ухудшая сгораемость вторыхъ и накопленіе въ третьихъ соли, уменьшающія выходъ кристаллическаго сахара.

Обильное пользованіе воздухомъ вызываетъ болѣе обильное развитіе растительной массы вообще; такъ какъ содержащаяся въ воздухѣ углекислота доставляетъ растеніямъ углеродъ, необходимый для образованія всѣхъ вообще органическихъ веществъ, въ особенности же богатыхъ углеродомъ углегидратовъ; содержащійся въ воздухѣ кислородъ необходимъ въ особенности для развитія корней и подземныхъ частей стебля, а находящійся въ воздухѣ въ доступной для растеній формѣ (аммиака и азотной кислоты) азотъ можетъ содѣйствовать образованію бѣлковыхъ веществъ въ такихъ особенно растеніяхъ, которыя (бобовыя), могутъ быть, имѣютъ способность принимать азотъ изъ воздуха листьями.

Обиліе влаги въ почвѣ и воздухѣ, въ предѣлахъ безвреднаго для растеній количества ея, во первыхъ способствуетъ развитію корней, стебля (удлиненію или развѣтвленію — кущенію) и въ особенности листьевъ, такъ какъ съ увеличеніемъ количества послѣднихъ усиливается испареніе растеніемъ воды, и ослабляетъ и замедляетъ образованіе цвѣтовыхъ, въ особенности плодовыхъ частей растенія; во вторыхъ, замедляетъ одеревенѣніе стѣловокъ клеточекъ и вообще созрѣваніе растеній.

Теплота ускоряетъ развитіе растеній вообще. Усиливая испареніе воды растеніями, она вызываетъ тѣже измѣненія въ развитіи растенія, что и недостатокъ влаги, т. е. ослабляетъ развитіе корней, стебля и листьевъ и ускоряетъ образованіе цвѣтовъ и плодовъ, одеревенѣніе растеній и созрѣваніе ихъ.

Свѣтъ необходимъ для усвоенія растеніемъ питательныхъ веществъ; а потому, обильное пользованіе имъ влечетъ за собой обильное образованіе органическихъ веществъ (въ особенности углегидратовъ), а слѣдовательно и развитіе частей растенія: развитіе стебля (кущеніе), въ особенности образованіе листьевъ, какъ непосредственныхъ приемниковъ солнечныхъ лучей, цвѣтовыхъ и плодовыхъ частей сѣмянъ. Обильное пользованіе свѣ-

Различныя сѣмена теряютъ способность проростанія различно скоро, чемъ большее или меньшее число лѣтъ послѣ ихъ сбора, въ зависимости, по-видимому, настолько отъ свойства оболочки и резервныхъ веществъ, сколько отъ зародка, который теряетъ свою жизнеспособность различно скоро въ различныхъ сѣменахъ. Опытъ показываетъ, что сѣмена богатые содержаниемъ жирнаго масла и азотистыхъ веществъ, хотя не безъ исключения (сѣмена льна), теряютъ способность проростанія скорѣе мучнистыхъ сѣмянъ. Но продолжительность времени, въ теченіи котораго сѣмена сохраняютъ способность проростанія, различна не только у различныхъ сѣмянъ, но даже у сѣмянъ одного и того же растенія, смотря по состоянію зрѣлости, въ которомъ собраны сѣмена, по содержанию воды въ сѣменахъ, ссыпавшихся на сохраненіе и по мѣсту сохраненія. Сѣмена не вполне зрѣлыя, сѣмена, ссыпавшіяся для сохраненія съ большимъ содержаниемъ влаги, слѣдовательно дозрѣвшія и собиравшіяся въ влажную погоду и, наконецъ, сѣмена сохраняющіяся въ сырыхъ и теплыхъ мѣстахъ, теряютъ способность проростанія скорѣе, чѣмъ сѣмена вполне дозрѣвшія, сѣмена, ссыпавшіяся на сохраненіе съ меньшимъ содержаниемъ воды и, наконецъ, сѣмена, сохраняющіяся въ сухихъ и прохладныхъ мѣстахъ. Неполная зрѣлость сѣмянъ, содержание въ нихъ большого количества воды и значительная влажность и теплота мѣста ихъ сохраненія ускоряютъ тѣ процессы окисленія и другія измѣненія въ веществахъ сѣмянъ, которые происходятъ въ этихъ послѣднихъ вообще во время ихъ покоя; ставятъ сѣмена въ условія неблагоприятныя для ихъ проростанія и для развитія паразитныхъ грибовъ и процессовъ гниенія. Какъ губительно дѣйствуетъ на сѣмена теплота въ сочетаніи съ влажностью, убѣждаютъ насъ слѣдующія опыты: данныя между тѣмъ какъ въ сухой атмосферѣ сѣмена (хлѣбъ, гороха, бобовъ) въ просушенномъ на воздухѣ состояніи выдерживаютъ въ теченіи нѣсколькихъ часовъ температуру 60° и даже 80° P. безъ потери способности проростанія, сѣмена хлѣбныхъ злаковъ и бобовыхъ въ томъ же состояніи теряютъ способность проростанія: во влажной атмосферѣ при температурѣ 60° P. уже въ теченіи 15 минутъ все; при температурѣ же 48° P., въ теченіи того же времени до половины. Въ сыромъ нескѣ при постоянной температурѣ 36°—40° P., а въ водѣ даже при постоянной же температурѣ 28° P. теряютъ способность проростанія большая часть хлѣбныхъ сѣмянъ, оставшаяся въ этихъ условіяхъ нѣсколько болѣе продолжительное время. Поэтому приводимыя нѣздѣ за сплѣ числа лѣтъ, въ теченіи которыхъ сѣмена сохраняютъ свою способность проростанія, могутъ считаться лишь приблизительными; и, хотя не подлежитъ никакому сомнѣнію, что, при извѣстныхъ способахъ сохраненія, сѣмена многихъ изъ приводимыхъ здѣсь растеній могутъ сохранить способность проростанія гораздо болѣе показаннаго, все же для практическаго руководства, эти числа скорѣе могутъ быть уменьшены, чѣмъ увеличены. И дѣйствительно хозяева, большей частью, засѣваютъ поля сѣянками или годовальными сѣменами, допуская только въ рѣдкихъ случаяхъ употребленіе для посѣва болѣе старыхъ сѣмянъ. Такъ, употребляютъ болѣе чѣмъ годовалыя сѣмена шведицы, потому что эти послѣднія страдаютъ въ этомъ случаѣ меньше отъ голонии, которой споры, какъ показываютъ наблюденія, теряютъ способность проростанія по истеченіи двухъ лѣтъ. Двугодовалыя сѣмена гороха, по наблюденію нѣкоторыхъ, даютъ болѣе плодовой завязи, что можетъ происходить отъ измѣненія въ сѣменахъ съ теченіемъ времени относительного содержанія питательныхъ для зародка веществъ въ пользу углегидратовъ, такъ какъ азотистыя вещества подвергаются легче измѣненіямъ чѣмъ такіа углегидраты какъ крахмалъ. Впрочемъ, кромѣ этихъ причинъ на предпочтеніе нѣсколько болѣе старыхъ сѣмянъ сѣянкамъ могутъ имѣть вліяніе еще двѣ причины: во-первыхъ различное качество сѣмянъ въ зависимости отъ состоянія погоды — старія сѣмена могутъ развиваться при лучшихъ условіяхъ

погоды, чѣмъ сѣянки и потому могутъ быть лучше этихъ послѣднихъ. Во вторыхъ, старія сѣмена, вслѣдствіе утраты способности проростанія сѣменами менѣе развитыми и сѣменами сорныхъ растеній, могутъ быть выровнены и чище сѣянки (см. ниже).

Теряютъ способность проростанія: *черезъ 1 годъ*: клубни картофеля и земляной груши и сѣмена: рыжика, колынды, сафлора, черны и левонника; *черезъ 2 года*: пастернака, табака, вороньей шипки, рапса, конскихъ бобовъ, фасоли, пшеницы, полбы, эммора, однозеряныи, ржи, ячменя, овса, проса, гречи, чечевицы, люпина, сурьницы, мака, тмина, конопли, шипергеля, клеверовъ: краснаго, бѣлаго и мясо краснаго — илкарпата, и нѣкоторыхъ злаковыхъ травъ (овсяницы); *черезъ 3 года*: сѣмена моркови, рѣпы, майса, рапса, пшеницы, колбы, эммора, однозеряныи, ржи, ячменя, овса, гречи, вики, люпина, сурьницы, мака, аниса, укропа, тмина, конопли, вайды, люцерны (обыкновенной и хмѣлевидной), эспарцета и многихъ злаковыхъ травъ (бухарника, полевицы); *черезъ 4 года*: сѣмена свеклы, моркови, капусты, майса, конскихъ бобовъ, фасоли, пшеницы, ржи, гороха, вики, конопли, льна, вайды, птицепожжи, люцерны (обыкновенной и пестаной), эспарцета и многихъ злаковыхъ травъ (бухарника, полевицы); *черезъ 5 лѣтъ*: сѣмена брюквы, капусты, табака и гороха; *черезъ 6 лѣтъ*: сѣмена цикорія и горчицы; *черезъ 8 лѣтъ*: сѣмена льна и *черезъ 9 лѣтъ*: сѣмена цикорія.

Масса сѣмянъ имѣетъ большое значеніе, какъ моментъ, опредѣляющій качество сѣмянъ, потому что, какъ показываютъ прямыя опыты надъ сѣменами пшеницы, гороха, конскихъ бобовъ, льна и сурьницы, большія сѣмена т. е. большія величины, а слѣдовательно и большаго вѣса, сравнительно съ малыми сѣменами, имѣютъ болѣе запасы питательныхъ веществъ и, конечно, нуждаются развитію зародка, такъ какъ этотъ послѣдній развивается раньше запаса. Далѣе, большія сѣмена, хотя проростаютъ медленнѣе малыхъ, потому что требуютъ болѣе времени для того, чтобы набрать потребное для ихъ проростанія количество воды, тѣмъ не менѣе при одинаковыхъ условіяхъ, развиваютъ скорѣе и болѣе сильное, чѣмъ малыя сѣмена, зародышное растеніе, съ болѣе длиннымъ стеблемъ, съ болѣе массою листьевъ и корней, въ томъ же болѣе сильныхъ корней, которые легче преодолеваютъ механическія сопротивленія почвы и скорѣе углубляются въ почву; вслѣдствіе чего зародышное растеніе изъ большаго сѣмени противостоитъ легче вреднымъ вліяніямъ жаровъ и засухъ, чѣмъ зародышное растеніе изъ малаго сѣмени. Наконецъ, большія сѣмена, сравнительно съ малыми, производятъ, при одинаковыхъ условіяхъ, болѣе растительную массу, даютъ болѣе урожанъ, какъ зерномъ, такъ мѣлкой и соломой. Что такая большая, сравнительно съ малыми сѣменами, производительность большихъ сѣмянъ обуславливается почти исключительно большимъ запасомъ въ нихъ питательныхъ веществъ, обеспечивающихъ развитію зародышнаго растенія, доказывается тѣмъ, что если искусственной обрѣзкой большихъ сѣмянъ уменьшить въ нихъ запасы питательныхъ веществъ до размѣровъ его въ малыхъ сѣменахъ, то производительность ихъ дѣлается равной производительности послѣднихъ. Поэтому же самому механическое поврежденіе сѣмени, каковъ случается иначе при молотбѣ, вредно для сѣмени не только въ томъ случаѣ, если имъ повреждается прямо зародышъ, но даже и въ томъ случаѣ, если имъ повреждаются, уменьшаясь запасы сѣмени. Механическое поврежденіе сѣмени, кромѣ того, можетъ быть вредно еще въ томъ отношеніи, что облегчаетъ доступъ внутрь сѣмени различнымъ вреднымъ вліяніямъ (см. ниже).

О породности, зрѣлости позрѣст и массѣ сѣмянъ можно отчасти судить по нѣкоторымъ внѣшнимъ признакамъ, какъ-то: формѣ, цвѣту, блеску и запаху сѣмянъ, такъ какъ всякое отклоненіе

сѣмянъ отъ свойственныхъ каждому сорту ихъ формы, цвѣта, блеска и запаха указываетъ на ненадлежащее развитіе ихъ или поврежденіе потомъ уже гніеніемъ, болѣзнію или старостію.

Такъ, сѣмена, напр., сортовъ овса картофеля и Голландскаго различаются между собой цвѣтомъ сѣмянной бороздки, которая у первого, блѣдо-у втораго краснаго цвѣта. Известный блескъ характеризуетъ сѣмена различныхъ видовъ клевера въ отличіе отъ матовыхъ сѣмянъ различныхъ видовъ люцерны и донника. Щуплая сѣмена, хотя и прорастаютъ, все же, вслѣдствіе недостаточнаго своего развитія, производятъ слабыя растенія, которые трудно противостоятъ вреднымъ влияніямъ. Сѣмена, преждевременно проросшія при уборкѣ, точно также не годятся для посѣва. Грязно-желтый цвѣтъ пшеничныхъ сѣмянъ, вмѣсто восково-желтаго, или однообразно желтовато-зеленого цвѣта клеверныхъ сѣмянъ, вмѣсто фиолетовой окраски сѣмянъ отъ основанія сѣменодолей, или, наоборотъ, желтовато-бѣлый, отличающій въ зеленыхъ сѣменахъ, копотьныхъ сѣмянъ, вмѣсто сѣровато-зеленаго, свидѣлствуютъ о дурномъ сохраненіи сѣмянъ, дѣлающемъ ихъ менѣе пригодными для посѣва. Отсутствие блеска у липкихъ сѣмянъ указываетъ на недостаточную зрѣлость ихъ. Залхавый запахъ сѣмянъ, вмѣсто свойственнаго имъ запаха, происходящій отъ плѣневого грибка (*Penicillium ergusaeum*), указываетъ на поврежденіе сѣмянъ вслѣдствіе дурнаго сохраненія; или, запахъ гнилыхъ яицъ, или живой рыбы у сѣмянъ пшеницы свидѣлствуетъ о поврежденіи ихъ мокрой головней.

Но названные внѣшніе признаки не всегда уловимы для нашихъ чувствъ, да и не всегда надежны. Не говори уже о томъ, что сѣмена подвергаются поддѣлкѣ (фальсификаціи), которая можетъ придать имъ падежащій цвѣтъ и блескъ, (напр. послѣдній обработкой сѣмянъ небольшимъ количествомъ жирнаго масла), которыхъ они въ дѣйствительности не имѣютъ, вышеупомянутые признаки не всегда отвѣчаютъ известнымъ качествамъ сѣмянъ. Такъ, напр. внѣшняя полнота сѣмянъ съ твердой оболочкой (гречихи) не всегда отвѣчаетъ дѣйствительной полнотѣ сѣмянъ, которыя, при внѣшней полнотѣ и твердости оболочки, могутъ быть внутри пустыми, неспособными къ произведенію растенія. А потому, кромѣ наружнаго осмотра (экстерьера) сѣмянъ, полезнаго даже при хорошемъ знакомствѣ съ сѣменами и известномъ напѣтѣ глаза для оцѣнки сѣмянъ въ отношеніи ихъ происхожденія и въ отношеніи ихъ зрѣлости и возраста, насколько отъ этихъ послѣднихъ зависитъ сила развитія зародышнаго растенія, необходимы еще прямая, положительная, достовѣрная свѣдѣнія; для оцѣнки же ихъ въ отношеніи зрѣлости и возраста сѣмянъ насколько они влияют на всхожесть сѣмянъ и въ отношеніи малыхъ ихъ необходимы еще другіе приемы изслѣдованія сѣмянъ.

Всхожесть сѣмянъ опредѣляется проращиваніемъ ихъ или въ особыхъ приборахъ, или между двумя кусками дерна, войлока, холста, пропускной бумаги, которая поддерживается въ влажномъ состояніи и помѣщается въ мѣстѣ съ постоянной, достаточной для скорого прорастанія, температурой (15° Р.). Изъ растительныхъ приборовъ хороши *проскаекая растительная пластинка* и, въ особенности, приборъ *Ноббе*. Первый представляетъ простую,

довольно толстую, пористую глиняную пластинку съ многими слопными углубленіями на одной сторонѣ ея, въ которыхъ кладутся сѣмена, между тѣмъ какъ пластинка другой стороной приводится въ соприкосновеніе съ водою въ какомъ либо сосудѣ. Вода, постоянно смачивая пластинку, проникаетъ черезъ ея поры въ сѣмена. Приборъ Ноббе (рис. 212*), точно также изъ пористой, обожженной глины, состоитъ изъ круглаго углубленія для помѣщенія намоченныхъ сѣмянъ, окруженнаго желобкомъ съ отвѣсными стѣнками, въ который заливаются вода (рис. 213**). Во время проращиванія, приборъ покрывается крышкой (рис. 214) изъ такой же пористой глины, но покрывается ею слегка, для того чтобы образующаяся при проростаніи углекислота, могла свободно удалиться.




Рис. 212.



Рис. 213.




Рис. 214.

Въ отношеніи способности сѣмянъ производить растенія важно не только количество сѣмянной массы, которое опредѣляется *абсолютнымъ вѣсомъ* и *объемомъ* сѣмени, но и качество этой массы, падающей въ нѣкоторомъ соотношеніи съ количествомъ.

Абсолютный вѣсъ сѣмени опредѣляется взвѣшиваніемъ не отдѣльныхъ зеренъ, что было бы нѣсколько затруднительно, но большаго числа зеренъ сразу; напр. 100, 500, 1000, смотря по величинѣ зеренъ; при этомъ для опредѣленія предѣльныхъ величинъ (наибольшаго и наименьшаго) вѣса избираются изъ одной и той же партіи сѣмянъ: для полученія наибольшаго — наибольшія, а для полученія наименьшаго вѣса — наименьшія зерна, такъ какъ безъ большой погрѣшности можно допустить, что большія сѣмена въ какъ безъ большой погрѣшности можно допустить, что большія сѣмена въ то же время самыя тяжелѣе, мелкія же — самыя легкія; хотя случается особенно у сѣмянъ различныхъ сортовъ, что меньшей величиной сѣмена легче сѣмянъ большаго величинны. Для опредѣленія абсолютнаго вѣса сѣмянъ берутся сѣмена въ просушенномъ на воздухѣ состояніи, такъ какъ вліяніе на абсолютный вѣсъ сѣмянъ тѣхъ небольшихъ различій въ содержаніи воды,

*) Въ углубленіи, находящемся въ четырехъ углахъ прибора, помѣщаются маленькіе пузырьки съ жидкимъ каліемъ для поглощенія углекислоты, стоятъ около 1 руб. (3 марки) въ Берлинѣ у Нигандта, Гемпеля и Парей.

**) Тотъ же приборъ въ поперечномъ разрѣзѣ.

которые могутъ быть у сѣмянъ въ такомъ состояніи, исчезающе мало въ сравненіи съ вліяніемъ въ этомъ отношеніи индивидуальных различій у сѣмянъ не только одного и того же урожая, но даже одного и того же колоса, одной и той же метелки и т. д.; напр. у сѣмянъ изъ одного колоса: ячменя абсолютный вѣсъ разнится отъ 32,5 до 103,5 пшеницы — отъ 15,8 до 34,5 миллиграммъ, не принимая въ расчетъ совершенно не развившихся.

Большая часть абсолютнаго вѣса сѣмени приходится на долю сѣменнаго ядра (зародыша и запаса питательныхъ веществъ) и лишь не большая часть его (у овса отъ 22,8 до 33,7%, у гречихи около 21,8%, у фасоли всего около 11%) — на долю сѣменной оболочки. Толщина сѣменной оболочки, къ тому же, мало измѣняется, по крайней мѣрѣ у такихъ сѣмянъ какъ сѣмена пшеницы; да и участіе, которое она принимаетъ въ проростаніи сѣмени весьма незначительно, такъ какъ во время проростанія почти не потребляется ея сухаго вещества. Поэтому, различія въ вѣсѣ и химическомъ составѣ различно вѣсскихъ сѣмянъ зависятъ отъ различій въ этихъ отношеніяхъ сѣмяннаго ядра. Тяжелыя зерна относительно богаче содержаніемъ безазотистыхъ веществъ (углеводами, крахмаломъ, сахаромъ и т. д.), следовательно главными резервными веществами; легкія же зерна — азотомъ, древесиной и соевыми составными частями; хотя значительно различается химическій составъ различно вѣсскихъ зеренъ (по крайней мѣрѣ у овса, озимыхъ ржи и пшеницы) одного и того же урожая лишь содержаніемъ древесины, которой напр. въ зернахъ овса 28 1/2 фунт. въ четверикѣ было на 27% больше чѣмъ въ зернахъ овса 35 фунт. въ четверикѣ. Сѣмена, незрѣлыя или не вполне развитыя легче дозрѣвшихъ и вполне развитыхъ; такъ, сухое вещество 100 зеренъ пшеницы, убранной въ состояніи молочной зрѣлости, весило 2,86, убранной же въ состояніи полной зрѣлости — 4,22 граммъ; или изъ одной пробы сѣмянъ, приближенной въ одинаковой степени зрѣлости, 100 зеренъ ржи вѣсили отъ 1,29 до 2,58 (причемъ изъ 100 болѣе легкихъ было всего 42 всхожихъ), 100 зеренъ пшеницы — отъ 1,32 до 3,20 и 100 зеренъ овса — отъ 2,79 до 3,05 граммъ; въ другомъ случаѣ 100 зеренъ изъ одной пробы продажной ржи вѣсили отъ 0,65 до 2,05 граммъ. Наконецъ, относительно близкородства сѣмянъ и принадлежности ихъ извѣстному сорту, абсолютный вѣсъ не даетъ указаній; хотя, во первыхъ, весьма вѣроятно, что большія сѣмена (следствие ли недостаточнаго питанія или отпагива питательнаго вещества паразитами) всегда легче здоровыхъ, причемъ не слѣдуетъ, однако, упускать изъ виду того, что болѣе зерно можетъ во время сохраненія его вобрать въ себя много воды и тѣмъ увеличить свой вѣсъ. Во вторыхъ, абсолютный вѣсъ сѣмянъ различныхъ сортовъ можетъ быть весьма различенъ, но эти различія не настолько опредѣлены, чтобы могли служить для различенія сортовъ, онъ нѣсколько менѣе возможен различія въ вѣсѣ сѣмянъ одного и того же сорта.

Что касается объема сѣмянъ, то мы должны различать плотный объемъ или объемъ сѣмянъ за исключеніемъ промежутковъ, отъ рыхлаго объема (мѣры) *) или объема, который занимаютъ сѣмена съ промежутками, образующимися въ массѣ сыпавшихся выбѣ сѣмянъ. Плотный объемъ опредѣляется количествомъ вытѣсненной сѣменами воды; рыхлый же — изъ числа сѣмянъ, заключающихся въ извѣстной единицѣ объема. Рыхлый объемъ сѣмянъ болѣе плотнаго, насколько же онъ болѣе послѣдняго, зависитъ отъ формы, величины, поверхности и случайнаго относительнаго положенія сѣмянъ; такъ что одно и тоже число однихъ и тѣхъ же зеренъ можетъ занимать различныя объемы, или въ одномъ и томъ же объемѣ можетъ заклю-

*) Мы употребляемъ термины: плотный и рыхлый объемы для удобства различенія двухъ видовъ объема, не претендуя на научную вѣрность ихъ.

чатся различное число зеренъ одной и той же величины и формы и съ одинаковой поверхностью. Оба объема находятся подъ вліяніемъ содержанія воды въ сѣменахъ, особенно обусловливаемаго намочкой или подмочкой зеренъ; съ увеличеніемъ этого послѣдняго увеличиваются объемы. Такъ напр. у

	Пшеницы.	Ржи.	Ячменя.	Овса.
Мѣра увеличивается на %	15—25—25,5;	13—25—33;	10—18—22;	10—22—25
Съ припятиемъ воды въ %	5—10—15;	5—10—15;	5—10—15;	5—10—15

Съ выдѣленіемъ же воды сѣменамъ, объемъ ихъ уменьшается; такъ, напр., при просушкѣ на воздухѣ 100 зеренъ пшеницы, убранной въ состояніи молочной зрѣлости, уменьшили плотный объемъ съ 5,307 до 2,405; убранной же въ состояніи желтой зрѣлости, съ 4,283 до 3,428 куб. сантиметр. Сѣмена, намоченныя и увеличившія, вследствие этого, свой объемъ, по просушкѣ ихъ, не прививаютъ прежняго объема; такъ что 97 гарпцевъ ржи, намоченныя водой и затѣмъ сполна просушенные, даютъ сто гарпцевъ сухой ржи.

Чѣмъ болѣе плотный или рыхлый объемъ сѣмянъ, тѣмъ, конечно, крупнѣе сѣмена; крупныя же сѣмена болѣею частью болѣе тяжелыя сѣмена, болѣе же тяжелыя сѣмена имѣютъ извѣстныя характерныя черты въ химическомъ составѣ (см. выше). Кроме того, болѣе крупныя сѣмена оказываются болѣе выравненными, какъ въ отношеніи вѣса такъ и величины. Такъ, напр., при раздѣленіи выснаго сорта сѣмянъ обрабатывавшихся въ торговлѣ помощію сортировки, были получены два сорта сѣмянъ: болѣе крупныя и болѣе мелкія, при чемъ оказалось, что первыя сѣмена были тяжелѣе послѣднихъ у сурфиды на 12%, у льна на 18%, у пшеницы на 47%, у конскихъ бобовъ на 51% и у гороха на 137%; что различія между наибольшими и наименьшими вѣсами (I) и наибольшимъ и наименьшимъ объемами (II) были въ %.

	Сурфиды.		Льна.		Пшеницы.		Конскихъ бобовъ.		Гороха.	
	I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.
У крупныхъ сѣмянъ. . .	0,8	1,3	1,3	1,5	2,9	3,0	2,4	3,2	5,4	5,8
У мелкихъ сѣмянъ. . .	1,5	1,6	1,3	4,2	9,0	4,5	10,9	11,2	17,0	22,4

Изъ рассмотрѣнія объема сѣмянъ и его связи съ другими свойствами сѣмянъ, слѣдуетъ, что онъ, въ особенности же рыхлый объемъ, представляетъ весьма слабый моментъ для оцѣнки качества сѣмянъ; такъ какъ величина рыхлаго объема сѣмянъ можетъ измѣняться, смотря по болѣе или менѣе содержанию воды и смотря потому, какъ будутъ насыпаны сѣмена — какое относительное положеніе будутъ имѣть они. Лучшее рыхлаго въ этомъ отношеніи плотный объемъ, который, если и измѣняется въ зависимости отъ содержанія воды, то все же на него не имѣютъ вліянія случайности относительнаго положенія зеренъ. Объемъ, однако, какъ моментъ для оцѣнки качества сѣмянъ, приобретаетъ значеніе въ соединеніи съ вѣсомъ; иначе болѣе точная оцѣнка качества сѣмянъ возможна на основаніи вѣса, единицы плотнаго и рыхлаго объемовъ сѣмянъ, т. е. удѣльнаго вѣса ихъ и вѣса единицы мѣры ихъ (напр. четверика) или, такъ называемаго, объема овса.

Примѣненіе удѣльнаго вѣса сѣмянъ для оцѣнки ихъ качества затрудняется незначительнымъ вполнѣ удовлетворительнаго способа для опредѣленія удѣльнаго вѣса — плотности сѣмянъ, въ особенности предѣльныхъ величинъ ея, наименьшей и наибольшей, между которыми колеблется плотность сѣмянъ одного и того же сорта. Этому послѣдному можно было бы достигнуть

погруженіемъ сѣмянъ въ растворъ, котораго плотность увеличивалась бы постепенно на определенную величину; напр., въ воду, къ которой прибавлялся бы растворъ поваренной соли и чилийской селитры съ плотностью 1,35, и затѣмъ собираемъ сѣмянъ, всплывающихъ на поверхность раствора при каждомъ новомъ измѣненіи плотности. Такое изслѣдованіе сѣмянъ называется, что различія въ плотности сѣмянъ, довольно одинаковыхъ по виду, могутъ быть весьма значительны (напр., у пшеницы отъ 1,195 до 1,325; у ржи отъ 1,235 до 1,325; у овса отъ 1,0 до 1,04; у ячменя отъ 1,115 до 1,3; у манса отъ 1,235 до 1,335; у проса отъ 1,02 до 1,245; у люпина отъ 1,09 до 1,21; у бобовъ отъ 1,05 до 1,29; у раиса отъ 1,0 до 1,185 и у льна отъ 1,02 до 1,175). Но этотъ способъ не даетъ достаточно точныхъ результатовъ, потому что, при значительной продолжительности операціи, съ одной стороны измѣняется плотность зерна, вслѣдствіе того, что вода проникаетъ въ зерна и извлекаетъ изъ нихъ растворимыя вещества; съ другой—измѣняется плотность жидкости вслѣдствіе растворенія въ ней растворимыхъ веществъ зеренъ. Кроме того величина зеренъ и свойство ихъ поверхности имѣютъ также весьма большое, хотя ближе пока еще неопредѣлимое влияние на поднаты и опусканіе сѣмянъ въ жидкость. Вредное влияние воды и водныхъ растворовъ на опредѣленіе удѣльнаго вѣса устранимо замѣной ихъ керосиномъ. Но этимъ все же не достигается возможность опредѣленія предѣльныхъ величинъ, потому что опредѣленіе удѣльнаго вѣса отдѣльныхъ сѣмянъ невозможно, такъ какъ такое опредѣленіе, неговоря уже о чрезвычайномъ количествѣ труда, котораго оно потребовало бы, представляло бы значительныя ошибки, неизбежныя при опредѣленіи плотности тѣхъ такого малаго вѣса какъ отдѣльное сѣмя. Объ отборѣ же по виду сѣмянъ большей или меньшей плотности, конечно, не можетъ быть и рѣчи. Поэтому, пока, мы довольствуемся средними числами изъ нѣсколькихъ опредѣлений плотности нѣсколькихъ порцій сѣмянъ одной и той же пробы.

На плотность сѣмянъ имѣетъ большое влияние физическое содержаніе въ сѣменахъ воздуха (газовъ) и воды; такъ, напр. плотность сырой пшеницы съ 27,08% воды оказалась равной 1,282, тогда какъ просушенной на воздухѣ съ 9,42%—1,38 и совершенно свободной отъ воды—1,4085. А потому, опредѣленіе и показаніе плотности сѣмянъ должно сопровождаться опредѣленіемъ и показаніемъ содержанія въ сѣменахъ воды или, по крайней мѣрѣ, тѣхъ условій, изъ которыхъ находилась сѣмена болѣе продолжительное время передъ опредѣленіемъ ихъ плотности. Плотность сѣмянъ не даетъ возможности сколько нибудь точно судить о химическомъ составѣ зерна, какъ это дѣлается понятнымъ, если принять въ соображеніе, съ одной стороны большое число входящихъ въ составъ зерна веществъ, съ другой—незначительное различіе плотности въ особенности тѣхъ изъ нихъ, которыя входятъ въ составъ зерна въ наибольшемъ количествѣ; такъ, плотность соли 2,5—сахара 1,6—крахмала и клетчатки 1,53—легумина въ порошокъ 1,38—клейковины 1,297—легумина плотнаго 1,285—зѣирнаго масла отъ 0,9 до 0,76—воды 1,0—жирнаго масла отъ 0,96 до 0,91 и воздуха 0,001293. Такимъ образомъ плотность зерна не въ состояніи напр. указать степени участія въ массѣ сѣмени сѣмянной оболочки, состоящей преимущественно изъ клетчатки, потому что плотность этой послѣдней мало отличается отъ плотности другихъ составныхъ частей зерна и ничѣмъ не отличается отъ плотности крахмала; но она въ состояніи указать напр. содержаніе масла въ сѣменахъ, такъ какъ плотность масляныхъ сѣмянъ рѣдко превосходитъ нѣсколько плотность воды; между тѣмъ какъ бобовыя и токовыя сѣмена хлѣбныхъ злаковъ, вообще содержанія много крахмала, самыя плотныя. Удельный вѣсъ не даетъ возможности судить о принадлежности сѣмянъ тому или другому сорту, такъ какъ различія въ удѣльномъ вѣсѣ сѣмянъ различныхъ сортовъ, равноудвоенностей,

часто весьма значительныя (напр. сѣмена твердой пшеницы всегда плотнѣе сѣмянъ мягкой пшеницы), не превосходятъ различій въ плотности сѣмянъ одного и того же сорта въ зависимости отъ года, питанія и другихъ условій развитія растенія и сѣмянъ. Сѣмена болѣе, напр. пораженные головней, сѣмена ячменя или овса (всплывающія на поверхность воды), невыходя, недоразвившіяся или проросшія всегда менѣе плотны чѣмъ здоровыя, вполнѣ развитыя или непроросшія сѣмена. Поэтому, удѣльнымъ вѣсомъ все же слабо опредѣляется качество сѣмянной массы; но за то имъ опредѣляется совершенно точно количество этой массы и изъ этого обстоятельства объясняется, почему болѣе плотныя сѣмена даютъ болѣе урожанъ, чѣмъ менѣе плотныя сѣмена. Конечно у масляныхъ сѣмянъ это наоборотъ, потому что у нихъ съ увеличеніемъ ихъ плотности уменьшается содержаніе жирнаго масла. Почему же болѣе плотныя сѣмена даютъ не только болѣе, но и лучшаго качества урожанъ, это пока необъяснимо. Зависитъ ли это оттого, что плотность сѣмянъ есть измѣняющееся свойство, передающееся потомству; или оттого, что собственно уплотнѣніе сѣмянной массы имѣетъ влияние на развитіе растенія, помимо соотвѣствующаго этому болѣе утолщенію химическаго состава сѣмени, такъ какъ это послѣднее съ увеличеніемъ плотности можетъ и не быть болѣе благоприятнымъ для развитія растенія,—становится вопросъ, для разрѣшенія котораго необходимы были бы сравнительные опыты надъ качествомъ урожанъ растеній изъ сѣмянъ одинаковаго абсолютнаго, но различнаго удѣльнаго вѣса. Можетъ быть результаты такихъ опытовъ и покажутъ, что качество сѣмени, въ отношеніи его способности производить растенія, точнѣе еще опредѣляется произведеніемъ изъ абсолютнаго па удѣльный вѣсъ сѣмянъ, чѣмъ тѣмъ или другимъ въ отдѣльности.

Вѣсъ мѣры или объемный вѣсъ сѣмянъ весьма измѣнителенъ, въ зависимости: во 1-хъ, отъ большаго или меньшаго содержанія воды въ сѣменахъ—съ увеличеніемъ содержанія въ сѣменахъ воды, если это увеличеніе вызываетъ и увеличеніе объема (стр. 709), объемный вѣсъ уменьшается, въ противномъ случаѣ увеличивается. Во 2-хъ, отъ величины формы и поверхности сѣмянъ—чѣмъ мельче, круглѣе и глаже сѣмена, тѣмъ менѣе измѣняется объемный вѣсъ ихъ; такъ, нѣсколько кратныя измѣненія одной и той же мѣры, однихъ и тѣхъ же сѣмянъ, при новой каждой разѣ насыпѣ, дали результаты, между которыми наибольшія разницы были у овса $\frac{1}{100}$, у ячменя $\frac{1}{100}$, у ржи $\frac{1}{100}$, у пшеницы $\frac{1}{100}$, и у проса $\frac{1}{100}$. Даже тѣ небольшія различія величины и формы сѣмянъ, которыя могутъ представлять различныя порціи одной и той же большой партіи повидимому совершенно однообразныхъ сѣмянъ, не остаются безъ вліянія на объемный вѣсъ ихъ; такъ, при взвѣшиваніи одной и той же мѣры сѣмянъ изъ различныхъ порцій одной и той же партіи получены результаты, между которыми наибольшія разницы были: у пшеницы $\frac{1}{100}$, у ржи $\frac{1}{100}$, у ячменя $\frac{1}{100}$ и у овса $\frac{1}{100}$. Въ 3-хъ, отъ способа насыпанія сѣмянъ въ мѣру и точности наполненія мѣры сѣменами. Такъ, при взвѣшиваніяхъ одной и той же мѣры, наполнявшейся сѣменами въ одномъ случаѣ помощію лопатъ, въ другомъ—черезъ воронку, были получены результаты, между которыми наибольшія разницы были у

	пшеницы	ржи	ячменя	овса
въ 1 случаѣ:	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{100}$
во 2 случаѣ:	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{100}$	?

Даже при одинаковомъ способѣ насыпанія сѣмянъ въ мѣру, повторительныя взвѣшиванія одной и той же мѣры однихъ и тѣхъ же сѣмянъ, при новой только каждый разѣ насыпѣ, даютъ результаты, между которыми, послѣдствіе невозможности насыпать сѣмена каждый разѣ совершенно одинаково

и одинаково полно, получаютъ напр. такіе наивышшія разницы: у пшеницы $\frac{1}{1000}$, у ржи $\frac{1}{2000}$, у ячменя $\frac{1}{1000}$, у овса $\frac{1}{1000}$ и у проса $\frac{1}{1000}$. Конечно на это различіе результатовъ нѣсколько вліявшихъ измѣненій однихъ и тѣхъ же сѣмянъ при новой каждый разъ пасынкѣ имѣть вліяніе, хотя незначительное, измѣненіе въ величинѣ и формѣ, которое претерпѣваютъ сѣмена при насыпаніи въ мѣру и высыпаніи изъ нея, влѣдствіе обтиранія ихъ другъ о друга. Въ 4-хъ, отъ величины мѣры, въ которую насыпаются сѣмена для опредѣленія объемнаго вѣса сѣмянъ—чѣмъ больше мѣра, тѣмъ менѣе измѣнитъ объемный вѣсъ, тѣмъ точнее его опредѣленіе. Такъ, повторительнымъ измѣненіемъ 2, 1 и $\frac{1}{2}$ литра: въ одномъ случаѣ одной и той же порціи сѣмянъ, при новой каждый разъ пасынкѣ ея въ мѣру, въ другомъ случаѣ различныхъ порцій сѣмянъ изъ одной и той же, однако, партіи ихъ, дали результаты, между которыми наибольшая разница была у

	пшеницы			ржи			ячменя			овса			проса		
при измѣненіи	2	1	$\frac{1}{2}$	2	1	$\frac{1}{2}$	2	1	$\frac{1}{2}$	2	1	$\frac{1}{2}$	2	1	$\frac{1}{2}$
въ первомъ случаѣ:	2067	2078	1777	2074	1804	1703	2031	1724	1822	2114	2099	1725	2133	2120	1711
во второмъ случаѣ:	2061	2088	2099	2046	2054	2125	2037	2067	1799	1742	1731	184	—	—	—

Нижній рядъ чиселъ представляетъ наивышшія разницы между результатами опредѣленій объемнаго вѣса или вышій предѣлъ ошибокъ такихъ опредѣленій, которыя происходятъ отъ неоднородности матеріала и неизбѣжныхъ погрѣшностей при самомъ выполненіи опредѣленія. Для полученія же изъ чиселъ нижняго ряда чиселъ, которыя бы выражали вышій предѣлъ ошибокъ опредѣленія объемнаго вѣса, въ зависимости отъ одной лишь неоднородности матеріала, можно, слѣдуя теоріи вѣроятностей, изъ квадратныхъ чиселъ нижняго ряда вычесть квадраты чиселъ верхняго ряда и затѣмъ изъ остатковъ извлечь квадратные корни. Такимъ образомъ получены слѣдующія числа у

	пшеницы	ржи	ячменя	овса
для 2 литровой мѣры.	302	1082	750	718
" 1 " "	613	758	717	715
" $\frac{1}{2}$ " "	339	631	238	115

Если для пшеницы, ржи и ячменя изъ чиселъ этой таблицы и чиселъ нижняго ряда предыдущей таблицы, какъ мало разницыхъ между собой, взять среднія числа и эти послѣднія равно какъ и остальные числа сказанныхъ таблицъ и ряда округлить, то получатся слѣдующія числа, которыя выражаютъ наибольшія ошибки опредѣленія объемнаго вѣса, происходящія:

	отъ всѣхъ причинъ в общемъ	отъ неоднородности сѣмянъ только
при измѣненіи	2 — 1 — $\frac{1}{2}$	2 — 1 — $\frac{1}{2}$
для пшеницы, ржи и ячменя:	300 300 250	300 300 250
для овса	718 718 30	718 718 160

Впрочемъ, разница въ этомъ отношеніи между 1-литровой и дву- и свыше дуалитровой мѣрами до того незначительна, что, въ виду большаго удобства въ другихъ отношеніяхъ опредѣленія объемнаго вѣса въ меньшихъ мѣрѣхъ, можно остановиться на однопитровой мѣрѣ (≈ приблизительно 61 куб. дюйм. ≈ 0,8 кружки ≈ 0,3 гарнца, въ 6 хъ, отъ формы мѣры; форма приблизительно цилиндра, котораго вышняя превосходитъ въ $\frac{1}{2}$ раза діаметръ основанія, дасть наименьшія ошибки опредѣленія объемнаго вѣса,

по крайней мѣрѣ у овса и ячменя; у пшеницы и ржи наименьшія ошибки опредѣленія объемнаго вѣса получаютъ при мѣрѣ такой же формы какъ и для овса и ячменя, но только съ шарообразно вышуклымъ, вмѣсто плоскаго, дномъ.

На основаніи этихъ изслѣдованій наиболее пригодной для опредѣленія объемнаго вѣса хлѣбныхъ сѣмянъ *пуркой* (хлѣбными вѣсами) будетъ такая, которой мѣрный сосудъ будетъ емкости, и неперевышающей 1 литра и формы вышеупомянутаго цилиндра. Кроме мѣрнаго сосуда пурка должна имѣть воронку, которая устанавливалась бы нижнимъ отверстіемъ надъ мѣрнымъ сосудомъ такъ, чтобы центръ отверстія воронки приходился на продолженіи оси цилиндрическаго мѣрнаго сосуда, и у которой нижнее отверстіе закрывалось бы пластинкой на пружинѣ такъ, чтобы отверстіе могло быстро отсрывать и выпускать изъ воронки въ мѣрный сосудъ заключающееся въ ней зерно сполна. Какъ воронка такъ и автоматическое гребло для сравниманія поверхности зерна съ краями мѣрнаго сосуда, приживаются къ колонкѣ станина, на которую навѣшиваются вѣсы, такъ, чтобы движеніе ихъ какъ можно менѣе зависло отъ произвола употребляющаго пурку. Укрѣпленная такимъ образомъ воронка находится всегда на извѣстной высотѣ отъ мѣрнаго сосуда и центромъ своего нижняго отверстія на продолженіи оси этого послѣдняго, а укрѣпленное такъ гребло поворачивается всегда извѣстное число разъ около оси и слѣдовательно проходить извѣстное, всегда одно и то же число разъ надъ мѣрнымъ сосудомъ и всегда на одной и той же высотѣ. Такимъ укрѣпленіемъ воронки и гребла и опредѣленнымъ, постояннымъ положеніемъ ихъ въ отношеніи мѣрнаго сосуда надлежащей величины и формы устраняются возможно полно ошибки опредѣленія, происходящія отъ выполненія самаго опредѣленія. Изъ найденнаго объемнаго вѣса пурочной мѣрки вычисляется уже объемный вѣсъ принятой въ мѣстности большей единицы мѣры, напр. четверти. При этомъ, однако, необходимо имѣть въ виду, что чѣмъ больше мѣра, тѣмъ больше уплотненіе зерна въ мѣрѣ; а потому объемный вѣсъ, полученный простымъ помноженіемъ объемнаго вѣса пурочной мѣрки на то число, которое показываетъ сколько разъ принята въ мѣстности единица мѣры больше пурочной, былъ бы ниже действительнаго, и для полученія этого послѣдняго необходимо полученное произведеніе поимножить еще на нѣкоторое число—коэффициентъ уплотненія, которое находится опытнымъ путемъ. Вотъ, напр., коэффициенты уплотненія, показывающіе сколько зерно въ прусск. шеффелѣ (≈ 2,1 приблизительно четверика) лежитъ плотнѣе, чѣмъ въ:

	5	2	1	$\frac{1}{2}$ литрахъ
пшеницы	1,001	1,029	1,036	1,038
ржи	1,010	1,043	1,047	1,039
ячменя	1,002	1,043	1,049	1,039
овса	1,010	1,081	1,074	1,091

Пурки показываютъ, обыкновенно при измѣненіи зерна, не объемный вѣсъ пурочной мѣрки, а уже вычисленный вѣсъ употребительной въ мѣстности единицы мѣры: четверти, шеффеля, гектолитра.

За небольшими исключеніями (иногда у овса) у всѣхъ хлѣбныхъ зеренъ съ увеличеніемъ объемнаго вѣса увеличивается величина зеренъ; слѣдовательно зерна большаго объемнаго вѣса имѣютъ всѣ качества болѣе крупныхъ и болѣе вѣсныхъ зеренъ, т. е. содержатъ всегда болѣе крахмала и воды (нѣсколько) и меньше древесины и иногда болѣе (овесъ), иногда столько же (ячмень) и болѣе частью болѣе (рожь, пшеница) азота чѣмъ сѣмена

меньшаго объемаго вѣса, мелкія и менѣе вѣскія. Но за то меньшее, чѣмъ въ сѣменахъ меньшаго объемаго вѣса, процентное содержаніе нѣкоторыхъ веществъ въ сѣменахъ большаго объемаго вѣса вознаграждается абсолютно большимъ количествомъ этихъ веществъ въ послѣднихъ, чѣмъ въ первыхъ; или потому, что сѣмена большаго объемаго вѣса оставляютъ меньше промежутковъ чѣмъ сѣмена меньшаго объемаго вѣса, или потому что первые имѣютъ большую плотность чѣмъ послѣднія.

Качество массы сѣмянъ, конечно, зависитъ отъ качества составляющихъ ее отдѣльныхъ зеренъ; а потому масса сѣмянъ будетъ тѣмъ лучше, чѣмъ лучше будутъ составляющія ее сѣмена, т. е. чѣмъ лучшаго происхожденія, зрѣлѣе, развитѣе, здоровѣе, вѣсче, крупнѣе, плотнѣе, большаго объемаго вѣса будутъ они. Но, масса сѣмянъ должна отличаться кромѣ того: 1) *вывороченностью* — всѣ составляющія ее сѣмена должны по возможности имѣть всѣ эти качества въ одинаково высокой степени, т. е. принадлежать одному хорошему сорту, быть одинаково новыми, развитыми и т. д., и 2) *чистой*, т. е. не содержать дурныхъ сѣмянъ, сѣмянъ сорныхъ растений (стр. 486) и другихъ постороннихъ примѣсей.

Вывороченныя сѣмена производятъ и урожай болѣе вывороченныхъ сѣмянъ, но позная вывороченность сѣмянъ тѣмъ не менѣе недостижима, потому что съ одной стороны: сѣмена, подъ вліяніемъ вѣшнихъ условій произрастанія, состоянія почвы и погоды, и пріемовъ воздѣлыванія, измѣняютъ свои свойства, развиваются различно быстро и полно, и дозреваютъ въ различное время не только на различныхъ растеніяхъ одного и того же сорта, но даже въ одномъ и томъ же колосѣ (стр. 708), напр. стекловатая и мунистая зерна въ одномъ и томъ же колосѣ пшеницы, въ одномъ початкѣ кукурузы; съ другой — мы (см. выше, и ниже) не имѣемъ средствъ для отборки совершенно одинаковыхъ, вывороченныхъ сѣмянъ. О вывороченности сѣмянъ, въ помощи глазу, мы можемъ судить по результатамъ тѣхъ изслѣдованій, которыя предпринимаются для изслѣдованія качества сѣмени, т. е. по всхожести, абсолютному вѣсу, объему, удѣльному и объемному вѣсамъ нѣсколькихъ пробъ, взятыхъ изъ разныхъ мѣстъ хорошо перемѣшанной партіи сѣмянъ; такъ какъ эти изслѣдованія производятся обыкновенно надъ извѣстнымъ количествомъ сѣмянъ, а не надъ отдѣльнымъ сѣменемъ, которое представляеть большей частью слишкомъ малый предметъ для такого изслѣдованія. Для опредѣленія всхожести берется извѣстное число зеренъ и всхожесть опредѣляется числомъ сѣмянъ, проросшихъ изъ 100 взятыхъ для проращиванія, или процентомъ проросшихъ сѣмянъ. Чѣмъ болѣе процентъ проросшихъ сѣмянъ, чѣмъ вѣсче сѣмена, чѣмъ больше ихъ объемъ, чѣмъ плотнѣе они и чѣмъ болѣе ихъ объемный вѣсъ, тѣмъ болѣе вывороченными могутъ считаться сѣмена. Наибольшей вывороченности могутъ достигать сѣмена болѣею величина, формой, не заключенныя въ оболочку съ ровной поверхностью; меньшей — заключенныя въ меньшія, сравнительно съ вѣсомъ сѣмени, оболочки и наименьшей — мелкія сѣмена, заключенныя въ большія, сравнительно съ самими сѣменемъ, оболочки и съ неровной поверхностью. Такъ у ржи, голой пшеницы сѣмена могутъ быть гораздо выравненнѣе, чѣмъ у овса, а у этого послѣдняго вывороченнѣе, чѣмъ у сѣмянъ многихъ злаковыхъ травъ, напр., овсяницы, полевицы и т. д.

Сѣмена засоряются: во 1-хъ, неорганическими и органическими посторонними примѣсями; первые состоятъ изъ пыли, земляныхъ частей, песка, камешковъ, вторыя — изъ частей плодовыхъ оболочекъ, цвѣтка, стебля,

листьевъ и т. д. Какъ неорганическія, такъ и органическія примѣси могутъ наноситься на растенія въ полѣ въ видѣ пыли; главными же образамъ оныхъ примѣшиваются при уборкѣ съ поля и молотбѣ на тову; иногда же могутъ быть примѣшиваемы и съ злымъ умысломъ (подмѣси); во 2-хъ, сѣменами, не вполнѣ развитыми, неспособными къ проростанію, болѣвыми, къ которымъ можно причислить: зараженныя паразитами (головней), спорышью и механически поврежденныя, напр., поломанныя зерна, и, наконецъ, сорными, въ обширномъ смыслѣ этого слова, т. е. принадлежащими другимъ сортамъ того же воздѣлываемаго растенія или совершенно другимъ воздѣлываемымъ или даже дикопроизрастающимъ (сорнымъ сѣменамъ въ болѣе тѣсномъ смыслѣ этого слова) растеніямъ. Все это примѣшивается во время уборки и молотбы растеній.

Вредъ, причиняемый этими примѣсями двоякій: во-первыхъ они уменьшаютъ массу, чѣмъ затрудняютъ точное опредѣленіе действительнаго количества подлежащихъ, чистыхъ сѣмянъ, которое должно быть высѣяно и высѣивается на десятину; во вторыхъ затрудняютъ раночетное распредѣленіе сѣмянъ по полю, вълѣдствіе разности ихъ удѣльнаго вѣса съ удѣльнымъ вѣсомъ сѣмянъ (стр. 710) и вълѣдствіе засоренія приточныхъ и источныхъ отверстій въ сѣяльныхъ машинахъ; и въ-третьихъ служатъ источниками болѣзней и сорной растительности на поляхъ. Значеніе послѣдняго весьма хорошо поясняется слѣдующими цифрами. На одну десятину высѣивается столько, содержащимъ 5% примѣсей, 835,100 сорныхъ зеренъ принадлежащихъ 41 виду; съ краснымъ клеверомъ, содержащимъ 6,4% примѣсей — 602,500 принадлежащихъ 44 видамъ; съ тимopheвкой, засоренной 4% примѣсей, — 3.089,000 сорныхъ зеренъ, принадлежащихъ 31 виду и съ французскимъ райграсомъ, въ которомъ 46% примѣсей — 55.146,000 сорныхъ сѣмянъ, принадлежащихъ 45 видамъ. Вредъ, причиняемый примѣсями сѣмянъ сорныхъ растеній въ обширномъ смыслѣ, конечно, различенъ: оныхъ гораздо меньше въ томъ случаѣ, если эти сѣмена другаго только сорта, чѣмъ въ томъ случаѣ если эти сѣмена совершенно другаго, къ тому же дикорастущаго растенія. Эти послѣднія представляютъ также въ различной степени вредными (стр. 486) и, хотя вредъ ихъ измѣняется смотря по почвѣ, состоянію культуры, продолжительности періода произрастанія, воздѣлываемаго растенія по состоянію погоды извѣстнаго года, силѣ засоренія и другимъ менѣе важнымъ обстоятельствамъ, тѣмъ не менѣе можно различить ихъ на три группы по степени причиняемаго имъ вреда, согласно указаніямъ практики: наиболее опасныя (въ этомъ числѣ чужеродныя) (А.), менѣе опасныя (Б.) и такія, которыя едва могутъ считаться сорными растеніями (В). Вотъ списокъ важнѣйшихъ сорныхъ травъ, съ указаніемъ тѣхъ воздѣлываемыхъ растеній, между сѣменами которыхъ сѣмена ихъ пагубнѣе и въ наибольшемъ количествѣ встрѣчаются, съ различіемъ ихъ по тремъ указаннымъ группамъ А, Б и В съ указаніемъ долговѣчности ихъ, причемъ 1 обозначаетъ однолѣтнія, 2 — перзимонывающія, 3 — двулѣтнія, 4 — многолѣтнія кустарники и 5 — древоидныя сорныя растенія. Сѣмена слѣдующихъ сорныхъ растеній встрѣчаются: *между сѣменами болѣею части воздѣлываемыхъ растеній*: плевелъ обыкновенный 1 *), лукъ чеснокъ (*Allium sativum* L.) 4; различные виды подмаренника 4, 2 и 1; татарникъ полевой 4; василекъ полевой 2 и 1 марьбѣлая 1; тысячелѣстникъ обыкновенный 4. *Между сѣменами озимыхъ злаковъ*, изъ группы А: хвощъ полевой 4; костеръ ржаной 2 и 1 марьянникъ пашенный 1; желтоцвѣтъ — горичавецъ (*Adonis aestivalis* L.) 1; жинковость полевая 1 и 2; маки: волевой и самосѣйка 1;

*) Латинскія названія приводятся только въ томъ случаѣ, если растенія не находятся въ списокъ сорныхъ растеній на стр. 486 — 488.

куколь обыкновенный 1; горошек мышиный 4; чечевича волосистая 1; горошек вешенный (*Vicia villosa*, Rth.) 2 и 1; изъ группы В — гречиха ньюнокъ 1; воробейникъ полевой 1 и 2; пуанка полевая 1 и 2; лютикъ пашенный 1 и 2; горчица пашенная 1; тысячелетство обыкновенный (*Vaccaria vulgaris*, Gke.) 1; изъ группы В — разные виды незабудки (*Myosotis*) 2 и 1; разные виды вероники (*Veronica*) 4; короставникъ полевой 4; пазники (*Hypochaeris*): гладкий (*H. glabra* L.) 1 и съ длиннымъ корнемъ (*H. radicata*, L.) 4; скерда двулетняя (*Crepis biennis*, L.) 2 и 1; сумочникъ пастуший 1 и 2. Между крестовниками и живыми 1; изъ группы А — вишнякъ или овесъ живой 1; гречиха почечуйная трава 1; вьюнокъ полевой 4; поповникъ полевой — пивникъ 1; горчица полевая 1; рѣдка полевая (*Barbans garbanistrom*, L.) 1; горошекъ мышиный 4; чечевича волосистая 1; погребокъ пѣтуший грешокъ — зюнецъ 1; изъ группы В — пуанка полевая 2 и 1; живокость полевая 1 и 2; несла метельчатая (*Neslia paniculata*) 1; изъ группы В — щетинникъ сѣро-зеленый (*Setaria glauca* P. de B.) 1; просо волосистое 1; крестовникъ обыкновенный 1 и 2; доушникъ шерстистый 2 и 1; скерда двулетняя 2 и 1; амарантъ жемчужный 1; пузырникъ морковевидный (*Calsalia dancoides* L.) 1. Между семенами бобовыхъ растений, изъ группы А — повелика европейская 1; горчица полевая 1; рѣдка полевая 1; изъ группы В — просо колосистое 1. Между семенами клеверовъ и кормовыхъ травъ, изъ группы А — повелика (*Cuscuta*): тимьянолистная 1 и вѣтвистая (*C. racemosa*, Mart); паразиты (*Orobanche*): красная (*O. tuberosa*, Wallr.) 4; малая и *O. cruenta*; попутникъ ланцетолистный 4; изъ группы В — шавель курчавый (*Rumex crispus* L.) 4; различные виды гречихи 1; короставникъ полевой 4; пуанка полевая 2 и 1; доушникъ шерстистый 3; степной рѣзакъ (*Falcaria Rivini*, Host.) 4; изъ группы В — тимьянъ богородская трава (*Thymus Serpyllum*, L.) 5; черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris*, L.) 4; цикорий обыкновенный 4; аистникъ цинувый (*Erodium cicutarium*, L'Herit.) 2 и 1. Между семенами кормовыхъ злаковъ: различные виды осоки (*Carex*) 4; овсянка полевая (*Lolium campestris*, DC.) 4; различные виды свитника (*Juncus*) большей частью 4; различные виды шавеля 4; незабудка средняя (*Myosotis intermedia*, Link.) 1; различные виды вероники 2, 1 и 4; попутники средний и ланцетолистный 4; черноголовка обыкновенная 4; пуанка полевая 2 и 1; поповники (*Chrysanthemum*) пивнякъ (*C. Leucanthemum* L.) 4 и непашучий (*C. inodorum*, Lm.) 1; борщевикъ обыкновенный (*Lapsana communis*, L.) 1; осотъ жесткий (*Sonchus asper*, Vill.) 1; ярутка полевая 2 и 1; ленъ слабительный (*Linum catharticum*, L.) 1; горчица пашенная 1; песчанка тимьянолистная (*Arenaria serpyllifolia*, L.) 2 и 1; звѣздчатка мокричникъ 1 и 2. Между семенами прядильныхъ растений, изъ группы А — гречиха: развѣсистая и почечуйная трава 1; повелики: европейская и леновая 1; паразиты вѣтвистая 1; горчица пашенная 1; изъ группы В и В — воробейникъ полевой 2 и 1; попутникъ ланцетолистный 4; яснотка пурпуровая 1 и 2; пикунникъ колючий 1; поповникъ непашучий 1; кулбаба осевая (*Leontodon autumnalis*, L.) 4; борщевикъ обыкновенный 1; пазникъ гладкий 1; камелина зубчатая (*Samolus dentata*, Pers.) 1; ярутка полевая 2 и 1; сумочникъ пастуший 1 и 2; дивала однодѣльная (*Sceleranthus annuus*, L.) 1; чечевича волосистая и четырехсемянная 1.

Болѣе чистыя семена производятъ и урожай болѣе чистыхъ семянъ, тѣмъ не менѣе, подъ вліяніемъ вѣтвистыхъ условій произрастанія: почвы, погоды и пріемовъ воздѣлыванія, рѣдко можно имѣть совершенно чистыя семена даже изъ самыхъ чистыхъ семянъ. Семена крупныя съ гладкой поверхностью легче чистыми чѣмъ мелкія съ верховной поверхностью. Чистоту семянъ опредѣляется помощью отборки чистыхъ семянъ изъ одной или нѣсколькихъ пробъ опредѣленнаго вѣса, взятыхъ изъ извѣстнаго числа изъ дѣ.

сколькихъ вѣсъ изслѣдуемой въ отношеніи чистоты партіи семянъ. Взвѣсивъ отобранныя семена, можно опредѣлить сколько во 100 частяхъ по вѣсу взятыхъ для изслѣдованія семянъ заключается чистыхъ семянъ и сколько сору; полученныя процентныя числа выразить чистоту семянъ. Если же, затѣмъ, отбранное количество чистыхъ семянъ подвергнуть испытанію въ отношеніи всхожести, то число, которымъ опредѣляется, какую часть по вѣсу всего количества взятыхъ для изслѣдованія нечистыхъ семянъ составляетъ проросшія семена, выразить хозяйственную годность семянъ.

Слѣдующая таблица заключаетъ въ себѣ данныя относительно всхожести, чистоты и хозяйственной годности въ которыхъ полныхъ растений, которая могутъ служить отчасти для опредѣленія того, въ какой степени можно требовать этихъ качествъ отъ различныхъ семянъ и чего можно ожидать отъ покупаемыхъ семянъ въ настоящее время. (См. стр. 718 и 719.)

Если, вообще говоря, самыя крупныя и плотныя семена могутъ считаться лучшими для посѣва, то изъ этого не слѣдуетъ, чтобы это правило не допускало исключеній, такъ какъ не всѣ растенія воздѣлываются для семянъ, а между воздѣлываемыми для семянъ не всѣ — для наиболѣе плотныхъ семянъ; на качество семянъ урожай имѣютъ вліяніе посѣвныя семена. Такъ, не говори уже о масличныхъ растеніяхъ (стр. 711), можетъ быть для полученія высшихъ достоинствъ ливнаго волокна или ячменя для пивоваренія также неужны самыя крупныя и плотныя посѣвныя семена.

Надлежащаго качества посѣвныя семена могутъ быть добыты или у себя изъ хозяйства или на сторонѣ. Въ первомъ случаѣ хорошія семена могутъ быть или отбираемы изъ общаго урожая или же производимы на особыхъ семенныхъ участкахъ.

Отборка изъ общаго урожая производится или еще въ то время, когда растенія стоятъ изъ поля на корню или позже, по уборкѣ сноповъ или зерна. Въ первомъ случаѣ отбираются: или нѣдѣе участки болѣе развитыхъ, нѣсколько рѣже стоящихъ растеній, съ сильной, но не преобладающей удобоусвояемымъ азотомъ, слѣдовательно не свѣжеудобреной хлѣвнымъ навозомъ, чистой отъ сорныхъ травъ почвой; или небольшіе клочки поля (напр. у клевера), отличающіеся надлежащимъ развитіемъ растеній или даже отдѣльными, (напр. у табака, кукурузы) хорошо развитыя растенія. Отбираются такимъ образомъ отдѣльныя растенія или меньшей или большей величины участки такихъ растеній убираются въ состояніи возможно полной зрѣлости. Во второмъ случаѣ, отборка производится иногда при самомъ выдѣленіи семянъ изъ соломы; такъ, напр., для полученія хорошихъ ржаныхъ семянъ отборка производится при свозѣ сноповъ въ сараи: околачиваютъ снопы ударомъ по нимъ слегка валькомъ или удиреніемъ ихъ слегка о доску, колоду или что-либо подобное, при чемъ изъ (средины) колоса выпадаютъ только самыя спѣлыя, крупныя, тяжелыя, плотныя зерна — *околота*. Большой же частью семена на посѣвъ отбираются изъ общаго урожая намолоченныхъ —

семена, и никогда не может дать настолько чистых и выравненных семян, как производство семян на отдельных семенных участках, на которых, прежде сортировки и очистки семян, устраняется, по возможности, все, что только может вызвать неравномерное и недостаточное развитие и засорение семян. Подъ семенные участки выбираются (стр. 699) несколько возвышенные, не сырые места, открытые действию воздуха и солнца, с сильной непроницающей удобоусвояемым азотом, рыхлой, чистой от сорных трав почвой, которая, поэтому, если требует удобрения, то удобряется непосредственно подъ семенные растения не хлывным павозом и не азотистыми, в особенности же аммиачными солями, но минеральными удобрительными веществами, как-то: золой, суперфосфатами, известью; хорошо и своевременно обрабатывается для надлежащего разрыхления ее и уничтожения сорных трав и своевременно и негусто засаживается наилучшими семенами; удаление сорных трав во время произрастания растений и уборка растений в возможно полной зрелости дополняют те меры, которыми обеспечивается получение хороших семян. Семена, собранные при таких условиях, могут, при помощи очищения и сортировки, доставить действительно лучшие семена, каких только можно достигнуть культурой. Соединяя с этим еще и выбор для сбора семян только таких растений, которые имеют все желаемые нами качества в высшей степени, можно, в результате воздвизывания таким образом растений в течение большего или меньшего числа лет, получить семена высокой производительности как по количеству, так и качеству доставляемого ими урожая (Галлетовская пшеница, Вильмореновская и «империяль» сахарная свекловица).

Такой способ получения хороших семян в хозяйстве, иначе — *улучшение семян искусственным подбором* требует много времени; оно достигается скорее иногда *скрещиванием*, т. е. искусственным оплодотворением растений, требующих улучшения, пыльцей от более совершенных растений — произведением *бастардов*, которое, пока еще, впрочем, мало применимо у полевых растений, да и применяется предпочтительно с целью получения новых разновидностей. Еще скорее можно достигнуть того же приобретением хороших семян на стороне, если существует местность, в которой имеются семена требуемых нами качеств.

Но, растения, разводимые из приобретенных на стороне семян, сохраняют свои качества, а туземные, при улучшении их искусственным подбором, достигают известных качеств в таком только случае, если условия произрастания их в хозяйстве, т. е. почва и климат, отвечают таким качествам растений; а для их воздвизывания допускает в техническом и экономическом

отношении получение надлежащего качества семян. Если же это не так, если почва и климат не отвечают требуемым качествам растений или если невозможно получение надлежащего качества семян (напр. у льна воздвизываемого на волокно по технической невозможности получить хорошие семена с растений, убираемого на волокно раньше необходимой для хорошего качества семян зрелости, или у кормовых трав по невыгодности иногда оставления растений на семена); в таком случае растения или начинают утрачивать свои качества, *вырождаться*, в известном смысле ухудшаться, через год, два или большее число лет, смотря по стойкости семян и степени несоответственности условий, или достигают лишь известной степени улучшения, более или менее далекой от желаемой, смотря опять-таки по степени несоответственности условий; или, наконец, не дают вовсе семян. Культура дает средства, для того чтобы несоответствующим местным качествам или, что тоже, требованиям растений условия изменить соответствующим образом, но для этого необходимо с одной стороны знать в точности как существующее состояние условий произрастания, так и то, которого требуют растения желаемых качеств; с другой — иметь экономическую и техническую возможность изменить условия произрастания соответствующим образом. Часто, однако, в полевой культуре, мы не можем (напр. свет, теплоту, влажность), не находим выгодным (напр. влажность) или, что еще чаще, не умеем (напр. почву) изменить условий произрастания соответственно требованиям растений. В этих случаях, для поддержания или достижения желаемых, требуемых и хорошо оплачиваемых на рынке качеств того или другого растения, того или другого сорта его, приходится через более или менее продолжительное время приобретать из других местностей новые семена или, как говорят, *обменивать, обновлять* семена в хозяйстве.

Конечно, вводя новое растение или новый сорт желаемых качеств, лучше всего взять семена из мест, подходящих к приобретаемому семенам хозяйству по своим почвенным и климатическим условиям; так как в этом случае растение если не на всегда, то во всяком случае на более долгое время сохраняет желаемые качества, или потребует меньше времени на свое приспособление к местным условиям — на свою *акклиматизацию*. Напр. озимая пшеница, будучи перенесена из страны с умеренными зимами в страну с более суровыми зимами и разводится здесь из семян получающихся на новом месте, иногда в течение 12 — 15 лет не дает еще растений, которые бы не страдали от зимних холодов больше туземной пшеницы. Это настолько важно, что может побудить иногда отдать известное преимущество соответствию вводимого растения климатическим и почвенным условиям вводящего хозяйства предъ соответствием его требованиям местного рынка; так как более влиятельные и обильные урожаи, вследствие первого, могут часто с избытком вознаградить некоторую

утрату на рыночной цѣнѣ продукта такого растенія (стр. 246—247). Въ случаѣ же необходимости обновленія семянъ, выборъ мѣста ихъ приобретенья долженъ сообразоваться съ характеромъ вырожденія и болѣе или менѣе вѣроятными причинами этого послѣдняго. Такъ, въ случаѣ ослабленія у растенія сѣмянопроизводительности при усиленнѣ развитія стебля и листьевъ; потери сѣменами (ячмень) или клубнями (картофель) ихъ мучнистости, вследствие уменьшенія содержанія въ нихъ крахмала или потери корнями (свекловича) ихъ сахаристости, вследствие уменьшенія содержанія въ нихъ сахара; появленія наклонности къ болѣзнямъ и уменьшенія способности сопротивленія холодамъ и другимъ вреднымъ влѣяніямъ и, наконецъ, уменьшенія урожайности вообще, какъ слѣдствія воздѣлыванія растенія на нѣсколько влажной, тучной (богатой перегноемъ и прензобилюющей удобоусвояемымъ азотомъ), часто удобряющейся хлѣвнымъ навозомъ почвѣ, къ тому же въ нѣсколько влажномъ климатѣ, — необходимо обновить сѣмена или клубни изъ мѣстности съ менѣе тучной, легкой почвой, если бы нельзя было найти въ самомъ хозяйствѣ такой почвы для полученія съ нею безъ сильнаго удобренія посѣвныхъ семянъ и клубней. Если же урожай растенія топаютъ на тощихъ (легкихъ) почвахъ, то слѣдуетъ обновить сѣмена приобретеньемъ этихъ послѣднихъ изъ мѣстъ съ болѣе плодородной, но не очень тучной почвой. Въ случаѣ удлиненія періода проростанія растенія до того, что, напр., уборка его приходится въ дождливое время при воздѣлываннн растенія въ мѣстности съ прохладными и особенно влажными, къ тому же, весной и лѣтомъ; или, въ случаѣ сопровождающаго такое удлиненіе періода проростанія ослабленія сѣмянопроизводительности и усиленія развитія стебля (внушенія у хлѣбовъ, вѣнзеванія и пустоцвѣтѣ у бобовыхъ растеній), какъ это бываетъ въ влажныхъ и достаточно теплыхъ странахъ, необходимо обновленіе семянъ выпиской изъ болѣе южныхъ и сухихъ мѣстностей. По крайней мѣрѣ, наблюденія показываютъ, что кукуруза, пшеница, рожь, ячмень развиваются тѣмъ быстрее, чѣмъ южнѣе, и тѣмъ медленнѣе — тѣмъ позднѣе вырѣваются, чѣмъ сѣвернѣе происхожденіе ихъ семянъ; у овса же болѣе южное или сѣверное происхожденіе семянъ остается безъ вліянія на скорость развитія. Кромѣ того, всѣ вообще сѣмена южнаго происхожденія, сравнительно съ сѣменами сѣвернаго происхожденія, отличаются болѣе высокой производительностью относительно семянъ и менѣею относительно соломы; сѣмена пшеницы и кукурузы — сверхъ того отличныя качествомъ, а ячменя и овса, сравнительно съ сѣменами изъ той же широты какъ и выписывающее хозяйство или нѣсколько болѣе сѣвернаго происхожденія, — худшими качествами производимыхъ ими урожаевъ. Въ случаѣ сокращенія періода проростанія до того, что растенія не въ состояніи производить подлежащую массу урожая, какъ это бываетъ въ странахъ (континентальныхъ) съ жаркими весной и лѣтомъ и особенно въ тому же недостаточно влажной зимой, полезно обновленіе семянъ изъ болѣе, но не слишкомъ влажныхъ и прохладныхъ странъ (приморскихъ и гористыхъ), или изъ странъ, хотя и съ жаркими весной и лѣтомъ, но въ тоже время съ достаточно влажной зимой; такъ какъ въ первыхъ растенія имѣютъ вообще болѣе длинный періодъ проростанія; а во вторыхъ — отличаются быстрымъ и массовымъ развитіемъ вначалѣ. Такъ, опытъ показываетъ, что овесъ в ячмень изъ юго-восточныхъ (континентальныхъ) мѣстъ Европы противостоятъ отлично хлѣбнымъ засухамъ, потому что, имѣя болѣе короткий періодъ проростанія, довольствуются меньшимъ запасомъ влаги съ зимы и потому даютъ болѣеіе урожаи; или яровая хлѣба (овесъ) изъ гористыхъ мѣстностей съ большимъ запасомъ зимней влаги и короткимъ періодомъ проростанія растеній даютъ весьма хорошія посѣвные сѣмена для сухихъ равнинъ. Сѣмена кормовыхъ травъ (напр. клевера) или традицонныхъ растеній (льна) изъ болѣе влажныхъ

и холодныхъ странъ весьма хороши для посѣва въ мѣстностяхъ, въ которыхъ не достаетъ влаги весной или лѣтомъ, потому что, удлинняя періодъ роста у растенія (до цѣтенья его), способствуютъ развитію наиболѣе важныхъ у этихъ растеній стеблевыхъ частей. Сѣмена ячменя изъ сѣверныхъ и влажныхъ мѣстностей даютъ высокую солому. Сѣмена изъ болѣе холодныхъ мѣстностей даютъ растенія легче противостающія морозамъ и холодамъ, чѣмъ сѣмена изъ болѣе теплыхъ странъ; а потому для обновленія озимей необходимо выписывать сѣмена изъ болѣе холодныхъ или по крайней мѣрѣ одинаково холодныхъ съ выписывающей мѣстности мѣстъ. Изъ болѣе же холодныхъ мѣстъ слѣдуетъ выписывать сѣмена въ мѣстности съ ранними весенними утренниками, потому что сѣмена изъ такихъ мѣстъ даютъ растенія, которыя цвѣтутъ сравнительно позже, слѣдовательно въ то время, когда мновали опасные для растенія въ цвѣту утренники.

Какъ часто должны быть обновляемы сѣмена, зависитъ отъ скорости вырожденія растеній; такъ у льна, воздѣлываемаго на волокно, такое обновленіе можетъ быть необходимымъ ежегодно; между тѣмъ какъ для защиты растеній отъ скоропреходящихъ, крайнихъ холодовъ въ странахъ съ умеренными вообще зимами, имѣть надобности въ обновленіи озимыхъ семянъ чѣще одного раза въ 10, 12 — 15. Во всякомъ случаѣ сѣмена должны быть обновляемы прежде нежели вырожденіе растенія можетъ причинить убытокъ. Конечно, въ случаѣ совершенной невозможности (кукурузы на зеленый корнъ въ болѣе сѣверныхъ мѣстностяхъ) или невыгодности полученія семянъ, необходима ежегодная выписка семянъ. При выпискѣ семянъ необходима извѣстная осторожность, чтобы съ выписываемыми сѣменами не завести сорныхъ растеній или болѣзныхъ растеній; хотя обмѣлъ семянъ представляется наиболѣе дѣйствительнымъ средствомъ, въ случаѣ засоренія имѣющихся въ хозяйствѣ семянъ, напр. высекомъ, плелелами, горохомъ полевымъ (стр. 486—487). Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что если съ одной стороны, могутъ быть обстоятельства, требующія, обновленія, выписки, приобретенья семянъ на сторонѣ — въ такихъ случаяхъ относится, между прочимъ, введеніе новаго растенія; то съ другой — несомнѣнно весьма часто можно обойтись безъ этого и улучшить производство семянъ въ собственномъ хозяйствѣ.

Чистыя, отобранныя посѣвные сѣмена, прежде высква ихъ на поле, подвергаются иногда еще подготовкѣ, а именно: *намачиванію* съ цѣлю ускоренія проростанія выскваемыхъ семянъ; *протравливанію* — съ цѣлю уничтоженія зародышей паразитныхъ грибовъ, обуславливающихъ болѣзни растеній, и *удобренію* съ цѣлю обезпечить растенію возможно хорошее развитіе его вначалѣ.

Обыкновенно выскваютъ сухія сѣмена; но иногда намачиваютъ ихъ до высква на поле въ водѣ на болѣе или менѣе долгое время (у свекловича на 48 час., у моркови на 36—40 час., у кукурузы на 12—24 час.), для чего погружаютъ ихъ въ воду или прямо (кукуруза, свекловича) или въ мѣшкахъ (морковь) чистыми или смѣшанными предварительно съ пескомъ. Иногда съ той же цѣлю смѣшиваютъ сѣмена съ землей, пескомъ или опилками, которые поддерживаютъ въ возможно влажномъ состояніи, или же сохраняютъ ихъ въ постоянно влажныхъ шерстяныхъ мѣшкахъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ намачиваютъ сѣмена въ навозной жижѣ *) (у свекловича), въ другихъ еще —

Намачиваніе для восстановленія способности проростанія старыхъ семянъ, напр., въ 1—2% раствѣ соляной кислоты и т. д., представляетъ рѣдко применяемое но всегда принятое (напр., хлорная вода у масличныхъ семянъ) и не всегда вѣрное средство.

смоченный семя (у свекловича же) складывают в кучи, в которых оставляют до появления ростка. Намоченные семена, а тем более пророщенные семена, конечно, в случае утренней влажной и достаточно теплой погоды, могут дать более скорые и равномерные выходы, способные заглушить сорную растительность и достигнуть, прежде нежелан, полноты вредный нашествия, напр., земляная блоха, такой степени развития, на которой нашествие уже больше не трогает его, как слишком жесткую для него пищу. Но за то, если замоченные, а тем более пророщенные семена попадают в сухую почву или вследствие завышения их наступают сухая погода, проростание может приостановиться или росток засохнуть, а семя погибнуть. В случае же наступления мокрой погоды, семя может загнить. Поэтому замачивание семян можно рассматривать лишь как исключительную меру, применяющуюся в трудно и медленно прорастающим семенам, напр., кукурузы, свекловича, моркови, табака и т. д. Гораздо большую пользу и чаще может оказать протравливание семян, как средство, напр., против головни у пшеницы или против ржавчины у подсолнечника. Для протравливания семян употребляется предпочтительно мидный купорос (также жидкий щелок, известковая вода) в 1-процентном растворе воды, которым наполняется какая либо кадка, и в который затем высыпается пшеница и несколько раз помешивается, при чем счерпывается все всплывающее на поверхность (1/2 фунта мидного купороса на 100 ф. воды и 6 пуд. зерна). Пшеница замачивается в растворе в течение 12—16 часов, по истечении которых выбрасывается из кадки, рассыпается тонким слоем и тщательно переворачивается. По истечении нескольких часов, она может быть разбита руками, а по истечении 24 часов — сальной машиной. При таком догоде замачивании, конечно, несколько семян, в особенности механически поврежденных, напр., при молотье, теряют свою способность прорастания, у некоторых же эта способность ослабевает; но за то вредные погибнуть споры паразитного гриба. Наконец, удобрение семян в виде ли замачивания семян в растворах питательных для растений веществ или в виде обваливания смоченных в клейкой жидкости семян концентрированными туками, напр., гуано, костяной мукой и т. д., трудно выполнимо так, чтобы приготовить таким (особенно вторым) способом семена представляли массу, удобную для посева. Затем, значение, которое в этом случае, особенно при первом способе удобрения семян, могут иметь удобрения для первоначального развития растений слишком незначительно; хотя отрицать его совершенно нельзя. Наконец, удобрением семян с большим удобством и успехом может быть заменено местным удобрением (стр. 677), и потому в настоящее время едва заслуживает упоминания.

Готовые семена вносятся в почву или посев производится в известное время, главным образом весной и осенью. Весной производится яровые посевы — высеваются яровая однолетняя*), равно как и большая часть дву- (морковь, репа, брюква, свекла, цикорий) и многолетних (картофель, земляника, клевер, люцерна и т. д.) растений, которые не переносят в молодости зимних холодов. Осенью же производится озимые посевы — высеваются озимые преимущественно однолетние растения, реже многолетние (клевер), переносимые в молодости зимние холода, с целью выиграть время

для более массивного их развития. От этого осеннего посева озимей следует отличать осенний посев собственно яровых растений (напр. морковь, свекла, клевер), который производится так, чтобы высеванные семена не проросли до наступления зимы (так как иначе выходы погибли бы), а могли бы только воспользоваться первым благоприятным весенним временем для своего прорастания. Кроме того в местностях с продолжительным периодом времени, благоприятного для прорастания растений, успевают по уборке озимого или даже ярового растения, произвести на том же самом месте еще один посев так называемого *позднего* растения с коротким периодом прорастания (напр. гречиха, репа, морковь, шпиргеля, вики с овсом на зеленый корень), которое убирается еще в том же году осенью.

Время посева, затем, ближайшим образом зависит:

Во 1-х, с одной стороны от продолжительности периода прорастания растений (см. таблицу ниже), т. е. времени, которого требует растение для своего развития из семян до полной *естественной* зрелости, т. е. до созревания семян (напр. пшеница, рожь, ячмень и т. д.), или же до образования только стеблевой почки, способной к дальнейшему развитию лишь в следующем году (напр. морковь, свекла, репа и т. д.) или только до *хозяйственной* зрелости или того состояния, в котором растение употребляется в хозяйстве (напр. до полного цветения или начинающегося появления бобов у вики, при возделывании ее с овсом на зеленый корм); с другой — от продолжительности времени, благоприятного для развития растений в данной местности.

Так, яровая пшеница, которая требует для своего развития 18—20 недель, должна быть высевана, напр. в Смоленской губ., где всего благоприятного для прорастания растений времени неделя 25, в конце апреля, в самом начале мая; между тем как обыкновенный, четырехстрочный ячмень с периодом прорастания в 12 недель, может быть высеван там же еще в конце мая; или, вика с овсом, убираемая на зеленый корм уже в половине, конце июня, может быть высевана в конце апреля или в начале мая, следовательно за 7—8 недель до ее уборки, между тем как вика на семена, убираемая в полной зрелости в конце августа, должна быть высевана уже около половины мая, так как, для достижения ею полной зрелости, она требует уже не 7—8, а 18—22 недель времени.

Во 2-х, с одной стороны от количества и распределения теплоты и влажности, требуемых растением, и отношения растения к низким и высоким температурам и к разным переходам от тепла к холоду, и от сырости к засухе и обратно в различные периоды своего прорастания; с другой — от состояния погоды в течение года и в особенности в течение периода времени, благоприятного в данной местности для прорастания растений, так как этим определяются количество и распределение теплоты и

*) Относительно одно-, дву- и многолетних растений см. стр. 186—188.

влажности, время последних весенних и первых осенних утренников, резкость переходов от тепла к холоду и от сырости к засухе и т. д.

Такъ въ холодныхъ и сырыхъ, сѣверныхъ и гористыхъ мѣстностяхъ яровые посѣвы производить позже, а озимые раньше, чѣмъ въ теплыхъ и сухихъ мѣстностяхъ. Вообще говоря, если только позволяютъ условія влажности, лучше производить посѣвы когда средняя дневная температура почвъ достигнетъ низшей благопріятной для проростанія или, по крайней мѣрѣ, будетъ на 3—4° Р. выше низшей возможной проростанія (стр. 693). Если же можно опасаться за то, что ко времени такого повышенія температуры въ почвѣ не окажется благопріятнаго для проростанія сѣмянъ количества влаги, то умѣстно приступать къ посѣву и раньше наступленія наиболѣе благопріятной для того же температурч. Озимые должны быть высѣваемы настолько рано, чтобы имѣли достаточно еще свѣта и тепла для хорошаго выкушенія, прежде нежели наступитъ влажная и прохладная погода, благопріятная для укорененія развившихся побѣговъ (стр. 697), и тѣмъ болѣе холода. Кушение прекращается съ пониженіемъ средней дневной температуры, примѣрно, до 7° Р. Такія растенія, которыя какъ гречиха, просо, требуютъ небольшого сравнительно количества влаги и значительно высокой температуры для своего проростанія, высѣвать въ первое время большую сухость и чувствительны, напротивъ, къ холоду, должны высѣваться позже, чѣмъ такія растенія, какъ горохъ, подсолнечникъ, яровая пшеница, которыя требуютъ большаго количества влаги и сравнительно менѣе высокой температуры для своего проростанія и не боятся холодовъ въ первое время. Весьма важно, особенно если земля суха, какъ это бываетъ при озимыхъ посѣвахъ, нельзя рассчитывать на обильныя атмосферическія осадки въ время посѣвовъ, производить посѣвы раньше дождей, выпадающихъ въ мѣстности болѣею частью около извѣстнаго времени. Такъ, въ Могилевской губ., посѣять рожи до 6 августа, можно быть увѣреннымъ, что въ большинствѣ случаевъ посѣвъ ел. будетъ смоченъ дождемъ въ теченіи недѣли, двухъ.

Въ 3-хъ отъ состоянія влажности, теплоты, рыхлости, плодородія и чистоты отъ сорныхъ травъ, въ которомъ съ одной стороны растеніе и въ особенности проростаніе сѣмянъ его требуетъ почвы, и которое съ другой—представляетъ почва.

Извѣстная степень влажности, теплоты и рыхлости (доступа воздуха) почвы необходима для проростанія сѣмянъ (стр. 692); а потому на рыхлыхъ, сухихъ почвахъ, особенно же въ сухомъ климатѣ, гдѣ нельзя рассчитывать на пополненіе недостающаго почвѣ ко времени посѣва влаги послѣдующими атмосферическими осадками, какъ напр. у насъ, въ степныхъ мѣстностяхъ, производить яровые посѣвы въ особенности такихъ растеній, которыхъ сѣмена требуютъ значительнаго количества влаги для проростанія и первыосѣять сѣмена въ первое время, по возможности раньше, чтобы захватить въ почвѣ запасную съ зимы влагу. Поэтому же, въ средней Россіи возможно ранній высѣвъ клевера по озими оказывается болѣе надежнымъ, чѣмъ позднѣйшій посѣвъ его по яри; а въ мѣстахъ, страдающихъ еще болѣе отъ весеннихъ засухъ (напр. въ Воронежской губ.), даетъ хорошіе результаты посѣвъ клевера по озими съ осеви, если только поле не имѣетъ такого покатого положенія, при которомъ могли бы быть смыты оставшіяся безъ прикрытія сѣмена клевера весенними водами. На сухихъ, рыхлыхъ почвахъ ранние яровые посѣвы тѣмъ болѣе возможны, что такія почвы обогрѣваются скорѣе и открыты доступу воздуху болѣе плотныхъ; озимые же посѣвы на такихъ почвахъ, напротивъ, могутъ быть производимы нѣсколько позже. На

почвахъ плотныхъ, страдающихъ отъ излишка влаги, яровые посѣвы производятся позже, чѣмъ на болѣе рыхлыхъ, сухихъ, потому что они обогрѣваются медленнѣе, открыты доступу воздуху менѣе рыхлыхъ почвъ, сырость же сохраняютъ долѣе послѣднихъ. Озимые же посѣвы на такихъ почвахъ, напротивъ, производятся раньше. Почвы плодородныя (напр. удобренныя хлѣвнымъ навозомъ, спущенные пруды, застилаются яровыми раньше, а озимыми позже, чѣмъ менѣе плодородныя, тощія почвы; потому что яровыя, рано посѣяныя на тощихъ земляхъ, при недостаточной еще нагрѣтости почвы и атмосферы и дурныхъ условіяхъ питанія, развиваются тѣмъ туго, что даже въ послѣдствіи, съ наступленіемъ благопріятной погоды, рѣдко могутъ правлаться; многія же изъ нихъ, въ особенности зерновыя, какъ злаковыя, такъ и бобовыя растенія, будучи поздно посѣяны на плодородныхъ почвахъ, не успѣваютъ своевременно дозрѣть, такъ какъ періодъ произростанія ихъ на такихъ почвахъ удлиняется, вслѣдствіе сильнаго разантія стеблевыхъ и листовыхъ частей. Озимыя же растенія, посѣяныя на плодородныхъ почвахъ, развиваются настолько быстрѣе, вслѣдствіе благопріятныхъ условій питанія, что требуютъ сравнительно менѣе, чѣмъ на тощихъ почвахъ времени для достиженія той степени развитія, которая обезпечиваетъ имъ хорошую перезимовку. На засоренныхъ почвахъ особенно необходимымъ своевременный посѣвъ, рассчитанный сообразно съ временемъ наступленія различныхъ фазъ въ развитіи сорныхъ травъ, для того чтобы воздѣлываемое растеніе дружнымъ и ровнымъ всходомъ раньше сорныхъ травъ могло заглушить эти послѣднія, появляющіяся позже; или для того чтобы первое сорье настолько раиѣ послѣднихъ, чтобы могло быть убрано безъ примѣси сорныхъ сѣмянъ къ его сѣменамъ; или, наконецъ, для того чтобы развитіе сорныхъ травъ дало возможность выколотъ ихъ промежъ воздѣлываемаго растенія.

Въ 4-хъ, отъ времени поспѣванія наськомыхъ; такъ, напр., лепъ высѣвается, смотря по другимъ условіямъ, или такъ рано, чтобы, ко времени появленія земляной блохи, достигнуть той степени развитія, на которой блоха не трогаетъ его; или же такъ поздно, чтобы всходы его появились когда уже блоха исчезаетъ.

Въ 5-хъ, наконецъ отъ хозяйственныхъ условій — отъ возможности приготовить землю надлежащимъ образомъ для посѣва къ извѣстному сроку; хотя желательна, конечно, чтобы это обстоятельство какъ можно рѣже заставляло упускать время, благопріятное для посѣва.

Изъ вышеприведеннаго очевидно, что время высѣва опредѣляется различными соображеніями и не допускаетъ никакого обобщенія въ болѣе тѣсныхъ предѣлахъ. Руководить въ опредѣленіи его могутъ знаніе природы воздѣлываемыхъ нами растеній, выводы изъ многолѣтнихъ метеорологическихъ наблюденій, изъ наблюденій температуры и влажности почвы, времени распусканія, цвѣтенія и наступленія другихъ фазъ въ развитіи разнаго рода растений: травянистыхъ, кустарныхъ и древесныхъ породъ, дикорастущихъ; травянистыхъ, перелетомъ птицъ и другими жизненными явленіями различныхъ животныхъ, такъ какъ эти послѣднія, равно какъ и наступленіе различныхъ фазъ въ развитіи растеній, находятся въ тѣсной связи съ состояніемъ тепла и влажности въ воздухѣ и почвѣ. Такъ, напр., многолѣтній опытъ заставляетъ въ окрестностяхъ Горохъ (Могилевской губ.) предпочитать поздній посѣвъ овса — въ концѣ мая, даже началѣ іюня, равнымъ посѣвомъ въ началѣ мая, даже концѣ апрѣля, которые, напр., весьма употребительны

теплымъ въ сосѣдней Смоленской губ., потому что теплая погода и дожди, перенападающіе въ началѣ іюня, способствуютъ большей быстротѣ и равномѣрности появленія овсяныхъ всходовъ, нежели холодная и сырая, а иногда даже и сухая погода мая, особенно при возможности лучшей раздѣлки земли въ іюнь, нежели въ май; такъ что поздніе овсы не такъ засорятся, а между тѣмъ, дозреваютъ немногимъ позже раннихъ, что, при благоприятной погодѣ въ той мѣстности сентября мѣсяца, не представляетъ никакого неудобства. Многолѣтній же опытъ многихъ мѣстъ указываетъ, напр., какъ на лучшую пору для посѣва овса, когда начинается распускаться на березѣ листъ, когда цвѣтеть одуванчикъ, когда забиваютъ лагушки, а кроны начинаютъ выбрасывать землю; для льна — когда на вероникъ аптечной (*Veronica officinalis*) покажутся первые цвѣты; для гороха — когда зацвѣтеть мать-и-мачиха (*Thysanotus patens*), когда прилетаютъ дикіе журавли, гуси и т. д. Конечно, выводы изъ всѣхъ этихъ наблюденій могутъ помочь намъ только въ приблизительномъ опредѣленіи времени, благоприятнаго для посѣва каждого растенія въ данной мѣстности и въ данномъ году, но они не въ состояніи, по крайней мѣрѣ, при настоящей ихъ неполнотѣ, застраховать насъ отъ всякой ошибки, и мы можемъ быть довольны, если помощью ихъ въ состояніи уменьшить только число неурожайныхъ годовъ по отношенію къ урожайнымъ. Эта же трудность выбора наилучшаго времени посѣва заставляетъ хозяевъ прибѣгать нерѣдко къ весьма рациональной мѣрѣ посѣва въ нѣсколько сроковъ, въ особенности такихъ растеній, которыхъ успѣшное развитіе особенно зависитъ отъ удачнаго времени посѣва, такъ, напр., гречиху высѣваютъ въ два срока, а ленъ даже иногда въ три срока. Но, если съ одной стороны выборъ благоприятнаго времени для посѣва затруднителенъ, то съ другой стороны онъ значительно облегчается, какъ показываютъ вышеприведенныя соображенія, для хозяина, который располагаетъ хорошо обработанной и удобренной почвой средней плотности и не страдающей отъ избытка влаги.

Съ наступленіемъ времени посѣва необходимо прежде всего опредѣлить количество, въ которомъ сѣмена должны быть высѣяны на десятину, и которое опредѣляется въ зависимости:

Во 1-хъ, отъ площади, которой требуетъ каждое воздѣлываемое растеніе для развитія (стр. 511—512) своей особи (каждого отдельнаго растенія), и которая весьма мало еще исследована.

Вотъ нѣкоторые измѣщенія въ этомъ отношеніи числа: топинамбуръ, капуста, брюква, рѣпа, кормовая свекла, порезанная пишка и кукуруза на зерно требуютъ 258; озим. рапсъ и сурфинца—216; крѣп. фель, крапивъ, сафлоръ—144; конские бобы—30; горохъ—20; макъ—16; пшеница, горчица, рожь, конопля и вики—12; морковь, пшеница просо, гречиха—10; овесъ—9; рожь, чечевича—8; ячмень и люцерна—7; клеверъ и эспарцетъ—5; шпегель—2 и ленъ на волокно—1 кв. дюймъ для каждой особи.

Чѣмъ больше площадь, которой требуетъ растеніе для полнаго развитія своей особи, тѣмъ меньшее число сѣмянъ нужно для обсемененія десятины. Если, затѣмъ, на основаніи измѣющихся данныхъ относительно числа зеренъ, различныхъ растеній, заключающихся въ фунтѣ или гарницѣ, и въ предположеніи, что всѣ сѣмена всхожи и здоровы одно какъ другое, вычислить то число фунтовъ или гарницъ сѣмянъ различныхъ растеній, которое нужно для обсемененія одной десятины, и сравнить его съ тѣмъ числомъ фунтовъ и гар-

ницъ, которое действительно употребляется для обсемененія десятины, то мы найдемъ между этими двумя числами большую или меньшую, иногда весьма значительную разницу, какъ это подтверждаетъ слѣдующая таблица, изъ которой въ то же время видно, что, если опредѣлить количество сѣмянъ не счетомъ, а мѣрой или вѣсомъ, то для обсемененія десятины понадобится тѣмъ болѣе (фунтовъ или гарницъ) сѣмянъ, чѣмъ они легче или мельче.

	Площадь въ кв. дюймѣ, которой требуетъ особа для своего полнаго развитія.	Число растеній, которое должно быть на десятинѣ.	Число зеренъ.		Сколько должно бы было высѣваться на десятину.		Сколько въ действительности высѣвается на десятину.		Во сколько разъ больше высѣвается сѣмянъ, чѣмъ слѣдовало бы.	
			въ фунтѣ.	въ гарницѣ.	фунт.	гарн.	фунт.	гарн.	вѣс.	мѣр.
клевера . . .	4	4233600	1300000	2041234	14	2	40	62	2,75	3,50
ячменя . . .	7	2419200	12370	48914	196	49	342	72	1,75	1,50
ржи . . .	8	2116800	24000	85394	88	24	360	64	4,00	2,50
овса . . .	9	1881600	333333	50286	57	37	180	128	8,50	3,25
пшеницы . .	10	1693440	12800	69120	133	24	376	64	3,00	2,75
вики . . .	12	1411200	9493	55772	149	25	235	40	1,50	1,25
гороха . . .	20	846720	3750	18750	226	45	450	72	2,00	1,50

Почему высѣвается на десятину въ действительности больше сѣмянъ, чѣмъ слѣдовало бы по теоретическому расчету, происходитъ отъ того, что на количество высѣваемыхъ на десятину сѣмянъ влияют далѣе: во 2-хъ, количество сѣмянъ; чѣмъ лучше сѣмена, чѣмъ меньше между ними постороннихъ примѣсей или нескорожихъ и нездоровыхъ сѣмянъ, тѣмъ меньше (фунтовъ или гарницъ) нужно для обсемененія десятины. Это наглядно поясняется сравненіемъ только что приведенной таблицы съ таблицей на стр. 718—719, которая показываетъ, что количество сѣмянъ высѣваемое на десятину въ действительности превосходитъ теоретическое болѣе у тѣхъ растеній, которыхъ сѣмена въ действительности встрѣчаются менѣе чистыми и выращенными.

Въ 3-хъ, качество внешнихъ условий произрастанія, которое зависитъ отъ почвы, климата (погоды) и культурныхъ приѣмовъ, а именно: удобренія и обработки почвы, выполненія посѣва (времени посѣва, распредѣленія и прикрытія сѣмянъ) и ухода за растеніями во время произрастанія (мѣръ, принимаемыхъ противъ вредныхъ насекомыхъ). Чѣмъ благоприятнѣе эти условія для даннаго растенія, т. е. чѣмъ болѣе отвѣчаетъ почва растенію по ея физическимъ свойствамъ и состоянію влажности, чѣмъ плодороднѣе она и чище отъ сорныхъ травъ, чѣмъ болѣе отвѣчаетъ растенію погода и климатъ, чѣмъ соответственнѣе удобрена и обработана почва, чѣмъ своевре-

меньше высеваются семена, čímь равномернѣе они распределяются и соответственнѣе прикрываются, čímь меньше опасности отъ поврежденій насекомыми, čímь меньше не только можетъ по и должно быть высѣяно семянъ на десятину — тѣмъ *рѣже* долженъ быть посѣвъ и, наоборотъ, въ противоположныхъ этимъ условіяхъ онъ долженъ быть *гуще*.

Изъ этихъ условій важны въ особенности два: плодородіе и чистота почвы. Что на плодородной и чистой почвѣ можно и должно сѣять *рѣже*, яствуетъ изъ того, что на такой почвѣ все растение, а следовательно и корни его развиваются сильнѣе, čímь на тощей. Болѣе же сильное растение съ болѣе развитыми корнями съ одной стороны требуетъ большаго пространства — болѣе шире площади для себя, съ другой же — приобретаетъ способность использовать и отнять болѣе пространства земли, čímь слабое растение съ слабо развитыми корнями; такъ что, напр., вдвое меньшее число сильныхъ растений на десятинѣ, занимающихъ каждое въ все большее пространство, можетъ извлечь изъ почвы столько же (а иногда и болѣе, если густое стояніе сравнительно болѣе слабыхъ растений превосходило извѣстный предѣлъ) питательныхъ веществъ, образовать такое же количество растительной массы и также сильно отнять почву (въ видахъ заглушенія сорныхъ травъ), какъ и вдвое большее число слабыхъ растений, занимающихъ каждое вдвое меньшее пространство. Но усиленное развитіе растения, которое можно вызвать рѣдкимъ стояніемъ, имѣетъ предѣлы, полагаемый отчасти природой растений, отчасти цѣлью воздѣлыванія растений. Такъ, усиленное кущеніе хлѣбовъ *) можетъ вызвать съ одной стороны нежелательное вовсе для хозяйства запаздываніе и даже ослабленіе въ образованіи плодовъ, семянъ; съ другой — ослабленіе стеблевыхъ частей и коленіе растений, вслѣдствіе того, что образовательныя вещества, вмѣсто того, чтобы идти на образованіе плодовъ, семянъ или на утолщеніе клубочныхъ стѣночекъ прежде образовавшихся стеблевыхъ частей (побѣговъ), идутъ на образованіе новыхъ стеблевыхъ частей (побѣговъ вѣтвей). Или, у льна, воздѣлываемаго на волокно, желательно возможное ограниченіе вѣтвенія, а у сахарной свекловицы — ограниченіе развитія корня до извѣстной величины, а потому во первыхъ, нельзя вообще переступать разрѣженія растений, или нельзя уменьшать количества высѣваемыхъ на десятину семянъ дальша извѣстнаго предѣла, несмотря на плодородіе почвы; во вторыхъ же, у такихъ растений, какъ сахарная свекловица, ленъ, воздѣлываемый на волокно, въ видѣ исключенія изъ общаго правила, слѣдуетъ на плодородныхъ почвахъ дѣлать посѣвы даже до извѣстной степени гуще čímь на тощихъ, дабы этимъ поддѣвать въ нихъ вызываемое плодородіемъ почвы стремленіе у свекловицы увеличить корень, у льна — вѣтвиться.

Въ помѣщенной ниже таблицѣ приведены опыты среднія относительно высѣваемыхъ на десятину количествъ семянъ различныхъ растений. Если, подтвердивъ эти среднія среднимъ числомъ растений, которое приходится, скажемъ, на квадратный аршинъ поля въ годъ средней урожайности, измѣнить ихъ сообразно съ указанными выше обстоятельствами, то можно довольно вѣрно опредѣлить количество семянъ, которое должно быть высѣваемо на десятину въ данной мѣстности.

Успѣхъ будущаго урожая много зависитъ оттого, какъ *выполняется* самый посѣвъ, т. е. какъ *распредѣляется* по полю и при-

*) Конечно, болѣе еще отъ несоответственнаго состоянія почвы, отъ большаго недостатка влаги и удобоусвояемаго азота.

крывается землей назначенное на десятину количество семянъ. Чímь равномернѣе распределяются и прикрываются семена на надлежащую, соответствующую обстоятельствамъ глубину, тѣмъ обезпеченнѣе хорошій урожай. Высшее, чего можно достигнуть въ отношеніи равномерности распредѣленія семянъ, заключается въ томъ, чтобы всѣ всхожія и здоровыя семена лежали на полѣ въ равномъ отъ другаго разстояніи, посреди той площади, которой требуетъ растение для полнаго развитія своей особи; потому что, въ этомъ случаѣ, поле, при затратѣ возможно малаго количества семянъ, занимается возможно большимъ числомъ пестящихъ другъ друга растений, которыя свободно и возможно полно пользуются питательными веществами почвы, воздухомъ и свѣтомъ. Но, въ крупной практикѣ такое высшее достижимо лишь въ рѣдкихъ случаяхъ, болѣе же частію приходится, на путѣ къ нему, довольствоваться распредѣленіемъ семянъ, при которомъ на каждую изъ сравнительно малыхъ долей (напр. на каждыи ки. футъ) общей полевой площади приходится возможно одинаковое число семянъ.

Семена распределяются по полю или посѣвъ производится тремя образамъ: *въ разбросъ* — безъ опредѣленнаго разстоянія между отдѣльными зернами; *рядами* — съ опредѣленнымъ разстояніемъ между зернами въ одномъ лишь направленіи, а именно: между рядами зеренъ; или *гнѣздами* — съ опредѣленнымъ по всѣмъ направленіямъ разстояніемъ между отдѣльными зернами на полѣ. Какъ при *посѣвѣ въ разбросъ*, такъ и при *рядовомъ* и *гнѣздовомъ* (кустовомъ) посѣвѣ (*посадкѣ*) семена могутъ распределяться по полю руками или машинами. Иначе, посѣвъ можетъ быть *ручной* или *машинный*.

Сѣяльныя машины представляютъ два главныхъ различія:

I. Барабанныя сѣялки (системы Вилліамсона) съ однимъ или нѣсколькими движущимися во время движенія сѣялки, вращающимися около своей оси, короткими, цилиндрико-коническими сѣменными ящичками (рис. 215), съ отверстіями на цилиндрической поверхности ящика, которые могутъ измѣняться въ своей величинѣ помощью передвижной кольчатой пластинки съ отверстіями же, и безъ прибора, регулирующаго выходъ семянъ изъ ящика (Потенгеймова рапсовая рядовая сѣялка о трехъ барабанахъ, которой при 2 хъ часахъ и 1 лошади можно засѣять отъ 2¼ до 3¼ дес.).




Рис. 215.

II. Сѣялки съ остающимися въ почвѣ во время движенія сѣялки, недвижущимися сѣменными ящичками; между этими сѣялками, въ свою очередь, можно различить:

1) *Швырляки* — сѣялки безъ регулирующаго выходъ семянъ изъ ящика прибора внутри сѣменнаго ящика, изъ котораго семена высыпаются адѣсь

через отверстие въ передней *) стѣнкѣ ящика, изменяющееся въ своей величинѣ помощью задвижки, и, попадая въ вращающуюся воронку (шпиралка Кахуна, насаждающаяся на грудь сѣвца) или на вращающийся кругъ (шпиралка Штеккера, двигается лошадию впередъ собой), распределяются по полю въ разбросъ помощью центробѣжной силы, съ высоты отверстия въ ящикѣ.

2) Сѣялки съ *регулирующими* выходами сѣмянъ изъ сѣменнаго ящика *приборами* внутри сѣменнаго ящика, расположенными на оси, проходящей черезъ ящикъ, по его длинѣ, въ определенномъ отъ другаго разстояніи. Эти сѣялки различаются далѣе на два рода, смотря по тому,

А. Находятся ли регулирующие приборы *надъ* отверстиями въ днѣ суживающагося внизу ящика или *позади* отверстій въ задней стѣнкѣ ящика. У этихъ сѣялокъ: ящики объ одномъ или двухъ отдѣленіяхъ, изъ которыхъ въ послѣднемъ случаѣ, одно (верхнее) назначается для насыпанія сѣмянъ, а въ другомъ (нижнемъ), отдѣляющемся отъ верхняго перегородкой, помѣщается регулирующий приборъ (разбросная сѣялка Эккерта, рис. 216 — поперечный разрѣзъ). Кроме того, ящикъ раздѣляется поперечными перегородками на малыя, суживающіяся ко дну отдѣленія, изъ коихъ въ каждомъ отдѣленіи помѣщается по одному регулиющему прибору (рис. 217 — продольный разрѣзъ разбросной сѣялки Эккерта), для того чтобы около этого послѣдняго собрать по возможности больше зерна. Сѣмена выпускаются въ низшія (рис. 217) или выбрасываются въ боковыя отверстия (шотландская клеверная




Рис. 216.




Рис. 217.

сѣялка рис. 218). Отверстія изменяются въ своей величинѣ помощью одной общей задвижки или отдѣльныхъ задвижекъ, приводимыхъ въ движеніе каждая сама по себѣ или всею вѣстѣ; первое и послѣднее предпочтительнѣе

*) Передъ и задъ у сѣялки мы различаемъ по движенію; первый обращенъ въ сторону движенія, второй — въ противоположную сторону движенія.

второму, потому что дѣлается съ большими простотой и правильностію. Регулирующіе приборы могутъ быть:

а) *щетки* (рис. 219 — шотландская клеверная сѣялка), которыя продавливаютъ сѣмена въ боковыя отверстия (рис. 218), и пучковатая или состоящая изъ рядовъ щетинъ вдоль оси валика съ углубленіями между рядами (сѣялка Греневитцаго), которыя высипаютъ сѣмена въ нижнія отверстия.

б) *лопатчатые валики* (рис. 220) съ металлическими (сѣялка Робиллара) или кожаными лопатками, которыя выбрасываютъ сѣмена въ боковыя или высипаютъ въ нижнія отверстия.

в) *кружки* (Самса, рис. 221, Эккерта разбросная сѣялка) — чугуныя волнообразно изогнутые кружки, при вращеніи своемъ, сдвигаютъ зерно постоянно то въ одну, то въ другой сторонѣ нижнихъ отверстій.

г) *ячеистые валики* (Дукета, рис. 222) — деревянные съ различнаго вида и различной величины углубленіями на своей поверхности. Валики, при своемъ вращеніи, забираютъ въ свои углубленія сѣмена и высипаютъ ихъ въ




Рис. 218.



Рис. 219.




Рис. 220.




Рис. 222.




Рис. 221.

нижнія отверстия ящика, пройдя прежде подъ щеткой (рис. 222), которая прижимается къ валику помощью вѣнта и какъ гребло сгребаетъ съ углубленія валика все то, что не вровень съ его краями (сѣялка Альбана). Деревянные валики закрѣпляются иногда чугуными, а щетки — воробьями, въ которыхъ помѣщаются валики и у которыхъ подвижныя два прижимаются къ

жалками пружинами (сѣялки Торна, Древица). Для того же, чтобы избежать необходимости имѣть валки съ различными углублениями для различной величины сѣмянъ и различныхъ количествъ ихъ, въставляемыхъ на десятину, дѣлаются также составные валки (приборы Азбуна, Кейлера у шведскихъ сѣялокъ) изъ двухъ сдвигающихся и раздвигающихся частей, которыми, сдвигаясь, уменьшаютъ а, раздвигаясь, увеличиваютъ отверстія образуемаго ихъ соединеніемъ валка *).




Рис. 223.

жесть, приводимыхъ въ движеніе каждая отдѣльно или все вмѣстѣ заразъ. Регулирующіе приборы бываютъ:




Рис. 224.

а — для бобовъ, ячменя, пшеницы; б — для гречихи; в — для овса; г — для кукурузы; д — для пшеницы; е — для конскихъ бобовъ).

В. ложки (рис. 225) — устроенныя съ двухъ сторонъ шайбы, такъ что каждая шайба, вращаясь, поднимаетъ и высылаетъ сѣмена заразъ въ двѣ воронки (сѣялки Гаррета, Смита, Горисби, Кеммерера *). Чтобы можно было одними и тѣми же ложками высылать различной величины сѣмена, употреб-

*) Къ этой же группѣ II. 2. А. принадлежатъ сѣялки американскаго происхожденія съ двигающейся взадъ и впередъ, предохраненной дощечкой нитъ почти невстрѣчающіеся сѣялки Никольсона и Ньютона.

*) Къ этой группѣ II. 2. Б. принадлежатъ употребляющіеся нитъ въ Америкѣ сѣялки Брауна, Сеймура, которые въ Европѣ почти неупотребляются.

ляютъ Симтовскія двойныя ложки, которыя съ задней стороны имѣютъ меньшей величины углубленія. Перевернувъ ось съ ложечными приборами, можно помощью малыхъ дощечныхъ углубленій разбрасывать такіа малыя сѣмена, какъ сѣмена рапса, клевера и т. д.

Изъ всѣхъ этихъ видовъ регулирующихъ приборовъ наиболее просты, прочны и наилучше регулируютъ выходъ сѣмянъ изъ ящика черпальныя колеса и дощечки. За этими послѣдними слѣдуютъ ачестые валки, у которыхъ, впрочемъ, регулированіе выхода сѣмянъ страдаетъ много оттого, что деревянные валки и щетки быстро стираются, а пружины, придавливающія металлическія коробки къ металлическимъ же валкамъ ослабѣваютъ. Лопаточные валки и кружки, несмотря на ихъ простоту, представляютъ то неудобство въ регулированіи выхода сѣмянъ изъ сѣменнаго ящика, что не устраняютъ вреднаго вліянія на правильность выхода сѣмянъ сотрясеній сѣялки, неизбежныхъ и особенно сильныхъ при неровной пахотѣ, которая заурядъ встрѣчается у насъ; кромѣ того лопаточные валки, при выбрасываніи сѣмянъ въ боковыя отверстія, обдираютъ зерно. Наконецъ, безспорно, хуже другихъ приборовъ регулируютъ выходъ сѣмянъ щетки, потому что трудно получить одинаковой упругости щетину, да и щетина легко измѣняетъ свою упругость, вслѣдствіе поглощенія влаги изъ воздуха и сѣмянъ, наконецъ, потому что щетина легко стирается, а между щетиной набивается зерно, особенно у круглыхъ щетокъ.

Къ группѣ I принадлежатъ преимущественно рядовыя сѣялки, т. е. которыми посѣвъ производится въ рядъ. Къ группѣ II. 1 — исключительно разбросныя, т. е. которыми посѣвъ производится въ разбросъ. Къ группѣ II. 2. А. — преимущественно разбросныя, рѣже рядовыя и гнѣздовыя, т. е. которыми посѣвъ производится въ гнѣзда (II. 2. А. г.). Къ группѣ же II. 2. а. Б. — преимущественно рядовыя и гнѣздовыя, рѣже разбросныя.

У нитъ употребляющихся разбросныхъ сѣялокъ всегда одинъ сѣменной ящикъ различныхъ, во всякомъ случаѣ значительныхъ длины и широты, которая, однако, не должна претупать извѣстнаго предѣла: 12 футовъ черпала и 6 четвериковъ вторая; потому что, и при одинаковой широтѣ, сѣялки съ болѣе длиннымъ ящикомъ, имѣютъ болѣе широкій ходъ, слѣдовательно тяжелѣе на ходу; требуютъ болѣе частыхъ остановокъ, для насыпки зерна и, наконецъ, требуютъ болѣе длинныхъ осей для регулирующихъ приборовъ, чѣмъ сѣялки съ менѣе длиннымъ ящикомъ. Последнее неудобство длинныхъ ящиковъ вынуждаетъ дѣлать составныя оси, которыя, при легко возможной не правильности ихъ положенія и вращенія, могутъ сдѣлать неправильными положеніе и вращеніе самаго регулирующаго прибора. Если же для избѣжанія втораго неудобства увеличить широту длиннаго сѣменнаго ящика, то сѣялка сдѣлается грузнѣе, будетъ сильнѣе, вслѣдствіе этого, уходитъ въ землю колесами и потребуетъ большаго для ея движенія усилія. Въ видахъ же уменьшенія грузности сѣялки крышка ящика должна быть возможно легкая, лишь бы она защищала зерно отъ непогоды; а для предупрежденія расхвѣтанія сѣмянъ, она должна быть на замкѣ.

У сѣялки, для передвиженія ея и для приведенія въ движеніе регулирующаго прибора, имѣются обыкновенно два *подвижныхъ* колеса. Чѣмъ большаго онѣ диаметра, чѣмъ выше онѣ, тѣмъ легче сѣялка на ходу, а чѣмъ шире ихъ ободы, тѣмъ менѣе уходитъ сѣялка въ рыхлую землю колесами. Хорошо, особенно въ нѣсколько сырое время на черномысляхъ почвахъ, если при каждомъ колесѣ есть скребки для очистки настилающей земли. Весьма удобно для перевозки сѣялокъ по узкимъ дорогамъ, если ходовыя колеса, помѣщающіяся на концахъ ящика, могутъ быть сдвинуты и надвѣваемы на ось, продѣтую сквозъ ящикъ поперекъ его и по срединѣ его длины (рис. 225 — разбросная сѣялка Экверта, установленная для перевозки).




Рис. 225.

Для выпряжки лошадей у разбросных сѣялок имѣются обыкновенно олобаны, рѣдко дышло, рѣзвѣ у очень грузныхъ машинъ. Олобаны должны быть укрѣплены въ стѣнкѣ ящика настолько прочно, чтобы сѣялка во время работы не виляла, лучше всего вставки ихъ напр. въ чугунныя трубки на стѣнкѣ и связкой ихъ со стѣнкой непрѣменно помощію желѣзныхъ и деревянныхъ, но не кожаныхъ гужей.

У разбросныхъ сѣялокъ, за исключеніемъ шнурялокъ, сѣмена, выходящія изъ сѣменнаго ящика, подаются или прямо на землю, особенно если ящикъ очень близокъ къ землѣ, или же сперва на распределительную доску длины одинаковой съ данною ящика, а ширины такой и подвѣшенную такъ, что верхнимъ краемъ она подходитъ подъ отверстіе, изъ которыхъ выпадаютъ сѣмена, а нижнимъ спускается къ землѣ, не доходя до ея поверхности вершка на 2 и въ вѣкомъ случаѣ не больше 4-хъ, и можетъ быть наклонена болѣе или менѣе назадъ, другими словами, приподнята за нижній край. Доски зацѣпляютъ падающія на землю сѣмена отъ разноса ихъ вѣтромъ и замедляютъ ихъ паденіе болѣе или менѣе, смотря по наклону: болѣе при большемъ и менѣе при меньшемъ наклонѣ. Но она дѣлаетъ это недостаточно, для болѣе равномернаго распределенія сѣмянъ, если она гладкая (сѣялка Ливальона и Рау), а потому поверхность ея усаживаютъ деревянными треугольниками (сѣялка Альбана) или желѣзными шпильками въ известномъ порядкѣ (сперва трехъ-угольными, а трехъугольниками въ шахматномъ порядкѣ—сѣялка Греневичкаго), которые не только замедляютъ движеніе сѣмянъ по доскѣ, но и способствуютъ болѣе равномерному распределенію сѣмянъ, по крайней мѣрѣ, пока доска и сѣмена не смачиваются дождемъ; а чтобы дождь не препятствовалъ распределенію сѣмянъ, покрываютъ распределительную доску другою доской, такъ что сѣмена, пада на землю, проходятъ между двумя досками, соединенными шпильками (рис. 225).

Количество разбрасываемыхъ на десятину сѣмянъ пзмѣняется, т. е. увеличивается или уменьшается у разбросныхъ сѣялокъ преимущественно уменьшеніемъ или увеличеніемъ отверстій, черезъ которыя сѣмена выходятъ изъ ящика на доску (сѣялки Греневичкаго и Эвкорта) или черезъ которыя сѣмена выходятъ изъ верхняго отдѣленія въ нижнее (сѣялка Шнейтлера), или, что рѣже, увеличеніемъ или уменьшеніемъ скорости вращенія регулирующаго прибора; а именно перемѣной зубчатокъ, находящихся на концѣ оси регулирующаго прибора и зацѣпляющихся съ зубчатой ступицей ходоваго колеса, и подшипниковъ, въ которыхъ вращается ось приборовъ (сѣялка Кемерера). Выбрасываніе же зерна у этихъ сѣялокъ прекращается

или одновременнымъ закрытіемъ отверстій, черезъ которыя выходятъ сѣмена (сѣялки Греневичкаго и Эвкорта), или разцѣпленіемъ зубчатки оси регулирующаго прибора съ зубчатой ступицей ходоваго колеса, что исполняется или помощію рычага, поднимающаго сѣменную ащикъ (сѣялка Греневичкаго) или отодвиженіемъ зубчатки оси въ сторону, что менѣе удобно, потому что не можетъ быть произведено такъ быстро какъ первое.

У рядовыхъ и гнѣздовыхъ сѣялокъ ящики гораздо короче и меньшей выстѣмости, длина ихъ обыкновенно въ 6—6½ не болѣе 7 футовъ *), а емкость въ 3—4 четверика. Кромѣ ходовыхъ колесъ у этихъ сѣялокъ имѣется еще передокъ; безъ этого послѣдняго невозможно правильное движеніе сѣялки, при которомъ сѣялка двигалась бы всегда однимъ изъ ходовыхъ колесъ по старому сѣлду, какъ это нужно, для того чтобы поле было обсеменено параллельными, одинаково отстоящими другъ отъ друга рядами. Помощію прицѣпленныхъ въ передку рукоятокъ или рычаговъ, скрѣпленныхъ съ передкомъ (сѣялка Сакка), работникъ, въ первомъ случаѣ, находящійся у передка, во второмъ у рычага сзади сѣялки, можетъ отклонять передокъ, а слѣдовательно и сѣялку, съ которою первый скрѣпленъ помощію бруска въ срединѣ и цѣпей (по бокамъ), влѣво или вправо.

У рядовыхъ и гнѣздовыхъ сѣялокъ сѣмена, выходящія изъ ящика, падаютъ на землю отдѣльно изъ каждого отверстія, проходя по особому, подвѣшенному къ каждому отверстию сѣмянному (см. рис. 226 *) въ земля-




Рис. 226.

*) Сѣялка Зидерелебека въ Германіи, впрочемъ, имѣетъ ящикъ длиной въ 12 саженокъ суг.

*) Поверхный развѣзъ рядовой сѣялки Гаррета. А—передокъ; В—сѣмен-
ной ящикъ: а—отдѣленіе для насыпанія сѣмянъ, d—помѣщеніе регулирующаго
прибора, e—шайба съ ложечками, f—сѣменная воронка, g—шайба для за-
пирания отверстія воронки h, и—зубчатое зацѣпленіе, cc'—сѣмянный проводъ; ii—
направляющіе одна въ другую воронки, kk'—конечная труба сѣмянного




Рис. 227.

ную бороздку, открываемую сошниками (II'), въ которые входят сѣмяпровода нѣжными, конечными своими трубками (KK'). Лучшими сѣмяпроводами считаются, такъ называемые *телескопическіе*, состоящие изъ нѣсколькихъ жестяныхъ трубокъ, соединяющихся съ конечной трубкой помощью шарового сочлененія (рис. 227*) или же состоящие изъ трехъ трубокъ, соединяющихся между собой посредствомъ расширеній, позволяющихъ всему сѣмяпроводу сдвигаться свободно въ сочлененіяхъ. Лучшей формой сошника считается закругленная, выпуклая спереди (II'—рис. 226), потому что въ такомъ случаѣ всѣ незначительныя препятствія, какъ-то: камешки, остатки живыхъ, корни и т. д., понавъ подъ сошникъ, проскользнутъ подъ нимъ, не жѣлая работѣ. Сошники, выпуклые спереди на подобіе лапъ скоропашин, лучше забираютъ въ землю, рылать ее, извлекаютъ изъ нея корни, живые; но зато требуютъ болѣе частыхъ остановокъ для очищенія отъ застрявшихъ между ними живыхъ, корней и т. д., которое производится имѣющимися при сѣялкѣ скребкомъ въ видѣ длинной палки съ желѣзнымъ наконечникомъ. У сѣялокъ, назначаемыхъ для посѣва мелкихъ сѣмянъ, напр. клевера, льна (сѣялка Смита), употребляются сошники, раздѣленные на 2, 3 и болѣе отдѣленій, которые, раздѣлая попадающія въ пахъ сѣмена, на двое, на трое и т. д., укладываютъ ихъ въ землю вмѣсто одной въ 2, 3 и болѣе бороздокъ, смотря потому, какъ близко могутъ или должны быть бороздки одна къ другой. Сошники прикрѣпляются обыкновенно къ рычагамъ (м. рис. 226), которые однимъ концомъ прикрѣпляются подвижно (около точки и) къ общему брусу, находящемуся подъ ящикомъ; между тѣмъ какъ на другой, свободный конецъ ихъ напѣшивается грузъ о, для удержанія сошниковъ въ землѣ, несмотря на встрѣчающіяся въ почвѣ небольшія сопротивленія**). Увеличивая

грузъ о, можно заставить сошники уходить глубже въ землю и наоборотъ. При необходимости въ маломъ разстояніи между бороздками, которыми

II'—сошники, и—рычагъ, вращающійся около точки и, къ которому прикрѣплены сошники, о—грузъ, р—стойка для прикрѣпленія рычага, qq'—приспособленіе для наклоненія ящика, r—рукоятка ворота для подъема сошниковъ, r'—рычагъ для остановки вращенія ворота, s—воротъ, t—рычагъ для расклиненія зубчатокъ и приостановки выхода сѣмянъ изъ ящика.

*) Продольный разрѣзъ Смитоваго телескопическаго сѣмяпровода: а—трубка, выходящая сѣмя изъ сѣмяннаго ящика, б'б'б'—трубка съ двойной стѣной, въ которую вдвигается трубка б'б', с—шаровое сочлененіе, д—поперечный разрѣзъ рычага, поднимающаго сошникъ в.

**) Иногда, впрочемъ, напѣшивается грузъ и на другой конецъ рычага, который въ такомъ случаѣ продолжается за точку и, для того чтобы противодействовать, напротивъ, большому углубленію въ особенности тяжелыхъ сошниковъ въ землю.

проводятся сошниками, сошники располагаютъ не въ одинъ, а два ряда для того чтобы увеличить между ними разстояніе и избѣжать черезъ-то забиванія промежутокъ между ними. Всѣ рычаги подняты помощью дѣйствія въ деревянномъ валу (s), который можетъ быть вращаемъ посредствомъ крестовины (r), для того чтобы, наворачивая дѣйствіе на валъ, вынимать сошники изъ земли при прекращеніи разсѣва. Въ рядовой сѣялкѣ, которая должна употребляться для разсѣва сѣмянъ различныхъ растений, необходимо измѣненіе разстояній между сошниками, слѣдовательно измѣненіе числа сошниковъ при данной ширинѣ сѣялки. При ширинѣ рядовой сѣялки отъ 6 до 12 фут. число сошниковъ или, что тоже, число забираемыхъ рядовъ, можетъ измѣняться отъ 3 до 28. При обыкновенной ширинѣ сѣялки въ 6 фут. число рядовъ можетъ измѣняться отъ 3 до 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17, съ разстояніемъ между рядами отъ 18 до 4 дюйм., при этомъ средній сошникъ остается всегда на своемъ мѣстѣ, между тѣмъ какъ въ обѣ стороны отнимается по одному сошнику; остальные размѣщаются на брусѣ, къ которому прикрѣпляются рычаги, несущіе сошники, въ новомъ, соответствующемъ новому числу сошниковъ, разстояніи одинъ отъ другаго; при чемъ должно имѣть въ виду, что разстояніе между среднимъ крайняго сошника и серединой обода ходоваго колеса должно быть равно половинѣ разстоянія между серединами двухъ смежныхъ сошниковъ, для того чтобы между крайними бороздами двухъ смежныхъ проходовъ сѣялки было тоже разстояніе, что и между бороздами одного и того же прохода, если только ходовое колесо идетъ по слѣду ходоваго колеса предыдущаго смежнаго прохода*). Для правильной разстановки сошниковъ, при требуемомъ числѣ рядовъ, хорошо имѣть *расчерченную доску*, на которой чертами назначено то разстояніе рядовъ, которое должно быть при извѣстномъ числѣ сошниковъ. Отнявъ сошники, слѣдуетъ въ тоже время закрыть отверстія соответствующихъ воронокъ помощью особыхъ имѣющихся для того клапановъ (g рис. 226) въ сѣялкахъ группы II. 2. Б., или помощью особой задвижки закрыть соответствующія выходныя изъ сѣмяннаго ящика отверстія въ сѣялкахъ группы II. 2. А.

У гнѣздовыхъ сѣялокъ выдѣленіе сѣмянъ черезъ нѣкоторые промежутки времени, такъ чтобы они разстились въ землѣ въ параллельныхъ на извѣстное разстояніе удаленныхъ одна отъ другой бороздкахъ въ одинаковомъ кучка отъ кучки разстояніи, достигается или тѣмъ, что регулирующія выходъ сѣмянъ черпающія колеса снабжаются на ихъ окружности углубленіями на значительно большихъ, чѣмъ для ряднаго посѣва, разстояніяхъ одно отъ другаго (d. рис. 224), и окружаются по ободу (гнѣздовая сѣялка Купера), почти до обращенной къ землѣ нижней части его, шиномъ, которое

*) Впрочемъ, если ширина хода сѣялки (разстояніе между серединами ободовъ) не представляетъ кратнаго разстоянія между рядами (серединами сошниковъ), то одинаковости разстоянія между крайними бороздами двухъ смежныхъ проходовъ сѣялки съ разстояніемъ между рядами одного прохода можно достигнуть, если у машинъ передокъ съ извѣняющей шириной хода (раздвигная ось, такъ что одно изъ колесъ, двое, можетъ быть подаваемо болѣе или менѣе вѣзо). Для опредѣленія ширины передка, въ такомъ случаѣ, можетъ служить формула: $\frac{1}{2} v = a + b - (c + d)$, въ которой $\frac{1}{2} v$ — половина ширины хода передка, считая отъ внутренняго края обода; а — разстояніе послѣдняго сошника, который можетъ быть еще помѣщенъ при желаемомъ разстояніи между рядами, отъ середины ширины машинъ; б — разстояніе между рядами; с — разстояніе послѣдняго сошника отъ внутренняго края ходоваго колеса, и d — ширина обода ходоваго колеса. Передокъ долженъ быть направленъ такъ, чтобы внутренній край колеса передка приходился по слѣду наружнаго края ходоваго колеса.

не позволяют сѣменам выпадать из углублений преждевременно. Или же рядовые сѣялки (гнѣздовые сѣялки Сакка, Циммермана), помощью особенных, открывающихся автоматически через известные промежутки времени клапанов или задвижек въ сѣяпроводахъ, превращаются въ гнѣздовые сѣялки.

Количество*) зерна, выбрасываемое сѣялкой на десятину, иначе густота посѣва регулируется измѣненіемъ величины отверстій, проводящихъ зерно изъ верхняго—передняго въ нижній—задній ящикъ (стр. 736), измѣненіемъ зубчатки на концѣ оси регулирующихъ приборовъ и соответствующаго подлинника (стр. 736) и наклоненіемъ сѣменнаго ящика назадъ или впередъ (помощію винта *qq'*—рис. 226). Увеличеніе отверстій, уменьшеніе шестерни (сѣдовательно ускореніе вращенія регулирующаго прибора) и наклоненіе ящика назадъ увеличиваютъ количество зерна, разбрасываемаго на десятину, и наоборотъ. Возможность наклоненія ящика весьма важна при обмѣненіи полей мѣстностей, потому что позволяетъ парализовать вліяніе на густоту посѣва наклоненія ящика въ ту или другую сторону, вслѣдствіе покатости или наклоненія его въ противоположную сторону помощью винта. Кроме того возможность наклоненія ящика назадъ удобна для очистки ящика отъ сѣмянъ по окончаніи посѣва. Выссыпаніе сѣмянъ сѣялкой приостанавливается или возобновляется расцѣпленіемъ или сѣчленіемъ зубчатки оси регулирующаго прибора съ зубчаткой ходоваго колеса помощью рычага, которымъ приподнимается ящикъ (*t*—рис. 226).

Къ рядовымъ и гнѣздовымъ сѣялкамъ прилагаются иногда части для одновременнаго съ сѣяною разбѣла порохобразныхъ (рядовая сѣялка Горисби) туковъ, которые падаютъ въ тѣ же борозды или лунки, что и сѣмена.

Рядовая сѣялка, какъ мы видѣли, можетъ, при известныхъ приспособленіяхъ, служить въ тоже время и для гнѣздоваго посѣва. Конечно, было бы удобно и такое приспособленіе сѣялокъ, которое позволяло бы употреблять ихъ какъ рядовыя и разбросныя, но попытка такого приспособленія пока еще неудачалась успѣхомъ.

*) Установка сѣялки для разбѣла известнаго количества сѣмянъ на десятину, если нѣтъ указателя для этого въ видѣ косячной таблицы или на самой сѣялке (напр. у разбросныхъ сѣялокъ—Гренивцаго—вытѣснѣ дуга, по которой двигается рукоятка, приводящая въ движеніе закрывающую выходныя изъ ящика отверстія подосну, и на которой вытѣснѣ градусы указаны количества сѣмянъ, разбрасываемыхъ сѣялкой на десятину при томъ или другомъ положеніи рукоятки, а сѣдовательно и полоски), или проверка посѣвной таблицы производится слѣдующимъ, одинаковымъ какъ для разбросныхъ, такъ и для рядовыхъ сѣялокъ, образомъ. Положимъ, что нужно проверить разбросную сѣялку шириной 10 фут. съ ободными колесъ 10 фут. по окружности, которая, сѣдовательно, при одномъ оборотѣ колеса, засѣваетъ 100 кв. фут., нужно же, чтобы сѣялка засѣвала 2 четверти осы на десятину. Въ такомъ случаѣ берутъ 4 четверта для $\frac{1}{4}$ десят., засѣваютъ ихъ въ ящикъ (предварительно насыпавъ его въ то отдѣленіе, гдѣ находится регулирующий приборъ, для того чтобы отнѣренное количество зерна могло сподна высѣяться) и ставятъ сѣялку на подставку такъ, чтобы ходовыя колеса были на вѣсу; затѣмъ вращаютъ колесо столько разъ, сколько оно должно сдѣлать оборотовъ на пространствѣ $\frac{1}{4}$ десят., сѣдовательно 294 разъ въ приведенномъ случаѣ ($\frac{1}{4}$ десят. = 29,400 кв. фут.). Если при такомъ числѣ оборотовъ колеса, выссыпанется всѣ 4 четверта осы, значитъ установка сѣялки вѣрна, или показаніе таблицы вѣрно. Въ противномъ случаѣ слѣдуетъ уменьшить или увеличить отверстія или скорость вращенія регулирующаго прибора.

Сѣялки, за исключеніемъ швырляки Кахуна (стр. 732) и бордоской сажалки Аригейтера, устраиваются большей частью для всной тяги; имѣются однако и рядовыя сѣялки для тяги людьми (напр. 4 рядныя сѣялки Сакка (стр. 276) для тяги 1—2 человекъ, п. 24—44 талера на мѣстѣ).

Лучшими сѣялками считаются: изъ разбросныхъ: 1) Эккерта (рис. 226. II. 2. А. в.), шир. сѣялки 12 фут., окружн. обода—12 $\frac{1}{4}$ фут., вѣсъ—20 пуд., Коммисс. Работн. (стр. 274), цѣна 120—130 руб. 2) Шнейтлера (II. 2. Б. в.), ш. 1 $\frac{1}{2}$ фут., в. —16 пуд., Коммисс. Раб., п. 140—146 руб. 3) Кеммера (II. 2. Б. в.), ш.—8, 10, 12 фут., в.—20 пуд., Рансомъ (стр. 274), п.—160, 180, 200 руб. сообразно ширинѣ. 4) Гренивцаго (II. 2. А. а.), ш.—10 фут., в.—12 пуд. Коммисс. Раб. п. 90—85 руб. 5) Шотландская для мелкихъ сѣмянъ кормовыхъ травъ (II. 2. А. а.), в.—2 $\frac{1}{2}$ фут., ручная; Коммис. Раб. 30—32 руб. Изъ рядовыхъ (рис. 228. сѣялка Гаррета);




Рис. 228.

1) Шнейтлера „Викторія Дрилл“ (II. 2. Б. в.), ш.—6 фут., число рядовъ—11, 13 и 15, в.—32, 34 и 36 пуд. Ком. Раб., п.—250—265, 270—285 и 290—305 руб. 2) Эккерта (II. 2. Б. в.), ш.—6 фут., 13 ряд., п. 190 тал. (стр. 276). 3) Сакка (II. 2. А. д.), ш. 4, 5, 6, 7 фут. и различн. число рядовъ, п. на мѣстѣ 7 фут. —200, $\frac{6}{15}$ —185 и $\frac{4}{9}$ —125 талеровъ (стр. 276). 4) Циммермана, въ Галле, [II. 2. Б. в. (№ 2) и в(№ 1)], ш.—6 фут.; 11, 14 и 16 ряд., п. № 1—190, 203 и 220, № 2—160, 175 и 185 талеровъ. 5) Кн. Васильчикова (II. 2. Б. в.), ш.—6 фут., 12 ряд., п. 250 руб. (стр. 282). 6) Хуторская (II. 2. Б. в.), ш.—7 фут., 14 ряд., п. 220 руб. (стр. 276). Изъ гнѣздовыхъ: 1) Кулера, въ Вѣнѣ, 5 ряд., п. 340 гульд. и Кутиера, у Эйхмана, въ Прагѣ, 4 ряд., п. 400 гульд., обѣ исключительно для гнѣздоваго посѣва: первой годна и для смогуд., обѣ исключительно для гнѣздоваго посѣва: увеличивающимъ цѣнность первой на 60, а второй—на 20 руб.

Разбросными сѣялками—кошными: въ 12 фут. ширины можно засѣять въ день при 1 работѣ и одной лошади отъ 10 до 12 десят., если почва суха, иначе 6—8 десят., въ 10 фут. ширины—7—9 или 5—6 десят. Ручной (шотландской, для мелкихъ сѣмянъ)—6 десят. Рядовыми сѣялками 6 фут. или

рины, при 2 работн., 1 полуработн. и 2 лошади, отъ 4 до 5 озимаго и отъ 3 до 4 десят. яровато. Переменные лошади увеличиваютъ производительность: разбросной съ 10—12 до 12—14 или съ 7—9 до 8—10 десят.; рядовой же съ 4—5 до 6 и съ 3—4 до 4½—5 десят.

Рядовая сѣялка Савка можетъ быть: а) приспособлена для одновременнаго посѣва сѣмянъ кормовыхъ травъ, для чего въ передку приспособляется разбросная сѣялка, приводимая въ дѣйствіе одновременно съ главной сѣялкой и управляемая работникомъ помощью рычага, скрѣпленнаго съ передкомъ; б) превращена въ машину для разброски удобреній, для чего отнимаются шпиль и сошники и на ихъ мѣсто привкрывается другой правбортъ; в) въ многорядную конную мотыгу (стр. 312, рис 89); г) въ многокорпусный окучникъ (стр. 283) и д) культиваторъ (экстирпаторъ).

Посѣвъ въ разбросъ производится болѣею частью руками.

Сѣвель, производящій посѣвъ въ разбросъ, имѣя сѣмена при себѣ въ *рудинѣ* (холщевомъ мѣшкѣ) или *сѣялкѣ* (лубной или плетеной изъ соломы, ивы), привкрѣпленныхъ къ нему немного повыше пояса, захватываетъ болѣе крупныя сѣмена (напр. ржи) въ горсть въ болѣе или меньшемъ количествѣ, болѣе же мелкія (напр. клевера) въ щепоть и, подвигаясь равномернымъ шагомъ впередъ, разбрасываетъ ихъ съ высоты груди, или одной правой рукой (у насъ), къ тому же все прямо передъ собой, или поворачиваясь нѣсколько то вправо, то влево, или обѣими руками, выпуская сѣмена изъ горсти, или щепоти, постепенно, а не вдругъ, съ каждымъ новымъ шагомъ или же черезъ шагъ. Смотря по тому, такъ или иначе выполняется посѣвъ въ разбросъ, поле обсеивается болѣе или менѣе равномерно, болѣе или менѣе густо, болѣе или менѣе широкими полосами, *лѣгами* (изъ 1, 2, 3 сажени). Чтобы не обсеивать одного и того же мѣста два или нѣсколько разъ, если поле вспахано ровно, безъ разъемныхъ бороздъ (стр. 447), обсеиваемая лѣха отдѣляется отъ необсеиваемаго еще воля пучками соломы, втыкаемыми въ землю по всей границѣ лѣхи, или же втыканіемъ навозныхъ вилъ съ наведенной на ихъ рукоятъ соломой. А при меньшей длинѣ лѣхи, даже помѣщеніемъ мѣшковъ изъ-подъ сѣмянъ на полевыхъ межахъ, при началѣ и концѣ каждой лѣхи. На поляхъ, вспаханныхъ въ узкіе загоны, разъемныя борозды замѣняютъ лѣшинныя границы. Впрочемъ и ровно вспаханное поле весьма удобно можетъ быть *разлѣшено* подлѣ посѣвъ, т. е. разбито бороздами на извѣстной ширинѣ полосы. При обсеиваніи лѣхи сѣвель обсеиваетъ ее сперва съ одного конца поперегъ, а затѣмъ, сдѣлавъ полъ оборота, продолжаетъ уже посѣвъ вдоль лѣхи, одинъ сѣвель застѣваетъ въ день отъ 2½ до 4 десятинъ; причемъ разсѣиваетъ: сурьины 16—20, раиса 12—14 и клевера 11—13 гарницъ, пшеницы 3½—4, ржи 4—5, ячменя 4½—5½, овса 5¼—6½, гороха 3½—5, вики 2½—3½ и льна 3½ четверти въ день.

Густота посѣва въ этомъ случаѣ будетъ зависеть оттого, захватываетъ ли сѣвель сѣмена въ горсть или щепоть, сколько захватываетъ ихъ въ горсть, отъ величины шага, оттого, бросаются ли сѣмена съ каждымъ новымъ шагомъ или черезъ шагъ, разбрасываются ли сѣмена на болѣе или меньшей ширинѣ лѣху. Равномерность же разсѣва зависитъ: отъ выровненности сѣмянъ (см. ниже), такъ какъ сѣмена, разнящіеся по плотности, будутъ ложиться: менѣе плотныя ближе къ сѣвцу, болѣе плотныя—дальше отъ него; отъ болѣе или меньшей равномерности шага сѣвца и захватыванія имъ сѣмянъ въ руку и выпусканія ихъ изъ руки; отъ способа разбрасыванія одной или обѣими руками, такъ какъ лѣвая рука рѣдко при-

обрѣтаетъ одинаковыя съ правой силу и ловкость и такъ какъ сѣвель, разбрасывая сѣмена двумя руками, обыкновенно, чтобы не задѣвать сѣвалки, бросаетъ сѣмена выше чѣмъ разбрасыванъ ихъ одной рукой; отъ густоты посѣва и крупности сѣмянъ, такъ какъ меньшее количество сѣмянъ на десятину или мелкія сѣмена труднѣе распределять равномерно, чѣмъ болѣе количество сѣмянъ или крупныя сѣмена; наконецъ, отъ состоянія погоды, такъ какъ въ вѣтряную погоду невозможно разсѣять равномерно сѣмена, падающія къ тому же съ высоты груди человека.

Въ видахъ достиженія, поэтому, болѣе равномерности распределенія сѣмянъ при посѣвѣ въ разбросъ, необходимо поручать посѣвъ по возможности искусному сѣвцу, разбрасывать сѣмена только правой рукой, хотя этимъ замедляется нѣсколько работа, употреблять для посѣва по возможности выравненныя сѣмена, сѣшивать сѣмена, въ случаѣ рѣдкаго посѣва и разсѣва мелкіхъ сѣмянъ, съ какими-либо веществами (пред. стр.) для увеличенія разсѣиваемой массы; избѣгать посѣва въ вѣтряную погоду; наконецъ, во всѣхъ случаяхъ, затрудняющихъ равномерность разсѣва, или требующихъ особенной равномерности разсѣва, прибѣгать къ обсеиванію поля *перестѣвомъ* (у льна) или *на крестѣ*, т. е. за два раза, при чемъ въ первомъ случаѣ поле обсеивается такъ, что при каждомъ проходѣ обсеиваются кромѣ новой лѣхи, еще всю предыдущую обсеиванную уже разъ лѣху, или только половину ея, а во второмъ случаѣ поле, обсеиваемое разъ половиной сѣмянъ вдоль или поперегъ, обсеивается въ другой разъ остальной половиной сѣмянъ поперегъ или вдоль. Самое же лучшее во всѣхъ случаяхъ особенно для разсѣва мелкіхъ травяныхъ сѣмянъ замѣнить ручной посѣвъ машиннымъ, но только не швырлякой, которая не устраняетъ вреднаго вліянія на равномерность распределенія сѣмянъ ни невыровненности сѣмянъ, ни вѣтра. Машинной сѣмена разсѣиваются равномернѣе нежели рукой; машиной можно производить посѣвъ и въ вѣтряную погоду; при машинномъ посѣвѣ въ разбросъ можно сравнительно съ ручнымъ посѣвомъ сберечь около 10% сѣмянъ, такъ какъ болѣе равномерность распределенія сѣмянъ машиной, допускаетъ уменьшеніе густоты посѣва (стр. 730); наконецъ, машиной посѣвъ можетъ быть произведенъ скорѣе чѣмъ руками.

Сѣмена, разсѣиваемыя на поверхности почвы, должны быть прикрыты землей, для того чтобы доставить и сохранить имъ необходимую для ихъ проростанія влагу и защитить отъ поклева птицами; при этомъ они должны быть прикрыты землей на столько глубоко, на сколько этого требуетъ достиженіе указанныхъ цѣлей, и отнюдь не такъ глубоко, чтобы для ихъ проростанія, за недостаткомъ доступа къ нимъ воздуха, не доставало кислорода. А потому, тѣмъ мельче должны

быть прикрываемы сѣмена, чѣмъ влажнѣе погода, въ которую или подъ которую производится посѣвъ, чѣмъ влажнѣе, плотнѣе, хуже развита и сорнѣ почва, и чѣмъ позднѣе производится посѣвъ, потому что въ этихъ случаяхъ, при обезпеченности сѣмянъ влагой, необходимо съ одной стороны облегчить доступъ воздуха къ сѣменамъ, съ другой—вызвать возможно быстрое появленіе всходовъ. Въ противоположныхъ этимъ обстоятельствахъ возможно, и даже полезно, болѣе глубокое прикрытие сѣмянъ, потому что здѣсь, при достаточномъ доступѣ воздуха и при отсутствіи необходимости быстрого появленія всходовъ, необходимо, напротивъ, обезпечить сѣмена въ отношеніи необходимой для ихъ проростанія влаги. При слишкомъ глубокомъ прикрытіи сѣмянъ можетъ не хватить запаса питательныхъ веществъ въ сѣмени, для того чтобы зародышное растение могло развиться до величины, позволяющей ему выйти на поверхность земли. Слѣдовательно, глубина прикрытія сѣмянъ должна сообразоваться также съ величиной сѣмянъ.

Мелкія сѣмена, каковы сѣмена злаковыхъ травъ, клевера, мака, имѣющія весьма малый запасъ питательныхъ веществъ, могутъ быть лишь при- давленными въ землѣ, или же прикрыты ею на $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ дюйма. Бѣлье глубокое прикрытие сносятъ рожь, конопля; сѣмена сахарной свекловички могутъ быть прикрыты землей на $\frac{1}{4}$ —1 дюймъ; хлѣбныя сѣмена дюйма на 2 (ржи на $\frac{1}{2}$ —1, овса на $\frac{3}{4}$ —1— $1\frac{1}{2}$, пшеницы и кукурузы на 1— $1\frac{1}{2}$, ячменя на 1— $1\frac{1}{2}$ —2 дюйма); бобовыя, въ особенности сѣмена гороха, конскихъ бобовъ— даже на 3 дюйма (ячменя на 1— $1\frac{1}{2}$, гороха и бобовъ на $1\frac{1}{2}$ —2 дюйма) безъ ущерба для ихъ проростанія. Картофельные клубни укладываются въ землю на глубину 4 дюйм., а въ рыхлую землю даже на глубину $6\frac{1}{2}$ дюйм. безъ вреда для урожая. Въ зависимости отъ свойства почвы и состоянія погоды, глубина прикрытія, конечно, измѣняется такъ: сѣмена пшеницы, ржи, ячменя, овса прикрываются на плотной почвѣ на глубину $\frac{1}{2}$, на средней плотности почвѣ въ влажную погоду— $1\frac{1}{2}$, въ сухую—2, и на песчаной почвѣ $2\frac{1}{2}$ дюймовъ; сѣмена гречихи, вики на глубину 1— $1\frac{1}{2}$ —2—3 и гороха и бобовъ на глубину 1—2— $2\frac{1}{2}$ —3 дюймовъ въ такихъ же условіяхъ какъ перыя сѣмена. Особенно важно мелкое прикрытие сѣмянъ озимыхъ хлѣбовъ, въ тому же при первомъ посѣвѣ ихъ, потому что оно ускоряетъ и усиливаетъ образованіе верхнихъ корней, одно изъ главнѣйшихъ условій благополучной перезимовки озимей; тогда какъ, при глубокомъ прикрытіи, тратится много времени и питательныхъ веществъ на образованіе длиннаго стеблевого члена (см. рис. 211) и тѣмъ замедляется и ослабляется развитіе верхнихъ корней. Къ тому же, при всплываніи почвы вслѣдствіе замерзанія, легко можетъ порваться стеблевой членъ, что можетъ быть гибельно для растенія, которое, такимъ образомъ, лишается содѣйствія зародышныхъ корней, не развѣвъ достаточно верхнихъ.

Для полученія хорошаго урожая важно, однако, не только, чтобы проросла и дала всходы возможно большая часть сѣмянъ, но чтобы сѣмена этой части проросли и дали всходы возможно одновременно; это важно для заглушенія сорныхъ травъ, если почва засорена; для равномернаго развитія ихъ (особенно у льна) и для одновременности созрѣванія ихъ. Поэтому-то необходимо, чтобы не только каждое

сѣмя было прикрыто на надлежащую глубину, но чтобы и возможно большая часть сѣмянъ была прикрыта по возможности на одинаковую глубину. Равномѣрность прикрытія сѣмянъ, разбѣянныхъ въ разбросъ, зависитъ отъ состоянія поверхности почвы до разбѣва сѣмянъ (стр. 515), отъ самаго разбѣва сѣмянъ и отъ способа прикрытія сѣмянъ.

Чѣмъ болѣе ровнена поверхность почвы и чѣмъ лучше измѣнена почва, тѣмъ равномѣрнѣе прикрываются сѣмена; такое измѣненіе и выравниваніе поверхности почвы особенно важно для равномѣрной заделки мелкихъ сѣмянъ. Но не всегда возможно и выгодно привести почву въ такое состояние. Такъ, при посѣвѣ по пласту (стр. 523), или на почвахъ припавшихъ, запыляющихся, склоновыхъ въ образованіи коры, которой образованіе, по заделкѣ посѣва, весьма опасно; или, наконецъ, въ мѣстностяхъ съ холодными вѣтрами или безснѣжными зимами, слѣдующими за посѣвомъ, комковатое состояніе земли можетъ быть полезно для защиты всходовъ отъ вѣтровъ и лучшаго удержанія снѣга на поверхности почвы. Во всѣхъ этихъ случаяхъ невозможности привести поверхность почвы въ состояніе наиболѣе обезпечивающее равномѣрность прикрытія сѣмянъ, необходимо болѣе густой посѣвъ. Чѣмъ равномѣрнѣе распределены сѣмена на поверхности почвы, тѣмъ равномѣрнѣе могутъ быть они прикрыты. Мелкія сѣмена, каковы сѣмена клевера, въ влажныхъ климатахъ, часто прикрываются лишь въ почвѣ ваткомъ; въ сухихъ же климатахъ, равно какъ и болѣе крупныя сѣмена прикрываются, смотря по глубинѣ, на которую должны быть прикрыты, безотвальными (начная съ волокушъ, которые прикрываютъ сѣмена наиболѣе мелко, продолжая чѣпной бороной (стр. 303), оборотомъ бороны (стр. 302), бороной съ наклоненными зубьями въ обратномъ наклоненіи зубьевъ движеніи (стр. 298), легкими деревянными боролами, болѣе тяжелыми боролами и кончал скоронашками, прикрывающими сѣмена наиболѣе глубоко), или отвальными (запашниками, плугомъ) орудіями. Первыя смѣшиваютъ сѣмена съ болѣе или менѣе толстымъ, сохраняющимъ свою влагу (стр. 474), слоемъ земли, причемъ, конечно, часть сѣмянъ остается на поверхности почвы не покрытой, а потому сѣмена, прикрытыя этими орудіями въ влажную погоду, особенно мелко прикрыты, даютъ быстрые, довольно ровные и густые всходы. Чѣмъ суше же почва и чѣмъ глубже прикрытие, тѣмъ менѣе быстро, одновременно и густо появляются всходы—замѣчается *деурость*, т. е. разновременные всходы. Скоронашка, какъ орудіе для прикрытія сѣмянъ, особенно съ нѣсколько болѣе широкими и выпуклыми лопатами, составляетъ переходъ въ запашники и плугамъ—орудіямъ, которыя, открывая болѣе (скоронашки, запашники) или менѣе (плугъ) частыя и глубокия борозды, заставляютъ сѣмена сыпаться въ борозды и засыпаютъ ихъ въ этихъ бороздахъ сухой землей (стр. 474); при этомъ большая часть, къ тому же тѣмъ большая, чѣмъ крупнѣе и тяжелѣе сѣмена, скатывается на дно борозды и осеивается здѣсь въ ряды, прикрывается землей наиболѣе глубоко; другая же, меньшая часть, распределяется по скату борозды и прикрывается землей различно глубоко. Такимъ образомъ отвальные орудія нарушаютъ болѣе безотвальныхъ равномѣрное распределеніе сѣмянъ по поверхности почвы (въ горизонтальной плоскости) и прикрываютъ сѣмена неравномѣрно глубоко (въ вертикальной плоскости); какъ то, такъ и другое, они дѣлаютъ тѣмъ болѣе, чѣмъ рѣже и глубже проводимыя ими борозды: плугъ болѣе запашникъ, а запашникъ болѣе скоронашки. Поэтому плугъ можетъ быть употребленъ для прикрытія клубней картофеля и болѣе крупныхъ сѣмянъ, какъ-то: бобовъ, гороха и т. д.; особенно если сѣмена закрываются вмѣстѣ съ навозомъ (стр. 531, 533),

у хлебных же сѣмянъ прикрытіе плугомъ умѣстно развѣ на рыхлыхъ, сухихъ почвахъ, въ сухую погоду; или, напр. овса, если желаютъ дать время прорости сорнымъ травамъ прежде появленія его всходовъ. Во всѣхъ же другихъ случаяхъ предпочтительно употребленіе запашки (стр. 290), если нужно прикрытіе сѣмянъ на глубину 1—1½ дюйм., или же скоронашея, боронъ (стр. 477—478) и воловухъ, если нужно таковой же или еще меньшей глубины прикрытіе.

Сѣмена прикрываются большей частью сейчасъ же послѣ разсѣва ихъ; иногда же (напр. у льна), особенно на сухой почвѣ, проведя разсѣвъ съ вечера, оставляютъ сѣмена неприкрытыми до слѣдующаго утра, когда прикрываютъ ихъ покрытыя росой. Это такъ-называемый *росной посевъ*.

Послѣ прикрытія сѣмянъ плугомъ и скоронашкой, боронуютъ обыкновенно еще поле, для выравниванія поверхности, разъ поперекъ, а другой разъ наискось запашки, дабы облегчить потомъ уборку растений.

Но на почвахъ склонныхъ къ образованію коры и при задѣлкѣ растений съ нѣзрѣлымъ росткомъ (горохъ) лучше иногда вовсе не производить такого боронованія, чтобы избѣжать такого испуленія земли, которое могло бы повести къ образованію коры, затрудняющей выходъ ростка изъ земли. Иногда во избѣжаніе двукратнаго боронованія, откладываютъ это боронованіе до появленія всходовъ, напр. у картофеля, у котораго всходы появляются черезъ 3—4 недѣли послѣ высева клубней, съ тѣмъ, чтобы при этомъ боронованіи, которое лучше всего производить поперекъ рядовъ картофеля, въ два слѣда, однимъ въ одну, а другимъ въ противоположную первому сторону, не только выровнять поверхность почвы, но и уничтожить сорныя травы.

Рядовой посевъ рѣдко производится руками, особенно въ полѣ. Если же онъ производится, то изъ руки, бутылки со вставленнымъ въ пробку перомъ для медкихъ сѣмянъ или изъ голландскаго рожка (рис. 229*) выпускаютъ сѣмена (напр. моркови) въ болѣе или менѣе глубокия бороздки, открываемыя, на ровной поверхности или на грядкахъ или гребняхъ (сдѣланныхъ окулиномъ стр. 441) хорошо разрыхленной почвѣ, палкой (рукояткой грабеля, вилъ), маркеромъ (рис. 53) или плугомъ, въ известномъ




Рис. 229.

* Сѣменный рожекъ представляетъ воронкообразный жестяной сосудъ; на конецъ его навинчиваются большія или меньшія устеченно-коническія т. устечки съ отверстіями, которыя отъсѣкаютъ величину различныхъ сѣмянъ. Для посева верхнее пространство наполняется сѣменами, сосудъ закрывается крышкѣй А, а съ конца трубочки снимается крышка и конецъ трубочки держится надъ линіей, по которой долженъ быть произведенъ посевъ, при чемъ сосудъ наклоняется болѣе или менѣе, смотря потому болѣе или менѣе сѣмянъ должно высыпаться изъ него.

одна отъ другой разстоянія. Уложенныя въ бороздки сѣмена прикрываются граблями.

Намчаще же *рядовой посевъ* производится машинами, рядовыми сѣлками, которыя не только распредѣляютъ сѣмена въ ряды, но и укладываютъ ихъ въ известную глубину, въ бороздки, которыя открываются сошниками, дѣйствуя ими наподобіе двукрылыхъ плужковъ (рис. 39), въ которыхъ земля влажна и которыя, принявъ въ себя сѣмена, засыпаются землей тотчасъ же по проходѣ сошника, прежде нежели земля успѣетъ просохнуть сколько-нибудь значительно. Это большое преимущество посева рядовыми сѣлками, которое дѣлаетъ возможнымъ производить яровые посевы нѣсколько позже, не уменьшая ихъ успѣха. Это же важно въ томъ отношеніи, что, позволяя не спѣшить яровыми посевами, увеличиваетъ весной время для подготовленія земли къ посѣву. Но, за то, успѣхъ посева рядовою сѣлкой требуетъ, чтобы земля была хорошо раздѣлана, чиста отъ сорныхъ травъ, свободна отъ крупныхъ комьевъ и достаточно суха, такъ чтобы земля могла безпрестанно раздвигаться сошниками и закрываться вслѣдъ за проходомъ ихъ. Если же земля не достаточно разрыхлена и суха, то бороздки незаполняются землей и сѣмена остаются не прикрытыми; приходится прикрывать ихъ легкимъ заволокиваніемъ или заборонованіемъ въ направленіи рядовъ (стр. 478).

Иногда для лучшаго закрытія сѣмянъ, прикрываютъ сзади сошниковъ рядовой сѣлки *скребки* или лопаточки, которыми разваленная сошниками изъ бороздокъ земля снова загребается въ бороздки, причѣмъ образуются большіе гребни. Такое приспособленіе можетъ быть особенно полезно при задѣлкѣ озимей тамъ, гдѣ нужны большія неровности почвы тѣмъ тѣ, которыя оставляютъ обыкновенныя рядовыя сѣлки, для удержанія снѣга и скопленія воды отъ таящаго снѣга не въ ровѣхъ, въ которыхъ сидятъ растенія, а въ ровѣхъ, находящемся между рядами растеній.

Такъ какъ при выполненіи посева рядовою сѣлкой сѣмена не только равномернѣе распредѣляются, но и равномернѣе покрываются землей, чѣмъ при ручномъ посѣвѣ въ разбросъ, то въ первомъ случаѣ при равенствѣ всѣхъ другихъ условій возможенъ на 25—30% менѣе густой посевъ, чѣмъ въ послѣднемъ. Слѣдовательно, употребленіе рядовой сѣлки дѣлаетъ возможнымъ значительное сбереженіе сѣмянъ.

Успѣхъ рядоваго посева обуславливается въ значительной степени выборомъ надлежащаго разстоянія между рядами, которое зависитъ отъ тѣхъ же обстоятельствъ и точно также какъ и густота посева (стр. 728—730); слѣдовательно во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ требуется болѣе густой посевъ необходимо и меньшее разстояніе между рядами. Поэтому-то, между прочимъ, на засоренной почвѣ въ сухомъ климатѣ, въ отсутствіи обработки междурядій

рядовымъ, рядовой сравнительно съ разброснымъ, и наоборотъ. Впрочемъ, построение рядовыхъ сѣлокъ, высѣвающихъ сѣмена въ чрезвычайно узкіе ряды (стр. 738), приближаетъ рядовой посѣвъ настолько къ разбросному, что примѣненіе его, въ виду представляемыхъ имъ выгодъ, можетъ затрудняться лишь дурной обработкой почвы, ея засоренностью многочисленными сорными травами и глыбистостью. Гнѣздовой же посѣвъ въ ожиданіи большаго усовершенствованія гнѣздовыхъ сѣлокъ, не примѣняемъ пока для растений, требующихъ сравнительно малой площади для развитія своей особи.

Вотъ нѣкоторые разстоянія растений въ рядахъ (стр.), которыхъ требуютъ различныя растенія: 18—24—табакъ; 12—24—земляная груша; 10—24—кукуруза на зерно; 7—24—подсолнечникъ; 16—20—кормовая свекла; 15—18—фасоль; 14—18—брюква, кохляби; 12—18—рѣпа, капуста, порцильная пища; 10—15—конские бобы; 10—12—сорго обыкновенное, китайская рѣпка; 8—12—сахарная свекла; 6—8—крапивъ; 6—цикорій, макъ; 5—6—морковь, пастернакъ; 4—6—озимый рапсъ; 2—3—двойная кукуруза на зеленый кормъ; хлѣба безъ опредѣленнаго разстоянія въ рядахъ.

На почвахъ мелкихъ и страдающихъ отъ сырости можетъ быть полезно производить посѣвъ на грядкахъ, гребняхъ, которые образуются огулками (стр. 441) или выдавливаются вогнутыми натами, помыщаемыми у нѣкоторыхъ рядовыхъ сѣлкахъ (Мюрея и К^о) впереди сошниковъ, потому что этимъ утолщается слой хорошей и сухой земли, предоставляемой въ пользованіе растений; а это особенно важно для растений съ глубоко идущими корнями (напр. свекловицы).

По окончаніи посѣва прокатать, если нужно, водосточныя борозды (стр. 468—472), опаживаютъ поле кругомъ и разравниваютъ плугорочевную при опаживаніи на поле землю; кромѣ того прикрываютъ иногда засѣянное поле навозомъ, соломенной сѣвкой, мякиной, которая, особенно послѣдняя, защищаютъ поверхность почвы отъ уплотненія дождями, отнимаютъ почву, что способствуетъ сохраненію въ почвѣ влаги и заглушенію сорныхъ травъ, а хлѣвной навозъ удобряетъ сверхъ того почву растворяющимися изъ него питательными веществами. Такое дѣйствіе этихъ веществъ особенно полезно на почвахъ засоренныхъ, склонныхъ къ образованію коры, подъ влажное время въ сухую погоду и для растений съ весьма чувствительнымъ кѣжнымъ вародышемъ (ленъ).

Растенія, разводимыя сѣменами, разводятся *чистыми* или *смѣшанными* посѣвомъ, какъ *главное покровное растеніе*, или *подсѣвомъ*. При чистомъ посѣвѣ высѣваются сѣмена одного какого-либо растенія; при смѣшанномъ—сѣмена нѣсколькихъ растений заразъ. Смѣшанный посѣвъ примѣняется преимущественно у кормовыхъ травъ, воздѣлываемыхъ для ихъ стеблевыхъ и листовыхъ частей; такъ мѣшаютъ клеверъ съ тимотеиной, вику съ овсомъ и т. д.; но также и у зерновыхъ растений, при чемъ зерна урожая раздѣляются потомъ напр.

горохъ съ овсомъ, или же не раздѣляются и употребляются также въ смѣси, напр. рожь съ пшеницей для хлѣба. Выгода смѣшаннаго разведенія растений заключается, главнымъ образомъ, въ большей вѣрности урожая и въ большемъ количествѣ растительной массы, которую оно даетъ. Это зависитъ оттого, что смѣсь, при различномъ требованіи составляющихъ ее растений въ отношеніи почвы и погоды, при различіи ихъ враговъ, во первыхъ, скорѣе находитъ благоприятныя для своего развитія условія въ данныхъ обстоятельствахъ; во вторыхъ, поливъ, используетъ почву и воздушное пространство, чѣмъ одно растеніе. Для этого должны однако смѣшиваться между собой растенія, по возможности различныя въ своихъ требованіяхъ относительно почвы, напр. бобовыя и злаковыя, изъ которыхъ первыя имѣютъ болѣе глубокіе корни, требуютъ болѣе известія и менѣе азота изъ почвы и т. д. чѣмъ вторыя; различныя въ отношеніи формы зеренъ, если ихъ зерна должны быть потомъ раздѣлены, напр. горохъ и овесъ; но по возможности сходныя относительно времени высѣва и продолжительности періода произрастанія, въ особенности если смѣсь воздѣлывается для зеренъ, напр. горохъ съ овсомъ. Кромѣ того, при смѣшанномъ воздѣлываніи растений, одно растеніе, съ болѣе крѣпкимъ стеблемъ, можетъ служить опорой для другаго болѣе слабаго, такъ овесъ для гороха, кукуруза для фасоли и т. д.

Сѣмена смѣшаннаго посѣва высѣваются или смѣшанными или отдѣльно; смѣшанными, если они не настолько различны (различно велики и плотны), какъ напр. овесъ и вики, чтобы нельзя было распределить равномѣрно по полю ихъ смѣси и прикрыть ихъ на соответствующую глубину; въ противномъ же случаѣ высѣваютъ ихъ отдѣльно и даже прикрываютъ отдѣльно, если они требуютъ различно глубокой прикритки, напр. запахиваютъ сперва требующія болѣе глубокаго прикритія сѣмена, напр. гороха, а затѣмъ заборониваютъ требующія менѣе глубокаго прикритія, напр. сѣмена овса. При употребленіи рядовой сѣлки можно высѣять одинъ сѣмена вдоль, а другія поперекъ поля.

Растеніе разводится *подсѣвомъ*, если оно высѣвается на поле, засѣянное или занятое уже другимъ растеніемъ, развивается подъ защитой перваго, называемаго *главнымъ* или *покровнымъ* растеніемъ, и оставляетъ поле позже перваго. Подсѣвомъ разводятся растенія преимущественно съ болѣе продолжительнымъ періодомъ произрастанія, потому что такимъ образомъ выигрывается время—растеніе совершаетъ часть своего развитія на полѣ негуляющемъ, занятомъ другимъ растеніемъ; растенія, требующія въ молодости защиты отъ сорныхъ травъ, сухихъ вѣтровъ и сносимаго отѣненія. Покровными же растеніями выбираютъ такія, которыя не такъ сильно отнимаютъ почву, напр. ячмень предпочтительно предъ овсомъ, и высѣваютъ ихъ обыкновенно нѣсколько рѣже, чѣмъ безъ посѣва подъ нихъ другихъ растений.

Подсевомъ подъ хлѣба разводятся преимущественно многолѣтнія кормовыя травы, какъ-то: клеверъ, люцерна, эспартеръ, тимopheвка и т. д., такъ какъ въ первомъ году они не даютъ вовсе урожая или даютъ весьма малый. Ихъ подсеваютъ подъ озимыя или яровыя; до всхода покровнаго растенія или по всхожденію его. При подсевѣ до всхода покровнаго растенія, обыкновенно высѣваютъ ихъ, послѣ болѣе глубокой заделки покровнаго растенія запахивомъ или экиртираторомъ и выравнивая поверхности бороной, подъ легкую борону, волокушу или даже катокъ (стр. 745 и стр. 741 приспособленіе для этого сѣялки Савва); при подсевѣ же по всходамъ оставляютъ ихъ вовсе безъ прикрытія или прикрываютъ бороной, если всходы покровнаго растенія допускаютъ проборонованіе. Въ нашемъ климатѣ травы подсеваютъ подъ озимы по всходамъ весной возможно рано, не дожидаясь даже совершеннаго освобожденія поля отъ сѣва, если только это послѣднее не слишкомъ покато, для того чтобы захватить необходимую для проростанія ихъ сѣмянъ влагу; но при этомъ не прикрываютъ ихъ ничѣмъ, хотя было бы весьма полезно какъ для травяныхъ сѣмянъ, такъ и для озимы порыхленіе земли проборонованіемъ поля, когда это послѣднее настолько просохнетъ, что возможно пробороновать его. Подсевъ травъ подъ озимы съ осени до всходовъ въ нашемъ климатѣ невозможенъ, потому что позднія травы не успѣютъ до наступленія морозовъ развиться настолько чтобы перенести зиму; относительно же посева травъ по озимымъ всходамъ съ осени см. стр. 725. Подъ яровыя растенія, травы подсеваются преимущественно до всходовъ, такъ какъ онѣ при этомъ могутъ быть лучше прикрыты, что несомнѣнно погодно въ это время особенно важно. Если травы, высѣаемыя по озимымъ весной, сравнительно съ травами, высѣаемыми по ярамъ, находятъ болѣе влаги, то за то онѣ находятъ и болѣе уплотненную землю; какъ первое дѣйствуетъ благоприятно, такъ второе дѣйствуетъ неблагоприятно на ихъ развитіе. Подсевомъ же разводятся морковь, рѣпу подъ покровомъ льна, овса, чимена и даже ржи. 

Нѣкоторыя растенія не высѣваются прямо въ поле, а высѣваются прежде въ *рассады* на меньшемъ пространствѣ хорошо приготовленной земли или на *паровыхъ грядкахъ*, или въ *парники*, откуда уже высаживаются въ поле молодыя растеньица, такъ называемая *рассада* или *саженцы*. Такой способъ разведенія растеній называется *пересадкой*. Къ разведенію пересадкой хозяинъ прибѣгаетъ тогда, когда періодъ произростанія известнаго растенія такъ продолжителенъ, что въ данной мѣстности, по причинѣ поздней весны, нельзя высѣять это растеніе въ поле такъ рано, какъ это нужно было бы для того, чтобы оно могло вырѣсти до наступленія осенью снова неблагоприятнаго для его произростанія времени (капуста у насъ); или, если желательнѣе занять поле растеніемъ возможно позже, дабы имѣть время хорошенько приготовить для него землю (кормовая свекла) или воспользоваться землей, для того чтобы снять съ нее еще урожай растенія съ болѣе продолжительнымъ періодомъ произростанія (оз. рапсъ послѣ хлѣбовъ); если растенія въ молодости требуютъ особенной защиты отъ вредныхъ насекомыхъ, холодовъ и т. д. и, наконецъ, если растеніе сноситъ пересадку, такъ, сахарная свекловичка не сноситъ ея, потому что даетъ развитыя корни, содержащій процентно меньшее

количество сахара, чѣмъ цѣльный коническій корень. Кроме того къ пересадкѣ приходится прибѣгать иногда у такихъ растеній, какъ напр. майскъ, которыя обыкновенно не разводятся такимъ образомъ, но требуютъ этого въ случаѣ необходимости пополнить въ полѣ мѣста, на которыхъ пропали прямо посѣянные растенія отъ вредныхъ насекомыхъ или непогоды. Для посадки въ такихъ случаяхъ рѣдко выращиваютъ рассаду на особыхъ мѣстахъ, болѣе же частію пользуются растеньицами, получающимися при продергиваніи болѣе густыхъ мѣстъ (см. ниже).

Для парниковъ и паровыхъ грядъ, въ которыхъ нуждаются изъ разводимыхъ пересадкой растеній, растенія съ пасоотвѣтствующей мѣстнымъ условіямъ продолжительностью періода произростанія (табакъ, капуста у насъ), или рассадниковъ, которыми могутъ обойтись всѣ остальные изъ разводимыхъ пересадкой растеній, выбираются по возможности защищенными отъ вѣтровъ мѣста; для послѣднихъ же или плодородная садовая земля, или даже болѣе плодородная и защищенная часть самага поля, которая сверхъ того могутъ быть хорошо удобрены. Часть самага поля представляетъ то удобство, что рассада получается ближе въ засаживаемому полю, да и рассадники, по вынутіи изъ него рассады, нужной для засадки остальной части поля, превращаются самъ въ поле, на которомъ остается соотвѣтствующее наибольшему развитію растеній число растеній. Пространство, необходимое подъ парники, паровыя гряды или рассадники, для выведенія рассады на 1 десятину поля, весьма различно въ зависимости отъ числа растеній, которое нужно для засадки одной десятины (считая въ томъ числѣ и который нѣкоторой части рассады); отъ плодородія почвы рассадника, отъ возраста, въ которомъ выбирается рассада; оттого, пересаживается ли рассада уже въ рассадникъ, прежде высадивъ ея въ поле, какъ это дѣлается напр. у брюквы (у табака, который высѣвается рѣдко въ ящики или плошки, рассада пересаживается сперва въ парники) или нѣтъ; наконецъ оттого, превращается ли самъ рассадникъ въ поле или нѣтъ. Чѣмъ болѣе число растеній, нужное для засадки десятины поля, чѣмъ менѣе плодородна почва рассадника, чѣмъ позже выбирается растеніе, тѣмъ болѣе пространства нужно подъ выведеніе рассады, ровно какъ болѣе нужно его въ томъ случаѣ, если рассада пересаживается уже въ рассадникъ или рассадникъ превращается въ поле. Въ нижеслѣдующей таблицѣ для главнѣйшихъ разводимыхъ пересадкой растеній, показаны предѣльные числа: растеній нужныхъ для засадки 1 десятины, пространства и количества сѣмянъ, необходимыхъ для выведенія такого количества рассады, и времени посева и пересадки рассады. (См. табл. на стр. 754.)

Рядовой посевъ съ рядами, удаленными одинъ отъ другаго на 2 дюйм. наиболѣе удобенъ для выведенія рассады, такъ какъ значительно облегчаетъ уходъ за рассадой и выборку ея. Уходъ за рассадой долженъ состоять: въ поливѣ по мѣрѣ надобности; въ тщательномъ уничтоженіи сорняковъ; въ разрыхленіи почвы междурядій; въ удаленіи сорныхъ травъ полостью; въ прорѣживаніи густостоящей рассады до 1 1/2 дюйм. разстоянія между саженцами въ ряду; въ удаленіи вредныхъ насекомыхъ сборомъ, срыскиваніемъ навозной жижей (отъ блохъ) и т. д.; въ рыхломъ покрывіи рассады въ рассадникѣ соломой или хворостомъ или въ прикрытіи стеклянными или бумажными (въ промасленной бумагѣ) рамками парниковъ, въ случаѣ необходимости защитить рассаду отъ мороза. Рассада, достигшая надлежащаго развитія, напр. у брюквы—толщины корня отъ 1/8 до толщины мизинца,

	Число тысяч растений для посадки в 1 десятины.	Число пр. саж., необходимое для выведения рассады на 1 десятину.	Число фунтов семян, необходимое для выведения рассады на 1 десятину.	Время посева в рассадник.	Время пересадки рассады на поле.
Свекла кормовая....	50—80	200—300	7—8	Март, Апрель	Май, Июнь
Брюква и кольраби..	40—70	11	1—2	Март, Апрель	Май, Июнь
Капуста....	25—60	9—48	1—1	Март, Апрель	Май, Июнь
Брауни.....	170—200	?	?	Март, Май	осень или весна
Табак.....	25—50	2—22	1—1	Февраль, Апрель	Май, Июнь
Ворсильная шипка....	20—30	200—300	2	Май, Июнь	Сентябрь
Рис оз....	100—170	400—800	3—8 в разброс 11—4 рядками.	Март, Апрель	Июнь, Сентябрь
Укроп.....	55	?	?	Июль, Июль	Сентябрь, Октябрь
Тмин.....	115—120	14	1	Август, Сентябрь	Март, Апрель
Вайда.....	185	?	?	Март, Апрель	Июль, Август
Брашильная греча.....	40	24	3	Март, Апрель	Июнь
				Август, Январь	Октябрь, Март
				Март	Апрель.

у табака же 3—4 листьев, пересаживается в поле по возможности в утреннюю влажную погоду. Накануне выдергивания рассады или за несколько часов до этого, хорошо смочить землю в рассаднике, если она недостаточно влажна, для того чтобы легче выдергивалась рассада. При выдергивании по возможности избегать повреждений корня. У осторожно вынутой рассады отделяются завявшие листья, а иногда (у брюквы, свеклы) отгертываются даже все листья, за исключением сердечных. Выдернутая рассада накладывается в корзины, укладывается и относится в поле, где складывается в вучи, разбираемая садовыми. Саженцы сажаются на назначенных в поле местах в ямки, которые делаются рукой, садовым колом, мотыгой, заступом, или в борозды, проводимые плугом (стр. 746); сажаются так же прямо, чтобы корни их несли, по возможности, вертикальное направление, а потому слишком длинные корни укорачиваются, сажаются так же глубоко, чтобы сердечные листья не были засыпаны землей, и так же прочно, чтобы при употреблении некоторого усилия для выдергивания саженца за листок, скорее оборвался этот последний, чем выдернулся сам саженец. Иногда корни саженцев, при посадке, обмакиваются в удобри-тельную жидкость (раствор коровяка с сажой и золой).

Что касается размножения растений клубнями, то оно очень сходно с размножением семенами, как в отношении приемов, на которые мы указали при рассмотрении приемов размножения растений семенами, так и в отношении выбора клубней до некоторой степени. Лучшими клубнями у картофеля для его размножения считаются наиболее плотные (наибольшего удельного веса), а между этими, затѣм, наибольшей величины, как содержа-щие наибольший запас питательных веществ при относительно малом

числа глазков, следовательно способные дать наиболее сильные растения. Поясняют это следующие числа: три клубня.

при абсолютном весе . .	185,15	—	94,80	—	45,97	граммов
удельном	1,0892	—	1,1038	—	1,0862	
содержали сухого вещества	20,66%	—	21,23%	—	20,17%	
вкрамала	16,40%	—	16,45%	—	16,35%	

При этом предпочтительно разведение члѣвными клубнями; разделение же частями клубня, не имеющее с 3 глазами каждая, и обильными или обсыпанными золой, может оправдываться лишь недостатком карто-феля и благоприятными условиями почвы.

Уход за растениями во время произрастания

иметь члѣв (стр. 688) во первых, защитить растение от вред-ных влияний: погоды, несоответствующего в каком-либо отно-шении состояния почвы, от сорных трав, болезней и вредных животных; во вторых, направить развитие растения согласно задаче культуры: получить возможно больший и лучшего качества урожай. Для достижения этих члѣв хозяйств в уход за расте-ниями во время их произрастания применяются различные приемы: укатывание, боронование, мотыжение, окучивание, поверхностное удобре-ние, орошение, поддержку растений (перенос), удаление члѣвх расте-ний (продергивание и полоть) и удаление частей растения (обкаши-вание, обжидание животными и пасынкование).

1. *Укатывание*, в дополнение к приведенному на стр. 482—483, применяется в следующих еще случаях после посева: во первых, на озимых, весной, когда достаточно просохнет почва, для прикрытия земель корней, обнажившихся, вследствие выпаривания растений из почвы при попеременном замерзании и оттаивании этой почвы; во вторых, у кустящихся, образующих побѣги растений (озимых и яровых хлебов и луговых трав) для того чтобы придавить их к земле, прикрыть землей стеблевой узел (стр. 697), из которого развиваются побѣги и тем усилить кущение их; проборонованные в сухую погоду всходы хлебов на сухой почве прививаются с обильными этими члѣвами, т. е. чтобы прикрыть обнаженные при бороновании корни и усилить кущение продавливанием земли к растениям; в третьих, у различных растений, в более позднем возрасте, для сгибания или надламывания надземных частей с члѣвом усилить развитие подземных частей (стр. 700) или наредить несколько густо стоящих растений, чтобы тем укрепить остающиеся; так, напр., картофель прикатывается с этой члѣвом иногда уже по достижении им 4—5 высоты, или колосовые хлеба до выколашения, при чем неукоренившиеся побѣги последних погибают, а укоренившиеся скорее одеревеняются; в четвертых, наконец, для удаления

вредных насекомых, напр. блохи, напавшей на лень, такъ какъ катокъ отчасти раздавливаетъ комья земли, служащие убжищемъ для блохъ, частью уплотняетъ землю, чего не любятъ блохи, или слезней на озимяхъ, если поле не слишкомъ сыро.

2. *Боронование* применяется послѣ посѣва для уничтоженія коры, если сѣмена не дали еще всходовъ, или же всходы (хлѣбныхъ, бобовыхъ, гороха, гречихи, ржи, масличныхъ растений) уже укоренились настолько, что не выдергиваются изъ земли бороной, и если земля, при надлежащемъ состоянii влажности, крошется бороной или, при большей нѣсколько сухости, крошется по крайней мѣрѣ бороной и слѣдующимъ за ней каткомъ. Если же почва настолько плотна и суха, что не крошится не только бороной, но даже бороной и слѣдующимъ за ней каткомъ, то боронование скорѣе вредно нежели полезно, особенно для такихъ чувствительныхъ къ этому растений, какъ: чумиза, рожь и гречиха, и должно быть оставлено до смочки почвы дождемъ или совѣмъ, еслибы, въ ожиданiи дождя, растенiя поднялись уже настолько высоко, что надземныя части ихъ могутъ быть сильно повреждены.

Но, если оди растенiя не допускаютъ проборонованiя ихъ въ болѣе позднемъ возрастѣ, то другiя опять, какъ напр. гречиха, рѣпа, масличныя растенiя не допускаютъ ошнкомъ ранняго ихъ проборонованiя. Такъ какъ всходы, при проборонованiи ихъ, изрѣживаются т. е. при проборонованiи всходовъ всегда выдергиваются въ извѣстномъ количествѣ растенiя преимущественно слабоукоренившiяся, то въ тѣхъ случаяхъ, когда можно почему-либо предвидѣть необходимость проборонованiя всходовъ, слѣдуетъ сѣять нѣсколько гуще. Проронованiе всходовъ рыхлитъ землю, слѣдовательно открываетъ ее дѣйствию воздуха и черезъ то усиливаетъ развитiе растенiя, кушанiе хлѣбныхъ; а потому весеннее проборонованiе озимыхъ полей съ уплотнившейся за зиму почвой, если только просыханiе этой послѣдней позволяетъ произвести его заблаговременно, можетъ быть очень полезно какъ для озимыхъ, въ особенности для пшеницы, которая плохо укрываетъ землю съ осени, такъ и для подсыхаемаго модъ озимъ клевера (стр. 762). При проборонованiи всходовъ выдергиваются слабоукоренившiяся, слѣдовательно преимущественно одностѣбныя сорныя травы. Такимъ образомъ истребляются (стр. 488—489) одностѣбныя: василекъ полевой, ковыль собачья оструха (*Achusa cynapium*), лютикъ пашенный, подмаренникъ, пупавка, рѣдкая полевая (*Raphanus raphanistrum*), сумочникъ пастушій, и двустѣбныя: воробейникъ полевой и просарникъ круглолистный.

3. *Мотыжение* или обработка почвы ручными (стр. 268) или конными (стр. 308—315) мотыгами во время произрастанiя растенiй можно различить на *мелкое* и *глубокое*. Первое, точнѣе скребленiе, имѣетъ цѣлю преимущественно истребленiе сорныхъ травъ (между прочимъ цикорiн обыкновеннаго и марьяника пашеннаго) и уничтоженiе коры; второе—преимущественно болѣе глубокое разрыхленiе почвы со всѣми его послѣдствiями.

Поле, засѣянное въ разбросъ, можетъ мотыжиться лишь ручными мотыгами, но весьма рѣдко обрабатывается такъ, потому что такая обработка

обходится дорого. Поле, засѣянное рядами можетъ мотыжиться конными мотыгами, по крайней мѣрѣ, въ одномъ направленiи между рядами, если междурядiя не уже 9—10 дюйм.; въ рядахъ же между растенiями, гдѣ земля при конномъ мотыженiи остается неразрыхленной, а сорныя травы неистребленными, необходимо ручное мотыжение (которое для разрушенiя коры, пока растенiя еще очень молоды можетъ быть замѣнено укатыванiемъ) и ручное полевое. Поле засѣянное гнѣздами можетъ мотыжиться конными мотыгами въ двухъ направленiяхъ, если расстояние между растенiями не менѣе 9—10 дюйм.; хотя и здѣсь для порыхленiя земли и для удаленiя сорныхъ травъ изъ ближайшей окрестности растенiя, необходимо ручное мотыжение или ручное полевое. Впрочемъ, болѣе цѣнныя растенiя, какъ напр. сахарная свекловица, или растенiя, чьи листья (табакъ) могутъ быть весьма повреждены при мотыженiи, мотыжиться предпочтительно ручными мотыгами *). У насъ, въ нашемъ климатѣ, гдѣ сдѣлать полезно, для рядовыхъ посѣвовъ хлѣбныхъ, по крайней мѣрѣ яровыхъ, удаленiе рядовъ болѣе чѣмъ на 4 дюйма, конное мотыжение можетъ применяться лишь у яровыхъ растенiй, воздѣлывающихся съ болѣе широкими междурядiями, свыше 10 дюйм.; при этомъ у растенiй, воздѣлывающихся съ менѣе широкими междурядiями (сахарная свекловица), возможно употребленiе многорядныхъ мотыгъ. При возмощенiи мотыженiя весьма хорошо, въ видахъ лучшаго разрыхленiя земли, при возможности мотыженiя только въ одномъ направленiи, начинать каждый разъ новое мотыжение съ противоположной предыдущему стороны поля; при возможности же мотыженiя въ двухъ направленiяхъ, мотыжить разъ въ одномъ, другой разъ въ другомъ направленiи.

Мотыжение начинается обыкновенно возможно рано, какъ только сдѣлаются замѣтными всходы (ряды), чтобы уничтоженiемъ коры помочь развитiю всходовъ и не допустить заглушенiя ихъ сорными травами. Поэтому, у растенiй (какъ напр. свекла, морковь), чьи сѣмена очень долго не даютъ всходовъ, начинаютъ иногда мотыжение до появленiя всходовъ, если этого требуетъ развитiе сорныхъ травъ, а главное уплотненiе почвы; для того же, чтобы въ это время имѣть возможность различать ряды, высѣваютъ вмѣстѣ съ сѣменами этихъ растенiй какiя-нибудь скоропростающiя сѣмена (преимущественно крестоцвѣтныхъ—горчицы). Такое раннее мотыжение, разрыхляющее поверхность почвы, особенно важно въ сухихъ климатахъ, такъ какъ способствуетъ сохраненiю влаги въ почвѣ. Такъ какъ первое мотыжение имѣетъ цѣлю, главнымъ образомъ, разрушенiе коры и истребленiе сорныхъ травъ, то совершенно достаточно, если оно производится на глубину 1—2 дюйм., и лучше всего ручной мотыгой, которая не такъ сильно рыхлитъ

*) Для уничтоженiя возможнаго поврежденiя свекловицы и другихъ растенiй конными мотыгами, у которыхъ мотыга, кромѣ объясненнаго на стр. 309 измѣненiя направленiя ножей, которое допускаетъ ихъ устройство, имѣются еще на сторонахъ ножей шайбы, которыя прикрываютъ ряды растенiй со стороны ножей; или (мотыга (рис. 232) Зидерлебенъ въ Бернбургъ съ 2 мотыжными приборами и 1 для окулированiя на 4 ряда свекловицы, шириной хода 6 1/2 фут. ц. 495 марокъ) съ помѣщенными между рядами ножей вогнутыми катками, которые сносно вогнутостiю прикрываютъ ряды растенiй.




Рис. 232.

почву. Впрочем у сильнѣе укореняющихся растений, которыя не легко могутъ быть выведены изъ ихъ положенія, возможно сразу болѣе глубокое мотыженіе на 3-4 дюйма. Слѣдующее мотыженіе производится обыкновенно глубже, чтобы возможно сильно разрыхлить землю. Растенія, засыпанные землей при мотыженіи, освобождаются отъ нея, чтобы не задержать ихъ развитія. Но часто не ограничиваются одно или двукратнымъ мотыженіемъ (какъ у конскихъ бобовъ, подсолнуха, картофеля, рапса), а повторяютъ его три, четыре раза (какъ у рѣпы, брюквы, кукурузы, свеклы, въ особенности сахарной), возможно часто, какъ только покажутся сорняки травы, закоржавѣетъ почва или начнутъ тревожить растенія насекомыя. Въ влажную, дождливую погоду, конечно, не слѣдуетъ мотыжить, такъ какъ при этомъ могутъ образоваться глыбы, трудно измельчимыя впоследствии. После дождя, почвы скорѣе просыхающія должны мотыжиться раньше медленно просыхающихъ, чтобы въ первыхъ сохранить влагу, а вторымъ дать скорѣе просохнуть.

4. *Окучиваніе* или приваливаніе земли къ основанію растений производится помощію коннаго орудія окучника (стр. 283—284) *), если растенія воздвигаются въ правильныхъ рядахъ, достаточно удаленныхъ одинъ отъ другаго, но крайней мѣрѣ на 1½ фута; иначе ручной мотыгой. Польза окучиванія заключается въ томъ, что рыхлая, приналенная къ основанію растенія земля сохраняется рыхлой подъ защитой густой листвы растенія даже послѣ сильныхъ дождей. По этому всѣ воздвигаемыя въ рядахъ растенія, которыя только сносятъ окучиваніе, слѣдовательно: масличныя растенія, рапсъ, кон-

*) Для окучиванія можно употребить обыкновенную соху, если снять съ нея напильникъ и навязать на плугу вѣнчикъ или пучокъ соломы, или мекленбургскую соху (рис. 192).

скіе бобы, слѣдовало бы нѣсколько окучивать при послѣднемъ мотыженіи, въ особенности же на легко заплывающихъ и образующихъ кору почвахъ. Далѣе, свѣжая, рыхлая, удобопроницаемая для воздуха земля, приходя въ соприкосновеніе съ новой частью растенія, способствуетъ (стр. 697) образованію новыхъ корней *) у кукурузы, конскихъ бобовъ, подсолнуха, табака, оз. рапса, слѣдовательно усиливаетъ питаніе растенія и его устойчивость (защищаетъ отъ вѣтрована) или образованію клубней (у картофеля); прикрываетъ выставляющіяся изъ земли части растеній: шейку корня у сахарной свекловицы, клубень у картофеля, которые иначе, подъ вліяніемъ свѣта, окрашиваются въ зеленый цвѣтъ и уменьшаютъ содержаніе сахара въ одномъ крахмала въ другомъ случаѣ; заваливаетъ, и слѣдовательно и уничтожаетъ тѣ небольшія сорняки травы, которыя не могли быть удалены мотыгой изъ ближайшаго соседства съ окученнымъ растеніемъ, и, напротивъ, обнажаетъ корневища пырея, которыя если только окучиваніе было произведено въ сухую погоду, замираютъ; наконецъ, облегчаетъ выемку глубоко сидящихъ корней моркови не только лопатой или вилой, но также плугомъ или особо устроеннымъ для того орудіемъ (см. ниже).

Но, для того чтобы окучиваніе приносило надлежащую пользу, необходимо, чтобы оно производилось, съ одной стороны не слишкомъ рано — не тогда, когда растенія еще мало отъявлять почву, потому что въ этомъ случаѣ, почва, если она только по своему положенію, не слишкомъ влажна, не успеетъ вѣднѣмъ для развитія растенія образомъ; съ другой — не слишкомъ поздно: не тогда, когда нѣтъ только вновь образующіеся, вслѣдствіе окучиванія корни не клубни, но и приостановленные окучиваніемъ въ своемъ развитіи прежде образованшіеся, не могутъ уже болѣе развиваться такъ, чтобы принести полную пользу растенію; слѣдовательно, во всякомъ случаѣ до цвѣтенія растенія. Запозданіе окучиванія не должно производиться при слишкомъ влажномъ, даже сыромъ состояніи почвы, при которомъ эта послѣдняя можетъ образовывать сырую кору, а пырей еще болѣе размножиться, такъ какъ обнаженные корневища его, раздѣленные на части, будутъ находиться въ условіяхъ сохраненія полной своей жизнеспособности. Большей частью производится однократное окучиваніе растеній (у свекловицы, брюквы, моркови, рѣпы, подсолнечника, конскихъ бобовъ; иногда же окучиваютъ ихъ и два раза: рѣже кукурузу, чаще картофель), особенно при нѣсколько тяжелой, влажной и засоренной почвѣ. Если окучиваются два раза или больше, то первое окучиваніе производятъ нѣсколько раньше, чтобы не загноить вторымъ, при которомъ къ тому же окучникъ пускаютъ нѣсколько глубже, чѣмъ въ первый разъ, чтобы обработать новый слой земли и возвысить гребень, образующійся при окучиваніи вдоль рядовъ растеній.

*) Поэтому же надобно полагать, что окучиваніе озимыхъ хлебовъ послѣ уборки, по достиженіи всходами уже болѣе величинъ при воздвиганіи ихъ нѣсколько большими междурядьями, и приспособленіе для этого особымъ многоряднымъ окучникомъ (Саяна ссылка стр. 742), было бы чрезвычайно полезно: усиленная развитіе корней, оно дѣлало бы растеніе болѣе способнымъ переносить зимніе невзгоды и, образуя между рядами растеній значительную гребенную бороздку, защищало бы растенія отъ затопленія водой при таяніи снѣга и покрывтія полей (см. ниже и стр. 747).

Б. Поверхностное удобрение (стр. 669 и 675) применяется, когда нужно усилить развитие растений, а так как усиленное развитие воздвизаемого растением увеличивает отгибание почвы, способствует заглушению сорных трав и помогает воздвизаемому растению легче переносить вред, причиняемый ему насекомыми, большей частью в самое первое время развития, то поверхностное удобрение во многих случаях может служить средством истребления сорных трав и защиты от вредных насекомых. Поверхностное удобрение применяется у озимых весной, а иногда и у яровых, задерживаемых в их развитии весенними холодами, и чаще у кормовых трав, у которых особенно важно количество растительной массы вообще. В первом случае для поверхностного удобрения предпочитают легко растворимые азотистые туки (чилийскую селитру и сернокислый аммиак преимущественно), так как они способствуют в особенности усилению побегопроизводительности. Во втором случае гниль, золу, навозную жижу и т. д.

6. Орошение, преимущественно применяющееся на лугах (см. ниже), может быть с пользой применено и на полях с сухой почвой и в сухом климате. В таких условиях можно с пользой орошать все одесные растения, в особенности же многолетние кормовые травы, как потому, что они долго занимают поле и потому дешевле обходится приспособление их для орошения, так и потому, что у них особенно важно общее количество растительной массы, на увеличение которой действует орошение. Орошают поля, проводя воду или по поверхности запятого растениями поля (лент. кормовые травы — клевер, люцерна, эспарцет) или в бороздки между загонами или гряды, запятых растениями, и задерживая ее даже в несколько в бороздках, дабы она лучше могла пропитать землю через стволы бороздок (колосовые хлеба, корнеплоды, бобовые, зерновые, табак и т. д.). Орошают в течение года один (корнеплоды), два (колосовые хлеба) и больше раз (кукурузу на зерно, в особенности же на корм, кормовые травы), при чем начинают орошение довольно рано (у многолетних кормовых трав с глубокой плунами корнями, которые на глубине находят себе влагу, особенно важно орошение в первое время, пока растения хорошо укореняются, тогда орошается в первый раз когда достигнуты высоты $1\frac{1}{2}$ вершков) и оканчивают его, когда начнется колошение, образование початка (у колосовых хлебов, кукурузы) или за несколько дней до цветения (лент. кукуруза на корм); впрочем, полезно смочить несколько землю во время налива (у колосовых хлебов, пшеницы, ржи и ячменя, у кукурузы), отчего зерно поддается крунне и тяжеловеснее. Особенно много воды для орошения требуют кормовые травы: в каждое орошение не менее чем луга, не меньшее число орошений и менее продолжительных орошений, вообще же — менее лугов. Меньше воды требуют колосовые хлеба — от $\frac{1}{2}$ до $\frac{1}{4}$ количества ее, требуемого лугами; еще меньше — корнеплоды, хмель, конопля, а земляная груша и крапива могут обходиться даже вовсе без орошения.

7. В поддержании нуждаются растения с слабыми стеблями, как: горох, лент. воздвизающийся густым покровом на весьма тонкое волокно, который, не будучи в состоянии держаться прямо, ложиться; ложась же, лишаются необходимости для образования зерен (у гороха) пользования воздухом и светом, и подвергаются (лент. подопревание), особенно в холодную погоду. А потому такие растения поднимают или, как говорят, *вдвигают* втыканием в землю тычин или хвороста (горох, лент.) или устроением даже на стойках (выш. фута $1\frac{1}{2}$) особых горизонтальных хворостяных решеток (у льна), которые поддерживают в прямом положении прорастающих сквозь них растений. Такое перенос обходится дорого

как по материалу, так и по работам, которых требует, а потому применяется лишь у таких ценных растений как лент. воздвизающийся на самое тонкое волокно; у растений же менее ценных, как горох, лент. нос не применяется или же заменяется часто смещением покровом (стр. 751).

8) Целины растения удаляются с поля в двух случаях: при *продерживании* — воздвизаемых и при *полоты* — сорных растений.

Продерживание, прорывка, изгнание воздвизаемых растений имеет целью доставить растениям надлежащий простор, которого нельзя им предоставить сейчас же при посеве, как бы он не производился: в разброс или рядами или грядками; потому что, в виду всегда возможной потери некоторого числа воздвизаемых растений и проросших семян и всегда возможной несхожести некоторого числа семян, как бы не были они предварительно испытаны, высевается семян всегда больше, чем число растений, которое должно находиться на десятинах и потому всегда приходится выдергивать впоследствии излишние особи у растений, которых, для своего успешного развития, необходимо требуют извештиных промежутков между особями.

Продерживать растения необходимо, когда они еще не слишком велики (примерно не больше раскладки, употребляющейся для пересадки) — лучше всего вскоре после первого мотыжения, и когда поле смочено дождем; так как при этом легче выдергиваются удаляемые и менее повреждаются остающиеся растения. Если же почва суха и растения сидят глубоко в земле (морковь), то в предупреждение повреждения оставшихся, лучше вырывать а не выдергивать удаляемые растения. Иногда, приходится повторять продерживание, а именно: если, при первом продерживании, были забыты некоторые лишние растения, или оставлены, потому что не достигли надлежащего развития, или были произведены подсевы на оголившихся местах. При продерживании, места, почему-либо оголившиеся, засаживаются вновь или засаживаются раскладой, получающейся при продерживании другого, сносимого пересадку растений (свеклы, брюквы). При продерживании оставляются возможности самые лучшие, сильные растения, в требуемых одно от другого расстояниях; а выдернутые растения, если они не употребляются в корм, оставляются в междурядьях для отгибания почвы и подавления сорных трав. Предпочтительно ручное продерживание, как представляющее наименьше опасности повреждения растений; но, так как оно довольно дорого, то в помощь ему при рядовой культуре могут быть употреблены бороны и многорядная конная мотыга или даже рядовая сдвела, которая предварительно ручного продерживания пускается поперек густых рядов: последние с установленными на надлежащих расстояниях друг от друга ножами или сошниками; затея уже если нужно дальнейшее прорывание, руками выдергиваются лишь растения в ближайшем соседстве оставшихся. Бороны, конечно, прорываю до того неправильно, что применяется большей частью только в тех случаях, когда неименно в виду оставить растения в рядах с одинаковыми и более значительными

позже (стр. 755), можно приостановить развитие озимых, если осенью или даже весной, до выхода их из трубку, выгнать на *зеленый* (какъ называются у насъ всходы хлѣбовъ) животныхъ (какъ это такъ часто дѣлается у насъ въ черноземныхъ мѣстностяхъ, напр. Тамбовской, Тульской губ.), которые объѣдаютъ верхушки растений. Но для успѣха этой мѣры необходимо, чтобы животные выгонялись на сухое поле, иначе они втаптывали бы растения въ сырую землю; чтобы они не были грузны (поэтому преимущественно овцы), особенно при нѣсколькой сырой почвѣ; и чтобы они не оставались долго на одномъ мѣстѣ, а прогонялись бы лишь по зеленымъ, для того чтобы не могли слишкомъ сильно объѣсть растений. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи опасѣе другихъ овцы, объѣдающія растения весьма близко къ землѣ. Сильное объѣданіе можетъ совершенно истребить растения, какъ вѣтъ и пользуются для истребленія сорныхъ травъ въ зеленомъ парѣ (стр. 508) и при оставленіи почвы подъ многолѣтній выгонъ (стр. 537). Позже, если растения подрастутъ уже больше (весной у оз. пшеницы до выколосенія), можно приостановить ихъ развитіе и слѣдовательно предотвратить полеганіе обкашиваніемъ верхушекъ помощію серпа или косы. Но успѣхъ этого приема требуетъ своевременности его выполненія и осторожности, чтобы не скосить больше чѣмъ нужно (не скосить колоса у пшеницы), а потому можно предпочесть ему какъ и объѣданію животными прикалываніе (стр. 755). Если обкосить растение позже, напр. по выколосеніи или во время цвѣтенія, при томъ такъ чтобы срѣзать при этомъ колосъ или цвѣторасположеніе или скосить его, хотя и раньше, но сильнѣе, можно погубить не только однолѣтнее, но даже и многолѣтнее растение, особенно, если послѣдній приемъ повторять нѣсколько разъ, слѣдовательно постоянно лишая растение органовъ, усвояющихъ пищу и заставляя отростать на счетъ запасовъ корня, который такимъ образомъ совершенно истощается и, наконецъ, замираетъ.

Такъ рожа, которая неудалена изъ пшеницы полостью, потому что въ молодомъ состояніи, въ которомъ она могла бы быть выколота безъ вреда для пшеницы, трудно отличима отъ этой послѣдней; а потому удаляется иногда обкашиваніемъ, когда выколосится, такъ какъ развиваясь нѣсколько быстѣе пшеницы, она въ это время выставляется изъ пшеницы. Обкашиваніемъ въ пауту между полевыми растениями истребляются (стр. 486—489): крестовникъ обыкновенный, поповникъ полевой, рѣдка полевая (*Carduus marianthus*) въ сѣвѣ и ячмень, татарникъ полевой. Для того же, чтобы срѣзать въ возможныхъ постоянное, истощающее многолѣтній корень срѣзаніе надземныхъ частей, какого требуетъ стр. 483, напр., истребленіе блокопытка лекарственного (*Tussilago petasites*), долушника, малины ежевика, мать-и-мачиха обыкновенной, оставляютъ засоренное такимъ сорными травами поле на нѣсколько лѣтъ подъ выгонъ.

Съ цѣлю заставить воздѣлываемое растение развиваться извѣстными образомъ удвѣляютъ, смотря по растенію и цѣли его воздѣлыванія,

на нѣя, различныя части, такъ какъ чрезъ это развиваются сильнѣе остающіяся, потребляющія на свое развитіе и то количество образовательныхъ веществъ, которое иначе было бы употреблено на развитіе удаленныхъ частей (стр. 700).

Такъ у табака обламываютъ побѣги, развивающіеся изъ пазухи листьевъ — *пасынки*, отсюда названіе этого приема *пасынкованіемъ*, употребляемое иногда въ болѣе обширномъ смыслѣ — удаленіе вообще различныхъ частей растенія; у табака же обламываются лишніе листья и цвѣторасположенія для того, чтобы усилить развитіе остающихся листьевъ и придать продукту изъ нихъ большую крѣпость. У кукурузы на зерно обламываются иногда лишніе початки, чтобы усилить развитіе остающихся, початочные обертки и мужскія верхнія цвѣторасположенія, чтобы ускорить созрѣваніе початковъ. У ворсильной шипки въ болѣе южныхъ странахъ обрѣзаваютъ раннія шипки, чтобы получить изъ позднѣйшихъ шипки требуемой, средней величины. У конскихъ бобовъ обкашиваютъ верхушки, чтобы ускорить созрѣваніе нижнихъ бобовъ и удалить гнѣздящихся въ верхушкахъ стеблей вѣшей. У свекловича обламываютъ цвѣточные стебли, которые появляются иногда въ первомъ году еще, для того чтобы предупредить этимъ истощеніе корней въ отношеніи сахара (у сахарной свекловичи) и т. д.

Въ только что разсмотрѣнныхъ приемахъ, равно какъ въ приемахъ, которые были разсмотрѣны прежде въ отдѣлахъ: обработка почвы и посѣвъ, и которые будутъ отчасти разсмотрѣны въ этомъ и послѣдующихъ за этимъ отдѣлахъ, хозяинъ находитъ мѣры къ защитѣ воздѣлываемыхъ имъ растений отъ различныхъ вредныхъ вліяній и къ направленію ихъ развитія сообразно цѣли воздѣлыванія. Главныхъ источниковъ вредныхъ вліяній четыре: *погода, почва, растеніе и животное*.

1. *Вредное вліяніе погоды* сводится собственно къ вредному вліянію низкихъ температуръ, рѣзкихъ и частыхъ переходовъ отъ тепла къ холоду и обратно, избытка и недостатка влаги, сильныхъ дождей, вѣтровъ и града.

Отъ *низкихъ температуръ* растенія страдаютъ преимущественно весной и осенью, но иногда и зимой; весной — отъ позднихъ, осенью — отъ раннихъ утренниковъ и зимой — отъ сильныхъ морозовъ въ отсутствіи снѣжного покрова. Какъ на средства защиты противъ этихъ вредныхъ вліяній можно указать: на выборъ поля съ извѣстнымъ положеніемъ (стр. 140), особенно для растеній, чувствительныхъ къ позднимъ утренникамъ; затѣмъ, на своевременный посѣвъ (стр. 725); на окуливаніе растеній (какъ напр. свекловичныхъ высевъ весной); на покрытіе молодыхъ еще растеній хворостомъ, соломой или преимущественно въ старшемъ возрастѣ, въ ожиданіи утренника, дымомъ (сжигаютъ вещества, образующія густой дымъ, напр. торфъ, на той окраинѣ поля, съ которой тянетъ вѣтеръ), для того чтобы уменьшить излученіе полемъ теплоты (въ Белоруссіи для защиты гречихи) — средства, которыя, несмотря на испытанную

ихъ дѣйствительность, рѣдко примѣняются на большихъ пространствахъ, отчасти по значительной стоимости ихъ выполненіи; наконецъ на удержаніе сѣвѣжнаго покрова на полѣ защитой этого послѣдняго отъ вѣтровъ (стр. 364); или помощью неровностей на поверхности почвы, нарочно образуемыхъ оставленіемъ на зиму всаханной плугомъ или засѣянной подъ плугъ почвы безъ боронованія; или задѣлкой сѣвѣнъ съ грядками (стр. 747). Противъ преждевременныхъ морозовъ и снѣговъ осенью, которые могутъ воспрепятствовать дозрѣванію растений или даже оставить въ полѣ необраннымъ цѣлый урожай или только часть его (какъ напр. въ настоящемъ 1875 г.—весь урожай конопли и часть урожая сахарной свекловицы, оставшіяся въ заморзней и занесенной снѣгомъ землѣ), мы не имѣемъ много средства, какъ не откладывать уборки растений безъ особенной надобности.

Отъ частыхъ и рѣзкихъ переходовъ отъ тепла къ холоду и обратно, растения страдаютъ, поздней осенью, зимой и ранней весной, когда, вслѣдствіе попереѣнныхъ заморзанія и оттаиванія почвы, выпираются изъ земли растенія (стр. 755) или разрываются подземныя междоузлія у злаковъ (стр. 744) или, вслѣдствіе таянія покрывающаго почву снѣга и заморзанія на поверхности образующейся изъ снѣга воды, озимь покрывается въ углубленіяхъ почвы водой, а вода—ледяной корой, подъ которой задыхаются и подопрѣваютъ долго остающіяся въ такомъ положеніи растенія. Для устранения этихъ вредныхъ вліяній, можно предложить: укатываніе полей (стр. 755), мелкую задѣлку озимыхъ полевъ (стр. 744), возможное выровненіе поверхности почвы или же, вслучаѣ необходимости неровности этой послѣдней, помѣщеніе растений на возвышеніяхъ (стр. 747); надлежащее проведеніе, осмотръ и очистка водосточныхъ бороздъ (стр. 468—470) и уничтоженіе ледяной коры помощью плуга, какъ это дѣлается въ некоторыхъ горныхъ странахъ, или помощью катка, бороны или острокованныхъ лошадей, какъ это дѣлается въ прибалтійскихъ губерніяхъ. *Изобиліе снѣга*, въ свою очередь, можетъ быть вредно для растений или тѣмъ, что на влажной, еще незамерзшей почвѣ покрываетъ слишкомъ толстымъ покровомъ озимые всходы, которые, особенно роскошно развившіеся изъ нихъ, при недостаткѣ воздуха, легко подопрѣваютъ; или тѣмъ, что, при таяніи снѣга, даетъ такую массу воды, которая или смываетъ почву или застаивается въ углубленіяхъ почвы, и растенія *вымываются* въ этихъ послѣднихъ. Средствами противъ этихъ вредныхъ вліяній могутъ служить: осушка, въ особенности дренажированіе сырыхъ полей, прикатываніе или обтравливаніе роскошныхъ вселенъ (стр. 763) и надлежащія проведеніе и содержаніе въ порядкѣ открытыхъ канавъ и водосточныхъ бороздъ.

Чрезмѣрно влажная погода можетъ причинять много бѣдъ: мо-

жетъ воспрепятствовать своевременному выполненію большей части хозяйственныхъ работъ; можетъ вызвать чрезмѣрно роскошное развитіе растений, влекущее за собой *полеганіе* растений и загниваніе сочныхъ зеленыхъ частей растений; можетъ помѣшать оплодотворенію растений и слѣдовательно ослабить плодотвореніе, вслѣдствіе растрескиванія и смыванія цвѣтенья; можетъ затруднить уборку зрѣлыхъ растений и ухудшить качество урожая—солома и сѣно смоченныя нѣсколько разъ дождемъ во время уборки, теряютъ не только свой ароматъ, но и значительное количество растворимыхъ питательныхъ для животнаго организма веществъ и даже совсѣмъ сгниваютъ, особенно при дурномъ выполненіи уборки; а сѣмена прорастаютъ въ колосьяхъ еще. Влажная и холодная погода во время проростанія растений понижаетъ вообще качество урожая; такъ, понижаетъ, напр. весьма значительно содержаніе сахара въ свекловицѣ. Осушка, надлежащее проведеніе и содержаніе водосточныхъ бороздъ, болѣе глубокая обработка почвы (стр. 463) и усиленное удобреніе минеральными веществами (стр. 698—699) могутъ значительно ослабить вредныя вліянія влажной погоды.

Чрезмѣрно сухая погода вредитъ растеніямъ болѣе или менѣе, смотря по тому, въ какое время развитія растенія и какъ продолжительно вліяетъ она на растеніе. Злаковыя зерновыя растенія, страдающія отъ засухи въ первое время (напр. овсы 1874 и 1875 года въ Московской и Тульской губ.) образуютъ хорошія зерна, но даютъ мало короткой соломы; страдающія отъ засухи позже, послѣ того, что они пользовались достаткомъ влаги въ первое время, даютъ плохой урожай зерна; иногда вовсе не даютъ зерна; наконецъ, страдающія во все время отъ засухи, кустятся плохо, преждевременно дозрѣваютъ, вслѣдствіе сего даютъ дурной урожай зерна и соломы, хотя послѣдняя получается очень питательной, такъ какъ за недостаткомъ влаги, намопленные въ корняхъ, стеблѣхъ и листьяхъ, питательныя вещества не могли быть употреблены на образованіе зеренъ. Засуха не вредитъ вовсе, если наступаетъ послѣ того, что зерна выйдутъ изъ молока (см. ниже). Подобно этому, у сахарной свекловицы сухая осень, преждевременно приостанавливая ростъ растенія, ограничиваетъ отложеніе сахара въ корнѣ. Особенно страдаютъ отъ засухъ мелкокоренящіяся растенія; всѣ же вообще—особенно въ первое время своего развитія. Для ослабленія вреднаго дѣйствія засухъ, мы имѣемъ слѣдующія средства: защиту полей (стр. 364 и 384); хорошую обработку: преимущественно глубокую всапку съ неровной поверхностью подъ зиму (стр. 514, 521 и пред.), избѣжаніе, по возможности, перепахиванія почвы, весной плугомъ (стр. 474, 514 и 515) и поддержаніе рыхлой и чистой отъ сорныхъ травъ поверхности, какъ у незанятой, такъ и у занятой (между растеніями) растеніями.

почвы во время засухи, для того чтобы замедлить поднятие влаги к поверхности почвы (стр. 106, 133 и 305), а следовательно и испарение ее из почвы *); надлежащее удобрение почвы (стр. 662—663) веществами, увеличивающими ее влагоемкость и гигроскопичность, и наконец, орошение, которого применение на полях затрудняется у нас значительной его стоимостью и недостатком воды для орошения полей как раз в тех местах, где в нем нуждаются поля.

Сильные дожди (ливни), сильные оттопы и грады повреждают растения механически, хотя град может действовать на части растения, с которыми он соприкасается, и никакой температурой; так, пораженные градом части листа обезцвечиваются, замерзают. Ливни уплотняют землю, прибивают растения к земле, иногда же ломают их; град или только повреждает некоторые части их, напр. прорывает листья табака, обивает листья конопля, или совсем ломает их; ветер разрывает листья, напр. у табака, откручивает листья, напр. у майса, ломает, перепахивает, вырывает из земли не только молодые всходы, но и взрослые, особенно высокие и мелкокорневишие растения, и заносит всходы песком. Растения, поваленные ветрами или дождями, если они не склонны к полеганию, по своему развитию, и не перепаханы, могут еще подняться; растения, поломанные, побитые градом до цветения или до выколашения (напр. рожь), могут еще отстростить, образовать побег и дать иногда весьма хороший урожай. В случае же более позднего побития, остается лишь скосить побитые растения, и засеять это место каким-либо растением с таким коротким периодом произрастания, который позволил бы растению достигнуть еще естественной или хозяйственной спелости до наступления холодов. Затѣм, защита полей (стр. 364 и 384), окучивание высоких растений (кукурузы, напр., стр. 759) и прикатывание поля, в случае обнажения ветром корней всходов, могут отчасти предупредить названные повреждения, отчасти ослабить их.

2) Вредное влияние несоответствующаго состояния почвы сводится, главным образом: к вредному влиянию излишней сырости или сухости ее, против которых мы можем бороться теми же средствами, как и против таких же крайностей погоды; затѣм, к вредному влиянию излишней ее плотности или рыхлости, против которых действительны лишь коренныя улучшения, приемы периодической обработки удобрения, предшествующія заделке почвы; далѣе, к

*) Для разрыхления поверхности несколько глыбистой плотной почвы, а следовательно и для лучшаго удержания в такой почвѣ влаги может понадобиться *каток*, который на более рыхлых почвах, нуждающихся с этою же целью в поверхностном бороновании, производит совершенно обратное действие.

вредному влиянию уплотнения почвы послѣ заѣзда ее, иначе *образование коры*, против которого мы можем применять: прикатывание (стр. 755), боронование (стр. 756), мотыжение (стр. 756), окучивание (стр. 758) и прикрытие поверхности заѣзданнаго поля другими веществами (стр. 750); еще далѣе, к вредному влиянию несоответствующаго для растений содержанія въ почвѣ питательныхъ веществъ, против которого мы располагаемъ, главнымъ образомъ, предшествующимъ посѣву удобрениемъ почвы и поверхностнымъ удобрениемъ (стр. 760) растений послѣ заѣзда; наконецъ, к вредному влиянию засоренія почвы т. е. к вредному влиянию, котораго источникомъ служитъ собственно.

3) *Растение*, вредящее воздѣлываемымъ растеніямъ или какъ *сорное растение* или какъ растение обуславливающее *близкннныя явленія* въ воздѣлываемомъ растеніи.

Съ различными *сорными растеніями*, характеромъ ихъ, вредомъ причиняемомъ ими воздѣлываемымъ растеніямъ (стр. 486—490), равно какъ съ непосредственнымъ (полотнемъ—стр. 762; вырѣзываніемъ многолетнихъ сорныхъ травъ—стр. 763; проборонованіемъ всходовъ—стр. 756; сгребаніемъ корней многолетнихъ сорныхъ травъ—стр. 295, 298, 508, 509, 518, 521 и 522; паровой обработкой—стр. 529—536; рядовой культурой съ мотыженіемъ и окучиваніемъ (стр. 756—758); срываніемъ сорныхъ травъ въ цвѣту (стр. 764) и выжиганіемъ полей—стр. 537) и отчасти посредственными (вспашкой засореннаго поля при наступающей сухой и жаркой или холодной погодѣ—стр. 490 и 522; закапываніемъ многолетнихъ сорныхъ травъ, лежащихъ закопанными части растений необходимаго для развитія ихъ почвѣ доступа воздуха—стр. 537; оставленіемъ поля подъ выгонъ—стр. 508 и 537; осушеніемъ—стр. 537; заведеніемъ соответствующаго сѣвооборота—стр. 491—503 и 537) мѣрами истребленія сорныхъ травъ мы ознакомились уже выше; такъ что здѣсь, въ добавленіе къ сказанному о мѣрахъ истребленія сорныхъ травъ, мы дополнимъ лишь посредственныя мѣры истребленія указаніемъ на то, что примѣненіе минеральныхъ удобрень, въ особенности измѣняющихъ физическія свойства почвы, способствуетъ истребленію сорныхъ травъ, которымъ не отвѣчаетъ такое измѣненіе. Такъ, известкованіе почвы способствуетъ удаленію съ почвы, содержащихъ много перегноя: вереска, гречишечной почечуйной травы, крапивы, восточнаго обыкновеннаго, кокорыша собачей петрушки, лебеды, мытника болотнаго, ярутки полевой, яснотки; съ суглинистыхъ и песчаныхъ почв: василька полевнаго, буколы обыкновеннаго, клевера, поповника, горчицы, щавеля малого; послѣдній истребляетъ и при удобреніи почвы мергелемъ; удобреніе золой: древесной, торфяной и бурого угля содѣйствуетъ очищенію почвы отъ жабника и щавеля малого, а костяной тукой—отъ горчицы полевой, рѣдьяки полевой, ярутки полевой; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы (за исключеніемъ, развѣ, известки для истребленія щавеля), слѣдовало примѣнять эти удобрительныя средства исключительно, какъ средства истребленія этихъ травъ. *Проборонованіе почвы до посѣва* (стр. 478), т. е. выравниваніе ее съ цѣлю достигнуть возможно равномѣрнаго прикатыванія сѣмянъ, разсыпанныхъ въ разбросъ (стр. 744), и тѣмъ обусловить возможно дружный всходъ растений, способный заглушить сорныя травы, представляетъ весьма действительную мѣру для истребленія сорныхъ травъ, какъ напр.: костера ржаного, лунавока, сумочника пастушьяго, ярутки полевой и т. д. Наконецъ, у насъ, въ черноземныхъ

губернiяхъ напр. Тульской, для истребленiя сорныхъ травъ въ овесъ, просо, ячмень, горохъ (но не гречихъ), преимущественно же въ первомъ, при-
бѣгаютъ къ неглубокой сошной перепахкѣ узкими пластами (вмѣсто сохи
можетъ быть употребленъ и экстраторъ) уже заѣзданнаго посѣва, пока
ростокъ сѣмени еще не очень длиненъ, такъ напр. у овса не превосходить
еще длины сѣмени, что бываетъ дней 8 спустя послѣ посѣва. *Ломанiе посѣва*,
какъ называютъ такую перепахку, не только уничтожаетъ опередившiе
овесъ всходы сорныхъ травъ, но и разрыхляетъ почву, чѣмъ облегчаетъ про-
ростанiе еще непроросшихъ сѣмянъ воздѣлываемаго растения. Ломанiе
посѣва есть собственнота лишняя обработка, которой требуетъ сплываю-
щаяся почва, но которой не успѣваютъ исполнить до посѣва, потому что
спѣшать этимъ послѣднимъ, чтобы захватить необходимую для овса влагу
въ почву, посѣивъ его по пословицѣ: „сѣй овесъ въ грязь, будешь князь“.

Гораздо разумнѣе и экономичнѣе, впрочемъ, зная истинныя за-
соренiя полей (стр. 489), стараться по возможности уменьшить не-
обходимость въ принятiи мѣръ истребленiя сорныхъ травъ, прини-
мая своевременно мѣры, предупреждающiя засоренiе полей а имен-
но: *тщательное очищенiе сѣмянъ* (см. ниже), которымъ предупреж-
дается занесенiе на поля: гречихъ, заразики, кокорыша собачьей пет-
рушки, костеръ, крестовника обыкновеннаго, куколы, лебеды, лютика
лащеннаго, мака, марьянника, плевель, повелюки, подмаренника, по-
повника, проса, пупавокъ, рѣдкихъ полевой, торицы, чечевичъ
(стр. 486—488). Далѣе, *правильное употребленiе сорныхъ растений*,
т. е. выносокъ цѣльныхъ растений или сѣмянъ ихъ, получаю-
щихся при очисткѣ сѣмянъ воздѣлываемыхъ растений или попадаю-
щихъ вмѣстѣ съ этими послѣдними въ кормъ животнымъ. Чтобы
предупредить занесенiе этимъ путемъ сорныхъ растений на поля,
необходимо выпалывать сорныя травы, прежде нежели образуются
сѣмена; въ случай же подоты, по образованiи сѣмянъ, употреблять
годвыя изъ нихъ въ кормъ (напр. василекъ, лебеду, осотъ, куколь,
чертополохъ), равно какъ и надерганныя корневища пырея, не иначе
какъ вареными или обваренными кипяткомъ; негодныя, же для
корма—употреблять въ подстилку, при чемъ получающiйся съ такой
подстилкой, навозъ, прежде вывозки его въ поле, подвергать по
крайней мѣрѣ 4—5, а получающiйся съ пыреемъ—даже 10—12 мѣ-
сячному тщательному разложению. Лучше, однако, употреблять
такія сорныя травы въ компостъ, гдѣ они, разлагаясь въ теченiе
болѣе долгаго времени съ веществами, содѣйствующими ихъ
разложению, разлагаются гораздо полнѣе. Что же касается сорныхъ
сѣмянъ, то сѣдобныя изъ нихъ, какъ напр. костеръ, который не-
рѣдко заимчивается у насъ въ большомъ количествѣ, должны смар-
живаться животнымъ не иначе какъ измолотыми или сваренными,
слѣдовательно лишившимися способности проростанiя. Негодныя
же въ кормъ сѣмена должны быть сбрасываемы въ яму на дворѣ
или въ саду, поливаемы въ ямѣ отъ времени до времени навозной

жижей и выбираемы разъ въ году изъ ямы въ компостную кучу.
Еще же въриѣ, какъ сорныя травы такъ и корневища и сѣмена ихъ
сжигать, и употреблять для удобренiя лишь золу ихъ. Засоренныя
сѣдобными сорными сѣменами, сѣмена воздѣлываемыхъ растений
сбѣдуютъ давать животнымъ по преимуществу раздавленными, а
засоренную мякнцу—опаренной. Правильное употребленiе сорныхъ
растений особенно важно для предупрежденiя заноса на поля василька,
гречихъ, куколы, лебеды, метлицы, мари, марьянника, осота, пикуль-
ника, поповника, проса, пупавокъ, торицы, шерцы, яснотокъ.
Обкашивание подорожныхъ и полевыхъ междъ до образованiя сѣмянъ
произрастающими на нихъ сорными растениями можетъ преду-
предить заносъ на поля многихъ сорныхъ травъ, какъ-то: вьюсого,
гречихи, почечуйной травы, крестовника обыкновеннаго, марей,
метлицы, нивника, одуванчика, татарника, чертополога, шерцы.
Еще же въриѣ, въ видахъ предупрежденiя засоренiя полей, имѣть
какъ можно меньше междъ; необходимыя же межды—возможно болѣе
узкими, и вовсе не имѣть междъ, покрытыхъ сорными для полей
растениями. Наконецъ, *тщательность* воздѣлыванiя растений вообще,
отъ которой зависитъ быстрое и роскошное развитiе воздѣлывае-
мыхъ растений, есть самое полное и действительное средство
предупрежденiя засоренiя полей.

Страшнѣе другихъ сорныхъ травъ чужеродныя, т. е. проникающiя въ тебѣ
воздѣлываемыхъ растений и высасывающiя изъ этихъ послѣднихъ питатель-
ныя вещества (стр. 486), а между ними—повелики, нападающiя на клеверъ,
ленъ и т. д. Для истребленiя: ихъ скашиваютъ, срѣзаютъ, выдергиваютъ пора-
женныя ими воздѣлываемыя растения на всемъ пространствѣ пораженiя и
удаляютъ ихъ возможно тщательно съ поля. Или, покрываютъ пораженныя
ими мѣста клевернаго поля мякиной, золой; или поливаютъ ихъ навозной
или сѣрной кислотой, которая, впрочемъ, губитъ клеверъ, такъ что
онъ не отрастаетъ болѣе. Или, что въриѣ, перекашиваютъ или выкашиваютъ
пораженныя мѣста; въ послѣднемъ случаѣ вступаютъ такъ: покрываютъ
пораженныя мѣста и ближайшiя ихъ окрестности, на которыя могли уже
распространиться отдѣльныя нити повелики, изрѣзанной въ куски (отъ 8 до
12 дюйм. длины) соломой, опрыскиваютъ ее немного керосиномъ и зажа-
гаютъ.

Болѣзненныя явленiя въ воздѣлываемыхъ растенияхъ обуслови-
ваютъ чужеродныя растения низшей организацiи—*грибы*.

Изъ числа паразитныхъ грибовъ мы назовемъ здѣсь главнѣйшiе: I. Изъ
Водорослей-грибовъ (Phycomycetes) принадлежащiе къ сем. перовоспоро-
выхъ (Peronosporaceae): перовоспоро (Peronospora); *картофельная болѣзнь*—мокрая
таля, отъ которой происходитъ извѣстная картофельная болѣзнь—мокрая
таля, и *ворсянниковую* (P. dipasae)—гниль въ ворсянковой шпальтѣ. II. Изъ
ножовыхъ (Uredinales) принадлежащiе: А) къ сем. Голованевыхъ (Ustilagi-
naceae)—1) мокрую головню ишеницы (Tilletia Caries. Tul.); 2) летучую пыле-
видную головню (Ustilago); ишеницы (U. Carbo. Tul.), проса (U. destruens.
Duby.), майса (U. maydis. Tul.) и ржаного зерна (U. secalis. Rabh.) и Б) въ сем. Ржав-
чаную стеблевую головню (Urocystis occulta. Rabh.) и въ сем. Ржав-
чаныхъ (Uredinales)—1) пухляки (Puccinia): травяную (P. graminis),

полосатую (*P. staminis*) и вилочковую (*P. coronata*), которая производит ржавчину на наших хлебах; подсолнечниковую (*P. helianthi*), производящую подсолнечниковую болельзнь—ржавчину; 2) уромиссы (*Uromyces*): свекловичный (*U. betae*), бобовый (*U. appendiculatus*), фасолевый (*U. phaseologum*) и клеверный (*U. trifolii*), производящие первый—свекловичную, второй—гороховую и клеверную бобовую, третий—фасолевую и четвертый—клеверную ржавчину. и 3) мелампсору леновую (*Melamporaleini*), производящую леновую ржавчину. III. Из сумчатых грибов (*Ascomycetes*) принадлежащие: А. к сем. зерновиков (*Pyrenomycetes*)—1) медвяную росу (*Erysipe*); 2) саженидную росу (чернь): на ржи (*Pleospora napi*. Fuck. *Polydesmus exittiosus*. Mont. *Sporidesmium exittiosum*. Kühn) и на свеклович (*Helminthosporium rhizoctonop. Rabb.*); 3) корнегубителей (*Byssothecium*. Fuck. *Rhizoctonia*. Dl.); люцернового (*By. circinans*. Fuck. *Rh. violacea*. Tul. и картофеля (*Rh. solani*. Kühn), производящего картофельную паршу, и 4) спорыню (*Claviceps purpurea*. Tul.), поражающую не только рожь (преимущественно) но и ячмень (редко), пшеницу и т. д., и Б) к сем. пластинчатых грибов (*Discomycetes*)—раку (*Peziza*): клеверный (*P. ciborioides*. Fr.) и конопляный (*P. Kauffmanniana*. Tich).

Главную массу гриба образует мицелий, замещающий у него корень и стебель вышних растений и состоящий из клеточек, которые, располагаясь преимущественно в ряд и соединяясь в цепи или нити, образуют бесконечное разнообразие грибных форм. Грибы размножаются спорами (так сказать, семенами без зародыша, почками), которые весьма различны как по месту, способу и времени образования их на мицелии, так и по способности прорастать их точно так же по достижении или зрелости, или только через некоторое время. Для своего прорастания, споры требуют известной степени тепла (+ $\frac{1}{2}$ 0° P. и выше) и влаги (вода или влажный воздух), а иногда и известной постели (субстрата), напр. поверхности известной части растения. Возвышение температуры (по крайней мере у споры летучей головки до 16—23° P.) ускоряет прорастание споры. Способность прорастания споры сохраняют иногда весьма долго (напр. споры просняной головки проросли еще через 5 лет). Споры прорастают обыкновенно в растении, на котором чужездствует грибок, и только развивающийся из споры росток проникает в питающее растение через устье (цуклини) или и прямо через стеньги клеточек верхней кожи (пероноспора картофеля). Дальнейшее развитие гриба становится возможным только на известном растении, а плодотворение—даже в известном только органе или известной части растения (у головки и спорыньи в плодике, у ржавчины—у поверхности листа). Наконец, один и тот же грибок, в своем развитии, проходит иногда через несколько форм плодотворения в определенной последовательности, так что споры последней формы, прорастая, дают снова первую форму; и при этом некоторые формы плодотворения образуются не на том же растении, на котором развивалась первая форма, но постоянно на другом, известном растении.

Из причиняемых чужездными грибами болезней наиболее вредны у нас головня, ржавчины колосовых хлебов, бобовых растений, свекловичны, подсолнечника и льна, спорыньи и картофельная мокрая гниль.

Зерно пораженной мокрой головней пшеницы грязно-зеленого цвета, содержит внутри, как это оказывается, если раздавить зерно, вместо зародыша и белка, сначала мажущуюся, а потом пылеобразную, черную,

воющую массу—споры гриба. Больное зерно, примешиваясь к здоровому, понижает цену пшеничного зерна, потому что грязнить его, так что нельзя очистить его скольконибудь полно даже самой тщательной промышленной зерна, оттого мука выходит сбра. Протравливание семян (стр. 721) есть единственное средство против этой болезни. Летучая головня поражает не только внутренность но и оболочки зерен и представляет сухую пыль, которая легко разлетается и потому не грязнить зерен как мокрая, хотя уничтожением зерен приносит такой же вред как и первая.

Ржавчина обнаруживается в конце весны, в начале лета (во время цветения и после него у льна), зарождающимися под неповрежденной кожей листьев а затем выступающими наружу через разрывы кожицы, ржаво-красными, ржаво-желтыми, оранжевыми, ярко желтыми, круглыми или продолговатыми пятнами, которые состоят из лентич. спороносных сейчас же к прорастанию споры (уредоспоры). Нисколько позже эти пятна бурьют или к ним присоединяются в конце лета или к осени, бурная, темная и темно-коричневая даже черная пятна, или гладкая припухлости (у льна) с зигмичными спорами (телеосторами), которые прорастают не ранее следующей весны, если попадут в благоприятные для своего прорастания условия, и образуют новые споры (споридии), прорастающие уже на смоченной поверхности листьев: у пшеницы (ржавчины колосовых хлебов); травяной—барбариса (*Berberis vulgaris*. L.), полосатой—волгодель лекарственной (*Achusa officinalis*. L.), и вилочковой—крушины слабительной (*Rhamnus cathartica*); у пшеницы подсолнечниковой, уромиссов бобового, фасолевого и свекловичного и у мелампсору леновой на вилках тех же самых растений (у свекловичны на веснах побегов); при чем росток прорастающей споридии пронизывает наружные стеньги клеточек кожицы и, продолжая развиваться внутри листовой ткани, образует, так называемую, энцидальную форму гриба с двойного рода органами плодотворения: сперматозоидами и перитериями. В этих последних развиваются споры (телиоспоры*), которая, прорастая на смоченных поверхностях листьев и стебля, проникает ростками в устья растений и образует между клеточками растений мицелий, развивающийся у поверхности растений снова летом и зимняя споры. В случае сильного поражения ржавчиной, листья и стебли покрываются не только листья и стебли, но даже и цветоржавыми пятнами покрываются не только листья и стебли, но даже и цветоржавыми пятнами покрываются почти сплошь пятнами, увядают, нечиста, напр. листья покрываются почти сплошь пятнами, увядают, чернеют и засыхают, так что сильно пораженное ржавчиной подсолнечниковое поле представляется как бы опаленным—пострадавшим от сильного мороза или жара. Ржавчина, конечно, повреждает близлежащее пораженное ею части—солома хлебных злаков дается негодной для корма, а у льна ослабляется волокно (любимая ткань); по затмев не остается без влияния и на зерна, прорастающая совершенно их образование, в случае сильного ее развития (подсолнечник).

Средствами против ржавчины могут служить: удаление из общества полей таких растений, в которых развивается энцидальная форма гриба (стр. 367—368). Затем протравливание семян подсолнечника (стр. 724). Далее, возделывание растений с возможно большими промежутками между отдельными растениями, следовательно по крайней мере в рядах (у подсолнечника фасоли, свеклы). для того чтобы с одной стороны затруднить переход болезни с одного растения на другое, с другой—облегчить полоть,

* У уромиссов (ржавчины бобовых и свекловичны) в энцидовой грибки вырастают и уредоспоры; а у леновой ржавчины пока еще не было наблюдаемо прорастание телеосторы.

Thrips cerealeum—маленькое пастькомое, котораго личинка повреждает колосовые хлеба, такъ что стебель выше поврежденія (колосъ) отмираетъ. Уришь (пшеничную, ворсянковую и свекловичную—*Anguillula tritici*, *hirsa* и ?)—родъ глистовъ, повреждающихъ пшеничные растенія, головки ворсянки и свекловичные корни. Изъ числа вторыхъ приведемъ: *гомяка* (*Oriseus frumentarius*), истребляющаго большія количества хлебныхъ зеренъ на пожъ; *колорадо-картофельнаго жука* (*Doryphora decimlineata*), страшнаго бича картофельныхъ полей въ Америкѣ; *рапсовую блестянку*, повреждающую завязь крестоцвѣтныхъ растеній, преимущественно рапса; два вида мухи *Chlorops* (*lineata* и *frit*), которыхъ личинки: первой повреждаютъ стебли пшеницы, такъ что выше поврежденія растеніе усыхаетъ; второй—выѣдаютъ мягкія зерна въ колосѣхъ, преимущественно ячменя или портятъ ржаные всходы, выѣдая стебли; два вида мухи *Cecydomyia* (*tritici* и *destructos*), изъ коихъ первая въ видѣ личинки выѣдаетъ завязь у пшеничныхъ колосовъ; вторая же извѣстная также подъ именемъ *осенней мухи*, въ видѣ личинки же, портитъ стебли озимой пшеницы и ржи, такъ что они, не выдерживая тяжести колоса, ломаются; *слизня полевая* (*Lilapha agretis*), который повреждаетъ озимые посѣвы, особенно въ влажные годы. Наконецъ, есть животныя, которыя нападаютъ на растенія, находящіяся въ болѣзненномъ состояніи; таково, напр. картофельный клещъ (*Asarus fesculae*), который весьма быстро размножается въ больномъ картофелѣ.

Въ защиту отъ вреда или къ ослабленію вреда, причиняемаго животными воздѣлываемымъ растеніямъ, хозяинъ можетъ принимать *предохранительныя*, предупреждающія появленіе или размноженіе вредныхъ животныхъ на данномъ мѣстѣ, или *истребительныя мѣры*, истребляющія появившихся животныхъ. Первые, по преимуществу, общія для всѣхъ животныхъ, между тѣмъ какъ послѣднія различны для различныхъ животныхъ и должны сообразоваться съ природою какъ воздѣлываемаго растенія, которое подвергается нападенію, такъ и съ природою вреднаго животного, которое или проводить всю жизнь на повреждаемомъ имъ растеніи (напр., муха *Chlorops lineata*) или вовсе не обитаетъ его и, въ такомъ случаѣ, только питается повреждаемымъ растеніемъ: постоянно (напр. амбарный долгоносикъ) или иногда только, питаясь въ тоже время еще и другими растеніями (напр. метлица свекловичная).

Въ числѣ общихъ мѣръ противъ вредныхъ животныхъ мы назовемъ приемы культуры, соответствующія природѣ растенія; возможное ограниченіе участковъ, занятыхъ сплошь однимъ полевымъ растеніемъ; раздѣленіе полевыхъ участковъ древесными насажденіями (стр. 364 и 384); чередованіе растеній съ воздѣлываніемъ одного и того же растенія или даже сходныхъ растеній по возможности меньшее число лѣтъ на одномъ мѣстѣ и съ возможно рѣдкимъ возвращеніемъ его или ихъ на тоже мѣсто (стр. 503); удаленіе изъ соседства полей сорныхъ травъ, которыя могутъ служить пріютомъ для вредныхъ насѣкомыхъ, напр. для озимой вичницы или свекловичной метлицы (попынь); сохраненіе и даже размноженіе естественныхъ враговъ вредныхъ животныхъ, какъ-то: со-

бакъ, кошке, лисицѣ, ежѣ, ласовъ, черныхъ воронъ, грачей, ястребовъ, орловъ бѣлохвостовъ, сарыча, совъ для истребленія зайцевъ, хомяковъ, мышей, сусликовъ, а для истребленія преимущественно насѣкомыхъ — летучихъ мышей, крота, землеройки, ушей, ящерицъ, лягушекъ, жабъ и, въ особенности, птицъ, какъ-то: дрозда, соловья, малиновки, краснохвостки, черногрудки, воробушки, чечановъ, славотъ, крапивника, щеврацы, пилисы, ласточки, мухоловки, сорокопудовъ, сверчка, синицъ, поползней, зяблива, вьюрка, стрелатки, жаворонка, скворца, черной вороны, грача, галки, кукушки, ржанки, пугалцы (чибиса), галки, коростеля (дергача).

Мѣры, принимаемыя въ частности противъ различныхъ вредныхъ животныхъ, состоятъ, главнымъ образомъ, въ истребленіи животныхъ по-одиночкѣ или въ небольшомъ числѣ заразы и массой. Перваго рода истребленіе возможно лишь у болѣе крупныхъ животныхъ; такъ, на зайца охотятся, хомяка ловятъ капканомъ, мышей — въ цилиндрическія дыры, 2 фута глубины и 4—6 дюйм. въ діаметрѣ съ гладкими стѣнками, или же въ горшки, которые вырываются въ землѣ или вырываются въ нее и изъ которыхъ мышь, разъ попавъ въ нихъ, не можетъ болѣе выбраться и погибаетъ отъ усилій выдти или отъ голодныхъ сопляницъ; сусликовъ вылавляютъ изъ норъ водой. Болѣе мелкіе же животныя, въ особенности насѣкомыя, истребляются болѣею частью массами, для чего пользуются мѣстами, гдѣ они находятся въ наибольшемъ числѣ въ сборѣ (напр., пыльная саранча на ночь, во время росы, собирается на сухія мѣста или метлица свекловичная на кустахъ попынь; или же нарочно стараются собрать ихъ для этого въ одно мѣсто. Собираютъ ихъ рѣдко руками, хотя и это дѣлается, когда, при неимѣніи другихъ для этого средствъ, необходимо спасти цѣнное растеніе; такъ, напр., свекловичнаго клеонуса, въ видѣ жука, собираютъ, проходя между рядами свекловицы, въ желѣзные съ узкимъ горломъ бутылки, со времени посѣва свекловицы до іюня мѣсяца, преимущественно во время оплодотворенія жука; а личинки этого жука выпаиваютъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ наиболѣе замѣтно поврежденіе ими свекловицы, или, собираютъ руками гусеницу гаммовой вичницы, если это допускается подвергшееся нападенію растеніе. Чаше же прибѣгаютъ для сбора насѣкомыхъ растеній въ одно мѣсто: къ канавамъ, ямкамъ или приманкамъ. Первыми пользуются для удержанія на мѣстѣ и собиранія преимущественно перемѣщающихся съ мѣста на мѣсто гусеницъ бабочекъ (напр. попынь озимой и гаммовой и метлицы свекловичной), рѣже жуковъ (клеонуса свекловичнаго). Для удержанія на мѣстѣ такихъ гусеницъ, канавы гусеница озимой вичницы, которая боится канавъ, достаточно канавы глубиной въ $\frac{1}{2}$ фута. Если же нужно удержать насѣкомое, которое не боится канавъ и которое даже

охотно идетъ въ канаву, тогда необходимы болѣе глубокія канавы въ 1 футъ (для влеченія) или даже въ $1\frac{1}{2}$ фута глубины и ширины (для гусеницы метлицы свекловичной); къ тому же, въ послѣднемъ случаѣ, съ вертикальными стѣнками, въ первомъ же—полевая стѣнка (для входа) наклоняется подъ угломъ 45° , а противоположная ей дѣлается вертикальной. Канавами окружаютъ мѣсто наиболѣе пораженное насѣкомымъ, чтобы не пустить это послѣднее на окружающія мѣста (напр. у ночницъ озимой и гаммовой), или проводить ихъ только съ одной стороны, съ которой именно необходимо защитить поле; такъ, бабочекъ метлицы свекловичной передъ кладкой яицъ сгоняютъ съ свекловичнаго поля на паровое или другое свободное поле удлиннвнымъ дымомъ, который получается сжиганіемъ сѣры на навозѣ, а затѣмъ, выведшейся изъ яицъ гусеницы преграждаютъ путь на свекловичное поле канавой. Если насѣкомое идетъ въ канаву, то уничтожаютъ его въ канавѣ. Нѣчто подобное канавамъ представляютъ ямы, глубиной $\frac{1}{2}$ фута, дѣлаемые на мѣстахъ пораженныхъ личинкою майскаго жука, которая, двигаясь въ верхнихъ слояхъ земли, попадаетъ въ эти ямы и, по неуклюжести своей, не можетъ выбраться изъ нихъ. Приманки, употребляющіяся для собиранія насѣкомыхъ, весьма различны. Такъ, медвѣдокъ собираютъ или подъ куски дерна (въ $\frac{1}{2}$ кв. арш. и 1 верш. толщ.), которые раскладываются съ осени по дугу или близъ полей, такъ чтобы они нижней стороной касались непременно земля, почему съ мѣста, на которое кладется дернъ, сканивается предварительно трава, если бы она росла, или въ ямы, которыя роются въ сентябрѣ глубиной въ 1 арш., въ мѣстахъ, гдѣ дѣломъ было замѣчено много медвѣдокъ, и наполняются конскимъ навозомъ. Медвѣдка устраиваетъ подъ первыми своимъ гнѣздамъ съ весны, а во вторыхъ собирается послѣ перваго мороза. Оплодотворенныхъ самокъ майскаго жука, отыскивающихъ мѣсто для кладки яицъ, собираютъ въ небольшія кучи навоза, которыя разбѣщаютъ на полѣ и раскладываютъ, когда изъ сложенныхъ въ нихъ яицъ выведутся личинки, для того чтобы собрать этихъ послѣднихъ руками или предоставить истребленіе ихъ домашней птицѣ. Слизней собираютъ подъ раскладываемые по нимъ горшечные черешки, куски тыквы или моркови. Амбарнаго долгоносика собираютъ на развѣшанныхъ по стѣнкамъ амбара шкурки—овчины, въ которыя это насѣкомое забирается на спячку, вмѣсто трещинъ въ стѣнахъ, которыя должны быть тщательно задѣланы. Амбарнаго долгоносика, гороховаго зерновика, гнѣздящихся въ зернѣ, собираютъ, отдѣляя ихъ отъ зерна провѣиваніемъ этого послѣдняго и погруженіемъ въ воду (см. ниже), причѣмъ зерна съ насѣкомымъ, какъ болѣе легкія, относятся дальше при вѣяніи, для всплывающаго наружу при погруженіи. Саранча пѣная, на

3 день по выходѣ ея изъ яицъ, охотно собираются на ночь на верхушки поставленныхъ сноповъ соломы, или просто на положенную выше солому. Блохъ или мошкору собираютъ помощію намазанныхъ клейкимъ веществомъ досокъ или полотнъ, къ которымъ пристають насѣкомыя, тревожимыя прутьями (блохоловки). Личинокъ насѣкомаго *Serphus rugosus*, въ случаѣ ранняго созрѣванія пораженнаго имъ хлѣбнаго злака, собираютъ вмѣстѣ съ хлѣбомъ, который сканивается для этого возможно нѣже, такъ какъ въ это время личинка не спускается въ свое зимнее помѣщеніе у корневой шейки. Сюда же относится обкапываніе вершинокъ у конскихъ бобовъ съ цѣлю удаленія вишей (стр. 765).

Лучшее время для собиранія и истребленія вредныхъ животныхъ то, когда ихъ можно уничтожить въ наибольшемъ числѣ съ наименьшими усиліями и уличтоженіемъ ихъ предупредить болѣе сильное развитіе. Такъ, метлица свекловичная сгоняется съ свекловичнаго поля, пока она еще не положила яицъ; такъ истребленіе саранчи возможно лишь въ состояніи яицъ или пѣшей саранчи; такъ суслики вылавливаются лучше всего раннею весной, когда они еще слабы и не оцѣнились, что бываетъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ; комары вылавливаются осенью и весной, и т. д.

Вредныхъ животныхъ, истребляемыхъ массою, слѣдовательно по преимуществу насѣкомыхъ, находящихся на павѣтномъ мѣстѣ или собранныхъ въ павѣтное мѣсто, истребляютъ: 1) *огнемъ*—сжигаютъ собранныхъ насѣкомыхъ, напр. солому, въ которой собралась пѣшая саранча за ночь; или выжигаютъ жнивье (стр. 537 и 774) для истребленія, напр. остающихся въ жнивѣ гусеницы метлицы просяной или личинки гессенской мухи; 2) *перепашкой*, которая производится или съ цѣлю закопать насѣкомое, напр. личинку гессенской мухи, вмѣстѣ съ жнивьемъ, осенью на такую глубину, на которой она погибаетъ. Или перепашиваютъ, чтобы дать такое положеніе коконамъ окукливающихся въ землѣ насѣкомыхъ, при которомъ слабая бабочка не могла бы выйти наружу; такъ, при неглубокой даже, а тѣмъ болѣе глубокой перепашкѣ поздней осенью яроваго жнивья на полѣ, на которомъ окуклилась свекловичная метлица, коконы ея, которыя лежатъ у поверхности земли выходнымъ отверстіемъ вверхъ, поворачиваются этимъ послѣ внизъ и бабочка лишается возможности выйти наружу, если поле не будетъ тронутъ по крайней мѣрѣ до ередины мая—времени выхода бабочки. Послѣ перепашки можно приватать еще поле, если бы можно было опасаться, что гусеница, оставшаяся потревоженный осенью коконъ, можетъ свить себѣ новый коконъ. Или, перепашиваютъ, наконецъ, чтобы вывернуть наружу сложенные въ землю яйца или ушедшихъ въ землю личинокъ и отдать ихъ на съѣденіе другимъ животнымъ, или подвергнуть

требленію степені развитія; слѣдовательно, время уборки зависить отъ того же, отъ чего зависить и способъ уборки растений и дальнѣйшая обработка убраннаго растенія, т. е. отъ цѣли воздѣлыванія растенія. Время уборки — есть время страдное въ хозяйствѣ, время чрезвычайнаго напряженія рабочихъ силъ, а потому, въ виду того, что ущербъ благоприятнаго времени для уборки можетъ причинить большіе убытки, необходимо: во-первыхъ, запастись достаточнымъ количествомъ рабочихъ силъ, а во-вторыхъ, приготовить заблаговременно все, что только можетъ быть приготовлено заранее изъ необходимаго для уборки, для того чтобы, при надлежащемъ къ тому же распоряженіи имѣющихся силами, достигнуть наибольшей ихъ производительности.

Растенія, со всѣми ихъ надземными частями, срѣзываются ручными орудіями: *серпомъ* или *косой*, или конными — *жатвенными* (жнеями) и *косильными* (косилками) машинами.

Серпы могутъ быть различно изогнутые, различной величины и ширины, съ *плоскообразнымъ* (употребительнымъ у насъ) или *гладкимъ* лезвиемъ. Работы серпомъ требуетъ наименьшихъ усилий со стороны жнатицы, если лезвіе изогнуто, такъ что линия, идущая изъ центра верхняго основанія цилиндрической рукоятки, въ которую вставленъ серпъ, пересѣкая кривую лезвия въ какой бы ни было точкѣ, образуетъ съ касательной къ кривой въ этой точкѣ всегда одинъ и тотъ же уголъ. Серпы съ *плоскообразнымъ* лезвиемъ не требуютъ точенія, но зато требуютъ, чтобы срѣзываемыя ими растенія придерживались рукой или прижимались къ рукѣ; серпы же съ *гладкимъ* лезвиемъ требуютъ точенія, но, за то, срѣзываемыя ими растенія могутъ не придерживаться рукой и не прижиматься къ рукѣ. Лучшими серпами у насъ считаются Валдайскіе и Тульскіе.




Рис. 233.



Рис. 234.

Косы различаются: 1) *длиной* (отъ 28 и даже меньше 18 до 46 дюймовъ), *шириной* и *изогнутостью* клинка (собственно косы, клинка или листа); 2) *формой* косовища, которое можетъ быть *прямымъ* (рис. 233 — тамбовская коса), или *изогнутымъ* (рис. 234 английская коса), и 3) *присутствіемъ* (рис. 233) или *отсутствіемъ* (рис. 234) *грабеля* (лучка, паруса). Лучшими косами считаются со-всѣмъ стальныя (ав-

гійскія) — бывають и желѣзныя наваренныя сталью, сравнительно легкія, нѣсколько выпуклыя (въ плоскости) и выгнутыя (по лезвію — жалу). Къ косовищу прикладываются большою частью рукоятки: двѣ неподвижныя или одна или двѣ подвижныя, устанавливающіяся на различной высотѣ по росту косца*). Иногда (нѣкоторыя английскія, американскія косы) къ сравнительно короткому (4 фута) косовищу прикладывается другое, еще болѣе короткое (3 фута), которое, выходя изъ перваго нѣсколько выше насадки косы, отклоняется отъ него вправо фута на 2 верхнимъ концомъ. Коса прикрѣпляется къ косовищу помощью шипа у широкой ея части, который она прикладывается къ соотвѣстному пѣсолокку концу круглаго косовища; помощью желѣзнаго кольца, которое надѣвается на конецъ косовища съ приложеннымъ къ нему шипомъ косы, и помощью желѣзнаго клина, который загоняется между кольцомъ и косовищемъ. Коса прикрѣпляется такъ, чтобы она съ косовищемъ составляла острый уголъ (около 60°), котораго величина, однако, измѣняется, въ зависимости отъ сопротивленія, представляемаго скашиваемымъ растеніемъ; тѣмъ оно больше (напр. у толстостебельнаго клевера), тѣмъ меньше, острѣе долженъ быть этотъ уголъ, потому что тѣмъ меньше поверхность, которую захватываетъ коса и тѣмъ острѣе уголъ, подъ которымъ коса встрѣчаетъ растенія, слѣдовательно тѣмъ меньше усилие, котораго требуется для срѣзки данныхъ растеній, и наоборотъ. Далѣе, коса прикрѣпляется къ косовищу такъ, чтобы лезвіе косы, а слѣдовательно и остріе ея было приподнято нѣсколько вверхъ сравнительно со спинкой косы, которая во время косбы скользитъ по поверхности земли; это послѣднее необходимо, для того чтобы коса не зарубалась такъ легко въ землю и перерѣзывала бы стебли не подъ прямымъ, а подъ нѣсколько острымъ угломъ, отчего выигрывается также нѣсколько усилий. Коса отъ употребленія тунится и, потому, должна почаще *точиться* брускомъ, который косильщикъ долженъ имѣть съ небольшимъ количествомъ воды всегда при себѣ, въ брусочницѣ на поясѣ. Кромѣ точенія брускомъ, косы совершенно иступившіяся, зазубрившіяся *отбиваются* еще два два въ день въ плоской или острой *бабкѣ* (небольшой наковальнѣ) острыми или плоскими *молоткомъ*; первое легче втораго, но вторымъ способомъ можно лучше и острѣе отбить. Лезвіе косы отбивается пошире и поуже, потоньше и потолще, смотря потому, назначалась ли она для косбы чего-либо болѣе твердаго (колосовыхъ хлѣбовъ, люцерны) или чего-либо мѣнѣе твердаго; во всякомъ же случаѣ равномерно и въ мѣру, потому что слишкомъ оттянутое лезвіе изгибается; мало же оттянутое недостаточно остро; неравномѣрно оттянутое дурно рѣзаетъ и легко иззубривается, а потому отбой косъ требуетъ большой ловкости и навыка и поручается обыкновенно особымъ мастерамъ. Значительно облегчается отбой употребленіемъ особыхъ отбивныхъ снарядовъ, въ которыхъ опредѣляется не только отбиваемая ширина лезвия, но и направленіе удара (опредѣленнымъ положеніемъ наковальни относительно молотка); въ нѣкоторыхъ же изъ нихъ какъ то, такъ и другое можетъ измѣняться по надобности. Выпуклыя косы не могутъ быть отбиваемы, ихъ точатъ, если они совершенно иступятся, на точилахъ. Лучшими косами у насъ считаются Штирскія (отъ 70 до 90 коп. за штуку) изъ Австріи.

Нѣчто среднее между косой и серпомъ представляетъ *горбуша* (лѣтовская коса) — небольшая коса съ короткимъ, волнистымъ вверхъ косовищемъ, употребляющаяся для срѣзки растеній при содѣйствіи маленькой грабли (отдѣльной отъ косы) или грики.

* На нижнюю рукоятку устанавливается, напр. на высотѣ длины косы, если эта послѣдняя равна напр. 36 дюйм., а верхняя отъ нижней въ разстояніи длины руки косца отъ локтя до кончика пальцевъ.




Рис. 285.

Из двух имевшихся систем машин, срывающих растопия: с вращающимися (машина Якушки у нас) и сдвигающимися взад и вперед клинками удержалась, развивалась и достигла, можно сказать, высшего развития, вторая, состоящая из некоторого числа поющих (рис. 285) с гладкими (ножничная) или оилообразными (пильная система) лезвиями клинков. У обеих систем клинки одной стороны всех ножиц неподвижны, образуют, так-называемые пальцы (а, а, а, рис. 285), изготовляются из кованного чугуна и привинчиваются к одному железному брусу (b). Спереди пальцы заостряются в закругленные или четырехгранные острия, а сзади имеют прорезы, доходящие почти до самого переднего острия. Другой стороны клинки всех поющих подвижны; соединяясь попарно в *ножевые пластинки* (с, с, с), формы равнобедренного трехугольника, они, прикрепленные к железной полосе (d), образуют так-называемый *нож*. Помощью направляющего прута нож двигается взад и вперед в указанных прорезах пальцев. При входе режущего снаряда в столю на ног растения, эти последние разделяются пальцами на пучки, которые, при дальнейшем движении машины вперед, соскальзывают вдоль боков пальцев в углы между пальцами и ножевыми пластинками, приближаются затвиз к пальцам с приближением к этим последним ножевых пластинок, и наконец, срываются, при прохождении ножевых пластинок в прорезы пальцев. При соответствующей скорости движения ножа, которая у пильной системы может быть несколько меньше, но все же настолько значительна, что стебли не могут уклониться, часть стеблей срывается и без прижатия к пальцам. Для того чтобы срываемые растения втрое и чаще отделялись от остающихся еще на корню, придвигается к режущему прибору со стороны, противоположной телжки, *раздвигатель*, который состоит из оодвижного, заостряющегося вперед башмака и двух помешенных над башмаком закругленных железных прутьев. Нож, двигаясь взад и вперед, двигается в тоже время вместе со всей машиной вперед. Выполнение этого совокупного движения вместе с числом поющих определяющих чистоту и равномерность срывки.

Машины сдвигающимися взад и вперед клинками представляют две системы: с режущим снарядом впереди телжки, толкаемой лошадьми (машина Бека) и с режущим снарядом, помещающимся с правой (преимущественно, почему впереди будет рыв только о них) или с левой стороны телжки, которую тянут животные, идущие с левой или правой стороны срываемого хлеба. Из этих двух систем удержалась последняя, при которой режущий снаряд будет тем лучше прилегать к неровностям почвы, чем точнее помещается он в вертикальной плоскости оси ходовых колес.

К телжке прикрепляются отдельные части машины и в ней же помещаются передаточные механизмы для режущего и самообсыпывающего приборов. Телжка состоит из ходовых колес и станка, в котором находятся передаточные механизмы. Жатвенные машины (для срывки зерновых хлебов) делаются обыкновенно с одним ходовым колесом (другое ходовое колесо замещает отчасти колесо, находящееся с правой стороны платформы); косильные же машины (которые не имеют платформы) — с двумя ходовыми колесами. Впрочем, два ходовых колеса и у жатвенной машины делают ход машины более втроем и облегчают приведение в движение режущего снаряда. В отношении требуемой машиной рабочей силы особенно важно место прикрепления дышла к телжке, так как от этого зависит равномерность распределения сопротивлений, которые требуются преодолеть, по обе стороны дышла; от этого же, в свою очередь, зависит степень устранения стремления машины поворачиваться в сторону срываемых растений, вследствие того, что все (хотя и незначительное *), сравнительно с суммой всех сопротивлений) сопротивление, представляемое срывкой растений, действует с одной правой стороны дышла, а следовательно и степень экономии той силы, которая напрасно тратится на противодействие такому стремлению. Поэтому, сопротивления распределяются наиболее равномерно, если дышло прикрепляется: у одноколесных машин между ходовым колесом и режущим прибором, у двухколесных же — между ходовыми колесами; наименее же равномерно, — если дышло прикрепляется втв ходовых колес (с левой стороны), так как в этом случае наиболее сильно проявляется у машины стремление поворачиваться к срываемым растениям.

Передаточный механизм состоит обыкновенно из 2-х или 3-х пар зубчатых колес, смотря по тому, должна ли машина только срезать, или же срезать и обсыпывать срываемые растения. Первое зубчатое колесо делается в новейших машинах так, чтобы, при обратном движении машины, действие машины прекращалось само собою; последнее же зубчатое колесо соединяется с всеми машинными с шатуном, который вращательное движение ходовых колес, при посредстве направляющего прута, передает режущему снаряду в вид возвратного прямолинейного движения. В жатвенной машине Джонстона, напр., движение ножей, при двух передаточных к ним от ходового колеса $\left(\frac{83}{17} \text{ и } \frac{37}{10}\right)$ ускоряется в 18, а движение складывающихся граблей при трех передачах к ним от ходового колеса $\left(\frac{83}{17}, \frac{10}{37} \text{ и } \frac{10}{30}\right)$ замедляется в 0,44 раза сравнительно со скоростью движения ходового колеса.

К телжке же прилагается *сиденье* так, чтобы управляющий машиной работник, помещаясь на нем, мог бы удобно наблюдать за машиной и управлять ею, и чтобы весь работник уничтожал давление дышла на лошадей. В названных частях косильных и жатвенных машин сходны между собой. В хорошей вослкт имеют приспособления, для того чтобы работник с своего сиденья на вослкт мог останавливать движение ножа, наклонить вперед или назад режущий прибор так, чтобы он срывал траву ближе к поверхности земли или выше от нее, и, наконец, поднять режущий прибор при встрече препятствий на поверхности почвы, или закинуть его совсем на машину при осрезовке ее. Так, в одной из лучших

* На срывку и сброску употребляется около трети всего усилия, расходываемого машиной в полной работ.

косилок—косилки Джонстона (рис. 236 *) имеют для этого три рычага, из коих самый короткий с левой стороны сиденья служит для первой, средний с правой—для второй и самый длинный с правой же стороны сиденья—для третьей пяди.

Так как зерновой хлеб, при срезывании его машиной, не может оставаться на том месте, на котором он срезан, потому что иначе он, при следующем проходе машины, топтался бы животными, что безвредно для травы, но безвредно для зернового хлеба, из которого при этом вытравливались бы зерна; то, поэтому у жатвенных машин, сравнительно с косилками, необходимо приспособление, которое бы складывало срезаемые растения в снопы и отбрасывало их в сторону, для того чтобы с одной стороны можно было тем же легче вязать хлеб в снопы, а с другой—очищаться от хлеба дорога для следующего прохода машины. Для этого у само-сбрасывающих машин имеют платформы и автоматические грабли. Первая, в вид кругового сегмента, из дерева, отчасти или вся обитая железом, прибивается непосредственно к режущему снаряду сзади и поддерживается с одной стороны ходовыми колесами, к оси которых она подвешена, с другой стороны небольшим, болышею частью колесным колесом. Это последнее колесо, помощью особого рычага, может быть поднято или опущено, причем платформа с режущим снарядом понижается или приподнимается, смотря по высоте над поверхностью земли, на которой должен срезываться хлеб. С наружной стороны платформа имеет стенок и, сверх того, два закругляющиеся железные прута, выходящие из раздвигателя, которые, возвышая, так сказать, стенок, препятствуют стеблям переваливаться через нее. Платформа назначается для принятия на себя подрезанного хлеба. Автоматические грабли имеют двойное назначение: во первых, наклонить подрезаемый хлеб к ношам; во вторых, сбросить подрезанный хлеб в снопах с платформы. Наиболее совершенно исполняют это грабли Джонстоновской системы, которые, числом пять, движутся по изогнутой кривой; так что, подхода к платформе, опускаются на нее очень медленно и тихо, отчего не вымалачивают зерен ударом о хлеб, а, пройдя ее, поднимаются снова вверх. Кроме того у машины Джонстона имеется педаль, нажимая которую во время работы, работник может приводить в бездействие ту или другую граблю и через то изменять толщину снопов. Но, так как в изменении толщины снопов во время самой работы, почти не бывает надобности, то гораздо важнее и удобнее у этой машины возможность изменять ширину снопов (см. ниже) перед началом работы, посредством трех шестерен в 20, 16 и 12 зубьев, которые могут быть заменены одна другой, зацепляясь (с 20 зубой) шестерней, вращающейся с быстрой последней зубчаткой в передаточном механизме между ходовым колесом и граблями, и могут заставить опадать на платформу каждую 5-ю, 4-ю или 3-ю граблю, сообразно желаемой толщине снопов. Без этих шестерен все, сбрасываются самые малые снопы через граблю. Кроме того, у жатвенных машин имеется приспособление для наклонения во время работы режущего прибора и платформы вперед или назад, смотря потому, нужно ли срезать хлеб ниже или выше. Приспособление к поднятию платформы из горизонтального в вертикальное положение без отнятия ее от тележки для проезда с машиной по узким дорогам или в узкие ворота, существующее, напр., в жатвенной машине Вуда, несмотря на хорошую пядь его, не-




Рис. 236.

*) Главный склад машин Джонстона в Москве, на 3-й Мещанской, в доме Тимофеевских; косилка стоит в Москве 195 руб.

удобно в том отношении, что делает машину неустойчивой при перевозке, уменьшает прочность соединения платформы с тележкой и требует все же довольно много умелого труда для исполнения этого.

У машин без самосбрасывающего прибора, с ручным сбрасыванием снопов, имеется только одна платформа; хлеб наклоняется здесь к рвущему прибору и срезанный собирается на платформе позади рвущего сарада работником, вооруженным ручными граблями. Когда же на платформе собирается срезанного хлеба на один сноп, тогда, у большей части машин этого рода, работник, наступая на особое рычажное приспособление, наклоняет платформу назад и ручной граблями сбрасывает хлеб назад и, редко, в то же время в бок (напр. машина „премьер“ Горисби). Такие машины, требующие кроме работника, управляющего машиной, еще одного для весьма тяжелой работы сбрасывания снопов, весьма редко пригодны, особенно у нас.

Наконец, имеются сложные машины — жнеи-косилки, которые жнут, а с отнятием платформы и самосбрасывающего прибора и вторыми небольшими еще изменениями, косят.

Жатвенные машины (Марша, Вуда), которые бы только складывали хлеб в снопы, но и вязали снопы, остаются пока попыткой, которая, надобно надеяться, приведет к постройке столь полезной в хозяйстве машины.

Как лучшие самосбрасывающие жнеи можно назвать жнеи: 1) *Джон-стона* (рис. 237.) двух размеров: 5-ти и более удобную 6-ти фут., т. е. по ширине сжимаемой ими полосы; склад в Москве (стр. 778 там же выдаются наставления для сборки машины и управления ею.), цена 330 и 340 руб.; 2) *Новый Чемпион* Вуда, 5-ти фут., комис. Работник, цена 280—320 р.; 3) *Черера Бурдикс* Осборна, 4-х фут.; Москва, Тверская ул., № 22, склад




Рис. 237.

Акермана, цена 315 руб., и 4) жнеи-косилка *„Чемпион“* Вардера, Мичела и К°, 5-ти фут., комис. Работник, цена 355—370 руб. Все машины на пару лошадей.

Успешность действия жатвенной машины много зависит от хорошей тщательной смазки чистым, нелюбо высушенным деревянным маслом всех трущихся частей, от постоянного наблюдения за гайками, чтобы не дать им ослабнуть, от своевременного и тщательного точения ножа помощником или точильного камня, от 4 раз в день до 2 раз в два дня, смотря по качеству ножа и срезанным растениям и числу часов работы в день, а от своевременной перемычки лошадей (до 4 раз в день при 16 часовой в день работы). Перевозить машину на поле и с поля необходимо, поднимая платформу с рвцами возможно высоко, а пускать ее в хлеб, приведя ее предварительно в полное движение.

А. Уборка растений срезкой остей надземных частей.

Растения, которые убираются срезкой надземных частей, воздвигаются для стеблевых и листовых частей — кормовых трав, или для зерен — зерновых растений и, согласно этому, разнятся между собой как в отношении времени жатвы, так и в отношении способа уборки их и приготовления их к продаже или употреблению и сохранению их в хозяйстве.

а. Уборка кормовых трав.

Убираемая с поля кормовая трава или сейчас же скармливаются скоту в свежем еще состоянии в вид, так-называемого, *зеленого корма*, или же они просушиваются или квасятся для лучшего сохранения их, и скармливаются скоту уже в вид обыкновенного или *зеленого сена*, *бураго сена* и *квашенного корма*.

Лучшим временем для уборки кормовых трав следует считать то, когда они могут доставить с десятины не столько наибольшую массу, сколько наибольшее количество удобоусвояемых питательных веществ; следовательно, как показывают наблюдения, для бобовых и вообще злаковых кормовых трав — начало цветения, а для злаковых трав — полное цветение. Если только позволяют рабочие силы и погода, не следует допускать более поздней уборки, так как перестоявшие растения теряют часть питательных, более богатых питательными веществами листьев и зрелых зерен и дают жесткую, менее питательную массу, содержащую меньше бобовых веществ и больше трудно переваримой древесины; так как, да же, срезанные поздно растения слабо и медленно отрастают, потому что: с одной стороны, те вещества, которые, при ранней уборке, оставаясь в нижних, несрезанных частях растений, были бы употреблены на развитие новых побегов, при поздней уборке потребляются растением на образование

плодовых частей семян, с другой — растение во времени поздней уборки больше деревенеет; и так как, наконец, при медленном отрождении долго стоявших растений, второй укос, в случае запоздания первым, особенно в странах с влажной осенью, может придется в такое время, когда его трудно высушить. При более ранней уборке получается пыльная масса, более богатая белковыми веществами, удобоваримой клетчаткой и фосфорной кислотой, следовательно весьма питательная, но в то же время более богатая водой, а потому трудно просыхающая; кроме того ранне срезанные растения скорее отрастают. Вследствие этого, более ранняя уборка может быть убыточной, по 1-х, при уборке кормовых трав на зеленый корм, так как в этом случае трава не просушивается и необходимо более скорое отращивание ее для последующих укосов; во 2-х, при сильном засорении кормовых трав особенно такими растениями, которые приносят семена раньше, нежели кормовые травы начнут цвести или будут находиться в полном цвету, и в 3-х, при плохом росте трав, вследствие неблагоприятного состояния погоды, когда, скосив скорее растения в таком состоянии и усилив тем их производительность, можно рассчитывать на тем лучший второй укос.

Кормовые травы скашиваются обыкновенной косой без дучка, причем скошенная трава относится косой от скошенной и складывается в валы, или косилкой (пожничной системы). Косят травы лучше всего утром, пока они покрыты еще росой, сочны и упруги; а потому с утра прежде всего косят сухие места с густой, гибкой травой (палухах); позже — поросшие рыхлой сочной травой *).

Если трава косится на *зеленый корм*, то накашивается сразу не более того, сколько нужно для прокормления животных в течение дня. На случай же воскресных и праздничных дней накашивается потребное количество травы в запас и, чтобы сохранить его возможно свежим, складывают в тенистом месте, лучше всего на рыхлом (из жердей) помосте. Такой помост может быть полезным также для складки смоченного дождем или слишком молодого зеленого корма. Для помещения 60 пуд. зеленого корма нужно от $\frac{3}{4}$ до 1 куб. саж. места.

Для сохранения на более долгое время урожая кормовых трав, его просушивают, приготовляя *зеленое* или *бурое сено*. Задача просушки заключается в том, чтобы довести содержание воды в травяной массе до 14 — 15%, другими словами, превратить траву в *сено*, сохранить по возможности ее зеленый цвет, аромат и на-

*) В день косец скашивает от $\frac{1}{2}$ до $\frac{1}{3}$ десятка, смотря по состоянию растений; косилкой, смотря по ширине ее прокоса, в 5—6 фт. от 3 до 4 десятка.

ходящиеся в ее состав важные для животного питательные вещества, которые утрачиваются в большей или меньшей степени тогда, когда травяная масса несколько раз смачивается дождем и пробивается ветром на солнце. Кроме того, при сгребании и разгребании травы, может теряться большое, даже все количество более питательных, скорее высыхающих листьев и более тонких стеблевых частей, чему особенно подвержены клеверные растения (красный клевер), у которых эти части составляют по крайней мере четвертую часть, если не половину всей массы урожая. Задача хорошей просушки травы разбивается различно в зависимости от состояния погоды и свойства кормовых трав.

Наиболее просто, хотя и наименее надежно оставление скошенной травы в валах до тех пор, пока она не столько просохнет, что может быть срезана. Такой способ просушки возможен лишь в местностях с очень сухой и постоянной погодой во время сенокоса, хотя при этом неизбежна утрата сеном зеленого цвета на поверхности валов. Более же обыкновенно и надежно, скосив траву по росе, не оставлять в валах, но, как только просохнет она на поверхности от росы, разбросать ее равномерно по полю или лугу. В течение дня, затем, трава, смотря по более или менее скорому завяданию ее, поворочивается раз или два, до и после обеда. Часто делают ошибку, оставляя завядшую траву на почве разрушенной, вместо того, чтобы сгрести ее, до падения росы, в небольшие кучи, фута 2 вышиной. Если бы, затем, поверхность такой кучи и смочилась росой или даже легким дождем, то все же в течение следующего дня она скоро бы обсохла на солнце и ветру. На другой после скоса день, кучи разбрасываются снова, но более толстым слоем, и трава, смотря по надобности, ворожается несколько раз в течение дня, для того, чтобы в вечеру сгрести ее в большие кучи или скопить в копны. Неслишком сочная трава может даже во времени этого копчения быть достаточно сухой для сзки ее с поля. На третий день копна распускается и сено ворожается. При благоприятной погоде, оно теперь настолько сухо, что может быть срезано. Надобно по возможности стараться сгребать траву в копны каждый раз перед падением росы, следовательно на ночь, или перед дождем, так как, в случае наступления продолжительной ненастной погоды, она лучше защищена от порчи в кучах, чем распушенной по полю. Однако, если бы в таких условиях была скопчена недостаточно просохшая трава, то, в случае наступления продолжительной дождливой погоды, необходимо от времени до времени порыхлять кучи и даже раскрывать их несколько, пользуясь прекращением дождя хотя на непродолжительное время, для того чтобы не

сгноить зеленой растительной массы. Подкошенную не надолго до дождя, или даже во время дождя, траву лучше оставлять въ валахъ, если трава не была еще изъ нихъ разбросана.

Обыкновенно употребляющіяся для сгребанія и ворожанія травы ручныя грабли и вилы могутъ быть съ выгодой замѣнены на большихъ пространствахъ конными сѣноворошилками и граблями. Хороша сѣноворошилка Говарда (рис. 238), шир. 3 арш. 3 верш., вѣс. 23 пуда, на 2 лошади, комис. Работникъ (стр. 274), цѣна 130 — 140 руб.; а изъ конныхъ граблей можно указать: 1) грабли (рис. 239), Рансома, Симса и Геда (стр. 274) съ сидѣньемъ,




Рис. 238.




Рис. 239.

о 24 стальныхъ зубъ-ахъ, вѣс. 17 пуд., на 1 лошади, цѣна 105 руб.; 2) подобныя же грабли, но только съ деревянными колесами, изготовляющіяся въ механическомъ заведеніи Н. Вестберга въ Харьковѣ, цѣна 75 руб., и 3) американскія деревянные грабли (рис. 240), у которыхъ АА оглобли, Т грабли и ВВВ становки для спариванья граблей подъемомъ обѣихъ ручекъ.




Рис. 240.

Частое ворожаніе подготавливаемаго сѣна, влечетъ за собой, потерю подвижной впередъ сушки, все большую и большую потерю листьевъ и пѣжныхъ стеблевыхъ частей у клеверныхъ растений вообще, въ особенности же у краснаго клевера. А потому, для сушки этихъ травъ необходимъ другой приѣмъ, по возможности мало тревожащій подсыхающую траву. Поэтому, богатую листьями и очень сочную траву оставляютъ въ валахъ на день, на два, а когда она въ этихъ послѣднихъ завянетъ съ поверхности, поворачиваютъ ее и соединяютъ по два вала въ одинъ. Спустя 4—5 дней, когда трава на половину просохнетъ, сгребаютъ ее въ кучи, вышиною въ 1—2 фута, въ которыхъ трава удобно проветривается. Изъ этихъ небольшихъ кучъ подготавливающееся сѣно сгребается, наконецъ, въ большія копны, вышины въ 7—10 фута, въ которыхъ оно и остается до тѣхъ поръ, пока можетъ быть снесено съ поля; что наступаетъ иногда, при неблагоприятной погодѣ, недѣли черезъ двѣ послѣ кошенія. Въ странахъ съ влажнымъ климатомъ, гдѣ даже такой приѣмъ недостаточно обезпечиваетъ урожай травы отъ сгноенія или иного какаго поврежденія, можно сушить сочную траву (напр., клеверъ), на подобіе того, какъ сушатъ зерновые растения (см. ниже), т. е. вязать въ средней величины снопы, перевязывая ихъ поперекъ цѣтовъ, стеблями самой травы, если эти послѣдніе достаточно для этого длинны, или, въ противномъ случаѣ, соломенными переваслами, а затѣмъ ставить снопы на землю распушеннымъ пѣсколью комлемъ и оставлять ихъ въ такомъ положеніи до тѣхъ поръ, пока можно снести съ поля сухое уже сѣно. Такой, хотя копотливый и дорогой способъ сушки травы, примѣнимъ для богатыхъ листьями, длинно-стебельныхъ и сочныхъ травъ, въ нестойкую погоду, если имѣется небольшое количество травы для просушки. Для просушки же большихъ количествъ травы въ тѣхъ-же условіяхъ, слѣдуетъ прибѣгнуть къ сушкѣ на козлахъ.

Козлы устроиваются, главнымъ образомъ, трехъ родовъ: въ видѣ заостреннаго снизу (для вбивки въ землю) кола, 8—10 фут. вышиной и 3—4 дюйм. толщиной, съ 6 или 8 перекладинами 4 фут. длины, продѣтыми крестообразно въ просверленные въ колѣ дыры (рис. 241). Или, въ видѣ изгороди изъ ряда болѣе толстыхъ кольевъ, вбиваемыхъ въ землю на разстояніи сажени одинъ отъ другаго, и жердей, которыя накладываются на вбитые въ колья колышки, съ обѣихъ сторонъ: первая въ разстояніи 14 дюйм. отъ земли, а слѣдующія въ разстояніи 28 дюйм. одна отъ другой. Или, въ видѣ пирамиды—треугольника, состоящаго изъ трехъ кольевъ, 9—11 фут. длины и 4—5 дюйм. толщины, съ вбитыми въ нихъ, съ наружной стороны и по длинѣ ихъ, въ опредѣленномъ другъ отъ друга разстояніи, 3—4 колышками; эти колья отверстиями, имѣющимися на верхнемъ концѣ ихъ, падѣты подвижно на деревянный гвоздь, такъ что могутъ раздвигаться и сдвигаться, и, по установкѣ ихъ на полъ раздвинутыми внизъ, соединяются между собой цоцеречьями перекладинами, которыя кладутся на вбитыя въ нихъ колышки (рис. 242). Или, въ видѣ легкой переносной, двускатной крыши, которая




Рис. 241.




Рис. 242.

образуется изъ такихъ же кольевъ, какъ и предыдущихъ, только соединенныхъ попарно. Для образованія козель, устанавливаются въ рядъ, по направленію вѣтра, большее или меньшее, смотря по надобности, число паръ кольевъ (на протяженіи 5—15 и болѣе сажень), въ разстояніи 10 фут. пара отъ пары, раздвинувъ ихъ внизъ, такъ чтобы наклоненныя вершиной къ срединѣ ряда колья были параллельны между собой; а затѣмъ соединяютъ ихъ по коню и скатамъ образуемой ими крыши продольными жердями, укладываемыми на вбитые въ колья колышки, и подпираютъ съ противоположныхъ краевъ (фронтонно) большими же, упирающимися въ коня крыши. Трава накладывается на козлы, свѣжей или нѣсколько обвявшей (въ теченіи дня) въ налахъ, начиная снизу, такъ чтобы нижніе слои, не касаясь земли, перекрывались верхними, для удобства стока воды по поверхности наложенной

травы. Для этого у втораго и послѣдняго видовъ козель трава навѣшивается сперва на нижнія перекладины, затѣмъ на вторыя, такъ чтобы свѣшивавшаяся съ этихъ жердей трава перекрывала нѣсколько траву, наложенную на первыя жерди, и т. д. до верха. Перваго же и третьяго видовъ козель обкладываются, такъ сказать, травой, причѣмъ первые стараются обложить травой такъ, чтобы наложенная трава имѣла видъ обращеннаго остріемъ къ низу яйца, такъ какъ при этомъ стекающая съ травы вода наименѣе смачиваетъ бока ее. Во всѣхъ случаяхъ, верхушка или гребень козель заваливается покрѣпче, чтобы дождь не могъ пробить ее. Въ такомъ положеніи трава остается висѣть на козлахъ въ теченіи нѣсколькихъ недѣль, пока не просохнетъ на столько, что въ видѣ готоваго сѣна можетъ быть свезена съ поля. Иногда, впрочемъ, въ случаѣ педренаго дня, можетъ быть полезнымъ снять траву съ козель и растресть ее на нѣсколько часовъ передъ навалкой на возы. Въ случаѣ постоянно ненастной, дождливой погоды, во время сушки травы на козлахъ, снимаютъ иногда клеверъ съ козель и не разѣ, пользуясь для этого днями сухой, бездождной погоды, и затѣмъ снова накладываютъ на козлы; но это до того хлопотливо, что не всегда выполнимо, да и не нужно при извѣстныхъ видахъ козель, въ особенности послѣднихъ. Свѣжій, наложенная трава накладывается на козлы менѣе толстыми, много въ 7 дюйм. толщины слоями; обвявшая же нѣсколько, къ тому же при хорошей погодѣ, — болѣе толстыми, до 21 дюйм. толщины слоями, такъ какъ въ послѣднемъ видѣ трава ложится рыхлѣе. Для просушки 750 пуд. травы, какъ средняго урожая съ десятины, дающаго около 150 пуд. сѣна, нужны 100 штукъ козель перваго, 15 штукъ втораго рода козель или козлы третьяго рода длиной около 20 саж. Сушка травы на козлахъ кромѣ большой надежности ея, представляетъ еще ту выгоду, что поле весьма скоро, тотчасъ же или черезъ день или два освобождается на всемъ пространствѣ или на большей части его отъ травы; это же представляетъ двойную выгоду: во первыхъ, благоприятствуетъ отращиванію травы, такъ какъ подскошенной травой, въ особенности въ влажную погоду, когда трава именно долѣе всего остается для просушки на полѣ, подпираютъ растенія; во вторыхъ, даетъ возможность приступить сейчасъ къ перепашкѣ живновъ, если это нужно (стр. 584) для сохраненія почвы той рыхлости, которую она приобрѣла, благодаря защитѣ покрывавшихъ ее растеній. Но, эти выгоды сушки травы на козлахъ не одинаковы при всѣхъ родахъ козель. Первые двое козель и въ особенности первые требуютъ большого количества работы для ихъ установки, чѣмъ третьи и четвертые, потому что требуютъ набиванія въ землю дыръ для установокъ кольевъ; первые и третьи требуютъ больше дѣшевого матеріала (который можетъ служить отъ 5 до 10 лѣтъ), чѣмъ вторые и четвертые; первые двое менѣе устойчивы, чѣмъ послѣдніе двое. Четвертые представляютъ наиболѣе благоприятную для стока дождевой воды поверхность. Накладывается трава на четвертыхъ и вторыхъ почему никогда непокрывается плѣсенью изнутри, въ случаѣ продолжительной дождливой погоды; на худшее — на первыхъ. Наименѣе препятствуютъ отращиванію травы первые двое, наиболѣе — третіе. Первые и третіе, сравнительно съ вторыми и четвертыми, представляютъ большое удобство въ отношеніи подвеса къ нимъ травы для накладки, такъ какъ могутъ быть равномерно распределены по всему полю; на вторые и четвертые можно вѣзвать для накладки, чего нельзя сдѣлать у первыхъ и третьихъ; наконецъ, снѣзка травы со вторыхъ и четвертыхъ чрезвычайно легка, потому что стоитъ только снять съ колышковъ одну за другой жерди, на которыя навѣшена трава, и снѣзнуть ее въ телегу, тогда какъ съ первыхъ и третьихъ нужно сдирать ее, что нѣсколько требуетъ много времени и рукъ, но и сопряжено съ утратой сухихъ листьевъ и вѣтвиныхъ частей стебля; первое особенно важно тогда, когда приходится снѣзать сѣно

съ козель въ продолженіи сушки (см. выше), второе — при окончательной уборкѣ сѣна съ козель. Изъ этого слѣдуетъ, что четвертые козлы должны быть предпочтены остальнымъ.

Сѣно, какимъ бы образомъ оно не сушилось, можетъ считаться въ наиболѣе благоприятномъ для связки съ поля состояніи, когда даже наиболѣе трудно высушивающіяся, болѣе толстыя былинны и стебли травяныхъ растений настолько высохли, что ломаются при сгибаніи или скручиваніи. Сушить сѣно дальше излишне, потому что пересушенное сѣно, при накладкѣ его на возы и т. д., теряетъ много питательныхъ частей. Хорошо высушенное сѣно должно имѣть зеленый цвѣтъ и свойственный ему ароматный запахъ.

Въ странахъ съ неблагоприятной, дождливой погодой во время сѣнокоса, которая для приготовления зеленого сѣна, недопускаетъ обыкновеннаго способа, требуетъ хлопотливой и расходуемой сушилки на козлахъ, можно съ пользой прибѣгнуть къ приготовленію, такъ называемаго, *бурого сѣна*, при которомъ трава, прежде окончательной ея просушки, освобождается изъ-подъ вліянія погоды и досушивается теплотой, развивающейся при броженіи травы. Этотъ способъ приготовления сѣна имѣетъ особенное значеніе для кормовыхъ травъ, у которыхъ, какъ у клевера, люцерны, эспарцета, много нѣжныхъ, легко исключающихся по высыханіи частей. Толстостебельная, такъ называемая бислая луговая трава отъ превращенія ея въ бурое сѣно дѣлается точно также вкуснѣе.

Для приготовления бурого сѣна берутъ: луговую траву, изъ которой при благоприятной погодѣ, можно было бы приготовить зеленое сѣно дня въ три, за день до окончательной ея просушки; клеверъ же за 3 и 4 дня до этого, если бы изъ него можно было приготовить зеленое сѣно дней въ 6. Такую, на половину просохшую въ налахъ и копенкахъ траву, иногда даже подкошенную (луговую траву) съ утра и оставившуюся часа 3 раструженной съ обѣда, если она только не влажна настолько, чтобы руна, продержавъ ее съ минутой, отсырѣла *), складываютъ въ стога, 20 и болѣе футовъ въ діаметръ, слоями въ 6—8 дюймовъ, съ постояннымъ и сильнымъ утаптываніемъ помощію находящихся для этого на стогу людей (въ числѣ равномъ примѣрно числу людей, складывающихъ стогъ), пока стогъ не достигнетъ вышины 17—18 футовъ. Завершенный стогъ прикрывается соломой, равно какъ и подъ стогъ можетъ быть подстлана солома, но отнюдь не что-либо болѣе рыхлое, напр. хворостъ. Точно также не слѣдуетъ переслаивать травы въ стогу соломой или чѣмъ-либо подобнымъ соломѣ, рыхлымъ; такъ какъ весь успѣхъ приготовленія

*) Были уже примѣры успѣшнаго приготовленія бурого сѣна изъ травы, скошенной дней за 10 до того и подвергавшейся вымочиванію безпрерывными дождями.

бурого сѣна зависитъ отъ плотности укладки, которая умиротворяетъ доступъ воздуха внутрь массы, и которой вредила бы всякая рыхлая прокладка травы. Въ стогу, вскорѣ (часовъ 10 спустя) послѣ его складки, начинается самосогрѣваніе, которое, смотря по состоянію погоды, усиливается въ теченіе 4 до 8 дней, достигаетъ затѣмъ такой степени, что нѣтъ возможности держать въ стогѣ руны, причемъ стогъ распространяетъ запахъ, похожій на запахъ свѣжеиспеченнаго хлѣба или печеннаго яблока, и, наконецъ, начинается стихать, такъ что, по истеченіи примѣрно 6-ти недѣль, бурое сѣно готово и, во избѣжаніе потери нѣжныхъ частей, рѣжется для употребленія въ кормъ *свинными ножами* (стр. 683). При складкѣ въ стогъ слишкомъ влажной травы самосогрѣваніе можетъ развиться до самовозгаранія или, по крайней мѣрѣ, до обугливанія массы; а при маломъ уплотненіи стога, трава въ болѣе рыхлыхъ мѣстахъ загниваетъ и покрывается плѣсенью. Поэтому для приготовления бурого сѣна менѣе пригодны или вовсе не пригодны слишкомъ толстостебельныя растения, какъ, напр., кукуруза, которыя трудно уплотняются. Приготовление бурого сѣна требуетъ сноровки и, потому, сопряжено съ нѣкоторымъ рискомъ.

Но, съ гораздо большимъ еще рискомъ сопряжено и еще болѣе сноровки требуетъ приготовленіе *горьлаго сѣна*, тоже родъ бурого сѣна, по способу *Клаппмейера*, при которомъ трава, обвявшая въ теченіи сутокъ, складывается на 48—60 часовъ въ большія кучи для самосогрѣванія. Развивающаяся въ кучѣ теплота значительно усиливаетъ испареніе воды изъ кучи и на второй день уже достигаетъ 52° Р.; тогда куча должна быть разбросана для окончательной просушки сѣна, которая быстро наступаетъ. Куча должна быть разбросана даже въ дождливую погоду, несмотря на неудобство этого, потому что иначе кормъ можетъ испортиться (обуглиться).

Наконецъ, еще болѣе независимымъ отъ погоды и толщинны стеблей, представляется способъ приготовленія *квашеннаго корма*, въ особенности же пригодный для сочныхъ и толстостебельныхъ кормовъ, какъ-то: кукурузы на зеленый кормъ, ботвы корнеплодовъ, но можетъ быть употребленъ и для красного клевера, люцерны, луговой травы, въ особенности если просушка этихъ послѣднихъ затрудняется погодой. Для приготовленія квашеннаго корма, можно, въ видахъ полученія возможно болѣе массы корма, убирать кормовыя растения даже въ болѣе старомъ возрастѣ, нежели для приготовленія зеленого сѣна. При постоянномъ приготовленіи квашеннаго корма, въ тому же въ большихъ количествахъ и на опредѣленномъ мѣстѣ, предпочтительно имѣть ямы, выкопанныя впрочемъ на цементѣ; въ противоположныхъ же этимъ обстоятельствахъ можно довольствоваться ямами, вырытыми въ сухой, плотной землѣ на самомъ полѣ, съ котораго берется растительная масса для квашеннаго корма, или по близости хлѣвовъ, въ которыхъ предполагается свармливать квашенный кормъ. Лучшими считаются ямы слѣдующихъ размѣ-

ровъ: 4 фута въ глубины, 12 футовъ ширины сверху и 10 футовъ ширины въ подошвѣ. Для соображенія длины ямы, считается, что на каждый футъ длины ея, въ ней помѣщается отъ 90 до 100 пудовъ зеленой кукурузы*). Вынутая изъ ямы земля складывается около ямы для употребленія ея впоследствии на покрытие квашенного корма. Зеленая, только что скошенная трава укладывается въ хорошо очищенную, слегка даже выбѣленную известью яму послойно и послойно же утаптывается или сжимается даже проѣздомъ по ней тяжелымъ ваткомъ. Для достиженія возможно равномерной и плотной укладки зеленой массы въ яму, можно, до ухода въ яму, превращать зеленую массу въ довольно грубую сѣтку у самой ямы, или же вязать ее на полѣ въ небольшие снопы (помощію тонкихъ веревокъ длиной въ $3\frac{1}{2}$ фута), укладывать ихъ, затѣмъ, по снятіи съ нихъ веревочной перевязи, въ яму правильными слоями и утаптывать. Еслибы масса была нѣсколько суха, то можно немного смочить ее. Такая укладка массы продолжается выше краевъ ямы, фута на $3\frac{1}{2}$ —4; при чемъ наблюдается, чтобы стѣнки ея по верху ямы были по возможности вертикальными, такъ какъ этимъ достигается болѣе равномерная осадка массы. Въ заключеніе сложенная масса, по обрѣзкѣ гладко косою ея боковъ, прикрывается со всѣхъ сторонъ слоемъ земли въ $1\frac{1}{2}$ —2 фута толщины, который тщательно и сильно утрамбовывается, для того, чтобы по возможности преградить доступъ воздуха къ массѣ. Начинаящееся вскорѣ затѣмъ броженіе оканчивается мѣсяца черезъ три, и кормъ готовъ для употребленія, хотя можетъ сохраняться въ теченіи 2 и даже болѣе лѣтъ, если только хорошо приготовленъ. При вскрытіи ямы, тщательно снимаютъ земляную покрывку на небольшомъ протяженіи и, по удаленіи верхняго, покрытаго плѣсенью и загрязненнаго землей слоя, примѣрно въ 3 дюйма толщины, отрѣзаютъ ножомъ потребное на день или и больше (на недѣлю) количество корма. Кормъ выбирается изъ раскрытой части горизонтальными слоями, при чемъ остающееся прикрывается соломой или соломенными щитами, а въ вертикально обнаженной стѣнкѣ приставляютъ деревянную перегородку. Квашенный кормъ поѣдается скотомъ охотно и составляетъ большое подспорье въ хозяйствѣ къ концу зимы, подъ весну. Единственное неудобство этого способа приготовленія кор-

*) Для лучшей набивки ямы, при значительной длинѣ, дѣлаютъ въ ямѣхъ, выложенныхъ кирпичемъ, черезъ каждые 9 футовъ, постоянныя, во все время кирпичными перегородки, выступающія изъ ямы, подобно крайнимъ поперечнымъ ея стѣнкамъ, въ видѣ фронтона двускатной крыши; или же, въ ямѣхъ выложенныхъ кирпичемъ, вмѣсто такихъ стѣнокъ, равно какъ и въ ямѣхъ, выложенныхъ кирпичемъ, употребляютъ въ томъ же случаѣ, передвижную деревянную перегородку, устанавливаемую въ ямѣ съ помощію особой подпорки.

мовыхъ массъ въ провъ заключается въ большомъ расходѣ рабочей силы на подвозъ массы, содержащей 80 и болѣе процентовъ воды, въ постояннымъ ямамъ возлѣ хлѣбовъ, къ тому же въ такое время, когда рабочія силы часто заняты другими спѣшными работами. При непостоянныхъ ямѣхъ, устраиваемыхъ на полѣ, вблизи мѣстъ полученія свѣжихъ кормовыхъ массъ, расходы на перевозку уменьшаются на столько, на сколько перевоза въ этомъ случаѣ уже квашенного корма можетъ быть сдѣлана зимой, въ болѣе свободное отъ хозяйственныхъ работъ время (если тому не мѣшаютъ снѣжные заносы), но за то увеличиваются, вслѣдствіе необходимости устройства каждый разъ новыхъ ямъ, смотря по мѣсту полученія свѣжей кормовой массы. А потому, этотъ способъ приготовленія кормовыхъ травъ въ провъ имѣетъ значеніе не какъ исключительный способъ, а какъ подспорье только къ другимъ способамъ и преимущественно для такихъ массъ, которыя, какъ напр. ботва корнеплодовъ, не могутъ быть сохранены въ провъ другимъ способомъ.

6. Уборка зерновыхъ растений.

Во время цвѣтенія и образованія плода измѣняется жизненная дѣятельность растенія, которая до того, во время роста, заключалась главнымъ образомъ въ превращеніи въ растительное вещество питательныхъ веществъ, поступавшихъ въ растеніе изъ почвы и воздуха. Растеніе, уже за нѣсколько недѣль до окончанія образованія плода, т. е. до наступленія полной зрѣлости его, перестаетъ принимать корнями питательныя вещества изъ почвы и начинать перемѣщать въ направленіи къ цвѣтовымъ частямъ вещества, образовавшіяся во время роста въ листьяхъ или стебляхъ. По мѣрѣ того какъ спораживаются листья и стебли, увеличивается вѣсъ оплодотворенныхъ, развивающихся сѣмена цвѣтовыхъ частей, вслѣдствіе перемѣщенія въ нихъ образовательныхъ веществъ. Въ сѣмени образовательныя вещества употребляются на образованіе зародыша или отлагаются въ видѣ запасныхъ веществъ въ близкѣ сѣмени (стр. 692). Въ сухія лѣта, при недостаткѣ влаги, перемѣщеніе веществъ весьма слабо, и сѣмена, вслѣдствіе этого не достигаютъ полного развитія — растеніе *дозрываетъ преждевременно*.

Сѣмена, по мѣрѣ перехода въ нихъ образовательныхъ веществъ, принимаютъ свой наружный видъ. Такъ, у колосовыхъ хлѣбовъ, сѣмя, достигшее, спустя нѣсколько времени послѣ оплодотворенія, своей настоящей величины, наполняется млечнымъ содержимымъ, вслѣдствіе перемѣщенія въ него образовательныхъ веществъ. Въ это время колосовой хлѣбъ достигаетъ того состоянія зрѣлости, которое отличаютъ названіемъ *молочной зрѣлости*. Млечное содержимое, по мѣрѣ того какъ созреваніе растенія подвигается впередъ, становится гуще и, наконецъ, воскообразнымъ, между тѣмъ какъ солома желтѣетъ. Въ этомъ состояніи зрѣлости колосового хлѣба, называемомъ *желтой зрѣлостью*, сѣмя, перегибаемое черезъ ноготь, ломается еще. Позже же, по достиженіи растеніемъ *полной зрѣлости*, сѣмя дѣлается твердымъ, вслѣдствіе истари имъ воды путемъ испаренія, и не ломается уже болѣе, при сгибаніи его черезъ ноготь. Наконецъ, сѣмя дѣлается совершенно твердымъ, а солома становится бѣловатой, когда растеніе приходитъ въ со-

стояние *перезрелости* (мертвой зрелости). Съ началомъ желтой зрелости, по всей вѣроятности, прекращается вступленіе въ сѣмена образовательныхъ веществъ изъ стебля и листьевъ.

в. Лучшимъ *временемъ* для уборки волосовыхъ хлѣбовъ, если желательно получить наибольшее количество зерна лучшаго качества, можно считать начало желтой зрелости. Впрочемъ, послѣ сѣзки стеблей, сѣмена, во время такъ-называемаго *дозрѣванія*, павѣиваются еще нѣсколько, главнымъ образомъ, вслѣдствіе утраты воды путемъ испаренія. Къ уборкѣ съ расчетомъ на дозрѣваніе уже послѣ сѣзки приходится прибѣгать у такихъ растений (гирса — ягтян, безостая пшеница, просо, рапсъ, особенно пораженный ржавчиной *), которыя, чѣмъ позже убираются, тѣмъ болѣе представляютъ опасности въ отношеніи осыпи зерна, увеличивающейся по мѣрѣ приближенія ихъ къ состоянію полной зрелости. При ранней уборкѣ волосовыхъ хлѣбовъ получаютъ болѣе питательная солома и зерна, которыя проростаютъ скорѣе (стр. 703) и даютъ болѣе бѣлую муку (см. ниже), вслѣдствіе того, по всей вѣроятности, что наружныя оболочки ихъ болѣе нѣжны и легче отдѣляются отъ внутреннихъ частей зерна. Впрочемъ, позднѣе ранняя уборка волосовыхъ хлѣбовъ, напр. въ молочной зрелости, въ расчетѣ на дозрѣваніе ихъ послѣ сѣзки, также ошибочна какъ и слишкомъ поздняя уборка; потому что, если при послѣдней една возможно избѣжать значительной осыпи зерна, то при первой невозможно получить наибольшаго урожая зеренъ, хотя получаютъ зерна, способныя проростать.

Ранняя уборка важна часто въ видахъ уничтоженія сорныхъ травъ; такъ, уборка ржи не позже начинающейся желтой зрелости въ случаѣ засоренія костеромъ, такъ какъ при этомъ зерна костера, примѣшивающіяся ко ржи, получаютъ до того легковѣсными, что легко отдѣляются послѣдствіемъ отъ ржи. Иногда, впрочемъ, засоренность поля можетъ вынудить къ сѣзкѣ воздѣлываемаго растения раньше даже необходимой для полученія зеренъ зрелости ихъ; такъ, напр., яровыхъ хлѣбовъ и озимыхъ пшеницъ и ржи при засореніи первыхъ двухъ выносомъ, а послѣдней чечевицей (стр. 486—487).

Къ уборкѣ растений, на которыхъ плоды созрѣваютъ неравномерно (напр. гречихи, конскихъ бобовъ) слѣдуетъ приступать, когда созрѣютъ первые (нижніе) плоды; къ уборкѣ растений, у которыхъ легко осыпаются сѣмена, (напр. гороха, рапса, проса) — когда дозрѣютъ первые плоды или первые растенія, и къ уборкѣ

*) Причиняемая паразитнымъ грибомъ *Sporidesmium exitiosum*. Кухня ржавчина рапса влечетъ за собой иногда громадный уронъ сѣмю, поражаая преимущественно верхнюю сторону стручковъ, если рапсъ полегъ, вывалитъ въ видѣ чернотѣхъ сученій, нѣтъющихъ видъ точекъ или полосокъ, которыя постепенно увеличиваются. При началѣ болѣзни, окружающая болѣзнь мѣста лань сохраняетъ свѣжій, зеленый цвѣтъ, но позже она становится грязной и сѣмюжается, отчего самое легкое давленіе на стручокъ влечетъ за собой разсыпаніе сѣмянъ.

растений, которыя дозрѣваютъ неравномерно вообще (овса, сѣмюнаго клевера) или вслѣдствіе двуроста (стр. 745) — когда дозрѣетъ большая часть растений.

Кромѣ состоянія зрелости растений, на время уборки растений павѣиваютъ вліяніе еще погода и находящіяся въ распоряженіи хозяина рабочія силы. При благоприятной погодѣ и недостаткѣ рабочихъ рукъ слѣдуетъ приступать къ уборкѣ, особенно большихъ пространствъ, лучше нѣсколько раньше того, какъ это слѣдовало-бы по состоянію зрелости растений, потому что въ этомъ случаѣ можно убрать въ надлежащее время, по крайней мѣрѣ, главную массу растений. При неблагоприятной-же, а именно: холодной и влажной погодѣ, лучше отложить нѣсколько уборку, хотя-бы время и настало по состоянію зрелости растений, такъ какъ на корню растенія лучше всего защищены отъ ненастья.

Растенія, которыя легко осыпаютъ зерно, какъ-то: рапсъ, просо, или у которыхъ легко обламываются колосы, какъ у ячменя, въ случаѣ уборки ихъ въ нѣсколько перезрѣломъ состояніи, чего не всегда можно избѣгнуть, такъ какъ они дозрѣваютъ и перезрѣваютъ очень быстро (иногда день особенно жаркой погоды составляетъ уже большую разницу въ состояніи ихъ зрелости) жнутъ, въ особенности-же косятъ преимущественно ночью, когда не такъ жарко, или пока растенія покрыты росой, такъ какъ въ такое время и въ такомъ состояніи растенія меньше ломаются, и зерна крѣпче держатся въ нихъ.

б. При уборкѣ, растенія сѣмюжаются различно близко къ землѣ; иначе, оставляется *различно длинное жнивье*. Вообще говоря, лучше оставлять жнивье, покороче, потому что въ хозяйствѣ, большей частью, выгодно имѣть больше соломы, и короткое жнивье легче запахивается въ землю. Но, зато, могутъ быть случаи, когда оставленіе болѣе длиннаго жнивья необходимо, а именно: если сѣмюжаемое растеніе сильно проросло сорными травами или подсыянными подъ него клеверомъ, если оно полегло или если необходимо задержаніе сѣмю на полѣ или разрыхленіе слишкомъ плотной почвы; потому что, при болѣе высокой сѣзкѣ: въ первомъ случаѣ, во 1-хъ, въ сѣмюжаемыхъ растеніяхъ не примѣшивается такъ много сорныхъ травъ или клевера, что затрудняетъ просушку сѣмюжаемаго растенія, особенно во время влажной погоды; во 2-хъ, облегчается просушка осеннего укоса клевера, сѣмюжаемаго съ соломой оставленнаго болѣе длиннаго жнивья, если, по мѣстнымъ условіямъ, можно косить клеверъ въ первую осень; въ 3-хъ, обезпечивается перезимовка клевера въ такихъ мѣстностяхъ, въ которыхъ нельзя косить клеверъ въ первую осень, какъ тѣмъ, что клеверъ обкашивается при этомъ меньше, чѣмъ въ случаѣ оставленія короткаго жнивья, такъ и тѣмъ, что

длинное жнивье, способствуя задержанию на полѣ сѣвѣ, защищаетъ плугъ отъ морозовъ. Во второмъ случаѣ трудно срѣзать низко, особенно серпомъ и косой; въ третьемъ—лучше задерживается сѣвѣ на полѣ и почва разрыхляется лучше запашкой въ нее болѣе длиннаго жнивья. Обыкновенную длину жнивья можно полагать въ 3—4 дюйма; длиннѣе же одного фута трудно оставить жнивье, не только потому что оно отнимаетъ у хозяйства слишкомъ большое количество соломъ, но и потому что трудно запахать его въ почву. Но какъ бы высоко или низко не срѣзывались растенія, для облегченія запашки жнивья необходимо, чтобы это послѣднее оставлялось одинаково высокимъ. Это легче всего достигается при срѣзкѣ растеній жнеями, труднѣе—при срѣзкѣ ихъ серпомъ и еще труднѣе—при срѣзкѣ ихъ косой.

Серпомъ растенія жнутъ, смотря по левизу серпа — пилообразному или гладкому—или небольшими горстями, которыхъ набирается въ лѣвую руку столько, сколько можетъ удержать рука, и которыхъ, затѣмъ, кладутъ на землю на перевало до тѣхъ поръ пока не образуется снопа; или небольшими пучками, которые остаются въ отвѣсномъ положеніи, поддерживаемые съ одной стороны стоячимъ хлѣбомъ, съ другой лѣвой рукой жнеца, пока не соберется срѣзанныхъ растеній на одинъ снопокъ; тогда кладутъ ихъ на землю. Большой косой какъ безъ лучка, такъ и съ лучкомъ (стр. 784) растенія срѣзаются — *косатки* или въ *отвалъ*, когда косецъ, стоя къ хлѣбу правой стороной, относитъ срѣзанныя косой растенія (съ полосой шириной въ 7—8 фут. со скоростью 7¼ фут. въ секунду) влево отъ остающихся на корню растеній; или въ *привалъ*, когда косецъ, стоя къ хлѣбу лѣвой стороной, кладетъ подрѣзанныя растенія на стоящія на корню еще растенія. Въ послѣднемъ случаѣ, для безпрепятственнаго продолженія кошения, необходимо, чтобы срѣзанныя растенія относились въ сторону другимъ рабочимъ. Маленькой (литовской, стр. 785) косой косить растенія всегда въ *привалъ*. Жатвенными машинами растенія жнутъ объѣздомъ вокругъ; почему, предварительно, необходимо прокосить вокругъ участка полосу, по которой можно было бы свободно проѣхать съ машиной, и при этомъ, для облегченія жатки машиной на заворотахъ, завруглать нѣсколько угловъ.

Уборка серпомъ представляетъ ту выгоду, что подвергаетъ растенія сравнительно малой осыпкѣ зерна; что отдѣльные растенія ложатся правильнѣе, поэтому легче вяжутся въ снопы и легче потомъ обмолачиваются, и что на полѣ остается самое незначительное число растеній неподобраннмъ; но, за то, она требуетъ большого количества рабочихъ рукъ. Уборка косой требуетъ менѣе рабочихъ рукъ, но за то подвергаетъ растенія сравнительно большой осыпкѣ, перепутываетъ растенія болѣе или менѣе, такъ что затрудняетъ связку въ снопы и обмолотъ ихъ потомъ, и дѣлаетъ необходимымъ согребаніе оставшихся на полѣ стеблей и колосьевъ помощью широкихъ ручныхъ или конныхъ граблей (рис. 239). Впрочемъ, коса представляетъ эти недостатки въ различной степени, смотря по роду косы, употребляемой для кошения, и способу кошенія. Наименѣе

представляетъ ихъ кошеніе маленькой косой съ грабелями, приближающееся къ уборкѣ серпомъ какъ по правильности положенія растеній, такъ и потому что дѣлаетъ излишнимъ подгребаніе оставшихся на полѣ растеній, кошеніе косой съ лучкомъ и кошеніе косой безъ лучка въ *привалъ*; болѣе—кошеніе косой безъ лучка въ *отвалъ*. А потому, первое принимается преимущественно у высокорослыхъ растеній (озимыхъ ржи, пшеницы), которые вяжутся въ снопы; второе — у низкорослыхъ, не всегда вяжущихся въ снопы растеній (яровыхъ: ячменя, овса, проса, гречихи, гороха). Уборка жатвенными машинами съ самосбрасывающимъ приборомъ допускаетъ наибольшее сбереженіе рукъ; въ остальныхъ же, приведенныхъ отношеніяхъ, если и превосходить уборки серпомъ, то, по крайней мѣрѣ, и не уступаетъ ей. А потому, если только мѣстность не слишкомъ холмиста, волнообразна, поле не слишкомъ неровно (узкіе высокие загоны, твердые пласты), каменисто, и экономическія соображенія допускаютъ заведеніе и употребленіе машинъ, уборка жатвенной машиной заслуживаетъ предпочтенія предъ другими способами уборки даже и тогда, если-бы нужно было убирать полеглый хлѣбъ, который жатвенная машина можетъ подрѣзывать поперечной мѣрѣ съ двухъ сторонъ, т. е. перпендикулярныхъ къ направленію, въ которомъ полегъ хлѣбъ; хороши же машины, напр. Джонстона, допускающія значительное пониженіе ножа и наклоненіе платформы впередъ, могутъ жать полеглый хлѣбъ если онъ густъ, по направленію полеганія; въ направленіи же, противоположномъ полеганію, если это послѣднее такъ сильно, что ножъ не можетъ быть опущенъ ниже колосьевъ, ни одна машина не можетъ жать полегаго хлѣба. За машинной уборкой слѣдуетъ уборка большими косами съ лучкомъ и безъ лучка и маленькой косой съ грабелями; послѣдняя особенно хороша тогда, когда приходится убирать полеглый хлѣбъ, съ которымъ она въ рукахъ умѣлаго косца справляется легче серпа. Затѣмъ, для уборки серпомъ остаются мѣста дешевыхъ рабочихъ рукъ, мѣста непреодолимой пока привычки къ серпу и мѣста, въ которыхъ, при невозможности почему-либо машинной уборки, кошеніе затрудняется крайней полеглостью, перепутанностью и засоренностью воздѣваемого растенія выходящими сорными растеніями или необходимостью оставленія особенно короткаго жнивья, хотя-бы съ затратой на это большого количества труда.

В. Растенія въ рѣдкихъ только случаяхъ свозятся съ поля на дальнѣйшее сохраненіе или переработку ихъ тотчасъ же по срѣзкѣ ихъ, какъ это дѣлается иногда съ растеніями, которые подвержены сильной осыпкѣ зерна при высыханіи; напр., просо молотятъ иногда въ тотъ же день какъ снимаютъ. Большей-же частію, снятыя такъ



Рис. 245.




Рис. 246.

бабки *богемия бабки* (рис. 246), в которых 8 снопов, поставленных в два ряда вокруг среднего, прикрываются одним снопом на сѣбѣ. Между тѣмъ какъ въ крестны складываются снопы, пролежавшіе, большей частью, день на полѣ, въ бабки составляются снопы сейчасъ же по сѣвѣ ихъ изъ только что снятыхъ растений (колосового хлѣба), такъ какъ для составленія въ бабки снопы вяжутся нѣсколько меньшей величины и составляются рыхло. Въ бабкахъ хлѣбъ можетъ оставаться довольно долго при ненастной погодѣ безъ поврежденія; такъ какъ въ случаѣ промоки его онъ скоро просыхаетъ въ небольшихъ, рыхло составленныхъ снопахъ; и, въ тому же, можно всегда раскрыть бабку—снять шанку, пользуясь даже кратковременнымъ перерывомъ дождевой погоды, и снова закрыть ее съ началомъ дождя. Поэтому, въ бабкахъ зерна дозреваютъ, не прорастаютъ, и солома не теряетъ ни цѣлы, ни кормового достоинства *).

Рис. 247.




Рис. 248.

Въ костры, крестны и бабки складываются хорошо и легко снопы высококорослыхъ растений (озимыхъ хлѣбовъ), но не низкорослыхъ (ячменя, овса, льна), которыхъ снопы, если только они вяжутся сейчасъ по снятіи растений, а не послѣ сушки растений въ покосахъ и т. д. (см. выше), составляются предпочтительно въ *матки* (суслонки тоже — рис. 247 и 248), т. е. въ два ряда (до 20 сноповъ въ шатрѣ), съ раздвинутыми внизу козлами и сближенными въ среднѣ верхушками, на подобіе двускатной крыши. Для большой прочности шатра, надо обвязать два боковыхъ снопа съ обѣихъ краевъ ряда соломистой веревкой (рис. 247), а для лучшей защиты отъ дождя прикрыть шатеръ крышей (рис. 248) изъ обращенныхъ внизъ колосьями и разобранныхъ на двое сноповъ, или даже про-

*) Въ некоторыхъ частныхъ случаяхъ, напр. рапсъ, пораженный ржавчиной (стр. 802) и потому снимаемый рано, когда большая часть зеренъ еще не дозрѣла и связываемый въ снопы тотчасъ же по сѣвѣ, не только обсохнетъ на вѣтрѣ роса, но которой онъ посится, составляетъ въ особеннаго рода большія

сто однимъ или двумя, смотря по длинѣ шатра, положенными по коню снопами (колосьями въ края).

Въ мѣстностяхъ съ дождливой погодой во время уборки растений, сушатъ эти послѣдніе (преимущественно яровые хлѣба, которые убираются въ болѣе позднее время года) на *острогахъ* и *озеретяхъ*. Первые представляютъ вбитый въ землю колы, на который надвигаютъ снопы: первый стоймя, комлемъ внизъ, а послѣдующіе ближе къ козлу, на сѣвѣ колосьями, такъ что они перекрываютъ другъ друга; хотя на острогахъ хлѣбъ просыхаетъ очень скоро, но зерна легко прорастаютъ въ случаѣ болѣе продолжительнаго ненастья. Лучше остроговъ озерети (Минская губ.), представляющія подъ легкой соломеной крышкѣй или даже и безъ нея нѣсколько горизонтальныхъ жердей, которыя своими концами вкладываются (одна надъ другой и въ разстояніи 3—4 фут. одна отъ другой) въ вырѣзки, сдѣланныя въ вкопанныхъ въ землю стойкахъ (выш. сажени 2—3). На эти жерди навѣшиваются снопы раздвоенными, начиная съ нижней жерди. Иногда нѣсколько параллельныхъ рядовъ такихъ столбовъ съ жердями соединяются подъ одной общей крышей. Хлѣбъ, навѣшанный на такія озерети, хорошо защищенъ отъ ненастья и просыхаетъ скоро.

Хлѣбъ, связанный въ снопы считается копнами въ 52 (4 крестна въ 13), 60 (3 бабки въ 20) или 100 (5 бабокъ въ 20) сноповъ.

Безъ вѣзья въ снопы сушатъ болѣею частью низкорослыя, съ слабымъ стеблемъ, растенія, снимаемыя преимущественно косой, какъ-то: ячмень, овесъ, просо, гречиху, рапсъ, ленъ воздушываемый на сѣмена, а также же бобовыя растенія: горохъ, вику, чечевицу и т. д. Такая сушка продолжается отъ 2—3 до 8—10 дней, смотря по погодѣ, причемъ, при неблагоприятной погодѣ, растенія (ячмень, овесъ) въ валахъ порыхляются и даже переворачиваются.

Иногда, впрочемъ, при продолжительномъ ненастьѣ, колосовые хлѣба, проросшіе сильно травой, составляютъ въ бабки (рис. 249) безъ вѣзья въ снопы, для чего берутъ такое количество растений, которое бы пошло, примѣрно, на 5—6 сноповъ, въ 25 фунт. вѣсомъ каждый, и, поднявъ ихъ колосьями вверхъ, образуютъ изъ нихъ козусъ, который обвязываютъ соломеной веревкой пониже колосовъ и прикрываютъ опрокинутымъ внизъ колосьями и




Рис. 249.

бабки: сперва вокругъ одного снопа ставится въ 4 ряда 21 снопа, 6—8 дюйм. толщиной; затѣмъ, на эти стоячіе снопы кладется два ряда сноповъ потоньше, колосьями внутрь вкруга, такъ чтобы козлы 1-го ряда прикрывали стручки стоячихъ сноповъ, а козлы 2-го ряда—стручки сноповъ 1-го ряда; наконецъ, такая коническая бабка завершится тремя снопами, и вершина ея прикрывается соломой, такъ чтобы эта послѣдняя перекрывала перевѣсы второго лежащаго ряда сноповъ. Въ такихъ бабкахъ рапсовыя зерна, защищенные отъ дождя и солнца, доходятъ превосходно безъ всякой осмачи, а растенія совершенно просыхаютъ въ теченіи 12—14 дней.




Рис. 250.

въ небольшія кучи, въ которыхъ досушиваютъ ихъ только при порыхлѣніи, еслибы въ этомъ послѣднемъ была надобность. Третья (напр. просо), которую убираются въ прозелень для предупрежденія осипки, оставляютъ въ покосахъ день, два и, затѣмъ, сгребаютъ въ большія кучи, въ которыхъ они даже вѣсколько согреваются, или, какъ говорятъ, *томятся*, причемъ хорошо просыхаютъ, а зерна дозреваютъ безъ осипки. Четвертая, напр. рапса, сгребаютъ въ небольшіе круглые *одомки* (рис. 250), въ которые растенія укладываются стручками внутрь, а колосьями наружу и на которые, въ предупрежденіе разноса растеній вѣтромъ, накладываютъ колья, палки и т. п. Пятая, наконецъ, (напр. гречиху), тотчасъ по скошеніи, составляютъ иногда въ шатры, разставляя колья и сближая верхушки растеній.

г. Высушенные растенія иногда обрабатываются даждѣ или сохраняются на самомъ полѣ; большей же частію, *связываются* для этого въ усадьбу. Какъ только высохнуть сжатія растенія и наступитъ благоприятная погода, такъ сейчасъ же надобно употребить всѣ силы, для того чтобы перевести урожай какъ можно скорѣе на мѣсто сохраненія или дальнейшей обработки. Успѣхъ перевозки зависитъ кромѣ состоянія погоды отъ перевозочныхъ средствъ: члена и качества телегъ, рабочаго скота и людей и умѣнья распорядиться послѣдними.

Лучше другихъ для перевозки снопового хлѣба и другихъ высушенныхъ растеній четырехколесныя, двуконныя телеги, напр., употребляющіяся у насъ арбы, мажары или изображенныя на рис. 251. Можно употреблять для этого и ратки съ надѣлкой и койкой (рис. 207). Для перевозки такихъ растеній, у которыхъ легко осипаются зерна (напр. рапса), телеги выстилаются перетью. Для безостановочной свозки слѣдуетъ имѣть телегъ, людей и рабочаго скота столько, чтобы, въ то время какъ одинъ телегъ находится въ пути и разгружается, были другія, которыя могли бы нагружаться: если разстояние перевозки не болѣе версты, то необходима одна нагружающаяся телега на одну въ пути; при 2-верстномъ разстояніи одна—на два и т. д. Для нагрузки (навивки) воза, кромѣ возчика, нужны одинъ навивальщикъ и 2—3 подвальщики; для разгрузки же—столько же или немного меньше.

Обработка высушенныхъ на воздухѣ растеній заключается въ выдѣленіи изъ нихъ зеренъ (*молотьба*), которой предшествуетъ иногда искусственная сушка *въ снопахъ*, въ отдѣленіи зеренъ отъ постороннихъ примесей (*вяліи и очищеніи*) и раздѣленіи ихъ по качеству (*сортировка*).




Рис. 251.

д. Сушка снопового хлѣба имѣетъ цѣлю облегчить обмолотъ, т. е. выдѣленіе зерна изъ соломы и сдѣлать зерно и солому болѣе прочными и удобными для сохраненія.

Сноповый хлѣбъ сушится у насъ обыкновенно въ помѣщеніяхъ (срубахъ) съ поломъ и потолкомъ (иногда у крестьянъ, впрочемъ и безъ потолка), которое нагревается или исключительно входящимъ въ него дымомъ, если печь помѣщается внѣ его (*овинъ*), или же и тепломъ, отдаваемымъ нагрѣтой печью, если эта послѣдняя помѣщается внутри его (*рига*).

Въ овинѣ обыкновенно три отверстія: одно въ полу для входа дыма, другое—въ потолокъ (посредствѣ или сбоку) или у пола для выхода влажнаго воздуха, и третье—въ стѣнѣ, для насады сноповъ, которые помѣщаются или на жердахъ, *колосникахъ*, выше пола, или на самомъ полу въ одинъ или два ряда; причемъ, въ послѣднемъ случаѣ, нижній рядъ помѣщается колосьями вверхъ, а верхній колосьями внизъ. Въ ригахъ же имѣются только послѣдніе два отверстія. Смотря по устройству овина и печи, температура воздуха въ овинѣ достигаетъ 50—90° Р. при входѣ въ овинъ, 40° въ средній овина и 20—30° у вытяжнаго отверстія. Въ ригахъ воздухъ нагревается равномернѣе и не такъ сильно, до 30° въ срединѣ. Варазъ насаживается въ овинъ или ригу отъ 1½ (крестьянскіе овинны) до 25—40 копѣекъ (улучшенные овинны и риги), которые остаются тамъ для просушки, считая въ томъ числѣ и время, потребное для насады и остыванія хлѣба, отъ 2 до 12 часовъ. Для просушки одной коны ржи, дающей, приѣрно, 6 четвериковъ зерна, расходуется отъ 2½ до 4 пудовъ соломы или дровъ (смѣшанныхъ сосновыхъ и еловыхъ).

Хорошій овинъ (тоже рига) долженъ: во 1-хъ, быстро и полно удалять влажный воздухъ, для того чтобы зерна не запаривались при высокой температурѣ внутри овина и большомъ количествѣ влаги, выдѣляемой сырмъ хлѣбомъ вначалѣ (стр. 704). Это достигается устройствомъ вытяжныхъ отверстій достаточно большой площади, надлежащимъ помѣщеніемъ ихъ въ потолокъ или у пола, снабженіемъ ихъ трубами и приспособленіемъ, которое позволяло бы закрывать и открывать ихъ по мѣрѣ надобности. Вначалѣ, пока продолжается топка и не просохъ еще хлѣбъ, вытяжныя отверстія держатъ открытыми. Во 2-хъ, овинъ долженъ расходовать возможно мало топлива. Это достигается устройствомъ плотныхъ стѣнъ и потолка; закрытіемъ

выходнаго. для дыма, отверстія, когда хлѣбъ просохнетъ и прекратится топка; помѣщеніемъ входнаго, для дыма, отверстія въ овинѣ такъ (напр., у пола), чтобы дымъ, прежде выхода его изъ овина, по возможности полно отдавалъ теплоту овину; устройствомъ печи въ ригахъ съ достаточнымъ числомъ дымовыхъ оборотовъ и каменкой, которая, задерживая тепло, способствовала бы болѣе сильному нагрѣванію печи и охлажденію дыма настолько, чтобы онъ выходилъ въ ригу безъ искръ. Конечно, черезъ это послѣднее, если сушка производится не постоянно, задерживается нагрѣваніе рига или овина, потому что печь медленно отдаетъ тепло, и потому несомнѣнно было бы выгодно замѣнить кирпичные обороты печи желѣзными трубами, которыя сравнительно быстро отдаютъ теплоту. Въ 3-хъ, наконецъ, овинѣ должно представлять возможно малую опасность отъ огня; это достигается помѣщеніемъ топки въ овина или рига, и такимъ устройствомъ печи (см. выше), чтобы дымъ выходилъ въ ригу безъ искръ.

Просушенными въ овинѣ (ригѣ) растенія сравнительно легко обмолачиваются; зерно и солома ихъ хорошо и удобно сохраняются, солома можетъ быть плотнѣе набита и потому требуетъ меньше помѣщенія для своего сохраненія чѣмъ несущенная; мука изъ зерна овинной сушки даетъ болѣе припека; овинная просушка зерна можетъ уничтожать способность проростанія нѣкоторыхъ примѣшивающихся къ зерну сорныхъ сѣмянъ, не запарывая, не поджаривая и не уничтожая, при надлежащемъ веденіи ея, способности проростанія у зерна; наконецъ, дѣйствуя высокой температурой, а отчасти, можетъ быть и дымомъ, можетъ убивать гниющихъ въ зернахъ насѣкомыхъ (стр. 782), предохранять хлѣбныя зерна отъ поврежденія ихъ амбарнымъ долгоносикомъ и предотвращать вредное дѣйствіе на здоровье животныхъ соломы пораженной ржавчиной и т. д. Но, овинная сушка хлѣба имѣетъ и невыгодныя стороны: сообщаетъ дымный вкусъ зерну и дѣлаетъ солому менѣе пріятной и питательной для скота (стр. 298, II ч.) и болѣе ломкой, отчего она сильно разбивается молотилкой. Конечно, эти неудобства могутъ быть устранены устройствомъ рига, въ которыхъ хлѣбъ сушился бы не дымомъ, а нагрѣтымъ воздухомъ; но, вѣстѣ съ этимъ уничтожаются незначительныя, къ тому же сомнительныя выгоды овинной сушки, какъ сушки дымомъ; а остальныя, болѣе значительныя выгоды ея могутъ быть, затѣмъ, достигнуты сушкой одного зерна, выдѣленнаго изъ соломы, гораздо дешевле, чѣмъ сушкой зерна и соломы вѣстѣ въ снопахъ; потому что, для просушки одного и того же количества зерна, послѣдняя требуетъ втрое больше топлива, гораздо больше мѣста, а слѣдовательно и строительнаго матеріала и гораздо больше рабочихъ рукъ, чѣмъ первая. Къ тому же, сушка хлѣба въ снопахъ представляетъ гораздо болѣе опасности отъ огня, чѣмъ сушка одного зерна. Что же касается: во-1-хъ, способности проростанія, то она мо-

жетъ быть сохранена также и при сушкѣ зерна отдѣльно, если надлежащимъ образомъ устроить зерносушилку; въ томъ же, сохраненіе ея необходимо лишь у сравнительно небольшой части зерна, предназначенной для посѣва, а такое небольшое количество не представляетъ большихъ затрудненій въ сохраненіи его даже не сушеннымъ. Во-2-хъ, трудности сохраненія соломы подъ крышей, то это неудобство устраняется возможностью сохранять солому не подъ крышей въ ометахъ, къ тому же распорядиться обмолотомъ хлѣба, такъ чтобы не накопилось заразъ большаго количества соломы. Въ 3-хъ, трудности обмолота несущеннаго снопового хлѣба, то это неудобство устраняется молотильными машинами, которыя съ одной стороны съ гораздо болѣе силой выдѣляютъ зерна изъ соломы, чѣмъ это можно сѣномъ, а съ другой — даютъ возможность обмолачивать хлѣбъ въ такое время, когда онъ еще сухъ и не столько и слѣдовательно легче обмолачивается. Поэтому то, овинная сушка необходима и возможна развѣ только на сѣверѣ: возможна, потому что здѣсь имѣется еще дешевое топливо; необходима, потому что здѣсь нельзя успѣть обмолотить весь хлѣбъ пока онъ еще сухъ, да и не убирается онъ никогда настолько сухимъ какъ южнѣе; потому что имѣются для сѣвѣрной молотилки иногда даровыя руки въ теченіе длинной зимы, если, для того чтобы имѣть рабочихъ лѣтомъ, приходится держать ихъ вкруглый годъ; наконецъ, потому что здѣсь солома труднѣе сохраняется въ ометахъ.

е. Растенія обмолачиваются удареніемъ ихъ о что либо твердое, или ударомъ по нимъ чѣмъ либо твердымъ: *палками, кичками, вальками, колотушками или цѣпами, испытываемыми животными (гонкой), телѣгами (на гарманахъ), молотильными катками и, наконецъ молотильными машинами.*

Для обмолота въ большей части случаевъ необходимъ *токъ*, который, при молотѣ цѣпами, гонкой, на гарманахъ и катками, служитъ для настилки обмолачиваемыхъ растеній и опорой для нихъ при ударѣ по нимъ; въ болѣе же части случаевъ на немъ собирается зерно, выбиваемое изъ соломы. А потому, во всякомъ случаѣ онъ долженъ быть по возможности ровнымъ, безъ углубленій, въ которыхъ западали бы зерна и изъ которыхъ извлеченіе этихъ послѣднихъ было бы затруднительно; при обмолотѣ же цѣпами и катками хорошо, если токъ имѣетъ нѣкоторую упругость, такъ что цѣпы и катокъ отскакиваютъ отъ него и зерно не перебивается на немъ. Токъ можетъ быть *постоянный* или *временный*.

Постоянный токъ дѣлается деревянный изъ досокъ, каменный изъ каменистыхъ плитъ, или глиняный. Первый имѣетъ большую упругость, но дорогъ и къ тому же дерево то разбухаетъ, то высыхаетъ; второй слишкомъ твердъ, а потому болѣе обмываемъ третій. Онъ дѣлается изъ хорошей, вязкой, очищенной отъ камней и крупнаго песка, кирпичной глины, которую

*) Весьма хороша рига въ имѣніи Алекс. Флаш. Быченскаго подъ Яре-славлемъ. Проектъ этой риги имѣется въ ком. сельскохоз. консультаціи.

навозить на выровненную хорошо земляную поверхность, назначенную для устройства тока, разбрасывать сколько возможно лучше, разсплющить какъ можно равномерно по поверхности, поливать водой, пока не пропитается совершенно и, наконецъ, начинать мять ногами. Когда глина хорошо перемнется, тогда сдвигаютъ ее въ кучу и потомъ разравниваютъ по всей поверхности ровнымъ слоемъ, котораго толщина должна быть фута 1½. Когда глина обсохнетъ, ее начинаютъ убивать бабой и продолжаютъ это, по 2 раза въ день, до тѣхъ поръ, пока токъ не будетъ совершенно гладокъ, ровенъ и сухъ. Послеъ этого поливаютъ его бычачью кровью, такъ чтобы поверхность его совершенно пропиталась ею; а, затѣмъ, разсплющиваютъ нѣсколько кошелюкъ окалины, такъ чтобы она укрывала всю поверхность ровнымъ слоемъ и снова убиваютъ бабами. Еслибы, при скоромъ просыханіи въ жаркую погоду (токъ устранивается лучше всего въ маѣ, іюнѣ), на току образовались трещины, то, отъ времени до времени, поливаютъ его навозной жижей и снова убиваютъ бабами. Току не даютъ просыхать быстро, такъ какъ онъ долженъ просыхать равномерно во всей толщинѣ. Въмѣсто окалины, покрываютъ токъ иногда самымъ тонкимъ слоемъ гидравлической цѣменты (нетолще соломины), разбрасывая ее помощью сита по току, который въ это время не долженъ быть не слишкомъ влаженъ, не слишкомъ сухъ, и затѣмъ убиваютъ бабами. По прошествіи 6 часовъ токъ твердѣетъ съ поверхности, а чрезъ 14 дней во всю толщю. Для приготовления хорошаго тока нужно отъ 4 до 5 недель времени, смотря по погодѣ; въ сухую меньше. Такой токъ имѣетъ всѣ необходимыя качества хорошаго тока: упругъ, ровенъ и недунитъ; слѣдовательно, остается долго ровнымъ. Токъ помѣщается обыкновенно подъ одной крышей съ овинами и рнгой, гдѣ эти послѣдніе въ употребленіи, и тогда вся постройка называется *риной*; *риной* же называется и одинъ токъ подъ крышей, съ мѣстоми по бокамъ его для складки сноповаго хлѣба. Временной токъ устранивается обыкновенно при молотбѣ хлѣба въ полѣ. Подъ вытѣпываніе животныхъ, называемое у насъ также *юшкой*, мѣсто, назначенное въ полѣ для тока, очищается отъ лишней лопатами, подметается метлами и подливается водой, чтобы убитъ пылъ; или для молотбы телѣгами приготавливаютъ токъ выжиганіемъ, а для цѣпной молотбы или даже молотбы катками (напр. рауса) употребляютъ вмѣсто тока грубое полотно, котораго бока приподнимаются и прикрѣпляются къ столбамъ.

Растенія, связанныя въ снопы, обмалачиваются иногда удареніемъ ихъ (рожь, пшеница, стр. 717) о что либо твердое, напр. козель (толстое бревно на 4-хъ ножкахъ), или удареніемъ ихъ другъ о друга (макъ); иногда же, удареніемъ по снопамъ, которые держатъ въ рукахъ (ленъ, макъ) палкой, вичигой или валькомъ, или по снопамъ, которые кладутъ на землю (ленъ), особой колотушкой. Зерна, выбиваемыя при этомъ изъ соломы, падаютъ или на токъ, или въ подставленные чаны и т. д. Но гораздо распространеннѣе этихъ способовъ молотба цѣпомъ.

Для молотбы цѣпомъ растеній, какъ связанныхъ, такъ и несвязанныхъ въ снопы, настилаются длинной полосой въ ½ фута толщиной; если настилаются снопы, то настилаются въ два ряда, колосьями внутрь и комлями наружу, старательно пробиваются, затѣмъ переворачиваются на другую сторону и снова пробиваются; потомъ развизываются и пробиваются еще два два и даже до шести, если хлѣбъ сыръ. Для молотбы цѣпами охотно ставятъ нечетное число молотильщиковъ 3, 5, 7; лучше партіями насвѣше 6 человекъ.

Хлѣбъ вымалачивается цѣпами сколько нибудь чисто, если онъ сухъ, тщательно переворачивается и пробивается нѣсколько разъ; но, за то, при цѣпной молотбѣ сберегается солома. Цѣпомъ хлѣбъ обмалачивается медленно, и молотба не рѣдко продолжается цѣлую зиму; это же ухудшаетъ качество, а слѣдовательно понижаетъ цѣну зерна, затрудняетъ пользоваться наиболѣе выгоднымъ временемъ для сбыта зерна, облегчаетъ расхищеніе зерна и дѣлаетъ необходимымъ сушку хлѣба въ снопахъ.

Молотба ускоряется при молотбѣ на *гарманахъ*, какъ называютъ у насъ *вытѣпываніе животными* и молотбу *телѣгами*, и при молотбѣ катками; но, зерна выбиваются изъ соломы недостаточно сильно, въ особенности при вытѣпываніи, а потому этими способами обмалачиваются только очень сухія растенія, а вытѣпываются даже преимущественно растенія, у которыхъ зерна особенно легко выдѣляются изъ соломы, какъ-то: рапсъ, ячмень, у насъ же преимущественно: просо, ленъ и гречиха. Впрочемъ, нѣкоторые изъ нашихъ хозяевъ предпочитаютъ машинной молотбѣ вытѣпываніе у проса, потому что просо въ послѣднемъ случаѣ меньше шелушится, чѣмъ въ первомъ, и молотбу катками у твердыхъ пшеницъ (арнаутки-бѣлотурки), потому что катками будто-бы эти зерна выбиваются лучше изъ соломы, чѣмъ обыкновенными конными молотилками. Далѣе, при этихъ способахъ молотбы, въ особенности же при вытѣпываніи, какъ зерно такъ и солома грязнятся изверженіями животныхъ, зерна поддаются отчасти животными и солома сильно разбивается. При вытѣпываніи, кромѣ того, хлѣбныя зерна даже перебиваются. Наконецъ, эти способы молотбы требуютъ настилки при нихъ кругами до 6 саж. въ діаметрѣ и, слѣдовательно, такихъ большихъ квадратныхъ токовъ, какіе могутъ быть только *) подъ открытымъ небомъ; а потому молотба этими способами въ ненастную погоду прекращается, а захваченная ненастной погодой въ полѣ можетъ причинить большой уронъ. Изъ всего этого слѣдуетъ, что вытѣпываніе годится для обмола хлѣба лишь въ случаѣ недостатка средствъ обмолотить хлѣбъ иначе; вообще же эти способы молотбы пригодны для растеній, которыхъ солома не имѣетъ кормовой цѣнности, или въ мѣстностяхъ, гдѣ солома имѣетъ вообще малую кормовую цѣнность и гдѣ растенія сходятъ съ поля сухими и къ тому же такъ рано, что могутъ быть обмолочены еще въ сухую погоду (въ нашихъ юговосточныхъ губерніяхъ).

У насъ употребляютъ рубчатые каменные (въ Екатеринославской и Таврической губ.) и булавковые деревянные (въ Бурулдинѣ) катки. Молотильныя катки дѣлаются нецилиндрическими, а слегка суживающимися къ одной

*) Впрочемъ, катки, движущіеся взадъ и впередъ и допускающіе настилку растеній полосой, были приняты подъ крышей.

сторонѣ, чтобы облегчить болѣе крутое, сравнительно съ полевыми катками, заворачиваніе. Для молотбы этими способами настлаютъ растенія на прежнее току (см. выше) довольно толсто (при вытптываніи льна, гречихи у насъ до $2\frac{1}{2}$ фут. толщины) снопы ставятся болѣе стойки, если молотится сноповый хлѣбъ. Животных (8—10 лошадей) одѣ, или запряженныхъ въ телеги (4 телеги, запряженныхъ паромъ воловъ каждая), или катки (одинъ или два, смотря по величинѣ тока) гоняются обыкновенно развивающейся или развивающейся спиралью: сперва отъ наружи въ серединѣ, а затѣмъ отъ середины кнаружи. При вытптываніи, напр., на гарманѣ, 6 саж. въ діаметрѣ, настлается 80—100 копенъ льна или гречихи.

Наиболѣе успѣшно обмалачиваются растенія молотильными машинами, что касается полноты выдѣленія зеренъ изъ соломы; хороша молотилка оставляетъ въ соломѣ не болѣе 3% зерна, между тѣмъ какъ при хорошей цѣпной молотбѣ остается отъ 5 до 7%; а потому машинная молотба значительно облегчаетъ обмолотъ несушеннаго снопового хлѣба. При хорошей конструкціи молотилокъ и надлежащей установкѣ ихъ, зерна повреждаются ими незначительно. Солома разбивается болѣе или менѣе, смотря по устройству машины: билъныя машины съ длиннымъ барабаномъ, въ которыхъ хлѣбъ подается параллельно оси барабана (*продольная молотилка*), берегаютъ солому довольно хорошо; въ билъныхъ же и зубчатыхъ машинахъ съ короткимъ барабаномъ, въ которыхъ хлѣбъ подается перпендикулярно къ оси барабана (*поперечная молотилка*), солома болѣе или менѣе разбивается. Но, для употребленія въ порѣ и подстиль солома улучшается отъ разбивки; для удовлетворенія же потребностей хозяйства въ неразбитой, такъ называемой, *кулевой* соломѣ (для покрытія врышъ, изготовленія соломенныхъ щитовъ или перекотъ) всегда можно обмолотить цѣпями небольшое, потребное для этого количество озимаго хлѣба. А потому, предпочтительно употребляются поперечныя молотилки, какъ болѣе производительныя, чѣмъ продольныя. Наконецъ, что касается производительности различныхъ машинъ, то она зависитъ отъ размѣровъ ихъ (длины барабана) и отъ силы того двигателя, которымъ приводится въ движеніе машина: руками человека, меньшимъ или большимъ числомъ животныхъ, (рѣдко вѣтромъ), водой или паромъ. Въ нижеслѣдующей таблицѣ показаны производительность различныхъ молотилокъ (паровыхъ вмѣстѣ съ вѣніемъ и сортированіемъ зерна) сравнительно съ цѣпной молотбой и молотбой на гарманахъ. (См. стр. 817.)

Полная *) сравнительно производительность молотильныхъ машинъ даетъ возможность сокращать время молотбы хлѣба въ хозяйствѣ, что, при возможности молотить машиной во всякое время, облегчаетъ своевременный сбытъ зерна и затрудняетъ его расхищенія. Изъ тому же, при возмож-

*) За исключеніемъ ручныхъ, которыхъ производительность вообще не больше производительности цѣпной молотбы.

Способъ молотбы.

Способъ молотбы.	Сколько лошадей требуется для работы.	Сколько людей требуется для работы.	Длина барабана въ дюйм.	Сколько копенъ хлѣба обмалачивается въ 10 рабочихъ часовъ.		Сколько копенъ хлѣба обмалачивается на 1 чел. при снуга.	
				озимаго ярового		озимаго ярового	
Цѣпной.....	—	3—5	—	—	—	1 $\frac{1}{2}$ —1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$ —2
На гарманахъ.....	16—20	25	—	—	160—200	—	1 $\frac{1}{2}$ —2
Молотилки:							
ручной.....	—	6	15	12	20	2	3 $\frac{1}{2}$
конной.....	1	6	15	20	30	3 $\frac{1}{2}$	5
".....	2	6	20	30—40	40—50	5—6	6—8
".....	3—4	8	26	40—50	50—60	6—7	7—9
".....	6	10—12	39	60—70	80—90	7—8	8—10
".....	8	15	58	80—100	100—120	8—9	9—11
паровой.....	8	20	48	80—100	150—180	4—5	7—9
".....	10	30	60	120—150	200—250	4—5	6—8

Прим. У конныхъ молотилокъ въ числѣ прислуги непознаны рабочіе для подвозки сноповъ и отвозки и кладки соломы въ ометы; у паровыхъ же молотилокъ въ числѣ прислуги включены и рабочіе, необходимыя для укладки соломы въ ометы. Конная молотилка обмалачиваетъ меньше, если хлѣбъ сыръ, меньше запряжено лошадей, лошади не пережигаются и не доводятъ подавальщика. Потребность въ прислугѣ у паровой молотилки значительно уменьшается при правильной разстановкѣ скирдъ, при возможной близости молотилки къ скирдамъ и употребленіи соломоподъемника (см. ниже).

ности перемѣщать молотилки (перепозныя конныя и паровыя молотилки), можно молотить хлѣбъ въ полѣ, пока еще онъ сухъ, отчего выигрываетъ цѣна зерна (шеницы). Это послѣднее обстоятельство дѣлаетъ особенно цѣпными паровыя молотилки для нашихъ степныхъ хозяйствъ съ огромными хлѣбными посевами, которые приобретаютъ черезъ это возможность, обмоловить шеницу въ полѣ и оставить тамъ солому до зимы, сбытъ зерно тотчасъ же въ порты или на мельницы.

Хорошая молотилка должна молотить чисто, неповреждать зерна, быть прочна, доступна во всѣхъ частяхъ и удобна для обхожденія съ ней, требовать мало прислуги и не тратить много движущей силы.

Работавшая часть каждой изъ употребляющихся въ настоящее время молотильныхъ машинъ, состоитъ изъ двухъ частей: изъ вращающаго камина либо двигателя барабана и неподвижнаго подбарабаника. Подбарабаникъ представляетъ собою почти такую же вогнутую поверхность, какъ барабанъ выпуклую, и обхватываетъ барабанъ на $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{3}$ его поверхности. Онъ помѣщается надъ барабаномъ (преимущественно у зубчатыхъ молотилокъ, гдѣ поломка легче) или подъ барабаномъ, такъ что хлѣбъ, который вносится для обмола между барабаномъ и подбарабаникомъ, втягивается машиной: въ первомъ случаѣ вверхъ, а во второмъ—внизъ; первое имѣетъ преимущество предъ вторымъ, что тяжелые и твердые предметы, какъ камни, куски дерева или желѣза, попадая случайно въ такую молотилку, не попадаютъ между барабаномъ и подбарабаникомъ, а падаютъ, по своей тяжести, внизъ, и такимъ образомъ избѣгается ломка машины. У болѣе тяжелой, внизъ, и такимъ образомъ избѣгается ломка машины. У болѣе легкой части машины подбарабаникъ можетъ быть болѣе или менѣе приближенъ къ

барабану или удаленъ отъ него въ той или другой его части, смотря по тому, нужно-ли усилить или ослабить дѣйствіе машинъ.

По поверхности барабана и подбарабаника различаютъ двѣ системы молотилокъ: шотландскую (Мейкле) и американскую (Мофита). У первой, наиболее употребительной системы машинъ, которая выбиваетъ или вытрясаетъ зерно изъ колосьевъ, барабанъ (рис. 252) состоитъ изъ горизонталь-




Рис. 252.

ной, кованого желѣза или стальной, оси, изъ круговъ и ободьевъ и навинченныхъ на эти послѣдніе 4—8 билъ. Била дѣлаются изъ желѣза, стали или ковкаго чугуна, гладкіе или рубчатые, для того чтобы увеличеніемъ ихъ поверхности достигнуть болѣе чистаго обмола; иногда, впрочемъ, дѣлаютъ дубовые, покрытые полосовымъ желѣзомъ била, изъ которыхъ навинчиваютъ изъ ковкаго чугуна бруски съ косыми рубцами. Подбарабаникъ состоитъ изъ нѣсколькихъ похожихъ на била брусковъ, удаленныхъ одинъ отъ другаго на столько, чтобы между ними могли проваливаться вымолоченныя зерна. Для того чтобы зерна хорошо выбивались изъ колосьевъ, необходимо, чтобы вращающійся барабанъ бросалъ небольшія количества хлѣба съ большой скоростью о брусья подбарабаника; для этого же барабанъ долженъ дѣлать отъ 800 до 1000 оборотовъ въ минуту, а, при такой значительной быстротѣ, вращенія барабана, била должны быть не только одинаковаго вѣса но и одинаково удалены отъ оси барабана. Къ подбарабанику примыкаетъ обыкновенно наклоненная книзу *ришетка*, по которой скатывается и удаляется изъ машинъ солома. Барабанъ, подбарабаникъ и рѣшетка укрѣпляются въ деревянномъ или желѣзномъ *станкѣ*. Въ послѣднемъ положеніе барабана вредныя вліянія неизбежныхъ толчковъ и сотрясеній. Для противоудѣйствія же вредному вліянію, какое можетъ имѣть на положеніе барабана деревянный станокъ, въ легко возможномъ случаѣ, что его поведетъ, не привѣрляютъ подшипниковъ прямо къ дереву, а кладутъ ихъ на подшипниковыя подкладки. Къ станку прилаживается достаточно большой столъ для подачи сноповъ въ машину, который въ тоже время служитъ достаточной защитой для подавальщика.

У машинъ второй, менѣе употребительной, американской системы барабанъ и подбарабаникъ усилены зубьями, по спиральной линіи, такъ что, при вращеніи барабана, зубья этого послѣдняго проходятъ между зубьями подбарабаника, притомъ такъ близко одинъ къ другому, что попадающія между ними колосья ошпытываются. Этой системы машинъ дѣлаются лишь ручныя и конныя; онѣ расходятъ менѣе силы, но за то требуютъ болѣе быстрой вращенія барабана и подвержены (зубья) болѣе ломкѣ, чѣмъ билыя машины.

Наконецъ, есть машины смѣшанной системы съ билами и американскими зубьями.

Ручныя машины дѣлаются всегда переносными; водныя, напротивъ, всегда постоянными; конныя же и паровыя дѣлаются переносными и

постоянными. Переносныя, конечно, удобны тѣмъ что могутъ быть употребляемы для молотбы въ различныхъ мѣстахъ: на полѣ и въ усадьбѣ, могутъ переноситься изъ одной усадьбы въ другую, не требуя сколько нибудь капитальныхъ приспособленій для ихъ установки, каждый разъ на новомъ мѣстѣ. Но за то они, сравнительно съ постоянными, сложнѣе, менѣе прочны и потому могутъ требовать нѣсколько большихъ издержекъ на ремонтъ.

Вода приводитъ въ движеніе молотилки помощью *водныхъ колесъ*, паръ — помощью *постоянныхъ или перемѣщающихся (локомотивныхъ) паровыхъ машинъ*; животныя — помощью *конныхъ приводовъ*.

Конные приводы бываютъ *толчковые* или *манежные*.

Толчакъ бываетъ: *круговой*, весьма распространенный у насъ, и *американскій*, распространенный у насъ изъ Озерковской мастерской г. Михалъ въ Тульской губ. Въ первыхъ животныя ступаютъ по наклонному кругу, около 4-5 саж. въ диаметрѣ; на нижней поверхности круга, по окружности его, насажены кулаки, заставляющіе цѣвочную шестерню на валѣ, съ котораго движеніе передается барабану молотилки помощью еще одной передачи. Во вторыхъ животныя ступаютъ по безконечному полотноу, движущемуся на большомъ числѣ небольшого диаметра валиковъ и приводимому въ движеніе колесо, съ котораго движеніе передается оси съ насаженными на нее шестернями, а съ этого послѣдняго, помощью ремня, шесту на ось барабана въ молотилкѣ. Эти толчаки дѣлаются на 1 и 2 лошади. Толчаки вообще представляютъ ту выгоду, что животныя на нихъ производятъ въ день болѣе работы, чѣмъ въ манежныхъ приводахъ; такъ на двуконномъ американскомъ въ 1,5 раза, а въ одноконномъ въ 1,4 раза болѣе, чѣмъ въ манежномъ приводѣ; но они представляютъ ту невыгоду, что, въ случаѣ разобщенія ихъ почему либо съ машиной (напр. у американскаго толчака въ томъ случаѣ, если соскочитъ ремень), или при перерывѣ почему либо или прекращеніи работы машиной, они начинаютъ вращаться съ такой быстротой, что животныя, павольно увлекаемые этимъ движеніемъ, спотыкаются и повреждаютъ себя. Конечно, противъ этого могутъ быть употреблены съ большими или меньшими успѣхомъ нажимные тормазы. Кромѣ того зимой, въ холодномъ помѣщеніи, обливаемыя мочей животныя, они легко обледенѣваютъ и дѣлаются скользкими, отчего также могутъ спотыкаться животныя. Въ частности, круговые толчаки требуютъ чрезвычайно много помѣщенія подъ крышей; американскія же требуютъ его, напротивъ, очень мало — одноконный всего $13 \times 5 = 65$ кв. фут. Это-то обстоятельство и дѣлаетъ этотъ приводъ столь цѣннымъ для переносныхъ молотилокъ и въ хозяйствахъ, нерасполагающихъ большими помѣщеніями. Наконецъ, въ американскихъ толчакахъ неудобно большое число не большого диаметра быстро вращающихся валиковъ, отчего коэффициентъ полезной работы у этихъ толчковыхъ (0,75 у однокон. и 0,82 у двукон.) меньше, чѣмъ у манежныхъ приводовъ (0,9).

Манежные приводы, весьма различны въ своемъ устройствѣ, представляютъ, главнымъ образомъ, слѣдующія различія: зубчатое колесо, которое непосредственно приводится въ вращеніе животными, находится или на верху высокой, вертикальной оси, вращающейся вмѣстѣ съ нимъ на нижнемъ подшипникѣ и въ верхнемъ подшипникѣ, укрѣпленномъ въ горизонтальномъ подвижно одномъ нижнимъ или нижнимъ и верхнимъ кондомъ вмѣстѣ, что предпочтительно первому. Въ первомъ случаѣ (шотландскій приводъ), оно имѣетъ обыкновенно гораздо болѣе діаметръ, чѣмъ во второмъ и заставляются съ цѣвочной шестерней (передаточной оси), съ котораго уже движеніе, посредствомъ одной зубчатой передачи, передается оси барабана (1). Во второмъ случаѣ, съ непосредственно вращаемого животными зубчатого

колеса движение передается оси барабана посредством трех передач, которые могут быть частью ремешные; напр., у привода Пине нижнее, непосредственно вращаемое животными зубчатое колесо, помощью зубчатого зацепления, приводит в движение вертикальную высокую ось с горизонтальным, посаженным наверху ее шкивом, с которого движение передается оси барабана помощью двух ремешных передач (2). У этих двух приводов животные, приращенные к водилам, прикрепленным: в первом — к оси, на которую насажено первое зубчатое колесо, ниже этого последнего, а во втором — к самому колесу сверху, проходят в работ под передаточной осью (валом) в первом или под передаточным ремнем во втором случае. Число водил, запряженных здесь, бывает различно, по числу животных, которого требует работа машины; водила же, для наибольшей производительности работы животных, должны иметь не менее 20 фут. длины. При нижнем первом зубчатом колесе и исключительно или преимущественно зубчатых передачах,*) положение передаточной оси таково, что животные должны переходить через нее (обыкновенно через прикрывающий ее мостик), и она, затем, должна подниматься к оси барабана; поэтому ее делают колбчатой помощью универсального колба Гукка в том месте, где она поднимается к оси, принимает наклонное положение, и там, где она из этого наклонного положения должна перейти в горизонтальное для соединения с осью барабана (3). Для того чтобы такая колбчатая ось тратила как можно меньше рабочей силы, необходимо, чтобы колбно образовало возможно тупой угол, что достигается повышением положения или удлинением передаточной оси (иначе удалением машины от привода) и опущением в землю машины. Первое неудобно, потому что затрудняет слишком переход животных через ось; последнее удобно лишь в известной степени, напр. настольно чтобы ось барабана была выше поверхности земли дюймов на 30, а подкалывщик стоял дюймов на 6 ниже поверхности земли; а потому приближают преимущественно к второму — удлинению передаточной оси. Чтобы совершенно избежать колбчатого соединения передаточной оси с осью барабана, употребляют передаточный станок (4), с которым соединяется передаточная ось колбно и с которого уже на какой угодно высоте можно передать движение оси барабана без колба, лучше всего помощью ремешной передачи. Если передаточный станок опустить несколько в землю, то можно совсем избежать колбчатой передаточной оси (5). Наконец, приводы с исключительно зубчатыми зацеплениями, без передаточного станка, напр. известный привод Баррета, делают иногда закрытыми (6), что защищает несколько зубчатых зацепления от засорения, главным же образом предупреждает несчастные случаи с рабочими у привода. Что касается передач *ремешной***) и *зубчатой*, то первая неудобна тем, что ре-

*) У нас неупотребительна, но заграницей встречается и по своей простоте предпочтается даже другим, передача движения с первого, вращаемого животными колеса, на котором внизу по окружности выходит горизонтально вращающееся на вертикальных осях редик. безконечному винту составляющему часть передаточной оси; так что можно, при 32 редиках напр., на 1 оборот колеса иметь 32 оборота передаточной оси, на что при зубчатых зацеплениях потребовалась бы по крайней мере две зубчатых передачи.

**) Конными ремни в скорости делаются ненадежными, и потому их предпочитают вулканизированные каучуковые с двойной до четверной хлопчатобумажной прокладкой; такие ремни выдерживают всякую перемену погоды, немногим дорожникам и прочим их применение барешном обхождении с ними.

мень легко соскакивает, если животным почему-либо вдруг рвануть, или же ход машины сбивается почему-либо неправильным, или вдруг останавливается, напр. вследствие выпуска в молотилку сразу большого количества хлеба или какого-либо постороннего предмета. Для избежания в подобных случаях поломки зубьев у второй передачи или других частей машины, прикладывают водила непрямо к первому колесу, а к кругу, соединяющемуся с колесом *предохранительным* гвоздями, которые достаточно крепки, чтобы, при правильном движении машины, удерживать связь круга с колесом, но которые тотчас же ломаются и прерывают связь водил с колесом, как только встречается какое-либо из вышеприведенных нарушений обыкновенного хода машины, и круг вращается животными без передачи движения колесу. Такие гвозди, конечно, в случае поломки, весьма легко могут быть заменены новыми. Или, с той же целью вставляют в соответствующем месте колесо, при котором барабан, вследствие накопленной им живой силы, может продолжать движение при сказанной остановке привода. Из различных маневренных приводов заслуживают внимания для наших условий: шотландские приводы (1) по своей простоте и меньшей трате рабочей силы при двух только передачах, не смотря на значительность места, которого они требуют, сравнительно скорее стирают подплатника, который всегда может быть заменен новым с небольшими расходами, и необходимость большого приближения машины к приводе, по невозможности делать передаточный вал слишком длинным; далее, привод Пине (2) особенно для небольших молотилок, закрытый привод Баррета (6) и некоторые другие приводы, с которыми делаются указываемые нами ниже молотилки.

Успешное действие молотилки требует: 1) чтобы машина, если она конная, была прочно укреплена в земле и чтобы все части ее до начала молотьбы были верно установлены.

Подбарабаник должен быть на столько приближен к барабану, чтобы при малейшем удалении его молотилка начинала сейчас же молотить нечисто. Поэтому, сначала устанавливают подбарабаник от барабана дальше нежели нужно, и затем уже, приближают его к барабану, помощью существующих для того винтов, до тех пор, пока молотилка ненадолго молотит совершенно чисто. Вот приблизительно расстояния подбарабаника в различных частях его от барабана: для пшеницы, ржи, ячменя и овса вверху — 1,2, в средине — 0,64 и внизу 0,28 дюйм.; для гороха, вики и гречихи: вверху — как можно дальше, в средине — 1,44 и внизу — 0,52 дюйм.; для рапса и сурфиницы: вверху — как можно дальше, в средине — 3,12 и внизу — 2,08 дюйм.

2) Чтобы выпуск хлеба в машину начинался не ранее того, как барабан будет вращаться с полной скоростью (о чем можно узнать по звуку); иначе, машина может остановиться. 3) Чтобы хлеб выпускался в машину с особенным вниманием и ловкостью; перелесла должны быть предварительно сняты; хлеб, божень впускаться колосьями вперед, *для того чтобы машина не забивалась можно равномерно не шла порожнем*. 4) Чтобы при машинке достаточно было при-
слуги, которая должна заботиться о том, чтобы на стол молодилки находилось всегда достаточное количество развязанных снопов и чтобы солома, выходящая из машины удалялась безо-

становочно. 5) Чтобы при конной молотилке животным сменились, не работая более 8—9 часов в день; так что для 4-х конной молотилки нужно по крайней мере 6 лошадей.

Перетриваніе соломы обмолоченнаго хлѣба, съ тѣмъ чтобы въ ней не оставалось зеренъ, и удаленіе ея отъ машины требуютъ столько рабочихъ рукъ (сколько и для подачи хлѣба къ молотилкѣ), что молотилки безъ *соломотрясовъ* для перетриванія соломы и удаленія ея отъ машины не достигаютъ полнаго значенія. Но, соломотрясъ, для того чтобы вполнѣ исполнять свое назначеніе, необходимо долженъ быть длиненъ и поднимать солому на столько, чтобы она удобно могла быть складываема прямо на возъ. Впрочемъ, съ этой поспѣдной цѣлю, употребляются даже особенные *соломо-подземники* (элеваторы), которые приставляются къ машинамъ съ болѣе короткими соломотрясами.

Соломотрасы различны по конструкции. Наиболее употребительная представляет ряд брусков, обыкновенно числом 5, с зубцами, обращенными отбрасными сторонами в сторону схода соломы с соломотраса, а отлогими—в сторону входа соломы на соломотрасу, или с набитыми на бруски железными штифтами; такие бруски прикрываются же козбчатой осью, такъ что, при вращеніи этой послѣдней, поднимается попеременно (черезъ одинъ) то одна, то другая часть ихъ, причемъ солома, подбрасываемая слегка поднимающимися брусками, перетрясается, и въ то же время поднимается вперед подающимися, при вращеніи козбчатой оси, зубцами или штифтами; вытрасасывае же сѣмена проваливаются сквозь отверстія, имѣющіеся въ соломотрасѣ, подъ этотъ послѣдній. Эти соломотрасы дѣйствуютъ очень хорошо, но относить солому сравнительно недалеко, такъ какъ нефлажуются очень длинными, и не поднимаютъ ее, потому что ставятся горизонтально. Кроме того, у насъ употребительны соломотрасы въ видѣ безконечнаго полотна изъ камышевыхъ переладницъ, соединенныхъ по краямъ веревкой. Эти соломотрасы дѣлаются очень длинными, относятъ солому далеко, такъ какъ дѣлаются до 10 арш. длинн, поднимаютъ ее довольно высоко, такъ какъ могутъ устанавливаться съ значительнымъ подъемомъ отъ земли; перетрясаютъ довольно удовлетворительно солому; но представляютъ то неудобство, что легко косятся (т. е. теряется параллельность камышевыхъ переладницъ съ осью валковъ, которые обходятъ безконечное полотно) и тогда перестаютъ дѣйствовать.

Какъ на болѣе извѣстныхъ изъ лучшихъ простыхъ, только обмалочивающихъ зерно, молотилокъ можно указать на молотилки: 1. *Бильной системы*: 1) *Энкерта* (Комм. Работн., стр. 274), 4-хъ размѣровъ: барабаны—35 (диам. 20 дюйм.), 39, 26 и 20 дюйм. длины со стальными билами; вѣсъ: 44, 35¹/₂, 27¹/₂ и 23 пуд.; цѣна: 310—330, 280—290, 200—210 и 150—160 руб. Приводы къ нимъ маневренныя, съ составными колесолообразными зубчатыми колесами: 42 пуда; цѣна: 3¹/₂, 3³/₄, 3¹/₂ и 3¹/₄ фут.; вѣсъ: 88, 72¹/₂, 60 и 40 пуд., послѣдняя передача стальная. Обмалочивающаго 35, 160—175 руб.; передача стальная 6—8, 4, 3—4 и 2 лошадей—150—180, 120, 70—90 и 50—60 пудовъ, при тѣлѣхъ ржи; 2) *Рансома, Симса и Гедд* (стр. 274), 4-хъ размѣровъ съ барабанами 27, 36, 42 и 51 дюйм. длины, на 4—6, 6—8, 5—10 и 6—12 лошадей. Цѣна 600, 735, 900 и 1,100 руб.; 3) *Н. Вестерга* въ Харьковѣ съ барабаномъ 31¹/₂ дюйм. длины, 17¹/₂ дюйм. въ ширинѣ, на 4 лошади обмалоча-

100 — 120 копенъ въ сутки. Цѣна 700 руб. II. Американской системы: 1) *И. Вильсона* (Москва, Мал. Якиманка, соб. д.), трехъ размѣровъ: 4-хъ, 3-хъ и 2-хъ копына съ шотландскимъ приводекомъ; первая 400 и послѣднія двѣ по 300 руб.; 2) *В. и Б. Аккерманъ* (Москва, Тверская, № 22) съ приводами Пинс, 3 размѣровъ: на 2 и 4 лошади; первая обмолочиваетъ около 4-хъ копенъ овсяного и отъ 5 до 10 копенъ овса средней вѣсы въ часъ. Цѣна 350 и 550 руб.; 3) г. *Миллера*, въ Озеркахъ Тульской губ. (Колм. Работникъ, стр. 274); съ верхней или нижней подачей по желанію; барабанъ длиною 26, въ діаметрѣ 16 1/4 дюйм., вѣсъ 15 пуд., цѣна 125 р. Приводъ американскій двукон. топчакъ безъ колеснаго хода вѣситъ 60 пуд., цѣна 230 р.; съ колеснымъ ходомъ для перевозокъ вѣс. 75 пуд., п. 270 руб. на заводѣ.

Впрочем, кроме этих молотилок, которыми можно обмолачивать большую часть возделываемых растений, существуют еще специальные молотилки для обмолаа известных растений. Так, для обмолаа клевера можно указать на молотилки: *Шенкеля* (Комм. Работникъ, стр. 274), на 2 лошади, вѣс. 18 пуд. Цѣна 210—225 руб. и на 1 лошадь, вѣс. 12 пуд. Цѣна 190—140 руб. и *Целлигана* (Гельсфорстъ въ Швеціи): ручная, обмолачивающая 40—50 фунт. клевера въ часъ при 2 раб. и 1 мальч. цѣна 200 германск. марокъ. Для обмолаа майса — *американскія* молотилки: ручныя, конныя и паровыя; ручная (Комм. Работникъ, стр. 274) стоитъ 25—26 руб.; паровая, обмолачивающая 175—200 четвертей въ теченіе 10 часовъ, стоитъ 1.000 германск. марокъ.

ж) Въ результатѣ различныхъ способовъ обмолаа зерновыхъ растений получаются на тогу, при обмолаѣ цѣнами, на гарманахъ и катками солома, подъ которой находится зерна со всѣми приѣсами, указанными на стр. 714—715, въ видѣ такъ-называемаго *вороха*; солому снимаютъ осторожно съ вороха граблями и относятъ прочь, а ворохъ сгребаютъ въ сторону. При обмолаѣ машинами солома и ворохъ получаютъ отдѣльно: солома выбрасывается молотилкой или свдывается соломотрасомъ и относится прочь, а ворохъ собирается подъ молотилкой и сгребаеа въ сторону. Задача дальнейшей обработки вороха заключается, слѣдовательно, въ томъ, чтобы удалить изъ вороха болѣе крупныя и тяжелыя части: обломки колосьевъ, куски соломы, камешки и т. д., что достигается пропускаемъ вороха черезъ грохотъ съ крупными отверстіями, или собственно *грохоченіемъ*; 2) болѣе крупныя и легкія части—мелкнну, что достигается бросаемъ противъ вѣтра, или собственно *вѣяніемъ*; 3) отдѣленіе болѣе крупныхъ и тяжелыхъ или болѣе мелкихъ и легкихъ сѣмянъ сорныхъ травъ и болѣе мелкихъ и легкихъ изъ очищаемыхъ сѣмянъ и болѣе мелкихъ и тяжелыхъ, песчаныхъ и землястыхъ частей, пыли, что достигается отчасти *вѣяніемъ*, но главнымъ образомъ *подсываніемъ* на ситахъ съ различной величины отверстіями. При подсываніи, впрочемъ, играетъ роль не только величина, но и форма раздѣляемыхъ частей, такъ какъ могутъ быть употреблены рѣшета или сита съ отверстіями различной формы.

Было время, когда всѣ эти три операціи производились раздѣльно въ указной послѣдовательности и помощью самыхъ несовершенныхъ орудій и ма-

шинь. Ворох грохотался через подвешенный на веревках грохот — ящик, в котором вместо дна были натянуты на крест веревки, кожаный ремень или проволока; дабы, ворох провалился бросанием с лопаты напротив ветра, причем тяжелые зерна ложались дальше от бросающего (получалось *чело*); легкие ближе к бросающему — *хвост* (получалось *озадки*, *озадки*) и макина относилась прочь. Наконец, отбывающее зерно подбывалось на ршетах, ситах, называемых также грохотами; отсюда несоответствие втрое название этой операции тоже *грохочением*. Эти круглые ршета с отверстиями различной величины точно также подвешиваются и, при подбывании на них зерен, кружатся; отсюда, название ршета *кружалами*, а самой операции *кружением*, при котором, впрочем, не только проваливаются сквозь отверстия ршета части меньшей величины, чем отверстия, но и избираются на поверхность подбываемой массы более крупные и легкие части, которые собираются рукой и сбрасываются долой. Таким подбыванием на различных ршетах и ситах зерна могут быть отбываны как нельзя лучше, хотя и очень медленно. У нас *кружат* преимущественно просо, лен, и занимаются этим особые кружалщики, получая плату с четверть раздвального хатба. Медленность этих операций в таком виде, невозможность пользоваться всегда ветром побудили прежде всего замкнуть вращение лопатой вращением на *арфе*, т. е. машин, в которой смена спускавшаяся с наклонной плоскости ковша попадала в более или менее сильный ток воздуха, производившийся крылатом, который вращался рукой рабочего: ворох, отбывенный предварительно от крупных и тяжелых частей на грохот, которого не имела арфа, летел по направлению ветра, который относил дальше всего легкую макину, менее далеко легкое зерно и оставлял ближе всего к арфе самое лучшее тяжелое зерно.

В настоящее время вышеприведенные операции производятся нераздвально, так называемых, *стялок-сортировок*, в которых ворох, как он получается из-под молотилки, спускается с ковша на грохот через отверстие, которого величина может изменяться, для того чтобы, пустая его медленнее, через меньшее отверстие, лучше разбить разнородный, смешанный между собой части, хотя и с большей тратой на это времени; или, пустая скорее через большее отверстие, скорее пропустить ворох через машину, хотя бы с менее совершенным раздвением разнородных частей смеси. На сотрясающемся грохоте остаются более крупные и тяжелые части, а проходящий сквозь него ворох попадает в ток воздуха, производимый крылатом, и разбивается, как и в арфе, при чем раздвальные ветром части вороха попадают обыкновенно в три различных места: макина вонь из вилки за доску, которая может быть поднята выше или ниже высоко, смотря по тому, желательно ли, чтобы менее или более выходило вонь из вилки; более легкое из остающегося внутри вилки, преимущественно дурное зерно, некоторые сорные смена (все выстил называется *озадками*) попадает в отделение ближайшее к доске, и отбывающееся от остальной внутренности вилки перегородкой, которая точно также и с той же целью, как и наружная доска, может иногда повышаться или понижаться; наконец, самое тяжелое

зерно попадает на ршето, сито или целый ряд ршет и сит, находящихся одно под другим и освобождающих зерно преимущественно от сорных смен и раздвальных его иногда на сорта; последнее самое мелкое сито обыкновенно отделяет преимущественно пыль, земляные и мелкие песчаные части. Такие машины с меньшим числом сит носят название и просто *стялок*, когда они доставляют зерно, требующее еще сортировки. А потому, существуют специально сортировки для раздвения зерен различного качества: преимущественно по удельному весу (сортировка с крылатом только, напр., Варакина), или по величине (сортировки с ршетами и ситами, напр., Перноле, Пине), или по удельному весу и величине (действующие подобно кружению, напр., сортировка Жюсса). Вилки-сортировки, а тем более вилки не очищают зерна достаточно от сорных, в особенности известных смен, напр., вики, куколя, а потому деляют необходимыми *специальными зерночистилками*, исключительно с ситами или ршетами, которыми имеют отверстия несколько различной величины, но и различной формы. Особенно же хорошей оказалась для очистки зерна от куколя, горошка появившаяся lately 20 тому назад *ячменная* система, которой принадлежат: зерночистилки Вапона, Моро-старшего, Люлье, Перноле и в частности: кулеотборники: Перноле, Орбека, Авермана и т. д.

На рис. 253 изображен *кулеотборник* (одиночного действия) Перноле (из Парижа) № 1, длин. 52 дюйм. и 18 дюйм. в диаметре, вес 183 фунта, очищающий в час около 1½ четвертей. Цена 250 германск. марок. На рис. 254 — Перноле же *зерночистилка* № 2, длин. 6 фут., в диаметре 18 дюйм., вес 244 фунта, очищающая в час около 1½ четвертей; цена 360 германск. марок. Вторая (кулеотборник двойного действия) назначается, не только как первая, для выделения круглых (куколя, горошка, подмаренника, горчицы полевой), во и продолговатых (овса, ячменя из шеницы и ржи) сорных смен. У обоих машин смена передней пятой части вращающегося цилиндра, в которую через воронку D (рис. 254) впускается очищаемое зерно, состоит из сита В с продолговатыми прорывами, которое может быть заменено другим и которое служит для выделения выпадающих из машины с осадков, т. е. узких тощак




Рис. 253.




Рис. 254.

зеренъ, мелкихъ сорныхъ сѣмянъ, земли, пыли и т. д. Остальная часть цилиндра закрытая, покрытая съ внутренней стороны довольно густо ячеями. Хлѣбное зерно у машинъ двойнаго дѣйствія (№ 2) проходитъ изъ сита В въ примыкающую къ нему первую часть закрытаго сита съ ячеями 0,4 дюйм. въ диаметѣ. Въ эти ячеи входятъ только зерна пшеницы и подобныя имъ, равно какъ круглыя сорныя сѣмена, между тѣмъ какъ зерна ячменя, овса выпадаютъ изъ машины черезъ отверстія у D. При вращеніи цилиндра въ направленіи отъ m къ n (рис. 255—поперечный разрѣзъ кулесторбника), зерна, попавшія въ ячеи, подаются въ желобъ p, по которому они выносятся с переводятся во второе отдѣленіе закрытаго цилиндра. О боки желоба p падаются въ каждомъ отдѣленіи 4 наклонныя плоскости (лопатки); по нимъ зерна скатываются изъ ячеекъ въ желобъ, который, будучи прикрѣпленъ къ оси цилиндра подпорками p, можетъ поворачиваться около нея, чтобы, наклоняя менѣе или болѣе лопатки, достигнуть менѣе или болѣе хорошаго очищенія зерна.




Рис. 255.

Рис. 256.

Подъ лопатками укрѣплены скребки с (рис. 256) изъ толстой желѣзной проволоки, которыхъ назначеніе соскребать болѣе величныя зерна, которыя могли бы застрять въ ячеяхъ. Третье отдѣленіе, въ которомъ точно также имѣются желобъ и винтъ, выдѣляетъ круглыя сорныя сѣмена и короткія хлѣбныя зерна, которыя принимаются здѣсь ячеями всего 0,28 дюйм. въ диаметѣ и выходятъ изъ цилиндра по желобу у F. Непринимаемыя же ячеями этого отдѣленія зерна пшеницы или ржи лучшаго качества выходятъ изъ машины у E.

Какъ на лучшія машины этого рода можно указать. I Изъ вѣялокъ: 1) Вильсона (стр. 823) ручная Ц. 65 руб. и конная—125 руб. 2) Гранта

(Комм. Работникъ стр. 274). Цѣна 50—55 руб.; 3) Аккермана (стр. 823) американской системы. Цѣна 55—60 руб. II Изъ вѣялокъ сортировокъ: 1) Горисби (рис. 257) у Аккермана (стр. 823) трехъ нумеровъ съ двумя сотрясающимися рамами безъ насѣннаго вальца для мякины (№ 3, ц. 110 р.) и съ такимъ вальцемъ (№ 4—143 и № 5—163 руб.). 2) Рансона, Симса и Гедд (стр. 274) ручная 120 руб., безъ зубчатата валика 110 руб.; со шквномъ для коннаго привода на 5 руб. дорожж. III Изъ сортировокъ: 1) Варахсина у Вильсона (стр. 823) безъ рѣшетъ 35 руб., съ рѣшетками 40 руб. Превосходная по простотѣ и возможности измѣнять границы между различными сортами поднятіемъ и опусканіемъ перегородокъ между отдѣленіями, въ которыя сѣмена распределяются токомъ воздуха, производимымъ крыльчаткой. Вислѣдствіи къ этой машинѣ присоединены еще рѣшета. 2) Малмесская сортировка, улучшенная Варахсинымъ (Комм. Работникъ стр. 274) 60—45 руб. 3) Перноле (рис. 258) съ перемѣнными ситами, длин. 5 фут. въ діам. 22 дюйм., вѣсомъ 98 фунт., очищаетъ въ часъ около 1—1½ четвертей, стоитъ 200 германск. марокъ. Она можетъ сортировать зерна одного и того же хлѣба на 3, 4, 5, сортовъ, но съ вставкой другихъ ситъ можетъ разбирать сѣмь различныхъ зеренъ: пшеницы и ржи, ячменя и овса, чечевицы и вики, бобовъ и гороха, краснаго клевера и люцерны въ Комм. Работникъ (стр. 274) двухъ размѣровъ: № 2—180—135 и № 4—230—240 руб. 4) Меннер пилиндръ длин. 56 дюйм. въ діам. 20,8 дюйм. Ц. 180 германск. марокъ, состоящая изъ проволоночной сѣтки, которой отверстія могутъ быть увеличиваемы или уменьшаемы. 5) Подобная предыдущей Рансона Симса и Гедд (рис. 259) съ приспособленіемъ внутри цилиндра для выдѣленія изъ очищаемаго зерна камешей и другихъ болѣе крупныхъ чѣмъ зерно предметовъ, которые выходятъ подъ корпусомъ машины, и съ вентиляторомъ для отдѣленія пыли, мякины двухъ нумеровъ № 2—185 руб. и № 3—220 руб. (стр. 274) IV Изъ собственно зерноочистилокъ: кулесторбники 1.) Моро и 2) Люмѣ трехъ величинъ Комм. Работникъ (стр. 274) первый—130—135, второй 90—100, 130—145 и 190—200 руб. 3) Лынная трещетка для очистки лынныхъ сѣмянъ, преимущественно изъ льна и ржи у Вильсона (стр. 823) 45 руб. 4) Сортировка Жосса, (Хут. Имп. Моск. общ. сельск. хоз., стр. 276 ц. 16 руб.) на которой зерно отдѣляется точно также какъ и при круженіи на грохотѣ и также хорошо, но нѣсколько скорѣе, хотя все же медленно.




Рис. 257.




Рис. 258.




Рис. 259.

Кроме бросания и подсывания, зерна могут еще отбираться и очищаться 1) погружением в чистую в. дули растворы, при чем больше легкия сѣмена (стр. 710) и сѣмена, пораженные насекомыми, всплывают и могут быть отобраны; кроме того, при нѣскольکو больше продолжительном замачивании, нѣкоторые изъ сорныхъ сѣмянъ могутъ терять способность проростания раньше засоренныхъ ими зеренъ; такъ, напр. растворъ поваренной соли, по

наблюдению нѣкоторыхъ, не вредитъ пшеницѣ, но вредитъ горошку. 2) Обливаниемъ кипяткомъ, который уничтожаетъ способность проростания нѣкоторыхъ сорныхъ сѣмянъ съ тонкой кожицей, скорѣе чѣмъ толстокожихъ, засоренныхъ ими, напр. проса. Очистка проса перебрашиваниемъ черезъ пламя горячей соломы есть собственно тоже бросание, при которомъ лишь уничтожаются огнемъ не отлетающія далеко сѣмена сорныхъ травъ.

Очищение и сортирование зерна особенно важно въ видахъ получения хорошихъ сѣмянъ *), и хотя оно сдѣлало въ последнее время значительные успѣхи съ приобретениемъ нѣсколькихъ превосходныхъ машинъ, тѣмъ не менѣе оно должно совершенствоваться еще далѣе; но для этого, главнымъ образомъ, необходимо изученіе свойствъ зеренъ какъ воздѣливаемыхъ такъ и сорныхъ растений (стр. 707—714): ихъ формы, величины, объема, измѣненій объема съ измѣненіемъ состоянія ихъ влажности, абсолютнаго и удѣльнаго вѣсовъ и вліянія различныхъ условий на способность ихъ проростанія; потому что формой, величиной и объемомъ зеренъ, равно какъ и измѣненіями послѣдняго, определяется отношеніе зеренъ къ открытіямъ различныхъ рѣшетъ и ситъ; всѣми же этими свойствами вмѣстѣ, за исключеніемъ способности проростанія, — отношеніе ихъ къ бросающей ихъ силѣ и къ силѣ тяжести, дѣйствіемъ которыхъ сѣмена приводятся въ движеніе при вѣяніи и сортированіи, и отношеніе ихъ къ воздуху и водѣ, какъ срединамъ, которыя представляютъ сопротивленіе движенію въ нихъ зеренъ при бросаніи ихъ или погруженіи въ воду; наконецъ, вліяніе различныхъ условий на проростаніе зеренъ определяетъ ихъ отношеніе къ раз-

*) Если у насъ существуетъ повѣрье, что гречиха родится лучше при посѣвѣ дурными зернами (охвостьемъ, озадками), то это объясняется рѣдкою способностью посѣвовъ гречихи, весьма требовательной въ отношеніи погоды, въ тѣхъ условіяхъ истощенной и дурно обработанной почвы, при которыхъ она у насъ выѣвается и при которыхъ наши земледѣльцы, наученный опытомъ, считаютъ часто нужнымъ рисковать хорошими сѣменами, такъ какъ, при благоприятныхъ условіяхъ погоды, и дурные сѣмена даютъ немалый урожай, а, при неблагоприятныхъ, — пропадаютъ, покрайней мѣрѣ, только дурными сѣменами. Очевидна несостоятельность такого расчета.

личнымъ растворамъ и температурамъ. Какъ примѣръ, приведемъ нѣсколько данныхъ, добытыхъ, можно сказать, начинающимися только изслѣдованіями этого рода относительно зеренъ нѣсколькихъ воздѣливаемыхъ и сорныхъ растений.

	Величина въ миллиметрахъ:						Форма зерна: отношение къ средней величинѣ меньшаго поперечника=1	Объемъ 1000 зеренъ въ куб. центнерахъ.	Средній абсолютный вѣсъ 1000 зеренъ въ граммахъ.	Удельный вѣсъ.	Содержаніе воды въ % вѣса зерна.		
	большаго		средняго		меньшаго								
	поперечника												
	высшая	нижняя	высшая	нижняя	высшая	нижняя							
	высшая	нижняя	высшая	нижняя	высшая	нижняя	средняго поперечника	большаго поперечника					
Пшеница: бѣлая эльденская	8,4	5,1	3,7	2,5	3,1	1,9	2,6	1,1	2,3	—	47,93	1,364	12,59
„ кузвская.....	6,7	5,0	3,2	2,0	2,7	1,6	2,3	1,2	2,6	22,32	30,69	1,376	13,14
Рожь: пробытская.....	7,7	5,7	2,8	1,9	2,6	1,8	2,2	1,1	3,0	18,98	26,16	1,378	10,62
„ зеленская.....	8,5	6,1	3,0	2,0	2,8	1,8	2,2	1,1	3,5	20,62	28,07	1,358	13,32
Ячмень: двухстрочный....	9,5	7,4	3,9	2,9	2,8	2,1	2,5	1,3	3,4	32,80	43,01	1,312	11,02
„ шестистрочный.....	9,7	7,3	3,6	2,8	2,6	1,9	2,2	1,4	4,0	29,92	38,53	1,288	11,54
Овесъ метельчатый.....	13,8	9,8	2,9	2,2	2,0	1,5	1,9	1,3	5,9	22,31	27,55	1,235	10,79
Гречиха шотланд. серебр.	6,2	4,2	3,7	2,8	3,4	2,5	3,0	1,0	1,8	19,36	24,08	1,193	8,78
Горохъ обыкновен. желтый...	8,6	6,6	7,9	6,5	7,3	5,7	6,7	1,0	1,2	—	—	—	—
„ викторія.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	246,61	346,56	1,412	—
„ зеленый.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147,33	211,73	1,438	13,02
Вика.....	5,9	4,0	5,6	4,0	4,1	2,9	3,6	1,3	1,4	—	—	—	—
Рапсъ оз.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,73	5,56	1,097	—
Горчица черная.....	1,6	1,2	1,5	1,1	1,3	0,9	1,2	1,1	1,2	1,01	1,29	1,213	—
Маѣ синий.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,49	0,51	1,238	—
Ленъ рижскій.....	5,5	3,5	2,4	1,9	1,0	0,8	0,9	2,4	4,4	3,43	4,14	1,208	—
Клеверъ красный.....	2,2	1,2	1,6	1,0	1,2	0,9	1,0	1,3	1,7	1,17	1,53	1,320	10,53
„ бѣлый.....	1,4	0,9	1,2	0,9	0,8	0,6	0,7	1,6	1,7	0,51	0,67	1,340	8,24
Люцерна обыкновенная.....	2,9	1,9	1,7	1,2	1,1	0,8	1,0	1,4	2,3	1,50	2,...	1,301	12,91
Повелка тимофеева.....	1,0	0,6	0,9	0,6	0,8	0,4	0,7	1,2	1,5	—	0,...	—	—
Короставка полевой.....	5,8	4,4	5,0	3,2	2,2	1,6	1,9	2,3	2,6	—	3,...	0,877	—
Василекъ полевой.....	5,1	3,9	3,8	2,5	1,9	1,2	1,6	2,0	2,8	2,13	2,81	1,316?	—
Допушикъ шерстистый.....	7,0	5,2	3,2	2,0	1,6	1,1	1,3	2,4	5,5	9,87	11,59	1,173	—
Маѣ самосѣйка.....	1,1	0,6	0,9	0,5	0,6	0,4	0,5	1,2	1,8	—	0,12	—	—
Куколь обыкновенный.....	4,0	2,1	3,4	2,1	3,2	1,9	2,6	1,1	1,8	13,30	13,35	1,282?	—
Чечвица волосистая.....	2,9	2,0	2,8	2,0	1,9	1,2	1,7	1,3	1,5	4,26	7,43	1,749?	—

Эту таблицу добавимъ: во 1) слѣдующимъ замѣчаніемъ, что величина зеренъ определяется величиной трехъ поперечниковъ зерна: большаго, средняго и меньшаго, а форма — отношеніемъ этихъ трехъ поперечниковъ между собой. Для абсолютныхъ величинъ поперечниковъ приведены здѣсь лишь предѣльные числа; среднія же для нихъ числа изъ нѣсколькихъ измѣреній могутъ быть вычислены изъ приведенныхъ въ двойной средней величины меньшаго поперечника и отношеній къ нему, принятому = 1, остальныхъ двухъ поперечниковъ; во 2) слѣдующими данными относительно удѣльнаго вѣса спорныхъ (стр. 774) = 1,063 и относительно содержанія воды въ зернахъ, высушенныхъ на воздухѣ, въ % вѣса зеренъ: около 5,5% — подсолнечникъ, свекловица; около 6% — рѣпа, около 9,5% — рускіе бобы и маѣ; около 10% — красный клеверъ, оз. рапсъ, ленъ, турецкіе бобы, бѣлый кле-

верь, горохъ; около 11% — чечевица; около 12,5% — конопля, около 13% — люцерна; около 13,5% — овесъ и около 14% — просо, гречиха; ячмень, пшевица, рожь и кукуруза. Наконецъ, въ 3, относительно увеличенія объема зеренъ при замачиваніи ихъ водой и уменьшенія его при просушкѣ ихъ: объемъ зеренъ больше всего увеличивается и уменьшается въ этихъ случаяхъ въ направленіи меньшаго поперечника; годовалыя сѣмена клевера разбухаютъ сильнее такихъ же сѣмянъ новелки, а сѣмена куколя ссыхаются гораздо больше сѣмянъ ржи.

У нѣкоторыхъ хлѣбныхъ зеренъ, напр., обыкновенныхъ ячменя и овса, которые отдѣляются отъ растений съ приросшими къ нимъ пленками и остиами; обламываютъ эти послѣднія или, какъ говорятъ, *шнитууютъ* или *шастуютъ* ихъ, для того чтобы сдѣлать зерна безвредными для корма, чтобы они ложились плотнѣе въ мѣру и легче обрабатывались бы, т. е. превращались бы въ муку, крупу, солодъ и т. д.

Шнитуваніе или *шастаніе* производится: колотушками съ острореберной нижней поверхностью или небольшими острореберными каточками, которыми колотятъ или прокатываютъ разсыпанныя на току не толстымъ слоемъ зерна; или же въ особыхъ машинахъ, состоящихъ изъ барабана, котораго стѣнки представляютъ сито изъ четырехгранной проволоки и въ которомъ вращается ось съ крыльями, приближающимися къ сѣткѣ не ближе $\frac{3}{8}$ дюйма.

Молотьба растений, затѣмъ вѣяніе пороха, наконецъ очищеніе, сортированіе и шастаніе зеренъ производится или отдѣльно на соответствующихъ машинахъ, разбѣиваемыхъ для этаго извѣстнымъ образомъ въ одной (лучше) или въ нѣсколькихъ постройкахъ; или же на *сложныхъ молотилкахъ*, которые соединяютъ въ себѣ всѣ необходимыя для этихъ операций механизмы или нѣкоторые изъ нихъ: принимаютъ въ себя необмолоченныя растенія (сноповой хлѣбъ) и выпускаютъ изъ себя отдѣльно солому, мякину, озадки и два, три сорта зеренъ, если нужно, то и шастанныхъ.

Сложныя молотилки имѣютъ преимущество, если необходимо молотить на полѣ, или же для хозяйствъ небольшихъ размѣровъ, когда, слѣдовательно, нѣсколько такихъ хозяйствъ должны пользоваться одной молотилкой, перемѣщающейся изъ одного хозяйства въ другое. При большихъ же нѣсколькихъ хозяйствахъ, въ 500—1,000 десятинъ, гдѣ хлѣбъ обмалачивается въ одномъ мѣстѣ, въ усадьбѣ предпочтительнѣе отдѣльныя для каждой изъ названныхъ выше операций машины, которые могутъ быть размѣщены, такъ что продукты одной поступаютъ на слѣдующую машину для дальнѣйшей обработки съ возможною малой тратой рабочихъ рукъ; такъ, при помѣщеніи вѣялки подъ молотилкой, получающійся изъ послѣдней ворохъ можетъ прямо падать въ ковшъ вѣялки и т. д. Отдѣльныя же машины въ этомъ случаѣ выгоднѣе сложной молотилки въ томъ отношеніи, что доступнѣе для поправокъ, очистокъ чѣмъ послѣдняя; да и въ случаѣ порчи которой-либо изъ нихъ остальные могутъ продолжать работу. Сложныя молотилки приводятся въ движеніе весьма рѣдко лошадьми, большей же частью паромъ, дѣйствующимъ помощью передвижныхъ паровыхъ машинъ — *локомобилей* различной силы, въ 2—20 паровыхъ силъ. Такъ какъ у насъ паровыя молотилки особенно полезны для мѣстностей, бѣдныхъ топливомъ, то весьма важно

приспособленіе локомобилей къ толкѣ соломы помощью особаго прибора, имѣющаго видъ соломорѣза (рис. 40 г. II) и подвигающаго нѣсколько сжатую солому въ толпу. На паровую силу въ часъ машина расходуетъ около 30 фунт. соломъ. Кроме того у нѣкоторыхъ сложныхъ молотилокъ имѣется приспособленіе, напоминающее соломотрясъ, которое, будучи помѣщено въ соответствующемъ мѣстѣ, служитъ для равномернаго выпуска обмалачиваемаго растенія въ машину и устраняетъ опасность такого выпуска для рабочихъ.

Лучшими сложными молотилками, на основаніи имѣющагося въ нашихъ хозяйствахъ опыта, могутъ быть названы: 1) *Клейтона и Шетлворса* (комм. „Работникъ“, только въ Петербургѣ, стр. 274) съ 8 сильнымъ локомобилемъ, намалачивающая въ 10 часовъ отъ 80 до 100 четвертей озимаго, стоитъ около 3,500 руб. въ Вѣнѣ. 2) *Рансома, Симса и Гедда* (стр. 274) трехъ категорій: съ сортировкой и двумя вѣялками (А) или безъ сортировки съ двумя (В) или одной (С) вѣялками; каждой категоріи три размѣра: А (9,1 и 3), В (2,1 и 3) и С (9,1 и 3), изъ коихъ С. 9 для 4-сильнаго, С 1 и А 9 для 6-сильнаго, А 1, С 3, В 2 и В 1 для 8-сильнаго, А 3, В 1 и В 3 для 10-сильнаго и В 3 для 12-сильнаго локомобилей съ толпой для соломъ и элеваторами для соломъ, если нужно. 3) *Маршала* (Москва, мясницкая, складъ Юхима). 4) *Горкеби и сына* (у Аккермана). Сложная молотилка съ 2 вентиляторами и сортировкой, при ширинѣ въ 5 $\frac{1}{2}$, 4 $\frac{1}{2}$ и 5 фут., съ 5, 6, 8 и 10-ти сильнымъ локомобилемъ, стоитъ въ Москвѣ 3,500—3,800—4,200 и 4,775 руб.; за приспособленіе для толки соломы на 40 руб. отъ каждой паровой силы дороже. Если необходимо обмолотить скорее, но нѣтъ надобности въ немедленной сортировкѣ зеренъ, то лучше молотилки съ вѣялками безъ сортировки, которые, при одинаковой силѣ приводящихъ ихъ въ движеніе локомобилей, производятельнѣе паровыхъ сложныхъ молотилокъ съ сортировкой. Изъ сложныхъ молотилокъ съ конными малежными приводами назовемъ молотилки *Эккерта* (Комм. Работникъ, стр. 274) на колесахъ, удобныя для передвиженія, двухъ размѣровъ: длина барабана 39 и 26 дюйм. или 20 дюйм. въ діаметрѣ, съ соломотрясомъ, приборомъ для отдѣленія мякины и вѣялкой, весомъ 73 $\frac{1}{2}$ и 53 пуда, стоятъ 650—670 и 520—540 руб. Къ нимъ приводы на 6—8 и 4 лошади (стр. 822). 325—365 и 275—300 руб. и передаточные станки для ремневой передачи, 45 и 35 руб. Обмалачиваютъ и очищаютъ въ 10 раб. часовъ около 120 и 80 одноконныхъ тѣлѣгъ. Эти же молотилки могутъ быть приспособлены къ водяному или паровому двигателю, и тогда, конечно, производятъ больше.

Б. Уборка отдѣльных частей растеній.

У нѣкоторыхъ позднѣеубираемыхъ растений убираются отдѣльно тѣ или другія части ихъ.

Такъ, *плоды* или *плодорасположенія* убираются отдѣльно: у *шмиды*, когда не вполнѣ еще раскрышіяся шишки его окрашиваются въ желтозеленый, желтоватый или красноватый цвѣтъ, смотря по сорту, дѣлаются жирными на ощупь и выделяютъ много пыли, — хмѣлевныя плети разбѣиваются на части длиной въ 20 дюйм., снимаются съ жердей, которые они обвивали во время роста, и очищаются въ полѣ же или въ усадьбѣ, при чемъ у шишекъ остаются небольшой черешокъ $\frac{1}{2}$ дюйм. длины, для того чтобы шишка не развалилась. У *воросыки* по отцвѣтении, когда шишки и ихъ черешки окрасятся въ желтоватый или золотисто-зеленый цвѣтъ, — срѣзываютъ шишки съ черенками въ 10 дюйм. длины, какъ этаго требуютъ употребляющія эти шишки сушенины фабрики; у *укропа* — зонтики, у *подсолнечника* и *мака* —

головки, по мере того как в них созревают семена. У сахарной свекловицы на семена не редко срываются семена (собственно плоды) со стеблем, а затем, по просушке их в снопах, отделяют семена обмалачиванием или ошмиванием. Иногда же, у очень ценных сортов обирают отдельно семена со стоячих на полѣ растений, по мере их созревания. У кукурузы — початки, а у тыквенных растений плоды отделяются без частей стебля. Из початков, по просушке их на воздухѣ или въ особо-устроенных сушильнях, зерновидчатые плоды или тупымъ ножомъ или кукурузными молотилками (стр. 823). Во всехъ этихъ случаяхъ плоды или плодорасположения собираются отдельно съ каждого растения. Хотя рѣдко, тѣмъ не менѣе бывають случаи, когда сборъ плодорасположений производится сразу съ большаго числа растений; такъ, напр. у сѣвнанаго красного клевера счесываютъ головки съ стоячихъ на полѣ растений помощью совочнаго грабля.

Цветы обираются у сафлора постепенно, по мере того какъ они окрашиваются въ темно-красный цвѣтъ по утрамъ, послѣ росы прежде нежели они начнутъ заядать. У шафрана цвѣты ошмиваются прежде нежели они совсѣмъ раскроются, преимущественно по утрамъ и вечерамъ, пока вѣтрикъ закрытъ и не завялъ; затемъ, просушиваются въ теченіи нѣсколькихъ дней, послѣ чего изъ нихъ вынимаются осторожно рыльца и осторожно просушиваются въ хлѣбныхъ печахъ.

Листья убираются отдельно преимущественно у табака (обламываниемъ) и у айды (срѣзаниемъ). У первого — когда они покрываются желтыми пятнами, сдѣлаются красноватыми, вялыми, похожими на пергаментъ и клейкими, наклоняться къ землѣ и удобно отламываются; растения же испускаютъ сильный и пріятный запахъ. Впрочемъ у табака листья собираются иногда и со стеблемъ. У второго листья убираются когда начнутъ желтѣть. Въ некоторыхъ случаяхъ (особенно въ малыхъ хозяйствахъ) убираютъ отдельно листья (ботвы) корнеплодныхъ растений для корма скоту (а у картофеля такое удаление ботвы рекомендовалось даже какъ средство противъ мокрой гнили). Но, такое удаление ботвы можетъ быть безвреднымъ для растений и для урожая въ томъ только случаѣ, если производится передъ самой выборкой корней или клубней изъ земли, когда закончилась жизненная дѣятельность растений; въ противномъ случаѣ, оно тѣмъ вреднѣе для растения и урожая, чѣмъ чаще и раньше до выборки корней или клубней производится оно; потому что съ удаленіемъ листьевъ приостанавливается усвоеніе растеніемъ питательныхъ веществъ изъ воздуха и удаляются содержащіеся въ листьяхъ образовательныя вещества, которыя должны были бы перемѣститься въ корни; отчего корни и клубни выходятъ бѣднѣе сахаромъ и крахмаломъ. Такъ, напр. 100 корней сахарной свекловицы, у которой не обламывались листья вѣсили 37,3 килогр. и, содержали сахара 17,18% и не сахара 1,78% и дали 5,8 килограм. ботвы; 100 же корней той же свекловицы, у которой листья удалялись три раза: въ июлѣ 10,6, въ августѣ — 8,9 и въ сентябрѣ 3,2 килограмма листьевъ, вѣсили 15,1 килограм., содержали сахара 14,77% и не сахара 2,07% и дали 25 килограм. листьевъ. Удаленіе же картофельной ботвы, съ цѣлю предупредить развитіе мокрой гнили, производится или слишкомъ поздно, потому что невозможно схватить для того тотъ моментъ, когда грибокъ готовится лишь образовывать споры (стр. 774—775), и потому не достигаетъ своей цѣли; или же, производится слишкомъ рано, отчего урожай клубней уменьшается болѣе, нежели отъ самой болѣзни, съ развитіемъ которой ботва все же не пропадаетъ вдругъ, а постепенно.

У растений, у которыхъ убираются отдельно цвѣты, плоды или плодо-

ношенія, высохшія стебли и листья, убираемые части складируются, срубаются или срываются какъ солома.

В. Уборка вырываніемъ съ корнемъ (теребленіемъ).

Вырываются съ корнемъ или теребятъ руками; во 1-хъ такихъ растений, у которыхъ, какъ у прядильныхъ: льна и конопли, важно получить стебель возможно большей длины. Они убираются раньше (до образованія или созрѣванія сѣмянъ) или позже (въ различномъ состояніи зрѣлости сѣмянъ), смотря по тому, извѣстна ли въ виду получить только волокно, болѣе или менѣе тонкое, волокно и сѣмена, или преимущественно сѣмена на посѣвъ и для масла. Они просушиваются связанными или несвязанными въ снопы въ козлахъ, шатрахъ, кострахъ; послѣ чего обрубають корни, а сѣмяныя головки отдѣляются у льна лучше всего *рыбленіемъ* — протаскиваніемъ растений сквозь желѣзный гребень, а у конопли — *околачиваніемъ*. Во 2-хъ, такихъ растений, у которыхъ, какъ напр. у фасоли, чечевицы, конскихъ бобовъ, легко осыпаются сѣмена; или которыя, какъ напр., горохъ, такъ сильно полегаютъ, что крайне затрудняютъ уборку ихъ серпомъ или косой. Вытеребленные растения связываютъ въ снопы и, просушивъ ихъ на полѣ или въ усадьбѣ, обмалачиваютъ. Въ 3-хъ, такихъ растений, которыхъ уборка этимъ ускоряется, какъ напр. у позднихъ сортовъ картофеля на легкой почвѣ, когда клубни, при рыхломъ укрѣпленіи въ землѣ, остаются ко времени уборки настолько прочно еще связанными съ подземной частью растения, что могутъ быть выдернуты изъ земли за эту послѣднюю.

Г. Уборка выкапываніемъ.

Выкапываются, собственно, растения воздѣлываемыя для клубней и корней (стр. 494).

Время уборки этихъ растений, которыя воздѣлываются для подземныхъ частей, выбираемыхъ въ первый годъ, и которыя, какъ растения большей частью двулѣтнія (стр. 689), приносятъ сѣмена лишь во второмъ году, опредѣляется весьма трудно. Конечно, въ опредѣленіи времени уборки этихъ растений можно руководиться величиной подземныхъ частей, которую можно наблюдать, выдергивая растения отъ времени до времени въ различныхъ частяхъ поля, опредѣленіемъ въ вынутыхъ корняхъ или клубняхъ содержанія сахара или крахмала; но все же единственнымъ вѣрнымъ указателемъ этого времени остается замѣраніе ботвы или пожелтѣніе листьевъ, такъ какъ, пока ботва или листья зелены, живы, до тѣхъ поръ не прекращается усвоеніе листьями пищи изъ воздуха и приращеніе массы корней и клубней

и содержанія въ клубняхъ и корняхъ: крахмала, сахара, бѣлковыхъ веществъ и т. д., и, слѣдовательно, уборка этихъ всегда будетъ сопряжена съ нѣкоторой утратой количества или качества урожая и можетъ оправдываться лишь приближеніемъ морозовъ, ранѣ наступленія которыхъ должны быть вынуты изъ земли клубни и корни; состояніемъ погоды, такъ какъ уборка этихъ растений должна по возможности производиться въ сухое время, чтобы выбрать изъ земли клубни и корни возможно чистыми отъ земли и сухими для болѣе надежнаго ихъ сохраненія; и, наконецъ, какими либо хозяйственными соображеніями. Впрочемъ, клубни топинамбура, посажъ срѣзавъ сухихъ стеблей осенью, оставляютъ на зиму въ землѣ, гдѣ они хорошо перезимовываютъ, до весны, когда ихъ выкапываютъ по мѣрѣ надобности. Имѣются примѣры того, что и брюква безъ обрѣзки листьевъ, но съ засыпкой ее землей, хорошо сохраняется въ землѣ въ теченіе зимы.

Клубни выкапываются заступомъ вилами или двузубой мотыгой (рис. 16) и, при рядовомъ воздѣлываніи, выпахиваются сохой, плугомъ или окучникомъ съ сплошными или, что лучше, съ лучистыми крыльями (рис. 42), черезъ которые можетъ провадываться земля, но не картофеля. Послѣ сбора руками вынутаго изъ земли картофеля, картофельное поле нерѣдко проборанивается и, при сошковой выборкѣ въ первый разъ, перепашивается вторично сохой и еще разъ проборанивается, при чемъ каждый разъ собираются еще новыя количества клубней.

Для уборки картофеля имѣются особенныя орудія — *картофелекопатели* (напр. Генсона, дѣйствующей наиболѣе удовлетворительно, выбирая картофель вращающимися вилами; Корбета, Кольмана и Мортоня), но употребленіе ихъ пока ограничивается однимъ лишь опытомъ. Наиболѣе затрудняется примѣненіе какъ этихъ, такъ и другихъ пахатныхъ орудій ботвой и влажностью почвы, такъ какъ орудія забиваются въ первомъ случаѣ ботвой, во второмъ землей.

Корни выкапываются лопатой или вилами: первое, какъ бы осторожно оно ни дѣлалось, повреждаетъ много корней, что, напримѣръ, у марены, которой корни сохраняются сушеными, не важно; но крайне вредно у такихъ растений, которыхъ корни, какъ напр. корни сахарной свекловицы, должны сохраняться болѣе или менѣе продолжительно свѣжими, а между тѣмъ пораженные при выемкѣ загниваютъ сами и заражаютъ гнилью другіе, даже непораженные корни, съ которыми попадаютъ въ одно мѣсто при сохраненіи. Поэтому, для выборки корней изъ почвы, лучше лопать двузубыя мотыги съ ушкомъ, на которое можно надавливать ногой при втыканіи вила въ землю. Вилы легче входятъ въ землю, труднѣе повреждаютъ корни и легче чѣмъ лопаты управляются работникомъ при выворачиваніи корней (свеклы): работникъ дѣвой рукой хватаетъ корнеплодъ за ботву, правой наклоняетъ рукоятъ вилы отъ растенія, подлѣ котораго воткнута вила и, такимъ образомъ, вытаскиваетъ корень. Вы-

тащить корень, слегка овалачиваетъ отъ него землю, ударяя имъ о древно вилы, окончательно очищаетъ его отъ земли и медкихъ корней особымъ ножомъ съ деревянной рукоятью, и этимъ же ножомъ обрѣзаетъ нижнюю, самую тонкую часть корня и срѣзаетъ ботву съ самой верхней части корня: у свекловицы толщиной всего въ $\frac{1}{2}$ —1 дюймъ, такъ чтобы отрѣзанные съ такой частью корня листья не могли держаться вмѣстѣ; у брюквы же можно срѣзать листья съ нѣсколько болѣею частью головки корня, для того чтобы листья держались вмѣстѣ. Если срѣзать корни меньше указаннаго здѣсь, то корень можетъ образовать стебель, отчего можетъ уменьшиться, напр., содержаніе сахара въ сахарной свекловицѣ; если же срѣзать корни болѣе приведеннаго выше, то онъ можетъ загнить, что влечетъ за собой точно также утрату сахара, которая въ послѣднемъ случаѣ можетъ быть даже болѣе чѣмъ въ первомъ, а потому, всегда лучше не срѣзать много корня при обрѣзкѣ листьевъ.

Въ послѣднее время стали примѣнять съ успѣхомъ особенныя орудія, облегчающія выборку свекловицы изъ земли — *корнеподъемники* съ однимъ (напр. Сакка) или двумя (напр. Зидерслебена) корпусами, которые имѣютъ сходство съ подпочвенными лугами и, во время дѣйствія орудія, идутъ съ одной стороны одного (Сакка) или двухъ смежныхъ рядовъ (Зидерслебена) или съ двухъ сторонъ одного ряда (Цейтгаммера) и лишь приподнимаютъ корни, но не вытаскиваютъ ихъ, что уже дѣлается затѣмъ весьма легко рукой. При этомъ орудіе Цейтгаммера (рис. 260) отрѣзываетъ главную массу корня отъ его тонкаго удлинненія перекладной между двумя его корпусами.




Рис. 260.

Выбранные изъ земли клубни или тотчасъ же отвозятся съ поля для сохраненія; или же, оставляются на нѣкоторое, во всякомъ случаѣ непродолжительное, время на полѣ прикрытыми ботвой, листьями или соломой, если почвѣ либо нельзя ихъ свести тотчасъ же съ поля, преимущественно же если нужно дать имъ (клубнямъ) нѣ-

сколько обсохнутъ для уборки ихъ въ подвалы. Во всякомъ случаѣ нужно стараться, чтобы они въ это время не мокли подъ дождемъ, если они должны сохраняться болѣе долгое время.

Для возки корнеплодовъ употребляютъ ратки (тачки) (рис. 207), которыя въ гористыхъ мѣстностяхъ, для сбереженія рабочаго скота, ставятъ на низкій, двухколесный передокъ (рис. 261) и дѣлаютъ пароконными.




Рис. 261.

Картофельная ботва оставляется, большей частью, на полѣ и запахивается какъ удобреніе; въ кормъ употребляется весьма рѣдко. Листья же корнеплодовъ болѣею частью употребляютъ въ кормъ, и если употребляютъ ихъ въ кормъ не сейчасъ, то въ видѣ квашенаго корма (стр. 799), который приготавливается, по возможности, изъ свѣжихъ, нежелалыхъ листьевъ, точно также какъ изъ травы; при чемъ, конечно, не требуетъ такихъ усилій для убиванія въ яму (достаточно утаптыванія, утрамбовыванія) какъ травяной, поспѣваетъ раньше того педѣль черезъ шесть, сохраняется также хорошо до дѣла какъ и тотъ, но принимаетъ темный цвѣтъ и непріятный иногда, аммиачный запахъ, что не мѣшаетъ, однако, тому, что скотъ, привыкнувъ къ нему, поѣдаетъ его весьма охотно.

Въ слѣдующей таблицѣ приведены количества различныхъ полевыхъ произведеній отъ различныхъ растений, получаемыхъ при среднемъ хорошемъ урожаѣ, вмѣстѣ съ некоторыми данными по прежнимъ статьямъ, а именно: количествомъ сѣмянъ, разсѣваемыхъ на десятину, временемъ посѣва и уборки, продолжительностію періода произрастанія, вѣсомъ четверика зеренъ, клубней и корней, и числомъ различныхъ зеренъ въ фунтѣ и гарницѣ. (См. стр. 838, 839, 840, 841.)

Сохраненіе различнаго рода полевыхъ произведеній.

Сохраненіе полевыхъ произведеній должно имѣть въ виду защитѣ ихъ отъ потери и порчи, не затрудняя въ тоже время ни дальнѣйшаго пользованія ими, ни дальнѣйшей обработки ихъ. Въ отношеніи сохраненія мы можемъ различить, главнымъ образомъ, три рода полевыхъ произведеній: 1) сноповой хлѣбъ, солому, мянну и сѣно; 2) зерно и въ 3) клубни и корни.

1) Сноповой хлѣбъ проще всего сохраняется въ *скирдахъ* (стр. 175—176), въ которые она складывается или на самомъ полѣ или на *гумнищѣ* въ усадьбѣ.

Первое, сравнительно со вторымъ, представляетъ то удобство, что, давая возможность отложить перевозку сноповаго хлѣба въ усадьбу до зимы, когда болѣе свободной рабочей силой, уменьшаетъ расходъ дорогой рабочей силы во время уборки растений съ поля, но за то затрудняетъ надзоръ за скирдами и перевозку хлѣба въ томъ отношеніи, что заставляетъ разбирать скирды и перевозить хлѣбъ во время грозы или глубокихъ снѣговъ, мятежей; или же, во избѣжаніе этого или при совершенной необходимости перевозки въ такихъ обстоятельствахъ, останавливать молотилу и терпѣть нужду въ кормовой, подстилочной соломѣ или толчѣ, гдѣ для этого служитъ солома. Поэтому, на полѣ складываютъ въ скирды хлѣбъ, преимущественно тогда, если хлѣбъ на полѣ же обмолочивается (стр. 815 и 830), или тамъ, гдѣ поля чрезвычайно удалены отъ усадьбы и гдѣ нѣтъ особенной надобности въ соломѣ. Гумнище—съ одной стороны для уменьшенія расхода рабочей силы, должно находиться поближе къ молотильному сараю (*молу*) и къ скотному двору, на который постушаетъ солома и мянина; съ другой—для уменьшенія опасности отъ огня—должно находиться въ нѣкоторомъ разстояніи отъ отопляемыхъ строеній, слѣдовательно и отъ молотильныхъ сараевъ, соединенныхъ съ овинами (ригъ), и должно быть обсажено деревьями, которыя защищаютъ скирды въ тоже время отъ вѣтровъ. Гумнища, для защиты ихъ отъ скота, окапываются канавой въ 3' фута ширины и глубины и обносятся живой изгородью. Въ полѣ, подъ складку скирды выбираются возможно сухіе мѣста, которыя выравниваются и выстилаются хворостомъ, а по немъ соломою. На гумнищѣ же, подъ скирды устраиваются такъ называемыя *падеримы* или *падеримы*, т. е. мѣста подъ скирды, для предупрежденія подмоченія хлѣба, возвышаются нѣсколько насыпкою вершковъ на 6 земли, которая утрамбовывается и затѣмъ устилается соломою; падеримы, для складки каждый разъ скирды очищаются отъ травы, которой порастаютъ. Лучше падеримъ *подскирдинки*, которыя защищаютъ хлѣбъ въ скирдахъ не только отъ подмочекъ, но и отъ мышей, и устраиваются, смотря по формѣ и величинѣ скирды, изъ большаго или меньшаго числа деревянныхъ, вкопанныхъ въ землю ступеней или каменныхъ столбовъ (к. рис. 262, деревянный подскирдинникъ), которыя связываются брусками (1); между брусками накладывается рѣшетникъ (г), который подъ складку скирды покрывается хворостомъ и соломою. Такой подскирдинникъ способствуетъ лучшему провѣтриванію сложеннаго въ скирды хлѣба, открывая доступъ воздуха въ скирду снизу; но, въ мѣстностяхъ съ обильными снѣгами, онъ дѣлаетъ это, равно какъ и защищаетъ хлѣбъ отъ мышей, въ томъ только случаѣ, если онъ достаточно высокъ, такъ что не заносится снѣгомъ до самаго хлѣба и, слѣдовательно, дно скирды остается доступнымъ для воздуха, а мыши не могутъ забираться по снѣгу въ скирды; для того же, чтобы мыши не могли забираться въ скирды




Рис. 262.

Яр. картофеля.....	Продолжительность периода роста картофеля в зависимости от температуры воздуха (градусы)	Время высева или высадки *) в поле.	Время уборки растений.	Количество съмыка на десятину въ четверниках или фунтах *) при посеве:	
				въ разбросъ.	рядомъ.
Яр. картофель.....	18—26	IV ₂ —V ₁	IX	—	40—120
„ топинабургъ...	50—52	IV ₂ IX	IX ботва { X—IV клуб.	—	60—100
„ свекла кормовая..	22—26	IV	IX	—	20—80*
„ „ сахарная..	22—26	IV	IX	—	30—80*
„ морковь.....	26—30	IV	IX	—	12—14*
„ пастернакъ.....	26—30	IV	IX	80—120*	8—14*
„ цвирой.....	10—18	IV ₂ —V ₁	IX	20—25*	—
„ крапшъ.....	78—130	III	X	—	150—200*
„ рѣпа.....	16—20	V ₂ —VI ₁	IX ₂	—	10—12*
„ брюква и кольраби	18—24	V ₂ —VI ₁ *	IX ₂ —X ₁	перо	садкой
„ капуста.....	18—24	V ₂ —VI ₁ *	IX ₂ —X ₁	перо	садкой
„ кукуруза на зеленомъ корнѣ.....	10—12	V	VII ₂ —VIII	—	0—8
Яр. табакъ.....	22—26	V ₂ —VI ₁ *	IX	перо	садкой
„ ворсилья. шапка:	52—56	VII ₂ —IX ₁	VII—VIII	—	25*
„ кукуруза на зерно.	20—26	IV ₂	IX ₂ —X ₁	—	3—4
„ сорго обыкновен.	22—24	IV ₂ —V ₁	IX ₂ —X ₁	—	2—3
„ конскіе бобы.....	22—28	IV	IX—X	—	10—12
„ фасоль.....	12—14	V	VII ₂ —VIII	—	3,5—4
оз. рапсъ.....	46—50	VII ₂ —VIII	VI—VII ₁	—	10—16*
Яр. подсолнечникъ...	21—22	IV	VIII—IX ₁	—	1—1,5
оз. пшеница.....	42—50	VII ₂	VII—VIII ₁	6—12	4—6
„ полба.....	42—50	VIII ₂	VIII	14—24	6—14
„ эмеръ.....	44—52	VIII ₂	VIII	16—20	4—6
„ одностернянка.....	48—56	VIII ₂	VIII	12—16	4—6
„ рожь.....	40—42	VII ₂ —VIII	VII—VIII	8—12	4—6
„ ячмень.....	40—46	VII ₂ —VIII	VI—VII	6—8	4—6
Яр. пшеница.....	18—20	III ₂ —V ₁	VII—VIII	8—12	6—8
„ полба.....	20—22	IV	VIII	16—26	10—16
„ эмеръ.....	22—26	III ₂ —IV ₁	VIII—IX ₁	20—24	6—8
„ рожь.....	20—22	IV	VII ₂ —VIII	8—10	6—8
„ ячмень крупный..	17—22	IV ₂ —V ₁	VII ₂ —VIII	8—12	6—8
„ „ мелкій.....	9—14	IV ₂ —V	VII ₂ —VIII	8—12	6—8
„ овесъ.....	16—22	III ₂ —V	VIII—IX ₁	12—24	8—10
„ просо.....	13—16	IV ₂ —V	VIII—IX ₁	1—3	0,75—1
„ гречиха.....	12—16	V—VI ₂	VIII—IX ₁	6—12	3—6
„ горохъ.....	16—20	IV—V ₁	VIII—IX ₁	8—12	6—9
„ чечевица.....	20—22	IV ₂ —V ₁	VIII—IX ₁	6—8	4—6
„ вика.....	18—22	IV ₂ —V ₁	VIII—IX ₁	6—8	4—6

Средній хороший урожай съ десятины.		На 100 ч. зерна прироста соломы, мн. или из 100 ч. соломы или кор-моя *) — ботвы или листочковъ.	Въ четверной се-рѣ или клубней *) въ фунтахъ.	Число тысячъ зеренъ.		Примѣчанія.
Зерно въ четвер-ныхъ клубняхъ *), клубней *) и кор-ней **) въ пудахъ.	Соломы и мякны, травы, ботвы и листь-евъ въ съёмномъ состо-яніи *) и сѣна **) въ пудахъ.			въ горн-цѣ.	въ фун-тѣ.	
400—1200*	125—350*	25	50—58*	—	2—8')	(*)штукъ клубней.
400—1300*	250—800*	50	52*	—	—	
2000—4000**	500—1000*	25	15—18	—	—	
1000—2000**	250—500*	25	15—18	27,13	12,88 до	24,82
1200—2800**	240—586*	20	4—12	—	307,20')	(*) 783,8 об-тертой.
1200—2500**	240—500*	20	12—15	—	—	
900—1600**	225—400*	25	23—26	—	—	
800')—1200**	240—450*	—	32—33	—	—	(*) 150—300 п. сух. корней.
1500—3000**	350—750*	25	40—43	—	151,50	
1200—2400**	240—600*	20—25	43—47	—	—	
—	2000')—4000*	—	43—47	—	148,75	(*) кочаней.
2600—6500')	650—1625**	—	45—50	8,06 (лонскій)	1,20 (зубъ)	(*) вселен. корма.
75—200')	250—300')	—	26—29	—	—	(*) сух. анисовъ.
100—300')	200—400	—	26—29	—	—	(*) отбросовъ.
160—200	250—500	170	46—53	0,05	1,20	
120—200	175—200')	—	35—40	—	—	(*) 40—45 пуд. или 1000—1200 шт. метелокъ.
64—120	120—200	—	52—58	6,05	1,06	
64—120	100—150	—	58—59	—	—	
64—120	150—225')	127	46—47	760,94	120,49	(*) впродъ того 40—75 пуд. струч-ковъ.
96—200	600—800	—	25—30	—	—	
64—96	150—250	194	49—55	49,68	8,35	
160—280	125—225	—	25—33	16,13	4,81	
96—150	150—250	—	29	—	—	
96—160	125—225	—	29	—	—	
64—96	150—280	257	45—53	89,64	15,00	
64—96	100—200	—	38—41	50,78	12,48	
48—72	120—200	212	48—54	76,26	12,30	
98—208	120—200	—	25—33	—	—	
98—144	120—200	—	29	—	—	
48—96	150—250	270	42—50	114,20	19,95	
80—136	130—200	—	40—43	42,90	8,23	
64—96	65—150	163	35—40	—	14,60	
64—120	100—200	150	26—35	58,84	14,86	
72—104	100—150	186	44—49	—	101,90	
48—96	65—150	—	33—43	98,81	17,00	
58—80	75—225	223	50—56	10,08	1,97	
40—80	65—100	92	50—55	66,12	10,74	
58—80	100—180	194	50—54	59,00	8,65	

ар. чина.....	18—22	IV ₂ —V ₁	VIII—IX	6—8	4—6
" бараний горошек.....	18—22	IV ₂ —V ₁	VIII—IX	6—8	4—6
(пузырное съем.)					
" люпин желтый.....	20—24	IV ₂ —V ₁	IX	6—8	4—6
" рапс.....	20—26	IV ₂ —V ₁	VIII—IX	20—30*	10—15*
оз. сурбана.....	40—45	VIII	VI—VII	20—30*	10—15*
ар. ".....	12—16	V—VI	VIII—IX	30—40*	20—30*
" горчица белая.....	16—20	IV ₂ —V ₁	VII—VIII	20—25*	10—15*
" " черная.....	16—20	IV ₂ —V ₁	VII—VIII	15*	10*
" рижикъ.....	16—20	IV ₂ —V ₁	VIII	25*	—
" китайская рѣдьба.....	14—16	V	VIII	1,5—2	1—1,5
" макъ.....	22—26	III ₂ —IV	VIII	4—6*	5*
" кунжутъ (Sesamum orientale).....	20—22	IV—V	VIII—IX	40—45*	—
" ленъ.....	12—15	III ₂ —V	VII—VIII	4—16	—
" конопля.....	13—15	V	VIII—IX	6—16	—
оз. тминъ.....	48—54	VI ₂ —VII	VI—VII	—	12—16*
ар. анисъ.....	12—18	III ₂ —IV	VII—VIII	45—55*	—
оз. и ар. укропъ.....	68—72	III ₂ —IV	VIII—IX	30—45*	—
ар. козлянда (кишинецъ).....	14—20	III ₂ —IV	VIII—IX	40*?	—
" Сафлоръ.....	12—14	III ₂ —IV	VII	—	2—4
оз. и ар. церва.....	48—52	VIII—IX	VII—VIII	10—30*	—
ар. красильная греча.....	14—16	IV—V ₁ *	VI—IX	пере	садкой
оз. и ар. вайда.....	1—2*	IX, III ₂	VI—VII	—	20—25*
оз. розъ на зеленый корень.....	33—35	VII ₂ —VIII	V	8—12	—
ар. могаръ.....	10—12	V ₂ —VI ₁	VIII—IX	1,75—2	—
" ника.....	7—8	IV	VI—VII	6—8	—
" птиценожка.....	14—16	IV—V	VIII	35—60*	—
" шпергель.....	7—8	V ₁ —VII	VI—IX	100—120*	—
" клеверъ красный.....	2—3*	III ₂ —V	VI—IX	40—50*	—
" " шведский.....	2—3*	III ₂ —V	VI—IX	25—35*	—
" " бѣлый.....	2* и болѣе	III ₂ —V	VI—VII	20—30*	—
" мясокрасный.....	32—33	IX, IV	V ₂ —VII	50—60*	—
" люцерна обыкновенная.....	4—15*	IV—V ₁	V—IX	50—80*	—
" " хмѣль.....	2* и болѣе	III—V	VI—VIII	40*	—
" эспарпеть.....	4—15*	IV—V ₁	VI—VIII	16—24	—
" тимopheва трава.....	4—6*	IV—V ₁	VI	20—25*	—
" итальянскій рай-грассъ.....	2*	IV—V ₁	VI—IX	130*	—
" англійскій рай-грассъ.....	3—4*	IV—V ₁	VI—IX	130*	—
" французскій рай-грассъ.....	4—6*	IV—V ₁	VI—IX	100*	—
" ежа обыкновенная.....	4—6*	IV—V ₁	V—IX	60—75*	—

Примечание. Вообще можно считать 1) въсь четверика корней или клубней вер-
хъ томъ числу утолщенныхъ—какъ 2—2½, въ 1, у ароматныхъ—какъ 1,5—1,75 къ 1; въ влаж-

40 — 80	100 — 180	—	50	—	—
32 — 64	75 — 120	—	50	—	—
32 — 96	125 — 250	—	52—56	16,13	3,07
32 — 64	100 — 180	—	41—44	—	150,00
48 — 72	120 — 200	120	43—47	—	149,20
32 — 56	100 — 150	—	42—44	—	155,00
64 — 96	120 — 200	—	36—44	—	153,17
48 — 72	90 — 150	—	40—43	—	—
48 — 72	100 — 180	250	35—41	—	—
46 — 72	100 — 180	—	35	—	—
48 — 96	100 — 180	240	35—41	—	712,53
56 — 112	300 — 600	600	37—39	—	—
16 — 56	100 — 150 ¹⁾	—	41—47	—	90,44
40 — 96	150 — 180 ¹⁾	—	35—40	—	—
48 — 72	120 — 150	—	33—38	—	—
56 — 96	75 — 180	—	22	—	—
56 — 112	300 — 500	—	23—26	—	—
112 — 144	250	—	19—23	—	—
60 — 90 ¹⁾	100 — 200	—	32—36	—	—
—	175 — 350	—	38—45	—	—
—	800 ¹⁾	—	38	—	—
12 — 20	1200 — 2000 ¹⁾	—	6—7	—	—
—	200 — 300**	—	45—53	—	15,00
72 — 88	180 — 300**	—	36—40	—	330,00
—	180 — 250**	—	50—54	—	8,65
—	180 — 220**	—	29	—	—
45 — 65*	100 — 130**	—	40—44	—	—
18 — 20*	250 — 350**	—	48—51	2047,24	251,45
10 — 15*	250 — 350**	—	51	—	570,00
25 — 30*	150 — 200**	—	47—51	—	576,18
25	200 — 225**	—	51—53	—	—
25 — 30*	250 — 400**	—	49—51	—	190,86
20 — 30*	200 — 250**	—	49—51	—	240,00
64 — 96	150 — 250**	—	18—26	47,84	22,00
8 — 15*	200 — 400**	—	29—35	—	960,00
25 — 30*	400 — 500**	—	13—16	—	230,00
30 — 40*	250 — 300**	—	13—16	—	220,00
20 — 25*	300	—	10	—	140,00
25*	300 — 400**	—	13	—	330,00

¹⁾ 25 — 40 нуд.
труп. воложна.
²⁾ 5 — 75 нуд.
труп. воложна.

³⁾ 10—18 нуд. су-
хихъ цвѣтковъ.

⁴⁾ 6 нуд. индиго-
вой. красн.

⁵⁾ 200—300 нуд.
сух. листьевъ.

Прим. Вообще можно считать, что въ
100 нуд. травы получается 20—25 нуд.
сѣян.

хотъ въ 50 фунт. 2) Отношеніе соломы къ зернамъ у вологовыхъ халбовъ какъ 2 : 1;
выхъ глиматахъ это отношеніе больше, въ сухихъ—меньше къ пользу соломы. 3) Уро-




Рис. 263.

подскирдинки затрудняют складку скирда и подвергают его большой опасности отъ вѣтра. Для лучшаго провѣтриванія скирда, особенно при складкѣ въ скирдъ не хорошо просушеннаго снопового хлѣба при уборкѣ его въ ненастную погоду, устанавливаютъ иногда въ срединѣ подскирдинки жердь, къ которой приставляютъ еще нѣсколько жердей, такъ чтобы образовалось коническое пространство, вокругъ котораго складывается хлѣбъ и которое сообщается внизу съ подскирдиннымъ пространствомъ.

Скирды складываются различной формы и величины. Въ горизонтальномъ сѣченіи скирды биваютъ *круглые* (ковны, одонны), которые допускаютъ наиболѣе равномерную складку, представляютъ наименьшую поверхность и наилучше противостоятъ вѣтру, и *продолговато-четыреугольные*, которыхъ (*сироды*) хорошая складка затруднительнѣе нежели круглыхъ, но въ которыхъ хлѣбъ провѣтривается гораздо лучше, чѣмъ въ круглыхъ, потому что поверхность первыхъ больше чѣмъ послѣднихъ; затѣмъ, продолговатый меньше круглаго требуетъ матерьяла (соломы) для покрыванія ихъ; и если поставить по направленію господствующаго вѣтра, то онъ очень устойчивъ, потому что только узкая сторона его подвергается дѣйствію сильнаго вѣтра. Наконецъ, продолговатый—четыреугольный скирдъ складывается скорѣе и можетъ быть какъ складываемъ, такъ и разбираемъ по частямъ (въ 12, 18, напр., футъ длинны каждая). что важно въ случаѣ ненастья. Впрочемъ, вредное вліяніе этого послѣдняго обстоятельства на круглые скирды можетъ быть устранено устройствомъ легкихъ соломенныхъ или драничныхъ крышъ (*соландекскихъ напѣсовъ*), которые могутъ подниматься и опускаться на столбахъ (обыкновенно четырехъ) и надъ защитой которыхъ, опускавъ ихъ на недоложенный или неразобраный вполнѣ скирдъ, можно, безъ вреда для хлѣба, остановить въ ненастье какъ складку, такъ и разборку скирда. Въ отвѣсномъ направленіи скирдъ представляетъ двѣ части: нижнюю, которая мо-

жетъ быть поддержана большими колебаніями: отъ полнаго неурожая въ неблагоприятные годы до колоссальныхъ урожаевъ въ годы особенно благопріятныя и на хорошихъ почвахъ: такъ, известный урожай на десятинахъ: пудовъ корней—7500 кормовой свекловицы, 5350 брѣвны, 4500 кормовой моркови; пудовъ сѣна—1200 итальянскаго райграсса, 650 краснаго клевера, 585 шведскаго клевера, 820 люцерны, 1600 кукурузы; четвертей зерна—25—30 пшеницы, 25 ржи, 45 овса, 35 ячменя, 24 раиса; алыя стеблей 390 пудовъ. Но, эти урожаи недостаточны еще возможности предположить: 10000 пуд. кормовой свеклы, 6000 пуд. сѣна, 18 дѣм. между рядами, 10 дѣм. между растеніями въ ряду и 2 1/2 фунт. въса въ каждомъ корнѣ) и т. д.

но столбамъ, хорошо прикрывать столбы деревянными или желѣзными крышками (козоколами, рис. 263—желѣзный подскирдинникъ), свѣшивающимися со столбовъ, такъ чтобы мышь, взбѣжавъ по столбу до крыши, не могла изъ-подъ крышки выбраться на ея поверхность и по этой послѣдней въ скирдъ. Слѣшкомъ же высокіе

жесть имѣть прямыя, отвѣсныя или же наклоненныя, расходящіяся къверху стѣнки (рис. 264), и верхнюю, образующую крышу скирда, которой стѣнки, всегда наклоненныя, сводятся къверху въ остроугольную или въ острореберную вершину (конъ четырехскатной крыши) у продолговатыхъ скирдъ. Скирды съ прямыми стѣнками у нижней части складываются легче, но за то защищаютъ хлѣбъ нѣсколько хуже отъ дождя, чѣмъ скирды съ наклонными стѣнками у нижней части. Впрочемъ,




Рис. 264.

для лучшей защиты боковъ круглыхъ съ прямыми стѣнками скирдъ отъ дождя, дѣлаютъ зерновую часть (крышу) на 1/2 фута большаго диаметра чѣмъ нижнюю, такъ чтобы крыша образовала вокругъ скирда нахлѣсъ дюйма въ 3. Къ тому же отъ осадки такого скирда стѣнки нижней части всегда нѣсколько разваливаются къверху. Чтобы, по возможности, уменьшить поверхность скирдовъ, дѣлаютъ скирды не болѣе 30 фут. (а менѣе 12) въ диаметрѣ, а потому приходится дѣлать ихъ сравнительно высокими (не ниже 15—18 фут.), такъ что подача на нихъ сноповъ, производимая болѣею частью деревянными или желѣзными вилами съ тѣлѣт, можетъ потребовать, при значительной высотѣ скирда, особенныхъ лѣстницъ и подмостковъ. Нижняя часть дѣлается, примѣрно, въ 1/3 (преимущественно у продолговатыхъ скирдъ съ наклонными стѣнками)—2/3 (преимущественно у круглыхъ скирдъ съ прямыми стѣнками нижней части) всей высоты скирда. Въ круглый скирдъ, выш. 15—18 фут., въ 12—15 фут. въ диаметрѣ, укладывается около 3,000 сноповъ (стр. 176). У насъ, въ южныхъ губерніяхъ, складываются скирды сажени 10 въ длину и 3 въ ширину, вмѣщающія отъ 300 до 350 копѣекъ снопового хлѣба. Вообще же, чѣмъ сурѣе хлѣбъ, тѣмъ меньше долженъ быть скирдъ.

Складка скирда, для того чтобы онъ былъ проченъ и защищалъ хорошо хлѣбъ отъ ненастья, требуетъ большой сноровки и тщательности. Снопы кладутся въ скирдъ слонами снизу вверхъ, въ каждомъ же слоѣ—рядами, при чемъ всегда комлемъ (гузомъ) наружу, а колосьями внутри скирда; снопы одного ряда черerkиваютъ снопы другаго ряда и слои сноповъ получаютъ прочность отъ срединъ въ паружья скирда, чтобы сдѣлать невозможнымъ затѣкъ воды въ скирдъ; наконецъ, въ рядахъ особенно наружныхъ, снопы кладутся возможно плотно одинъ къ другому. Особой тщательности требуютъ во первыхъ складки нижней части съ наклонными стѣнками и верхней части вообще; первую не слѣдуетъ разваливать, а вторую сводить слѣшкомъ быстро, такъ какъ въ противномъ случаѣ можетъ пострадать прочность скирда, и на поверхности верхней части, кромѣ того, образоваться уступы, задерживающіе воду; во вторыхъ, завершенье скирда, которое должно быть

такъ плотно, чтобы дождь не могъ пробить вершинки. Во время кладки скирда каждую версту (рядъ сноповъ) слѣдуетъ покатывать по комлямъ; иначе, если комли сноповъ будутъ лежать неровно, скирда развалится. Для правильной складки круглаго скирда весьма хорошо поставить въ срединѣ скирда шесть и надѣть на него петлей веревку, которой можно бы было повѣрить окружность скирда; для правильной же складки скирда вообще необходимъ опытный рабочий, который снизу, оставаясь внизу или сѣзая по временамъ внизъ, могъ бы наблюдать за складкой скирда, направляя ее, исправляя дѣлаемые кладчиками ошибки и выравнивая снопы наружныхъ рядовъ: сперва, пока скирда невысока, помощію вилъ, которыми онъ вытаскиваетъ наружу вдавшіеся внутрь и вбиваетъ внутрь выдавшіеся наружу снопы, а затѣмъ, когда скирда достигаетъ уже большей высоты,—помощію лопаты съ длинной рукоятію, которой онъ вбиваетъ внутрь выдавшіеся наружу снопы. Крыша готового скирда покрывается перебитой соломой или соломой, связанной въ снопы, которые накладываются другъ на друга какъ черепица; а солома, въ предупрежденіе развеса ея вѣтрами, врытывается соломёнными веревками. Бока же готового скирда хорошоенько свесываются граблями или особенными граблями и обрѣзаются даже иногда особеннымъ поземъ, похожимъ на сѣкирой. Въ заключеніе скирда хорошою окружить канавкой для отвода дождевой воды (рис. 264).

Складка снопового хлеба въ скирды ускоряетъ уборку хлеба, такъ какъ требуетъ, сравнительно со складкой снопового хлеба въ сарай, всего половину или немногимъ больше этого рабочихъ рукъ; она даетъ возможность уборки съ поля не совсемъ сухаго хлеба, такъ какъ въ скирдахъ, особенно продолговатыхъ, хлебъ хорошо провѣтривается; она не требуетъ тѣхъ затратъ на первоначальное устройство и ремонтъ, которыхъ требуетъ устройство хлебныхъ сараевъ. Но, эти преимущества складки хлеба въ скирды, особенно въ странахъ съ влажнымъ временемъ года во время уборки хлебовъ, перевѣшиваются невыгодными сторонами этого способа сохраненія снопового хлеба, которыя заключаются главнымъ образомъ въ томъ, что при немъ, во 1-хъ), теряется много зерна какъ отъ осыпки, перевозки, складки и разборки сноповъ, такъ и отъ поклева птицами и поѣданія мышами; впрочемъ, обведя скирды канавой, глубиной въ 15, а шириной въ 8 дюйм. съ отвѣсными и гладкими стѣнками или вкопавъ вокругъ нихъ цилиндрическіе горшки (стр. 779) и осматривая ежедневно тѣ и другіе, для истребленія попавшихъ въ нихъ животныхъ, можно значительно ослабить вредъ, причиняемый мышами скирдамъ хлеба. Въ 2-хъ), неговори уже объ утраченной отчасти (см. выше) помѣхи въ складкѣ и разборкѣ скирды со стороны ненастной погоды, трудно, особенно въ влажныхъ странахъ, защитить сноповой хлебъ въ скирдахъ отъ порчи его дождями, такъ что солома утрачиваетъ часть своего кормоваго достоинства, особенно въ верхнихъ (овершье) и нижнихъ (одошье) снопахъ, а зерно въ верхнихъ снопахъ не рѣдко прорастаетъ. Вообще потерю скирдоваго хлеба зерномъ и соломой можно считать, въ 3⁰/₀

въ правильно сложенныхъ скирдахъ, а то такъ и больше до 4—5⁰/₀. Въ 3-хъ) тратится много рабочихъ рукъ на подвозку снопового хлеба въ скирды и складку его въ нихъ, а затѣмъ разборку его изъ скирды и перевозку въ молотильному сараю сравнительно съ тѣмъ, если сноповой хлебъ свозится съ поля и складывается прямо въ молотильный сарай (ригу). Въ 4-хъ) нельзя складывать въ скирды небольшихъ количествъ хлеба. Въ 5-хъ) труднѣе, чѣмъ въ сараихъ уберечься отъ воровства. А потому, складка хлеба въ скирды болѣе пригодна въ сухихъ климатахъ; въ мѣстностяхъ, гдѣ дорогъ строительный матеріалъ; гдѣ особенно значительны пространства, засѣваемые хлебами; на случай особенно урожайныхъ годовъ, когда не помѣщается весь урожай въ имѣющіеся для средняго хорошаго урожая сараи; въ особенности для сохраненія ржи, которая плотнѣе укладывается въ скирды, да и долѣе противостоитъ порчѣ. Наименѣе же пригодна она для сохраненія снопового хлеба въ влажныхъ климатахъ, гдѣ строительный матеріалъ дешевъ, при небольшихъ пространствахъ, засѣваемыхъ хлебами, въ особенности для яровыхъ хлебовъ (ячменя и гороха), которые легче терпятъ зерно.

Для послѣдняго рода обстоятельствъ пригоднѣе сохраненіе снопового хлеба подъ крышей—въ хлебныхъ сараяхъ, ригахъ, пуняхъ, въ которыхъ онъ лучше защищается отъ птицъ, воровства и даже отъ огня; въ которыхъ онъ можетъ быть сложенъ во всякое время и въ какомъ угодно маломъ количествѣ, какъ это только позволяетъ погода; и изъ которыхъ имъ можно пользоваться точно также во всякое время года. Но, для того чтобы эти помѣщенія вполне отвѣчали своему назначенію, необходимо, чтобы подъ нихъ не подтекала вода, чтобы полы ихъ допускали сборъ выпадающихъ изъ сноповъ зеренъ (слѣдовательно были устроены на подобіе молотильнаго тока), чтобы логіи крыши ихъ не давали течи; наконецъ, чтобы они были достаточно просторны и высоки и имѣли достаточное число надежащихъ образомъ размѣщенныхъ воротъ какъ для помѣщенія всего необходимаго количества произведеній, такъ и для удобнаго въѣзда въ нихъ и выѣзда изъ нихъ съ возами и, если нужно, то и для молотбы. Что же касается стѣнъ такихъ помѣщеній, то ихъ можетъ даже вовсе не быть, когда ограничиваются для храненія снопового хлеба наѣсами (стр. 842); или онѣ могутъ быть лишь съ трехъ сторонъ, какъ, напр., ихъ не бываетъ съ внутренней стороны у сараевъ, окружающихъ четырехугольный дворъ; или, наконецъ, онѣ бываютъ со всѣхъ четырехъ сторонъ. Конечно, послѣднее лучше втораго, второе лучше перваго; потому что стѣны защищаютъ бока сложеннаго хлеба отъ дождей и снѣга; но хорошо, если стѣны сарая въ тоже время допускаютъ провѣтрива-

ние сложенного хлеба, какъ это дѣлають, напр., плетенныя стѣны. Впрочемъ, хлебъ, сложенный подъ навѣсы съ крышами, спускающимися весьма низко къ землѣ, довольно хорошо защищается отъ дождей, хотя не также хорошо отъ спѣжныхъ запасовъ. При сохраненіи снопового хлеба въ сараихъ требуется крайняя осторожность, чтобы не сложить въ сарай, къ тому же плотно, полу-просохшаго хлеба, въ особенности ярового (ячменя, овса), который, въ такомъ случаѣ, легко согрѣвается, портится и даже воспламеняется. Поэтому, лучше оставить недостаточно просохшій хлебъ въ полѣ (стр. 805), чѣмъ свезти его въ сарай; такъ какъ въ первомъ случаѣ, можетъ быть надежда хоть на сохраненіе части его, тогда какъ во второмъ неизбежна потеря всего хлеба и издержекъ на свозку его въ сарай.

Солома сохраняется часто въ *ометахъ*, т. е. въ большихъ кучахъ, въ которые она свозится изъ-подъ молотилки и въ которыхъ она выщелачивается дождями и запыляется сѣномъ, и потому сохраняется дурно. Лучше сохраняется она въ болѣе правильныхъ скирдахъ или подъ легкими навѣсами, въ легкихъ сараяхъ или на чердакахъ, такъ какъ защищается здѣсь болѣе или менѣе отъ дождей и сѣна. Чердаки, находящиеся надъ скотными дворами, весьма удобны для сохраненія какъ соломы, такъ и другихъ кормовъ, какъ-то: сѣна, мякны, потому что допускаютъ легкое пользованіе кормами, которые могутъ быть спускаемы въ скотный дворъ для употребленія черезъ закрывающіяся отверстія въ потолкѣ скотнаго двора; но въ этомъ случаѣ этотъ послѣдній долженъ быть очень щителъ, и отверстія въ немъ должны плотно закрываться, чтобы не пропускать къ корму зловонныхъ испареній изъ скотнаго двора (въ особенности копышенъ), могущихъ сдѣлать кормъ несъдобнымъ для скота. Кормъ можетъ или провозиться на чердакъ по въѣздамъ, которые неудобны если круты и дѣлаются скользящими, напр., вслѣдствіе обледѣвненія, или, что удобнѣе, подниматься туда черезъ слуховыя окна, помощію особыхъ крюковъ, щипцовъ, прикрѣпленныхъ къ передкѣ, обходящей блокъ и т. д. Въ закрытыя помѣщенія солома сыромолотнаго, особенно ярового, хлеба не должна набиваться слишкомъ плотно, въ предупрежденіе ея согрѣванія и порчи.

Мякна сохраняется лучше всего подъ навѣсами съ спускающимися низко къ землѣ крышами, въ сараихъ или на чердакахъ, гдѣ она болѣе или менѣе защищена отъ замочки дождями и заноса сѣномъ.

Сѣно, какъ и сноповой хлебъ, проще всего сохраняется въ *одоньяхъ* (круглыхъ скирдахъ) или *стогахъ* (продолговатыхъ скирдахъ *).

*) Впрочемъ, стога бывають и овальной формы въ поперечномъ сѣченіи.

Сѣно мечется въ одонья и стога приблизительно также какъ складывается сноповой хлебъ; съ тою разницей, что для сѣна ограничиваются обыкновенно подстилкой изъ хвороста и соломы и что нижнюю часть стога почти всегда нѣсколько разнаживаютъ сверху. Сѣно предпочитаютъ складывать въ стога, а не одонья, потому что въ первомъ можно складывать и изъ первыхъ можно разбирать его по частямъ, неопасаясь вреда для недоложенного или неразобраннаго стога отъ непастья. Впрочемъ, складка сѣна въ стоги можетъ производиться и, въ такомъ случаѣ, прерываться въ случаѣ непастья безъ вреда для сѣна, или полѣ голландскомъ навѣсомъ (стр. 842), что заслуживаетъ вниманія для нашихъ влажныхъ мѣстностей, или, что подороже, полѣ брезентовъ изъ плотнаго укупорочнаго, еще лучше просмоленнаго холста, который перекладывается черезъ натянутую на два песта веревку. Если стога кладется на самый лугу, то сѣно сваливается къ нему веревками; но еще удобнѣе для этого *сѣнная волокушка*, которая дѣлается изъ трехъ деревянныхъ рѣшетокъ или перилъ, выш. 40 дюйм., въ видѣ обыкновенныхъ лѣстницъ; къ одной изъ нихъ, средней, длиною въ сажень, прикрѣпляются подвижно, на желѣзныхъ болтахъ, двѣ боковыя рѣшетки, длиною 56 дюйм. каждая, которыя, такимъ образомъ, могутъ быть болѣе или менѣе приближены къ средней рѣшеткѣ, или болѣе или менѣе удалены отъ нея своими свободными концами. Между стойками перилъ около нижняго бруса ихъ продѣтъ крайній канатъ съ петлями на концахъ, въ которые продѣты веревки, прикрѣпленные однимъ концемъ къ верхнимъ концамъ боковыхъ перилъ, а другимъ концемъ къ вѣшкамъ, на которые надѣваются постромки упряжной лошади. Двѣ лошади, приращенныя въ такую волокушу, могутъ въ одинъ часъ сволочить сѣна болѣе, нежели нѣсколько человекъ въ одинъ день, если поверхность луга ровная. Для поѣма сѣна на стога стоить испытанія *стоподобника Колмана* (съ 3-мя блоками 25—26 р. въ Ром. „Работникъ“ стр. 274).

Въ хорошо и сухо сложенныхъ стогахъ сѣно подготовляется (броженіемъ) и сохраняется очень хорошо: главнымъ образомъ не исплывається, сохраняетъ болѣе такихъ частей, какъ листья, и потому побдается скотомъ охотнѣе, чѣмъ сохранявшееся въ сараяхъ. Такъ что, несмотря на нѣкоторое количество овершья, негоднаго въ кормъ, можно всегда предпочесть складку сѣна въ стога сохраненію его въ закрытыхъ помѣщеніяхъ, требующихъ затратъ на первоначальное устройство и ремонтъ ихъ. Но, при влажной погодѣ, во время уборки сѣна, складка въ стога безъ навѣса и брезента крайне затруднительна, а потому во влажныхъ мѣстностяхъ, при невозможности обзавестись тѣмъ или другимъ, предпочтительна складка сѣна подъ навѣсы, въ сарай (пули) или на чердаки (сѣновалы). Складывать сѣно на сохраненіе необходимо возможно плотно и тѣмъ плотнѣе, чѣмъ сырѣе оно, въ предупрежденіе плѣсени или другаго рода порчи его (стр. 798). Чѣмъ плотнѣе сложено и лучше укрыто сѣно въ стогахъ, тѣмъ меньше овершья. Въ хорошо сложенныхъ стогахъ сѣно часто слагается до того плотно, что его нельзя разобрать вилами, а нужно рвать особенными сѣнными ножами. Сѣно сохраняется лучше всего подъ соломенной или очеретовой крышей, менѣе хорошо подъ черепичной, такъ какъ здѣсь легче образуется капельножидкая вода, которая способствуетъ заплѣсневѣнію сѣна.

Сѣно при сохраненіи теряетъ часть своего вѣса, вследствие высыхания и др. причинъ; такъ, убранное въ хорошую погоду теряетъ черезъ полгода — 5—10%, а убранное въ дурную погоду даже 10—18%.

У сѣна, особенно часто, сѣно поступаетъ въ продажу значительными количествами для употребленія въ городахъ. Перевозка сѣна, какъ чрезвычайно громоздкаго предмета, легко воспламеняющагося въ обыкновенномъ его видѣ, неудобна для перевозки по желѣзнымъ дорогамъ, но оно дѣлается удобнымъ для этого, если его *спрессовать* помощью преимущественно употребляющихся для этого рычажныхъ американскихъ прессовъ^{*)}, которыми оно можетъ быть спрессовано до плотности тополеваго дерева (0,883) или до $\frac{1}{4}$ прежняго своего объема, такъ что годовое количество сѣна для казальной лошади (109 $\frac{1}{2}$ пуд.) въ спрессованномъ состояніи занимаетъ не болѣе 8,6 куб. футовъ. Спрессованное сѣно получается въ тюкахъ, вѣсомъ около 6 пуд., перевязанныхъ крѣпкими веревками или легкими обручными желѣзными; оно перевозится по желѣзнымъ дорогамъ въ открытыхъ вагонахъ, такъ мало подвержено оно, по своей плотности, опасности отъ огня; оно дешево сохраняется, потому что занимаетъ мало мѣста; расхождение его легко контролируется. Къ тому же, спрессовано можетъ быть сѣно и въ менѣе сухомъ состояніи; спрессованное тотчасъ по уборкѣ съ дуга, оно подготавливается въ тюкахъ такъ хорошо (броженіемъ), сохраняется мгновенно, перасыхивается, сохраняетъ всѣ наиболѣе питательныя части: листья, цвѣты, сѣмена и если гризнутся, то гризнутся только съ поверхности, такъ что подается скотомъ охотнѣе сохраняющагося на чердакахъ.

2. Зерно сохраняется преимущественно въ амбарахъ, рѣже въ ямахъ.

Послѣднія вырываются въ землѣ въ видѣ бутылки, глубиной до 2 саж. и 8—10 фут. въ наибольшемъ діаметрѣ, съ горломъ $\frac{1}{2}$ фут. въ діаметрѣ и 3 фут. вышины; затѣмъ, за нѣсколько дней до наполненія зерномъ, обжигаются соломой въ теченіи 12—15 часовъ, и, по выгребѣ зола, обкладываются по дну и стѣнкамъ свѣжей, сухой соломой, которая прикрѣпляется помощью обручей и деревянныхъ гвоздей; наконецъ, по наполненіи зерномъ до нѣсколькихъ футовъ ниже поверхности земли, прикрываются крѣпко связанными пучками соломы, которая притаптывается какъ можно плотнѣе, и поверхъ соломы съ поверхности земли засыпаются землей, которая утрамбовывается и на которую насыпается еще бугоръ земли въ 2—3 фут. вышины, обкладываемый дерномъ. Иногда, такіе ямы, называемыя *силосами*, оштукатуриваются внутри цементомъ, обкладываются цинковыми или оловянными листами или выкладываются хорошо обожженными кирпичомъ съ приспособленіемъ для запиранія ихъ на замокъ. Если яма вырыта въ плотномъ сухомъ грунтѣ или выложена тѣмъ же непроницаемымъ для воды животнымъ, то хлѣбное зерно, сыпавшее въ нее сухимъ (съ содержаніемъ не болѣе 12—14% влаги), сохраняется хорошо въ теченіи 5 и болѣе лѣтъ; въ противномъ же случаѣ—оно легко дѣлается затхлымъ, такъ какъ воздухъ несовершенно всасывается изъ ямы, а выходъ изъ ямы водянымъ парамъ, выделяемымъ зернами, затрудненъ, загниваетъ, поѣдается мышами, крысами, сусанками, и подмокаетъ черезъ недовольно плотныя стѣнки ямы или же черезъ ходы, сдѣланные названными животными. Кромѣ того затруднителенъ надзоръ за ямами, которыя, въ удовлетвореніе нѣкоторыхъ требованій, приходится часто устраивать далеко отъ жилищъ, и выборка изъ нихъ зерна, которое къ тому же должно быть выбрано возможности скорѣе—въ день, два, чтобы не подвергнуть его расхищенію и поврежденію. Поэтому,

^{*)} Въ Коми. «Работникъ» (стр. 274) стоитъ 190—200 руб.

амбары хороши въ сухихъ южныхъ мѣстностяхъ, гдѣ при большихъ количествахъ хлѣбнаго зерна и при дороговизнѣ строительнаго матеріала для возведенія амбаровъ, хлѣбъ убирается чрезвычайно сухимъ и можетъ быть сыпанъ въ такомъ состояніи сухости еще въ сухую погоду.

Амбары строятся: въ связи съ другими постройками или, что лучше, отдѣльно; различной величины, смотря по количеству зерна, для сохраненія котораго они назначаются; по-отдѣлу отъ отопляемыхъ строеній, для предупрежденія опасности отъ огня; на открытомъ для свободнаго движенія воздуха мѣстѣ; на цоколѣ съ отдушниками или на столбахъ, для того чтобы полъ амбара, въ предупрежденіе вреднаго вліянія сырости и захода мышей, находился на нѣкоторой высотѣ отъ земли. Противъ




Рис. 265.

мышей полезно столбы или весь цоколь покрыть крышкой (стр. 841—842). Внутри амбарной постройки имѣются обыкновенно отдѣленія для сыпки различныхъ зеренъ или однихъ и тѣхъ же зеренъ по частямъ, которыя могутъ быть названы вообще *закромами* и которыхъ устройствомъ различаются различные амбары. Закрома могутъ быть *постоянные* или *переносные, подвижные*. Первые могутъ быть болѣе (собственно *закрома*) или менѣе (*суськи*) глубоки. Въ болѣе глубокихъ закромахъ зерно сохраняется массами болѣе толщины, которыя почти вовсе непротриваются и изъ болѣе глубокихъ закрома труднѣе выбирать зерно. Чтобы усилить протриваніе, пропускаютъ сквозь закрома на различныхъ высотахъ, въ двухъ перекрещивающихся направленіяхъ, трехугольные желоба (рис. 265^{*)}), сколоченные изъ двухъ досокъ и оберну-

^{*)} Снизверожки хлѣбныхъ башни, въ которыхъ зерно, помощью блока *f*, поднимается, черезъ дверь *a* въ верхній этажъ и, черезъ отверстіе *d* въ полу верхняго этажа, спускается въ среднее отдѣленіе строенія, черезъ которое вкрестъ вдоль и поперекъ его, проходятъ крышеобразно поставленные деревянные желоба, отрывающіе внутри строенія доступъ воздуху черезъ трехугольные отверстія *h* (устыя желобовъ въ стѣнѣ), покрытыя металлической сѣткой для пре-

тые вершиной вверх, которые образуютъ въ массѣ зерна каналы, проводящіе воздухъ. Или, устраиваютъ закрома съ двухъ сторонъ со стѣнками въ видѣ жалюзи *), состоящими изъ досокъ, которыя, будучи врублены своими концами въ двѣ стойки подѣ угломъ въ 45° къ горизонту и параллельно между собой, оставляютъ между собой промежутки, допускающіе къ зерну воздухъ, но не допускающіе высыпки зерна изъ закрома. Для облегченія же выборки зерна у перваго изъ упомянутыхъ закрома имѣется внизу закрома, заостряющагося внизу въ видѣ воронки, задвижка (к. рис. 265); у втораго же—отверстіе (лотъ) съ задвижкой же у самаго дна закрома, въ срединѣ одной изъ сплошныхъ стѣнокъ. У обыкновеннаго же закрома съ сплошными стѣнками, дѣлаются, съ той-же цѣлю: или отверстие съ задвижкой, помещаемое у самаго дна закрома, посрединѣ одной изъ сторонъ его; или выгребной ящикъ, т. е. совсѣмъ открытый сверху или закрывающійся крышкой выступъ нижней части закрома; или одна изъ стѣнокъ закрома разборчатой, такъ что она можетъ быть постепенно закладываема снизу вверхъ, по мѣрѣ наполненія закрома зерномъ, или разбираема сверху внизъ, по мѣрѣ выборки зерна изъ закрома. Во всѣхъ этихъ закромахъ, за исключеніемъ послѣдняго, можно привести зерно въ движеніе, если открывъ нижнее отверстие, спустить или выбрать нѣсколько зерна изъ выгребнаго ящика; но въ послѣднемъ случаѣ перемѣщеніе зерна наименѣе полно, наиболѣе же полно оно въ Синклеровскихъ башняхъ (рис. 264), а затѣмъ въ закромахъ съ стѣнками въ видѣ жалюзи; въ этихъ закромахъ, особенно въ первыхъ, достаточно выпустить четверть хлѣба, которая снова возвращается въ закрома сверху, чтобы привести въ движеніе всю массу зерна, и при этомъ провѣтрить зерно токомъ воздуха, проникающаго въ отверстія и направляющагося въ противоположномъ движенію зерна направленіи. Амбары съ болѣе глубокими закромами, въ 3—5 арш. глубины, дѣлаются обыкновенно одноэтажными, если не считать за этажи нижней части въ Синклеровскихъ башняхъ и чердаковъ, которыя служатъ иногда, напр. въ Синклеровскихъ башняхъ и въ амбарахъ съ закромами въ видѣ жалюзи, для предварительной просушки зерна, и съ которыхъ зерно сыпается иногда въ закрома. Менѣе же глубоки закрома—сушны и подвижныя

гражденія доступа насквозь внутрь строенія. Въ нижней части строенія, въ которую ведутъ двери *b*, находятся воронки *i*, которыми зерно проводится изъ средняго въ нижній этажъ зданія и которыя открываются въ одну большей величины воронку *k*, закрытую задвижкой.

*) Подобно стѣламъ, въ зерносушилкѣ Севера (см. ниже). Такогой системы амбаръ имѣется на Ильинской Ек. Императорскаго Величества фермѣ, въ 25 верстахъ отъ Москвы.

закрома помѣщаются обыкновенно въ дву-или многоэтажныхъ зданіяхъ, при чемъ каждый этажъ, для удобства обращенія съ зерномъ, долженъ быть, по крайней мѣрѣ, $8\frac{1}{2}$ фут. высоты. Въ сушны зерно насыпается слоемъ не толще $1-1\frac{1}{4}$ фут., выгребается изъ сушекъ лопатами и, если нужно, приводится въ движеніе лопатами же—перелопачивается. Къ переноснымъ, подвижнымъ закромамъ мы должны отнести: приборъ Валлери, безвоздушные цилиндры Лувелла, обыкновенныя бочки, мѣшки и т. д., изъ коихъ первый весьма удобенъ для приведенія въ движеніе зерна, второй—дѣлаетъ это ненужнымъ, потому что зерно сохраняется въ цилиндрахъ, изъ которыхъ выкачивается воздухъ; а у третьихъ необходимо для этаго споражниваніе ихъ.

Приборъ Валлери представляетъ два цилиндра, изъ коихъ одинъ меньшаго діаметра помѣщенъ въ другомъ большаго діаметра, и пространство между ними раздѣлено радіальными перегородками на 8 отдѣленій. Поверхности обоихъ цилиндровъ состоятъ попеременно изъ досочекъ и проволочныхъ стѣнокъ; а на поверхности наружнаго имѣются закрывающіяся задвижками отверстія, черезъ которыя зерно можетъ всыпаться въ отдѣленія. Снаружъ утверждается на помостѣ, сдѣланномъ изъ бревенъ, и осью, приделанной къ внутреннему цилиндру съ одной стороны, лежитъ на подшипникахъ, въ которыхъ вращается помощью приделанной къ оси рукоятки; другимъ же концомъ лежитъ на трехъ каткахъ, на которыхъ онъ обращается при вращеніи; съ этого же конца его находится вентиляторъ, сообщающійся съ внутреннимъ цилиндромъ и приводящійся въ движеніе вѣстѣ съ снаридами. Достаточно $\frac{1}{4}$ часоваго вращенія, чтобы какъ нельзя лучше провѣтрить зерно, занимающее только $\frac{1}{4}$ каждаго отдѣленія. Въ снаридахъ длиной 20 ф., при втрое болѣе окружности большаго сравнительно съ окружностью малаго цилиндра и разстояніи между цилиндрами въ 3 фута, помѣщается не менѣе 100 четвертей зерна.

Синклеровскія башни, какъ они строятся въ Венгріи (рис. 265), представляютъ собственно открытые закрома, незаключенные въ стѣны амбара, покрыты лишь крышей; въ болѣе сѣверныхъ и влажныхъ мѣстностяхъ это неудобно, потому что зерно слишкомъ мало защищается отъ сырости. А потому, наипаче закрома помѣщаютъ внутри амбаровъ стѣны.

Постоянные закрома располагаются обыкновенно въ два ряда: или къ стѣнамъ длиннаго строенія амбара съ проходомъ посреди, какъ это наипаче бываетъ тогда, когда деревянныя стѣны амбара служатъ въ тоже время стѣнами закромовъ; или къ срединѣ амбара съ проходами вдоль стѣны амбара, когда у двухъ рядовъ закромовъ одна общая стѣна, какъ это встрѣчается въ амбарахъ съ каменными стѣнами, гдѣ, при помѣщеніи закромовъ у стѣнъ все же приходилось бы дѣлать особенныя деревянныя закромыя стѣны для лучшаго предохраненія зерна отъ сырости; или, наконецъ, съ проходами и по срединѣ и около стѣнъ и даже поперегъ зданія, какъ напр. при закромахъ въ видѣ жалюзи, а иногда даже, что гораздо лучше, въ влажныхъ климатахъ, и при закромахъ на подобіе Синклеровскихъ башенъ.

Подпильные разставляются въ амбарахъ рядами въ одномъ или нѣсколькихъ этажахъ, а бочки и мѣшки ставятся даже другъ на друга; или мѣшки, напр. со свекловичными сѣменами, подвѣшиваются къ балкамъ.

Амбары много выигрываютъ отъ приспособленій, освобождающихъ рабочихъ отъ встаскиванія и стаскиванія мѣшковъ съ зерномъ. Възвѣзды въ амбары и провады въ немъ рѣдко удобны, потому что увеличиваютъ стоимость строенія, требуя въ немъ большаго пространства. Лучше блоки для подъема въ амбаръ и спуска изъ амбара и особенныя тележки для перевозки мѣшковъ въ амбаръ. Въ амбарѣ же должно быть помѣщеніе для сортировокъ, зерноочистилокъ, если нужно рассортировать или перебрать зерно, и для вѣсовъ на случай надобности перевѣсить зерно. Далѣе полъ, стѣны и потолокъ амбара должны быть возможно гладкими, чтобы не дать приюта настыкомымъ; амбаръ долженъ быть удобенъ для провѣтриванія помощью достаточнаго числа оконъ, закрывающихся металлическими ставнями и ставнями, для прегражденія пути свѣту, пыли и настыкомымъ и возможной безопасности отъ огня.

Кромѣ такихъ общихъ правилъ для различныхъ зеренъ существуютъ еще спеціальныя, напр. для початковъ кукурузы, такъ называемыя въ Венгріи, *чердаки*, которые устраиваются въ столбахъ, вышиной фута на 3 отъ земли и дѣлаются шириной отъ 4 до 6 фут., вышиной 12 фут. и произвольной длины. Стѣны ихъ дѣлаются изъ рѣшетки, сдѣланной до того, чтобы между отдѣльными рѣшетинами не могли проваливаться початки. Въ такіе чердаки початки, освобожденные отъ оберточныхъ листьевъ, насыпаются подъ самый конъ крыши, нѣсколько свѣшивающейся надъ стѣнами.

Свѣжее зерно, чѣмъ менѣе оно сухо, тѣмъ болѣе тонкимъ слоемъ должно оно насыпаться въ амбары — не толще нѣсколькихъ дюймовъ; только позже можно насыпать его потоньше, слоемъ до 1 — 2 фут. Чтобы избѣжать затхлости зерна, необходимо перелачивать его, въ первое время посыпкѣ его въ амбаръ, ежедневно; позже же, можно дѣлать это, смотря по надобности, примѣрно каждыя двѣ недѣли. Во всякомъ случаѣ необходимо почаще осматривать зерно, для того, чтобы своевременнымъ перелачиваніемъ предупредить сопрѣваніе зерна и поврежденіе его вредными настыкомыми (стр. 777 и 780). Съ этой же послѣдней цѣлью, амбаръ долженъ содержаться возможно чисто: щели должны быть замазаны известкой или дегтемъ, а валяющіяся часто по угламъ кучи стараго, запыленного зерна удалены изъ амбара.

Для предупрежденія порчи нѣкоторыхъ зеренъ особенно подверженныхъ ей, напр. рапса, мака, льна и даже, хотя рѣдко, сыромолотныхъ яшенцы, ржи сохраняютъ зерна вѣстѣ съ мякиной, *) отчего зерно ложится рыхло

*) Иногда упреждаютъ даже такія свѣшанія съ мякиной (у яшера напр.), сѣмена на посѣвъ, для сохраненія труда отдѣленія отъ мякины зеренъ, особенно

и, слѣдовательно, лучше провѣтривается; но это увеличиваетъ мѣсто требуемое для сохраненія зерна, и потому принимается преимущественно у зеренъ, собираемыхъ въ хозяйствахъ въ сравнительно небольшомъ количествѣ, какъ напр. рапса, мака, льна и вообще масличныхъ, въ особенности крестоцвѣтныхъ растений (рыжика, сурьны).

Старое, болѣе сухое хлѣбное зерно, черезъ 2 мѣсяца послѣ ссыпки въ амбаръ, теряетъ $\frac{1}{2}\%$, а черезъ годъ 1% своего вѣса; зерно же свѣжее, болѣе сырое теряетъ въ тоже время втрое больше.

Въ виду такой трудности прочнаго сохраненія сыромолотнаго зерна, которое въ влажныхъ климатахъ содержитъ иногда до 30% влаги, особенно въ теченіи болѣе продолжительнаго времени, необходимо прибѣгать къ сушкѣ хлѣбнаго зерна (стр. 812) въ особыхъ *зерносушилкахъ*. Хорошая сушилка должна просушивать зерно во всей его массѣ, а не только съ поверхности, до того, чтобы оно содержало не болѣе $12-14\%$ влаги, не должна поджаривать или запаривать зерна или уничтожать въ немъ способности проростанія. Первое необходимо, для того чтобы зерно могло прочно сохраняться; второе же, — если зерно должно служить сѣменами или для приготовленія солода. Впрочемъ, важность этого послѣдняго уменьшается еще тѣмъ, что сѣмена, при небольшомъ сравнительно количествѣ ихъ, нетрудно сохранить даже непросушенными, особенно отобрать для этого лучшія, убранныя и обмолоченныя въ болѣе благоприятную погоду, слѣдовательно болѣе сухія. Излишняя просушка зерна не только бесполезна, потому что зерно снова вбираетъ излишне выдѣленную имъ влагу (стр. 692—694), но и вредна, потому что влечетъ за собой напрасную трату горючаго матеріала и времени и понижаетъ часто качество зерна; а потому, оправдывается развѣ при употребленіи просушеннаго зерна немедленно на выкоуреніе, когда весьма важно, при существующей системѣ акциза, положить въ заторный чанъ возможно большее количество дающаго спиртъ вещества (крахмала) въ данномъ вѣсѣ зерна. Далѣе, хорошая сушилка должна просушивать зерно въ возможно скорое время съ возможно малой тратой топлива и рабочихъ рукъ. Наконецъ, она должна стоять недорого и представлять возможно мало опасности отъ огня. Для сохраненія хорошихъ качествъ зерна, для достиженія быстроты сушки и сохраненія топлива, зерносушилка должна представлять зерну возможно большую поверхность соприкосновенія съ воздухомъ, возможно быстро и полно удалять изъ соприкосновенія съ зерномъ насыщенный влагой воздухъ, постепенно возвышать температуру пространства, въ которомъ находится зерно, не доводя ее выше 80°R. , возможно быстро передавать тепло, развиваемое топливомъ пространству, въ которомъ находятся

тогда когда это отдѣленіе несовсѣмъ легко; но, этотъ приемъ дуренъ, потому что не даетъ возможности, хотя съ обыкновенной точностью, опредѣлить сколько собственно сѣмянъ и какого качества высѣивается на десятину.

зерна, и самому зерну, и возможно долго сохранять тепло въ сушильнѣ.

Этимъ требованіямъ существующія и употребительныя зерносушилки удовлетворяютъ въ различной степени.

Изъ встречающихся у насъ въ хозяйствахъ зерносушилокъ, въ зерносушилку Майера (въ Маховомъ—имѣніи І. Н. Шатилова, Новосильскаго уѣзда, Тульской губ.), зерно сушится горячимъ дымомъ, который протягивается вентиляторомъ сквозь зерно на желѣзномъ ситѣ вверху сушилки, покрытой сходомъ. Эта зерносушилка представляетъ нѣкоторую опасность для зерна отъ искръ. Между остальными же зерносушилками, въ которыхъ зерно сушится нагрѣтымъ воздухомъ, можно различить такіе, въ которыхъ разъ засыпанное зерно остается до выборки его изъ зерносушилки въ покой, и такіе, въ которыхъ оно находится въ движеніи, постоянно притекая въ нѣхъ и постоянно оставляя ихъ. Первые различаются: во 1-хъ на *лежающія* (2), въ которыхъ зерно разсыпается толстымъ слоемъ (20 четвертей на 26 кв. саж.) по кафельной или кирпичной поверхности, непосредственно нагрѣваемой дымовыми оборотами печи (малороссійская зерносушилка и зерносушилка, употребляемая крестьянами Тамбовской губерніи); эти зерносушилки требуютъ помѣщанія зерна допотой отъ 4 до 5 разъ въ день, тратятъ много топлива, легко поджариваютъ зерно и медленно сушатъ; во 2-хъ, на такіхъ зерносушилкахъ, въ которыхъ зерно помѣщается въ пространствахъ нагрѣваемомъ дымовыми оборотами печи, сперва каменными, а затѣмъ желѣзными, какъ болѣе скоро отдающими тепло. У зерносушилки *Кюзеля* (3) (въ с. Сыреть, въ 15 верстахъ отъ г. Луки, Петербургской губ.), представляющей улучшение зерносушилки Майера, горячій дымъ обходитъ желѣзныя трубы, черезъ которыя притекаетъ въ сушилку нагрѣваемый этими трубами воздухъ, протягиваемый затѣмъ вентиляторомъ черезъ зерно, разсыпанное на желѣзномъ ситѣ вверху сушилки. Вентиляторъ, хотя требуетъ лошади и работника, за тоонѣспособствуетъ быстрой и равномерной просушкѣ зерна и бережетъ топливо. У зерносушилки *Сиверса* (въ Ильинской Ея Имп. Велич. фермѣ въ 25 верст. отъ Москвы) эти дымовые ходы располагаются вертикально вдоль




Рис. 266.

прохода между двумя рядами стеллажей (рис. 266), состоящихъ изъ двухъ рядовъ досокъ (s и s'), которыя врублены въ стойки (г): въ каждомъ ряду параллельно между собой и наклонно къ горизонту подъ угломъ 45°; относительно же одного ряда досокъ къ другому такъ, что соответствующія доски образуютъ расположенныя другъ надъ другомъ желоба съ нѣсколькими отверстиями внизу, за исключеніемъ нижняго желоба, у котораго это отверстие можетъ быть закрыто или открыто, смотря потому, плотно или нѣтъ придвинута нижняя доска s' къ нижней же доскѣ s. Теплый воздухъ проходить сквозь зерно, расположенное на стеллажахъ, и вытягивается по другую сторону стеллажей вытяжными трубами, открывающимися у пола и выходящими въ дымовую трубу по срединѣ сушилки. Изъ другихъ зерносушилокъ этого отряда, у которыхъ дымовые ходы располагаются горизонтально и зерно помещается надъ этими ходами, назовемъ: а) *полощилку* (употребительную напр. въ Моршанскомъ уѣздѣ, Тамбовской губ.), въ которой зерно разсыпается на нѣкоторой высотѣ надъ дымовыми ходами на изогнутой проволоочной сѣткѣ или продырявленной жести; выше этой послѣдней, находятся въ стѣ-

нахъ сушильни вытяжныя для влажнаго воздуха отверстія; зерно должно быть помѣщаемо. б) *Мышецкую* (Харьковская учебная ферма), въ которой зерно насыпается въ мѣшки, пропихивая по длинѣ и привѣшенныя къ брускамъ, концами которыхъ они загибаются за выемки въ двухъ смежныхъ балкахъ и подвѣшиваются такимъ образомъ въ сушильнѣ рядами; въ каждый мѣшокъ входятъ 1 четверть зерна; влажный воздухъ вытягивается трубами, выходящими черезъ крышу открывающимися у пола. в) *Шимковъ* (въ Спѣшевѣ—имѣніи І. Н. Шимкова, Данковского уѣзда, Рязанск. губ.), въ которой зерно насыпается на картонъ, наклеенный на рамку (на каждую рамку около 1 четверти зерна), а рамки, въ числѣ 176—216, размѣщаются въ 9—11 рядахъ, снизу вверхъ; зерно просушивается теплымъ воздухомъ, проходящимъ между рамами снизу вверхъ и вытягиваемымъ выходящими черезъ крышу вытяжными трубами, открывающимися у пола зерносушилки. Изъ зерносушилокъ, въ которыхъ зерно во время сушки находится въ движеніи, назовемъ: а) *Геккера* (въ Песочномъ—имѣніи А. И. Кошелева ?) Сапожковскаго уѣзда Рязанской губ.), въ которой зерно въ направленіи противоположномъ току теплаго воздуха, вгоняемаго вентиляторомъ, падаетъ сперва между двумя вложенными одинъ въ другой, продырявленными и обращенными основаніями внизъ конусами, затѣмъ между двумя сплошными, обращенными основаніями вверхъ конусами и, наконецъ, двигается въ трубѣ помощью архимедова винта. б) *Карповича* (въ Алексѣевскомъ, имѣніи г. Славина, подъ Харьковомъ), въ которой зерно перебрасывается вращающимися въ цилиндрѣ лопатками. в) *Эсмарха* *) (въ имѣніи графа А. П. Бобринскаго, подъ Богородскомъ, Тульской губ.), въ которой зерно двигается по спирали отъ середины круглой металлической рѣшетки къ окружности ея, помощію вращающагося гребля особеннаго устройства. Наконецъ, г) переносная *Аккермана* (на Уиковской фермѣ А. Н. Голякина близъ Москвы и с. Рыбушки.—К. А. Равинскаго, Кокотояскаго уѣзда, Черниговск. губ.), въ которой зерно пересыпается съ лопочки на лопочку, въ противоположномъ движенію теплаго воздуха направленіи.

Для сушки малыхъ количествъ зерна можно указать на сушилки: мѣшечную, Шимкова, холотняную, Сиверса и Аккермана; для сушки большихъ количествъ, какъ напр., при винокуренныхъ заводахъ, на сушилки: Карповича, Эсмарха и Аккермана же. Для сравнительной оцѣнки этихъ зерносушилокъ

*) Эсмархъ, впрочемъ, въ последнее время предлагаетъ новую зерносушилку, о которой нѣтъ пока еще отзывовъ испытывавшихъ ее въ дѣйствицѣ, на которую можно видѣть въ дѣйствицѣ въ Соб., Коломенск. части, на углу Пяржи и Перевозочн. ул., № 8, балка Сухаряго моста. Она напоминаетъ зерносушилку Геккера, такъ какъ зерно въ ней падаетъ тонкими слоями между парами рѣшетчатыхъ стѣнокъ, которые, образуя родъ трубъ, закрываются внизу помощію общей, движущейся задвижки; скорость движенія—зависитъ отъ открытій задвижки, а следовательно и прохода зерна черезъ трубы, можетъ измѣняться по произволу. Эти трубы помѣщаются въ камеру, которая обогревается вгоняемымъ въ нее, помощію вентилятора, нагрѣтымъ до 70—75° Р., воздухомъ; воздухъ же, насыщенный водяными парами, вытягивается колыбчатой вытяжной трубой въ потолокъ камеры. Зерносушилки въ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, трубы (съ поверхностью въ 8 кв. фут. каждая), сушащія въ часъ: 36, 72, 108, 144, 180, 216 и 255 пуд. зерна, всасать: 70, 120, 180, 240, 300, 340 и 380 пуд., стоятъ въ Спб.: 575, 1100, 1650, 2200, 2750, 3300 и 3850 руб. и употребляютъ 1 куб. саж. сосныя дрова для испаренія 5% влаги изъ 6000 или 10% изъ 3000 пуд. зерна. (Жизн. Работы, стр. 274).

еще морозы, и возможно полную защиту от морозов впоследствии. Для этого служат вытяжные трубы через крышу (из погребов), отдушины в выдающейся из земли части стѣны (у подвалов) и въѣзды и въѣзды двери (въ подвалах, погребах и лабазах), которые, по мнѣнію надобности въ провѣтриваніи и при наступленіи необходимости защитить помѣщеніе отъ морозовъ, плотно закрываются дурными проводниками тепла: вытяжныя трубы — соломою; отдушины — втулками съ прикрѣпленіемъ, затѣмъ листьями; двери лучше всего дѣлаются двойными съ возможно большимъ промежуткомъ между ними, который у дверей, ненужныхъ для пользованія въ данное время, можетъ быть наполняеъ соломой, листьями и т. д. Корни и клубни наилучше защищаются отъ мороза въ погребахъ, наихуже въ лабазахъ, а потому въ послѣднихъ сохраняются изъ нихъ лишь предназначенныя для болѣе ранняго употребленія. Въ 3-хъ, были достаточно высоки и просторны для того, чтобы можно было проѣхать или по крайней мѣрѣ пройти по нимъ, ненужно было насыпать корней высоко и можно было бы перемѣщать ихъ съ мѣста на мѣсто, если нужно. Погреба и подвалы дѣлаются иногда съ закромами: весьма хороши, если позволяютъ мѣсто, раздѣленные проходами, закромы съ рѣшетчатыми стѣнами и поломъ.

Въ названныхъ помѣщеніяхъ, особенно погреба и подвалы корни и клубни должны поступать по возможности сухими, обсохшими (стр. 775, 835), къ тому же когда въ этихъ помѣщеніяхъ уже станетъ нѣсколько прохладнѣе. Клубни картофеля, да и корни, при ссыпѣ ихъ на сохраненіе, должны быть тщательно перебраны для удаленія изъ нихъ больныхъ, поврежденныхъ и почему либо негодныхъ (стр. 775); картофель не долженъ вообще насыпаться въ подвалы слишкомъ толстыми слоями (толще 3 фут.), а тѣмъ болѣе, пока онъ отдѣляется изъ себя много влаги (потѣетъ). Корни могутъ насыпаться и толще до 7—8 фут., а въ лабазахъ, изъ которыхъ они поступаютъ раньше въ употребленіе, даже до 12—15 ф. До наступленія холодовъ необходимо хорошо провѣтривать мѣста сохраненія корней и клубней. Картофель, въ случаѣ сильнаго отпотѣванія, сырости, долженъ быть переселенъ въ сухое; съ цѣлью предохраненія его отъ увлажненія, совѣтуютъ прикрывать его, по ссыпкѣ въ подвалъ, соломой, замѣняя ее повои, сухой, каждый разъ, какъ она окажется мокрой отъ выпотѣвающей картофелемъ влаги. Болѣе легки портящіеся корни, какъ-то: морковь, брюкву и клубни картофеля удаляютъ, по возможности, отъ сырыхъ стѣнъ и насыпаютъ иногда не прямо на сырой, земляной, а на рѣшетчатый полъ (см. выше рѣшетчатые закрома), устраиваемый на нѣкоторой высотѣ отъ землянаго пола; или насыпаютъ не толстыми слоями на рѣшетки, размѣщенные въ нѣсколько рядовъ одна надъ другой; небольшія количества болѣе цѣнныхъ корней (высадокъ напр.) и клубней сохраняютъ пересыпанными сухимъ пескомъ.

Въ ямахъ, которыя роются глубиной до 57 футовъ въ сухой почвѣ, и, по наполненіи преимущественно клубнями, закладываются соломой, досками и засыпаются землей, клубни и корни сохраняются хуже, чѣмъ въ надземныхъ или только нѣсколько углубляющихся въ землю кучахъ, потому что въ пер-

вомъ случаѣ легче согрѣваются и гниютъ. Кучи насыпаютъ поверхъ земли или въ вырытыя въ землю канавы (глубиной 2½—3 фута, шириной внизу 1 футъ и вверху въ ширину кучи), такъ чтобы поверхъ земли они имѣли видъ четырехъскатной крыши 2½—3 фут. вышины отъ поверхности земли до коня. При этомъ, клубни какъ и корни складываются въ беспорядкѣ, но послѣдній, верхній слой у сахарной свекловичной кучи кладется головками вверхъ, для того чтобы, образовавшемъ возможно ровной поверхности, предупредить поврежденіе корней лопатой при вскрытіи кучи. Ширина кучи зависитъ, главнымъ образомъ, отъ свойства корней или клубней сыпавшихся въ кучу. Чѣмъ болѣе они, напр. картофель, въ особенности, сѣменной или преждевременно убранный, слѣдовательно недозрѣвшій, содержащій много воды, могутъ пострадать отъ гніенія и проростанія, тѣмъ ниже и уже (отъ 4 до 6 фут.) должна быть куча, чтобы болѣе ослабить согрѣваніе. Свекла, картофель, которые должны быть вскрыты скорѣе кормленъ скоту или переработаны па заводѣ, могутъ складываться въ кучи шириной отъ 6 до 8 фут. Длина кучи (отъ 10 до 100 фут.) зависитъ отъ количества клубней и корней и пространства, которыми можно располагать для устройства кучъ. Чѣмъ длиннѣе куча, тѣмъ лучше, потому что длинныя кучи легче устраиваются и легче разбираются чѣмъ короткія или круглыя; у нихъ менѣе поверхности и, слѣдовательно, они требуютъ менѣе матеріала для накрышкы и представляютъ меньшую возможность обваловъ, сползанія земли и промерзанія кучъ. Углубленіе кучи въ землю, если только при мелкой почвѣ нѣтъ опасности отъ грунтовой воды, дѣлаетъ кучу болѣе прочной и доставляетъ землю для прикрѣпленія кучи, по за то, въ особенности при большой значительности его, способствуетъ скорѣе согрѣванію сложенныхъ въ кучу корней и клубней. Въ кучи корни должны складываться по возможности тотчасъ же по вынутіи ихъ изъ земли, чтобы они, такъ сказать, попадали *изъ земли въ землю*, т. е. засыпались землей въ кучахъ прежде, нежели вынутые изъ земли успѣютъ завянуть.

Корни и клубни, сложенные въ кучу, для защиты ихъ отъ сырости и мороза, покрываются одной землей, одной соломой или тѣмъ и другимъ вмѣстѣ. Одной, особенно болѣе связной землей прикрываются преимущественно корни свекловичныя. Сначала, чтобы по возможности облегчить испареніе влаги изъ корней, свеклы, которая складывается въ кучи довольно рано, въ концѣ сентября до половинъ октября, прикрывается землей не толще 1 фута, къ тому же только съ боковъ; въ верхушкѣ же прикрывается по всей длинѣ соломой для защиты отъ дождя и свѣта; если же она прикрывается (у свеклы) и тѣмъ землей, то лишь на столько, на сколько эта поспѣвшая задерживается на верхушкѣ призабрашиваніи ею боковъ кучи. Затѣмъ, земляная накрышка, доводится до верха, если этого не было слѣлапо сейчасъ же, и постепенно утолщается, по мѣрѣ усиленія холодовъ и въ зависимости отъ времени употребленія свекловичны въ дѣло и отъ связности употребляемой для прикрѣпленія кучи земли. Такъ, у кучъ, изъ которыхъ свекла должна быть употреблена въ дѣло до новаго еще года, земляная накрышка утолщается въ ноябрѣ, когда усиливаются морозы, еще на футъ, примѣрно, а у тѣхъ, изъ которыхъ предстоитъ употребленіе свекловичны послѣ новаго года, земляная накрышка доводится въ декабрѣ, до полной толщины въ 2½—3 фута, если земля неслишкомъ песчаниста; въ противномъ случаѣ и болѣе. Во всякомъ случаѣ прикрѣпленіе землей оканчивается до выпаденія сильнаго свѣта, при чемъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что накрытіе кучи свѣгомъ, дурнымъ проводникомъ тепла, значительно предохраняетъ ее отъ промерзанія. Иногда, подъ земляную накрышку прикрываютъ корни соломой, для того чтобы земля не могла попасть внутрь кучи или, для лучшаго испаренія влаги, дѣлаютъ въ накрышкѣ кучи по коню (чрезъ каждыя 6 фут.) отверстія—отдушины, сообщающіяся съ канавомъ вдоль коня подъ соломенной накрышкой или же съ продольнымъ

каналомъ въ основаніи кучи. Этотъ послѣдній каналъ, открывающійся наружу съ обѣихъ узкихъ сторонъ кучи, образуется или двумя крышеобразно составленными хлѣбницами (рѣшетками) съ столь частыми перекладинами, чтобы въ промежутки между ними не могли проваливаться клубни, или, какъ въ нашихъ хозяйствахъ, воздвигнувшихъ свекловичу, настилкой поперегъ канавы на высотѣ, примѣрно 1½ фута, отъ дна ея, подбивку, которыми концами вкладуются на бревна, положенныя вдоль канавы, скрывающей основаніе кучи. Канавы роются въ этомъ случаѣ нѣсколько глубже, чѣмъ было указано выше. Но, въ послѣднее время стали избѣгать какъ одного, такъ и другого, потому что соломенная покрывка способствуетъ слишкомъ согрѣванію корней, а въ отдушинахъ, съ наступленіемъ холодовъ сгущаются водяные пары въ капельножидкое состояніе, и, увлажняя такимъ образомъ солому, корни или клубни, способствуютъ гніенію соломы, корней или клубней, развитію вслѣдствіе этого, вредной теплоты и распространенію въ картофелѣ мокрой гнили.

За то, сложенные въ кучу корни свекловичны покрываютъ иногда одной лишь соломой, если желаютъ защитить ихъ нѣсколько отъ замерзанія, сколько отъ увлажненія, согрѣванія и оттаиванія, если они замерзнутъ. Для этого употребляютъ лучше всего длинную сноповую солому, которой покрываютъ кучу сначала не толще 10 дюйм.; а затѣмъ, по мѣрѣ усиленія опасности отъ мороза, увеличиваютъ соломенную покрывку до 3½ фута, пока не наступятъ постоянные морозы и не минуетъ, слѣдовательно, опасность того, чтобы разъ замерзшіе корни могли снова оттаять. Солома приставляется къ кучѣ съ боковъ стоймя и придерживается жердями, которые прикладываются также стоймя; но на концы кучи не вкладываютъ жердей, такъ какъ образующійся отъ этого на вершинѣ соломенной покрывки желобокъ способствуетъ затѣканію воды въ кучу. Въ случаѣ наступленія теплой и хорошей погоды, солому раздвигаютъ мѣстами или принимаютъ даже совсѣмъ прочь, что значительно облегчается удобопримѣнимостью длинной сноповой соломы, для того чтобы открыть воздуху доступъ къ кучѣ и тѣмъ облегчить испареніе изъ нея воды и ея охлажденіе; а, затѣмъ, когда нужно, снова покрываютъ ее.

Картофель же, большей частью прикрывается сперва соломой, лучше всего ржаной, которая въ вертикальномъ положеніи, корневыми концами внизъ, а колосьями вверхъ, настилается на кучу въ одинъ рядъ, а если этого мало, то и въ два ряда. Затѣмъ, если картофель довольно сухъ, то куча тотчасъ же засыпается по соломѣ землей, слоемъ не толще ½ фута, до ¾ или даже * всей высоты кучи; верхъ же кучи—конъ остается до наступленія морозовъ непокрытымъ землей, но, прикрытый по длинѣ слегка соломой, прикрывается доской, которая будучи положена на поперечные бруски, защищаетъ кучу отъ затѣка въ нее воды, но, не прилегая плотно къ ея вершинѣ, не задерживаетъ испаренія изъ нея влаги. Это послѣднее тѣмъ важнѣе, чѣмъ влажнѣе картофель, такъ что, въ случаѣ большой влажности картофеля, хорошо даже въ началѣ покрыть всю кучу одной лишь соломой, если бы въ этомъ послѣднемъ случаѣ вся соломенная покрывка, а въ первомъ—соломенная покрывка коня, оказалась, ко времени покрытія кучи землей, мокрой, то необходимо замѣнить какъ ту такъ и другую новой, сухой соломой. Затѣмъ, съ приближеніемъ холодовъ, куча покрывается сперва до верха землей, а потомъ, по мѣрѣ усиленія холодовъ, утолщается вообще земляная покрывка и доводится до 1—2 ф. толщины, смотря по глѣбинѣ соломенной покрывки и свойству почвы: толще при меньшей толщинѣ первой и меньшей вязкости послѣдней, и тоньше въ противоположномъ случаѣ. Картофель, во время сохраненія его, постоянно выделяетъ небольшое количество углекислоты, при чемъ, конечно, развивается теплота; особенно же это усиливает-

ся при проростаніи картофеля, а потому, если онъ преждевременно прикрывается толстымъ землянымъ слоемъ, то онъ весьма легко согрѣвается, и усиливаете, вслѣдствіе этого, испаряетъ влагу. Въ время же куча можетъ быть прикрыта значительно толще землей; и чѣмъ толще земляная покрывка, тѣмъ лучше предохраняется она кучу отъ прониканія въ нее воздуха и теплоты, а картофель, слѣдовательно, отъ проростанія. Иногда, прикрываютъ картофельныя кучи въ перемежку соломой съ землей: сперва, напр. слоемъ соломы въ 2—3 дюйма толщины, затѣмъ слоемъ земли, который доводится постепенно до 6 дюймовъ толщины, снова слоемъ соломы и, наконецъ, снова слоемъ земли въ 6—8 дюймовъ толщины.

Для предотвращенія затѣка воды въ кучи, окружаютъ ихъ каналкой; а въ случаѣ сильныхъ холодовъ, кучи, прикрытыя одной землей (свекловична) или соломой и землей (картофель), по болѣе песчанистыхъ свойствахъ, покрываются иногда, въ особенности со стороны, наиболѣе подвергающейся вѣтрамъ, еще дурными проводниками теплоты, какъ-то: хлѣбнымъ навозомъ, тростникомъ, листьями, ботвой, пыреемъ и др., смотря потому, что дешевле. Земля для засыпки кучъ, если бы куча устраивалась поверхъ земли, берется вокругъ этой послѣдней, на равномъ со всѣхъ сторонъ разстояніи отъ кучи, болѣе или менѣе, смотря по давленію, которое производятъ куча на землю, и связности земли. Кучи складываются лучше всего ближе къ мѣсту потребленія, если только есть свободное пространство и если можно располагать переносными средствами въ осеннее время; въ противномъ случаѣ—при полевой дорогѣ, ближайшей къ мѣсту произрастанія растенія, но не на самомъ полѣ, дабы имѣть свободный подъѣздъ къ кучамъ во всякое время. Въ первомъ случаѣ облегчается надзоръ и осматриваніе ихъ. Во всякомъ же случаѣ кучи складываются на сухомъ мѣстѣ, на которомъ онѣ не страдаютъ бы отъ сырости, особенно если онѣ одной своей частью опускаются въ землю.

Кучи должны быть осматриваемы отъ времени до времени; при чемъ, если бы мѣстами сошла земляная покрывка или же въ ней показались трещины, необходимо оправить ее или задылатъ трещины. Если бы же при этомъ (при изслѣдованіи особымъ термометромъ) было замѣчено согрѣваніе корней или клубней, то необходимо даже полегчить или же, въ случаѣ теплой погоды, совсѣмъ снять поверхностную покрывку, съ тѣмъ чтобы, при новомъ усиленіи холодовъ, возстановить ее. Наконецъ, если бы корни начали подвергаться порчѣ или гніенію, необходимо переложить кучу, если позволяетъ погода, или употребить ихъ скорѣе въ дѣло, если переладка невозможна уже болѣе.

Сохраненіе корней и клубней въ кучахъ, при всей своей простотѣ, представляетъ, однако, то большое неудобство, что, при затруднительности раскрывать замерзлый земляной покровъ, дѣлаетъ невозможнымъ брать изъ кучи корни или клубни ежедневно, какъ это удобно можетъ дѣлаться изъ подваловъ, погребовъ; брать же изъ кучи заразъ большое количество ихъ возможно лишь въ томъ случаѣ, если вблизи помѣщенія скота, которому скармливаются корни, или даже подъ одной крышей съ нимъ имѣется достаточное для такого количества мѣсто, защищенное отъ вѣтряныхъ неблагоприятныхъ вліяній.

Некоторые корни, напр. рбы, по предварительной очистке их от земли, спекловидных головки, и т. д. могут быть сквашиваемы вместе с листьями, подобно тому как сквашиваются одни листья (стр. 799, 836) в ямах, которые, у нас, лучше всего устраивать под легкими навозами, так чтобы доступ к ним мог быть всегда свободен от сибки. Несколько иначе сквашивается картофель, при возделывании его в значительном количестве для корма; промыв его в промывальном барабане, (рис. 41 ч. II), расквашивают в чану паром, затем рассыпают по каменному полу и, на некотором охлаждении, раздавливают его; и, наконец, раздавленную массу, когда она совершенно охладится, набивают послойно, с пересыпкой, если можно, солью, как можно плотнее в яму под навозом и прикрывают слоем земли в 8 1/2 фута толщины. Этим способом картофель сохраняется весьма долго (в течение года) и прочно, и потому имеет особенное значение при сильном развитии мокрой гнили, опустошающей картофельные погреба и кучи.

Растения, возделываемые нами для корней большей частью растения двулетние (стр. 689), которых семена получают на стеблях, вырастающем из сохраненного в течение зимы корня, если его высадить на следующую весну в землю. Такие высаженные в землю корни, с целью получения семян, называются *высадками*. Для высадок должны быть отобраны лучшие корни самых лучших в поле растений. Отобранные корни возможно тщательно сохраняются в течение зимы (см. выше) в погребах, подвалах, в кучах (напр. у свекловицы) или даже оставляются в земле (напр. у рбы, пастернака) с засыпкой их землей. Затем, с наступлением весны (у нас в апреле, май, июнь) высаживаются на соответствующем, лучше всего защищенном от ветров, солнечном месте, в хорошо, главным образом, глубоко обработанную почву с старой силой или свежее удобренную по только минеральными, а не азотистыми веществами или хлорным навозом, в квадратом или треугольником (стр. 749), на известном расстоянии друг от друга: 2 — 3 фута у свекловицы, рбы, брюквы, козыраби, капуста и 1 1/4—1 1/2 фута у моркови, пастернака. Даже, промотыживаются промежутки между растениями, пока эти последние не могут быть повреждены, образуют боковые, более слабые, производящие неравномерные семена побегов, а остальные укорачивают (напр. у сахарной свекловицы), для того чтобы достигнуть выравненности семян; привязывают, при небольшом числе высадок, семенопосные побеги к вбиваемым под каждый растением колышкам. Наконец, когда наступает зрелость семян (у рбы, брюквы, козыраби, капуста — в июле, у моркови и пастернака — в августе, у свеклы в сентябре) собирают семена; для чего срывают семенопосные побеги, просушивают их в развешиваемых на полках спонках (свекловица) или в подвешиваемых под

крышей пучках (морковь, рба), обмолачивают цынами на разостланных веретях (свекловица, рба), или обмолачивают стеллирами, или протирают их между руками (морковь) и полученный семя отбрасывают и сохраняют как и другие. С одного семенного растения свекловицы получается до 1/2, рбы до 1/4 и моркови до 1/6 фута. Десятина свекловичных высадок дает от 35 до 50 пуд. семян.

Уход за луговыми растениями (лугами).

Часть земли, занятая постоянно травяными растениями, никогда не перепашивающаяся или перепашивающаяся лишь в редкие исключения и то через значительные и неодинаково продолжительные промежутки времени, в отличие от лугового и выгонного полевых кленов (стр. 510—511), называется *лугом* или *выгоном*, смотря потому, скшиваются или стреливаются скоту произрастающие на ней травы. Впрочем, от времени до времени трава стреливается и на лугах. Все, что будет говориться ниже о лугах, будет относиться и к выгонам с исключениями, которые будут оговорены в надлежащих местах.

Качество луга (выгона) определяется *качеством* и *количеством* доставляемого им продукта *свежей травы, сена, отавы* (травы второго укоса). *Качество* (ч. II, стр. 282—298) и *количество* травы (сена) зависят:

Во 1-х, от *рода произрастающих на лугу растений*, между которыми различают, главным образом: *злаковые* растения (из сем. злаковых), которые, развиваясь в земле, преимущественно в верхнем почвенном слое свои подземные стебли (корневища), а из назушных почку (стр. 697) этих последних — выходящие на поверхность земли побегов, образуют *дерн* (дернину); *бобовые* растения (из сем. мотыльковых) и растения *из других семейств*.

В нижеследующей таблице перечислены главнейшие луговые и выгонные растения из этих трех групп, с присовокуплением различных данных, необходимых для изложения этого отдела. (См. стр. 864, 865, 866 и 867.)

Не все, однако, из поименованных в таблице растений одинаково удовлетворяют требованиям, предъявляемым к хорошему корму (ч. II, стр. 286—287). Наибольшее количество травы дают злаковые растения, которые произрастают густо и которые все (дают вьющее сено); меньшее — бобовые, и наименьшее — растения из других семейств. Вообще же, мало травы дают: *низкорослые* растения (напр., *гребенчатый обыкновенный, люцерна хмелевидная, василек луговой*), *блудный листьями* растения (напр., *доппик — Melilotus* из сем. мотыльковых, *полынь* из сложноцветных или *морковь* из зонтичных) и *стелющиеся по земле* или с *прилегающими к земле листьями* растения (напр., *блудный клевер*, по-

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ.	Долговечность.	Время цветения.	Время созревания.	Высота, которой достигают растения; выходящая — выше (в) и ниже (в) 3 футах.	Сколько растений приходится на 1 кв. дюйм.	Примерный десятины в			
						Семья.	Семейной союзы.	Травы, убранные в паству.	
I. Из семейства злаковых (Gramineae).									
а) лучшие травы.									
1 Аржанец, тимфеева трава (Phleum pratense).....	мн.*	VI—VIII	VIII—IX	с.	5	17	202	3163	
2 Аржанец Бомеров (Ph. Boehmeri)...	мн.	VI	VIII	с.	—	—	—	—	
3 Батлачик луговой (Alopecurus pratensis).....	мн.*	V—VIII	VI—IX	с.	0,5	18	72	1582	
4 Гребенчик обыкновенный (Cynosurus cristatus).....	мн.	VI—VII	VII—VIII	н.	4	16	83	459	
5 Ежа обыкновен. (Dactylis glomerata).....	мн.	VI—VIII	VIII—IX	с.	1	10	60	2093	
6 Мятлик луговой (Poa pratensis).....	мн.*	VI—VIII	VII—VIII	с.	—	15	98	706	
7 " обыкновенный (P. trivialis).....	мн.*	VI—VII	VII—VIII	с.	7	—	—	552	
8 Овес луговой (Avena pratensis).....	мн.*	VI—VII	VII—VIII	н.	—	—	—	511	
9 Овсяница луговая (Festuca pratensis).....	мн.*	VI—VIII	VII—IX	с.	0,6	21	104	1021	
10 Плевель многолетний (Lolium perenne).....	мн.*	VI—IX	VII—IX	н.	3	30	114	587	
11 " итальянский (L. italicum)...	мн.*	V—IX	VII—X	с.	—	35	195	685	
12 Пшеница пырей (Triticum repens).....	мн.	VI—VII	VIII—IX	с.	—	—	—	—	
13 Пашечник высокий (Arrhenatherum elatius).....	мн.*	VI—VII	VII—VIII	с.	0,2	10	161	1276	
14 Ячмень луговой (Hordeum pratense)...	мн.	V—VI	—	н.	—	—	—	—	
б) посредственные:									
15 Борь развесистый (Miliun effusum)...	мн.	V—VI	VII	с.	—	—	—	—	
16 Бухарник перистый (Holcus lanatus).....	мн.*	VI—VII	VII—VIII	с.	—	—	—	1429	
17 Желтоцветельник пахучий колосок (Anthoxanthum odoratum).....	мн.	V—IX	VI—X	н.	5	—	—	587	
18 Канарейник тростниковый (Phalaris arundinacea).....	мн.*	VI—VIII	VII—IX	с.	—	—	—	2042	
19 Костер луговой (Bromus pratensis)...	од.	VI	—	с.	—	—	—	—	
20 " мягкий (Br. mollis).....	мн.*	V—VI	VI—VII	с.	—	—	—	816	
21 Лучовик щучка (Aira caespitosa).....	мн.	VI—VIII	VII—IX	с.	—	—	—	766	
22 " изогнутый (A. flexuosa)...	мн.	VI—VIII	VII—IX	с.	—	—	—	766	
23 Манник обыкновенный (Glyceria hians).....	мн.*	V—VIII	VII—IX	с.	—	—	—	1021	
24 Мятлик однолетний (Poa annua).....	од.	VII—VIII	время в осле.	с.	—	—	—	—	
25 " лисий (P. nemoralis).....	мн.	VI	—	с.	—	—	—	731	
26 Овес желтый (Avena flavescens)...	мн.*	VI—IX	VI—IX	н.	—	18	101	658	
27 " залый (Av. pubescens).....	мн.	V—VI	VI—VII	с.	—	—	—	1174	
28 Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea).....	мн.	VI—VII	VII—VIII	с.	0,6	38	215	3829	
29 Овсяница овечья (Festuca ovina).....	мн.*	VI	VII	н.	—	54	68	408	
30 " красная (F. rubra).....	мн.	VI—VII	VII—VIII	н.	—	—	—	766	
31 Полевница обыкновен. (Agrostis alba).....	мн.	V—VII	VII—IX	н.	—	—	—	—	
32 " ползучая (A. stolonifera)...	мн.*	VI—VII	VIII—IX	н.	13	16	156	1327	
33 Трасука средняя (Briza media).....	мн.	VI—VII	VII—VIII	н.	—	—	—	715	

урожаи с пудами.														Какой почвы требует растение.			
Сена из сена.	Отавы — травы.	Раст. четвертая сена в футах.	Число тысяч зерен в футах.	Позднее или ранее по сему развито растение.	Для какого употреблен годичное растение.					На какой почве лучше всего произрастает.		Какая почва еще сносима.		Сколько фунтов сена нужно для чистого обсемена десятины.			
					Для покоса.	Для настобна.	Для лошадей.	Для крупного домашнего скота.	Для овец.	Зеленой.	Орешковой.	Исорошковой.					
1302	715	29—35	902	нз.	1	1	1	1	1	—	1	1	св. п.л. с. чр.	сх. и.ч.ч. всякую	20		
—	—	—	—	нз.	1	1	1	1	1	—	—	1	сх. п.л. с. чр.	—	—		
459	613	9—10	419	оч. рн.	1	1	1	1	1	—	1	1	св. п.л. с.	тр.	62—68		
138	255	24	586	нз.	—	1	1	1	1	—	1	1	сх. п.л. с.	св. в.л. тр. нз.	65		
889	893	13	356	рн.	1	1	1	1	1	—	1	1	св. п.л. п.л. с. с. ч. нз.	всякую	104		
215	306	10—12	1545	оч. рн.	1	1	1	1	1	—	1	1	св. п.л. с.	всякую	52		
169	357	12—13	1816	рн.	1	—	1	—	—	—	1	1	св. в.л. п.л. с.	св. в.л. всякую	52		
140	—	—	96	нз.	—	1	1	—	—	—	1	1	сх. нз.	сх. нз.	78		
485	—	14—15	217	нз.	1	1	1	1	—	—	1	1	св. в.л. п.л. с.	сх. с.	130		
284	253	13—16	201	рн.	1	1	1	1	1	—	1	1	св. п.л. с.	св. в.л. всякую	130		
339	—	13—16	236	рн.	1	1	1	1	1	—	1	1	св. п.л. с.	сх. всякую	130		
455	—	—	60	нз.	1	1	1	1	1	—	1	1	сх. св. п.л. с. чр.	сх. нз.	156		
479	1021	10	132	рн.	1	1	1	1	1	—	1	1	св. уд. с.	всякую (п.л.)	260		
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	св. п.л. с.	в.л. нз.	—		
—	—	—	674	нз.	—	1	—	1	—	—	—	—	св. в.л.	сх.	—		
465	511	5—7	1078	нз.	1	1	1	—	—	—	1	1	св. в.л. п.л.	в.л. в.л. всякую	52		
158	—	9	686	оч. рн.	1	1	1	1	1	—	1	1	нз. тр.	всякую	104		
919	—	—	521	нз.	1	—	1	—	—	1	1	1	ср. п.л.	ср. с. с.	—		
—	—	—	—	нз.	1	—	1	1	—	—	1	1	в.л. п.л.	сх. с. с.	—		
408	—	10—13	113	рн.	1	1	1	1	—	—	1	1	св. в.л. с.	сх. нз. нз.	156		
249	—	11	1114	нз.	1	1	1	1	—	—	1	1	сх.	всякой	—		
249	204	—	723	нз.	—	1	—	—	1	—	—	1	св. нз.	сх. с.	78		
306	—	—	144	нз.	1	1	1	1	—	1	1	1	в.л. нз.	всякую	—		
—	—	—	1414	рн.	—	1	—	—	1	—	1	1	сх. в.л. п.л.	тр.	—		
311	—	12	1793	рн.	1	—	1	1	1	—	1	1	св. с.л. с.л. с.л. нз.	—	260		
214	306	6—7	1059	нз.	1	1	1	1	1	—	1	1	св. с.л. с.л. нз.	сх. с.л. п.л.	78		
436	511	—	113	рн.	—	1	1	—	—	—	1	1	св. тр.	сх. с.	78		
1340	1174	11	179	нз.	1	—	1	—	—	—	1	—	в.л. п.л.	всякую	130		
—	255	10—12	833	рн.	—	1	—	—	1	—	1	—	сх. п.л. нз. с.л. нз.	тр.	78		
325	255	10—11	360	рн.	1	1	—	—	1	—	1	—	сх. с.	сх. всякую	104		
247	—	13	3620	нз.	1	1	—	—	1	1	1	1	в.л. чр. с.	сх. нз.	25		
581	204	13	5241	нз.	—	1	1	1	1	1	—	—	св. в.л. чр. тр.	в.л. всякую	25		
233	613	—	811	рн.	1	1	1	1	1	—	1	1	св. чр. с.л. нз.	сх. св. всякую	—		

II. Из сем. мотыльков. (Papilionaceae).									
а) лучшие травы.									
34	Горошек мышиный (Vicia sativa)...	мн.	VI—VIII	IX	с.	—	—	816	
35	Клевер луговой (красный, Trifolium pratense)...	мн.*?	VI—VII	VIII—IX	с.	1,9	—	3675	
36	Клевер шведский (Tr. hybridum)...	мн.*?	VI—VII	VIII—IX	с.	—	—	—	
37	белый (Tr. repens).....	мн.*	VI—VII	VIII—IX	н.	5	—	—	
38	Люцерна обыкновенная (Medicago sativa)...	мн.*	VI—VII	VIII—IX	с.	—	—	—	
39	хмелевидная (M. lupulina)...	од.	VI—IX	VIII—IX	с.	—	—	1021	
40	Лядвенец рогатый (Lotus corniculatus)...	мн.	Y—IX	VII	с.	—	—	766	
41	Чина луговая (Lathyrus pratensis)...	мн.	VI—VIII	VIII	с.	—	—	1838	
42	Эспарцет обыкновенный (Hedysarum onobrychis).....	мн.*	VI—VII	VIII	с.	—	—	511	
б) посредственные.									
43	Горошек заборный (Vicia sepium)...	мн.	Y—VII	VI	с.	0,2	—	1327	
44	Клевер средний (Trifolium medium)...	мн.	VI—VII	IX	с.	—	—	1582	
45	землистый (Tr. fragiferum)...	мн.	VI—VII	—	н.	—	—	—	
46	горный (Tr. montanum).....	мн.*	VI—IX	—	н.	—	—	—	
47	желтый (пашенный, Tr. agrarium).....	мн.	VI—VIII	—	н.	—	—	—	
48	стелющийся (Tr. procumbens)...	од.	VI—VIII	—	н.	—	—	—	
49	Люцерна песчаная (Medicago intermedia).....	мн.	VI—VIII	—	с.	—	23	—	
50	Люцерна пилекая (Medicago falcata)...	мн.	VII—VIII	—	н.	—	—	—	
51	Лядвенец обыкновенный (Anthyllus vulneraria).....	мн.	V—VII	—	н.	—	—	—	
III. Из других семейств.									
а) лучшие травы.									
52	Кровохлеба лекарственная (Sanguisorba officinalis).....	мн.	VI—VII	—	с.	—	—	—	
53	Козлобородник луговой (Tragopogon pratensis).....	мн.	VI—VII	—	с.	—	—	—	
54	Попутник lanceолистный (Plantago lanceolata).....	мн.	Y—VII	—	с.	—	—	—	
55	Тмин обыкновенный (Carum Carvi)...	дв.	VI	—	с.	—	—	—	
56	Черноголовник кровохлебный (Potentilla Sanguisorba).....	мн.	VI—VII	—	с.	—	—	—	
б) посредственные.									
57	Бедренец каменоломка (Pimpinella saxifraga).....	мн.	VI—VIII	—	с.	—	—	—	
58	Борщевик обыкновенный (Heraclium sphondylium).....	мн.*?	VI—VII	—	с.	—	—	—	
59	Василек луговой (Centauria jacea)...	мн.	VI—IX	—	н.	—	—	—	
60	Одуванчик аптечный (Taraxacum officinale).....	мн.	V—XII	IX—X	н.	—	—	—	
61	Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium).....	мн.	VI—IX	—	н.	—	—	—	
62	Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus).....	мн.	VI—IX	—	н.	—	—	—	

Примечание. * обозначены травы, которые особенно удобно могут быть разводными остальными употребленными сокращения понятны, за исключением двух граф: отпоси-ск.—отпоси, вл.—влажную, ср.—сырую, жк.—мокрую, бл.—болотистую, гл.—глинистую, чр.—черноземную, тр.—торфяную, св.—солонцеватую, пл.—плодородную, уд.—удобрен-ль скобки. Приведенные урожаи имеют относительное значение—они характеризуют

316	—	—	32	нз.	1	1	—	1	1	—	1	1	св. вл. сь нз.	сх. нс. мр.	—
919	—	43—51	242	рн.	1	1	1	1	1	—	1	1	св. сг. сь нз.	сх. сг.	40—50
—	—	51	585	рн.	1	—	1	1	1	—	1	1	св. сг. сг.	—	30—40
—	—	51	620	рн.	—	1	1	1	1	—	1	1	сг.	всакую	25—30
—	—	49—51	161	оч.рн.	1	—	1	1	1	—	1	1	сб. нз. сг. сь нз.	—	60—80
383	—	49—51	244	оч.рн.	1	1	1	1	1	—	1	1	всакую	мр. нс. нз.	40—50
239	—	48	283	рн.	1	1	1	1	1	—	1	1	вл. всакую	мр.	20—25
919	—	—	32	рн.	1	1	—	1	1	—	1	1	св. вл. нз. сг.	—	208
160	—	18—21	18	рн.	1	1	1	1	1	—	1	1	сх. нз. нс.	—	440
332	511	46—47	27	нз.	1	1	—	1	1	—	1	1	св. вл.	—	—
479	1431	—	200	нз.	1	1	1	1	1	—	1	1	нз. сг.	нс. сь нз.	—
—	—	—	—	нз.	—	1	—	—	1	—	1	1	св. сг.	всакую	—
—	—	—	—	рн.	1	1	1	1	1	—	1	1	сх. мр.	нс.	—
—	—	—	—	нз.	—	1	—	1	1	—	1	1	сх.	сх.	—
—	—	—	—	нз.	—	1	—	—	1	—	1	1	сх. нс.	сх. нс.	—
400	225	—	—	рн.	1	1	1	1	1	—	1	1	сх. мр.	сх. нс.	78
(сна)	—	—	—	рн.	1	1	1	—	1	—	1	1	мр.	нс. нз.	—
260	—	—	140	—	1	1	—	1	1	—	—	—	мр.	нс. сь нз.	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(мн.)	—
—	—	—	—	рн.	—	1	1	1	1	—	1	1	вл. нз.	сх. сь мр.	96
—	—	—	—	рн.	1	1	1	1	1	—	1	1	вл. нз. тр.	—	—
—	—	45	216	оч.рн.	1	1	1	1	1	—	1	1	всакую (сх).	—	52
—	—	—	180	рн.	—	1	—	1	1	—	1	1	сб. св.	—	—
—	—	—	36	рн.	—	1	1	1	1	—	1	1	сх. нз. нс.	—	78
—	—	—	—	нз.	1	1	—	1	1	—	1	1	всакую сь нз.	—	78
—	—	—	—	оч.рн.	—	1	—	1	—	—	1	св. вл. нз. сь мр.	—	—	
—	—	—	—	рн.	—	1	1	1	1	—	1	всакую (вл. сг. нс)	—	20	
—	—	—	780	рн.	1	1	—	1	1	—	1	1	св.	сх. вл.	—
—	—	19—23	2475	нз.	—	1	—	1	1	—	1	1	сх.	св.	20
480	—	—	—	рн.	1	1	—	1	1	—	1	1	сб. св. нз. сь нз.	вл. сг.	31

на полд для получения семян; римские цифры во 2-й и 3-й графах означают месяцы; только отвечающих требованиям растений почв, в которых: сх. означают сухую, сг.—суглинистую, св.—сулещную, нс.—песчаную, мр.—мергельную, нз.—известковую, пл.—тошную, гб.—глубокую почву; скобки означают за исключением заключенного растению одно в отношении другого.

путники большой и средний, манжетка обыкновенная — *Alchemilla vulgaris* или лапчатка гусиная лапа — *Potentilla anserina*; потому что производят мало растительной массы на данномъ пространствѣ, а послѣднія сверхъ того въ главной своей массѣ не захватываются косой. Кромѣ упомянутыхъ въ приведенной таблицѣ растений, на лугахъ (выгонахъ) встрѣчаются еще другія, которые значительно ухудшаютъ луговую траву, потому что болѣе или менѣе вредны для всѣхъ вообще домашнихъ животныхъ или только для нѣкоторыхъ изъ нихъ (ч. II, стр. 287—288 и 324—329), или уменьшаютъ количество луговой травы, потому что не только сами вовсе не доставляютъ ей или доставляютъ ей мало, но и на болѣе или менѣе разстояніи вокругъ себя заглушаютъ и изгоняютъ хорошія луговые травы; таковы кустарники (ивы, ольха, осина, крушина, таволга и т. д.), и крупныя: сложноплодныя (полынь, чертополохъ и т. д.), зонтичныя (купырь, сныть, морковь) или стелющіяся по землѣ или съ прилегающими къ землѣ листьями растеній (см. выше, росники — *Drosera*). Эти ухудшающія луговую траву или уменьшающія количество, ея растенія составляютъ *сорную луговую растительность*.

2) *Отъ почвы, ея положенія и свойства ея поверхности*. Луговые растенія весьма различны въ своихъ требованіяхъ относительно почвы (см. таблицу); но, говоря вообще, наилучшая луговая трава получается съ почвъ, которыхъ свойство и положеніе обеспечиваютъ произрастающимъ на ней растеніямъ достаточное пользованіе влагой; слѣдовательно, съ почвъ средней плотности (суглинистыхъ, супесчаныхъ, мергелистыхъ, черноземныхъ), съ задерживающей влагу подпочвой или съ болѣе рыхлой подпочвой, въ которую просачивается вода изъ близъ-лежащихъ водовмѣстителей; таковы, напр., почвенныя условія вапихъ поемныхъ по берегамъ рѣкъ луговъ (согровыя почвы стр. 93) съ песчаной подпочвой, постоянно сырой отъ просачивающейся въ нее изъ рѣки воды, и съ почвой изъ уплотненнаго залеганія песка. При достаточной влагѣ, рыхлая почва (песчаная, известковая и торфяная) могутъ быть весьма хорошиими для луговой растительности; труднѣе могутъ быть такими плотныя глинистыя почвы. Но, если съ одной стороны для луговой растительности необходимо значительное количество влаги, то съ другой стороны избытокъ влаги, отъ котораго наичаще страдаютъ луга съ глинистой и торфяной почвами, вреденъ для нея. Механическое строеніе и физическія свойства луговой почвы тѣмъ важнѣе, что она мало доступна для періодической механической обработки. Лучшее положеніе луговой почвы есть низменное, ровное (въ долинахъ рѣки), по берегу водовмѣстителя (рѣки), особенно если, при такомъ положеніи, луга заливаетъ водой, изъ которой осаждаются на луговой

поверхности изъ болѣе или менѣе хорошихъ качествъ (*заливные, поемные луга*, стр. 155); затѣмъ, положеніе въ долинахъ небольшихъ ручьевъ, временныхъ подтековъ, въ сухихъ долинахъ, балкахъ по отвершіямъ, по которымъ стекаютъ въ обиліи весеннія воды (*долинныя, суходольныя, колесые луга*, стр. 155); дажѣ, въ лѣсахъ (*лѣсные луга*); наконецъ, наши *стенные* покосы и *ключевые, болотистые* луга представляютъ наименѣе выгодное положеніе луговой почвы. Что касается поверхности луга, то, съ одной стороны, тѣмъ ровнѣе она, тѣмъ лучше, потому что тѣмъ выровненнѣе на ней растительность, тѣмъ болѣе производима лугомъ растительная масса и тѣмъ полнѣе можетъ быть снята эта послѣдняя съ луга; но, съ другой — тѣмъ надобности, чтобы эта поверхность была ровнѣе того, сколько нужно для того, чтобы выпадающая на нее метеорная вода или вода, притекающая на нее съ прилегающихъ къ ней возвышенностей, не застаивалась на ней, и чтобы удобно, безъ траты излишней рабочей силы, можно было скосить и убрать траву (слѣдовательно, примѣнить косилку, коныя грабли и т. д.). Кромѣ неровностей, такъ сказать, образовавшихся вмѣстѣ съ луговой поверхностью, встрѣчаются еще такія, которыя, при отсутствіи надлежащихъ ухода за лугами и пользованія ими, могутъ постоянно образовываться вновь. Къ такимъ неровностямъ на суходольныхъ лугахъ, по отвершіямъ, въ особенности съ почвой, богатой мелкимъ пескомъ, принадлежатъ преимущественно *рытвины, промоины*, образующіяся отъ размыва почвы весенними водами и сильными дождями; а на лугахъ низменныхъ, въ особенности сыроватыхъ — *кочки*, небольшой сравнительно величины возвышенія, которыми покрывается лугъ въ болѣе или менѣе числѣ. Кочки могутъ быть весьма различнаго образованія: первоначально это нарытыя кротами кучи рыхлой земли (*кротовины*) или муравьиныя кучи; или болѣе или менѣе величавыя пни, оставшіеся отъ вырубленныхъ деревьевъ или кустарника; или стволы грубыхъ луговыхъ, сорныхъ растеній, которыя несканиваются косой и не обѣдаются животными, но задерживаютъ и накопляютъ около себя разныя наносимыя водой вещества; или, наконецъ, возвышенія, образовавшіяся на сыромъ лугу, вслѣдствіе вытѣпыванія его животными. Образовавшіяся возвышенія покрываются растительностію, соответствующею условіямъ произрастанія, которыя они представляютъ; такъ, напр. мхами, удерживающими сильно воду, покрываются преимущественно разлагающіяся пни на сырыхъ лугахъ, осокой (*сагех*), пушицей (*Eriophorum*) — кочки вытоптанныхъ скотомъ торфяныхъ луговъ и т. д. Поселяющіяся на кочкахъ растенія, напр. осоки, образуютъ весьма сильныя корнища, которыми пролизываются и скрѣпляются кочковатыя возвышенія, увеличивающіяся, такимъ образомъ,

изъ году въ годъ. Плодородіе луговой почвы особенно важно у луговъ незаливаемыхъ водой, осаждающей на нихъ илъ; вообще же, оно менѣе важно, чѣмъ механическое строеніе и опанческія свойства ея, потому что луговая почва доступна для удобренія чѣмъ для обработки.

3) Отъ климата, а слѣдовательно и состоянія погоды. Наилучшіе луга пахотятся въ климатахъ влажныхъ, въ приморскихъ или горныхъ странахъ, гдѣ луговая растительность можетъ пользоваться достаточнымъ количествомъ влаги и тепла въ періодъ роста, т. е. отъ перваго появленія растенія изъ сѣмени или почвы (песной или лѣтвомъ—при отростаніи отавы) до цвѣтенія (стр. 699 и 722—723). Вредъ, причиняемый засухой и холодомъ въ этомъ періодѣ развитія кормовой травы, особенно въ началѣ его, непоправимъ впоследствии. Кроме того, климатъ имѣетъ вліяніе на качество травы, опредѣляя условія уборки ея. Соответствующій требованіямъ роскошнаго развитія травъ климатъ можетъ, поэтому, въ значительной степени исправить недостатки положенія луговой почвы и сдѣлать пригодными для луговой растительности даже болѣе возвышенныя, сухія мѣста (горныя страны), и обратно.

4) Отъ времени и способа уборки травы, правда, независимо или зависитъ очень мало качество производимой лугомъ травы, но зато (стр. 791—801), въ значительной степени зависитъ качество убранной травы (сѣна).

Изъ этого разсмотрѣнія обстоятельствъ, обуславливающихъ то или другое качество травы, произрастающей на лугу, вытекаетъ, что луга могутъ имѣть недостатки, устраняемые частію *единовременными* мѣрами (коренными улучшеніями), частію *мѣрами*, которыя должны приниматься *постоянно* (уходомъ за лугами). Къ первымъ относятся:

1) *Осушка болотистыхъ, мокрыхъ, низинныхъ сырыхъ луговъ* (стр. 317—340), выполняемая иногда съ самыми незначительными затратами на исправленіе русла ручья или ручья (стр. 325), на проведеніе канавы, перехватывающей ключи и т. д.

2) *Навозка земли*, въ особенности песка (стр. 401), *наплавленія* (стр. 403—406) и *заплевенія* (стр. 406—409), если луговая почва должна быть улучшена въ своихъ свойствахъ; если она должна быть возвышена съ цѣлю осушенія ея или если поверхность ея требуетъ выравниванія.

3) *Засыпка небольшихъ углубленій* земель, взятой съ ближайшихъ возвышенностей на лугу же; при этомъ можно пользоваться *конной лопатой* (рис. 108).

4) *Выравниваніе небольшихъ промозинъ, рытвинъ и ограниченіе образующихъ ими обваловъ.*

Какъ то, такъ и другое достигается плетнями; они устраиваются изъ вбитыхъ въ землю ракетинныхъ кольевъ, толщиной изъ 1—1½ верш., которые заплетаются хворостомъ и, принявшись, образуютъ небольшія деревца. Въ первомъ случаѣ такіе плетни устанавливаются поперегъ неглубокихъ рытвинъ, неглубже 1—1½ аршинъ, въ разстояніи 15—30 саж. одинъ отъ другаго, смотря по величинѣ наденія луга и, со стороны напора воды, прикрываются приваливаемыми къ нимъ хлѣвнымъ навозомъ, негодной соломой и т. д. Въ случаѣ, еслибы вода обошла плетни, необходимо загородить мѣста обхода такими же плетнями. По истеченіи нѣкотораго времени, вода, осаждающая передъ плетнями илъ, землю, затягиваетъ рытвинамъ, и тогда ракиты, если окажется пущеными, могутъ быть вырублены, а засѣенныя иломъ мѣста засѣяны травой. Во второмъ случаѣ, выше того мѣста, гдѣ рытина образовала обвалъ, ставится поперегъ же рытвины, два невысокихъ (изъ ½ арш. высоты) дугообразныхъ плетней, въ разстояніи ½ арш. одинъ отъ другаго, такъ чтобы они, обращенные выпуклой стороной изъ сторону напора воды, охватывали вогнутой стороной верхъ обвала. Промежутки между плетнями засыпаются землей, которая твердо утрамбовывается и на поверхности засѣвается травой. Если же обвала, вдоль долины, по уменьшеніи ихъ крутизны срываются, засаживаются ивовыми черепками. Выше обвала съ рытвиной можно поступить также какъ и въ первомъ случаѣ.

5. Удаленіе кочекъ на кочковатыхъ лугахъ.

Кочки истребляются лучше всего весной и осенью, когда почва достаточно влажна, особыми *кочкорѣзками* (напр. кочкорѣзъ *Калачева*, рис. 267, стоитъ 23—25 руб. въ Комм. Работникъ, стр. 274), обыкновеннымъ *вдупомъ* (напр. рис. 27, снявши башмакъ), *согой* или *заступомъ*, если они болѣе плотны и часты. Конными орудіями кочки срываются вровень съ поверхностью земли. Если кочки не такъ часты и менѣе плотны, напр. молодая кротовина, то онѣ удобно срываются *луговымъ стругомъ*, состоящимъ изъ проходной деревянной рамы, въ которой наискось прикрѣплены два ножа: передній срѣзаетъ кочку дюйма на 1½—2 отъ земли, между тѣмъ какъ задній срѣзаетъ ее у самой поверхности земли; на крюкъ въ переднемъ брускѣ рамы надѣвается валежъ. Пшения кочки истребляются при содѣйствіи топора или лома, если они недостаточно перегнили. Срѣзанныя кочки доставляютъ хорошій матеріалъ для конюшнскихъ лужъ (стр. 680).




Рис. 267.

6) *Удаление кустарника* выкорчевыванием (стр. 342—350) и *крупных сорных трав* вырыванием по возможности глубоко с корнем (стр. 763).

7) *Увлажнение луга*, если луговая растительность, по положению луга и свойства климата, недостаточно пользуется влагой.

Вода, в силу своего химического состава и своих физических свойств, действует на луг трояко: во 1-х, *удобряет* его, доставляя растениям (стр. 120—132) воду, элементы воды (водород и кислород) и растворенные (стр. 74—76) и взмученные в ней (стр. 407—408) вещества (стр. 586—587); во 2-х, *охраняет* его, передавая растениям растворимые ею из воздуха газы, а из почвы—твердые вещества; выщелачивая из почвы вредные для растений вещества (растворимые перегнойные кислоты, соли закисей железа и марганца); защищая, при своей большой теплоемкости, растения, открытые ею от быстрого охлаждения вследствие излучения теплоты и быстрого оттаивания и обгоривания солнечными лучами (стр. 140); и потребляет сорные растения (вереск, мох и др.), кровет, муравьев, мышей; 3) *вредит* лугам, если применяется не такого качества, не в том количестве и не в то время, как этого требуют хорошие луговые травы, причем довольно различны в этом отношении.

Поэтому, успех увлажнения луга зависит от качества и количества воды, употребляемой для увлажнения, от свойств увлажняемого луга, от климата, в котором луг находится, и от способа увлажнения.

Качество воды обуславливается содержанием в ней растворимых твердых и газообразных и взмученных веществ, присутствием между этими веществами в большем или меньшем количестве вредных для растений веществ или совершенно отсутствием их и температурой. Поэтому, очень хороша для увлажнения лугов прудовая вода, особенно из прудов, лежащих вблизи селений и принимающих в себя много навозной жижи; она содержит сравнительно мало взмученных веществ, которая осаждают на дно в виде ила, но она очень теплая, потому, особенно пригодна для увлажнения холодных глинистых или торфяных почв. Хороши также ручейная и речная воды, которые богаче прудовой взмученными частями, особенно во время половодий (стр. 75 и 408) и которых температура приближается к температуре воздуха; холодные же этих вод и бедные их не только взмученными но и растворенными веществами ключевая вода (стр. 75), почему она годится для увлажнения сухих, теплых, песчаных, супесчаных, известковых почв, но лишь с осторожностью может быть употребляема для увлажнения холодных, глинистых и торфяных почв. Ключевая вода, кроме того, нередко содержит в растворе вредные вещества: растворимые соли железа и перегнойных кислот. Будучи проведена на некотором протяжении в открытой канавке или же оставлена собранной в пруд, она улучшается: обогривается, поглощает воздух с содержащимися в нем газообразными веществами и, действуя на воздух (кислорода и углекислоты), осаждают на дно канавы или пруда растворенные в ней вредные соли в нерастворимом виде (стр. 86). Таким же образом улучшается для дальнейшего увлажнения вода, употребляемая уже раз для увлажнения и принявшая в себя при этом вредные вещества, или же объединяемая в отношении полезных для растений веществ; она осаждают первая, а вторыми обогащается из воздуха и из стенок и дна канавы, по которым протекает до нового ее употребления. Хорошая вода узнается способами, наложенными на стр. 410—411.

Количество воды, необходимой для успешного увлажнения луга, весьма

различно, в зависимости: во 1-х, от качества воды—хорошей воды нужно меньше чем худой, если имеется в виду удобрение водой луга; во 2-х, от свойств почвы и подпочвы—чем проникаемее та и другая, тем больше нужно воды; во 3-х, от климата и состояния погоды—чем суше они, тем больше испаряется следовательно, влаги из почвы, тем больше нужно воды; влажный воздух горных стран или влажное время года делают часто вовсе излишним увлажнение луга с целью доставления растениям воды; во 4-х, от величины увлажняемой поверхности—чем больше она, тем больше нужно воды; во 5-х, от величины падения увлажняемой поверхности—чем она больше, тем больше нужно воды; во 6-х, от цели *увлажнения*—в южных странах, где действие воды ограничивается лишь растворением и распределением питательных для растений веществ, вносимых при оттаивании от увлажнения удобрения почвы, воды употребляется меньше, чем в северных странах, где вода в то же время удобряет луг, и в 7-х, наконец, от способа *увлажнения*—применяется ли вода для увлажнения повторительно два, или больше раз на нескольких, лежащих один ближе другого участках, когда воды нужно меньше, или нет, когда ее нужно больше. Впрочем, повторительное употребление воды ограничивается ухудшением ее при каждом новом увлажнении ею (см. выше). Вообще говоря, успех увлажнения можно считать наиболее обеспеченным при большом количестве воды и большом падении увлажняемой поверхности. Недостаток воды, особенно в летнее и осеннее время, когда увлажнения луга особенно полезны (см. ниже), и недостаток падения, не позволяющий луговой поверхности освободиться от увлажняющей ее воды с надлежащей быстротой, нередко бывают причинами безуспешности увлажнения. Из этого ясно, что как годовое, так и дневное количество воды, потребной для увлажнения десятины, чрезвычайно различны в различных случаях. В действительности употребляется от 0,15 до 2 куб. фут. воды в секунду для увлажнения 1 десятины. В средней же и южной Германии считается отличным, если можно употребить для увлажнения 1 десятины от $1\frac{1}{4}$ до $2\frac{1}{4}$ очень хорошим— $1\frac{1}{2}$; хорошим— $1\frac{1}{4}$ и достаточным— $\frac{1}{2}$ куб. ф. в секунду. Если представить себе количество воды, протекающей на луг в таком количестве в течение 24 часов, в виде слоя воды, покрывающего луг, то толщина этого слоя была бы в названных случаях примерно: $1\frac{1}{4}$ —16, 14—18, 12, 9, и 6 дюйм. Влияние на успех увлажнения свойств увлажняемого луга (т. е. свойств его почвы и поверхности), равно как и климата является отчасти из сказанного выше о качестве и количестве воды, отчасти из того, что будет сейчас сказано о способах увлажнения и их влиянии на успех увлажнения.

Увлажнение луга производится различными способами, которые представляют, главным образом, два различия: вода, с которой приводится в соприкосновение луговая почва, находится в покое или в движении. Первое имеет место при *затоплении* (наводнении), когда увлажняющая луг вода стоит на поверхности луга (рис. 268 *) и при *подтоплении* (увлажне-

*) Представляет, в плане и разрез по линии АВ, искусственно затопленный луг из четырех отделений, обнесенных плотинами (валами) с горизонтальным гребнем; вода, впускаемая на затопляемый луг из реки через плоты s, распределяется по затопляемой поверхности отчасти помощью канавы вдоль плотины, которая с окончанием затопления содействует в то же время главным, иногда разлитвенным, отводным каналам в возможно быстром освобождении затопленной поверхности от воды; закрывающиеся заставками трубы k служат для переноса воды из одного отделения в другое и для обратного спуска ее в реку. Искусственное затопление имеет много общего с наведением (стр. 406—408).




Рис. 268.

ни просачиваніемъ), когда вода, задержанная въ канавахъ, проникающихъ увлажняемый лугъ, просачивается чрезъ стѣнки канавъ въ луговую почву — дѣйствуетъ какъ грунтовая вода (рис. 269 *). Второе же имѣетъ мѣсто при орошеніи, которое устраивается односкатнымъ или двускатнымъ. При односкатномъ орошеніи (рис. 270 и 271 **), вода изъ водопроводной канавы, проходящей по высшему мѣсту луга, имѣющаго покатую въ одномъ лишь направленіи поверхность, втекаетъ въ оросительныя канавки, перпендикулярныя къ скату, и, выливаясь изъ нихъ черезъ одинъ лишь край, орошаетъ поверхность луга, стекая къ водоотводной канавѣ въ нижнемъ мѣстѣ

*) Представляетъ, въ планѣ и разрѣзѣ по линіи АВ, искусственно подготовленный лугъ, осушенный помощью канавъ, по которымъ вода стекаетъ съ луга, оставляя его у х, гдѣ находится шлюзъ, дающій возможность болѣе или менѣе задерживать воду, стекающую съ осушеннаго пространства, въ собирающихъ и отводящихъ ее канавкахъ и, такимъ образомъ, заставляя ее просачиваться въ луговую почву.

**) Рис. 270 представляетъ примѣръ правильнаго односкатнаго орошенія; вода изъ водопроводнаго канала а напускается въ запруженный сѣткою дерномъ раздѣлительныя канавы bb, и изъ нихъ, при помощи щитовъ, въ оросительныя борозды cc. Канавы bb протянуты до главной водоотводной канавы, такимъ образомъ онѣ служатъ, если вынуть шлюзы ниже только что орошеннаго отдѣленія, вмѣстѣ и для отвода воды. Рис. 271 представляетъ примѣръ односкатнаго же орошенія, но съ особыми отводящими канавками e, e — стягивающими воду, стекающую съ отдѣльныхъ участковъ, орошаемыхъ водой изъ оросительныхъ канавокъ f, f, f; такъ что всѣ части луга орошаются только свѣжей водой.




Рис. 269.




Рис. 270.




Рис. 271.

луга. При двухкатномъ орошеніи (рис. 272 *), или орошеніи *законами*, *грядками*, вода изъ водопроводной канавы вытекаетъ въ оросительныя ка-




Рис. 272.

*) Рис. 272 представляетъ примѣръ двухкатнаго орошенія: *a* — главный

навыи, проходящая вдоль гребней грядокъ, которая въ направлении главного ската образуетъ поверхность дугъ, и, чередуясь черезъ оба края оросительныхъ канавъ, стекаетъ по болѣе или менѣе отлогимъ и широкимъ бокамъ загоновъ или грядокъ къ канавкамъ между грядками, а изъ нихъ уже въ главную водоотводную канаву. Какъ одно-такъ и двухкатное орошение можетъ быть *искусственное*, когда искусственно: въ первомъ случаѣ сообщается дугу совершенно правильная, покатая въ одномъ направленіи поверхность (рис. 270), во второмъ — поверхность совершенно правильныхъ загоновъ (рис. 272); или болѣе или менѣе *естественное* (дикое), когда для устройства какъ покатой въ одну сторону, такъ и грядковой поверхности дуга, пользуются естественной поверхностью дуга, хотя бы устраиваемымъ такимъ образомъ дуговая поверхность и не имѣла той правильности какъ въ первомъ случаѣ (рис. 273 *). Наконецъ, способъ увлажненія по системѣ *Пе-*




Рис. 273.

терсенна есть собственно соединеніе односкатнаго орошенія и отчасти подтопленія луга съ дренажной осушкой его; при этомъ вода, стекающая по собирательной дрени (стр. 334), которая, въ отличіе отъ того, какъ это дѣлается при обыкновенномъ дренажированіи, прокладывается здѣсь вдоль наибольшаго паденія (всасывающія же дрены по горизонталямъ) можетъ быть останавливаема въ движеніи помощью особыхъ клапановъ. Клапаны заключаются въ вертикальныхъ трубахъ, ящикахъ, которые помѣщаются вдоль собирательной дрени, въ мѣстахъ пересѣченія ея съ всасывающими дренами; которые принимаютъ въ себя внизу съ двухъ противоположныхъ боковъ концы прерванной собирательной дрени, а съ двухъ другихъ противоположныхъ боковъ концы всасывающихъ дренай; и которые имѣютъ сверху, въ части ихъ выступающей надъ поверхностью земли, боковыя отверстія для выхода воды. Клапаны могутъ быть открываемы и закрываемы помощью проволоки, находящейся въ ящикѣ же и достигающей съ поверхности земли. Вода, остановленная въ своемъ движеніи по собирательной дрени съ закрытіемъ клапана, проникаетъ въ почву снизу и поднимается въ ящикѣ вверхъ до отверстій, черезъ которыя вытекаетъ въ оросительныя канавки, проведенныя на поверхности почвы параллельно между собой, по направленію горизонталей и

и *bb* — второстепенныя водопроводныя канавы; *cc* — раздѣлительныя канавы; *dd* — оросительныя, которыя идутъ по гребнямъ загоновъ; *ee* — водоотводная канавы и *ff* — дорога для связи съва.

* Представляетъ примѣръ естественнаго орошенія; вода изъ главной водопроводной канавы проходитъ во второстепенныя *bb*, а изъ нихъ въ оросительныя канавы *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*, *oo*, *pp*, *qq*, *rr*, *ss*, *tt*, *uu*, *vv*, *ww*, *xx*, *yy*, *zz*, *aa*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *ff*, *gg*, *hh*, *ii*, *jj*, *kk*, *ll*, *mm*, *nn*

соответственно всасывающим дренаж на глубинѣ почвы, и орошает луговую поверхность; съ открытіемъ же клапановъ, вода проникаетъ почву съ поверхности, протоняя передъ собой воздухъ, опускается до дрена и по нимъ начинаетъ снова стекать съ луга. Такимъ образомъ, этотъ способъ увлажнения почвы допускаетъ: съ одной стороны, возможно полное использование воды въ отношеніи растворенныхъ въ ней веществъ, которыя, при прониканіи воды черезъ почву, задерживаются этой послѣдней; съ другой — провѣтриваніе почвы.

Умѣстность и выгодность различныхъ способовъ увлажненія зависятъ въ техническомъ отношеніи отъ величины паденія луговой поверхности, отъ свойствъ почвы, отъ качества и количества воды и отъ положенія источника воды (рѣки, ручья) относительно увлажняемаго участка; въ экономическомъ отношеніи — отъ существующихъ цѣнъ на строительные материалы и рабочія руки и луговыхъ произведеній (траву, сѣно), отъ имѣющагося для выполнения увлажненія капитала и отъ возможности умѣлаго и тщательнаго устройства увлажненія и присмотра за нимъ.

Искусственное орошеніе, какъ дву- такъ и односкатное, требуетъ: постоянного и большаго количества хорошей воды; возможно полного осушенія луга и отсутствія всякой опасности отъ затопленія его; легко обрабатываемой почвы, проницаемой подпочвы и возможности имѣть неподалеку достаточное количество дерна или обезпеченности травяного постога; значительнаго паденія увлажняемой поверхности: при односкатномъ орошеніи не менѣе 0,04, а при двускатномъ не менѣе 0,05 (стр. 323); и значительнаго капитала на первоначальное устройство и поддержаніе его. А потому, искусственное орошеніе умѣстно и выгодно лишь въ исключительныхъ случаяхъ, когда требующія увлажненія луга имѣютъ слишкомъ неровную поверхность съ крайне первичнымъ паденіемъ, такъ что невозможно его увлажненіе безъ искусственнаго исправленія паденія и поверхности, безъ снятія дерна, выпланированія поверхности и новаго наложенія дерна. Меньшаго капитала на устройство требуетъ естественное орошеніе; и потому оно чаще примѣнимо: односкатное примѣнимо уже при паденіи луговой поверхности въ 0,02; хотя, если почва болѣе непроницаема и холодна, оно даетъ хорошіе результаты только при большемъ паденіи, даже при паденіи не менѣе 0,04—0,06; возможно же его примѣненіе еще при 0,3 паденія увлажняемой поверхности. При паденіи луговой поверхности менѣе 0,02 и при болѣе или менѣе непроницаемой почвѣ, находятъ себѣ примѣненіе двускатное орошеніе; къ тому же съ тѣмъ болѣе длинными грядками, чѣмъ меньше паденіе, и съ тѣмъ болѣе широкими, а слѣдовательно и низкими и пологими грядками, чѣмъ менѣе непроницаема почва, чѣмъ менѣе склонна она къ заболотчивости и чѣмъ меньше количество воды, которымъ можно располагать для орошенія*). Орошеніе грядками увеличиваетъ, слѣдовательно, паденіе и луговую поверхность, доставляетъ каждой грядкѣ свѣжую воду и облегчаетъ удаленіе употребленной воды. При паденіи луговой поверхности, менѣе 0,0015, но болѣе 0,001, и недостаточномъ количествѣ воды является на выручку хозяина, нуждающагося въ увлажненіи луга съ нелегко проницаемой почвой, орошеніе по способу Петерсена. Наконецъ, самые де-

шевые и простые способы увлажненія: затопленіе и подтопленіе, особенно естественное затопленіе, несмотря на то, что помощью ихъ нѣкогда не получается такого хорошаго сѣна, какъ помощью орошенія, потому что при затопленіи покрывающій лугъ слой воды почти совершенно устраняетъ дѣйствіе воздуха и его температуры на растительность, а при подтопленіи — застой воды въ нижнемъ слой почвы вредно дѣйствуетъ на нѣкоторыя хорошія луговые травы, — все же, при благоразумномъ примѣненіи ихъ, представляются неопредѣленными, когда необходимо увлажнить лугъ съ ровной поверхностью и съ паденіемъ не менѣе 0,001 и не меньшимъ того, какое нужно лишь для спуска употребленной воды. Лугъ пригоденъ для затопленія даже только въ томъ случаѣ, если паденіе его поверхности не превосходитъ 0,001—0,0015, но причинами объясненными при заилненіи (стр. 409). Для затопленія необходимо, чтобы лугъ лежалъ ниже ручья, рѣки, изъ которой берется вода; подтопленіе же возможно еще и тогда, когда находящаяся въ луговой почвѣ или приводимая къ ней вода лежитъ такъ глубоко, что не можетъ быть приведена на поверхность луга. Для затопленія, въ особенности въ лѣтнее время, достаточно такое небольшое количество воды, какого мало для орошенія. Затопленіе какъ и подтопленіе пригодны для почвъ легкихъ, проницаемыхъ, причемъ, при первомъ почва уплотняется давленіемъ водянаго слоя и осаждающимся иломъ, который въ тоже время удобряетъ почву и часто настолько, что дѣлаетъ излишнимъ другое удобреніе; при подтопленіи же почва удобряется весьма слабо веществами, поглощаемыми почвой изъ просачивающейся въ нее воды, а потому неустраивается необходимость въ другомъ еще удобреніи. Слой воды, покрывающій лугъ при затопленіи, защищаетъ растенія отъ утренниковъ, изгоняетъ съ луга вредныхъ животныхъ (кротъ, мышь) и сорныя растенія (верескъ, мхи). Но, затопленіе не можетъ вовсе примѣняться, или можетъ примѣняться лишь въ ограниченномъ размѣрѣ во время произрастанія растеній и, какъ и подтопленіе, негодится для плотныхъ и холодныхъ почвъ.

8) *Заложеніе новой или возобновленіе старой дернины*, къ которому приходится прибѣгать при коренныхъ улучшеніяхъ, численности подл 1—6, на нѣкоторыхъ мѣстахъ, а при увлажненіи искусственнымъ орошеніемъ или, въ случаѣ крайней засоренности старой дернины, — даже на всей поверхности луга. Впрочемъ, въ сухихъ климатахъ, на болѣе сухихъ, недоступныхъ для увлажненія мѣстахъ, слѣдуетъ, по возможности, сберегать старую дернину, потому что возобновленіе дернины при этихъ условіяхъ крайне затруднительно.

Дернина возобновляется или вновь закладывается двумя способами: 1) *наложеніемъ дернины*, которая берется изъ лѣсовъ, съ придорожныхъ мѣстъ, съ пастбищъ и даже луговъ но не сплошь (оголенные такимъ образомъ мѣста засѣваются съ подсыпкой земли), или *застогомъ*.

Первый способъ примѣняется рѣдко, преимущественно при искусственномъ устройствѣ орошаемой поверхности. Подъ наложеніе дерна поверхность почвы выравнивается или устраивается сообразно назначенію (двускатное орошеніе), а иногда почва кромѣ того обрабатывается и удобряется. Куски дерна болѣе или менѣе значительны накладываются или *слоями*; или, въ случаѣ недостатка дернины, прибѣгаютъ къ такъ называемой *прививкѣ* дерна, которая, впрочемъ, удается только на плодородныхъ почвахъ, т. е. накладываютъ

*) При естественномъ двускатномъ орошеніи грядки не дѣлаютъ длиннѣе 100—120 фут., при искусственномъ же они дѣлаются отъ 20 до 60 фут. ширины въ обоихъ свѣтахъ, причемъ слѣдуетъ обращать вниманіе на то, чтобы ширина одного ската была кратнымъ числомъ ширины (отъ 3 до 6 фут.) прокоса обмываемой косы. Въ зависимости отъ ширины и паденія, грядки дѣлаются отъ 70 до 140 фут. длинны (при ширинѣ отъ 36 до 60 фут. въ 1,25 — 1,6 ширины, какъ средніе размѣры) и такой высоты, чтобы паденіе ската было не менѣе 0,05.

куски дерна большей величины в шахматном порядке или отдельно в рядовом один от другого расстоянии, а промежутки между кусками дерна засыпаются землей и обсеменяются; или, наконец, меньшей величины куски разбрасываются по поверхности обработанной земли и плотно прижаты.

Чаще применяется второй способ возобновления дернины зазеленением, под который почва непременно обрабатывается, возможно глубоко и хорошо разрыхляется паханием и боронованием согласно ее связности, очищается от сорных трав, удобряется, если она недостаточно плодородна, и выравнивается в своей поверхности. Для достижения этого весьма хорошо занять дуг, предварительно возобновления на нем дернины, паровым растением (картофелем, рьпой, капустой—стр. 531), а если бы из-под старой дернины трудно было раздвигать почву прямо под паровое растение, то сбить предварительно какое-либо растение по пласту (овес стр. 523) и посеять его заняв уже дуг паровым растением. Из-под этого последнего под посев трав почва должна быть приотворена (стр. 513), главным образом, с осени, с тем чтобы весной можно было ограничиться самой необходимой обработкой для зазеленения одних трав или трав с покровным растением. Последнее хотя и сберегает некоторое количество травяных семян, потому что делает возможным более редкий посев их, тем не менее уместно лишь на открытых, сухих, но плодородных местах (стр. 751), при осеннем посеве (напр. под кормовую рожь); на хороших же, свежих или даже влажных, но годных для травосаждения почвах, при весеннем посеве это излишне. Во всяком случае, покровное растение должно быть несомненно пореже и снято, недожидаясь его зрелости. Осенний посев трав возможен лишь в умеренном климате, в зашищенных местах, на свежих почвах или в странах, где вполне надежен снежный покров; в странах же более суровых с негустым местным покровом предпочтительнее весенний посев. При посеве с покровным растением травы высеваются после покровного растения (стр. 752); без этого же последнего они высеваются раньше всего на сухих почвах, как только зазеленеют межи; на почвах уже несколько свежих—когда отцветет скороспелая лекарственная (*Primula veris* s. *officinalis*) и на свежих почвах—когда зазеленеют дуга. При большом различии травяных семян не следует разбавлять их всегда и все смешанными видами; лучше же смешивать между собой лишь более сходные и разбавлять различными смесями отдельно (стр. 754), увеличивая, если нужно массу их примесами (стр. 743) напр. опилками. Травяные семена несутся прикрытия глубже $\frac{1}{2}$ дюйма; а потому закатываются, завааливаются, реже забараниваются, а иногда под закатывание прикрываются песком (на глинистых почвах) или, что еще лучше, компостом. Травы разводятся смешанным посевом (стр. 750—751), и для получения семян для такого посева имеются три источника: 1) *сытная труха* т. е. та мелкая масса, которая высыпается из сена и содержит большей частью нездорвистые семена и способные к прорастанию семена только тех трав, которые достигли зрелости во времени уборки сена. Хорошо очищенной трухой употребляют от 5 до 6 четвертей для обсеменения одной десятины с примесью чистых всхожих семян злаковых и клеверных растений; тем не менее труха представляет слишком неопределенную смесь, для того чтобы употребление ее можно было считать разумным и нормальным. 2) Семена, собираемые с лучших наиболее чистых от сорных трав частей дуг, с которых, ввиду этого, трава уже не косится до наступления полной зрелости трав; но и в таких семенах заключается, большей частью, еще много семян менее хороших луговых трав и сорных семян, особенно если собранный таким образом урожай не был хорошо

проборонован в весну (см. ниже); и такие семена еще слишком неопределенны в их смеси; а потому, наиболее зрелые источники—это смеси чистых семян растений, взятых для этого по соображению: во 1-х климатических условий; во 2-х, механического строения, физических свойств, плодородия, состояния влажности и положения почвы; в 3-х рода пользования и рода животных, в пользование которых назначается дернина: для покоса или пастбища, лошадей, крупному рогатому скоту или овцам; в 4-х, того, будет ли закладываемая дернина увлажнена или нет, а если будет, то каким способом; в 5-х того отношения, в котором должны находиться растения луговой растительности: злаковых, бобовых растений и растений других семейств; высокорослых и низкорослых растений; многолетних и однолетних; ранние и поздние растения. В хорошей смеси должны преобладать злаковые растения (80—95%); бобовые растения и растения других семейств могут примешиваться в количестве 5—20% преимущественно к смесям для сухих почв; растения наиболее отвечающие данным климатическим, почвенным условиям и условиям употребления травы (в выбор как тех так и других можно руководиться наблюдением местной луговой флоры); растения высокорослых (если назначаются для покоса) и низкорослых (если назначаются для выгона; низкорослые, образующие так называемый подстил, должны всегда находиться в известном количестве, потому что, как показывает опыт, без них нельзя получить полного урожая трав стр. 750—751); наконец, многолетних в особенности, если смесь назначается для пастбища; ранние, если желательно косить траву возможно рано и обратно (в смеси должно быть немного таких трав, которые ко времени скоса не достигают зрелости, и еще меньше таких, которые бы к тому же времени уже отцветали; во всяком случае должны быть и те и другие, потому что только таким смешением обеспечивается средний хороший урожай трав).

Определяя, на основании этого, процент, в котором должны участвовать в смеси разные взятые растения, остается определить абсолютное количество семян, необходимое для обсеменения десятины. Вообще говоря, предпочтительнее густой посев (от 3—4 до 6—8 пудов на десятину), и тем более густой, чем менее благоприятны условия появления всходов и дальнейшего развития (стр. 728—730). Для ближайшего его определения могут еще служить опытные данные (стр. 864—867) относительно количества семян различных трав, высеваемого на десятину при чистом посеве; относительно числа зерен различных трав, заключающегося в 1 фунте, относительно пространства, требуемого некоторыми травами для полного развития отдельного растения, к которым можно присовокупить следующие числа: на 1 кв. фут хорошей дернины помещается 300 растений и данные (стр. 716—719) относительно чистоты и всхожести семян некоторых трав.

Вот несколько примесей травяных смесей для покоса и пастбища при различных почвенных условиях: (см. стр. 882 и 883.)

Для травосаждения в наших степях заслуживают испытания посевы: аржанца Бемерова, пырея аржанца (*Agropyrum cristatum*), костера безосотного (*Bromus inermis*), мянленбергии (полевницы) мексиканской (*Muhlenbergia mexicana*), люцерны шведской (юмуреи, буркунца — *Medicago falcata*), эспарцета степного (красного буркунца (*Onobrychis gracilis*), донника белого бухарского клевера — *Melilotus alba*), вишля разноцветного (*Coronilla varia*), астрала хлопунца (*Astragalus cicer*) и цикория обыкновенного (Петровых батогах — *Cichorium intybus*).

№№ (ср. 861—867)	Для влажныхъ луговъ, съ пастбищ-ной почвой.	Для орошаемыхъ луговъ.	Для сухихъ плодородныхъ почвъ.	Для сырыхъ почвъ, переходящихъ въ влажныя.				Для сы-хъ дающихъ	
				рыхлыхъ.		вязкихъ.		мергели-сто сугли-нистыхъ.	
				пок.	настб.	пок.	настб.	пок.	настб.
1 Аржанецъ тимфеева трава.	30	20	20	—	—	—	—	5	5
3 Батлачникъ луговой.	50	30	5	10	10	10	10	—	—
4 Гребенникъ обыкновенный.	—	10	10	10	20	10	20	5	10
5 Ежа обыкновенная.	20	40	50	—	—	—	—	5	10
6 Мятликъ луговой.	—	5	20	—	—	—	—	5	10
7 " обыкновенный.	30	25	10	10	15	10	15	—	—
8 Овесъ луговой.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 Овсяница луговая.	50	50	50	20	20	20	20	20	20
10 Клеверъ многолѣтний.	20	50	50	—	35	—	35	—	20
13 Шашечникъ высокий.	5	20	50	—	—	—	—	40	—
17 Желтостебельный пахучій колосокъ.	2 ₁	2 ₁	2 ₁	1 ₁	1 ₁	1 ₁	1 ₁	1 ₁	1 ₁
20 Костеръ мягкій.	—	—	—	—	—	—	—	30	30
26 Овесъ желтѣющій.	10	10	10	—	—	—	—	—	—
27 " зячій.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 Овсяница тростниковая.	—	—	—	20	—	20	—	—	—
29 " овечья.	—	—	10	—	—	—	—	—	—
30 " красная.	—	—	—	20	20	—	—	—	—
31 " горная.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 Полевница обыкновенная.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 " ползучая.	10	10	5	5	5	—	—	—	—
33 Трясунка средняя.	—	—	—	—	—	—	—	5	5
35 Клеверъ луговой.	—	—	—	15	5	15	5	15	5
36 " шведскій.	—	—	—	5	—	—	—	—	—
37 " бѣлый.	—	—	—	5	15	5	10	—	10
38 Люцерна обыкновенная.	—	—	—	—	—	—	—	2 ₁	—
39 " хмѣлевидная.	—	—	—	5	5	10	10	—	5
42 Эспарцетъ обыкновенный.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	227 ₁	272 ₁	292 ₁	126 ₁	151 ₁	101 ₁	126 ₁	134	126 ₁

Примѣчаніе Числа первыхъ трехъ травъ имѣютъ значеніе абсолютныхъ тѣмъ какъ числа остальныхъ травъ указываютъ относительныя количества взять и костеръ луговой (19), а вмѣсто люцерны обыкновенной люцерну хмѣ-ляно брать лишь небольшое количество, потому что во времени ея носова горошка (43).

9) Особенно полезно обнесеніе преимущественно суходольныхъ, открытыхъ сухихъ и холодныхъ вѣтрамъ, луговъ живыми изгоро-дями, для защиты ихъ отъ этихъ вѣтровъ и для удержанія на нихъ сѣна.

Для влажныхъ почвъ, переко-въ сухія.		Для сухихъ почвъ.						Для страдающихъ отъ засухи почвъ:					
рыхлыхъ суглин-ныхъ.	вязкихъ суглин-ныхъ.	мергель-ныхъ.	песча-ныхъ.	глини-стыхъ.	извест-ковыхъ.	рыхлыхъ.	вязкихъ.	рыхлыхъ.	вязкихъ.	рыхлыхъ.	вязкихъ.	рыхлыхъ.	вязкихъ.
пок.	настб.	пок.	настб.	пок.	настб.	пок.	настб.	пок.	настб.	пок.	настб.	пок.	настб.
10	5	10	5	5	5	10	5	10	5	10	10	10	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	20	10	20	—	—	10	20	10	20	15	15	15	15
10	20	20	20	10	10	10	10	20	20	—	—	—	—
5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	35	25	35
25	10	25	10	20	20	20	20	20	20	—	—	—	—
—	35	—	45	—	15	—	25	—	35	—	—	20	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 ₁	1 ₁	1 ₁	1 ₁	1 ₁	1 ₁	1 ₁	1 ₁	1 ₁	1 ₁	1 ₁	1 ₁	1 ₁	1 ₁
20	10	20	10	—	—	—	—	10	10	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	30	20	30
10	10	—	—	10	10	20	20	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	30	30	—	—	—	—	—	—	10	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	—	—	—	—
15	5	15	5	10	5	15	5	15	5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	10	5	10	2 ₁	5	5	10	5	10	5	5	10	10
2 ₁	—	2 ₁	—	2 ₁	2 ₁	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	5	10	2 ₁	5	5	10	5	10	5	5	10	10
—	—	—	—	четверо рыхла.	—	—	—	—	—	четверо рыхла.	—	—	—
124	146 ₁	124	151 ₁	104	144	106 ₁	161 ₁	106 ₁	151 ₁	81 ₁	101 ₁	101 ₁	121 ₁
				кроме эспар-цета.						кроме эспар-цета.			

количество (фунтовъ) сѣмянъ, потребныхъ для обнесенія десятины, между сѣмянъ разныхъ травъ въ сѣвѣ. Вмѣсто гребенника обыкновеннаго можно левидиумъ, если первая не могла быть взята. Мятлика луговаго для носова метелки его уже совсемъ почти неспѣли. Можно считать примѣсь заборнаго

Къ постоянному уходу за лугами относятся слѣдующіе приемы, приводимые здѣсь въ порядкѣ слѣдованій, начиная съ весны и кончая осенью.

1) *Первое проборонованіе* луговъ заросшихъ мхами (рис. 65 и 66),

когда земля только что обнажилась отъ снѣга и едва оттаяла на поверхности, для выдергиванія мха. Если бы пришлось почему либо запоздать этой боронкой, то лучше оставить ее.

2) *Второе проборонованіе*, которое полезно на всѣхъ лугахъ и имѣетъ цѣлю открыть луговую почву дѣйствию воздуха и уничтожить нѣкоторые сорныя травы, производится позже перваго, когда лугъ зазеленѣетъ. Если бы по связности и плотности дернины дѣйствіе обыкновенной бороны было недостаточно, можно съ пользой употребить борону съ ножами вмѣсто зубьевъ (стр. 298) или скарификаторъ (стр. 295). На заливныхъ лугахъ это боронованіе можетъ служить для разравниванія нанесеннаго ила.

3) *Подсѣвъ травъ* на лугахъ, если бы того требовало изрѣдкавшееся состояніе луговой растительности, руководствуясь въ этомъ отношеніи сказаннымъ о заложеніи дернины заѣвомъ.

4) *Отсыпка луга компостомъ* (стр. 658—661) для удобрения луга, прикрытія сѣмянъ подсѣва и обнаженныхъ корневищъ травъ, преимущественно полезно послѣ проборонованія и подсѣва.

5) *Укатываніе* луга возможно тяжелыми гладкими катками для прикрытія обнаженныхъ корней и усиленія кушенія (стр. 697 и 755), уплотненія почвы и выравниванія ея поверхности, производится тогда, когда луговая почва уже обсохнетъ нѣсколько, лучше всего послѣ подсѣва и отсыпки луга; или и позже, когда уже нѣсколько подростетъ трава, если имѣется въ виду усилить кушеніе травъ.

6) *Удобреніе* луговъ есть удобреніе поверхностное (стр. 669 и 675) и потому производится лучше всего жидкими и порошкообразными туками, содержащими возможно болѣе растворимыхъ питательныхъ веществъ — прежде всего азота (сѣры), затѣмъ кали и известь и послѣ всего фосфорной кислоты (стр. 698 и 699); слѣдовательно навозной жижей, золой, известью, компостомъ какъ наиболѣе доступными туками. Такими туками лугъ долженъ удобряться преимущественно весной (стр. 699), послѣ того какъ пройдутъ весеннія воды, которыя могли бы иначе унести съ луга много не только растворимыхъ но и взмученныхъ частей. Чѣмъ болѣе громоздокъ тукъ (напр. хлѣвной навозъ, картофельная ботва), тѣмъ необходимѣе примѣненіе его съ осени, хотя и въ этомъ случаѣ можетъ теряться много растворенныхъ и взмученныхъ частей, особенно если лугъ имѣетъ хотя нѣсколько покатое положеніе; да къ тому же, весной приходится сгребать остающіяся неперегнившими, неизмельчившимися крупныя части тука, подъ которыми могло бы страдать развитіе луговыхъ травъ. А потому, предпочтительно предварительное превращеніе имѣющихся для удобренія луга громоздкихъ туковъ въ компостъ и весеннее примѣненіе этого послѣдняго; затѣмъ, примѣненіе на лугу громоздкаго тука

съ осени оправдывалось бы равнѣмъ положеніемъ луга, открытымъ по веснѣ холоднымъ и сухимъ вѣтрамъ. Если бы лугъ возиася не разъ, а два или болѣе разъ, то весьма хорошо раздѣлять удобреніе такъ, чтобы можно было примѣнять его въ началѣ каждаго новаго подростанія травы, спустя нѣсколько времени (недѣлю, двѣ) послѣ скоса. Удобреніе луга, усиливая ростъ хорошихъ травъ, значительно содѣйствуетъ истребленію сорныхъ травъ заглушеніемъ.

7) *Увлажненіе луга*, если лугъ устроенъ такъ, что можетъ быть увлажняемъ, производится, смотри по запасу воды, климатическимъ условіямъ и способу увлажненія, круглый годъ или только въ извѣстное время года, наичаще весною, потому что въ это время наичаще имѣется достаточно воды; между тѣмъ какъ осеннее увлажненіе—орошеніе особенно важно, потому что въ это время, когда съ одной стороны приостанавливается развитіе травы, съ другой—вода богата взмученными частями, возможно наиболѣе сильное, удобряющее орошеніе. Впрочемъ, луга съ искусственно устроенной орошаемой поверхностью должны орошаться лишь умѣренно мутной водой, потому что обильное осажденіе на нихъ ила измѣняетъ (возвышаетъ) сланькомъ ихъ поверхность. А потому, для орошенія такихъ луговъ слѣдуетъ выждать освѣтленія воды, и затѣмъ орошать непрерывно до конца осени, когда полезно прерывать его на нѣсколько дней, такъ чтобы снѣгъ и начавшіеся морозы нашли лугъ совершенно сухимъ; иначе, т. е. въ случаѣ если бы морозъ захватилъ на лугу воду и образовался бы ледъ, необходимо продолжать орошеніе до оттепели, чтобы ледъ не осыпался на поверхности луга и не оголилъ его мѣстами (стр. 592), и затѣмъ, прекративъ орошеніе, дать обсохнуть лугу. Позднее непрерывное осеннее орошеніе можетъ повредить лѣншторфянымъ и болотно-черноземнымъ лугамъ, а потому требуетъ здѣсь большой осторожности.

Зимнее орошеніе возможно лишь въ очень тепломъ климатѣ; въ менѣе же тепломъ оно примѣняется развѣ для истребленія на лугу вереска, мха и нѣкоторыхъ другихъ сорныхъ травъ.

Весеннее орошеніе, пока еще не оттаяла болѣе глубокіе слои почвы, возможное на лугахъ съ естественной орошаемой поверхностью, такъ какъ здѣсь оно можетъ способствовать сходу снѣга и льда, рѣшительно вредно для луговъ съ искусственно устроенной орошаемой поверхностью. Въ это время ранней весной при болѣе холодной, чѣмъ воздухъ, водѣ, необходимо ограничиться лишь орошеніемъ въ теченіи 24—48 часовъ, повторяя его чрезъ пролежувшія времени въ нѣсколько дней, такъ чтобы воспользоваться только охраняющимъ и растворяющимъ дѣйствіемъ воды. Вообще, слѣдуетъ начинать орошеніе съ вечера и оканчивать поутру; покрывать лугъ водой въ ожиданіи утренника; орошать преимущественно въ пас-

журные и холодные дни, когда вода теплѣе воздуха и прекращать орошеніе въ теплые солнечные дни, чтобы открыть почву и растеній благотворному дѣйствію теплаго воздуха. Съ болѣе сильнымъ раскушеніемъ травы орошеніе прекращается, чтобы не загрязнить растений слишкомъ иломъ. Въ это время достаточно для смачиванія почвы наполнить водой лишь канавы въ случаѣ сухаго времени.

Лѣтомъ лугъ орошается съ цѣлю смочить траву съ вечера передъ косью для облегченія этой послѣдней (стр. 792); а, затѣмъ, если нѣтъ недостатка въ водѣ, то начинаютъ орошеніе недѣлю, даѣ спустя послѣ скося, чтобы дать обсохнуть нѣсколько срубившимъ стеблямъ; если же можно опасаться недостатка воды, то и раньше. Орошеніе въ это время не имѣетъ въ виду удобренія, а потому не должно быть сильнымъ: оно производится периодически, непродолжительными періодами и прекращается солѣмъ, какъ скоро поднимется нѣсколько трава и наступятъ болѣе длинные, прохладные, обильныя росами ночи, особенно въ влажныхъ и потому холодныхъ мѣстностяхъ.

Орошеніе необходимо должно сообразоваться съ состояніемъ влажности самой луговой почвы и требуетъ особенной осмотрительности на лугахъ съ малымъ паденіемъ поверхности при маломъ количествѣ воды и на вновь устроенныхъ лугахъ, на которыхъ еще не образовался настоящій дернъ.

Луга затопляются преимущественно весной и осенью, пока трава нетрогалась еще въ ростъ или уже прекратила ростъ и когда вода богата взмученными частями. Воду держатъ на поверхности луга нѣсколько дней, а затѣмъ спускаютъ ее и снова напускаютъ не раньше какъ обсохнетъ лугъ. Чѣмъ чаще повторяютъ напускъ, тѣмъ менѣе долго держать на лугу напущенную воду.

Для подтопленія луга закрываютъ шлюзы, чрезъ который стекаетъ вода съ осушеннаго болотистаго (обыкновенно торфянаго) луга, обыкновенно съ ранней весны и держать его закрытымъ до поздней осени, за исключеніемъ времени сѣнокоса, когда открываютъ на короткое время шлюзы съ тѣмъ, чтобы повизвить нѣсколько уровень важной воды въ почвѣ.

8) *Въ выборъ времени для кошенія* луга слѣдуетъ руководствоваться соображеніями, приведенными на стр. 791. У насъ, вообще говоря, запаздываютъ слишкомъ уборкой луговъ, что ведетъ къ усиливающемуся изъ году въ годъ засоренію луга сорными травами (напр. эвонцемъ) и ослабленію отавы. Что касается уборки въ остальномъ, то см. стр. 791—801.

9) Лугами можно пользоваться не только для покоса, но и для *пастбища*. Скотъ утаптываетъ луговую почву (дѣйствуетъ какъ катокъ см. выше) и постоянно объѣдаетъ травы, усиливая этимъ ихъ плодотворность и истребляя преимущественно одно-

лѣтнія сорные травы, которыя не достигаютъ при этомъ образованія сѣмянъ. А потому, стравливаніе луговъ скотомъ можетъ быть весьма полезно для луговъ, если только скотъ не выгоняется на луга въ то время, когда луговая почва сыра (ранней весной и поздней осенью), или пока еще трава не взяла силы (рано весной и вскорѣ послѣ скося), такъ какъ перелос ведетъ къ образованію кочекъ, а второе къ ослабленію растительности. Поэтому, слѣдуетъ стремиться къ тому, чтобы вовсе не выгонять скота на луга въ тотъ годъ, когда они косятся, а лучше предоставлять лугъ стравливанію периодически чрезъ 3—4 или 5 лѣтъ, иначе стравливать ежегодно известную ($\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{5}$) часть луга, не производя уже на стравливаемой части въ томъ году покоса. Или же, выгоняя скотъ на лугъ въ годы кошенія этого послѣдняго, стравливать скоту отаву, если не имѣется въ виду другаго пользованія этой послѣдней, не выгоняя для этого скота, однако, слишкомъ скоро послѣ скося и не оставляя его на лугу слишкомъ долго и поздно осенью, чтобы растенія могли образовать запасы, обезпечивающіе первое развитіе ихъ весной, и чтобы скотъ не вытаптывалъ сырой луговой почвы. На увлажняемыхъ лугахъ, на которыхъ скотъ можетъ повредить канавки, гребни и т. д., выгонять скота ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ.

10) *Осень* есть наиболѣе благоприятное время для уничтоженія кротовины, (лучше всего луговымъ стругомъ (стр. 871), къ которому придрѣланъ хворостъ для разравниванія рыхлой земли), появившихся кустарника и крупныхъ сорныхъ травъ и исправленія канавъ, служащихъ для осушенія луга. На увлажняемыхъ лугахъ ко времени осенняго увлажненія должны быть осмотрѣны и исправлены всѣ сооруженія, какъ-то канавы, шлюзы и т. д.

Наконецъ неувлажняемые луга, если они легко засоряются сорными травами, а по положенію своему, обезпечивающему для растеній пользованіе достаточнымъ количествомъ влаги, допускаютъ возобновленіе дернины, полезно отъ времени до времени (въ 10—15—20 лѣтъ разъ) перепаживать и занимать ихъ сперва хлѣбнымъ зерновымъ (озимымъ или яровымъ), затѣмъ паровымъ или прямо паровымъ и, наконецъ, яровымъ зерновымъ растеніемъ, подъ которое подставляютъ травы (стр. 880). Такъ, напр., заливные луга по Днѣпру, мѣстами у насъ, перепаживаются съ занятіемъ ихъ капустой, по капустѣ именованъ, послѣ котораго залужаются безъ искусственнаго обсемененія ихъ даже. Для занятія перепаживаемыхъ заливныхъ луговъ не всегда годятся озими, которыя, въ годы малой воды, вытираются льдомъ; для занятія же перепаживаемыхъ заливныхъ луговъ, съ которыхъ поздно сходитъ вода, годны изъ яровыхъ растеній такіа, которыя высѣваются или высаживаются въ полѣ сравнительно поздно, какъ-то: капуста, ячмень, конопля и т. д.

ПОТРЕБНОСТЬ ХОЗЯЙСТВА ВЪ РАБОЧЕЙ СИЛѢ.

Потребность въ рабочемъ скотѣ.

Сельскій хозяинъ, дѣйствуя какъ промышленникъ, избираетъ не тѣ виды рабочаго скота, которые ему *болѣе нравятся*, но тѣ, которые доставляютъ *наивысше и дешево* потребную работу, хотя бы избранныя животныя, разсматриваемыя *сами по себѣ*, обладали даже меньшою силою, или при *другихъ* условіяхъ представляли менѣе выгоды. Для производства упряжныхъ работъ употребляются лошади, волы и коровы; послѣднія, какъ рабочій скотъ, имѣютъ значеніе только въ очень малыхъ хозяйствахъ, не выносящихъ по своимъ размѣрамъ содержаніе 1 лошади или пары воловъ.

Преимущества *лошадей* состоятъ въ способности ихъ къ употребленію на самыя разнообразныя сельскохозяйственныя и перевозочныя работы и въ большемъ количествѣ работы, исполняемой ими въ единицу времени, сравнительно съ волами; выгоды *волово* заключаются въ нѣсколько меньшей стоимости содержанія ихъ, большемъ количествѣ получаемого отъ нихъ навоза и возможности значительнаго возвышенія цѣнности бракуемыхъ животныхъ посредствомъ откармливанія.

Меньшая стоимость содержанія воловъ сравнительно съ лошадьми условливается главнымъ образомъ меньшимъ расходомъ на возобновленіе капитала въ скотѣ (въслѣдствіе откармливанія брака) и меньшими издержками на уходъ, ковку, утварь разнаго рода и пр.; что же касается до расходовъ на *кормленіе*, то они верѣяко одинаковы для обоихъ видовъ животныхъ, если только разсчитать стоимость кормленія на количество производимой полезной работы. Выгоды употребленія на работу *коровъ* состоятъ въ *одновременномъ* пользованіи ими, какъ *молочными* животными и въ возможности послѣдующаго *откармливанія*. Но главное условіе, опредѣляющее выгодность всѣхъ видовъ рабочаго скота, состоитъ преимущественно въ томъ, на сколько въ хозяйствѣ представляется возможность къ *постоянному* производству полезной работы въ *теченіе цѣлаго года*.

Число потребнаго рабочаго скота зависитъ отъ свойства почвы, особенно отъ большей или меньшей плотности ея, отъ климата, опредѣляющаго срокъ, въ теченіе котораго должны или могутъ производиться главнѣйшія упряжныя работы, и также отъ принятой системы хозяйства. При огульныхъ сѣткахъ, не требующихъ особенной точности, верѣяко принимаютъ, что въ хозяйствѣ требуется столько рабочаго скота (переведеннаго на лошадей), сколько нужно, чтобы можно было осенью и весною окончить всѣ полныя упряжныя работы по воздѣлыванію хлѣба въ теченіе 3—4-хъ недѣль; полагаютъ, что опредѣленное такимъ образомъ число скота достаточно для производства всѣхъ работъ въ теченіе *цѣлаго года*.

Вопросъ о томъ, какія упряжи заслуживаютъ предпочтенія, въ 1—2 и болѣе животныхъ, рѣшается условно, смотря по роду упряжныхъ работъ въ хозяйствѣ вообще. Волы, впрочемъ, негодятся для одиночной упряжи, такъ какъ управленіе однимъ животнымъ, поворачиваніе его и пр. гораздо труднѣе, нежели управленіе паромъ. Одиночныя упряжи заслуживаютъ безусловнаго предпочтенія при очень легкой почвѣ, при работѣ на легкихъ орудіяхъ и нестдаленныхъ перевозкахъ небольшихъ грузовъ, какъ напр. при земляныхъ работахъ. Напротивъ, транспортъ значительныхъ тяжестей и на болѣе далекая разстоянія производится дешевле посредствомъ парныхъ упряжей.

Само собою разумѣется, что при выборѣ рабочаго скота должно быть обращено достаточное вниманіе на состояніе здоровья, силу, строеніе груди, на ноги и нравъ животныхъ, а для воловъ также и на тѣ свойства, которыя указываютъ на способность къ откармливанію, обыкновенно слѣдующему за окончаніемъ службы для работы.

При опредѣленіи мѣры работы, исполняемой лошадью, полагаютъ, что при горизонтальной тягѣ лошадь уравниваетъ грузъ, равный ея собственному вѣсу (приблизительно 600 ф.); въ теченіе дня лошадь можетъ работать 10 часовъ при 2—3 часовомъ отдыхѣ среди работы; при перевозкѣ груза, или работѣ плугомъ, при грузѣ, равномъ *удвоенному* вѣсу лошади, она дѣлаетъ въ минуту 80—90 шаговъ и проходитъ 160—180 футовъ протяженія; при горизонтальной тягѣ и перевозкѣ по хорошей дорогѣ лошадь работаетъ съ проявленіемъ силы въ 240—290 фунтовъ, на неровной и дурной дорогѣ — 180—200 ф. и въ горахъ 120 ф.; при обработкѣ плугомъ тяжелыхъ и каменистыхъ почвъ, проявленіе силы лошади можетъ быть принято въ 156 фунтовъ, на обыкновенныхъ глинистыхъ почвахъ — 135 ф., суглинистыхъ 125 ф. и легкихъ песчаныхъ 116 ф.

Рабочій волъ въ 800 ф. вѣсомъ уравниваетъ равный собственному вѣсу грузъ, при перевозкѣ груза; равнаго *удвоенному* собственному вѣсу, волъ проходитъ въ минуту 150—170 футовъ.

Одной пары хорошихъ рабочихъ лошадей достаточно для обработки 10—25 десятинъ полей, а именно:

при тяжелой почвѣ	10—15 дес.
» средней »	15—20 »
» легкой »	20—25 »

при выгонной системѣ хозяйства потребность въ рабочемъ скотѣ можетъ быть принята на 20—30% меньше. На пару лошадей требуется одинъ постоянный работникъ; при очень большомъ хозяйствѣ одному рабочему могутъ быть поручаемы 4 лошади.

Двѣ пароконныя равны тремъ пароволовымъ упряжамъ, а эти послѣднія равны 5—6 упряжамъ коровъ, предполагая сравненіе относительно работъ, которыя по своей легкости могутъ быть вообще выполняемы коровами.

Если въ хозяйствѣ нѣкоторыя работы производятся на переменныхъ (смѣняющихся въ теченіе дня) волахъ, то въ смѣтахъ потребнаго количества скота можно считать 8 переменяющихся воловъ при двухъ рабочихъ равными 6 работающимъ безсѣнно воламъ съ 3 рабочими.

Число рабочихъ дней въ году можетъ быть принято:

для лошадей	230—290 дней.
» воловъ	160—220 »

Смотря по климату, почвѣ и распредѣленію праздниковъ, упряжные рабочіе дни распредѣляются слѣдующимъ образомъ по временамъ года:

на весну приходится	55—70 дней.
» лѣто »	65—80 »
» осень »	60—75 »
» зиму »	50—65 »

Продолжительность работы въ теченіи дня можно принять:

	для лошадей	для воловъ
весною	10 часовъ	8 часовъ
лѣтомъ	11 »	10 »
осенью	10 »	8 »
зимой	8 »	7 »

Наконецъ, что касается до количества работы, которое въ хозяйствѣ выгодно исполнять волами и лошадьми, то въ большемъ среднемъ выводѣ полагаютъ, что посредствомъ воловъ можно съ успѣхомъ выполнять не болѣе $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ всѣхъ упряжныхъ рабочихъ дней въ хозяйствѣ.

Стоимость содержанія рабочаго скота.

Расходъ на рабочихъ лошадей.

Недорогое содержаніе рабочаго скота составляетъ основное условіе доходности полевыхъ работъ. Но съ другой стороны, дешевымъ содержаніемъ рабочихъ животныхъ можно признать лишь такое, которое возстановляетъ вполне и съ наименьшими издержками силы животныхъ, потребляемыхъ при работѣ. Подобная задача можетъ быть разрѣшена только при помощи обильнаго и цѣлесообразнаго кормленія, безъ котораго вообще немислимъ успѣхъ какой бы то ни было отрасли скотоводства.

При опредѣленіи стоимости содержанія лошадей вычисляются слѣдующія величины: расходъ на кормовыя средства, проценты со всѣхъ капиталовъ въ лошадяхъ и строеніяхъ, расходы на уходъ и попеченіе, на леченіе, ковку и утварь, составляющую принадлежность конюшенъ.

Годовая потребность въ кормѣ и подстилкѣ.

Лошадь требуетъ въ кормъ среднимъ числомъ на 1000 фунтовъ живаго вѣса: органическаго вещества 20 ф., бѣлковыхъ веществъ 42 фунта, безазотистыхъ вѣщ. 12 ф. и древесины 6 ф.; при выраженіи же корма по извѣстнымъ нормамъ въ переводѣ на сѣно, лошадь требуетъ на каждыя 100 ф. живаго вѣса 3—3 $\frac{1}{2}$ ф. корма въ питательности сѣна. Количество объемистаго корма, какъ напр. соломы, въ дневныхъ дачахъ корма лошади можетъ простираться до 8—18 сунтовъ.

Наиболѣе соответствующую природѣ лошади кормовыя средства изъ зеренъ, сѣна и соломы; лучший зерновой кормъ представляетъ овесъ. Зерна бобовъ, вики и ржи имѣютъ такъ называемыя горячительныя свойства, а потому могутъ быть даваемы лошадямъ въ ограниченномъ количествѣ, всегда вмѣстѣ съ овсомъ и большою прибавкою соломенной сѣчки. Выборъ того или другаго рода зерноваго корма опредѣляется съ одной стороны цѣною зерна, а съ другой его питательностью, которую эмпирически полагаютъ:

1 четверикъ пшеницы равенъ	2 $\frac{2}{3}$ четка овса.
1 » бобовъ »	2 $\frac{1}{3}$ » »
1 » ржи »	1 $\frac{1}{2}$ » »
1 » ячменя »	1 $\frac{2}{3}$ » »

При замѣнѣ овса другими зернами, не слѣдуетъ простирать ее болѣе 6—7 ф. овса въ день.

Среднюю величину корма лошади можно принять:

	на 1 день	на 1 год
Овса	10 — 12 фунт.	90 — 105 пудовъ
Сѣна	5 — 10 "	45 — 90 "
Свѣчки	2 1/2 — 5 "	25 — 45 "
Подстилочной соломы	3 — 6 "	27 — 50 "

При усиленных работах эти нормы должны быть несколько увеличены; напротив зимой, когда работы мало, они могут быть значительно уменьшены.

Чѣмъ равномернѣе распределены упряжные работы по всѣмъ временамъ года, тѣмъ равномернѣе должно быть и кормленіе. Если назначеніе рабочей лошади состоитъ въ употребленіи ея силы, то матеріалъ для образованія послѣдней долженъ каждый разъ создаваться въ организмъ до работы, но не послѣ нея. Скудное кормленіе лошадей зимою, доводимое иногда до изнуренія животныхъ, есть ничто иное, какъ *мотовство кормовыхъ средствъ*.

Возовыя крупныя лошади получаютъ кормовыя дачи вдвое большія сравнительно съ вышеприведенными.

При учетѣ стоимости содержанія рабочихъ лошадей весьма часто выключаютъ солому изъ вычисленія, полагая ее равною по цѣности съ получаемымъ навозомъ, который въ свою очередь не ставится въ приходъ. Мы не рекомендуемъ этого способа, основаннаго на совершенно произвольномъ предположеніи; результатъ во всякомъ случаѣ получится точнѣе, если одѣлать затрачиваемую солому, сообразно ея питательности, приблизительно въ 2 раза дешевле сѣна, а навозу поставить ту стоимость, по которой обходится производство его продуктивнымъ скотомъ — въ томъ же хозяйствѣ, такъ какъ эта стоимость представляетъ собою хозяйственную цѣну навоза.

Стоимость годового содержанія одной рабочей лошади, не включая инвентаря и ухода.

5% съ покупной цѣны лошади въ 100 р.	5 р. — к.
Ежегодное уменьшеніе цѣности 10%	10 " — "
Ковка	3 " — "
Леченіе и соль	1 " — "
Осѣненіе стойла	— " 50 "
% съ капитала и на погашеніе его въ строеніяхъ.	3 " — "
Кормъ и подстилка:	
Овса 90 пуд. = 15 четверт. по 2 р. за 1 четверть	30 " — "
Сѣна 90 пуд. по 15 к. за 1 пудъ	13 " 50 "
Соломы кормовой и подстилочной 100 пуд. по 7, 5 коп. за пудъ	7 " 50 "
Сумма	73 р. 50 к.

Изъ этой суммы вычесть:

10 возовъ навоза по 45 пуд. = 450 пуд., оцѣнваемыхъ по стоимости производства въ продуктивномъ скотоводствѣ, положимъ, въ 1 к. пудъ	4 р. 50 к.
Останется	69 р. — к.

Отсюда, содержаніе пары лошадей стоятъ 138 руб., 4-хъ лошадей 276 руб. и т. д., не считая прислуги и рабочего инвентаря. Само собою разумѣется, что назначеніе представленнаго учета заключается лишь въ указаніи метода оцѣнки, такъ какъ съ измѣненіемъ цѣны лошадей и кормовыхъ средствъ измѣнится и стоимость содержанія рабочего скота, которая можетъ быть опредѣлена съ точностью только по мѣстнымъ даннымъ.

Стоимость рабочего инвентаря, рассчитаннаго на 4 лошадей.

Два пароконныя тележки (фуры) для перевозки урожая и удобренья со всѣми принадлежностями по 80 руб.	160 р.
Два плуга по 16 р.	32 "
Одна конная мотыга	10 "
Два пары боронъ по 8 руб.	16 "
Два окучиваки по 8 р.	16 "
Два бороздныя бороны по 6 р.	12 "
Катокъ	12 "
Четыре прибора сбруи по 10 р.	40 "
Помѣщенія для дневнаго корма, скребницы и щетки, вилы и пр.	10 "
Подмазка тележекъ, мазь и проч.	8 "
Сумма	316 р.

Вся стоимость содержанія двухъ пароконныхъ упряжей, включая рабочихъ людей.

Стоимость содержанія только лошадей, опредѣленная выше	276 р.
25% съ капитала въ инвентарѣ (% съ кап., ремонтъ и погашеніе) = 316 р.	79 "
Жалованье и содержаніе 1 постояннаго работника въ годъ	120 "
Стоимость полуработника помогающаго конюху	50 "
Сумма	525 р.

Отсюда стоимость одной параконной упряжи, приблизительно обходится:

на содержаніе двухъ лошадей	138 р. — к.
25% съ капитала въ инвентарѣ равнаго 158 р.	39 " 50 "
Стоимость человеческой работы	85 " — "
Сумма	262 р. 50 к.

	Десятины.
Одна сильная лошадь (или пара средних) проводить 5 лемеш- ных маркером борозды на пространстве	2 1/2—3
Дневная работа боронь, катков и волокуш.	
Две лошади боронят поле за один день двумя одноконными боронами	3 —4
Две лошади при одной тяжелой боронь	2 —3
Две лошади боронят при круговой боронь	1 1/2—2
Одна лошадь боронит ряды картофельною бороздною бороною	1 1/2—2
Две лошади с брабантской волокушей	2 1/2—3
Две лошади укатывают катком в 8 футов длины	4 1/2—5
Одна лошадь с катком в 5—8 фут.	3 —3 1/2
Две лошади при каткѣ с зубцами	3 —4
Три лошади с глыбодробомъ	2 1/2—3

Дневная работа съялок и жней.

Одна сильная (пара средних) лошадь обсеивает съялкою вь разбросъ <i>Альбана</i>	5 —7 1/2
Одна сильная (2 средн.) лошадь с универсальною съялкою <i>Кеммерера</i>	5 —6
Одна сильная (2 средних) лошадь с рядовою съялкою <i>Гаррета</i>	3 —4 1/2
Одна сильная (2 средн.) лошадь с барабанною съялкою <i>Вил- ямсона</i>	3 —3 1/2
Одна сильная (2 средн.) лошадь обсеивает большую (18 фут. длины) шотландскою шеточною съялкою (прим. для клевера)	3 1/2—5
Одна сильная лошадь разсыпает порошковатыя удобрения ма- шиною <i>Чамберса</i>	3 —5
Одна сильная (2 средн.) лошадь косить сенокосилкою <i>Вуда</i> и др.	3 —3 1/2
Одна сильная лошадь с сеноворошилкою	2 1/2—3 1/2
Две лошади с жатвешною машиною (<i>Вуда</i> , <i>Джонстона</i> , <i>Макъ- Корника</i>) срѣзываютъ хлѣбъ	5 —6
Одна лошадь с конными граблями	3 1/2—5

Приведенныя данныя взяты при предположеніи разстоянія угодій отъ
усадьбы не далѣе 1 версты; при увеличеніи разстоянія можно приять, сред-
нимъ числомъ, что на каждую 1/2 версты дневное количество работы ма-
шины и орудій уменьшается на 5%.

Вычисленіе перевозочныхъ работъ.

Для производства перевозочныхъ работъ въ хозяйствѣ употребля-
ются или четырехколесныя тележки и фуры (рис. 251) или двухколесныя
тележки—тачки (рис. 207 и 261) или тѣ или другія орудія, смотря по
удобству производства различныхъ перевозочныхъ работъ. Смотря
по величинѣ и грузу, тѣ и другія орудія могутъ быть одно-, дву- и
четырехконныя. Выгоды двухколесныхъ тележекъ—тачекъ состоятъ
въ томъ, что при нихъ наблюденіе за упряжью и управленіе ею зна-
чительно легче; высокія колеса обуславливаютъ меньшее треніе срав-
нительно съ четырехколесными фурами, нагрузка и разгрузка произ-
водятся гораздо скорѣе опрокидываніемъ тачки на поперечной гори-
зонтальной оси; наконецъ, сообщеніе этому орудію равной степени

прочности обходится дешевле, нежели при четырехколесныхъ повоз-
кахъ. Обратнo на сторонѣ послѣднихъ могутъ быть поставлены слѣ-
дующія преимущества: четырехколесныя тележки и фуры могутъ слу-
жить для разнообразныхъ назначеній и имѣютъ болѣе большой кругъ примѣ-
неній; они допускаютъ употребленіе въ дѣло мѣсье сильныхъ живот-
ныхъ и болѣе берегаютъ послѣднихъ при работахъ, что особенно важ-
но при гористой мѣстности и частыхъ спускахъ съ горъ; при перевозкѣ
на одно и тоже число упряжнаго скота здѣсь требуется меньше лю-
дей; при высокой нагрузкѣ предостѣять менѣе опасности опрокиды-
ванія воза и т. п. Количество перевозочной работы, которое можетъ
быть исполнено въ хозяйствѣ въ данное время, напр. въ 1 рабочий
день, зависитъ отъ силы и качества рабочего скота, величины на-
грузки, отъ разстоянія, качества дорогъ и нѣкоторыхъ другихъ
обстоятельствъ. На обыкновенныя одноконныя тележки накладывается
грузъ, среднимъ числомъ, въ 15 пудовъ, при хорошихъ лошадяхъ—
до 30 п. На провѣздъ воза полагается на версту 1/4 часа, на каждую
нагрузку и разгрузку воза тоже 1/4 часа.

Въ зависимости отъ этихъ данныхъ, одноконная тележка можетъ
въ день сдѣлать нижепоказанное число оборотовъ, а полагая грузъ
въ 15 и 30 пудовъ, каждая лошадь можетъ за день перевезти пока-
занный въ сѣ сельскохозяйственныхъ продуктовъ.

При среднемъ разстояніи въ одинъ конецъ.	Число оборотовъ.	Число перевезенныхъ пуд. въ, когда возъ =
		15 пуд. 30 пуд.
100 саж.	20	300 600
200 "	17	255 510
300 "	15	225 450
400 "	13	195 390
1 верста	10	150 300
2 "	6	100 200
3 "	5	75 150
4 "	4	60 120
5 "	3	45 90
10 "	1	15 30

Весною и осенью, когда дни короче, количество перевозочной
работы въ день должно быть нѣсколько сокращено противъ показан-
ныхъ нормъ. Въ полѣ, для нагрузки сноповъ на тележку можно счи-
тать, что въ день одинъ человѣкъ успѣетъ погрузить возчику 11 те-
лежекъ, полагая на тележку по 250 сноповъ. На разгрузку тележекъ и
увязку въ сарай должно считать въ день, кромѣ возчика, на каждыя
10 тележекъ по 1 рабочему.

Величину груза на 2 лошадей или воловъ,
при паравонной фурѣ, можно приять, смот-
ри по скоту, ... 45—60 пуд.
На 4 лошадей, или воловъ 75—90 .

На основаніи приведенныхъ данныхъ, можно вычислить количество всякой перевозочной работы въ день, если известны: расстояние, на которомъ производится провозъ и средняя величина груза тележки или фуры. Не трудно также опредѣлять, по даннымъ—расстоянію и среднему грузу тележки число упряжныхъ рабочихъ дней, потребныхъ для выполнения всякой перевозочной работы относительно известнаго пространства, напр. перевозки опредѣленнаго урожая съ 1 десятины, или вывозка даннаго количества удобрения на известное пространство и пр.

Примѣрная смета потребныхъ въ хозяйствѣ упряжныхъ работъ.

1) Нижеслѣдующая смета относится къ малому имѣнію, состоящему изъ 30 десятинъ полей и 4 десятинъ луговъ, въ которомъ ведется улучшенная трехпольная система хозяйства.

Полевая земля занята ежегодно слѣдующимъ образомъ: 10 десятинъ озимымъ хлѣбомъ, 10 десят. яровымъ хлѣбомъ, 6 дес. — клеверомъ, кормовою капустой, картофелемъ, горохомъ и викою, 4 десят. подъ чернымъ паромъ. Работы по воздѣлыванію требуютъ содержанія пары сильныхъ лошадей и производятся приблизительно въ слѣдующемъ порядкѣ:

а) *Весенній періодъ.* Отъ половини марта до конца мая; 64 рабочихъ дня.

Десятинъ.		Дни.
1 ¹ / ₄	занята пара викою и горохомъ, подъ которые навозъ вывезенъ еще зимою, вспахать одинъ разъ плугомъ и заборонить посѣвъ	3 ¹ / ₂
2 ¹ / ₂	занята пара капустою, картофелемъ и пр., подъ которые половина навоза вывезена и запахана съ осени, а половина вывозится передъ посѣвомъ, пахать два раза и боронить одинъ разъ	15
1 ¹ / ₄	предвидимаго пространства удобрить 50 пароконными возами навоза, на вывозу	5
5	ячменнаго поля поднять и тщательно разборонить	10
5	ячменнаго поля передвонить, заборонить сѣмена и прикатать	10
5	овсянаго поля пахать и боронить	10
		53 ¹ / ₂

Слѣдовательно, весною остаются еще 10 1/2 упряжныхъ рабочихъ дней для другихъ работъ.

б) *Лѣтній періодъ* — отъ 1-го іюня до конца августа; 78 рабочихъ дней. Въ этомъ періодѣ предстоятъ слѣдующія упряжныя работы:

Десятинъ.		Дни.
4	чернаго пара; вывезти навоза 150 пароконныхъ возовъ	15
4	луговъ; снести 10 возовъ сѣна	2
2 ¹ / ₂	клевера; снести 3 воза сѣна и 32 воза зеленой травы	6 ¹ / ₂
4	чернаго пара; три раза вспахать и боронить	22 ¹ / ₂

2 1/2	картофеля и капусты; мотыжить, окучивать и обрабатывать бороздною бороной	8
10	озими; снести урожай	5
10 1/2	ярового; снести урожай	4 1/2
1 1/4	горохового и виковаго жнивьѣ; поднять	2 1/2
		66

Для другихъ работъ остаются еще 12 дней.

в) *Осенній періодъ.* Отъ 1-го сентября по 1-е декабря; 78 рабочихъ дней.

Десятинъ		Дни.
5	снести второй укосъ луговаго и клевернаго сѣна	2
10	обработка озими	20
2 ¹ / ₂	выпахивать корнеплоды	5
2 ¹ / ₂	перевозка корнеплодовъ	6
20	взметъ жнивьѣ безъ бороньбы	32
1 ¹ / ₄	вывозка половини навознаго удобрения подъ корнеплоды, 50 возовъ	5
1 ¹ / ₄	запахивка навоза	2 ¹ / ₂
		<u>72¹/₂</u>

Остаются 5 1/2 дней.

Если, такимъ образомъ, пары лошадей достаточно для совершенія всѣхъ весеннихъ, лѣтнихъ и осеннихъ работъ, то тѣмъ болѣе ихъ достаточно для производства всѣхъ зимнихъ работъ (вывоза сѣна, дровъ, доставки продуктовъ на рынокъ и пр.). Для хозяйства въ 60 — 70 десятинъ было бы достаточно 4-хъ лошадей.

2) Въ этомъ примѣрѣ сдѣлана смета упряжныхъ работъ для хозяйства съ 300 десят. полей при плодосѣбной системѣ, безъ чернаго пара, съ воздѣлываніемъ рапса и корнеплодовъ. Кроме полей, въ имѣніи находится еще 38 дес. луговъ. Порядковъ слѣдованія растений въ сѣвооборотѣ и пространства подъ отдѣльными культурами слѣдующія:

88 дес. подъ озимымъ хлѣбомъ	1. Озимь и двуклѣтній клеверъ.
80 " " яровымъ	2. Озимь, ярь и рапсъ.
50 " " корнеплодами	3. Корнеплоды и озимь.
16 " " горохомъ, викою и др. зел. кормомъ	4. Озимь, ярь и корнеплоды.
82 " " однолѣтн. клеверомъ	5. Ярь.
17 " " двуклѣтн. клеверомъ	6. Горохъ, вика и корнеплоды.
17 " " рапсомъ и сурьпицей	7. Озимь.
	8. Ярь.
	9. Клеверъ.

300 дес.

При такомъ сѣвооборотѣ въ хозяйствѣ требуется содержать: 16 лошадей; или 12 лошадей и 6 безсѣмянныхъ или 8 перемѣняющихся воловъ. Опредѣляемая сѣвооборотомъ работы будутъ производиться въ слѣдующемъ порядкѣ.

а) Въ 64 весеннихъ рабочихъ дня.

Десятинъ.		Дни.
16	одна вспашка подъ горохъ, вику и др. зел. кормы 8 плугами	5 1/2
50	дѣй вспашки и бороньбы подъ корнеплоды	25
9	вывозка 350 возовъ навоза подъ корнеплоды	4 1/2
30	ячменнаго поля; двѣ вспашки и бороньба	16
50	оса; полная обработка	12 1/2
		63 1/2

6) Въ 78 лѣтнихъ рабочихъ дней.

Десятины.		Дни.
17	жнивья двулѣтнаго клевера; вспахать 3 раза подъ рансь съ бороньюю	4
17	двулѣтнаго клевера и	
12 1/2	корнеплодовъ; в всего на 30 дес. вывезти 1200 возовъ навоза	15
50	корнеплодовъ; два раза окучивать	4
88	озимй; свезти урожай, 240 возовъ	6
16	гороха и вики; свезти урожай	2
80	ярого; свезти 160 возовъ урожая	4
16	запахать жнивье вики и гороха	5 1/2
17	запахать рапсового жнивья	5 1/2
12 1/2	запахать рано скошеннаго клевера	4 1/2
28	взметъ хлѣбнаго жнивья	7
82 1/2	свезти 25 возовъ клевернаго сѣна	1
	и 200 возовъ зеленого клевера	7
32 1/2	свезти 16 возовъ клевернаго сѣна втораго укоса и 150 возовъ зеленого клевера	6
33	свезти 75 возовъ луговаго сѣна	3 1/2
		75 1/2

в) Въ 78 рабочихъ дней осенью.

Десятины.		Дни.
20	вспахивка клевернаго жнивья	5
37	свезти отаву, 32 воза	1 1/2
42	взметъ хлѣбнаго жнивья	10 1/2
50	вспахивка корнеплодовъ	12 1/2
50	обработка поля корнеплодовъ	12 1/2
50	свозка урожая корнеплодовъ, приблизительно 1200 возовъ	17
11	вывозка навоза подъ корнеплоды, 360 возовъ	11
11	запахивка навоза подъ корнеплоды	4
		74

Изъ приведенной смѣты видно, что вышеозначенное количество упряжнаго скота совершенно достаточно для выполнения всѣхъ упражняемыхъ работъ при данной системѣ хозяйства.

3) Слѣдующая примѣрная смѣта относится къ хозяйству въ 300 дес. полей и 38 дес. луговъ при 8-ми полной выгоной системѣ съ чернымъ паромъ. Сѣвооборотъ и воздѣлываемыя пространства слѣдующія:

1	клевъ	37 1/2	дес.	пара
1	"	37 1/2	"	озимаго хлѣба
1	"	37 1/2	"	ячменя
1	"	37 1/2	"	овса
1	"	37 1/2	"	клевера на укосъ
8	"	112 1/2	"	выгона

При такомъ хозяйствѣ потребовалось бы держать 10 сильныхъ лошадей, 1/6—1/4 часть которыхъ можетъ быть замѣнена соответственнымъ числомъ воловъ. Главныя упряжныя работы слѣдуютъ въ нижеприведенномъ порядкѣ.

а) Въ 64 рабочіе дня, весной.

Десятины.		Дни.
37 1/2	подъ ячмень два раза пахать и забороновать посѣвъ, 5 плугъ	30
37 1/2	подъ овесъ полная обработка	15
19	поднять выгонъ	10
		55 1/2

Остаются свободными 9 дней.

б) Въ 78 рабочихъ дней лѣтомъ:

Десятины.		Дни.
37 1/2	пара—два вспашки и боронья	30
37 1/2	вывозки 1500 возовъ навоза	30
37 1/2	свезти озимый урожай (136 возовъ)	4
37 1/2	свезти урожай ячменя (72 воза)	2
37 1/2	свезти урожай овса (48 возовъ)	1 1/2
37 1/2	свезти клеверное сѣно перваго укоса	3
37 1/2	свезти луговое сѣно	3 1/2
37 1/2	свезти клеверное сѣно 2 укоса	3 1/2
		77 1/2

в) Въ 78 рабочихъ дня осенью.

Десятины.		Дни.
37 1/2	посѣвная вспашка и боронья	15
37 1/2	свозка отавы (30 возовъ)	2
75	взметъ подъ овесъ и ячмень	30
19	подъемъ и боронья выгона	10
		57

Остаются еще свободными 21 день.

Во всѣхъ трехъ примѣрахъ упряжи приняты пароконныя.

Для ручныхъ работъ.

При посѣвѣ. Относительно посѣва въ разбросъ см. стр. 742 и таблицу (838 и 840), въ которой показано количество сѣмянъ на десятину.

При посадкѣ: а) сѣмянъ—для засадки десятины свекловичными сѣменами, смотря по разстоянію между рядами, 10—16 женщ. б) клубней—для засадки десятины подъ плугъ или въ отвѣриваемыя мотыгой лунки 7—12 женщ.; в) рассады—для засадки десятины 17—18 женщ.

При уходѣ за растеніями во время прорастанія. Для прополки десятины необходимо 25—40 женщ. Для промѣтыванія десятины, смотря по разстоянію между рядами, глубинѣ мотыженія и свойствамъ и засоренности почвы, 12—30 женщ. Для окучиванія растеній на десятинѣ 15—25 женщ. Для очистки отъ земли растеній, заваленныхъ при обработкѣ междурядій коновыми орудіями, на десят. 13—22 женщ.

При уборкѣ растеній: а) кормовыхъ. Въ зависимости отъ густоты (величины урожая) и свойства травы (нѣжная трава требуетъ больше), для своса

*) Рабочій день считается въ 10—12 часовъ.

десятины необходимо $1\frac{1}{2}$ —2 (при 50—60), 2 (при 100—150) и 3 косца (при 200—300 пуд. урожая травы на десятины). Для сушки травъ съ ворошеишемъ и сгребаниемъ въ кучи, въ зависимости кромѣ вышеприведенныхъ обстоятельствъ отъ состоянія погоды, въ благоприятную погоду, необходимо на десятину $1\frac{1}{4}$ раб. при урожай въ 40 пуд. травы съ десятины и 1 раб. сверхъ того для каждыхъ 40 пуд. урожая травы свыше 40. Для болѣе затруднительной сушки клевера, необходимо на десятину 3 раб. при урожай въ 80 пуд. клевера на десятины и $\frac{1}{4}$ —1 раб. сверхъ того для каждыхъ 40 пуд. урожая клевера свыше 80. Для укладкы сѣна въ стоги: обыкновеннымъ способомъ — на 100 пуд. сѣна 2 раб. съ лошадыю; съ помощью сѣноподъемника Кольмана (стр. 847), на установку котораго требуется 30—40 мин., одна кобыла сѣна въ 10—15 пуд. поднимается въ 2—3 раза, тогда какъ при ручной укладкѣ за 10—15 разъ. При этомъ нужны 1 лошадь съ мальчикомъ — проводникомъ для подъема сѣна, 2 работника на стогъ и одинъ съ 3 женщинами вниз. Для нагрузки 600 пуд. сѣна въ стога на возы необходимы 2 работника съ 2 работницами. Сѣннымъ прессомъ Ингерсола (стр. 848), при 2—4 человекахъ прислуги, не считая рабоч. необходимыхъ для подвозки сѣна въ прессу, можно спрессовать отъ 50 до 60 копъ, въсомъ въ 4 (при маломъ) и 6 пуд. (при большомъ прессѣ) каждая; для вывѣшиванія этого количества необходимо 2 человека. Въ вагонъ (Никол. желѣзн. дор.) помѣщается 220—250 пуд. прессов. сѣна.

б) *Зерновые*. Для уборки серпомъ, вмѣстѣ съ вязкой въ снопы и составленіемъ этихъ послѣднихъ въ коны (бабки, кресты и т. д.), смотря по роду растений и ихъ состоянію, необходимо отъ 5 до 22 жнецовъ на десятину. Уборка масляныхъ растений требуетъ рабочихъ рукъ меньше уборки другихъ растений; уборка яровыхъ хлѣбовъ меньше уборки озимыхъ и уборка рѣдко и прямо стоящихъ растений меньше густостоящихъ и полеглыхъ. Для уборки серпомъ озими необходимо 5—7 (при 15), 8—9 (при 15—20) и 9—12 (при свыше 20 копень, въ 5 2 снопа каждая, урожай на десятины) жнецовъ на десятину. На десятину необходимо для уборки косой:

При урожай на десятины:

Мѣсяцъ	10	10—15	15—20	Свыше
Озимого хлѣба....	2	$2\frac{1}{2}$	3	8— $4\frac{1}{2}$ косца.
Ярового "	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	3
Гречихи.....	$1\frac{1}{2}$ —2	2	—	—

Для вязки въ снопы скошенныхъ: озимого хлѣба необходимо на каждого косца по одной вязальщицы, ярового нѣсколько больше, такъ что на $\frac{1}{2}$ вязальщицы на десятину больше сравнительно съ числомъ косцовъ; для уборки же скошенной гречихи—столько женщинъ сколько косцовъ. Для вязки въ снопы хлѣба, сжатого машиной въ день, нужно 6—7 вязальщицъ, если машина работаетъ не на перемѣнныхъ лошадахъ и сжинаетъ отъ $3\frac{1}{2}$ до $4\frac{1}{2}$ дес. въ день, и 7—9 вязальщицъ, если машина работаетъ на перемѣнныхъ лошадахъ и сжинаетъ отъ 5 до 6 дес. въ день. Одна женщина можетъ приготовить въ день отъ 14 до 20 копъ (по 60 штукъ въ копѣ) переваятъ — болѣе изъ свѣжей нежели старой соломы; на копу переваятъ идетъ отъ 30 до 35 фунт. ржаной соломы. Относительно связки хлѣба съ поля, см. стр. 810; одинъ работникъ накладываетъ въ день до 40 возовъ, въ 60—100 сноповъ каждый. Для складки въ скирдъ (напр. 10 саж. длиной и 3 саж. шир., следовательно разбѣровъ, употребительныхъ у насъ на югѣ) нуженъ одинъ работникъ на 60 копень, а для приготовленія издеринны (подстожны) подъ такой скирдъ—2 работника. в) Для *вытѣсненія* льна на одной десятины

необходимо 10—12 женщинъ (при урожай на десятины въ 2300 сноповъ, дающихъ 20 пуд. трешаного льна). Для уборки початковъ вьюгузы на десятину 6 раб., преимущественно дѣтей. г) *Корней и клубней*. Одна женщина выбираетъ отъ 20 до 25 четвертей въ день. Для выборки жедесятины свеклы, брюквы, обрѣзки листьевъ и накладывъ въ телегу нужно до 40 рабочихъ.

При *молотѣ*. Относительно молотѣ см. стр. 817.

При *опанѣ и очисткѣ зерна*. Работникъ можетъ скружить (стр. 824) въ день отъ 10 до 15 четвертей зерна въ день. На ручной вѣялкѣ 4 работника (1 вертитъ, 1 засыпаетъ, 1 отгребаетъ половику и 1 отгребаетъ зерно) перевѣиваютъ въ день отъ 18 до 25 четвертей. На одноконной вѣялкѣ 5 рабочихъ провѣиваютъ въ день отъ 35 до 40 четвертей. На ручной сортировкѣ (напр. Бараксина), разбирающей зерно по вѣсу, 4 работника сортируютъ и очищаютъ въ день отъ 60 до 100 четвертей.

При *перекопкѣ земли*. Для перекопки на 1 сажень десятины поля нужно 130, а огородной земли и легкой полевой отъ 52 до 108 работниковъ. Для копанія и выбрасыванія земли, при углубленіи до $4\frac{1}{2}$ фута, необходимо на каждую кубич. саж. выкинутой земли $1\frac{1}{2}$ —3 (при обыкновенномъ легкомъ и среднемъ), 4—5 (при глинистомъ, крѣпкомъ) и 6 работниковъ (при самомъ крѣпкомъ, требующемъ употребленія кирки и лома грунтъ).

При *удобрѣнн*. Одинъ работникъ съ 8 работницами могутъ выбрать изъ хлѣва на гумно въ день отъ 8 до 10 возовъ (въ 60 пуд. каждый) навоза. Одинъ раб. накладываетъ въ день отъ 8 до 10 воз. и скидываетъ навозъ съ 40—50 воз. Одна работница разбрасываетъ по полю въ день отъ 8 до 10 возовъ навоза. Одинъ работникъ разбрасываетъ въ день отъ 6 до 8 четвертей пшеницы, около 25 пуд. гипса и отъ 45 до 60 пуд. гуано, раковины жмыховъ или костяной муки.

При *лѣдномъ (подпечномъ, олезовомъ) хозяйствѣ* (стр. 343). Первая рубка лѣдныхъ (подкосариваніе) требуетъ на десятину 10—15 работниковъ и 10—15 работницъ. Вырубка дровъ на десят. лѣсны по позднему времени года — 15—20 работниковъ. Сборка вѣлка сучьевъ на десят. — 16—20 работниковъ и 16—20 работницъ.

Потребность хозяйства въ пѣшихъ рабочихъ.

На основаніи только что приведенныхъ данныхъ относительно средняго количества работы, исполняемой въ день рабочими, и на основаніи сказаннаго въ отдѣлѣ «о персоналѣ» о разныхъ видахъ рабочихъ, содержимыхъ въ хозяйствѣ, можно привести слѣдующій примѣръ смѣтнаго учета потребныхъ рабочихъ силъ, относящихся къ хозяйству въ 250 дес. полей и 38 дес. луговъ при трехпольной улучшенной системѣ; пространства на поляхъ, занятыхъ различными культурами, слѣдующія:

подъ озимымъ хлѣбомъ	83 десятины.
" яровымъ "	83 "
" паромъ "	28 "
" горохомъ "	13 "
" клеверомъ "	15 "
" корнеплодами "	28 "

Работы по посѣву требуютъ слѣдующаго числа рабочихъ дней.

	Мужскихъ.	Женскихъ.
83 дес. озими обѣять (1/2 посредствомъ постоянныхъ рабочихъ)	27 3/4	—
13 „ яровыхъ обѣять (1/2 пост. раб.)	22	—
15 „ клевера обѣять (1/2 пост. раб.)	4	—
13 „ гороха обѣять	4	—
15 „ картофеля высадить	—	121
13 „ свеклы и капусту высадить	—	200
Сумма	57 3/4	321

Работы по уходу за корнеплодами (поливка, подсадка и пр.) на прострѣлахъ 28 десятинъ требуютъ

— 90

Работы по уборкѣ хлѣба:

83 дес. озими: на косьбу	138 1/2	—
на сушку и вязку	—	166 2/3
на подгребаніе, нагрузку и укладку въ скирды	44	110
13 „ гороха: полную уборку и укладку	48 1/3	22
83 „ ачмена и овса: на косьбу	110 2/3	—
на сгребаніе и вязку	—	110 2/3
на подгребаніе, нагрузку и складываніе въ скирды	32	80
Сумма	363 1/3	489 1/3

Работы по уборкѣ клевера:

15 „ клевера: на косьбу, сушеніе и складываніе (работа производится постоянными рабочими)	60	55

Работы по уборкѣ луговъ:

38 дес.: на косьбу и сушку	100	100
подгребаніе, нагрузку и пр.	10	20
38 „ на косьбу 2-го укоса и сушку	100	100
нагрузку, складываніе и пр.	6	12
Сумма	216	232

Работы по уборкѣ корнеплодовъ:

15 дес. картофеля: на выкапываніе и доставку въ усадьбу	60	360
13 „ свеклы и капусты: уборку и доставку	50	200
Сумма	110	560

Работы по удобрѣнію:

1600 парокъ возовъ навоза: на очистку стога (востан. раб.)	160	480
60 дес.: на вывозку, нагрузку и разгрузку навоза	10	100
60 „ разгрузку навоза	—	238 1/3
Сумма	170	818 1/3

Сопоставленіе:

Работы по:	Рабочіе:			
	Поденные.		Постоянные.	
	Муж.	Женск.	Муж.	Женск.
Посѣву	39 3/4	321	18	—
Уходу за корнеплодами	—	90	—	—
Уборкѣ хлѣбовъ	363 1/3	489 1/3	—	—
Уборкѣ клевера	—	—	60	55
Уборкѣ луговъ	216	232	—	—
Уборкѣ корнеплодовъ	110	560	—	—
Удобрѣнію	10	818 1/3	160	480
Сумма	739	2025	238	535

Изъ приведенной смѣты видно, что наибольшее количество рабочихъ силъ требуется въ періодъ уборки хлѣбовъ, и если послѣдняя должна быть окончена въ 30 дней, то хозяйство въ этомъ періодъ должно въ каждый рабочий день ставить на работу около 12 мужчинъ и 16 женщинъ.

Затраты на упряжные и ручныя работы, относительно ихъ распредѣленія между отдѣльными культурами.

Нижеслѣдующія данныя показываютъ приблизительно среднюю величину затраты работы всякаго рода для важнѣйшихъ культуръ. Назначеніе этихъ данныхъ состоитъ въ томъ, чтобы облегчить скорое производство смѣтъ, когда не требуется особенно большой точности. Само собою разумѣется, что при обратныхъ условіяхъ хозяйства не можетъ ограничиваться подобными средними данными и долженъ производить учеты работъ, относящихся къ разнымъ культурамъ, самостоятельно, основываясь на фактахъ, даваемыхъ дѣйствительностью.

Въ нижеслѣдующія данныя показываютъ среднюю величину расходовъ на работу для 4-хъ десятинъ пространства, занимаемаго разными культурами.

Періодъ.		Упряж- ные дни.		Ручные дни.	
		Паро- кон- ные.	Одно- кон- ные.	Муж- ские.	Жен- ские.
1. Картофель послѣ озими.					
Весна.	Вспахива и бороныба	8,0	1,4	—	—
—	Бороныба и маркеромъ	2,0	1,6	—	—
—	Сажаніе и запахиваніе	4,0	—	—	24
Лѣто.	2 окучиванія, полотье, мотыженъе	6,0	—	20,0	40
Осень.	Выпахиваніе, выбораніе, пагрузка	6	—	—	160
—	Повторенныя выпаживаніе и выбораніе	10	—	10	—
—	Свозка, разгрузка, складываніе	20	—	20	—
Сумма		56	3	50	224
На 1 десятину		14	0,75	12 1/4	56
2. Озимая пшеница послѣ рѣсса.					
Лѣто.	Взметъ живца	15	—	—	—
—	3-кратная бороныба	—	1,6	—	—
Осень.	Посѣвная вспашка	8	—	—	—
—	3-кратная бороныба и укатываніе	1	1,6	—	—
—	Посѣвъ и закрѣпленіе сѣмянъ	—	3,4	1,4	—
—	Бороныба и проведеніе водосточныхъ бо- роздъ	1	1,4	1	3
Весна.	Пробороныба посѣвы	—	0,8	—	—
—	Подкашиваніе бурыхъ всходовъ	—	—	—	10
Лѣто.	Косеніе и жатъе	—	—	4	20
—	Переворачиваніе валовъ, вязка, пагрузка и подгребаніе	—	—	—	16
—	Свозка, пагрузка и складываніе	3	—	2	8
Зима.	Молотыба и сушка зерна	—	—	80	80
—	Разныя побочныя работы	2	—	—	3
Сумма		30	8,8	88,4	140
На 1 десятину		7,5	2,2	22,1	35
3. Озимая пшеница послѣ пара.					
Весна.	Паханіе отвердѣвшаго пара	20	—	—	—
—	3 бороныбы	—	1,6	—	—
Лѣто.	200 возовъ павоза вывезти	33	—	—	—
—	Пагрузка и разгрузка павоза	—	—	24	—
—	Разгрузка и заплата павоза	12	—	—	14
—	Укатываніе и бороныба	1	1,6	—	—
Осень.	Работы по посѣву (какъ и выше)	10	7,2	2,4	3
Лѣто.	Работы по уборкѣ (какъ и выше)	3	—	6	54
Зима.	Молотыба и пр.	2	—	80	88
Сумма		81	10,4	112,4	154
На 1 десятину		20,2	2,6	28,1	38,5

4. Озимая рожь послѣ рѣсса.					
Лѣто.	Взметъ живца и бороныба	15	1,6	—	—
Осень.	Посѣвная вспашка	8	—	—	—
—	3 бороныбы и укатываніе	1	1,6	—	—
—	Посѣвъ и заплата сѣмянъ	—	8,4	1,4	—
Лѣто.	Бороныба и проводъ водосточ. бороздъ	1	1,4	1	3
—	Косыба и сѣзываніе	—	—	4	20
—	Переворачиваніе, связываніе, пагрузка и подгребаніе	—	—	—	16
—	Свозка, разгрузка и складываніе	3	—	2	8
Зима.	Молотыба и чистка зерна	—	—	70	70
—	Разныя побочныя работы	2	—	—	3
Сумма		30	8	78,4	120
На 1 десятину		7 1/2	2	19,6	30
5. Озимая рожь послѣ клевера.					
Лѣто.	Взметъ живца	15	—	—	—
—	Бороныба и укатываніе	1,8	1,6	—	—
—	Вывозка 150 возовъ павоза	24	—	—	—
—	Пагрузка и разгрузка	—	—	20	—
—	Разгрузка и запахиваніе павоза	12	—	—	10
—	Бороныба и укатываніе	1	1,6	—	—
Осень.	Работы по посѣву (какъ и выше)	10	6,4	2,4	3
Лѣто.	Работы по уборкѣ (какъ и выше)	3	—	6	48
Зима.	Молотыба и пр.	2	—	70	73
Сумма		68,8	9,6	98,4	130
На 1 десятину		17 2	2 4	24,6	32,5
6. Ячмень послѣ корнеплодовъ.					
Осень.	Вспахка подъ зиму	8	1,4	—	—
—	Дроженіе и бороныба	8	1,4	—	—
Весна.	Посѣвная вспашка и бороныба	8	1,6	—	—
—	Посѣвъ и заплата сѣмянъ	2,6	4,8	2,4	2
Лѣто.	Уборка, свозка, складываніе	2	—	8,4	18
Зима.	Молотыба, чистка и пр.	2	—	50	50
Сумма		30,6	9,2	60,8	70
На 1 десятину		7,6	2,3	15,2	17,5
7. Овесъ послѣ корнеплодовъ.					
Весна.	Дѣлъ бороныбы и между ними вспашка	8	1,8	—	—
—	Посѣвъ и заплата сѣмянъ	—	3,4	1,4	—
—	Бороныба и проводъ водосточ. бороздъ	1	1,4	1	2
—	Укатываніе посѣва	1,6	—	—	—
Лѣто.	Косыба	—	—	6,4	—
—	Переворачиваніе, вязка, пагрузка, сѣребаніе	—	—	—	12
—	Свозка, разгрузка, складываніе	2	—	2	6
Зима.	Молотыба и чистка зерна	—	—	50	50
—	Побочныя работы	2	—	—	—
Сумма		14,6	6,6	60,8	70
На 1 десятину		3,6	1,6	15,2	17,5

8. Озимый рапсѣ послѣ пара.				
Весна.	Паханіе отвердѣваго пара	20	—	—
—	4-бороньбы	—	2	—
Лѣто.	Вѣронованіе	2	1,6	—
—	Вывозка 240 возовъ навоза	36	—	—
—	Нагрузка и разгрузка навоза	—	—	32
—	Растреска и запашка навоза	14	—	16
—	Вороньба и укатываніе	1,6	1,4	—
—	Вороньба и запашка передъ сѣвомъ	8	1,6	—
—	4 бороньбы и маркеромъ	—	2,4	—
—	Посѣвъ 3 рядною сѣлкой	—	—	5
—	Прикатываніе посѣва	1,4	—	—
Осень.	Двукратное рядовое пропахиваніе	8	—	—
Лѣто.	Срѣзываніе рапса	—	—	40
—	Переварачиваніе, вязка, нагрузка	—	—	4
—	Свозка, разгрузка	10	—	4
Осень.	Молотьба и чистка зерна	—	—	24
Зима.	Побочныя работы	2	—	2
Сумма		103	9	69
На 1 десятину		25,7	2,2	17,2
9. Вика на сѣно.				
Весна.	Всѣ работы, включая посѣвъ	39	8	16,4
Лѣто.	Косьба	—	—	12
—	Сумка и нагрузка	—	—	10
—	Свозка, разгрузка, складываніе	8	—	10
Сумма		47	8	48,4
На 1 десятину		11,7	2	12,1
10. Вика на зерно.				
Весна.	Всѣ работы, включая посѣвъ	39	8	16,4
Лѣто.	Косьба	—	—	12
—	Сумка и свозка	5	—	4
Зима.	Молотьба и чистка	—	—	50
Сумма		44	8	82,4
На 1 десятину		11	2	20,6
11. Клеверъ въ 1-мъ укосномъ году.				
Весна.	Посѣвъ и бороньба	—	1,6	3
Осень.	Гипсованіе въ первую осень	—	—	6
Лѣто.	Чистка клевернаго поля и бороньба	1	1	4
—	Первый укосъ	—	—	16
—	Работы по сумкѣ сѣна	—	—	30
—	Нагрузка, свозка, складываніе	20	—	10
Осень.	Второй укосъ	—	—	14
—	Сумка сѣна	—	—	20
—	Нагрузка, свозка, складываніе	12	—	6
Сумма		33	2,6	59
На 1 десятину		8,2	0,7	14,7

12. Клеверъ во 2-мъ укосномъ году.				
Весна.	Чистка поля, боронованіе	1	1	4
—	Гипсованіе	—	—	6
Лѣто.	Укосъ	—	—	16
—	Сумка сѣна	—	—	30
—	Нагрузка и свозка	20	—	10
Сумма		21	1	36
На 1 десятину		5,2	0,25	9
13. Луга.				
Весна.	Чистка луговъ	0,5	—	—
Лѣто.	Косьба	—	—	10
—	Сумка и складываніе въ копны	—	—	56
—	Свозка, нагрузка, разгрузка	8,5	—	5
Осень.	Укосъ отавы	—	—	10
—	Работы по сушенію	—	—	56
—	Свозка, нагрузка, разгрузка	6	—	4
Сумма		15	—	29
На 1 десятину		3,7	—	7,2
Пользуясь приведенными смѣтами, легко опредѣлять количество упражнимыхъ и ручныхъ рабочихъ силъ, потребныхъ при данной системѣ хозяйства, и даннымъ сѣвооборотѣ, если извѣстно число рабочихъ дней въ разные періоды года. Положимъ, что сѣвооборотъ требуетъ слѣдующее число дней:				
1. Весною при 60 рабочихъ дняхъ		326	70	118
2. Лѣтомъ " 77 " "		271	11	349
3. Осенью " 72 " "		261	32	60
4. Зимой " 71 " "		52	—	608
Всего въ 280 " "		910	113	1135
Раздѣляя число дней, потребныхъ въ каждомъ періодѣ для выполненія работъ на число рабочихъ дней въ данный періодъ (въ принятомъ примѣрѣ на 60, 77, 72 и 71), получаемъ количество рабочихъ силъ, потребныхъ въ хозяйствѣ для каждого періода.				
		210	890	428
		608	2136	

Паровая сила.

При исполнении различных хозяйственных работ начинают все больше и больше пользоваться паровой силой. Парь уже давно (стр. 830) и довольно часто приводит въ движение молотилки, и въ последнее время, хотя медленно, но все же больше и больше начинает замѣнять животную силу для движениі орудій земледѣлательной (въ видѣ попытокъ и рядовыхъ сѣялокъ).

Что касается технической стороны примѣненія пара для обработки земли, то этотъ вопросъ разрѣшается довольно удовлетворительно *системой* паровой обработки земли *Фаулера съ двумя самокатами* (самодвижущимися локомотивами). При паровомъ паханіи этой системы употребляется балансирующій, многокорпусный, оборотный плугъ *) съ удвоеннымъ числомъ корпусовъ (стр. 283), изъ которыхъ одни опускаются и дѣйствуютъ при движеніи плуга въ одну, другіе же — въ другую сторону. Плугъ движется по полю между двумя самокатами, поставленными по краямъ поля на большемъ или меньшемъ разстояніи одинъ отъ другаго (до 165 саж.); чѣмъ больше разстояніе, тѣмъ, конечно, работа спорѣе. Каждый изъ самокатовъ имѣетъ по вороту, на который наматывается или съ котораго сматывается проводочный канатъ, прикрепленный другимъ концемъ въ плугу; такъ что этотъ послѣдній движется въ данное время отъ самовата, съ котораго сматывается, къ самокату, на который наматывается канатъ. Канатъ, для того чтобы онъ не касался земли, поддерживается во время движенія на особыхъ подставкахъ. При оцепаніи каждаго прохода плуга, самокаты подвигаются впередъ по краямъ поля на ширину прохода, которая бываетъ различна, въ зависимости отъ силы самокатовъ, отъ числа корпусовъ орудія и работы, которая производится этими послѣдними; число корпусовъ же, при одной и той же силѣ самокатовъ, тѣмъ больше, чѣмъ мельче обработка. Ширина прохода, напр., 3,3 фута у трехкорпуснаго плуга для вспашки на глубину 15 дюйм., или 4 2/3 фута у 6 корпуснаго плуга для вспашки на глубину 7 дюйм., или 10 фут. у 9—11 лапага груббера (культиватора). Фаулера система пароваго паханія съ двумя самокатами предпочитается другимъ, потому что, сравнительно съ другими, представляетъ большія удобства въ управленіи орудіемъ и установкѣ его, увеличиваетъ производительность пароваго паханія, требуетъ меньше прислуги и дѣлаетъ ненужными животныхъ для связки плуга въ поле и свозки его съ поля. Самокаты

*) Употребляются также грубберы—экспираторы (культиваторы) такой-же системы или самоповорачивающіеся съ единственнымъ числомъ корпусовъ, подпочвенники, борозы и катки.

могутъ подыматься по значительнымъ покатостямъ и спускаться съ нихъ, равно какъ паровые плуги могутъ работать на значительно неровныхъ поляхъ (такъ что съ мѣста одного самовата не видно другаго).

Что же касается экономической стороны вопроса о паровомъ паханіи, то онъ разрѣшается, конечно, весьма различно въ зависимости отъ стоимости: съ одной стороны обработки почвы животными, съ другой обработки ея паровымъ паханіемъ. Вотъ, данные для вычисленія послѣдней сообразно мѣстнымъ цѣнамъ. Паровое паханіе вышеприведенной системы требуетъ прислуги: во 1-хъ, одного машиниста, двухъ помощниковъ его и двухъ кочегаровъ, иногда же только перваго и двухъ послѣднихъ при самокатахъ; во 2-хъ, одного плугаря, сидящаго на плугѣ и направляющаго его, помощника ему для очистки отвалоу во время паханія и по вынутіи плуга изъ борозды, и двухъ мальчиковъ для перемѣщенія подставокъ, поддерживающихъ канатъ; въ 3-хъ, подводъ съ возчиками для подвоза воды въ числѣ (отъ 2 до 4 паръ воловъ съ 2—4 водовозами и такимъ-же числомъ мальчиковъ при нихъ), зависящемъ отъ разстоянія (2 — 3 версты), на которое приходится возить воду. Кроме того, могутъ понадобиться ночные сторожа (два), если плугъ остается на почѣ въ полѣ. При 10 часахъ работы въ сутки, паровой плугъ съ двумя 14-ти сильными самокатами, смотря по величинѣ работы и орудія и качеству каменнаго угля, потребляетъ въ день: во 1-хъ, 80—100 пуд. (при вспашкѣ шестикорпуснымъ плугомъ степной залежи въ засуху на глубину 4 вершковъ) и даже 140 пуд. каменнаго угля или 1 1/2 куб. саж. дровъ (дубовыхъ, грабовыхъ) (при вспашкѣ трехкорпуснымъ плугомъ трехлѣтняго перелога въ засуху на глубину 15 дюйм. или живья пятикорпуснымъ плугомъ на глубину 8 2/3 дюйм.); во 2-хъ, 10 фунт. масла, 5 фунтовъ говяжьяго сала, 2 фунта пакли и 1 фунтъ пеньки. Паровой плугъ со всеми принадлежностями и запасными частями можетъ стоять съ доставкой въ то или другое мѣсто Россіи отъ 20 до 24 т. рублей. На затраченный въ плугъ капиталъ слѣдуетъ считать процентъ за пользованіе имъ (5—8%), равно какъ и процентъ на погашеніе и ремонтъ его (8—10%). Паровой плугъ проходитъ полосу въ 165 саж. длиной въ 5—12 минутъ, смотря по свойству почвы и ея поверхности и качеству работы. При работѣ же въ теченіи 10 часовъ въ сутки, можно обработать 3 десят. (при вспашкѣ неровнаго поля, трехлѣтняго перелога въ засуху, трехкорпуснымъ плугомъ на глубину 15 дюйм.; ширина прохода 3,3 фута), 3 1/2 десят. (при вспашкѣ ровнаго поля и остальныхъ одинаковыхъ съ первымъ случаемъ условіяхъ), 4 десят. (при вспашкѣ ровной степной залежи въ засуху, шестикорпуснымъ плугомъ на глубину 6 1/2 — 7 дюйм., ширина прохода 4 2/3 фута), 5 дес. (при вспашкѣ ровнаго живья пяти-

корпусным плугом на глубину $8\frac{2}{3}$ дюйм.) и 6—8 десят. (при обработке 9-лапым груббером—культиватором). Въ году можно пахать отъ 120 до 150 дней, въ теченіи которыхъ паровой плугъ можетъ работать. Смотря по производительности плуга, цѣнѣ его, величинѣ процента и смѣтнымъ цѣнамъ на рабочихъ, топливо и другіе необходимые матеріалы, стоимость обработки одной десятины паровымъ орудіемъ опредѣляется въ 7—14—16—17—22 рубля. На уменьшеніе стоимости этой обработки можетъ имѣть большое вліяніе возможность употребленія самокатовъ для другихъ работъ въ то время, когда они ненужны для пароваго паханія. При оцѣнкѣ паровой обработки сравнительно съ обработкой животными у насъ, необходимо принять во вниманіе два обстоятельства: эпидемію (чуму), которой подвержены воды и лучшее качество паровой обработки земли (какъ свидѣствіе небрежности, съ которой обрабатываются у насъ поля животными). Вообще же опытъ на континентѣ западной Европы говоритъ пова въ пользу введенія пароваго паханія только при необходимости въ глубокой обработкѣ почвы (какъ напр. подъ сахарную свекловицу) на болѣе значительномъ пространствѣ.

ВАЖНѢЙШІЯ ИЗЪ ЗАМѢЧЕННЫХЪ ВЪ I ТОМѢ ОПЕЧАТОКЪ И ПОПРАВКЪ.

Стр.	строки.	напечатано:	слѣдуетъ читать:
1	15 снизу	о смерти	до смерти
—	15	По жизненную	По жизненную
3	6	свѣдующихъ	свѣдующихъ
15	19	право	правомъ
21	4 сверху	максимальную	максимальную
24	12	владѣлецъ	владѣлецъ
34	15	инвентаръ	инвентаръ
56	10 снизу	содержа	содержащая
69	3	фосфорноокислыхъ	фосфорноокисло-
—	14	известковыхъ	глинистыхъ
72	10	алмаза = 7	алмаза = 10
73	2	остаткамъ	остаткомъ
—	16	или соединяется химически	соединяется химически или
75	9 сверху	Бромистаго	Бромистаго
—	14 снизу	магніи	" магнѣзіи
79	17 сверху	7—60%	7—10%
—	2 снизу	" нихъ,	" нихъ;
82	12	веревочныхъ	веревочныхъ
—	22	хлористовыхъ	хлористовыхъ
87	12	идеальныхъ	идеальныхъ
92	2	накосная	накосная
94	3	растеніями	растеніями
—	6	тнкомъ	тнкомъ
—	8	заростать	заростать вод-
—	9	водными вод-	водными
95	6	ни	или
96	7 сверху	обуславливается	обуславливается
—	8	(битуменомъ)	(битуменомъ)
—	21	(баггерторфъ торфы)	(баггерторфъ) торфы
—	20 снизу	заключаютъ	заключаютъ:
—	15	желѣза и изве тн	желѣза, и известн
106	21	волосныхъ	волосныхъ
109	14 сверху	быстрѣе; наконецъ а)	быстрѣе, г) отъ количества растворимыхъ веществъ: чѣмъ больше оно, тѣмъ выдѣ- леніе воды изъ почвы мед- леннѣе; наконецъ, д) извѣтомъ и гладкостію
110	11 сверху	цѣтотъ, гладкостію	424
123	7	624	

Стр.	строки.	напечатано:	следует читать:
126	4 сверху	она	оно
128	7 "	неболѣ	менѣе
—	8 снизу	а) неастворенныя	а) неастворимыя
129	3 "	опрь	опре
—	4 "	"	се
—	11 "	образуются;	образуются
130	10 сверху	, и вторыхъ	, а вторыхъ
—	20 снизу	, но пѣсколько	, но пѣсколько
138	4 сверху	имѣть	имѣютъ
144	8 "	пониманіемъ	пониманіемъ
—	18 снизу	0,5 " 1,0%	0,5 " 1,5%
149	7 сверху	сплавковъ	минераловъ
161	22 "	барія	барія
167	24 "	песчан-	песчаный
171	14 "	долженъ	должно
187	13 снизу	таблицъ	таблицы
236	11 "	Мекленбургская	Мекленбургская
266	4 сверху	или	и
274	10 "	стороной	шириной
289	12 "	Рамсона	Рамсона
—	13 "	формы	фирмы
295	9 снизу	скорошнень	скорошневъ
297	2 "	другъ къ другу	другъ въ друга (см. выноски стр. 476)
306	17 сверху	одной горизонтальной плос-	одной плоскости (см. выноски стр. 480)
318	24 "	ности	, и отъ условій
338	14 снизу	футахъ	рутахъ
355	3 "	масса ея остатковъ	масса растительныхъ остатковъ
359	24 "	болѣе узкимъ нежели	такой ширины каковой
311	15 "	жердевыя	жердевыя
411	25 сверху	лекарственная водная	Лекарственная — водной
457	2 "	ровные	ровные
—	19 снизу	напр.	напр.
459	26 сверху	вышло лѣѣе	вышло: лѣѣе
465	22 "	следуетъ	следуютъ:
486	15 снизу	falna	falna
487	5 "	озимыми	озимыми
489	20 сверху	Куколь	Куколь
—	23 "	многолепестникъ	многолепестникъ
515	17 "	Котокъ	Котокъ
523	1 снизу	даютъ	даютъ
524	15 "	борозду вторымъ	борозду, вторымъ
557	12 "	дрокъ	дрокъ
572	18 сверху	оставалась	оставалась
577	6 снизу	до	до
581	14 сверху	всасываютъ	всасываются
582	3 "	а именно:	а именно:
—	25 "	исчезающее	исчезающее
—	8 "	количества качества	количества и качества
583	20 "	и значительно	и при значительно

Стр.	строки.	напечатано:	следуетъ читать:
—	—	Выѣсто чиселъ помѣщен-	7,4 767,6 841,6 73,9 94,1
—	—	ныхъ въ соответствую-	70,9 147,2 13,7 6,5
—	—	щихъ мѣстахъ, 1 — 15	22,4 876,8 1030,9 104,5 143,4
—	—	строкъ снизу включитель-	0,5 15,4 57,6 12,6 3,3
—	—	но в графахъ 1, 3, 4, 5, 7,	2,7 12,0 11,8 1,4 0,8
—	—	8 и 9, считая слѣва направо,	26,3 25,8 3,1 5,7
—	—	сдѣлать помѣщенные	1,1 99,8 92,6 10,4 28,2
—	—	здѣсь вѣрные числа, раз-	19,1 66,2 4,1 2,8
—	—	мѣщенные совершенно	4,5 122,8 175,2 17,8
—	—	также, какъ размѣщены	11,0 0,5
—	—	ошибочныя числа.	11,0 28,5 1,7 0,2 2,1
—	—	—	22,1 52,6
—	—	—	0,3 9,0 8,3 1,4 1,1
—	—	—	—
—	—	—	9,8 8,8 1,6
586	17 сверху	содержать	содержится
587	17 снизу	клясачныхъ	клясачныхъ
588	18 сверху	Сѣверна	Сѣверна
—	20 "	80°	80°
—	19 снизу	насть	нается
589	23 "	магнесіей)	магнесіей),
590	16 сверху	св-	св-
592	2 снизу	наполнять	наполнить
—	13 "	въ рѣку	въ рѣку,
593	8 сверху	Крайдовъ	Крайдовъ
—	28 "	вентилацин	вентилацин
598	13 "	проводать	преходать
599	4 "	городъ	города
602	16 снизу	стольчика	стольчака
605	3 сверху	Мюллеръ-Шюра	Мюллеръ-Шюра
606	13 "	дезинфекція	дезинфекцин
—	22 "	винта	винта
—	12 снизу	уголь	уголь
607	25 "	опуска	спуска
—	14 "	Менлинскихъ	Менлинскихъ
608	6 сверху	камкомъ	камнемъ
—	8 "	сторона	систерна
621	24 "	шерсти	шерсть
623	3 снизу	свобождаются	освобождаются
—	4 "	объ	тъ
—	5 "	тисельчается	измельчается
625	12 "	0,3% маковья	0,3% (маковья)
631	4 сверху	радиалпстаго	радиалпстаго
634	19 "	кремневой	кремневой
—	18 "	Хлора	хлора
637	15 сверху	папоротники	папоротникъ
638	20 снизу	что и трубчатая	что трубчатая
641	5 сверху	единственна	единствен-
—	6 "	средствъ	средства,
642	21 "	случаяхъ	случаяхъ
650	6 "	пескомъ	гипсомъ
651	2 "	роется	роется
654	9 снизу	своему	своему
659	18 "	громоздкаго	громоздкаго

Стр.	строки.	напечатано:	следует читать:
663	8 снизу	сѣлая	дѣлая
664	2 "	высенія	впесенія
665	15 "	соли,	соли:
666	6 сверху	патръ	натра
667	6 снизу	на нее	на ней
668	20 сверху	внесеніе въ почву;	внесеніе въ почву
672	11 "	туковъ)	туковъ (
681	1 снизу	задерживаемой	задерживательной
682	2 "	лошадей	лошадей
686	15 сверху	полѣ	поле
—	20 "	если	если
688	7 "	оно	онъ
—	16 "	полученія,	полученія
689	3 "	удобно-различны	удобно различны
—	5 "	онѣ	они
—	—	онѣ	они
—	16 "	долготы	долготы ихъ
—	17 "	Цикорій обыкновен. дв.	Цикорій обыкновен. ж.
—	18 "	Кранцъ	Кранцъ
—	24 "	Carotta	Carotta
—	26 "	rustica). дв.	rustica). дв.
693	10 "	fullonum).	fullonum). дв.
695	заголовкомъ	14,8°	14,8° Р
696	2 снизу	ей	его
—	5 "	сѣменодоли	сѣменодоли
—	6 "	ав	ав
697	8 "	ро	ро
700	1 "	невища	корневища
701	21 "	Daucus	Daucus
702	1 сверху	признакамъ растенія	признакамъ, растенія
—	15 "	а)	а)
—	16 снизу	водамъ	водамъ
703	23 "	онѣ	они
—	15 "	помѣщеннымъ	помѣщенными
704	1 "	гречихи	гречиха
706	9 "	могутъ	могли
—	8 "	расть сѣмянъ на сколько	раста. на сколько
707	5 сверху	они	не
—	3 снизу	малыхъ ихъ	малыхъ ихъ,
708	18 "	поры	поры
709	6 сверху	углекислоты стоитъ	углекислоты. Стоитъ
—	10 "	сохранія	сохраненія
710	22 "	увеличивается	увеличивается
711	23 "	воздухъ 100	воздухъ, 100
712	16 "	сѣмянъ	сѣмянъ
713	7 "	качество	качество
—	2 снизу	и непревышаю-	непревышаю-
—	1 "	и меньше	и меньше
715	6 сверху	больша (роль,	меньше (роль,
—	5 снизу	спорынья	спорыньей
—	20 "	salivum	salivum
—	—	прозрастанія, воздѣлыва-	прозрастанія, воздѣлыва-
—	—	емаго растенія	емаго растенія,

Стр.	строки.	напечатано:	следуетъ читать:
716	22 снизу	Chrysanthemum).	Chrysanthemum):
—	3 "	Чисто	Чистота
—	2 "	сѣмянъ	сѣмянъ
—	—	и	и
—	1 "	коленьихъ	своихъ
719	13 "	сортиро-	сортиро-
722	21 "	относительно	относительно
723	13 сверху	сѣдовательно	сѣдовательно
—	29 "	требующія, обновленія	требующія обновленія
—	2 снизу	примѣляемое не всегда	примѣляемое, не всегда
724	7 "	свекла, цикорій)	свекла)
—	6 "	груша,	груша, цикорій,
725	19 "	для всего	для своего
726	28 "	овиныхъ поствяхъ,	овиныхъ поствяхъ, и
727	1 "	валъ	валъ
734	9 "	В. ложки (рис. 223)	е) ложки (Бука, рис. 223).
735	24 "	и	при
—	15 "	нѣдѣстміе	нѣдѣстміе
—	9 и 8 "	онѣ	они
736	25 "	навлѣбена	навлѣбена
—	24 "	Доски защищаютъ	Доски защищаютъ
737	11 сверху	ководныхъ	ководныхъ
—	7 снизу	Зидерелебена	Зидерелебена
739	13 "	краткаго	краткаго
740	10 сверху	нижня	нижня
744	15 снизу	первомъ	первомъ
746	8 "	сѣмянный	сѣмянный
748	27 сверху	разстоянія	растенія
—	1 снизу	и	и
749	19 "	сложной	сложной
751	8 "	растенія	растенія
754	1 сверху 2 столб.	число вр.	число вр.
—	2 " 3 столб.	сѣмянъ	сѣмянъ
755	8 "	мѣнее	мѣнее
759	2 снизу	сѣтѣ и	сѣтѣ и отъ
760	15 снизу	не меньшее	но меньшее
—	10 "	Въ поддержкѣ	Въ поддержкѣ
763	7 сверху	бузина, зеленки	бузина, зеленки
765	2 снизу	Белоруссін	Белоруссін
766	13 "	дѣлается	дѣлается
—	7 "	вымываютъ	вымываютъ
769	27 "	многолѣтнихъ	многолѣтнихъ
770	11 сверху	сящаяся	сящаяся
—	24 снизу	чечевицы	чечевицы
—	14 "	негодныя, же	негодныя же
771	4 сверху	сѣдовными	сѣдовными
—	13 "	гречихи, почечуйной травы	гречихи почечуйной травы
—	24 снизу	Для истребленія ихъ:	Для истребленія ихъ:
772	3 сверху	подсолнечниковую	подсолнечниковую
—	7 "	Melampyrorali	Melampyrorali
—	11 сверху	exitiosus	exitiosus
—	26 "	или зрѣлости	или зрѣлости
—	20 снизу	Сп орѣ	Сп орѣ
773	24 "	(тилоспоры)	(стилоспоры)

Стр.	строчк.	напечатано:	слѣдуетъ читать:
—	5 снизу	подсолнечника фасолн	подсолнечника, фасолн
774	5 сверху	плодокошеніями	плодоношеніями
776	3 снизу	arvicola	arvicola
778	заголовокъ	противъ.	противъ
—	7 сверху	картофельнао	картофельнао
—	8 "	decimilincata	decimilincata
—	8 "	блестянку,	блестянку (Nitidula aenea),
—	9 "	завязь	завязь
—	13 "	destructos	destructo
779	заголовокъ	Вредныхъ	вредныхъ
—	10 сверху	пигалицы (чибиса) галки,	пигалицы (чибиса, чайки),
781	1 "	собираются	собирается
—	18 "	вылазываются	вылазываются
784	5 "	напряженія	напряженія
790	4 снизу	сжимаемой	сжимаемой
—	9 сверху	особое	особое
792	1 "	части сѣмянъ	частей, сѣмянъ
802	7 снизу	ржавщина	ржавщина
806	21 "	чѣмъ	чѣмъ
807	6 "	Для	Для
812	12 "	къ тому же	къ тому же
830	11 сверху	о стѣмъ;	остѣми,
834	заголовокъ	выкапываніемъ	выкапываніемъ
837	2 сверху	она	онъ
839	заголовокъ	1')	')
—	1-й графы		
844	7 снизу	устраненной	устранимой
848	5 сверху	Перевозка сѣна,	Сѣно,
—	6 "	громоздкаго предмета	громоздкій предметъ
—	"	воспламеняющагося	воспламеняющійся
850	24 "	(рис. 264)	(рис. 265)
858	заголовокъ	корней	корней
—	4 снизу	57	5—7
861	заголовокъ	Корней	корней
—	13 сверху	свойство	свойствъ
864	15 снизу	Лучовикъ	Луговикъ
866	11 "	Тагахаеит	Тагахаеит
867	1 "	растенію	растенія
868	18 сверху	количество, въ	количество ея,
—	19 "	положенія	положенія
870	7 снизу	вышнена	вышнена
871	заголовокъ	Корневия	Коревния
873	19 снизу	поверхности	поверхности
874	заголовокъ	Увлажненіе луговъ	Возобновленіе дернины
888	8 снизу	обихъ	обихъ
—	13 "	сравнительно	сравнительно
889	2 "	грузъ, при перевозкѣ груза	грузъ; при перевозкѣ груза,
897	14 сверху	1/2	1/2
904	2 снизу	издернины	издернины
905	18 сверху	4—5	4 1/2—5
—	20 снизу	огневокъ	огневокъ
912	9 "	пага	паго