634.1 K.463p.n.

РАЦІОНАЛЬНОЕ ПЛОДОВОДСТВО.

ПРАКТИЧЕСКОВ РУКОВОДСТВО КЪ ВЕДЕНІЮ ПЛОДОВАГО ПИТОМНИКА И УХОДУ ЗА ПЛОДОВЫМЪ САДОМЪ.

бъ 136 оригинальными рисунками.

СОСТАВИЛЪ

старый спеціалисть по садоводству при Департ. Земледълія И. И. КИЧУНОВЪ.





ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 годъ. Двенадцатый годъ издан

Еженедъльный иллюстр. журна практическаго садовод. и огоро Ред. В. Н. ШТЕЙНБЕВ

НАЛА, года пом'вщается около 1.500 практических в правитических в правитическ тей и обстоятельныхъ отв'ятовъ практиковъ и спеціалистовъ на вопросы по вс Въ числе нумеровъ журнала будутъ даны следующе иллюстрированные спеціальные нум

Новости по комнатному садоводству. Описаніе новыхъ растеній, сов'яты и рецеп

Садъ — мов богатство. Въ двухъ больш. томахъ. Томъ І. Плодовый садъ. Нас деніе и уходъ за плод. садомъ, согласно съ новъйш. даны опыта и науки. Съ мног. оригин. млюстр. Инструктора садоводства Т. А. Гумсовика. Садъ — мов богатство. Томъ ІІ. Ягодый садъ. Насажденіе и раціональный ух Что надо знать огороднику для выгоднаго веденія огорода. Практичес для выгоднаго веденія огорода. Практичес для выгоднаго веденія огорода. Практичес дуководство къ огородичеству А. С. Кариова. Практичеству А. С. Кариова. Дамовра. З. Дамовра. Полнос руководство къ устройству декоративи Въ двукъ больш. томакъ. Томъ І. Плодовый садъ, На

Декоративное садоводство. Полное руководство къ устройству декоративно садовъ и цейтниковъ. П. Н. Штейнберга.

1) Грунтовые свраи. Постройка ихъ домащними средствами и приспособленіе для ранней гонки плодовъ и ягодъ. Н. Н. Шаврова. 2) Бахчевадство. Полевая культура дынь, арбуз тыквъ и огурцовъ. А. И. Кумевчова. 3) Превосходные руссия яблоть. Описание лучшихъ русси сортовъ яблокъ. М. В. Рытова. 4) Вультура ранней вапусты въ грунту. И. Димбожа. 5) Спадий бу Приготовление къ объду всевояможныхъ сладкихъ блюдъ изъ плодовъ, ягодъ и овощей. 1 раскостой. 6) Ботания для огородняющь. Академика С. И. Коросноскаго. 7) Нава сорта подовъх невъ и дъ выгодиће самать. А. С. Корочоси. 8) Изготовление моледы подовъ я ягодъ. К. Сера. 9) Накъ ускорить влодовшей моледыхъ плодовыхъ двревьевъ. М. Рътовоа. 10) Красивъйшія в вныя декоративным растенба. Культура ихъ и прострабшіе способы размноженія. И. Имколию Пяцевным растенба. Размнож. муж для приготовленія серсствъ умичтож насёком., мышей и к Ядовитыя растенія. Размнож. ихъ для приготовленія средствъ уничтож. насъком., мышей и ку Maoposa. 12) Вань самому сдъявъ изящную балконную мебаль и мардиньерии для цвътовъ. θ . Max

= KPOMB TOFO, вет гг. подписчики получать еще четыре сябд. приложенія: =

Настольное пособіе для перевода ботанических в названій растеній. Перев. Н. И. Вичун

АЛЬБОМЪ ВРЕДНЫХЪ НАСЪКОМЫХЪ ПЛОДОВАГО СА Съ подробнымъ описаніемъ испытан. средствъ борьбы съ ними. Сост. Серевьй Кранно

КАЛЕНДАРЬ РУССКАГО САДОВОДА НА 1915- 70

Запасы ивъ овощей, грибовъ, ягодъ и плодовъ (соленіе, маринованіе, квашеніе и т Варенье. Желе. Цукаты, пастила, плоды въ сахаръ. Ягодное и плодовое вино. Ягодные мо Цалебные сиропы. Консервы для мороженаго. Квасы, шипучки, водички. Старинные меды. Фру вый и ягодный уксусъ. Приготовление водокъ, ликеровъ и мн. др. Сост. Е. В. Спасоная.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на годъ со всёми приложеніями, съ до-Допускается разсрочка: при подпискъ 2 руб. и къ 1 мая остальные 2 руб. -

Главная Контора журнала: Петроградъ, Стремяная ул., № 12, собств. дов

rpor


ОНАЛЬНОЕ ПЛОДОВОДСТВО.

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО КЪ ВЕДЕНІЮ ПЛОДОВАГО питомника и уходу за плодовымъ садомъ.

Съ многоч. оригинальными рисунками.

старшій спеціалисть по садоводству при Департ. Земледълія

Н. И. КИЧУНОВЪ.







Петроградъ, Стремянная, 12, собств. д.

1. Общая часть.

Предметомъ плодоводства служитъ культура или воздѣлыван: плодовыхъ растеній, или точнѣе плодовыхъ породъ умѣреннаго пояса, при чемъ сюда относятъ также и ягодные кустарники.

Плодоводство въ Россіи ведется изстари и давно уже пріобрѣло у насъ очень большое экономическое значеніе въ народной жизни, не говоря уже о томъ, что плодоводство имѣетъ еще и немалое эстетическое значеніе, такъ какъ занятіе плодоводствомъ способно доставить человѣку немало свѣтлой радости и душевнаго успокоенія отъ житейскихъ треволненій и заботъ, принося съ собой огромное нравственное удовлетвореніе и пробуждая въ душѣ человѣка лучшія культурнѣйшія чувства.

Въ ботаническомъ отношеніи наши плодовыя деревья нринадлежать къ общему отдѣлу розоцвѣтныхъ растеній (Rosaceae), при чемъ яблоня, груша и айва, а также нѣкоторыя другія плодовыя маловажныя породы, составляющія въ плодоводствѣ особую группу сѣмячковыхъ, относятся къ ботаническому семейству яблоневыхъ (Ромасеае), а вишни, черешни, сливы, персики и абрикосы (на ряду съ нѣкоторыми другими, имѣющими второстепенное значеніе породами), принадлежа къ ботаническому семейству миндальныхъ, (Атудфаlасеае) составляютъ въ плодоводствѣ группу косточковыхъ. Относящійся также сюда миндаль въ плодоводствѣ причисляется къ орѣхоплоднымъ.

Аблоня. Яблоня среди плодовыхъ деревьевъ представляетъ собою безусловно главную плодовую породу, особенно въ Россіи, гдъ яблоня, какъ одна изъ наиболъе выносливыхъ къ холоду пло-

довыхъ породъ, находитъ наибольшее распространение.

Съверной границей разведенія культурной яблони въ Европ. Россіи (съ каковою границею приблизительно совпадаетъ и съверная граница вишни), будетъ линія, проведенная изъ Финляндіи немного съвернъе Бьернеборга, Тамерсфорса и С. Михеля и идущая далъе на востокъ черезъ Петрозаводскъ, Кадниковъ Вологодской губерніи и Вятку. Съ абсолютною точностью эту съверную границу провести нельзя, потому что среди культурныхъ сортовъ

яблони, которые не всь относятся къ одному ботаническому виду, есть болже или менже холодостойкие сорта.

Въ настоящее время принято вмъсто прежняго названія ботаническаго рода яблони Ругия, видовое прежнее название Malus. такимъ образомъ согласно настоящей номенклатуръ обыкновенная дикая или лъсная яблоня, Malus silvestris или Malus communis.

является прародителемъ, въроятно, большинства

нашихъ благородныхъ сортовъ.

Различная степень холодостойкости нашихъ благородных в садовых в сортовъ яблони, несомнённо. должна находить свое объяснение въ томъ, отъ какихъ именно дикорастущихъ видовъ происходятъ тъ или другіе культурные сорта.

Наши многіе льтніе сорта яблонь, явно происходять отъ китайской яблони Pvrus или Malus

prunifolia, что видно не только по строенію съменного гнъзда, плодоножки и вообще, по самому плоду, но и по строенію дерева, по древесинъ и, особенно по листьямъ.

Весьма въроятно, что въ образовании нъкоторыхъ нашихъ съверныхъ сортовъ яблони участвовала и сибирская яблоня. Pyrus или Malus baccata, по крайней мара, абсолютно отрицать этого не приходится, особенно если принять во вниманіе, что многіе, происходящіе отъ этихъ двухъ сибирскихъ или азіатскихъ видовъ. M. baccata и M. prunifolia, сорта еще совер-




Рис. 1. Плоды сибир-

ской яблони.

Родоначальная форма сибирской яблони имъетъ маленькій, величиною съ рябиновую ягоду, плодъ, откуда и происходитъ ея видовое латинское название—baccata, т. е. ягодная. Садовыя ея разновидности, а также и весьма часто встръчаемые и еще болъе многочисленные гибриды ея съ Ругиз prunifolia, уже имъютъ болъе крупный плодъ, величиною съ вишню, и въ нашихъ черно земныхъ губерніяхъ, напр., въ Курской, называются янтарками.

Настоящая сибирская ягодная яблоня, т. е. типичная, родоначальная ея форма, характеризуется, по большей части, небольшими размърами дерева, способностью размножаться кусочками корней. отделенными отъ маточнаго экземпляра и чрезвычайной энергіей прорастанія стинть, которыя способны быстро прорастать даже осенью, тотчась по извлеченім ихъ изъ плодовъ, если ихъ, напр., мокрыми сушить толстымъ слоемъ въ тепломъ мъсть. Этихъ двухъ послёднихъ признаковъ, т. е. способности возрождаться отъ кусочковъ корней, и прорастанія осенью, тотчасъ по извлеченіи ихъ изъ плоловъ, не имфютъ никакіе другіе виды яблони, какъ и не обладають этими особенностями и гибриды сибирской яблони съ другими видами. Среди гибридовъ и садовыхъ разновидностей сибирской яблони, какъ и среди садовыхъ формъ попадаются такіе, которые имъють высокорослыя деревья съ быстрорастущими кръпкими побъгами. Нъкоторыя саловыя формы китай-

ской яблони имъютъ кромъ быстраго роста побъговъ довольно крупные, очень красивые листья и плоды, величиною приблизительно съ голубиное яйдо. Слаборослыя формы ягодной сибирской яблони нъкоторыми пепиньеристами предлагаются какъ сдерживающій силу роста привоя полукарликовый подвой, имъющій замънить дусень въ тъхъ мъстностяхъ, гав последній не выносить зимъ.

Однако, возможность такой замёны мелкоплодною ягодною яблоней пусена пока далеко не выяснена, оставаясь, такимъ образомъ, подъ сомнъніемъ, и вообще, какъ подвой, сибирская яблоня многими плодоводами отрицается, другими же восхваляется. Гораздо большее значеніе имбеть, какъ рослый, здоровый и выносливый къ холоду подвой, настоящая китайская яблоня.



Рис. 2. Плоды курской янтарки.

Въ Пензенскомъ Училищъ Садоводства, руководимомъ извёстнымъ плодоводомъ А. И. Журавскимъ, имъется цълое насаждение китайскихъ яблонь, посаженныхъ здёсь еще, очевидно, при учреждении этого училища, или вскорв послв этого, т. е. лвтъ 70-80 тому назадъ. Такъ заставляють думать огромныя здоровыя деревья растущей здёсь китайской яблони, ежегодно дающія массу плодовъ. Послёднія идуть для добыванія сёмянъ, назначаемыхъ для посёвовъ съ цёлью выведенія дичковъ. Однако, несмотря на всв ценныя качества китайской яблони, было бы ошибкой рекомендовать ее, какъ подвой, пригодный повсюду, но въ мъстностяхъ съ суровыми зимами и ръзкими переходами отъ холода къ теплу и обратно, китайская яблоня несомнонно всегда будеть имоть очень большое значеніе, какъ выносливый подвой, обладающій къ тому же густо развивающимися, мочковатыми корнями, что дёлаеть у китайской яблони лишней такъ называемую зеленую пи-

Единичные случаи долголётняго существованія въ сѣверныхъ мѣстностяхъ китайской яблони на очень сырыхъ мѣстахъ, пока-



Рис. 3. Одно изъ деревьевъ китайской яблони, растущихъ въ саду Пензенскаго Училища Садоводства. По этой фотографіи можно судить, какихъ значительныхъ размъровъ достигаетъ китайская яблоня.

зывають наибольшую выносливость ея корней къ чрезмърному избытку въ почвъ воды.

Плоды гибридовъ сибирской яблони имъютъ въ большинствъ случаевъ цънность для употребленія на варенье; крупноплодныя же разновидности китайской яблони для непритязательнаго вкуса, годятся даже къ употребленію ихъ въ сыромъ видъ. Къ цъннымъ качествамъ китайской яблони, между прочимъ, относятся, какъ ея неизмѣнно постоянная и обильная плодовитость, такъ и ея стойкость въ отношея (на ряду съ сибирской) къ жарѣ и засухѣ, вслѣдствіе чего китайская яблоня, (крѣпко удерживающая на деревѣ плоды и не роняющая ихъ на землю при продолжительной засухѣ даже у насъ на югѣ), имѣетъ несомнѣнное значеніе въ засушливыхъ мѣстностяхъ нашего юга, хотя бы въ качествѣ породы для скрещиванія съ садовыми сортами яблонь, съ цѣлью выведенія цѣнныхъ засухостойкихъ сортовъ яблони для нашихъ южно-русскихъ степныхъ мѣстностей. Начало полученія такихъ сортовъ положено благодаря выдающемуся оригинатору И. В. Мичурину.

Какъ китайская, такъ и сибирская яблони, даютъ гибриды съ садовой яблоней; такіе гибриды, обыкновенно мелкоплодные, называются кребами, причемъ такъ называютъ неръдко вообще мелкоплодныя яблони, за исключеніемъ развъ сибирской ягодной.

Въ С. Америкъ, согласно извъстному американскому спеціалисту по садоводству, профессору Бейли (L. H. Bailey. Scetch of the evolution of our native fruits), въ культуръ, по крайней мъръдяя цълей гибридизаціи имъютъ вначеніе дикорастущіе американскіе виды яблони, — Pyrus coronaria, P. angustifolia и P. Ioensis.

Въ образованія современныхъ культурныхъ сортовъ яблонь участвовала также и низкорослая яблоня Ругиз или Malus pumila, отъ которой происходятъ всёмъ извёстные, размножаемые, обыкновенно, безполымъ путемъ подвои,—полукарликовый подвой дусенъ (Malus pumila praecox) и карликовый подвой,—райская яблоня или парадизка (Malus pumila paradisiaca).

Райская яблоня или парадизка представляетъ собою, какъ извъстно, подвой, довольно требовательный не только къ самой почвъ, въ смыслъ ея качествъ, но и въ смыслъ достатка въ ней влаги. На парадизкъ, какъ на вполнъ карликозомъ подвов, выводятся наиболъе слаборослыя, миніатюрныя формы, въ которыхъ выращивается яблоня, а именно маленькій кустъ, кордоны, небольшія пальметты, колонны и проч., срокъ существованія коихъ ограничивается обыкновенно приблизительно 12—15 годами.

Дусенъ является уже полукарликовымъ подвоемъ, и привитыя на немъ яблони достигаютъ гораздо большихъ размѣровъ, чѣмъ на парадизкѣ, употребляемой для наиболѣе мелкихъ формъ. При этомъ срокъ продолжительности жизни деревьевъ, привитыхъ на парадизкѣ, приблизительно вдвое короче, чѣмъ на дусенѣ, который дллеко не столь притязателенъ къ качеству почвы и его влажности, какъ парадизка. Вообще, по своимъ свойствамъ и требованіямъ къ почвѣ дусенъ представляетъ собою какъ бы стоящій, по силѣ роста, подвой посрединѣ между парадизкою и обыкновеннымъ яблоневымъ дичкомъ. При этомъ дусенъ проявляетъ нѣсколько большую холодостойкость, чѣмъ парадизка.

Здѣсь нельзя не упомянуть о томъ, что Р. И. Шредеръ различаетъ два дусена, — нѣмецкій и французскій, характеризуя ихъ слѣдующимъ образомъ. Ростъ дусена нѣмецкаго довольно сильный, корни самаго непривлекательнаго сложенія: длиные, рогатые, голые, такъ что, кто не знаетъ этой особенности, считаетъ деревья бракомъ. Корни проникаютъ очень глубоко въ землю, не страдаютъ отъ засухи, хорошо питаютъ привитыя на нихъ деревья и долговѣчны, служатъ лѣтъ 15—20. Плоды зеленоватые, поздніе, кислые. Деревья, привитыя на нѣмецкомъ дусенѣ, требуютъ 4 арш. разстоянія между собою. Очевидно, въ качествѣ полукарликоваго подвоя для средней и отчасти для сѣверной Россіи этотъ нѣмецкій дусенъ Р. И. Шредеръ только и рекомендуетъ.

Дерево французскаго дусена отличнаго качества, но очень чувствительно въ морозу и потому примънимо только на югъ; плодъ сладкій, съъдобный. Это чуть ли не тотъ самый сорть, который питомники называють amelioré. Что касается парадизки, то она считается достаточно холодостойкою не только на съверъ, но и въ средней Россіи, хотя нъкоторые плодоводы полагають, что это вопрось не окончательно выясненный и ръшенный. По нашему мнънію, врядь ли можно разсчитывать въ съверной Россіи на

нарадизку, какъ на холодостойкій дичекъ.

Обращаясь теперь къ культурнымъ садовымъ сортамъ яблони, можно сказать, что количество этихъ сортовъ очень велико и больше, чъмъ у какой-либо другой породы. Въ Россіи имъется много еще неизвъстныхъ, никъмъ пока не описанныхъ мъстныхъ сортовъ яблони, изъ коихъ нъкоторые могутъ оказаться весьма цънными для культуры. Но на настоящій должный путь русское плодоводство, въ которомъ яблоня играетъ первенствующую роль, станетъ только тогда, когда будутъ выведены путемъ гибридизаціи, по опредъленному строго-научному плану, новые сорта яблони, отвъчающіе въ наибольшей степени всъмъ мъстнымъ условіямъ. Пока же мы довольствуемся случайно появившимися у насъ въ культуръ сортами, безъ всякаго участія разумной воли человъка.

Находящіеся въ культурѣ сорта яблони въ помологическомъ отношеніи принято раздѣлять на слѣдующіе 15 классовъ: 1) Кальвили, 2) Гремушки или Гремучія, 3) Златки или Гульдеринги, 4) Розовки, 5) Голубки, 6) Рамбуры или фунтовыя, 7) Рамбурные ренеты, 8) Одноцвѣтные или восковые ренеты, 9) Борсдорфскіе ренеты, 10) Красные ренеты, 11) Сѣрые ренеты, 12) Золотистые ренеты, 13) Полосатки или штрейфлинги, 14) Пипки или остро-

конечныя, и 15) Репки или плоскія.

Груша. Дикорастущая груша, Pyrus communis Linn, принадлежить къ ботаническому семейству яблоневыхъ Pomaceae, причемъ отъ этого вида происходятъ всъ культурные сорта груши, за исключениемъ очень немногихъ сортовъ японскихъ и американ-

скихъ грушъ; изъ последнихъ, кроме сорта Сенецъ Кифера (Kieffer Seedling), надо еще указать на имфющій значеніе въ промышленной культуръ Съверной Америки Ле-Контъ (Le Konte). Оба эти сорта происходять оть пом'вси европейской груши P. communis съ китайской или японской (Р. sinensis). Въ Японіи разводится нъсколько культурныхъ сортовъ, повидимому, происходящихъ только отъ этого последняго вида. Р. sinensis, Сорта эти именотъ мало для насъ значенія и достойны вниманія только по своему происхожденію. Груша представляеть собою замічательное дерево въ томъ смыслъ, что въ природъ вообще, а въ культуръ въ частности, можно найти груши съ плодами самыхъ разнообразныхъ качествъ, начиная съ простъйшихъ лъсныхъ грушъ (идущихъ на сушку и приготовление превосходнаго грушеваго кваса) и кончая дорогими зимними высококультурными берами и дющесами съ ихъ тающей сочной и ароматной мякотью. Въ центральныхъ черноземныхъ и малороссійскихъ, а отчасти и другихъ губерніяхъ Россіи, груша встръчается въ лъсахъ, какъ дикорастущая порода и при вырубкъ лъса часто оставляется нетронутою населеніемъ, которое почитаеть это дерево, какъ Божій дарь. Будучи пересажена въ садъ или выросшая здёсь изъ семечка, дикая груша въ саду въ отношении плода проявляетъ уже наклонность къ улучшение качествъ последняго, почему мы и иметь въ такомъ неисчислимомъ множествъ полудикія груши, такъ называемыя «поддульки» какъ они называются въ Курской губ. и некоторыхъ другихъ смежныхъ съ этою губерніею мъстностяхъ. Собственно крупноплодную, установившуюся уже въ смыслѣ опредѣленнаго сорта поддульку, представляеть собою, между прочимъ, и извъстный въ югозападномъ крат, а особенно въ Подольской губ., Глекъ, столь пригодный для сушки и образующій здёсь долговечныя, гигантскія деревья, способныя приносить до ста пудовъ въ годъ на одномъ деревъ. Наконецъ, въ своемъ родъ болъе или менъе крупноплодныя поддульки представляють собою многочисленные «сидровые» сорта грушъ, употребляемые для приготовленія грушеваго вина или сидра, особенно же похожи на многія изъ попадающихся въ нашихъ черноземныхъ губерніяхъ поддулекъ и только крупнъе ихъ многіе сорта, такъ называемыхъ, кухонныхъ грушъ, какъ Коровья Нога (Kuhfuss), Катильякъ (Catillac) и друг. Наконецъ, къ этой группъ надо отнести и огромные декоративные (въ сущности, тъ же кухонныя груши) сорта, какова Бель Анжевинь (Belle Angevine). Среднею по вкусу и плотности мякоти между настоящими столовыми сортами грушъ и кухонными грушами будетъ извъстная въ юго-западномъ край и разводимая также въ Малороссійскихъ и Новороссійскихъ губерніяхъ лѣтняя груша Ильинка. Въ прямон зависимости отъ качества плода находится и требовательность грушеваго дерева. Лёсныя груши, какъ дикорастущія деревья,

представляють собою максимумъ нетребовательности, не подвергаясь въ общемъ заболѣваніямъ. Но уже поддульки, представляющія собою первую ступень приближенія къ садовымъ грушамъ (т. е. дулямъ, какъ называетъ ихъ малороссійское населеніе и населеніе смежныхъ съ малороссійскими губерніями містностей; «дуля» населеніемъ тіхъ же мість противуполагается «груші», (подъ которой разумъють дикое лъсное дерево) предъявляють уже нъкоторыя требованія въ смысль ухода, напр., въ отношеніи удобренія, обработки почвы и проч. Садовые культурные сорта грушъ въ общемъ требовательнъе культурныхъ сортовъ яблокъ, какъ въ смыслѣ тепла и климата, такъ и вообще въ отношени культуры. Дессертные сорта грушъ, особенно зимнія беры и дюшессы и имъ подобные лежкіе сорта, предъявляють максимальныя требованія въ отношеніи климата и почвы, такъ и культуры. Вообще, дессертные сорта грушъ нуждаются въ тепломъ и особенно защищенномъ мъстоположении, какъ отъ холодныхъ зимнихъ, такъ и знойныхъ вътровъ. Помимо достаточно питательной почвы столовыя груши нуждаются въ достаткъ почвенной влаги, безъ которой плоды у нихъ или не доразвиваются или преждевременно опадаютъ. Среди столовыхъ дессертныхъ грушъ, правда, есть относительно немногіе, какъ, напр., Деканка іюльская, Жозефина Мехельнская, Конгрессовая и некоторыя другія, мирящіяся съ относительно сухой почвой, но ихъ культура становится совершенно иной въ смыслъ доходности при условіи орошенія сада.

Для груши существуетъ нъсколько подвоевъ, изъ коихъ главные два, — обыкновенный грушевый дичокъ и айва. Грушевый дичекъ является общимъ подвоемъ для всёхъ грушъ, особенно же для кронистыхъ полуштамбовыхъ деревьевъ, айва же служитъ для культуры грушъ въ формъ пирамидъ, куста и затъмъ для карликовыхъ и шпалерныхъ формъ, причемъ айва, какъ подвой, не исключается при благопріятных условіяхь и для кронистаго полуштамба. Привитыя на айвъ груши хотя въ общемъ и менъе долговъчны, чъмъ привитыя на грушевомъ дичкъ, но зато айва даетъ возможность получать быстро растущія въ молодости деревья, которыя значительно ранбе приходять съ урожаями и отличаются болье обильнымъ и регулярнымъ плодоношеніемъ, чъмъ груши, привитыя на грушевомъ дичкъ. Вдобавокъ къ этому и самые плоды при примънении въ качествъ подвоя айвы бываютъ обыкновенно лучше, т. е. крупнъе, интенсивнъе окрашены и вкуснъе. Такія преимущества айвы, какъ грушеваго подвоя, давно уже заставили плодоводовъ различныхъ странъ примънять айву въ широкомъ размъръ при культуръ груши. На айвъ способны прививаться далеко не всъ сорта грушъ, тогда какъ иные сорта грушъ удаются на айвъ какъ нельзя лучше. Сообразно этому, въ плодоводствъ уже давно различають среди сортовъ грушъ симпатизирующіе айвѣ и несимпатизирующіе ей, т. е. не удающіеся на айвѣ. Чтобы заставить хорошо расти на айвѣ и сорта грушъ не симпатизирующіе, примѣняютъ такъ называемую промежуточную или двойную прививку, при которой на айвѣ сперва прививаютъ (или окулируютъ) симпатизирующій сорть груши, а затѣмъ уже на послѣдній прививается сортъ айвѣ не симпатизирующій. Для такой промежуточной или двойной прививки въ Западной Европѣ чаще всего пользуются слѣдующими тремя быстро растущими грушевыми благородными сортами: Бера Аманли, Пасторская (Сиге) и Торжество Жодуанское. Къ числу сортовъ грушъ, не симпатизирующихъ айвѣ и слѣдовательно требующихъ вышеупомянутой двойной прививки, между прочимъ, принадлежатъ: Деканка Зимняя, Беры Башелье, Боскъ, Клержо, Вильямсъ Бонкретьенъ, Дюшессъ д'Ангулемъ, Пассъ-Кольмаръ, Пассъ-Крассанъ, Оливье де Серъ и др.

Обладая сказанными преимуществами, привитыя на айвѣ груши зато и болѣе требовательны. Почва при посадкѣ привитыхъ на айвѣ грушъ должна быть достаточно влажною, но не слишкомъ сырою и холодною. Кронистыя полуштамбовыя груши (на дичкѣ) сажаются въ саду на разстояніи 12 аршинъ другъ отъ друга, пирамиды на дичкѣ на $5^{1}/_{2}$ арш., а на айвѣ на 4 арш., а веретенообразная форма или Фюзо (Fuseau) на $2^{1}/_{2}$ арш. Для кустовой формы на айвѣ даютъ разстояніе какъ и для пирамидъ въ $5^{1}/_{2}$ арш. Среди грушъ есть сорта съ слабымъ ростомъ и имѣющіе узко или вытянуто пирамидальный ростъ, какова, напр., извѣстная груша Клержо, при посадкѣ которой разстоянія соотвѣтственно уменьнаются

Сорть грушь, какъ и сорта яблони, по времени ихъ спълости, раздъляются на самые ранніе лътніе, среднеранніе и осенніе и, наконецъ, зимніе. Лѣтніе, равно какъ и раннеосенніе сорта грушъ снимаются съ дерева обыкновенно нѣсколько ранѣе, до наступленія ихъ полной зрълости, т. е. заблаговременно, —дней за 6—10, иначе на деревъ эти сорта легко перезръваютъ и теряютъ тогда во вкусъ, становясь неръдко мучнистыми. Болъе позднимъ сортамъ столовыхъ грушъ даютъ возможность пробыть подольше на деревв. Выдающіеся по вкусовымъ качествамъ зимніе лежкіе сорта, какъ Зимняя Деканка, Оливье де Серръ, Пассъ Крассанъ и др. требують очень много тепла и потому обыкновенно воспитываются на шпалерахъ, въ наименъе же тепломъ климатъ разводятся въ форм'я пирамидъ и веретена (Фюзо). Въ общемъ, груша въ высококультурныхъ сортахъ есть плодовое дерево южной Россіи. Ликія груши встрачаются частью уже и въ центральной Россіи, каковыя мъстности и составляютъ ихъ естественную съверную границу. Въ культурномъ состоянии груша доходитъ до Петрограда (Финляндскій бергамоть) и разводится въ Швеціи и Норвегіи, хотя и въ ограниченномъ количествъ сортовъ.

Въ помологіи груши раздѣляются на слѣдующіе 15 классовъ: 1) беры или масляныя груши; 2) полуберы, или полумасляныя; 3) бергамоты; 4) полубергамоты; 5) длинныя зеленыя; 6) бутылочныя; 7) аптекарскія; 8) русслеты; 9) мускатныя; 10) шмальцевыя; 11) пряныя; 12) продолговатыя кухонныя; 13) кругловатыя кухонныя; 14) продолговатыя винныя и 15) кругловатыя винныя.

Айва. Айва принадлежить вмъстъ съ яблоней и грушей къ семейству яблочныхъ. Ротасеае, причемъ главное экономическое значеніе имъеть обыкновенаая айва, т. е. Cydonia vulgaris Pers (Pyrus Cydonia Linn). Разновидностью этого вида являются Р. С. lusitanica Mill, отличающаяся болже сильнымъ ростомъ съ широкими листьями грушевидной формы, ребристыми крупными плодами; эта разновидность, извъстная также подъ названіемъ «Португальской», польвуется особеннымъ распространениемъ въ Западной Европъ. Кромъ того, по формъ плода различаются еще двъ разновидности: яблочная (C. v. maliformis) и грушевая (С. v. pyriformis). Обыкновенная или съвдобная айва представляеть собою чаще всего небольшое дерево, достигающее въ высоту около 15 фунтовъ, но при редкихъ исключительныхъ условіяхъ дерево можеть достичь и вдвое большей вышины. Естественная форма дерева кустовидная или неправильно бокаловидная съ возрастомъ принимающая округлый видъ. Въ сыромъ видъ чрезвычайно ароматные плоды айвы несъвдобны, но зато весьма пригодны въ вареномъ видъ, т. е. въ видъ желе и консервовъ, давая, между прочимъ, приготовляемый съ очень отдаленныхъ отъ нашихъ дней временъ извъстный айвовый мармеладъ. Вкусъ плода въ южныхъ теплыхъ странахъ вообще бываетъ несравненно лучше, чёмъ въ более северныхъ.

Наилучшей почвой для айвы является хорошая суглинистая съ достаткомъ влаги. Въ С. Америкъ (въ штатъ Нью-Іоркъ, гдъ ведется особенно уснъшно промышленная культура айвы) лучшими почвами для айвы считаются влажныя глинистыя и при томъ дренированныя. На песчаныхъ почвахъ айва неръдко развивается быстрве, но бываеть менве долговвиною и, кромв того, поздно входить въ пору плодоношенія. Кромѣ того, на песчаныхъ почвахъ, не считающихся для айвы благопріятными, деревья ея не достигаютъ надлежащаго развитія и въ случав посадки айвы на такихъ почвахъ имъ дается въ С. Америкъ разстояние въ 10 футовъ, тогда какъ на благопріятныхъ глинистыхъ почвахъ американцы садять айву на разстоянии 15 футовъ. Въ С. Америкъ для посадки айвы пользуются трехлётними деревьями, при чемъ плодоношение начинается со второго года, полные же урожам получаются спустя 10-12 лътъ послъ посадки. Айва, подобно сливъ и персику, имъетъ корни не идущіе глубоко внизъ, а располагающіеся близъ певерхности земли, что необходимо принимать во внимание ри обработкъ почвы въ междурлдіяхъ деревьевъ. Айва вообще отличается равномърными урожаями, которые при вполнъ благопріятныхъ условіяхъ, кром'й того, еще и бывають весьма щедрыми и даже чрезмърными, следствіемъ чего бываетъ излишекъ плодовъ, получающихся при этомъ условім черезъ-чуръ мелкими. Въ этомъ случав, особенно у густорастущихъ и немолодыхъ деревьевъ часть вътокъ подвергается укорачиванію, т. е. частичному обмолаживанію, слишкомъ же густыя кроны подлежать проръживанію на общемъ основаніи. Такъ какъ у айвы цвъты развиваются на верхушкахъ однолътняго роста, то это необходимо принимать во вниманіе, не обръзая побъговъ безъ дъйствительной надобности. Среди вредителей айвы изъ грибныхъ бользней можно упомянуть листовую пятнистость (Entomosporum maculatum) и ржавчину (Roestelia aurantiaca). Кром'в опрыскиванія бордоской жидкостью, примівняется немедленное удаленіе пораженныхъ вътокъ и сучьевъ. Изъ насвкомыхъ особенно нападають плодожорка и жучокъ — curulis, съ которымъ борются стряхиваніемъ. Айва размножается посівомъ,

черенками, отводками, а также облагораживаніемъ.

Айва представляетъ собою также весьма важный грушевый подвой, употребляемый для выведенія пирамидъ и въ формовой культуръ, для каковой цъли айва въ широкомъ масштабъ размножается отводками. Окулировкой же обыкновенно размножаются цённые культурные сорта айвы. Кром вышеупомянутыхъ разновидностей, уже созданныхъ культурой болъе или менъе давно, американцами сравнительно недавно выведены собственные достойные вниманія сорта, какъ, напр., Оранжевая, Чемпіонъ, Реа и Мичъ (Orange, Champion, Rhea, Meech), а изъ новыхъ американскихъ сортовъ наиболъе достойны вниманія Феллеръ (Faller) и Ванъ-Деменъ (Van Deman). Вообще же айву надо признать деревомъ довольно теплолюбивымъ, и хотя она даетъ плоды не только въ Кієвской, но лаже въ Харьковской губ., доходная ея культура въ Россіи въ связи съ обильными и регулярными урожаями возможна въ болбе теплыхъ мъстностяхъ юга Россіи, въ Крыму, Бессарабін, на Кавказв и въ Закавказьв, въ Туркестанв и т. д.

Вишня. Подъ общимъ именемъ вишенъ мы имъемъ нъсколько древесныхъ породъ, какъ плодовыхъ, такъ и отчасти декоративныхъ, принадлежащихъ къ общему роду Prunus изъ семейства миндальныхъ (Amygdalaceae). Сюда изъ плодовыхъ породъ принадлежатъ: черешня (Prunus avium Linn) и вислая вишня (Prunus cerasus). Морелли и стекловијныя вишни являются промежуточными формами между Р. avium и Р. cerasus; къ последнему виду относятся также и сорта кислой вишни. Кромъ того, достойна вниманія распространенная въ нъкоторыхъ волжскихъ губерніяхъ кустовая или степная вишня,—Prunus Chamaecerasus Jacq. (P. fruticosa Pall). Въ наибольшей степени чувствительны къ холодамъ черешни; за ними идуть морелли, и наконецъ наиболъе морозоустойчивыми являются

кислыя вишни и P. Chamaecerasus. Исторія происхожленія вишенъ и черешенъ не вполнъ выяснена. Родиной этихъ деревьевъ считаются (по К. Коху) горы умфреннаго климата. Сфверная граница распространенія въ Россіи черешни приблизительно следующая: начинаясь въ Польшъ, она направляется черезъ Гродненскую и Минскую губерній, проходить черезъ среднюю часть Черниговской и Харьковской губерніи, откуда направляется чрезъ область Войска Донскаго на Астрахань. За этой съверной границей распространенія черешни илетъ сравнительно не очень обширный районъ распространенія мореллей или гріотовъ (Morellen, Griottes), каковой районъ особенно можеть быть представленъ губерніями Черниговской, Харьковской, Курской и Воронежской. Дальше къ съверу и востоку идуть уже кислыя вишни, при чемъ въ восточныхъ губерніяхъ, въ Поволжью распространена вышеназванная степная или кустовая вишня, плоды которой въ некоторыхъ районахъ Поводжья имеютъ безусловно торгово-экономическое значеніе. Черешня достигаеть въ вышину до 80 футовъ и растетъ быстро, особенно въ первое время. Гріоты или Морелли представляють собою небольшія или средней величины деревья. Кислыя вишни являются маленькимъ деревцомъ или большимъ кустарникомъ. Черешни, какъ и вишни, удаются на почвахъ различнаго качества; имъ благопріятствуютъ болье высоко расположенныя, задерживающія воду легкія суглинистыя почвы. Не пускающія столь глубокихъ корней, какъ черешни, вишни нуждаются во влагъ больше, чъмъ черешни. Песчаныя почвы также должны быть признаны за весьма подходящія (при наличности достатка влаги) для вишни.

Следуеть также отметить, что многіе изъ известныхъ вишневыхъ садовъ Корочанскаго убзда (Курской губ.), спеціально засаженныхъ сортомъ вишни Любка, расположены на склонахъ мъловыхъ горъ съ довольно близкою къ почвенной поверхности мъловой подпочвой, при каковомъ условім яблони и груши здісь не удаются; вишня же при такой подпочвъ благоденствуетъ, изъ чего видно, что некоторый избытокъ въ почет извести можетъ быть для вишни даже полезенъ. Какъ черешни, такъ и вишни, отличаются отъ другихъ плодовыхъ породъ, особенно отъ зерновыхъ. тъмъ, что онъ если и выносять поръзы ножемъ, то только въ ранней молодости, т. е. въ питомникъ, когда, кстати сказать, поръзы ограничиваются укорачиваніемъ или удаленіемъ (на «кольцо») небольшихъ побъговъ для сформированія штамбика и кроны. Большихъ же порёзовъ и крупныхъ ранъ у взрослыхъ деревьевъ черешни и вишни или совершенно не выносять, или очень отъ нихъ страдаютъ. Деревья косточковыхъ породъ, т. е. черешенъ и вишенъ, не нуждаются какъ въ молодости, такъ и въ послъдующее время въ прорѣживаніи или въ просвѣтленіи кроны. Равнымъ образомъ черешни и вишни, какъ и другія косточковыя, не перенося большихъ ранъ, не нуждаются и въ обмолаживании кроны. Послъднее обстоятельство, между прочимъ, въ значительной мъръ содъйствуетъ тому, что вишни, а отчасти и черешни, въ общемъ, живутъ меньше, чъмъ зерновыя породы. Впрочемъ черешня неръдко достигаетъ довольно значительнаго возраста, - лътъ до 60 и даже больше, приближаясь въ отношении долгольтия къ яблонь и грушь, при чемъ наибольшимъ долголътіемъ отличаются дикія и вообще не привитыя, выведенныя изъ косточекъ деревья. Морелли, сорта коихъ съ свътлокрасною ягодою называются во многихъ мъстностяхъ шпанкою, въ общемъ въ отношении долговъчности приближаются къ кислымъ вишнямъ, и въ среднемъ срокъ ихъ существованія можно принять около 25-30 лътъ. Въ этомъ отношении между различными сортами вишенъ замъчается разница, и сорта слаборослые, отличающіеся ежегодно изобильнымъ плодоношеніемъ, какъ извъстная курская морелль, - Любка, уже прекращаютъ свое существованіе ранке, льть черезь 15—20, тогда, какъ другіе болже сильнорослые сорта, какъ шпанки, живутъ лътъ 30 и болъе. Наиболже разнообразія въ смыслъ строенія кронъ представляють собою морелли, у которыхъ имъются сорта съ неправильной формы, распущенной кроной и цониклыми вътвями, какъ вышеназванная курская (или върнъе Корочанская) Любка; далъе имъются сорта съ большой шатровидной кроной (Шпанка) и, наконецъ, сорта съ характерной пирамидальной кроной, какъ, напр., Алферовская тем-

ная (Харьковская долговътка).

Слива. Къ группъ сливъ въ болъе или менъе общирномъ смыслъ надо отнести нъсколько различающихся между собою по многимъ признакамъ принадлежащихъ къ общему ботаническому роду Ргипиз плодовыхъ породъ, а именно терносливу или изгородевую сливу (P. insititia L.), венгерку (P. domestica L.), мирабель или вишнеплодную сливу, (Р. cerasifera Ehrh) къ которой относится и распространенная у насъ на Кавказъ алыча, названная К. Кохомъ P. divaricata и ренклодъ (P. italica Borkh). Въ образовании культурныхъ формъ или сортовъ сливъ играла нѣкоторую роль также и сирійская или дамасская слива P. syriaca Borkh. Все это европейскіе виды рода Prunus, къ которымъ бадо еще отнести столь распространенный у насъ, особенно въ южной половинъ Россіи, терновникъ или теренъ, Р. spinosa L., который имъетъ особенное значеніе въ плодоводствь, какъ подвой для болье ньжныхъ сортовъ сливъ и персиковъ. Выше перечислены только европейскіе, относящіеся къ роду Prunus сливовые виды; но помимо ихъ имфются и другіе, а именно американскіе и японскіе виды, им'єющіе также значение для Россіи. Изъ американскихъ видовъ для насъ имфють особенное значеніе холодостойкіе сорта американской сливы (Р. americana Marsh), въроятно, очень пригодные для культуры въ съверной половинъ Россіи, далъе Р. hortulana Bailey (Wild Goose Plum), слива Майнера (Р. hortulana var. Maineri), далве Чикасова слива, которая въ С. Америкв называется The Chicasaw Plum; датинское название ем — Р. angustifolia Marsh, Pr. Chicasaw Michx. Сюда же, по словамъ нъкоторыхъ американскихъ авторовъ, относится и т. н. Маріанова слива, (Магіанна рlum) которая являясь, какъ предполагаютъ, гибридомъ между чикасовой и вишнеплодной сливой, имъетъ у насъ въ Россіи безспорное значеніе, какъ подвой для сливъ, отличающійся чрезвычайно легкимъ размноженіемъ кусками корней. Кромъ американскихъ видовъ сливъ, относящихся къ виду Р. triflora Roxb, сорта которой пригодны для культуры лишь въ южной Россіи, скоръе же всего въ мъстностяхъ крайняго юга, такъ какъ они не переносятъ большихъ морозовъ и въ недостаточно благопріятномъ климатъ, кромъ того, сильно страдаютъ отъ истеченія камеди.

Относительно съверной границы разведенія въ Россіи сливы въ открытомъ грунту надо сказать приблизительно то же, что и относительно груши, тъмъ болье, что и между сортами сливы есть и болье, и менье выносливые. Здъсь, впрочемъ, вовсе не имъются въ

виду маловыносливыя къ холоду японскія сливы.

Что касается наиболье подходящей для сливы почвы, то за таковую можно признать легкую рыхлую, суглинистую. Тяжелыя глинистыя почвы не благопріятствують росту сливъ. Наши черноземныя почвы, въ общемъ, оказываются довольно подходящими для культуры сливы, но все-таки нельзя не принять во вниманіе. что слива, какъ косточковая порода, нуждается въ достаточномъ присутствій въ почвѣ извести, недостатокъ въ которой можетъ повлечь за собою въ почвъ хронические недороды у сливы, что нетрудно устраняется соотвътствующимъ известковымъ удобреніемъ. Что же касается отношенія сливы къ почвенной влагь, то слива, вообще хорошо плодоносить въ нашихъ южныхъ губерніяхъ и при отсутствій поливки, такъ что должна быть признана за плодовую породу, хорошо выносящую засуху, но изъ этого не следуеть, что всь сливы безпритязательны въ влагь. Въ этомъ отношении венгерка обнаруживаеть скорте обратныя свойства, требуя влажной почвы, на которой вполнъ достигаеть свойственной ей постоянной и большой урожайности. Наконецъ, принимая во вниманіе, что сливы относятся къ ранозацвътающимъ породамъ, онъ нуждаются въ защитъ отъ холодныхъ съверныхъ и восточныхъ вътровъ.

Что касается разстоянія между деревьями сливъ, то въ этомъ отношеніи трудно установить совершенно точныя правила, такъ какъ разстояніе, на которомъ сажаются сливы въ плодовомъ саду, зависить не только отъ географическаго положенія данной мъстности, но и отъ сорта, а также и отъ качества почвы. Такъ, на югъ въ большинствъ случаевъ приходится давать разстояніе въ

плодовомъ саду между сливами въ 3 сажени; въ болъе съверныхъ мъстностяхъ бываетъ ловольно и 2 саженъ.

Абрикосъ. Абрикоса существуетъ четыре следующихъ ботаническихъ вида, изъ которыхъ главный и наиболее распространенный въ культуръ видъ представляетъ собою: обыкновенный или европейскій абрикосъ. Armeniaca vulgaris Linn. Отечество этого вида точно не установлено, и по однимъ изследованіямъ этотъ видъ происходить изъ Туркестана или Арменіи, а по другимъ съ Дальвяго Востока-Китая и Японіи. Особую слаборослую разновидность этого вида, находимую дико въ южной Франціи и Италіи составляеть A. vulgaris brigantiaca. Особый, выносливый къ зимнимъ морозамъ видъ (отчасти даже въ средней Россіи) представляетъ собою черный, или пурпуровый абрикосъ - A. dasycarpa Ehrh (P. armeniaca dasycarpa K. Koch), представляющій собою маленькое деревцо и, какъ предполагають, происходящій родомъ изъ Маньчжурін. Въ этому виду относится извъстный въ Россіи сорть абрикоса Тлоръ Циранъ съ темнопурпуровыми, почти черными, довольно безвкусными, напоминающими сливу плодами. Сравнительно мало распространеннымъ видомъ является японскій абрикосъ-A. Mumo Sieb et Zucc. Дерево этого вида по размърамъ подходитъ къ обыкновенному абрикосу, при чемъ его въ Японіи разводять не ради плодовъ (у А. Мите илоды несъбдобны), а ради цвътовъ. Наконецъ, четвертымъ видомъ является сибирскій абрикосъ, P. sibirica Linn (P. armeniaca sibirica K. Koch), родомъ изъ Монголіи и Лагуріи и представляющій собою большой кустарникъ или маленькое деревцо. Плоды этого вида также несъбдобны, но само растеніе представляєть немалый интересь, какъ подвой для абрикоса и некоторыхъ другихъ косточковыхъ.

Такимъ образомъ, для насъ главнъйшій интересъ сосредоточивается на обыкновенномъ, т. е. европейскомъ абрикосъ, часто попадающемся въ некультурной формъ съ медкими плодами у насъ на югъ Россіи и называющемся здъсь жарделемъ. Абрикосъ представляетъ собою какъ бы промежуточный плодъ между персикомъ и сливой, при чемъ онъ является болъе выносливымъ къ холоду, чъмъ персикъ, цвътетъ хотя и позднъе послъдняго, но также довольно рано, раньше сливы. Лучшею почвою для абрикоса будетъ глубокая безъ излишней влаги, глинистая или суглинисто песчаная. Хорошо поддающіяся обработкъ глинистыя почвы, на коихъ хорошо удаются яблони, хороши и для абрикосъ сказывается весьма чувствительнымъ къ сырой подпочвъ и потому для низкихъ

влажныхъ мъстъ не годится.

Районъ произрастанія абрикоса въ Россіи, кромѣ Крыма, Кавказа, Закавказья и Закаспійскихъ владѣній приходится на Новороссійскія губерніи, Югозападный край и Бессарабію. Изъ послѣдней на рынки немало вывозится сушенаго абрикоса, подъ названіемъ шепталы. Въ кульгурт имъется около полусотни сортовъ абрикоса, изъ коихъ наиболъе извъстными являются: обыкновенный, Бреда, Овернскій ранній, Люизе, Персиковый и Королевскій Рояль. Въ С. Америкъ и особенно въ Калифорніи абрикосъ культивируется въ весьма широкихъ размърахъ, при чемъ тамъ распространены свои собственные, американскіе сорта абрикоса, изъ коихъ главными являются Моограгк, Elberta и др. Деревья культурныхъ сортовъ абрикоса въ плодовыхъ садахъ принято садить на такомъ же разстояніи, какъ и хорошо разрастающіеся сорта сливъ, т. е. на разстояніи 3 саженъ.

Персикъ—Amygdalus persica или Persica vulgaris Mill (нѣ-которые ботаники относять персикъ къ роду Prunus), будучи родомъ изъ Китая, принадлежить къ ботаническому семейству миндальныхъ, куда относятся всѣ косточковыя плодовыя деревья. Въ настоящее время персикъ культивируется во всѣхъ частяхъ свѣта и удается при весьма разнообразныхъ условіяхъ.

Въ помологіи персики группируются на пушистые, съ волосистыми плодами и на гладкокожіе. Пушистые персики въ свою очередь дѣлятся на двѣ группы: на настоящіе персики (съ отстающею косточкою) и на павіи (съ не отстающею косточкою). Точно также и гладкокожіе персики подраздѣляются на нектарины (съ отстающей косточкой) и на брюньоны (съ не отстающей косточкой).

У насъ въ Россіи персики культивируются только въ южной Россіи, хотя за посліднее двадцатильтіе культура персиковь шагнула замътно впередъ въ смыслъ приближенія границы успъщнаго развитія его къ сѣверу, и дальнѣйшіе опыты разведенія персиковъ въ грунту у насъ въ Россіи могли бы дать еще болъе благопріятные результаты. Въ общемъ при разведеніи персика въ открытомъ грунту это дерево является вообще недолговъчнымъ, и срокъ его существованія приблизительно колеблется въ предвлахъ 10-15 дътъ, при чемъ персикъ нередко начинаетъ плодоносить уже съ трехлатняго возраста. При культура его подъ стекломъ (въ оранжереяхъ), какъ это практикуется на съверъ, персикъ живетъ обыкновенно гораздо дольше. У насъ имъются уже примъры успъшной культуры персика подъ Кіевомъ и двадцатилътніе опыты культуры персика, произведенные въ довольно обширныхъ размърахъ заслуженнымъ плодоводомъ, лъсничимъ С. Ф. Храмовымъ въ Верхне-Днъпровскомъ лъсничествъ, Екатеринославской губ., между прочимъ, показали, что здёсь персикъ съ полнымъ успъхомъ можетъ развиваться въ открытомъ грунту. Такой наглядный примъръ, доказывающій возможность культуры персиковъ въ открытой степи, началъ увлекать многихъ любителей, и требованія на эти деревья изъ питомниковъ этого лъсничества всегда превышають запась. Отпущенные же персики изъ Верхне-Днъпровскаго лъсничества, привитые главнымъ образомъ на тернъ, этомъ коренномъ обитателѣ степей, начали приносить плоды въ губерніяхъ Полтавской, Подольской, Кіевской, Харьковской и даже въ Курской. Въ своемъ трудѣ «Степная культура персиковъ» С. Ф. Храмовъ сообщаетъ: «Дальнѣйшія наблюденія надъ культурой персиковъ въ питомникахъ показали, что персики на тернѣ растутъ быстро только въ первые два—три года, а затѣмъ какъ бы пріостанавливаются въ своемъ развитіи, при чемъ срастаніе съ подвоемъ значительно лучше, чѣмъ у привитыхъ на абрикосѣ. Что же касается



Рис. 4. Персиковая плантація 5-лътняго возраста въ Верхнеднѣпровскомъ лъсничествъ.

выносливости къ мѣстному злимату персиковъ, привитыхъ на тернѣ и абрикосѣ, то я особой разницы не наблюдалъ. Неблагопріятная же зима 1912—1913 года при продолжительной годоледицѣ сказалась болѣе пагубно для абрикосовъ, чѣмъ для персиковъ. Персики лучше выдержали эту зиму— почти всѣ уцѣлѣли, какъ въ питомникахъ, такъ и въ маточномъ саду; абрикосы же урожая не дали, а вмѣстѣ съ тѣмъ и много старыхъ и молодыхъ деревьевъ погибло не только въ районѣ лѣсничества, но мнѣ пришлось наблюдать въ томъ же году гибель абрикосовыхъ плантацій и школъ въ Мелитопольскомъ уѣздѣ, Таврической губ. Какъ абрикосы, такъ и персики, въ питомникахъ лѣсничества на зиму не обвязываются со спеціальной цѣлью предохранить ихъ отъ мороза, но въ виду массы зайцевъ производится обмотка соломой или оче-

ретомъ только нижней части деревца, боковыя же и верхушечныя вътки остаются свободными. Въ зиму 1905—1906 года обмотка деревьевъ совершенно не производилась, и всъ деревъя вышли изъзимы въ отличномъ вилъ и лали обильный урожай».

Персикъ, какъ и всв вообще плодовыя породы, говоритъ далве С. Ф. Храмовъ, полверженъ камелетеченію, хотя въ питомникахъ лъсничества камелетечение рълко наблюдается, развъ только при случайномъ пораненіи. На постоянныхъ мъстахъ въ саду, съ наступленіемъ плодоношенія, появляется зам'ятно и камедетеченіе, которое встръчается менъе на персикахъ привитыхъ на тернъ, чемъ на абрикосахъ. Такимъ образомъ, все преимущества на стопонъ персиковъ, привитыхъ на тернъ, что замътно даже для простого наблюденія въ питомникахь: школа персиковъ, привитыхъ на тернъ, ръдко отличается отъ рядомъ расположенной школы персиковъ, привитыхт, на абрикосахъ, какъ по росту своему, такъ и по интенсивности окраски листьевъ. Что касается плодоношенія персика, привитаго на тернъ, то онъ поражаетъ своимъ обильнымъ и раннимъ плодоношениемъ, примъромъ чему могутъ служить оставленныя въ школахъ однолътки, которыя на слъдующій годъ (на второмъ году послѣ окулировки) часто покрываются массой плодовъ. Такой необычно ранній сборъ плодовъ увлекаетъ многихъ, но одно только, что заставляеть иногда призадуматься, это корневые отпрыски терна, которые при неумблой культур могуть сильно развиться, засорить почву, а вийстй съ тимъ и ослабить плодоношение персиковыхъ деревьевъ. Мнъ кажется. — говоритъ С. Ф. Храмовъ. — что этого особенно не следуеть бояться, такъ какъ при неглубокихъ взрыхленіяхъ почвы возлів персиковъ, избъгая пораненія корней при раціональной и умъренной обръзкъ персиковаго дерева, корневые отпрыски терна не наблюдаются, а если они и появятся возлё ствола, то ихъ легко удалять, откопавъ предварительно землю вокругъ корневой шейки дерева. Кромъ того, замъчается у персиковъ привитыхъ на тернъ, что полвой теренъ въ своемъ развитіи отстаетъ, и стволъ привитаго персика бываеть значительно толще, но и этого особенно не слъдуеть бояться, такъ какъ это не препятствуеть успъщному росту персиковаго дерева. Пересаженные экземпляры персиковъ изъ питомниковъ у С. Ф. Храмова уже на второмъ году, а затъмъ и на третьемъ послѣ посадки даютъ плоды, а иногда и обильные урожан, если къ тому препятствиемъ не явятся случайные утренники, которые побивають цвёты, такъ какъ персикъ цвётеть очень рано. Но съ возрастомъ на персиковой плантаціи урожай можетъ повторяться черезъ извъстные промежутки времени, а затъмъ неожиданно для владёльца создадутся и разныя неблагопріятныя условія, напр., истеченіе камеди на вътвяхъ и стволахъ, курчавость листьевъ, насъкомыя, повреждающія корни (на рыхлыхъ почвахъ особенно личинки майскаго жука) и, какъ показали наблюленія, въ районъ Верхнеднъпровскаго лъсничества--тля.

Все это, — говоритъ С. Ф. Храмовъ, — необходимо имѣть въ виду при началѣ культуры персиковъ, чтобы потомъ не быть разочарованнымъ при борьбѣ съ врагами. Я, говоритъ С. Ф. Храмовъ, предполагаю, что вполнѣ достаточно, если персиковое дерево будетъ приносить плоды 5—7 лѣтъ, такъ какъ съ возрастомъ урожан могутъ настолько понизиться, и плоды могутъ мельчать, что выгоднѣе сдѣлать новую посадку.

Главными подвоями персика считаются: слива, персиковые же съянцы, абрикосъ и миндаль. Послъдній подвой для персика рекомендуется, между прочимъ, при известковыхъ почвахъ. Но что касается вообще выбора наиболъе подходящаго подвоя для персика при различныхъ условіяхъ, то здъсь практикою садоводства еще не выработано вполнъ опредъденныхъ данныхъ.

Говоря о подвояхъ персика, авторъ особенно имъетъ въ виду для мъстностей съ менъе теплымъ климатомъ карлиговые полвои. которые дали бы завсь привитому на нихъ персику слержанный ростъ и лучше выспѣвающую къ осени древесину; не слѣдуеть для этихъ мъстностей выпускать изъ виду, кромъ терна, и другого степного кустарника (растущаго во множествъ по берегамъ ръкъ, напр., въ Харьковской губ.), --бобовника или карликоваго минлаля. (Атусdalus naua). Кромъ того, немаловажное значеніе, какъ подвой для персика имбеть кавказская мирабель или алыча (Prunus divaricata или Prunus myrabolana divaricata), на которой персикъ прививается съ большимъ усивхомъ. Параллельный опытъ и наблюденія двухъ лътъ, -- говоритъ С. Ф. Храмовъ, при прививкъ персика на миндаль и алычь показали, что окулировка персика на алычь удается значительно лучше, чёмъ на минлаль. Полвой алычи посль терна является самымъ лучшимъ подвоемъ, что пришлось наблюдать и въ питомникахъ Кавказа близъ Сочи.

Мы здёсь преднамёренно привели выдержки изъ вышеназваннаго труда С. Ф. Храмова, такъ какъ персикъ, представляя собою одну изъ наиболёе цённыхъ плодовыхъ породъ, до сихъ поръ относительно мало распространенъ у насъ въ культуре. Между тёмъ въ высшей степени интересныя наблюденія С. Ф. Храмова, произведенныя имъ въ теченіе многихъ лётъ, разсёиваютъ установившееся о персикъ не совсёмъ правильное мнёніе, будто персикъ годится лишь для мёстностей крайняго юга. Въ болёе благопріятныхъ мёстностяхъ, съ болёе мягкими зимами, придется предпочесть при культурё персика, напр., алычу или другіе подвои.

Миндаль. Миндальное дерево, — Amygdalus communis L. — самое высокорослое среди плодовыхъ породъ и свободно достигаетъ въ высоту 4 саженъ, почему и называется въ нѣкоторыхъ странахъ исполинскимъ персикомъ, имѣетъ очень большое внѣшнее сходство

съ посладнею плодовою породою. Миндальное дерево принадлежитъ къ группъ косточковыхъ и нъкоторыми ботаниками относится даже къ роду Prunus. Миндаль въ Россіи можетъ съ успъхомъ произрастать лишь въ мъстностяхъ крайняго юга, на южномъ берегу Крыма, въ Закавказъй и Ташкентв. Миндаль цвътетъ много раньше всёхъ плодовыхъ породъ и на южномъ берегу Крыма зацвётаетъ уже въ концъ января, оръхообразные же плоды его поспъваютъ лишь только позднею осенью.

Кизилъ. Безусловное экономическое значение имъетъ въ южной половинъ Россіи кизилъ (Cornus Mas), принадлежащій къ семейству кизиловыхъ (Cornaceae) и представляющій собою большой кустарникъ или небольшое дерево родомъ изъ южной Европы и востока. Кизилъ отличается большою долговъчностью. Въ садахъ мы встрвчаемъ какъ мелкоплодныя такъ и крупноплодныя формы кизила. Именно къ последнимъ и относится Крымскій садовый кизиль, вывозимый на съверные рынки и высокоцънимый для варенья. Кизилъ цвътетъ весною очень рано, когда еще всъ окружающія его остальныя древесныя растенія не показывають никакихъ признаковъ жизни, за исключениемъ развъ оръшника. Хотя кизилъ и представаетъ собою плодовую породу, пригодную для разведенія въ южной Россіи, но все же оказывается достаточно выносливымъ на весьма значительной площади Имперіи, хорошо плодонося, напр., въ южной части Черниговской и въ Харьковской губ. По окраскъ плода кизилъ бываетъ красноплоднымъ и желтоплолнымъ. Последняя форма въ садахъ, особенно въ Россіи, попадается ръдко. Съмена кизила очень долго и трудно прорастаютъ, почему и съянцы его въ торговат попадаются не часто. Кизилъ можно разводить какъ прививкой, такъ и безполымъ путемъ-отводками. Къ последнему способу размноженія кизила въ Крыму у насъ и прибъгаютъ.

Знакомство съ терминологіей и главнейшими характерными ботаническими особенностями плодовыхъ деревьевъ. Какъ уже было сказано, плодовыя деревья подраздъляются на двъ группы-на зерновыя и косточковыя. Яблони, груши и айва съ плодами, заключающими внутри съмена, принадлежатъ къ первымъ; вишни и сливы заключающія внутри плода косточку, какъ и персики съ абрикосами-ко вторымъ.

У всёхъ деревьевъ мы различаемъ надземныя и подземныя части; последнія называются корневой системой. Въ надземныхъ частяхъ мы различаемъ стволъ и развътвленія послъдняго: сучья, вътви и вътки съ глазками или почками. Молодыя, еще неодеревенъвшія, вышедшія весною изъ почекъ и не сбросившія еще листьевъ вътки называются побъгами. На въткахъ мы различаемъ передніе, задніе и боковые глазки или почки. Вътки бывають ростовыми, -- длинными, служащими лишь для продолженія

роста дерева и плодовыми, короткими, служащими для плодоношенія. Среди ростовыхъ вътокъ отличаютъ волчки или водяные



Рис. 5. Розетка листьевъ.




Рис. 6. Розетка съ большимъ числомъ листьевъ.

побъги, легко узнаваемые по ихъ буйному росту, и образующіеся на деревъ обыкновенно въ томъ мъстъ, гдъ существуеть затрудненіе проходу сока. Ростовыя длинныя вътки, какъ у зерновыхъ,

такъ и у косточковыхъ деревьевъ, развиваются одинаково, и особенной разницы, какъ у тъхъ, такъ и у другихъ, не представляютъ; что же касается плодовыхъ вътокъ и ихъ развитія у зерновыхъ и косточковыхъ деревьевъ, то здёсь существують существенныя отличія.

У зерновыхъ породъ плодовыя почки развиваются следующимъ образомъ. На томъ месте ростовой вытки, гдъ сила сока не особенно значительна, т. е. не на столько велика, чтобы изъ какого нибудь глазка развить длинный побъть, развиваются въ первое льто 2-3 листа (розетка листьевъ, - рис. 5). Въ теченіе второго лъта на томъ же короткомъ побъгъ (бугоркъ) развивается розетка листьевъ съ большимъ ихъ числомъ (рис. 6), и къ концу лъта верхняя почка начинаетъ превращаться уже въ плодовую, образуя зачатки цвътка, причемъ весною она будетъ имъть видъ, представленный на рисункъ 7. Это будетъ уже совершенно сформированная плодовая вътка, которая развътвляется въ теченіе слідующих віть (рис. 8). Такимь образомь, Видьплодоцвъточныя почки у зерновыхъ породъ обыкновенно выхъ въразвиваются на трехлътней и болъе стараго возраста токъ весной.

древесинъ, котя, какъ исключеніе, существують и такіе сорта, которые развивають, подобно косточковымъ, плодовую почку и на годовалой древесинъ.

У косточковыхъ породъ развитіе плодовыхъ почекъ идетъ проще и скоръе, нежели у зерновыхъ. У косточковыхъ, какъ и у зерновыхъ, на тъхъ мъстахъ однолътнихъ вътокъ, гдъ сила сока не настолько велика, чтобы развить ростовый побъгъ изъ глазка, послъдній въ первый годъ развиваетъ розетку листьевъ, которая въ это же лъто заготовляетъ цвъточную почку. Образующіеся такимъ путемъ короткіе побъги уже на вторую весну несутъ цвъты, или, другими словами, у косточковыхъ—плодовыя почки развиваются уже на однолътней древесинъ.

По мфрф вырастанія короткихъ плодовыхъ вфтокъ,

послъднія удлиняются, имъя по бокамъ плодовыя почки, но конечныя почки этихъ короткихъ вътокъ точно такъ же, какъ и длинныхъ

ростовыхъ побъговъ, у косточковыхъ всегда бываютъ ростовыми, тогда какъ у зерновыхъ—конечныя почки тъхъ или другихъ вътокъ могутъ быть и плодовыми, и ростовыми. На рисункъ 9 изображены такія короткія плодовыя вътки вишни (такъ, напр., букетныя вътки), а на рис. 10 изображена пятилътняя вътвь, усаженная букетными вътками. Кромъ глазковъ, развивающихся въ побъги и вътки, какъ у зерновыхъ, такъ и у косточковыхъ породъ, имъются подъ корою еще скрытые, такъ называемые спящіе, глазки на многолътней древесинъ. Эти глазки, не развившеся своевременно, а замерзшіе подъ корою, въ благопріятныхъ для ихъ развитія въ побъгъ, случаяхъ, могутъ быть пробуждены и вызваны

къ жизни, какъ это мы видимъ при сильной подръзкъ надземныхъ частей дерева или укорачивании сучьевъ и вътвей.

Рис. 8. Развът-

вленная плодовая вътка.

Образующіеся сплошь и рядомъ на укороченныхъ вътвяхъ и сучьяхъ водяные побъги или волчки, обладающіе иногда, какъ это сказано выше, очень сильнымъ ростомъ и выходящіе часто изъ толстой и уже старой коры, на самомъ дълъ развиваются изъ спящихъ глазковъ, ожившихъ вслъдствіе напора сока. Способностью къ образованію спящихъ глазковъ и энергіей ихъ пробужденія зерновыя и косточковыя породы обладаютъ далеко не въ одинаковой степени. Въ то время, какъ у зерновыхъ породъ при вся-

комъ сильномъ укорачиваніи многольтней древесины свободно можно вызвать развитіе побытовъ изъ спящихъ глазковъ, (какъ это очень часто и бываетъ)—косточковыя породы гораздо менье способны къ образованію спящихъ глазковъ, нежели зерновыя. Такимъ образомъ, отличія въ характеръ роста между косточ-




Рис. 9. Короткія плодовыя вътки вишни.

Рис. 10. Пятилътняя вътвь вишни съ букетными вътками.

ковыми и зерновыми будуть, главнымъ образомъ, заключаться въ слъдующемъ:

1. Плодовыя почки у зерновыхъ, за ръдкими исключеніями, вообще появляются на трехлътней и старшаго возраста древесинъ. Плодовыя почки у косточковыхъ развиваются уже на годовалой древесинъ.

2. Конечная почка у всякихъ вътокъ косточковыхъ породъ, въ томъ числъ и у короткихъ плодовыхъ (букетныхъ), всегда ростовая, тогда какъ у вътокъ зерновыхъ породъ она можетъ бытъ и ростовою, и плодовою,

3. Какъ у зерновыхъ, такъ и у косточковыхъ породъ имъются скрытые, спящіе, находящіеся на многольтней древесинъ, глазки, но въ отношеніи способности къ отложенію этихъ запасныхъ глазковъ и энергіи къ ихъ пробужденію зерновыя породы



Рис. 11. Копулировочный ножъ.



Рис. 12. Окулировочный ножъ.

стоятъ гораздо выше косточковыхъ, бъдныхъ сиящими глазками. Это послъднее характерное отличіе косточковыхъ отъ зерновыхъ породъ необходимо знать и принимать во вниманіе для уясненія нъкоторыхъ пріемовъ ръзки плодовыхъ подвоевъ и деревьевъ.

Инструменты и ору дія для работъ въ пи-

томникъ и саду. Однимъ изъ важнъйшихъ инструментовъ въ садоводствъ надо считать ножи, подраздъляемые обыкновенно на прививочные и окулировочные и садовые; первые употребляются только при облагораживаніи растеній, послъдніе употребляются для всевозможныхъ работъ, имъющихъ цълью обръзку деревьевъ. Ножи, служащіе только для прививки черенками, очень часто называются

«копулировочными», такъ какъ простъйшимъ и употребительнъйшимъ способомъ прививки черенками является копулировка. Чаще всего на практикъмы имъемъ дъло съ окулировочнымъ ножомъ, снабженнымъ однимъ клинкомъ, при помощи котораго можетъ быть выполнена съ успъсомъ и прививка черен-



Рис. 13



Рис. 14. Окулировочные ножи.

комъ. Рисунокъ 12 представляетъ образецъ такого ножа, косточка когораго можетъ быть, подобно клинку, складною, т. е. вкладываться въ черенокъ ножа. Образецъ окулировочныхъ ножей безъ особой приставной косточки, которую здѣсь замѣняетъ заостренной лопаточкой плоскій конецъ черенка, изображенъ на рис. 13. Особый типъ окулировочныхъ ножей представляютъ ножи фабрики Кунде и сынъ, у которыхъ вынутый для работы изъ черенка клинокъ закрѣпляется кольцомъ близь мѣста прикрѣпленія клинка къ черенку. Косточку у ножей этой конструкціи (рис. 14) замѣняетъ расширенный выступомъ плоскій верхній уголъ конца стального клинка.

Хорошій окулировочный, какъ и прививочный ножъ, долженъ быть сдёланъ изъ вполнё доброкачественнаго матеріала, достаточно прочнымъ, а особенно, что важнёе всего, долженъ имёть клинокъ

изъ лучшаго качества стали. Хорошій и, слѣдовательно, болѣе дорогой ножъ въ концѣ концовъ обойдется все-таки много дешевле дешеваго, такъ какъ, номимо болѣе удобной ра-



Рис. 15. Садовый ножъ.

боты съ хорошимъ ножомъ, послужить значительно дольше, нежели болье дешевый, менье будетъ стачиваться, и клинокъ его въ мъстъ прикръпленія къ черенку не такъ скоро расшатается. Не слъдуетъ забывать, что на долю окулировочнаго ножа выпадаетъ наиболье трудная и самая важная работа, — окулировка; этого достаточно, чтобы на качество окулировочнаго ножа было бы обращено должное вниманіе. Изъ приведенныхъ образцовъ окулировочныхъ ножей трудно



Рис. 16. Садовыя ножницы.

отдать рёшительное преимущество какому-либо одному изъ нихъ, потому что съ извёстной, пріобрётаемой опытомъ, привычкой можно каждымъ порядочнымъ ножемъ работать скоро и хорошо. Но начинающему можно порекомендовать наиболёе употребительный типъ ножа, изображенный хотя бы на рисункъ 12. Хорошій окулировочный ножъ стоитъ приблизительно отъ одного до полутора рубля.

Покончивъ съ окулировочными ножами, обратимся теперь къ садовымъ. Относительно садоваго ножа можно сказать все то же,



Рис. 17. Садовыя ножницы.

что было сказано и относительно окулировочнаго, т. е. клинокъ его долженъ быть изъ хорошей стали, ножъ долженъ быть вообще сдъланъ со-

лидно, а черенокъ его долженъ хорошо и удобно сидёть въ рукѣ. На рисункѣ 15 изображенъ одинъ изъ наиболѣе встрѣчающихся и распро страненныхъ садовыхъ ножей. Хорошій ножъ у торговыхъ фирмъ стоитъ отъ полутора до двухъ рублей.

Вторымъ весьма важнымъ инструментомъ послъ ножа являются садовыя ножницы. Отъ садовыхъ ножницъ требуется, чтобы

онъ давали хорошій, гладкій поръзъ и не сжимали бы подвергаемыхъ обръзкъ вътокъ. На рис. 16 изображены ножницы съ пружиною изъ мъдной проволоки, а на рис. 17 изображены ножницы съ особымъ разжимающимъ механизмомъ, которыя предпочитаются многими нлодоводами по той причинъ, что ножницы этого типа наиболье успъшно выполняють свое назначение, хотя и стоятъ дороже ножницъ съ обыкновенными пружинами. Цъна садовымъ ножницамъ-отъ 2 до 3 руб. На рис. 18 изображены садовыя ножницы для ръзки вътокъ на высокихъ деревьяхъ. Такія ножницы насаживаются на кръпкую палку, при чемъ подвижное лезвіе приводится въ дъйствіе посредствомъ бичевки. Такія ножницы стоять около двухъ съ половиною рублей или нъсколько дороже.

Перейдемъ теперь къ садовымъ пиламъ. На рис. 19 изображена рекомендованная нъкоторыми иностранными авторитетами небольшая садовая пила. По нашему мнънію, однако, пилъ, изображенной на рис. 20, нужно отдать безусловное предпочтение. Последняго рода пилы въ торговле появились сравни-Рис. 18. Нож- тельно недавно (стоять онъ около 2 руб. 50 коп. за штуку) и привозятся къ намъ изъ Англіи. При покупкъ этихъ пилъ, имъющихъ по объимъ сторонамъ зубцы, болже крупные и мелкіе, необходимо требовать особые брусочки, спеціально приспособленные для ихъ

точенія. Что касается лонать, то многіе спеціалисты предпочитають для копки земли и выкопки деревьевъ прочныя англійскія лопаты, цёною около 3 р., или нёсколько дороже, за штуку. Необходимо сказать, что крупные номера англійскихъ лопать оказываются далеко не для всёхъ удобными въ работъ, по причинъ ихъ тяжести. Въ торговлъ попадаются и не тяжелыя, меньшей величины, англійскія лопаты, доступныя для работы съ ними

каждому. Жаль только, что эти лопаты попадаются въ торговай не всегда. Вслъдствіе относительно высокой цёны англійскихъ лопатъ, а также изъ-за большей легкости при выполненіи земляныхъ работъ, анлійскимъ лопатамъ предпочи-

ницы для

ложенныхъ




Рис. 19. Садовая лучковая пила.

телямъ предлагаются только бляхи сътрубкой для вставки въ нее надежной, хорошо оструганной палки. При покупкъ лопатъ надо обращать вниманіе на хорошее качество стали бляхи и

таютъ обыкновенныя стальныя лопаты, продаваемыя по цёнё 60 — 75 к. Лопаты этого сорта продаются безъ ручекъ, т. е. покупа-




Рис. 20. Садовая пила.

не увлекаться дешевизною тонкихъ желъзныхъ лопатъ, продающихся копъекъ по 40 за штуку, а непремънно выбирать лопату имъющую толстую стальную бляху, такъ какъ такая лопата, во-первыхъ,



Рис. 21. Французскія вилы.

будеть дольше служить, а. во-вторыхъ, много ръже противъ простой жельзной будетъ требовать натачиванія. Для натачиванія лопать употребляются прочные желъзные напильники.

При перекопкъ питомниковъ въ нашихъ черноземныхъ губерніяхъ лопаты съ большой выгодой могутъ быть замінены французскими вилами.

При поствахъ на грядахъ и при нъкоторыхъ посадкахъ и выкопкахъ небольшихъ и молодыхъ растеній употребляются садовые совки, образецъ которыхъ можно видъть на рис. 22. Для разрыхленія почвы, полки и очистки отъ сорныхъ травъ, молодыхъ насажденій и грядъ служатъ

мотыги и цапки.

При отбивкъ грядъ, а также при засадкъ кварталовъ питомника дичками и вообще при посадкъ разныхъ съянцевъ, употребляется садовый шнуръ. Если садовый шнуръ употребляется при посадкъ дичковъ или съянцевъ, то на немъ дълаются чрезъ опредъленные промежутки по всему протяжению би- Рис. 22. чевки узлы или отмътки, точно обозначающие пункты, при которыхъ должны сажаться съянцы. Въ большихъ и образцовыхъ питом-








Рис. 23. Садовый шнуръ.

таются въ длину отъ сырости. Нанесенныя на такіе шнуры отмътки сохраняютъ всегда въ точности обозначенныя ими дъленія, почему этого рода шнуры и употребляются въ тъхъ питомникахъ, въ которыхъ преслъдуютъ точную и безукоризненно правильную посадку дичковъ въ кварталахъ. Проволочные шнуры дълаются изъ двухъ проволокъ, скрученныхъ между собою. На этихъ шнурахъ, какъ и на веревочныхъ, наносятся отмътки (проволочные узлы) точно обозначающія разстоянія отъ одного дъленія до другого.

Изъ другихъ инструментовъ и орудій въ плодоводствѣ важную роль играютъ орудія для обработки почвы, о которыхъ говорится въ своемъ мѣстѣ, точно такъ же, какъ и объ опрыскивателяхъ, слу-

жащихъ для борьбы съ вредителями.

II. Школа подвоевъ.

Плодовыя деревья выращиваются въ двухъ особыхъ отдёленіяхъ,—въ школё подвоевъ и въ питомнике.

Назначеніе школы подвоевъ—выращивать матеріалъ для прививки или облагораживанія, или, другими словами, полученіе дичковъ и подвоевъ. Такимъ образомъ, прежде чѣмъ говорить собственно о питомникѣ, намъ сперва необходимо основательно позна-

комиться съ культурой подвоевъ.

Дичокъ или подвой, до прививки или облагораживанія, должень быть выращень въ особо выдёленномъ отъ собственно питомника мёстё, такъ какъ кварталь или мёсто, предназначенное подъ культуру дичковъ, требуетъ иной обработки и вообще особаго, болѣе или менѣе тщательнаго ухода. Впрочемъ это относится къ болѣе или менѣе обширнымъ питомникамъ, въ которыхъ подъ школу подвоевъ отводятся отдѣльныя мѣста или кварталы; въ маленькомъ же домашнемъ питомникъ, гдѣ подъ культуру дичковъ отводятся нѣсколько грядокъ, объ особой школѣ подвоевъ, не можетъ быть, конечно, и рѣчи, хотя само собой разумѣется, что не только одни пріемы, но и самыя основанія культуры при полученіи дичковъ и въ данномъ случаѣ остаются одни и тѣ же.

Полученіе и подготовка сёманъ къ посёву. Дичокъ или подвой является фундаментомъ для выращиваемаго на немъ дерева, и для насъ далеко не безразличенъ источникъ полученія этихъ сѣмянъ. Въ послѣднемъ отношеніи сѣмена яблонь и грушъ мы можемъ подраздѣлить на три разряда. Къ первому разряду будутъ относиться сѣмена нашихъ лѣсныхъ яблонь и грушъ. Эти сѣмена можно достать у нѣкоторыхъ нашихъ сѣменоторговцевъ, торгующихъ русскими сѣменами лѣсныхъ плодовыхъ деревьевъ. Кромѣ того, эти сѣмена можно имъть за весьма недорогую плату изъ

лъсничествъ тъхъ преимущественно южныхъ губерній, гдъ въ лъ сахъ дикія яблоня и груша растутъ въ изобиліи.

Ко второму разряду будуть относиться свмена, собранныя съ нашихъ русскихъ благородныхъ (садовыхъ) сортовъ, т. е. подученныя изъ нашихъ плодовыхъ садовъ. Свмена этого разряда, по моему мнвнію, надо считать наилучшими, такъ какъ получаемые изъ нихъ свянцы соединяютъ въ себв оба цвнныхъ качества, которыми должны обладать подвои: полную выпосливость къ холодамъ и силу роста. Оба эти свойства свянцы наслъдуютъ отъ культурнаго дерева, привыкшаго къ невзгодамъ нашего климата. Въ торговъв, конечно, эти, самыя цвнныя для цвлей питомника, свмена не попадаются, но ими лучше всего пользоваться для своего обихода въ маленькомъ домашнемъ питомникъ. Свмена эти надо собирать или самому, а иногда ихъ можно добыть у съемщиковъ, арендующихъ сады, базарныхъ торговокъ и т. д.

Наконецъ, къ третьему разряду надо отнести относительно дешево продающіяся съмена яблонь и грушъ иностраннаго происхожденія, отъ которыхъ получаются довольно рослые и сильные дички, но дички эти не вездъ могутъ быть желательными, потому, что полученные отъ этихъ съмянъ съянцы не будутъ достаточно

выносливыми къ нашему суровому климату.

Въ нашей садовой литературъ есть указанія относительно гибели деревьевъ, привитыхъ на иноземномъ дичкъ (выращенныхъ изъ заграничныхъ съмянъ) даже въ южной половинъ Россіи. Поэтому, нельзя не предостеречь отъ этихъ дичковъ плодоводовъ, особенно въ средней, а тъмъ болъе въ съверной Россіи. Между прочимъ, немало вреда принесла въ средней и съверной Россіи кавказская яблоня, распространяемая съ Кавказа. Вредъ отъ кавказской яблони, какъ отъ подвоя, сказывался, между прочимъ, въ вымерзаніи цълыхъ кварталовъ привитыхъ деревьевъ въ питомникъ.

Во всёхъ отношеніяхъ отличными подвоями въ сѣверной и во многихъ мѣстностяхъ средней Россіи для яблони является настоящая сильнорослая китайская яблоня. Нодвой этотъ особенно хорошъ тѣмъ, что онъ съ достаточной сильнорослостью соединяетъ въ себѣ весьма значительную выносливость къ неблагопріятнымъ климатическимъ условіямъ вообще и къ сильнымъ зимнимъ холо-

дамъ въ частности.

Между прочимъ этотъ подвой, т. е. настоящая китайская яблоня употребляется уже много лътъ въ значительномъ количествъ для прививки на ней яблони завъдующимъ Пензенскимъ училищемъ садоводства А. И. Журавскимъ. А. И. Журавскій пользуется для посъвовъ съменами этой яблони, ежегодно получаемыми со старыхъ, но полныхъ силы и здоровья деревьевъ, растущихъ въ саду Пензенскаго же училища. Эти огромныя деревья какъ бы иллюстрируютъ собою ту силу и выносливость ко всякаго рода не-

взгодамъ, которыя должны достаться по наслёдству ихъ сѣянцамъ Китайская яблоня въ мѣстностяхъ съ болѣе или менѣе суровымъ климатомъ имѣетъ большое значеніе для прививки въ крону или, другими словами, для образованія ствола, но объ этомъ рѣчь будетъ ниже, когда мы будемъ говорить о выведеній плодовыхъ деревьевъ въ питомникъ.

О подвояхъ яблони: —полукарликовомъ, дусенъ, и карликовомъ

парадизкъ, мы будемъ говорить особо.

Что касается грушевыхъ свиянъ, то они бываютъ заграничнаго, а также русскаго происхожденія. Впрочемъ, такъ какъ груша у насъ является породою, разводимою преимущественно въ южной половинъ, то вопросъ о происхождении съмянъ груши для насъ не имфетъ такого серьезнаго значенія, какъ это имфетъ мфсто по отношенію къ стменамъ яблонь. Лучшими стменами и здась будутъ, несомнънно, съмена русскаго происхожденія, т. е. съмена льсной груши, которыя можно достать въ нашихъ казенныхъ лъсничествахъ. Этотъ послъдній источникъ, по моему мавнію, наилучшій, если къ тому же не единственный, потому что имфющіяся въ продажъ у нашихъ съменоторговцевъ съмена груши обыкновенно бывають иностраннаго происхожденія и потому, какъ и иноземныя яблоневыя свмена, мало пригодны для нашего суроваго климата. Весьма важнымъ подвоемъ для грушъ является также айва, которая, впрочемъ, имъстъ полное свое значение для юга Россіи. Дички или подвои айвы хотя и безъ особаго труда получаются изъ съмянъ, тъмъ не менъе этотъ подвой оказывается цълесообразнъе разводить безполымъ путемъ, т. е. отводками, къ чему мы еще вернемся.

Теперь обратимся къ подвоямъ вишни. Въ южной части средней Россіи на подвой для вишенъ часто идуть съянцы крупной садовой вишни, такъ называемой морелли, носяще латинское название Prunus cerasus, а также относящиеся къ тому же виду съянцы кислой вишни. Начиная уже со средней Россіи, (особенно южныхъ предъловъ), подвоемъ для вишенъ и черешенъ служитъ Антипка, — Prunus Mahaleb. Я полагаю, что со временемъ, когда мы будемъ имъть свои русскія съмена Антинки, и при томъ собираемыя не только у насъ на югъ, Антинка окажется отличнымъ подвоемъ и во всей средней Рос ін. Я думаю такъ потому, что дерево это вовсе уже не такое зябкое, какъ у насъ составилось о немъ мнъніе. Антипка способна произрастать, какъ оказывается, даже въ Петроградъ, гдъ она цвътетъ, но далеко еще неизвъстно, можетъ ли Антипка въ климатъ Петрограда, приносить плоды-мелкія, какъ у черемухи, ягоды. Антипка, какъ подвой, обладаетъ чрезвычайно цънными качествами. Во-первыхъ, она развиваетъ прекрасные корни и безъ такъ называемой зеленой пикировки (что, впрочемъ, вообще свойственно косточковымъ), а, главное, отлично переноситъ въ сухомъ южно-русскомъ климатъ, - при знойной погодъ, зеленую пикировку безъ всякаго урона. Особое же достоинство Ангипки въ противоположность вишнъ заключается въ томъ, что ова очень хорошо принимаетъ окулировку. Если же къ достоинствамъ Антипки прибавить то, что она уживается на мелкихъ известковыхъ почв хъ (на что, впрочемъ, какъ подвой, способна и вишня), то за Антипкой нельзя не признать серьезныхъ достоинствъ. Жаль только, что въ Россіи, если и можно получать съмена Антипки, то только съ юга, следовательно, въ данномъ случае мы имемъ дъло съ съменами, дающими болъе или менъе зябкій дичокъ. Совстви иначе обстояло бы дело, если бы мы имели стмена полученныя отъ деревьевъ хотя бы изъ Орловской или Курской губ. Получаемыя нашими торгующими питомниками косточки Антипки идутъ обыкновенно изъ заграницы. На югъ Антипка вырастаеть въ довольно большія и высокія деревья, со стволомъ, доходящимъ до 10-12 вершк. въ діаметръ.

Послъ Антипки отличнымъ подвоемъ для вишни является черешня, — Prunus avium. Хотя эта плодовая порода успъшно произрастаеть и плодоносить лишь въ южной половинъ Россіи, тъмъ не менъе въ южныхъ предълахъ средней Россіи и вообще въ центральныхъ черноземныхъ губерніяхъ черешня съ успѣхомъ могла бы употребляться на подвои для такихъ чрезвычайно плодовитыхъ, но слаборослыхъ мореллей, какъ получившая теперь значительное распространение Любка, если бы подвои черешни выводились бы изъ съмянъ, полученныхъ съ деревьевъ, выращенныхъ въ мъстностяхъ съверной границы произрастанія черешни. Любка, если чёмъ и страдаетъ, то именно некоторою слаборослостью, и такой силькорослый подвой, какъ черешня, могъ бы сообщить этому сорту болье желательный и сильный рость, а потому и болье продолжительную жизнь. Но черешня, какъ подвой, внъ южной Россіи годна только для такихъ мъстностей, какъ Курская и отчасти Орловская губ. Здёсь этотъ подвой, кстати сказать, спрятанный въ землю, сильныхъ зимнихъ холодовъ не побоится, принимая во вниманіе, что стянцы выращены не изъ заграничныхъ и вообще южныхъ съмянъ.

Для сливъ и венгерокъ употребляются на подвои слива Сенъ-Жульенъ и венгерки, а для мирабелли—мирабелль. Нельзя не пожалъть, что намъ приходится до сихъ поръ часто и за этими косточками обращаться заграницу несмотря на то, что всего этого у насъ въ Россіи растетъ вдоволь. Что касается подвоевъ для абрикосовъ и персиковъ, то, для абрикосовъ на подвои идутъ абрикосы же и сливы, а для персиковъ—сливы, персики, абрикосы и миндаль, помимо вышеупоминавшагося терна.

Посвъъ и пескование свиянъ. Осенью свиена плодовыхъ деревьевъ свются или прямо на мъсто назначения, т. е. въ гряды,

въ которыхъ они будутъ расти въ теченіе перваго лѣта (культура безъ зеленой пикировки), или сѣются предварительно на посѣвныя гряды, съ которыхъ уже высаживаются весною по всходѣ на пикировочныя гряды. Когда имѣются съ осени сѣмена своего собственнаго сбора, то можно не безъ выгоды производить сразу два посѣва для различныхъ назначеній:—густой для культуры съ зеленой пикировкой и рѣдкій—лля обыкновенной культуры. При культурѣ дичковъ приходится рѣдко обходиться безъ пескованія сѣмянъ или временнаго ихъ посѣва (стратификаціи). При выращиваніи яблоневныхъ и грушевыхъ дичковъ можно еще избѣжать пескованія или временнаго посѣва тѣмъ, что собранныя заблаговременно сѣмена сѣять осенью прямо на мѣсто въ грунтъ; при культурѣ же дичковъ кисточковыхъ деревьевъ рѣдко возможно обойтись безъ пескованія.

Заговоривъ о пескованіи, обратимся сперва къ косточкамъ. Если косточки, по вынутіи ихъ изъ ягодъ, не будутъ вскорѣ положены во влажную землю или влажный песокъ, а будутъ сохраняться сухими осенью или до зимы, то такія косточки ближайшей весною не взойдутъ, пролежатъ въ землѣ лишній годъ и взойдутъ только на слѣдующую весну, причемъ больгіая или меньшая часть ихъ пропадетъ. Такимъ образомъ здѣсь теряется не только время, но пропадетъ и самый матеріалъ. Поэтому косточки запесковываются тотчасъ послѣ вынутія ихъ изъ ягодъ, чтобы ихъ створки не засыхали.

Косточки далеко не во всемъ похожи на сфмена зерновыхъ породъ, по ихъ свойствамъ. Съмена яблонь и грушъ могутъ лежать сухими часть зимы, не теряя способности прорастать ближайшею весною; съ ихъ пескованіемъ можно ждать до средины февраля; до этого времени сплошь и рядсмъ приходится откладывать пескованіе яблоневыхъ и групісвыхъ стиянъ въ томъ случать, если съмена собираются не у себя дома, а покупаются у съменоторговцевъ, отъ которыхъ ихъ трудно получить до средины декабря. Запескованныя еще въ февраль съмена яблонь и грушъ обыкновенно всходять весною того же года. Сфиена же косточковыхъ вовсе не позволяютъ откладывать поствъ на мъсто, потому что и безъ того плотная ихъ оболочка, при долгомъ храненіи косточекъ на воздухъ, уплотняется такъ, что вода и воздухъ уже не проникають сквозь косточку въ съмя, и последнее при запоздаломъ посѣвѣ не можетъ уже достаточно набухнуть, чтобы разъединить створки, то есть ихъ оболочку. Если случится имъть дъло съ косточками, присланными съменоторговцемъ зимою, то лучше оставить всякія надежды на появленіе изъ нихъ всходовъ ближайшею весною, запесковать эти косточки въ ящики, закопавъ ихъ близъ поверхности земли въ тънистомъ, безъ доступа солнца, мъстъ и наблюдая за тъмъ, чтобы несокъ въ ящикахъ

былъ бы всегда влажнымъ. Мы бы не совътовали полученныя отъ съменоторговцевъ зимою или весною косточки высъвать въ грунтъ въ первую же ближайшую весну, потему что такія запоздавшія нескованіемъ косточки, не всходя въ ближайшую весну, лътомъ пересыхаютъ на грядахъ, причемъ зачастую высыхаетъ и ядро косточки. При храненіи же во влажномъ нескъ косточекъ до осени, хотя часть ихъ и пропадаетъ вслъдствіе затвердънія ихъ покрова и происходящаго отъ этого загниванія ядра, но все же остальная болъе или менъе значительная часть всходитъ уже въ очередную весну.

Такъ какъ запоздавшія нескованіемъ получаемыя отъ съменоторговцевъ косточки должны лежать во влажномъ пескъ цълое лъто, то за запескованными косточками надо постоянно смотръть, поливая ихъ отъ времени до времени, что относится главнымъ образомъ къ лътнимъ мъсяцамъ съ сухой погодой. Никогда не слъдуетъ откладывать пескованія, производя его тотчась по добываніи или по полученій съмянъ. Далье, для пескованія надо брать чистый песокъ. Если чистаго песка въ наличности не имъется, то можно рекомендовать промывку песка и отмучивание его въ водъ. Особенно надо предостеречь противъ замъны песка связной глинистой почвой, потому что такая земля, какъ и нечистый песокъ, особенно, когда они слишкомъ влажны, препятствують столь необходимому для дыханія съмени доступу къ косточкамъ воздуха и ведуть къ ихъ загниванію. Чистота песка будеть особенно важна въ томъ случав, когла косточки должны находиться въ немъ долго, что имфетъ мфсто при запоздаломъ пескованіи косточекъ, не всходящихъ ближайшею весною, а прорастающихъ черезъ годъ.

Никогда не слѣдуетъ при пескованіи сѣмянъ, давать большую толщину слою песка съ сѣменами, будь это косточки или сѣмена яблонь и грушъ, вслідствіе чего въ данномъ случаѣ гораздо удобнѣе пользоваться плоскими, невысокими ящиками. При пескованіи косточекъ мы совѣтуемъ давать толщину слою смѣси 4— 5 вершковъ, а при пескованіи сѣмянъ яблокъ и грушъ—3—4 вершка. При смѣшеніи сѣмянъ съ пескомъ рекомендуемъ держаться слѣдующей пропорціи: на одну объемную часть косточекъ двѣ части песка, а при пескованіи яблочныхъ и грушевыхъ сѣмянъ три части песка. Занимаясь въ былые годы посѣвами плодовыхъ деревьевъ значительныхъ размѣровъ мы придерживались именно этой пропорціи и песковали сѣмена въ плоскіе ящики слѣдующихъ размѣровъ: 1/2 аршина вышины, З аршина длины и

 $1^{1}/_{2}$ арш. ширины.

При пескованіи косточекъ (особенно запоздавшихъ пескованіемъ), лучше устроить дренажъ на днѣ ящика изъ битаго кирпича для отвода лишней воды, что крайне важно, если косточки лежатъ въ пескѣ въ теченіе долгаго времени, иначе на днѣ ящика будетъ застаиваться вода. Вслѣдствіе этого въ нижней части слоя смѣси

циркуляція воздуха будеть затруднена, а это не замедлить вредно отразиться на сѣменахъ. При пескованіи косточекъ, полученныхъ дома и вынутыхъ изъ плодовъ недавно, или при пескованіи сѣмянъ яблони и груши когда сѣмена лежатъ въ пескѣ всего 3—4 мѣсяца, а иногда и того менѣе, дренажа на днѣ ящика можно и не дѣлать, но необходимо сказать, что дренажъ этотъ и здѣсь будетъ далеко не лишнимъ.

Вынутыя изъ плодовъ косточки и своевременно лътомъ запескованныя (здёсь рёчь идеть о косточкахъ вишни и черешни) какъ было сказано, осенью подлежатъ посъву въ грунтъ. Уже къ осени эти косточки будуть характ ризоваться легкостью раскола створокъ оболочки, а у въкоторыхъ изъ нихъ створки оболочки будуть распадаться сами собою, обнаруживая бълое здоровое ядрышко. Поздно поспъвающія косточки венгерокъ, особенно же терна (Prunus spinosa) приходится, минуя пескованіе, какъ поспъвающихъ осенью, прямо высъваютъ въ грунтъ. Впрочемъ на слъдующую весну у терна прорастають только нокоторыя немногочисленныя косточки, а остальныя косточки терна (95%) прорастають быкновенно черезъ годъ, поэтому косточки терна лучше первое лъто выдерживать запескованными въ ящикъ и высъвать ихъ въ гряду не ранве следующей осени. Мыши не могуть повредить косточкамъ, и потому осенній поствъ ихъ нертдко можетъ быть произведенъ съ выгодой для дъла. Если предвидится размывание грядъ весною отъ полой воды, то въ этомъ случать дълаются отводныя канавки. Если же косточки остаются на зиму въ пескъ въ ящикахъ до весны, то е ть до времени появленія у нихъ ростковъ, то до выства ихъ въ концт зимы или въ началт весны ихъ лучше всего держать на льду въ ледникъ, наложивъ льду и сверхъ ящика; за этими съменами надо внимательно смотръть, иначе они прорастуть, пустять длинные ростки, и тогда съ ними справиться уже будетъ трудно.

Находящійся въ ящикахъ слой смѣси время отъ времени перелопачивается съ цѣлью болѣе равномѣрнаго къ сѣменамъ доступа воздуха. Особенно это относится къ косточкамъ запоздавшаго песко-

ванія и долго лежащимъ въ пескъ.

Намъ приходилось высъвать косточки вишенъ и черешенъ, получаемыя отъ съменоторговцевъ, еще до наступленія зимы—осенью, въ срединъ октября; но ближайшею весною изъ цълой большой партіи косточекъ не всходила ни одна. Эти пробные посъвы производились въ довольно значительномъ количествъ и лишь подтвердили то положеніе, что если косточки запаздываютъ пескованіемъ всего какихъ нибудь мъсяца на полтора по вынутіи ихъ изъ ягодъ, то въ ближайшую весну эти косточки не всходятъ.

По нашему мнѣнію, съменоторговцамъ, ведущимъ продажу косточекъ, не мѣшало бы озабочиваться полученіемъ косточекъ, собран-

ныхъ немедленно по поспъвании плодовъ, и самимъ ихъ стратифицировать, т. е. запесковывать, продавая косточки уже стратифицированными, какъ это теперь дълаютъ нъкоторые заграничные съменоторговцы съ съменами шиповника, высылая вхъ отдъленными отъ песка.

Въ виду всего вышесказаннаго, при культуръ дичковъ косточковыхъ приходится при выпискъ косточекъ или особенно торопить сфменорговцевъ ихъ высылкой, или, когда это возможно, лично заняться ихъ сборомъ, что, конечно, будетъ лучше всего. При закупкъ плодовъ косточковыхъ, или вообще при снятіи съ дерева, съ целью полученія косточекъ, необходимо обращать вниманіе, чтобы плоды не были попорчены уколомъ долгоносиковъ, кладущихъ въ ядро косточки яички еще тогда, когда неотвердъвшая завязь легко поддается уколу насъкомаго. Особенно поврежденные такимъ образомъ плоды замътны у вишенъ и черешенъ, у которыхъ они, вследствие укола долгоносиками, делаются однобокими, причемъ точка укола очень легко замъчаетси на плодъ, какъ легко она замъчается и на самой косточкъ. Если такую пораженную насъкомымъ косточку расколоть, то тамъ будетъ находиться и питающаяся мякотью ядрышка личинка. Высъвать эти косточки не только безполезно, но и вредно, такъ какъ всходовъ онъ не дадуть, а будуть содъйствовать только дальнъйшему распространенію насъкомаго.

Передъ посъвомъ въ грунтъ запескованныя косточки мы просъваемъ черезъ ръшето, чтобы отдълить отъ нихъ песокъ, безъ котораго ихъ съять удобнъе. Чтобы лучше отдълить песокъ, можно ихъ промыть въ водъ въ томъ же ръшетъ, но это будетъ уже лишней работой и возможной, безъ замътной потери времени и труда, только тамъ, гдъ близко есть ръчка, сажалка или прудъ.

Въ маленькихъ домашнихъ питомникахъ, гдъ подъ культуру дичковъ отводится нъсколько грядокъ, можно всегда вырастить дички, не будучи особенно разборчивымъ относительно мъста, потому что въ этомъ случав, при надлежащей подготовкв земли, всегда можно отвести подъ эту культуру тотъ или другой клочекъ земли. Но, при культуръ дичковъ въ общирныхъ размърахъ, выбирается мъсто, гдъ можно было бы имъть воду въ достаточномъ количествъ. Это особенно важно тамъ, гдъ дички выращиваются съ помощью зеленой пикировки. При выборъ наиболъе подходящаго участка, нельзя переходить извъстныхъ границъ, или, другими словами, для высаживанія дичковъ нельзя выбирать слишкомъ мокраго мъстопололоженія, съ очень близко стоящею грунтовой водою. На мокрыхъ почвахъ дички, хотя и растуть сильно и дають много первосортнаго товара, но они не вездъ хорошо принимаются, и для посадки въ питомникъ, заложенный на возвышенной мъстности, мало пригодны. Во всякомъ случав, культура дичковъ въ болве или менве

обширных размърахъ немыслима безъ близкаго сосъдства съ водою, а разъ таковой въ достаточной степени въ наличности не имъется, то обширной культуры дичковъ лучше вовсе не затъвать, такъ какъ она требуетъ обильной и частой поливки.

Болже легкія почвы для культуры дичковъ, выращиваемыхъ посредствомъ зеленой пикировки, будутъ наилучшими, потому что обработка такихъ почвъ легче, нежели связныхъ и глинистыхъ, и, что главное, на легкихъ почвахъ гораздо скорѣе идетъ самый процессъ пикировки, которая будетъ представлять трудности и вызывать осложненія, если она производится на очень связныхъ, глинистыхъ почвахъ, весьма затрудняющихъ манипуляцію пикировки. Наши луговыя черноземныя почвы являются достаточно удобными для пикировки въ зеленомъ состояніи дичковъ.

При закладкѣ школы подвоевъ, необходимо имѣть въ виду, что долго дички расти на одномъ мѣстѣ не могутъ и послѣ четырехъ-пяти лѣтъ, а то и ранѣе, выращиваемые на одномъ и томъ же мѣстѣ дички уже вырастаютъ гораздо болѣе слабыми, причемъ первосортнаго товара получается настолько мало, что вести дальнѣйшую культуру дичковъ на этомъ мѣстѣ уже совершенно не стоитъ. Въ данномъ случаѣ для дичковъ наступаетъ утомленіе почвы, и плантацію ихъ волей неволей приходится переносить на

новый, свъжій участовъ.

Глубина при обработкъ почвы для культуры дичковъ должна быть не менъе десяти вершковъ. Большая глубина, само собой разумъется, желательна, но она очень дорога и далеко не всегда окупаетъ расходы. Обработка почвы ведется посредствомъ ручной перекопки лопатой съ переваломъ на два штыка или вспашкою сильнымъ Сакковскимъ плугомъ съ помощью почвоуглубителя, пускаемаго всябдь за плугомъ. При этомъ Сакковскій плугь береть на глубину 8 вершк., а почвоуглубитель прибавляетъ еще 2 вершка глубины. Обработка земли плугомъ съ помощью почвоуглубителя, конечно, уступаеть ручной обработкъ, но зато обходится много дешевле последней, и въ этомъ на ея стороне очень большое преимущество. При очень вязкой почвъ и тамъ, гдъ подъ культуру дичковъ отведено небольшое пространство, необходимо вести ручную обработку, чтобы не было комковъ, особенно въ верхнихъ частяхъ гряды. Тщательная раздёлка грядъ здёсь прямо необходима, потому что въ противномъ случав молодой корешокъ всходящаго съмени, встръчая на пути твердый комокъ, искривляется, слъдствіемъ чего впоследствии будеть искривление корня дичка, а подобный дичокъ. какъ увидимъ ниже, представляетъ никуда негодный бракъ.

Возвращаясь къ первоначальной обработкъ почвы, скажемъ, что вспаханный участокъ тщательно боронуется весною, участокъ же, поднятый съ осени лопатами, обрабатывается весною еще разълопатой на штыкъ, послъ чего приступаютъ къ раздълкъ грядъ.

Болье или менье возвышенныя гряды для культуры дичковъ дълаются развъ лишь на съверъ, въ большинствъ же мъстностей Имперіи, съ цёлью возможнаго сохраненія влаги, гряды не дёлаются возвышенными, а между ними протаптываются лишь однѣ бороздки. На поствныхъ же грядахъ, хорошо раздъленныхъ граб. лями, при поствъ дълаются три продольныя бороздки или мотыгою, или, что значительно удобнъе, бороздникомъ. При посъвъ грушевыхъ и яблоневыхъ стмянъ дълаются бороздки около 3/4 вершка, а для косточекъ сливъ и вишенъ нъсколько глубже. Если посъвъ производится на зиму, то следуеть увеличить несколько глубину бороздокъ. Если мъсто покатое, то гряды дълаются по склону участка для отведенія размывающей гряды полой, весенней воды. Если участокъ находится на низкомъ мъстъ, причемъ земля слишкомъ тяжелая, то весною на такихъ участкахъ скопляется и стоитъ долгое время полая вода, что представляетъ большое неудобство, такъ какъ такой участокъ долго не просыхаетъ и слъдовательно, долго бываеть недоступень для обработки почвы. Для устраненія последняго оказывается не только полезнымъ, но и прямо-таки необходимымъ дёлать болёе или менёе глубокія особыя отводныя канавки еще съ осени, хотя бы поствъ (съ следующей за нимъ пикировкой), производился весною.

Осенью съмена съются или прямо на мъсто, т. е. въ гряды, въ которыхъ дички будутъ расти до слъдующей осени (культура безъ зеленой пикировки), или съются на посъвныя гряды, съ которыхъ уже высаживаются по всходъ на пикировочныя гряды. Когда съ осени имъются съмена своего сбора, то не безъ выгоды можно производить сразу два посъва для двухъ различныхъ навначеній: густой — для культуры съ зеленой пикировкой и ръдкій — для обыкновенной культуры. При весеннемъ посъвъ мы совътуемъ извъстную часть дичковъ про всякій случай выращивать, минуя зеленую пикировку, чтобы, въ случав большой пропажи пикированныхъ съянцевъ отъ весенняго солнцепека и жары все таки можно было бы себя обезпечить матеріаломъ для прививки.

Необходимо сказать, что непикированная въ травянистомъ состояніи обыкновенная яблоня даетъ довольно много хорошихъ, въ смыслѣ окорененія, дичковъ, изъ которыхъ многіе даже не уступаютъ пикированнымъ; что касается груши, то она, въ противоположность яблонѣ, безъ зеленой пикировки даетъ плохіе дички, не въ смыслѣ слабости растеній, а въ смыслѣ развѣтвленія корня, почему грушу необходимо всегда подвергать зеленой пикировкѣ, безъ которой хорошихъ грушевыхъ дичковъ получить невозможно.

Напомнимъ также, что не всёми и не вездё пикированные дички считаются наилучшими для культуры, наоборотъ, въ нёкоторыхъ случаяхъ отдается предпочтение непикированному дичку, какъ это бываетъ въ мёстностяхъ съ степнымъ климатомъ, гдё

приходится дорожить въ вемлъ каждою каплею воды. Я знаю весьма авторитетныхъ плодоводовъ, предпочитающихъ въ сказанныхъ мъстностяхъ непикированный яблоневый дичекъ пикированному на томъ основаніи, что всл'ядствіе сухости почвы, у пикированнаго подвоя, послъ его посадки въ питомникъ неръдко отмираютъ густые, болъе мелкіе корешки и остаются лишь болье сильныя развытвленія корневой системы, такъ что въ засушливомъ климатъ сказанныхъ мъстностей пикированный дичекъ, не имъя преимуществъ передъ непикированнымъ, лишь будетъ стоить дороже последняго.

Повторяемъ, что все это относится къ дичкамъ яблони, а не къ грушевымъ дичкамъ, безусловно требующимъ пикировки и дающимъ безъ последней одиночные, безъ разветвленій корни. По нашему мнінію, цінность дичка заключается главнымъ образомъ все-таки въ его силъ, и сильный, хотя бы и непикированный дичекъ яблони всегда образуетъ въ питомникахъ сильное дерево

съ хорошими корнями.

Запескованныя стмена, назначаемыя для культуры дичковъ посредствомъ зеленой пикировки, иногда оказывается выгоднъе высъвать не сразу, а въ два или три пріема, съ промежутками дня въ два. Такимъ образомъ приходится поступать при значительномъ количествъ пикируемыхъ растеній, когда трудно управляться сразу съ слишкомъ большой партіей свянчиковъ, которые, какъ мы увидимь ниже, если перерастуть, то уже для зеленой пикировки становатся негодными. Если же зеленая пикировка ироизводится не въ большихъ размърахъ, то можно производить безъ всякихъ опасеній поствъ въ одинъ прівмъ.

Осенній посъвъ для зеленой пикировки имъетъ еще ту выгоду, что стмена здтсь выстваются безъ песка, что даетъ возможность произвести болье правильный посывь, т. е. не особенно загустить последній. При посеве для зеленой пикировки, будеть ли это поствъ осенній или весенній, не следуеть стять очень густо, потому что слишкомъ густые всходы, при которыхъ взошедшія растенія угнетають одно другое, будуть слабыми, съ вытянувшимися тонкими стебельками, т. е. какъ разъ будутъ такими, которые съ трудомъ переносять зеленую пикировку, и которыхъ при

последней большой проценть погибаеть.

Но что самое главное, въ южной половинъ Имперіи, а отчасти и въ средней Россіи, въ осеннемъ поспеть заключается весь успъхъ зеленой пикировки, и вотъ почему: опасаться мышей при осеннемъ посъвъ съмянъ яблонь и грушъ приходится лишь въ такъ называемые мышиные годы, изобилующіе мышами; тогда уже съ осени, задолго до замерзанія земли по множеству мышей можно видъть, что годъ мышиный, и что нужны предосторожности. Однако, и противъ мышей можно легко уберечь посвянныя съ осени съмена; если при посъвъ ихъ ситшивать съ мелкобитымъ

стекломъ, посыная последнимъ уже положенныя въ бороздахъ грядъ стмена. Но и помимо мышей на постянныя съ осени въ гряды стмена бываеть не мало охотниковъ, каковыми являются птицы и особенно грачи, налетающие иногда на поствы и осенью, и раннею весною. Средство избавиться отъ птицъ-караулъ.

Какъ бы рано весною семена ни высъвались, они всегда взойдуть на недълю или дней на десять позднъе высъянныхъ осенью. а такъ какъ благодаря раннему всходу посъянныхъ съ осени съмянъ выигрывается время, то взошедшія растенія всегда удается. даже на югь, распикировать еще до наступленія майскихъ жаровъ, подъ которые тамъ обыкновенно попадаетъ зеленая пикировка, причемъ иногда отъ палящаго зноя растенія гибнутъ во множествъ. Тотъ, кто занимался, подобно автору этихъ строкъ, въ большихъ размърахъ культурой дичковъ посредствомъ зеленой пикировки, отлично знаетъ, что выиграть въ данномъ случав во времени недълю и уйти отъ губительнаго для пикировки зноя, значить, навърняка застраховать отъ неугачи всю пикировку. такъ какъ свъже-пересаженные съянчики, обжигаемые палящимъ солнцемъ, при запоздалой пикировкъ гибнутъ массами и, наоборотъ, превосходно принимаются безъ всякаго урона при ранней пикировкъ, которая возможна только при раннихъ всходахъ осенняго поства. Повторяемъ, все это къ стверу не относится, ибо на стверт палящаго зноя весною опасаться не приходится.

Если поствъ производится прямо на мъсто, на которомъ предполагается воспитывать непикировянные дички, то необходимо быть хорошо освёдомленнымъ въ отношени качествъ почвы, чтобы рышить вопрось о томъ, производить ли окончательный посывъ на мъсто весною или осенью. Только на рыхлыхъ и песчаныхъ почвахъ можетъ быть произведенъ въ этомъ случав посввъ осенью. который вообще требуеть большой осторожности. Однако, мы часто имћемъ дело съ боле или мене связными почвами, которыя, какъ бы онъ глубоко и хорошо ни были обработаны съ осени, весною послё таянія снёга образують корку, черезь которую трудно, а върнъе и совершенно невозможно пробраться всходящимъ растеніямъ, которыя тогда погибаютъ подъ этой непреодолимой преградой, особенно, если въ періодъ всхода не бываетъ дождей, (что случается сплошь и рядомъ), способныхъ размятчить обравовавшуюся корку. Поэтому-то, не отрицая пользы и удобства поства на мъсто осенью, нельзя не рекомендовать съ осени песковать (стратифицировать) съмена и высъвать ихъ при первой возможности весною, въ какомъ случав поверхность грядъ неспособна дать корки, образующейся послѣ весенняго таянія снѣга. когда поверхность болье или менье связной почвы такъ сильно уплотняется. Это особенно важно знать съ цёлью предупредить неудачу, если посвыт производится въ большихъ размърахъ.

Читатель можеть сиросить автора этихъ строкъ, почему же всегда вполнъ возможенъ и не рискованъ осенній посъвъ для зеленой пикировки, въ противоположность столь опасному осеннему посвву прямо на мъсто? Очень просто: въ первомъ случав дълается болье или менье густой посывь, при которомь сымена высвваются въ бороздку сплошной лентой, а во второмъ случав посъвъ дълается ръдкимъ, причемъ съмя отъ съмени ложится приблизительно на разстояніи одного вершка. Густо посъянныя всходящія съмена общими силами всегда легко и свободно приподнимають находящуюся надъ ними землю, какъ бы она плотна ни была, тогда какъ отдёльно лежащія стмена не въ состояніи прободать земляной корки, подъ которой они и гибнуть. Впрочемъ, ссли дички воспитываются въ незначительномъ количествъ, напр., для домашняго небольшого обихода, то посывь сымянь можеть быть смёло произведенъ во всёхъ случаяхъ, т. е. и при связныхъ почвахъ осенью, но въ этомъ случав необходимо бороздки, въ которыя разложены стмена, закрыть заранте подготовленной рыхлой, совершенно неспособной къ образованию корки, перегнойной или компостной землей. Тогда, конечно, всякая опаспость образованія корки исчезаеть.

Для посъва на мѣсто устраиваются гряды такимъ образомъ, что намѣчаются только однѣ бороздки, а поверхность грядъ тщательно раздѣлывается граблями и выравнивается. Затѣмъ, вдоль гряды, шириною въ 1½ аршина, дѣлаются поперечныя бороздки, глубиною въ вершокъ, или немного болѣе, въ которыя нѣсколько гуще, чѣмъ должны расти сѣянцы, и сѣются сѣмена. Въ данномъ случаѣ лучше сдѣлать болѣе густой посъвъ, потому что лишніе всходы всегда легко прорѣдить, и, кромѣ того, они годятся для зеленой пикировки. Прямо высѣваются на мѣста всѣ илодовыя сѣмена, за исключеніемъ груши, которая должна быть обязательно пикирована. Среди яблоневыхъ непикированныхъ сѣянцевъ, если они росли не скученно, извѣстная часть растеній имѣетъ почги такіе же корни, какъ и у пикированныхъ,—у сѣянчиковъ дикихъ яблонь около 25—30%, а у сѣянчиковъ отъ благородныхъ сѣмянъ еще больше.

Китайская, какъ и сибирская, яблони, какъ уже было сказано, совсѣмъ не нуждаются въ зеленой пикировкѣ.

Культура дичковъ посредствомъ зеленой пикировки. Слово «пикировка» происходить отъ французскаго piquer—«колоть» и сдѣлалось спеціальнымъ техническимъ терминомъ, потому что самый пріемъ пикировки производится помощью заостреннаго колышка.

Преимущество дичковъ, подвергаемыхъ зеленой пикировкѣ, предъ непикированными заключается въ томъ, что при пересадкѣ молодыхъ всходовъ у нихъ укорачиваются корешки, вслѣдствіе

чего укороченный корень посаженнаго молодого съянчика на первыхъ же порахъ жизни развиваетъ боковые корешки, что и служитъ главною причиною полученія подвоевъ съ прекрасной корневой системой, не столь свойственной непикированнымъ молодымъ яблоневымъ дичкамъ и никогда неполучаемой у не пикированныхъ грушевыхъ дичковъ, къ которымъ, повторяемъ, вслъдствіе этого зеленая пикировка приложима въ гораздо большей степени, нежели по отношенію къ дичкамъ другихъ плодовыхъ деревьевъ.

Если съмена удалось добыть тъмъ или другимъ путемъ заблаговременно осенью, въ какихъ случаяхъ является возможность произвести своевременный осенній посъвъ, то, какъ уже было сказано, при этомъ условіи всходы будутъ самыми ранними и, благодаря этому, даже самыя большія партіи съянчиковъ могутъ быть распикированы безъ всякихъ затрудненій. Другое дъло весенній посъвъ съ болье поздними всходами, на долю которыхъ въ мъстностяхъ по-южнье выпадаетъ болье жаркая погода, подъ вліяніемъ которой съянцы перерастаютъ очень быстро и, требуя тогда немедленной пикировки, вмъстъ съ тъмъ становятся, будучи пересаженными на новое мъсто, менье приживчивыми и жизнеспособными.

Какъ только съянецъ начнетъ выходить изъ травянистаго состоянія и станеть развивать четвертый листокъ (не считая съменодолей) и выгонить стебелекъ, то онъ уже не годится для пересадки на пикировочныя гряды, такъ какъ въ этомъ періодъ свянны уже не принимаются. Поэтому, при зеленой пикировкв вообще стараются распикировать по возможности самые молодые всходы и, чёмъ моложе послёдніе будуть распикированы, тёмъ лучше они примутся. Надо всячески стремиться къ тому, чтобы растенія распикировывались въ то время, когда они имфють, кромф съменодолей, не болъе двухъ первыхъ листочковъ. Для усиъха дъла при весеннемъ посъвъ надо, особенно въ южной половинъ Имперіи, да отчасти и въ средней Россіи, стараться, чтобы окончить пикировку какъ можно ранбе, дабы уберечь распикированные съянчики отъ всеизсушающаго майскаго зноя, такъ какъ во время пикировки въ южной половинъ Имперіи ръдко стоитъ благопріятная пасмурная, прохладная погода, а, наоборотъ, солнечная и сухая.

Какъ только всходы появились, ихъ вынимаютъ изъ посёвныхъ грядъ лопаточкой или совкомъ небольшими пучками, и острымъ ножичкомъ подрёзываютъ длинные корешки: у грушевыхъ сёянчиковъ на половину длины корешка, а у другихъ подвоевъ подлиннъе, т. е. оставляютъ болъе длинный корешокъ.

Обръзанныя растенія тотчась же обмакиваются корнями въ жидкій черноземъ для защиты ихъ нъжныхъ корешковъ отъ вътра и солнца, особенно при сухой погодъ и безоблачномъ небъ. Лучше

Читатель можеть спросить автора этихъ строкъ, почему же всегда вполнъ возможенъ и не рискованъ осенній посъвъ для зеленой пикировки, въ противоположность столь опасному осеннему посвву прямо на мъсто? Очень просто: въ первомъ случав дълается болье или менье густой посывь, при которомь сымена высвваются въ бороздку сплошной лентой, а во второмъ случав посъвъ дълается ръдкимъ, причемъ съмя отъ съмени ложится приблизительно на разстояніи одного вершка. Густо посъянныя всходящія съмена общими силами всегда легко и свободно приподнимають находящуюся надъ ними землю, какъ бы она плотна ни была, тогда какъ отдъльно лежащія съмена не въ состояніи прободать вемляной корки, подъ которой они и гибнутъ. Впрочемъ, ссли дички воспитываются въ незначительномъ количествъ, напр., для домашняго небольшого обихода, то посывь сымянь можеть быть смёло произведень во всёхь случаяхь, т. е. и при связныхъ почвахъ осенью, но въ этомъ случав необходимо бороздки, въ которыя разложены съмена, закрыть заранъе подготовленной рыхлой, совершенно неспособной къ образованию корки, перегнойной или компостной землей. Тогда, конечно, всякая опаспость образованія корки исчезаеть.

Для посъва на мъсто устраиваются гряды такимъ образомъ, что намъчаются только одет бороздки, а поверхность грядъ тщательно раздълывается граблями и выравнивается. Затъмъ, вдоль гряды, шириною въ 1¹/2 аршина, дълаются поперечныя бороздки, глубиною въ вершокъ, или немного болъе, въ которыя нъсколько гуще, чъмъ должны расти съянцы, и съются съмена. Въ данномъ случат лучше сдълать болъе густой посъвъ, потому что лишніе всходы всегда легко проръдить, и, кромъ того, они годятся для зеленой пикировки. Прямо высъваются на мъста всъ плодовыя съмена, за исключеніемъ груши, которая должна быть обязательно пикирована. Среди яблоневыхъ непикированныхъ съянцевъ, если они росли не скученно, извъстная часть растеній имъетъ почги такіе же корни, какъ и у пикированныхъ,—у съянчиковъ дикихъ яблонь около 25—30%, а у съянчиковъ отъ благородныхъ съяннъ еще больше.

Китайская, какъ и сибирская, яблони, какъ уже было сказано, совсёмъ не нуждаются въ зеленой пикировкъ.

Культура дичковъ посредствомъ зеленой пикировки. Слово «пикировка» происходить отъ французскаго piquer—«колоть» и сдълалось спеціальнымъ техническимъ терминомъ, потому что самый пріемъ пикировки производится помощью заостреннаго колышка.

Преимущество дичковъ, подвергаемыхъ зеленой пикировкѣ, предъ непикированными заключается въ томъ, что при пересадкѣ молодыхъ всходовъ у нихъ укорачиваются корешки, вслѣдствіе

чего укороченный корень посаженнаго молодого съянчика на первыхъ же порахъ жизни развиваетъ боковые корешки, что и служитъ главною причиною полученія подвоевъ съ прекрасной корневой системой, не столь свойственной непикированнымъ молодымъ яблоневымъ дичкамъ и никогда неполучаемой у не пикированныхъ грушевыхъ дичковъ, къ которымъ, повторяемъ, вслъдствіе этого зеленая пикировка приложима въ гораздо большей степени, нежели по отношенію къ дичкамъ другихъ плодовыхъ деревьевъ.

Если съмена удалось добыть тъмъ или другимъ путемъ заблаговременно осенью, въ какихъ случаяхъ является возможность произвести своевременный осенній посъвъ, то, какъ уже было сказано, при этомъ условіи всходы будутъ самыми ранними и, благодаря этому, даже самыя большія партіи съянчиковъ могутъ быть распикированы безъ всякихъ затрудненій. Другое дъло весенній посъвъ съ болъе поздними всходами, на долю которыхъ въ мъстностяхъ по-южнъе выпадаетъ болъе жаркая погода, подъ влінніемъ которой съянцы перерастаютъ очень быстро и, требуя тогда немедленной пикировки, вмъстъ съ тъмъ становятся, будучи пересаженными на новое мъсто, менъе приживчивыми и жизнеспособными.

Какъ только съянецъ начнетъ выходить изъ травянистаго состоянія и станеть развивать четвертый листокъ (не считая съменодолей) и выгонить стебелекъ, то онъ уже не годится для пересадки на пикировочныя гряды, такъ какъ въ этомъ періодъ свянны уже не принимаются. Поэтому, при зеленой пикировкв вообще стараются распикировать по возможности самые молодые всходы и, чёмъ моложе послёдніе будуть распикированы, тёмъ лучше они примутся. Надо всячески стремиться къ тому, чтобы растенія распикировывались въ то время, когда они имъють, кромъ сфменодолей, не болье двухъ первыхъ листочковъ. Для успъха дъла при весеннемъ посъвъ надо, особенно въ южной половинъ Имперіи, да отчасти и въ средней Россіи, стараться, чтобы окончить пикировку какъ можно ранбе, дабы уберечь распикированные съянчики отъ всеизсушающаго майскаго зноя, такъ какъ во время пикировки въ южной половинъ Имперіи ръдко стоитъ благопріятная пасмурная, прохладная погода, а, наоборотъ, солнечная и сухая.

Какъ только всходы появились, ихъ вынимаютъ изъ посёвныхъ грядъ лопаточкой или совкомъ небольшими пучками, и острымъ ножичкомъ подрёзываютъ длинные корешки: у грушевыхъ сёянчиковъ на половину длины корешка, а у другихъ подвоевъ подлиннъе, т. е. оставляютъ болёе длинный корешокъ.

Обръзанныя растенія тотчась же обмакиваются корнями въ жидкій черноземъ для защиты ихъ нъжныхъ корешковъ отъ вътра и солнца, особенно при сухой погодъ и безоблачномъ небъ. Лучше

всего корешки растеній во время пикировки держать въ плоскомъ сосудь съ жидкимъ черноземомъ; откуда, стараясь не марать надземныхъ частей, по мъръ надобности съянчики и выбираютъ.

Для посадки разсады на приготовленныя для пикированныхъ дичковъ гряды, поперекъ последнихъ намечаютъ полоски на разстояніи четырехъ вершковъ одну отъ другой, для обозначенія рядовъ. Еще лучше для той же цъли пользоваться тремя или четырьмя поставленными на ребро равными по длинъ и ширинъ дощечками, скрыпленными между собой по обымъ сторонамъ и сверху брусками. Отмътка рядовъ помощью такихъ скръпленныхъ между собою дощечекъ идетъ значительно скорте. Для размътки рядовъ на грядъ помощью подобнаго приспособленія наступають ногою на верхнія ребра дощечекъ, тогда нижніе ребра оттиснутъ на грядъ направление рядовъ. Для этого, разумъется, надо сбить доски на разстояніи четырехъ вершковъ одна отъ другой. Обозначение на грядъ рядовъ достигается тъмъ, что двое рабочихъ, становясь одинъ противъ другого по объимъ сторонамъ гряды, держать эти скръпленныя дощечки и проводять ребрами послъднихъ нъсколько разъ по грядъ. На отмъченной полоскъ (по направленію обозначеннаго ряда) заостреннымъ колышкомъ, толщиною въ стеариновую свъчу и длиною вершка въ четыре, дълается ямка, въ которую и опускають съянчикъ до самыхъ съменодолей. При опускании корешка съянца въ ямку надо внимательно слъдить за тамъ, чтобы корешовъ находился въ ямка въ совершенно отвъсномъ положении; если же корешокъ въ ямкъ загнется, что постоянно случается у желающихъ работать «кое-какъ» поденщицъ, то изъ такого съянчика къ осени вырастаетъ никуда негодный съ кривымъ кернемъ дичекъ. Если къ процессу пикировки отнестись безъ надлежащаго вниманія и не смотръть внимательно за исполняющими эту работу поденщицами, то къ осени можно получить цёлую партію дичковъ испорченною.

Что касается пріемовъ посадки пикировокъ, то они заключаются въ следующемъ. Какъ только сеяненъ до семенодолей будетъ опущенъ въ сделанную колышкомъ ямку, то колышекъ косо втыкается въ землю такъ, чтобы конецъ его пришелся ниже дна или при самомъ днъ ямки, а на поверхности земли въ то же время колышокъ отстояль бы отъ сеянчика на разстояніи дюйма, после чего верхушка колышка двигается къ съянчику, вслъдствие чего корешки стянчика плотно прижимаются землею. Для того, чтобы по возможности содъйствовать уплотнению вемли около корешковъ, образовавшаяся отъ вынутаго колышка ямка снова уничтожается вторымъ втыканіемъ колышка въ землю и движеніемъ его въ сто-

рону уничтожаемой ямки.

Пикируютъ обыкновенно поденщицы, сидя около гряды другъ противъ друга, такъ что одна половина гряды пикируется однъйи

работницами, вторая—другими. За правильностью пріемовъ, т. е. за правильностью посадки съянчиковъ, за уплотненіемъ земли и проч. надо зорко следить. Сенцы въ рядахъ гряды сажаются на разстояній двухъ вершковъ одинъ отъ другого. При обширной зеленой пикировкъ и особенно въ томъ случеъ, если вновь начатое дъло не успъло создать привычныхъ рабочихъ, основательно ознакомившихся уже на практикъ съ пріемами и манипуляціями зеленой пикировки, приходится досмотръ за каждымъ десяткомъ работницъ поручать особымъ, контролирующимъ ихъ работу ли-




Рис. 24. Гряды съ свъжепосаженными пикированными съянцами.

намъ. Какъ только посадка съянчиковъ на извъстной площади будетъ произведена, съянцы обильно поливаются водой изъ лейки сквозь сито; поливку, не жалъя воды, приходится производить ежедневно утромъ и вечеромъ, особенно пока сфинцы не окрфпнутъ.

Для того, чтобы свъженосаженные съянцы защитить отъ налящаго солнца, иногда ихъ покрываютъ рогожными щитами съ подкладкой подъ нихъ кирпичей, чтобы щиты эти не ложились прямо на растенія. Но защита сѣянчиковъ щитами и т. п. нужна бываеть только при пикировкъ растеній весенняго поства и примѣнима лишь при культурѣ въ небольшихъ размѣрахъ, и совершенно немыслима при обширной культуръ. Необходимо сказать, что въ такой покрышкъ щитами нуждаются распикированные съянчики (да и то, какъ уже было сказано, при весеннемъ посъвъ) лищь въ южной части средней Россіи и вообще на югѣ Имперіи; въ стверной Россіи въ подобной защитъ распикированныхъ травянистыхъ съянцевъ нътъ никакой налобности.

Нъсколько пикировочныхъ грядъ съ свъжепосаженными на нихъ съянцами изображено на рис. 24; на немъ же изображены и рогожные щиты, пользы которыхъ отрицать нельзя, но пользование которыми, при обширной культурь, какъ мы уже сказали, непримънимо. На съверъ же, гдъ лъто не бываетъ знойно, въ такихъ щитахъ и вовсе нътъ надобности. Чтобы видъть всю разницу между пикированными и непикированными

дичками груши, слъдуетъ остановиться на рисункахъ 25 и 26. На рисункъ 25 изображенъ грушевый, въ сущности, никуда негодный дичекъ, а на


рисункъ 26 мы видимъ пикированный дичокъ, который, благодаря зеленой пикировкъ, развилъ роскошные корни.

Рисуновъ 27 представляетъ хорошій и сильный, полученный путемъ зеленой пикировки, яблоневый дичекъ въ противоположность никуда негоднымъ и слабымъ дичкамъ, изображеннымъ на слъ-

дующемъ рисункъ 28; у такихъ дичковъ какъ корни. такъ и надземныя части не могли развиваться отъ скученнаго посвва, следствіемъ чего быль угнетенный

ростъ.

Слива и вишня и безъ пикировки даютъ дички съ очень хорошо развитыми мочковатыми корнями, хотя нъкоторые, въ подражание французамъ, пикируютъ и эти подвои. За то, новторяемъ, грушевые дички безъ Грушевый зеленой пикировки даютъ очень пло- непикирохіе подвой, такъ какъ груша по на- ванный туръ своей развиваетъ стержневой дичекъ. корень безъ боковыхъ развътвленій.






Рис. 26. Пи-

кированный

дичекъ съ

роскошными

корнями.

Рис. 27. Сильный пикированный яблоневый дичекъ.

несмотря на это, имъющій прекрасные корни потому именно, что онъ росъ свободно, и ростъ его не былъ стъсненъ сосъдними съянцами. На слъдующемъ рисункъ 30 изображенъ такой

же вишневый личекъ.


Рис. 29

Если бы съянцы росли скученно, то это отравилось бы, повторяемъ, невыгодно не столько на ихъ налземныхъ частяхъ, сколько на корняхъ. Въ

этомъ случат стянцы будутъ имть одиночный корень, главный, безъ вся-

кихъ развътвленій.

Льтомъ дальньйшій уходъ, кромь поливки, которая производится часто, если въ продолжение мъсяца нътъ дождей, заключается въ полкъ сорныхъ травъ и, при надобности, въ рыхленіи земли; налобность же въ последнемъ наступаетъ обыкновенно послъ дождей. когда на грядахъ образуется корка, останавливающая рость съянцевъ. Обывновенно плантація личковъ въ теченіе льта требуетъ двухъ или трехъ основательныхъ полокъ; лишняя полка требуется, если лъто очень дождливое, содъйствующее росту сорныхъ травъ, или



отражаться на стоимости дичковъ. За малоопытными рабочими приходится смотръть и при выконкъ дичковъ, иначе, отъ неосторожнаго обращенія съ корнями, они могуть надёлать имъ лопатами много поврежденій.

Между выкопкой и сортировкой дичковъ является еще одна промежуточная работа, а, именно, ошмыгиваніе листьевъ на дичкахъ. Какъ ни проста эта работа, однако, она требуетъ много времени и обходится вовсе не такъ дешево, какъ это можетъ казаться съ перваго раза, если только дело ведется



Рис. 28. Слабые непикированные дички.



Рис. 30. олнолътній свянецъ.

не въ маленькихъ домашнихъ, а въ обширныхъ размърахъ. Чъмъ позднъе сортируются дички, тъмъ дороже обходится эта работа, какъ уже было сказано, не только вслъдствіе сокращенія рабочихъ часовъ по причинъ уменьшенія осенняго дня, но еще и потому, что съ наступленіемъ холодной осенней погоды и заморозковъ работницы, нанимаемыя для ошмыгиванія листьевъ на дичкахъ, берутъ за поденную работу дороже, а иногда и вовсе не являются на послъднюю. Ошмыгиваніе листьевъ на дичкахъ предшествуетъ ихъ сортировкъ, потому что обезлиственный дичекъ значительно легче поддается сортировкъ, нежели необезлиственный, и сортировка первыхъ идетъ значительно быстръе и успъщье, нежели вторыхъ.

Выкопанные дички сортируются на три сорта или, върнъе, на четыре. Самые сильные дички, которыхъ процентъ во всей партіи бываетъ очень не великъ, составляютъ высшій сортъ, который обозначается словомъ «экстра» (extra), въ продажу обыкновенно вовсе не отпускаемый уже потому, что какъ только было сказано, процентъ дичковъ еxtra бываетъ очень невеликъ. Далѣе дички сортируются и отсчитываются со связкой ихъ въ пучки на три сорта, на первый, второй и третій. Третій сортъ составляетъ бракъ. и не идетъ ни въ продажу, ни, тѣмъ болѣе, на посадку въ своемъ питомникъ.

Отсортированные и связанные въ пучки дички, если они идутъ въ пролажу, упаковываются Упаковка ихъ одинакова съ упаковей деревьств, о которой рѣчь мы будемъ вести ниже. Если дички предназначаются весною для отправки, или если они садятся у себя на мѣстѣ въ питомникѣ или въ школѣ сѣянцевъ весною для полученія двухлѣтнихъ дичковъ, то осенью временно до весны эти дички прикапываются въ канавки, у которыхъ одинъ бокъ дѣлается отлогимъ съ тѣмъ, чтобы размѣщенные въ канавкѣ дички располагались бы въ нѣсколько косомъ направленіи; тогдъ, по прикрытіи дичковъ землею, у послѣднихъ незакрытыми остаются лишь однѣ верхушки, причемъ дички въ канавкѣ должны быть разложены такимъ образомъ, чтобы они не соприкасались другъ съ другомъ, а тѣмъ болѣе не лежали скученно во избѣжаніе загниванія.

Но выращиваніемъ дичковъ въ теченіе одного лѣта обыкновенно не заканчивается ихъ культура. Правда, дички косточковыхъ: Сенъ Жульена, мирабели, сливы, венгерки, антипки и особенно черешни скоро перерастаютъ и потому обыкновенно идутъ въ посадку однолѣтними сѣянцами. Къ тому же дички косточковыхъ, если они растутъ не скученно, въ первый же годъ даютъ болѣе или менѣе равномѣрный товаръ, и процентъ слабыхъ, отставшихъ въ ростѣ, дичковъ бываетъ не великъ; яблоня же и груша, въ противоположность косточковымъ, способны давать много неравномѣрнаго товара и потому сплошь и рядомъ даже и изъ

очень большой партіи проценть второго сорта значительно превышаетъ процентъ перваго сорта и бываетъ настолько значительнымъ, что даже при культуръ дичковъ въ большихъ размърахъ не только трудно, но часто совершенно невозможно удовлетворить спросъ публики на первосортные дички яблонь и грушъ, и, потому, второй сорть приходится сажать въ школу съянцевъ на второй годь, когда получаются уже вполив сильные дички на посадку въ питомникъ. Хотя нъкоторые заграничные авторитеты и увъряють, что предпочитая для питомника сильные однолътніе дички, они ими исключительно и пользуются, но я склоненъ думать, что тъ же самые знаменитые пепиньеристы спокойно сажають у себя хорошіе двухлітніе дички, за недостаткомъ первосортныхъ однолътнихъ (яблонь и грушъ), получая и на этихъ подвояхъ не только хорошо развитыя, сильныя деревья, но даже и выставочные экземпляры. Посадка въ школъ съянцевъ дичковъ на второй годь дёлается при обширныхъ культурахъ просто рядами безъ грядъ, примърно на разстояніи 6 вершковъ рядъ отъ ряда и на разстояніи 2 вершковъ растеніе отъ растенія. При культуръ же въ небольшихъ размърахъ, дички садятся приблизительно на такомъ же разстояніи, какъ и обыкновенно на грядкахъ. При обширной культуръ дичковъ не всегда есть возможность произвести посадку дичковъ осенью, а для того, чтобы растенія не выжимались морозомъ на поверхность земли, приходится притаптывать посаженные дички и окучивать ряды ихъ по объимъ сторонамъ землею, которая весною отгребается.

Если гряды съ однолътними пикированными слабыми грушевыми и яблоневыми дичками есть возможность вовсе не трогать, котя бы въ томъ случав, когда эти гряды не мъшають обработкъ или перевалу почвы, то лучше всего такія гряды оставлять, не трогая ихъ, причемъ къ осени второго года изъ такихъ слабыхъ экземпляровъ получаются сильные дички.

Въ Россіи намъ всячески надо стараться о томъ, чтобы имѣть свой дичекъ, выращенный повозможности въ томъ самомъ климатѣ, въ которомъ будутъ расти въ плодовомъ саду, привитыя на этомъ дичкѣ деревья. Такимъ образомъ для каждаго плодовода и хозяина, наилучшій дичекъ будетъ тотъ, который выращенъ въ собственномъ хозяйствѣ изъ сѣмянъ, полученныхъ у себя или по сосѣдству. Заграничное сѣмя, взятое съ растеній, растущихъ въ болѣе благопріятныхъ, чѣмъ наши, условіяхъ, а ргіогі, должно давать болѣе сильный сѣянецъ противъ сѣянца изъ отечественныхъ сѣмянъ. Продолжая такъ разсуждать, мы приходимъ къ заключенію, что чѣмъ сѣвернѣе растетъ дерево, и чѣмъ ростъ его слабѣе, тѣмъ слабѣе будутъ и его сѣянцы. Эти положенія, строимыя лишь на теоретическихъ соображеніяхъ, вполнѣ оправдываются и въ дѣйствительности. На практикѣ мы видимъ, что ростъ дичковъ изъ загра-

ничныхъ съмянъ сильнъе съянцевъ, выращенныхъ изъ нашихъ съмянъ. Далъе мы видимъ, что съянцы, выращенные изъ Курской дикой яблони, сильнъе съянцевъ яблони, растущей гдъ-нибудь подъ Москвою. Русскій дичекъ съ его сдержаннымъ ростомъ не всякимъ пепиньеристамъ, торгующимъ деревьями, желателенъ, ибо на заграничномъ дичкъ, какъ на болъе сильномъ, скоръе и легче можно получить въ питомникъ годное къ отпуску дерево. Но для плодоваго сада континентальной мъстности дичекъ иноземнаго происхожденія врядъ ли можно считать вполнъ подходящимъ. Въ данномъ случаъ, русскій дичекъ, выращенный изъ стиянь той же мъстности, будеть наиболъе подходящимъ. Русскія съмена яблонь гораздо дороже заграничныхъ прежде всего потому, что у насъ мало кто занимается ихъ производствомъ, за исключениемъ лишь нѣкоторыхъ казенныхъ лъсничествъ, располагающихъ обыкновенно небольшимъ количествомъ сѣмянъ; въ свою очередь и русскіе дички не могутъ быть такъ дешевы, какъ заграничные, относительная дешевизна которыхъ обусловливается не только сравнительною дешевизною ихъ съмянъ, но, какъ уже читатель видълъ выше, еще и тъмъ, что заграницей дичекъ вообще легче вырастить, чемъ у насъ.

Всладствіе неразборчивости пепиньеристовъ къ выбору дичковъ по мъсту ихъ происхожденія, многіе сады не только средней, но даже съверной Россіи засажены деревьями на неприспособленныхъ и невыносливыхъ къ нашему климату дичкахъ. Между тъмъ въ садовой литературъ существуютъ указанія гибели садовъ даже въ южной Россіи, происходящей именно вслъдствіе посадки яблонь, выращенныхъ на заграничныхъ дичкахъ. Эти указанія, какъ предостерегающія и потому весьма важныя, мы не находимъ возможнымъ здъсь игнорировать. Такимъ образомъ, наша задача сводится къ тому, чтобы отыскать для нашего отечества съ его суровымъ климатомъ такой дичокъ, который бы не уступалъ заграничному въ силъ роста и имълъ бы нерыхлую, выносливую древесину; такой дичокъ даетъ, между прочимъ, сильнорослая китайская яблоня

Въ заключение сдвлаемъ еще одно замъчание. Для пепиньериста, имъющаго дъло съ посъвомъ съмянъ плодовыхъ деревьевъ, очень важно знать о продолжительности ихъ сохранения до посъва, или другими словами, о способности ихъ лежать непосъянными безъ потери всхожести. Въ этомъ отношении наши наблюдения сводятся къ слъдующему: твердоскордупыя съмена косточковыхъ нельзя держать продолжительное время незапескованными, какъ это уже указано выше. Если не имъютъ возможности ихъ запесковать тотчасъ послъ сбора, по вынутии изъ ягодъ, то запесковываютъ косточки тотчасъ по получении зимою или весною. Съмена же яблонь и груптъ свободно могутъ сохраняться цълый годъ незапескованными, и будучи посъянными годовалыми осеньк,

слѣдующей весной всходять, какъ и свѣжесобранныя. При храненіи сѣмянь яблонь и грушъ (что вообще можеть относиться къ храненію фруктовыхъ и древесныхъ сѣмянъ) послѣднія должны сохраняться въ сухомъ и прохладномъ мѣстѣ. Успѣхъ сохраненія еще болѣе будетъ обезпеченъ, если сѣмена будутъ смѣшаны съ сухимъ пескомъ и лежать въ смѣси съ послѣднимъ не очень толстымъ слоемъ.

Пишущему эти строки приходилось высвать осенью довольно значительное количество годовалых свиянь яблонь и грушъ. Свиена эти всходили прекрасно весною следующаго года. Возможность успёшнаго сохраненія яблочных и грушевых свиянь представляется темъ боле важной для плодовода, что последній далеко не ежегодно въ состояніи распологать урожаемъ семянь, такъ какъ и самые урожаи последнихь не всегда бывають ежеголными.

Культура подвоевъ, разводимыхъ безполымъ путемъ. Описавъ разведение дичковъ изъ съмянъ, обратимся теперь къ разведению полукарликовыхъ и карликовыхъ подвоевъ, т. е. дусена, порадизки и айвы. Эти подвои, какъ извъстно, размножаются безмолымъ путемъ, т. е. отводками и черенками.

Не только въ русской, но и въ иностранной литературъ не существуетъ лучшаго печатнаго описанія культуры этихъ подвоевъ, какое дано И. С. Филиппишинымъ. Съ любезнаго разръшенія И. С. Филиппишина, заимствуемъ у него здъсь приведенныя имъ цънныя данныя.

Для разведенія отводками надо взять сильным маточныя растенія (двухльтки 1-го сорта) и посадить ихъ на разстояніи 1¹/, арпі. рядъ отъ ряда и 6 вершк. растеніе отъ растенія въ ряду, на хорошей, обезпеченной влагой и удобренной почвъ. Для удобренія отводковъ, надо брать исключительно скотскій, хорошо перепрѣвшій навозъ. Первый годъ растенія образають на 1/2 длины и дають обыкновенный уходь, заключающійся въ полкѣ и рыхленіи почвы. На вторую весну растенія срізають при самой землі, разрыхляють на 3 вершка глубины почву и дають пенькамъ выпустить побъги; когда побъги достигнутъ 2-3 вершковъ длины, ихъ немедленно прищипываютъ-съ цёлью вызвать на оставшихся глазкахъ новые побъги, которые уже по достижени 3-4 вершк. въ вышину, начинаютъ исподволь окучивать широкими валиками, дабы почва надъ корнями не сильно высыхала. Окучивание продолжають до 3 разъ на первую половину явта, по мврв роста побъговъ, — насыпая валики до 4 — 5 вершковъ вышиною, освободившіяся отъ рыхлой земли междурядія надо въ свою очередь разрыхлять вследь за окучиваниемъ, чтобы не дать глубоко просохнуть почвъ.

Къ осени всё побёги задаютъ корни и могутъ быть отдёляемы и итти въ продажу какъ однолётніе отводки, которые также сортируются на три сорта, какъ и съянцы. При отдъленіи отводковъ, не слъдуетъ послъднихъ отламывать (отдирать) отъ маточника, а сръзать на «кольцо» острымъ ножомъ, такъ какъ при отломкъ уходитъ много отодранной коры, на которой имъются запасные глазки для будущихъ побъговъ и, кромъ того, у маточниковъ съ отодранными отводками раны очень илохо заживаютъ и загнивають. По окончаніи отділенія отводковь маточники опять окучивають на зиму, весною срёзають пеньки при земль и т. д. Маточники, обыкновенно, подвергають выгонкъ побъговъ въ теченіе 2—3 літь, потомъ дають одинь годь отдыха и т. д. Чімь слабъе почва, тъмъ скоръе отводки нуждаются въ отдыхъ и меньше запасають глазковь. Если бываеть сухая осень, то маточники следуеть передъ наступл ніемь морозовь полить, такъ какъ они могутъ вымерзнуть въ сухой и рыхлой земль, ибо морозъ тогда имбеть непосредственный доступь къ корнямъ, благодаря сухости и пористости почвы.

О черенкованіи дусена, парадизки и айвы, въ нашей садовой литературѣ имѣется весьма мало данныхъ и, думаю, что не ошибусь, если скажу, говоритъ И. С. Филиппишинъ, что и на практикѣ имѣется весьма ихъ недостаточно. Всѣ русскіе культиваторы подвоевъ предпочитаютъ выписывать отводки дусена, парадизки и айвы изъ Франціи, а именно—изъ Орлеана, отъ разныхъ фран-

цузскихъ фирмъ.

Разсматривая и высаживая въ теченіе нѣсколькихъ літъ сотни тысячъ однольтихъ французскихъ отводковъ, пріобрътенныхъ главнымъ образомъ изъ Орлеана отъ тамошнихъ фирмъ. И. С. Филиппишинъ обращалъ каждый разъ вниманіе на то обстоятельство, что отводки имѣютъ совершенно заплывшую каллюсомъ пятку, на которомъ выросли пучки мелкихъ корешковъ; на дусенахъ же и парадизкахъ ни одного развътвленія сверху, — совершенно прямой побътъ, и кора сверху до низу почти одноцвѣтная — зеленоватая. На отводкахъ же — говоритъ И. С. Филиппишинъ, выращенныхъ у насъ, имѣется нѣкоторый изгибъ у основанія, пятка съ совершенно свѣжимъ срѣзомъ, очень часты и характерны развѣтвленія, — особенно у парадизки и айвы, и основаніе у пятки, окученное землей, желтое — корнеобразное.

Сравнивая тъ и другіе отводки, И. С. Филиппишину пришла мысль, что не продаютъ ли намъ французы укоренившихся черенковъ? Работая въ этомъ направленіи и ставя опыты съ лътними, осенними и зимними черенками, И. С. Филиппишинъ остановился окончательно на одномъ способъ укорененія черенковъ,

дающемъ пріемку минимумъ 90%.

Основываясь на томъ, что черенки, прежде чѣмъ задать корни, образуютъ наплывъ (каллюсъ) и потомъ телько задаютъ корни. а также на томъ, что черенки смородины, ивы, винограда и проч,

задаютъ наплывы, будучи закопанными на зиму въ яму въ обратномъ вертикальномъ положеніи, П. С. Филиппишинъ, послъ цълаго ряда опытовъ, выяснилъ, что однольтніе побъги, будучи отръзаны у основанія острымъ ножемъ, или, еще лучше, отобраны отъ маточнаго растенія, съ естественнымъ кольцомъ — вокругъ основанія побъга, почти всъ задаютъ легко наплывы и потомъ корни. Главныя основанія, отчего черенки такъ легко задаютъ наплывы и потомъ корни, — это естественный готовый наплывъ (кольцо), который вслъдствіе выхожденія и напора соковъ легко расширяется и затягиваетъ рану и на мъстъ котораго появляются уже легко корни.

Если-же припомнить, что у растеній развитіе извѣстныхъ корней строго опредѣлено заранѣе, и каждая вѣточка у извѣстнаго растенія имѣетъ мѣсто, гдѣ она, будучи отдѣлена отъ растенія, наилегче можетъ задать корни, то, безъ сомнѣнія, надо признать, что въ частности у дусена, парадизокъ и айвът мѣсто, способное легко задавать корни, находится у основанія однольтней

въточки, окруженное кольцомъ.

Въточки для укорененія лучше всего брать отъ высаженныхъ на двухльтку растеній, но такъ какъ айва даетъ много развътвленій, парадизки меньше, а дусенъ преимущественно вырастаетъ въ одинъ побъгъ, то для того, чтобы получить развътвленія и на дусень, надо производить прищипку въ началь роста. Въ первой половинь сентября, передъ выкопкой растеній, производить обрывку листьевъ и всльдъ за этимъ отнимаютъ въточки на каждомъ подвов, но такимъ образомъ, чтобы при производствь этой операціи не обезобразить подвои и не нанести ранъ на мъстахъ близкихъ къ корневой шейкь, гдъ производится окулировка.

Лучше всего отчахивать (отрывать) вёточки, такъ какъ тогда остаются пятки съ округлыми узлами—сосудистыхъ и древесинныхъ пучковъ, которые, будучи оторваны, отдёляются со всею вросшей пяткою, и на послѣдней—широкій каллюсъ, задающій въ свою очередь хорошія корневыя мочки. Особенно хорошо отдѣляются вѣточки парадизки, и таковую не слѣдуетъ рѣзать, ибо при нѣкоторой сноровкѣ, прутики настолько хорошо отламываются, что ранки остаются самыя незначительныя. Что же касается дусена и айвы, то ихъ слѣдуетъ отдѣлять съ помощью ножа, такъ какъ каждая вѣточка, будучи оторвана, дѣлаетъ большіе задиры; при отдѣленіи вѣточки дусена и айвы, поступаютъ такъ: отрываютъ сначала нѣсколько вѣточку лѣвой рукой и въ то же время подъвзаютъ ножемъ снизу, дѣлая порѣзы ниже кольца.—На побѣгахъ айвы обыкновенно имѣется много мелкихъ развѣтвленій, которыя слѣдуетъ обрѣзать.

Отдълныя въточки съ пятками сортирують на два сорта,—на мелкія и крупныя, связывають ровными пучками, по 25 шт.,

и у всёхъ побёговъ, превышающихъ длину 8 вершк., отрёзаютъ верхушки. Приготовленныя такимъ образомъ вёточки должны быть немедленно закопаны въ яму и пересыпаны пескомъ, дабы онъ находились во влажной средъ и въ почвенной температуръ, гдъ въ теченіе зимы на пяткахъ вёточекъ появляются наплывы, а на болье сильныхъ вёточкахъ даже маленькіе бъленькіе корешки.

Яма для прикопки черенковъ должна быть глубиною 2 арш., произвольной длины и ширины; если земля въ ямъ сухая, то за нъсколько дней до прикопки слъдуетъ увлажнить стънки и дно ямы. Песокъ для прикопки черенковъ долженъ быть влажнымъ, но разсыпчатымъ и возможно безъ примъси глины, иначе черенки

будутъ загнивать зимою.

Прикопка черенковъ производится слёдующимъ образомъ: ставять по дну ямы вертикально ряды пучковъ-вверхъ пятками, присыпають ихъ слегка пескомъ и уминають последній и, когда поставлено нъсколько рядовъ, тогда засыпаютъ черенки пескомъ съ верхомъ, чтобы поверхъ пятокъ былъ слой песку въ 1 верш. толщиною и т. д. При засыпкъ черенковъ пескомъ, надо обращать вниманіе, чтобы песокъ между рядами быль хорошо замять, и не было пустотъ. Потомъ поверхъ песку насыпають еще слой земли около 2 вершк. толщиною, поливають слегка водою и оставляють въ такомъ видъ до наступленія холодовъ. Когда температура начинаетъ понижаться ночами до 2-3°, яму съ черенками заваливаютъ сухими листьями или чъмъ-либо другимъ (но не соломой, ибо въ последней заводятся мыши), накладываютъ сверхъ ямы доски, насыпають холмикъ земли, вокругъ холмика дёлають канавку для стока воды и въ такомъ видъ оставляютъ до весны. Задъланные такимъ образомъ черенки находятся въ температуръ почвы, зимою не замерзають и къ веснъ задають отличные наплывы. Съ наступленіемъ весны, когда земля хорошо прогръется, участокъ вскопанъ и приготовленъ для посадки черенковъ (для черенковъ надо выбирать свъжій, не истощенный участокъ, который следуеть удобрить съ осени и хорошо вспахать), яму открывають, черенки вынимають, отбирають негодные, гнилые и проч., обръзаютъ, обмакиваютъ въ густой растворъ коровьяго кала наплывы и приступають къ посадкъ.

Всѣ черенки необходимо обрѣзать на ¹/₃ ч. ихъ длины, а сильные прутья и больше, ибо часть соковъ, находившаяся въ верхушкахъ, уходитъ на образованіе наплыва, и если черенки посадить необрѣзанными, то оставшіяся верхушки настолько бываютъ слабы, что большинство ихъ усыхаетъ. Черенки, будучи прикопанными въ обратномъ вертикальномъ положеніи, передаютъ свои соки въ верхнюю часть стебля, гдѣ въ теченіе зимы эти соки и сосредоточиваются; если-же посадить черенки съ не обрѣзанными, бѣдными сокомъ верхушками, то соки

опять стремясь вверхъ, распределяются между всёми истощенными глазками, и тогда черенокъ долго зеленветь, но не развивается, такъ какъ соки, распредвляющиеся по всему черенку, теряютъ энергію и не могутъ пробудить къ жизни верхняго глазка, и такіе черенки, если и развиваются, то слишкомъ поздно, когда солнце высоко, влага листьями сильно испаряется, и черенокъ къ осени только еле укореняется и, конечно, попадаеть въ 3-й сорть. Приготовленные черенки высаживають на гряду подъ коль, на разстояніе 2 вершка въ рядахъ и 4 вершка въ междурядіяхъ и посадку производять такимъ образомъ, чтобы сверхъ почвы находился только одинъ глазокъ. Послъ посадки, черенки слъдуетъ полить, притенить мелкой соломой и потомъ хорошо поливать по мъръ высыханія почвы до появленія побъговъ, посль чего притънка нъсколько снимается, а почва рыхлится; дальнъйшій уходъ заключается въ полкъ и рыхленіи. Приготовленные и посаженные такимъ образомъ черенки выгоняютъ за лъто побъги до 1 арш. длины и настолько укореняются, что ничуть не уступають двухльтнимъ французскимъ отводкамъ, полученнымъ 1-льтними изъ Франціи и перельтовавшимъ въ Россіи, и внолнъ годятся для посадки въ питомникъ въ первое же лъто. Если мы теперь сосчитаемъ стоимость одной тысячи такихъ, вполнъ окоренившихся черенковъ и задавшихъ побъги, то каждая тысяча обойдется не дороже 4 руб., считая даже выкопку и упаковку.

III. Питомникъ.

Выборъ мѣста, разбивка и подготовка кварталовъ питомника къ засадкъ. Предназначенное подъ питомникъ мѣсто по возможности должно быть защищено какъ съ сѣвера, такъ и съ востока. Если избираемый подъ закладку питомника участокъ имѣетъ склонъ, то покатость участка, обращенная на югъ, допустима, развѣ въ сѣверной Россіи. Въ южной же части Имперіи и въ значительной части средней Россіи такая покатость недопустима, какъ подверженная выгоранію отъ солнца. Легкій склонъ на югъ въ средней Россіи еще допустимъ, но вообще участки съ сильными склонами непригодны подъ закладку питомника прежде всего потому, что на сильно покатыхъ участкахъ трудно обрабатывать почву. Кромѣ того, питомникъ долженъ быть закладываемъ непремѣнно на сухомъ мѣстѣ, гдѣ бы грунтовая вода во всякое время года находилась далеко отъ почвенной поверхности, что очень важно не только на сѣверѣ, но и на югѣ.

Для того, чтобы вести правильное чередованіе одновозрастныхъ посадокъ и культуръ, питомникъ разбивается на отдъльные участки или кварталы. Еще во многихъ прежнихъ руководствахъ, заимство-

ванныхъ изъ немецкой литературы, стремились къ установленію опредъленнаго числа кварталовъ питомника. Да и въ настоящее время въ вилу еще неподнаго выясненія вопроса о томъ, черезъ сколько времени плодовыя деревья съ успѣхомъ могутъ быть выращиваемы на томъ же самомъ мъсть, гдъ недавно росли раньше, ощущается еще надобность въ установленіи этого своего рода плодосмина въ питомникъ, т. е. въ установлении опредъленнаго количества отдъльныхъ кварталовъ питомника, ихъ последовательнаго чередованія въ связи съ чернымъ паромъ, т. е. съ болѣе или менѣе продолжительнымъ отдыхомъ освободившихся изъ подъ деревьевъ кварталовъ. Вотъ тутъ то, касаясь отдыха бывшей въ питомникъ подъ деревьями земли, мы и встръчаемся, за отсутствіемъ опыта, съ вопросомъ, сколько лътъ земля должна отдыхать послъ того, какъ на ней росли деревья. Мы уже видёли, говоря о культурё дичковъ, что последніе растуть на одномь и томь же месте хорошо только 3-4 года, а дольше вырастаютъ настолько слабыя растенія, что они не стоять уже разведенія; другими словами, такіе дички дають уже бракъ. Вотъ то же самое происходитъ и при культуръ плодовыхъ облагороженныхъ перевьевъ въ питомникъ, если освободившіеся отъ деревьевъ кварталы повторно засаживаются плодовыми деревьями. Очевидно, что эти кварталы нуждаются въ болъе или менте долгольтнемъ отдыхт отъ поседки на нихъ плодовыхъ деревьевъ, но черезъ сколько дътъ можно тамъ же съ прежнимъ успъхомъ выращивать плодовыя деревья, до сихъ поръ не выяснено. Видимо только одно, -- требуется очень долгое время и многіе годы для отдыха почвы, чтобы последняя была въ состояніи опять давать доброкачественныя сильныя деревья.

Это обстоятельство каждый, закладывающій питомникъ, плодоводъ непременно долженъ иметь въ виду. Исходя изъ этого, плодоводъ напередъ долженъ себя обезпечить достаточнымъ пространствомъ земли, чтобы не возвращаться съ выращиваніемъ плодовыхъ деревьевъ все на одно и то же мъсто. Кто хочетъ постоянно получать здоровыя, сильныя деревья, тотъ долженъ стремиться по возможности къ тому, чтобы постоянно выращивать ихъ на такихъ участкахъ, гдъ прежде плодовыхъ деревьевъ совсъмъ не было. Это особенно должны учитывать тв, у кого отводится разъ навсегда опредъленный, небольшаго размъра участокъ подъ плодовый питомникъ, что, напр., имфетъ мъсто при отводъ участковъ подъ школьное садоводство при земскихъ или церковно-при ходскихъ училищахъ и т. д. Нужно всегда помнить, что имъть въ питомникъ сильныя деревья на одномъ и томъ же мъстъ можно лишь одинъ разъ, послѣ чего придется совсѣмъ прекратить культуру или въ лучшемъ случав довольствоваться слабыми деревьями. Къ сожальнію, надо еще отмытить, что удобреніе здысь помогаеть мало. Здёсь, видимо, мы имёемъ дёло съ явнымъ утомленіемъ

почвы, а въ этихъ случаяхъ помогаетъ только одно-совершенное пріостановленіе выведенія плодовыхъ деревьевъ на данномъ участкъ. Что же касается качества почвы, то было бы глубокой ошибкой закладывать питомникъ на бъдной, тощей почвъ, въ предположени, что выращенныя на такой почвъ деревья будуть, яко бы, вездъ лучше приниматься. На самомъ дълъ это ведетъ какъ разъ къ печальнымъ результатамъ, а именно на бъдныхъ почвахъ получаются скорве всего плохія деревья. Прежде, когда не предполагали, что деревья могуть быть выращиваемы на одномъ и томъ же мъсть только однажды, а опять засаживали тъже кварталы черезъ 2-3 года дичками, чтобы въ питомникъ вести правильное чередование площадей, на которыхъ выращиваются деревья, весь участокъ разбивали на кварталы, изъ которыхъ ежегодно одинъ засаживался дичками. Въ большинствъ случаевъ количество кварталовъ, на которые рекомендовали разбивать общую площадь питомника, ограничивалось 7-8. При восьми кварталахъ первый кварталъ подвергается перевалу, т. е. глубокой обработкѣ почвы на 3/4 арш. и въ первомъ году дичками не засаживается, а подготовляется лишь къ посадкъ на вторую весну. На второй годъ участокъ засаживается дичками; въ третьемъ онъ идетъ въ окулировку; въ четвертомъ получаются однолътніе благородные побъги; на пятый годъ на кварталъ кронятся однольтніе побъги; на шестомъ году получаются кронистыя деревья, и, наконецъ седьмой кварталъ назначается для запоздавшихъ къ ръзкъ въ крону деревьевъ или для непроданныхъ своевременно экземпляровъ. Ради этихъ послёднихъ именно и рекомендовали количество кварталовъ въ питомникъ увеличивать до восьми.

Можно переваленный участокъ засаживать дичками и въ первую весну, но деревья въ питомникъ будутъ несравненно сильнъе и лучше, если кварталъ будетъ засаженъ черезъ годъ, а съ весны будетъ засаженъ картофелемъ, капустой, бураками и т. д. Въ теченіе льта, такимъ образомъ, почва будетъ лучше подготовлена, и дички на такой почвъ дадутъ болъе равномърный ростъ. Перевалъ всегда производится съ осени, потому что зимою почва, подвергаясь дъйствію мороза, дълается рыхлъе и болъе пригодною для культурныхъ цълей и къ тому же задержитъ всю влагу, образующуюся отъ осеннихъ и зимнихъ осадковъ, что особенно важно въ засушливыхъ мъстностяхъ нашего степного юга.

Ручная перекопка на переваль дѣлается слѣдующимъ образомъ: рабочіе становятся въ рядъ, и, снимая первый слой (штыкъ), выбрасывають его наверхъ, затѣмъ тоже дѣлается со вторымъ слоемъ; третій же слой не слѣдуетъ выбрасывать наверхъ, а, только, поднявъ и перевернувъ его, оставить на мѣстѣ. Особенно надо такъ поступать съ третьимъ слоемъ, когда этотъ слой, представляя уже переходъ къ подпочвѣ, бываетъ совершенно негоднымъ для культуры. При ручномъ перевалъ на 3 штыка земля перекапывается приблизительно на одинъ аршинъ.

Переваломъ лопатой обыкновенно пользуются хозяева, не имъющіе большихъ питомниковъ. Вообще ручной перевалъ примъняется въ маленькихъ домашнихъ питомникахъ, гдф нфтъ разсчета примфнять сильные, глубоко поднимающіе, такъ называемые райольные илуги, требующіе упряжки нісколькихъ паръ воловъ. Тамъ, гді дъло ведется въ значительныхъ размърахъ, т. е. въ большихъ питомникахъ, перевалъ производится помощью сказанныхъ плуговъ, благодаря чему глубокая райольная (перевальная) вспашка одной десятины обходится всего въ 15-20 рублей и даже меньше, тогда какъ перевалъ допатой на три штыка обходится до 200 р. на десятину. Для плужной пахоты на перевалъ особенно рекомендуется 16 ти дюймовый плугъ Сакка, перевертывающій пласть земли на 10-12 вершковъ глубины и стоящій около 55 р. Если вслудь за нимъ по открытой борозду пустить одноконный почвоуглубитель Сакка (цёна 24 р.), то глубина нахоты еще увеличивается по крайней мъръ на 2 вершка. Въ райольный плугъ впрягають несколько парь воловь или лошадей. Дневная производительность 16-ти дюймоваго плуга Сакка, не позже октября,—1/, десятины въ день. Качество райольной плужной пахоты довольно высокое и гораздо выше посредственной ручной работы, и не всякая земляная работа способна дать такое совершенное перемѣшиваніе почвы; надо только зорко следить, чтобы рабочіе лемеха плуга были исправны и, при изнашиван и таковыхъ, замънялись бы новыми, запасными.

Нъкоторыми плодоводами отмъчается не только полнъйшая достаточность вспашки на такую глубину подъ питомникъ, но даже отмичено явление отсталости въ рости деревьевъ, растущихъ въ питомникъ, заложенномъ на перевалъ лопатою, сравнительно съ деревьями питомника, обработаннаго на перевалъ плугомъ. Это утвержденіе, безусловно, подлежить еще дальнъйшимъ наблюденіямъ и провъркъ.

Выборъ дичковъ для засадки квартала и самая посадка При выборъ дичковъ для засадки питомника, мы должны всегда помнить следующее правило, являющееся непреложной истиной: для посадки берится только самые лучше дички, т. е. самые сильные, импющіе въ изобиліи корни, и преимущественно однольтніе. Всякому, кто хочеть заняться питомникомъ и выращивать въ немъ хорошія плодовыя деревья, необходимо напередъ знать, что въ выборѣ лучшихъ дичковъ заключается весь секретъ полученія хорошихъ деревьевъ, и чемъ лучше садятся въ питомникъ дички, тъмъ дучше будутъ получаться деревья. На сельномъ, отборномъ, съ хорошими корнями дичкъ и новичокъ можетъ получить прекрасное дерево, на слабомъ же дичкъ-перестаркъ и самый знающій плодоводъ не получить сноснаго дерева. Сильный дичокъ прежде всего дастъ молодому благородному побыту сильный и прямой рость, а это обусловливаеть возможность полученія въ одинъ годъ благороднаго побъгатакой высоты, при



которой его можно кронить, т. е. ръзать на крону уже весною второго года. Сильный же дичокъ, съ хорошо развитыми мочковатыми корнями, кромъ того, будетъ лучше противостоять всякимъ климатическимъ невзгодамъ и, само собой разумъется, дастъ въ кварталъ питомника болье равномърно развитую посадку. Только по отношенію къ косточковымъ породамъ мы должны признать, что, для окулировки ихъ. дучшими личками не будуть чрезмърно сильно развитые съянцы. Лучшіе результаты при прививкъ косточковыхъ дичковъ получаются, когда эти дички берутся средней силы, съ хорошо развитыми корнями. Такіе дички предпочтительны саобръзанны- мымъ сильнымъ всъдствіе того, что они имъють болье микорнями. тонкую кору, что крайне важно для успъшной окулировки косточковыхъ.

Передъ посадкой дичковъ въ питомникъ подвергаютъ обръзкъ ихъ корни и штамбики; последніе рёжутся такъ, что остающейся

части штамбика у яблонь и грушъ дается длина вершка въ три. Иногда, однако, бываетъ полезно (при открытыхъ, подвергнутыхъ вътру мъстоположеніяхъ) разать штамбивъ выше, доводя его длину до 5 и даже 6 вершковъ; тогда такой шинъ (или, върнъе, привязка благороднаго побъга въ двухътрехъ мѣстахъ къ такому шипу) даетъ болѣе опоры благородному побъту и тъмъ самымъ даетъ болъе защиты последнему отъ вътра.

Штамбики дичковъ косточковыхъ породъ оставляются болье длинными, чъмъ у яблонь и грушъ, вследствіе того, что у косточковыхъ породъ при короткой образка штамбикова саянцева, посладніе принимаются хуже, нежели дички съ менъе укороченнымъ штамоикомъ. Вишневый или сливовый Рис. 32. Дичекъ дичокъ съ коротко обръзаннымъ штамбикомъ от- съ болъе длинбиваеть побъги чаще всего около корневой шейки но обръзанныили ниже, самый же штамбикъ тогда не отби-



ваетъ побъговъ, и кора его становится неспособною принимать прививку, а тъмъ болъе окулировку. Такимъ образомъ при посадкъ въ питомникахъ косточковыхъ дичковъ приходится оставлять болье длинные штамбики, изъ которыхъ должно развиться съ весны насколько побаговъ, для надлежащаго укранленія и закорененія дичка.

Ръзать корни менте, т. е. оставлять ихъ болже длинными, какъ это видно изъ рисунка 32, было бы еще лучше, но тогда надо крайне осмотрительно производить посадку дичковъ и расправлять возможно тщательнте корни въ стороны, удъляя очень много времени посадкъ каждаго отдъльнаго дичка. Въ противномъ случать впослъдствии легко получить у дерева спутанные искривленные корни. Поэтому, при значительныхъ посадкахъ, гдъ нътъ возможности усмотръть за всякимъ рабочимъ и, ради быстроты въ работъ, приходится у дичковъ ръзать корни относительно коротко. Передъ засадкой квартала дичками поверхность его тщательно раз-




Рис. 33. Искривленные корни, получившеся вслъдствіе небрежной посадки дичка.

равнивается. Самая засадка производится весною, какъ можно раньше, по набуханія на деревьяхъ почекъ. Можно сажать въ кварталъ питомника дички н осенью, но это возможно только въ южной половинъ Россіи. Но посаженные осенью неукоренившіеся лички зимою сплошь и рядомъ морозомъ выжимаются изъ земли на ея поверхность и послъ стаянія снѣга оказываются лежащими на землъ, какъ будто бы ихъ ктонибудь нарочно выдернулъ изъ земли и бросилъ. Такъ какъ на нашемъ югъ весна бываетъ обыкисвенно быстротечною, а своевременному выполненію въ питомникъ весеннихъ работъ неръдко очень мъщаютъ пас-

хальные дни, то, чтобы справиться со всёми работами во время, въ южной половин Имперіи многія садовыя работы приходится выполнять по возможности осенью, когда во времени недостатка не бываетъ. Но чтобы дички не выжало зимою морозомъ, ряды ихъ осенью повыше окучиваются съ объихъ сторонъ землею; вся эта земля съ наступленіемъ весны отъ дичковъ отгребается и помъщается тамъ, откуда была взята. Однако, такая осенняя посадка дичковъ вовсе не можетъ быть возводима во всеобщее правило, и если и допустима, то только въ крайнемъ случав. Но уже въ средней Россіи пельзя совътовать такой осенней посадки дичковъ, а тъмъ болъе въ съверной Россіи, гдѣ всѣ деревья приходится сажать весною, а не только мелкіе дички, которые будучи посажены на сѣверѣ осенью и оставшись здѣсь на зиму незакоренившимися, будутъ обречены на неминуемую гибель. Весною же необходимо сажать дички какъ можно раньше, особенно въ южной части !!мперіи.

Что касается разстояній, на которыя сажаются въ питомникъ дички (сообразно этимъ разстояніямъ дъчаются и отмътки на

посадочныхъ шнурахъ), то въ сѣверной Россіи и въ сѣверной половинѣ средней Россіи дички въ кварталѣ питомника высаживаются на разстояпіи аршина рядъ отъ ряда и $^1/_2$ аршина между растеніями въ ряду. Въ южной половинѣ средней Россіи, въ виду болѣе роскошнаго и быстраго здѣсь роста молодыхъ деревьевъ, разстоянія между рядами даютъ въ $^5/_4$ аршина, а разстоянія между дичками или деревьями въ ряду $^3/_4$ аршина. На югѣ же и даже въ средней Россіи, въ тѣхъ питомникахъ, гдѣ для обработки почвы примѣняется лошадиная тяга, разстояніе между рядами довоъ



Рис. 34. Посадка дичковъ.

дять по крайней мъръ до $1^{1}/_{2}$ аршинь, чтобы между рядами свободно могла пройти лошадь съ экстирпаторомъ или коннымъ «Планетомъ». Для обработки въ питомникахъ почвы въ настоящее время весьма распространены ручные полольники и рыхлители «Планетъ», оказывающіе въ данномъ случав отличныя услуги.

Если посадка дичковъ, ради совершенной ея правильности, производится съ помощью не простого, а проволочнаго шнура, то передъ посадкой протягиваются вдоль двухъ противоположныхъ краевъ засиживаемаго квартала два проволочныхъ шнура съ отмътками, обозначающими разстояніе между рядами. Эти два шнура, протягиваемые по двумъ противоположнымъ другъ другу краямъ квартала должны быть совершенно параллельны между собою, причемъ отмътка одного шнура должна находиться какъ разъ прстивъ отмътокъ другого шнура. Когда шнуры эти будуть натянуты, то берется посадочный шнуръ съ другими отмътками, съ помощью котораго и ведется посадка. Чтобы достичь той правильности посадки, которая такъ подкупаетъ глазъ своею симметричностью, надо начать посадку съ одного края квартала. Для этого посадочный шнуръ натягивается и укръчляется между первыми двумя отмътками на продольныхъ шнурахъ (тогда посадочный шнуръ будетъ приходиться подъ совершенно прямымъ угломъ къ двумъ протянутымъ вдоль краевъ



Рис. 35. Кварталъ, засаженный дичками.

квартала проволочнымъ шнурамъ); далѣе, преслѣдуя правильность посадки, первый разъ посадочный шнуръ натягивается такъ, чтобы его первая отмѣтка совпала бы съ отмѣткой продольнаго шнура хотя бы на одной сторонѣ. Когда первый рядъ по протянутому посадочному шнуру будетъ посаженъ, шнуръ переносится къ слѣдующимъ двумъ отмѣткамъ на продольныхъ шнурахъ, причемъ наблюдаютъ, чтобы первая отмѣтка посадочнаго шнура, совпадавшая въ первомъ ряду съ отмѣткой продольнаго шнура, находилась бы точнымъ образомъ на половинномъ разстояніи отъ отмѣтки продольнаго шнура. Тогда всѣ отмѣтки посадочнаго шнура и посаженные дички придутся какъ разъ между дичками перваго ряда. При засадкѣ третьяго ряда посадочный шнуръ натягивается такъ же, какъ онъ натягивался въ первый разъ, т. е. его первая отмѣтка должна совпадать съ отмѣткой продольнаго шнура и,

такимъ образомъ всё отмётки посадочнаго шнура придутся какъ разъ противъ посаженныхъ дичковъ перваго ряда, а при засадкъ четвертаго ряда, когда шнуръ натягивается такъ, какъ онъ натягивался при посадкъ второго ряда, эти отмътки придутся противъ насаженныхъ дичковъ второго ряда; пятый рядъ сажается, какъ третій, щестой—какъ четвертый, и, такимъ образомъ, при постоянномъ чередованіи посадка ведется до слъдующаго края квартала. Такимъ чередованіемъ положеній отмътокъ посадочнаго




Рис. 36 Тотъ же кварталъ, снятый въ другомъ направленіи, чтобы показать правильность и симметричность посадки.

поперечнаго шнура достигается точный шахматный порядокъ засадки дичками квартала въ питомникъ. Само собой разумъется, что шнуры при посадкъ должны быть туго натянуты, если преслъзуктъ правильность посадки. Кварталъ, засаженный помощью проволочныхъ шнуровъ, чрезвычайно выигрываетъ отъ правильной посадки, въ смыслъ внъшности, и съ какой бы стороны глазъни посмотрълъ на посаженные дички, они по всъмъ направленіямъ будутъ образовывать прямыя линіи.

Самая посадка производится такимъ образомъ: одинъ рабочій выкапываетъ въ мѣстѣ отмѣтки посадочнаго шнура яму, а другой вслѣдъ за тѣмъ беретъ дичокъ и держитъ его за штамбикъ въ отвѣсномъ положеніи такъ, чтобы послѣдній приходился какъ разъ противъ отмѣтки. Корневая шейка дичка опускается въ ямку нѣ-

сколько глубже поверхности земли. Когда дичокъ приведенъ первымъ рабочимъ въ надлежащее положеніе, то второй рабочій въ это время копаетъ ямку въ мѣстѣ слѣдующей отмѣтки и землей, вынутой изъ этой ямки, забрасываетъ корни сажаемаго дичка. Но помимо этого способа посадки въ ямки существуютъ и другіе способы,— въ канавки или съ помощью длинныхъ мотыгъ, которыми вырываютъ соотвѣтствующей глубины ямки. Эти способы при умѣломъ ихъ выполненіи также даютъ вполнѣ желательные хорошіе результаты.

Въ маленькихъ домашнихъ питомникахъ при засадкъ кварталовъ дичками, употребляютъ простые веревочные шнуры, а ряды по краямъ квартала обозначаютъ втыканіемъ колышковъ. Для того, чтобы върно воткнуть колышки, употребляютъ узенькую дощечку съ отмътками на опредъленномъ разстояніи и, прикладывая ее къ краямъ квартала, сперва втыкаютъ съ одной стороны квартала колышекъ, а затъмъ съ противоположной. Когда нъсколько рядовъ колышками отмъчено, между ними протягивается шнуръ, и производится посадка, а затъмъ колышками отмъчаются дальнъйшіе рялы и т. д.

Уходъ за высаженными въ питомникъ дичками и обработка почвы. Уходъ за дичками состоитъ въ поверхностномъ разрыхленіи почвы, т. е. въ поверхностной перекопкъ. Замътимъ здъсь, что нъкоторыми плодоводами признана за самое лучшее орудіе для поверхностной перекопки не лопата, мотыка или папка, а вилы съ плоскими зубцами. Въ теченіе года питомникъ перекапывается не менъе трехъ разъ: рано весною, передъ набуханіемъ почекъ, въ серединъ лъта и въ концъ его. Въ случат же, когда приходится особенно бороться съ засухой, производится еще одна лътняя перекопка. Въ нашихъ лучшихъ обширныхъ южныхъ питомникахъ почва въ кварталахъ питомника рыхлится безпрестанно лошадиной тягой, помощью такъ называемыхъ рыхлителей или культиваторовъ, сообразно чему дается достаточное разстояніе между выращиваемыми въ питомникъ деревьями.

Необходимо также имъть въ виду, что кварталъ съ дичками, идущими на окулировку, долженъ быть основательно взрыхленъ незадолго до начала окулировки. Особенно это надо имъть въ виду во время засухи. Если же взрыхленіемъ квартала, идущаго въ окулировку, запоздать и не взрыхлить кварталъ заблаговременно, то отъ уплотнившейся земли движеніе соковъ въ подвояхъ можетъ пріостановиться, и тогда окулировка становится уже трудно примънимой. Не только въ климатъ степной полосы Россіи, но и въ другихъ мъстностяхъ, вообще перекопка земли въ питомникъ и постоянное поддержаніе рыхлости почвы имъютъ громадное значеніе. Частое и основательное разрыхленіе почвы особенно въ южной половинъ Россіи является вторымъ главнымъ условіемъ, послъ

выбора доброкачественныхъ подвоевъ, полученія въ питомникѣ хорошихъ деревьевъ.

Чтобы разъяснить всю суть важности разрыхленія почвы въ нашихъ южно-русскихъ питомникахъ, которымъ зачастую, при нашихъ засухахъ и бездожіи съ упорно дующимъ восточнымъ вътромъ, нельзя разсчитывать на атмосферную влагу, необходимо сказать, что при тщательномъ и возможно частомъ разрыхленіи почвы, последняя не высыхаеть даже при самыхъ продолжительныхъ засухахъ на высокихъ мъстоположеніяхъ, удерживая въ достаточномъ количествъ влагу. Происходитъ это потому, что взрыхленная почва имъетъ гораздо больше пустыхъ промежутковъ между земляными частицами, нежели невзрыхленная. Латній горячій воздухъ (кажущійся сухимъ, но на самомъ дълъ содержащій много водяныхъ паровъ), понадая въ нижніе, болье, нежели онъ, холодные слои взрыхленной почвы, осаждается на стънкахъ пустотъ почвы, причемъ осаждение это происходить тъмъ больше, чъмъ больше этихъ пустотъ, т. е. чъмъ лучше и глубже взрыхлена почва. Ночью, когда самые верхніе слои почвы остынуть, теплый воздухъ находившійся въ болже нижнихъ слояхъ, поднимаясь кверху и попадая, такимъ образомъ, въ болъе холодную среду, отдаеть здёсь ей всю свою влагу. Такимъ образомъ, при возможно тщательномъ и глубокомъ разрыхленіи почвы, невидимо для нашего глаза, происходить замфияющее поливку увлажнение почвы влагою изъ воздуха, не взирая ни на засухи, ни на бездождіе, чъмъ и достигается возможность даже на высокихъ мъстахъ въ степныхъ мъстностяхъ нашего юга выращивать отличныя деревья.

Конечно, чемъ больше мы будемъ подвигаться къ северу, темъ такое «воздушное орошеніе» будеть имъть меньшее значеніе, потому что нашъ съверъ по сравненію съ средней Россіей, а тъмъ болже съ южной, гораздо богаче атмосферными осадками, но уже въ средней Россіи при продолжительной засух'в частое рыхленіе почвы, сопровождающееся воздушнымъ орошеніемъ, можетъ оказать весьма значительныя услуги при выращиваніи деревьевъ въ питомникъ. На стверт частое рыхленіе почвы въ питомникт также оказывается весьма благодътельнымъ для полученія болье сильныхъ и рослыхъ деревьевъ, но на съверъ рыхленіе земли, т. е. послъдняя перекопка должна оканчиваться въ концъ августа, т. е. въ концъ льта, дабы не побуждать въ это время деревья къ излишнему росту, который долженъ закончиться своевременно осенью; въ противномъ случат, т. е. при совершенно закончившемся къ зимъ ростъ, однолътняя древесина окажется недостаточно вызръвшею, а следовательно и подверженною обмерзанію въ теченіе зимы.

Облагораживаніе. Подъ словомъ облагораживаніе разумѣется прививка растеній — пріемы, помощью которыхъ дичокъ облагораживается, давая культурное дерево.

Прививка черенкомъ. При прививкъ черенкомъ употребляются, за ръдкими развъ исключеніями, одеревенъвшія однольтнія

вътки, т. е. то, что въ садоводствъ называется зимними черенками, въ противоположность лътнимъ, не одеревенъвшимъ черенкамъ, употребляемымъ въ окулировкъ.

Для успъха прививки необходимо, чтобы черенки были въ полномъ поков, съ совершенно нетронувшимися въ ростъ глазками, поэтому они сръзываются или съ осени, или задолго до весенняго сокодвиженія. Между тъмъ отъ подвоя требуется, чтобы онъ тронулся уже въ ростъ и быль, какъ выражаются «въ соку». Если черенки сохранились хорошо, то прививка можетъ

быть произведена въ большинствъ мъстностей Россіи, за исключеніемъ развъ съверныхъ мъстностей, съ успъхомъ до іюня, а въ южной половинъ Россіи даже и позднъе, хотя подобная, слишкомъ запоздалая прививка вообще не можетъ быть рекоменлована.

Рис. 37.

Черенокъ

для прос-

той копу-

лировки.

Новичку обыкновенно прививка кажется какимъ-то особенно труднымъ дъломъ, и онъ очень удивляется, если, поупражнявшись нёсколько въ срёзахъ и сдёлавъ пару или двъ прививокъ, видитъ ихъ принявшимися. Пока новичокъ не изловчится дълать сръзы, онъ, взявъ въ руки ножъ, обывновенно держить лезвіе его подъ очень большимъ угломъ къ черенку, оттого то и получаются короткіе и плохіе сръзы. Насръзанный правление лезвія къ черенку подъ болже острымъ угломъ даетъ въ результатъ болъе ровные, а, главное, болъе длинные сръзы, т. е. именно то, что въ данномъ случав и требуется. Болье длинные сръзы черенка и

подвоя при прививкъ особенно рекомендуются, потому что тъмъ самымъ увеличивается площадь соприкосновенія черенка съ подвоемъ, и тъмъ будетъ лучше и надежнъе срастание. Само собой разумъется, что рекомендуемой здёсь длинё срёзовъ должны быть предёлы, потому что чрезмарно длинные сразы также неудобны. При прилаживаній черенка къ подвою необходимо наблюдать, чтобы край черенка, хотя съ одной стороны совпаль бы съ краемъ подвоя, если последній будеть толще черенка.



Рис. 38. Черенокъ съ заръ-SOMP

Простъйшимъ способомъ прививки будетъ обыкновенная прививка въ прикладку, или копулировка. Измененнымъ спосо-




Рис. 39. Черенокъ, прилаженный къ подвою, но еще не обвязанный мочалой.

Рис. 40. Англійская (съдлообразная) копулировка.

Рис. 41-42. Улучшенная прививка черенкомъ между корой и древесиной.

бомъ обыкновенной копулировки будеть англійская копулировка съ двумя язычками, при которой на подвов и черенкв делаютъ вертикальные заръзы. Рис. 38 изображаеть черенокъ яблони съ

заръзомъ, приготовленный для этого способа прививки, т. е. для англійской копулировки съ двумя язычками. Рис. 39 изображаетъ

череновъ, прилаженный по этому способу въ подвою, но не обвязанный еще мочалой. На рис. 40 представлена видоизмъненная англійская (съдлообразная) копулировка, примъняемая въ случаяхъ,

когда подвой бываеть толще черенка.

Англійская копулировка, съ расщепленіемъ подвоя и черенка, является очень хорошимъ способомъ прививки, потому что расщепление увеличиваетъ поверхность срастанія, и черенокъ держится на подвов до обвязыванія его мочалой, что облегчаеть выполнение прививки и обвязывание мъста прививки. Очень хороша, особенно при подвояхъ толщиною болье пальца, такъ называемая «улучшенная прививка между корой и древесиной». При этомъ спо собъ черенокъ обдълывается, какъ показано на рис. 41. при чемъ съ наружнато края язычка черенка снимается верхняя кожица. Когда черенокъ

готовъ, то на педвоъ дълается вертикальный сръзь, причемъ кора поднимается съ одной стороны. Поднятіе коры и приточка для при- ложенный къ подвою черенокъ вивки вишенъ можно видъть на рис. 42.

Въ Курской губ. спеціально между корой и древесиной. для вишенъ крестьянами-пепиньеристами примъняется слъ-

дующая, нъсколько своеобразная прививка между корой и древесиной. Для этой прививки употребляется особая косточка. Чтобы сдълать такую косточку, берутъ птичью полую кость и разваривають ее въ кипяткъ; когда кость размягчится, ее обдълывають трубочкой съ заостреннымъ язычкомъ. Затъмъ она надъвается трубочкой на деревянную ручку и закръпляется поперечнымъ штифтикомъ. При этомъ способъ прививки подвой сръзается такъ, какъ показано на рисункъ 44, при чемъ сверху не туго обвязывается мочалкой.

Рис. 43. Кос-



Рис. 44. Сръзка подвоя для прививки за кору. Подвой обвязывается мочалой.

Когда дичокъ обвязанъ, язычекъ костяшки запускаютъ между корой и древесиной (рис. 45), чтобы сделать свободное место для вставки язычка приготовленнаго черенка. Рисунокъ 46 показываеть, какъ приготовляется черенокъ; съ язычка черенка снимается верхняя кожица до основанія язычка, съ темь, чтобы язычекъ попалъ подъ кору зеленой и мягкой забо-

Если не сдълать предварительной обвязки мочалой, а попробовать вставить косточку между корой и древесиной до обвязки подвоя мочалой, то кожина подвоя можетъ легко дать черезчуръ сильную трещину. Послъ вставки косточки между корой и древесиной мъсто косточки тотчасъ же занимаетъ приготовленный уже черенокъ. Затымъ прививки обмазываются садовымъ варомъ (рис. 47). Способъ этоть, кажется, есть изобрътение крестьянъ пепиньеристовъ Корочанскаго у., Курской


губ.. славящихся своими многочисленными крестьянскими садами. Съ распространениемъ и съ замъной ввеленіемъ въ качествъ подвоя вмъсто вишни антипки, хорошо принимающей окулировку, этотъ способъ теряетъ свое значение. Нельзя не упомянуть, что весьма хорошая сторона этого способа прививки заключается въ томъ, что при немъ избъгается разръзъ коры, въ отношеніи чего вишня чувствительнее яблонь и грушъ.

Здъсь же можно еще упомянуть, что у вишенъ могутъ быть привиты лишь тонкіе, до мъднаго пятака въ діаметръ, штамбы съ сочною, гладкою и незагрубълою еще корою. Болъе старые стволы съ Рис. 45. Язычекъ грубою, покрытою ли- косточки запу- Какъ приго- Черенокъ шаями, корою прививки щенъ между ко- товляется вставляется не принимаютъ. Въ са- рой и древеси- черенокъ за кору, и дахъ иногда бываетъ ной, чтобы при для вставки прививокъ много вишневой поросли странство для рой и дре- ся и обызаывает-



Рис. 46.





безъ успѣха можетъ быть привита по этому способу. Употребляемыя крестьянами косточки часто ломаются, поэтому выгоднѣе заказать подобіе ихъ изъ металла.

Хотя описываемая здёсь прививка вишенъ съ помощью косточки и является какъ бы пережиткомъ старины, но она здёсь нами приведена потому, что точно такимъ же образомъ вынолняется прививка въ корень взрослыхъ дикихъ яблонь и грушъ; столь



Рис. 48. Результатъ прививки вишни по способу курскихъ крестьянъ.

распространенная среди крестьянъ - плодоводовъ центрально - черноземной полосы Россіи. Посредствомъ этой прививки много лѣсовъ и рощъ съ росшими въ нихъ дикими яблонями и грушами обращены крестьянами въ сады, или вѣрнѣе, въ плодовыя рощи и левады.

Для прививки въ корень крестьянами употребляется инструментъ
на подобіе описанной косточки, только значительно большихъ размѣровъ.
Такой инструментъ дълается изъ твердаго дере
ва, напр., изъ бересклета.

Для такой прививки въ корень на черенки употребляютъ толстую двухлътнюю древесину (толщиною въ палецъ),

изъ которой приготовляють черенокъ длиною вершковъ 5—6, затачивая его сѣдлообразно и снимая съ язычка черенка кожицу до заболони. При прививкъ этимъ способомъ дикое, обыкновенно уже не молодое, дерево рубится при корневой шейкъ, послъ чего отканываются верхнія толстыя корневыя развътвленія. Эти послъднія отпиливаются у корневой шейки пилкой и, по возможности, отводятся отъ корневой шейки и штамба назадъ. Послъ этого поверхность сръза на верхушкъ отдъленнаго корня сглаживается ножемъ, при чемъ верхушкъ сотдъленнаго корня сглаживается ножемъ, при чемъ верхушкъ обматывается паклей или мочалой, какъ это указано для прививки за кору вишенъ. Послъ этого примъняется для отдъленія коры корня отъ древесины вышеописанный инструменть (рис. 43), по вынутіи котораго, на мъсто его вставляется приготовленный уже черенокъ. Когда черенокъ вставленъ, прививка обмазывается глиной.

Между прочимъ А. А. Гинценбергъ указываетъ на способъ прививки вишенъ въ концъ іюня или въ началъ іюля полуодеревенъвшимъ, т. е. лътнимъ черенкомъ. Для этого черенокъ не долженъ быть слишкомъ мягокъ или травянистъ, а имъть уже нъ-

сколько выспѣвшую древесину. Черенокъ сръзается какъ вообще для прививки за кору. Лалъе подвой срѣзается горизонтальнымъ сръзомъ. а затъмъ сбоку дълается вертикальный обычный разрёзъ. послъ котораго въ этомъ мъстъ нъсколько полнимается кора. Затъмъ за кору очиненнымъ надлежащимъ образомъ срёзомъ вставляется черенокъ, завязывается раффіей и замазывается какойлибо замазкой, приготовленной по возможности не на спирту. Дабы остающіеся на черенкъ листья не испаряли влагу, ихъ укорачиваютъ на 2/3. Такъ какъ эта прививка производится въ самое жаркое время года, то прививки защища-




Рис. 49—50. Прививка мостомъ.

ются отъ солнца наложеніемъ на мѣсто прививки бумажнаго колпачка, который снимается, когда прививка уже принялась. Удача,
по словамъ А. А. Гинценберга, подобной прививки черенкомъ въ
зеленомъ видѣ зависитъ главнымъ образомъ отъ того, насколько
своевременно срѣзанъ черенокъ для прививки, при чемъ необходимо,
чтобы подвой былъ въ соку, чего достигнуть не трудно.

Весьма важнымъ способомъ прививки въ нѣсколькихъ указываемыхъ ниже случаяхъ является прививка мостомъ. Прививка мостомъ имѣетъ примѣненіе въ случаяхъ поврежденія штамба де-

рева мышами или зайдами, которые обгрызають штамбъ иногда такъ, что кора на штамбъ бываетъ съъдена вокругъ всего штамба до древесины, такъ что соку нътъ возможности двигаться по де-



реву снизу вверхъ, и послъднее обречено на неминуемую погибель, хотя въ первую весну обглоданное дерево и можетъ распуститься и даже цвъсти. Чтобы спасти дерево въ данномъ случат, необходимо дать возможность движенія сока отъ корней наверхъ къ кронт дерева по стволу. На рис. 49—50 изображена такая прививка мостомъ, при чемъ на этомъ рисункъ слъва (съ краю) изображенъ черенокъ въ одномъ положеніи, т. е. съ одной стороны, а рядомъ съ нимъ, — съ другой стороны. На

черенкъ по обоимъ концамъ его дълаются съдлообраз-

ные уступы, причемъ съ передней стороны язычковъ снята верхняя кожица, такъ что череновъ въ данномъ случав приготовляется на подобіе того, какъ онъ рѣзался при улучшенной прививкъ между корой и древесиной. Длина черенковъ должна соотвѣтствовать ширинѣ раны на штамбъ.

Далъе, на томъ же рисункъ изображенъ поврежденный мышами молодой штамбъ, рана котораго сглажена ножемъ, причемъ снизу и сверху поднята на подвоъ кора, на подобіе того, какъ это дълается при улучшенной прививкъ между корой и древесиной. Сглаженная и обдъланная, какъ показано на этомъ рисункъ, рана на штамбъ облегчаетъ прилаживаніе черенка къ подвою.

Справа (съ краю) представленъ черенокъ, прилаженный къ подвою, т. е. вставленный снизу и сверху за кору.

При вставкъ черенка язычками за кору необходимо наблюдать, чтобы глазки черенка были обращены вверхъ. Рисунки 49—50 поясняютъ примъръ прививки одного черенка къ молодому нетолстому

штамбу, объеденному мышами на половину, а не по всей окружности. Если же штамбъ довольно толстъ, и кора уничтожена вокругъ всего штамба то, сообразно этому, рана сглаживается ножомъ вокругъ всего штамба, и въ несколькихъ местахъ за приподнятую кору вставляется несколько черенковъ.

При прививкъ мостомъ даже у взрослыхъ деревьевъ необходимо внизу послъ прививки укръпить штамбъ кольями, такъ какъ



Рис. 52. Надръзъ на подвоъ для вставки плодовой въточки.

иначе отъ вътра вставленныя за кору части черенка будутъ сдвигаться съ мъста, и прививка не будетъ имъть успъха. Привитые «мостомъ» черенки современемъ такъ разрастаются, что штамбъ въ этомъ мъстъ оказывается совершенно исцъленнымъ.

Въ заключение упомянемъ объ интересныхъ прививкахъ плодовой въточкой, производимой у яблонь и грушъ. Эта прививка производится во время окулировки лътомъ. Вмъсто черенка берется плодовая въточка и сръзается съ дерева, какъ показано на

рис. 51, изъ котораго можно видъть, какъ должны быть удалены листья. Затъмъ на избранномъ мъстъ подвоя дълается надръзъ коры (рис. 52), за которую и вставляется плодовая въточка, какъ показано на рис. 53. Этотъ способъ прививки требуетъ, помимо обвязки мочалой, обмазки садовымъ варомъ.

На обвязку у насъ и теперь неръдко употребляется обыкновенная липовая мочала, но на ряду съ нею стала входить въ употребленіе и болье дорогая, индійская мочала «раффія», добываемая изъдревесныхъ волоконъ пальмы того же названія. Раффія имъетъ несомнънное преимущество передъ обыкновенной липовой мочалой, такъ какъ работать съ нею гораздо удобнъе. Обвязка прививочнаго мъста должна быть сдълана плотно и достаточно туго, чтобы привитыя части взаимно были бы сближены возможно совершеннъе.

Способъ прививки плодовой въточкой примъняется лишь у взрослыхъ деревьевъ и именно въ томъ случать, когда хотятъ у себя въ саду видъть поскоръе плоды какого-нибудь новаго сорта, такъ какъ этотъ способъ даетъ скорые результаты: если во второй половинъ лъта сдълать прививку плодовой въточкой, то послъдняя можетъ принести плодъ



уже въ слѣдующемъ году.

Садовый варъ, употребляемый при прививкѣ, бываетъ тепложидкій, требующій при работѣ разогрѣванія, и холодно-жидкій, не требующій разогрѣванія. Въ рецептахъ того и другого нѣтъ недостатка; мы здѣсь укажемъ на тѣ два рецепта, которыхъ придерживаемся сами. Тепложидкій варъ приготовляется изъ смѣси равныхъ вѣсовыхъ частей желтаго воска, терпентина и канифоли или очищенной еловой смолы. Сперва растапливается канифоль, послѣ чего въ тотъ же сосудъ кладется воскъ и терпентинъ, причемъ все это размѣшивается. Затѣмъ горячую смѣсь вливаютъ въ холодную воду и основательно размѣшиваютъ ее подобно тѣсту руками.

Холодно-жидкій варъ составляется изъ 6 въсовыхъ частей канифоли, 1 части терпентина и 3 частей кръпкаго спирта, граду-

совъ въ 90. Сперва растапливается смола и смъщивается съ терпентиномъ. Смолу надо растапливать не на сильномъ огнъ; лучше всего на жаровнъ съ угольями, и слъдить, чтобы расплавленная

Рис. 54. Запущенная прививка, у которой во время не была снята обвязка.

и кипящая смода не вспыхнуда, почему на всякій случай не мъщаетъ запастись влажной рогожею, чтобы прикрыть ею сосудь, если смода вспыхнеть. Когда смъсь канифоли и терпентина прокипить нъсколько разъ, то ее надо нѣсколько остудить и уже послѣ этого очень осторожно и исполволь вливать спирть. Остывшій, но еще теплый варь, разливается, при постоянномъ взбалтываніи, по бутылкамъ, въ которыхъ можетъ храниться неопредъленно долгое время.

Уходъ за прививками въ первое время сводится къ тому, чтобы во время снять обвязку и не дать мочаль връзаться въ привитыя между собой части, отчего можетъ произойти въ мъстъ прививки поломка

вътромъ. Когда прививка тронется въ ростъ, то дней черезъ 15-20, смотря по силъ подвоя и привоя, а также роста побъговъ, приходится, развязывая прививку, замънять снятую обвязку новою, менъе тугою. Запушенную прививку, у которой повязка не была своевременно снята и не была замънена новой, можно видъть на рис. 54. Въ срединъ лъта обвязку можно совершенно удалить. При-

вивки требуютъ обыкновенно привязки къ кольямъ.

Привитые за кору черенки вишенъ, какъ только почки тронутся въ ростъ, начинаютъ, вследствіе образованія наплыва, отклоняться въ сторону отъ штамба. Чтобы это предупредить, подлё растенія въ землю становится колышекъ съ противоположной стороны того мъста на подвоъ, въ которое вставленъ черенокъ. Последній въ одномъ или двухъ местахъ притягивается къ колышку. Побъги, развившіеся изъ сдъланныхъ въ крону дерева прививокъ, должны быть привязаны къ укръпленнымъ снизу палочкамъ въ нъсколькихъ мъстахъ, чтобы защитить принявшуюся прививку отъ поломки, какъ показано на рис. 55. Только следующимъ лътомъ, когда произойдетъ полное срастание подвоя съ привоемъ, можно будетъ удалить прикръпленную палочку. Такъ поступать приходится обыкновенно при перепрививкъ другимъ (лучшимъ) сортомъ дерева и на такъ называемыхъ «пробныхъ» деревьяхъ, въ крону которыхъ прививаются различные сорта, съ цёлью ихъ испытанія. палочкъ,



Рис. 55. Подвязка вновь развившагося побъга къ

Окулировка. Окулировка яблонь и грушъ обыкновенно производится на второй годъ по посадкъ дичковъ въ питомникъ. Не-



Рис. 56. Неподчищенный яблоневый дичекъ.



Рис. 57. Подчищенный снизу и готовый къ окулировкъ дичекъ.

задолго до окулировки, помимо рыхленія земли, дички приготовляются къ окулировкъ, т. е. полчишаются снизу, дабы не было препятствій къ вставкъ глазка въ штамбикъ дичка и завязкъ его. На рис. 56 представленъ неподчищенный яблоневый дичокъ, растущій уже второе лъто въ кварталъ питомника, а на рис. 57 изображенъ тотъ же самый дичекъ, но подчищенный снизу и совершенно подготовленный къ окулировкъ.

На окулировку берутся латніе черенки, отъ которыхъ требуется, чтобы они были спълы, т. е. чтобы древесина ихъ достаточно отвердела, а вмёстё съ тёмъ, чтобы глазки черенка были хорошо выспъвшими и развитыми. Какъ со сръзаннаго на окулировку побъга удадяются листья, показано на рис. 58, а рис. 59 представляетъ совершенно готовый для окулировки черенокъ На этомъ черенкъ въ дъло употребляется только срелняя его часть (заключенная на рис. 59 между двумя черточками), такъ какъ верхняя часть черенка бываетъ обыкновенно недостаточно одеревенявшей, съ плохо развитыми глазками, а нижняя хотя и бываетъ достаточно одеревянъвшей, но находящиеся на ней глазки бываютъ съ побъга.



Рис. 58.

обывновенно плохо развиты. Глазки или ръжутся съ тонкимъ слоемъ древесины («окулировка съ древесиной»), или срываются (выщинываются) съ черенка, или, наконецъ, сръзаются съ древесиной, послъ чего со щитка удаляется древесина помощью конца лезвея окулировочнаго ножа («окулировка съ удаленіемъ древесины»).




Рис. 59. Готовый для окулировки черенокъ.

Рис. 60. Какъ ръжется глазокъ со щиткомъ.

Во всёхъ благоустроенныхъ питомникахъ, особенно заграницей, въ настоящее время принята обыкновенно окулировка съ древесиной. Какъ снимается съ побъга глазокъ со щиткомъ-показано на рис. 60. А какъ глазокъ снимается съ побъга «съ выщинываніемъ щитка», показываетъ рисуновъ 61. На этомъ рисункъ 61 показано, какъ до отделенія отъ древесины щитокъ обводится сръ-

зами ножа. Отабленный (выщиннутый) по этому способу глазокъ со шиткомъ изображенъ въ двухъ положеніяхъ, спереди и свали.

къ рис. 62. Также, впрочемъ, будетъ выглядъть и щитокъ съглазкомъ, полученный не выщипываніемъ, а обывновеннымъ способомъ, т. е. просто при сръзкъ его съ черенка ножомъ, т. е. съ древесиной.

Мъсто вставки щитка съ глазкомъ на дичкъ всегла выбирается по возможности близъ корневой шейки, т. е. при земяв. На этомъ мъстъ для вставки за кору сръзаннаго съ черенка щитка и дълается предварительно общензвъстный Т-образный надръзъ

Нъкоторые плодоводы нъсколько видоизмъняють Т - образный надръзъ коры, проводя горизонтальный надръзъ не прямою линіею, а дълая его слегка дугою, такъ какъ въ последнемъ случае удобне вкладывается за кору щитокъ съ глазкомъ. Обыкновенный Т - образный надрёзъ, вмёстё съ видоизмъненнымъ надръзомъ дугою изображенъ на рис. 64.


Въ томъ и другомъ случав при надръзв на дичкъ коры, сперва дълается горизонтальный надръзъ, а затъмъ вертикальный, начинаемый снизу и доводимый до горизонтальнаго. Когда лезвіе ножа дойдеть до горизонтальнаго надръза. то, не вынимая изъ надръза лезвея,




движениемъ руки даютъ ножу два поворота въ одну и другую сторону для того, чтобы кора при надръзъ отдълилась отъ кожицы.

Въ случав, если кора однимъ движеніемъ ножа не отдъляется отъ древесины, то это отдъленіе производится помощью костяшки окулировочнаго ножа.

Пріемы окулировщика состоять въ следующемъ. Окулировщикъ встаетъ надъ дичкомъ, причемъ верхушку его оставляетъ за собою наклоняя нѣсколько дичокъ книзу, послѣ чего, держа наготовъ въ рукъ черенки, съ одного изъ нихъ сръзаетъ щитокъ (рис. 65). Сръзанный щитокъ окулировщикъ оставляеть на лезвей ножа, прижимая его большимъ пальцемъ правой руки и, нагибаясь книзу, передаетъ его львой рукь (рис. 66), которой онъ берется за листовой черешокъ съ помощью большого



ванія.



половины, а затъмъ и другой край отставшей уже коры надръза лъвой рукой, въ надръзъ вставляютъ щитокъ при помощи костяшки

Рис. 64. Обыкновенный Т - образный разръзь (слъва) и видоизмъненный дугою (справа).

ножа, который держится въ правой рукъ (рис. 68); черешокъ при этомъ изъ руки не выпускается.

Дальнѣйшее введеніе щитка за кору дичка производится помощью поставленной на ребро костяшки ножа (рис. 69). На рисункъ 70 изображенъ введенный за кору дичка щитокъ. Если верхняя половинка щитка надъ глазкомъ слишкомъ велика, то она укорачивается по линіи горизонтальнаго надрѣза. Когда щитокъ введенъ за кору, то окулировщикъ указательными пальцами объихъ рукъ (рис. 71) проводитъ сверху внизъ по краямъ разрѣзовъ, выравнивая такимъ образомъ взрѣзанную кожицу дичка и нажимая ее къ введенному за кору щитку, послѣ чего приступаетъ къ обвязкъ щитка съ глазкомъ мочалой.

Мочальная лента начинаетъ накладываться на мѣсто окулировки такимъ образомъ, что одинъ конецъ ея сперва закрѣпляется горизонтально на мѣстѣ горизонтальнаго надрѣза (рис. 72), для

чего одинъ конецъ ея подворачивается и закрапляется первымъ оборотомъ ленты. Когда одинъ конецъ будетъ заложенъ за оборотъ ленты и такимъ образомъ закръпленъ, то, придерживая пальцами первый оборотъ, чтобы онъ не распустился, дълаютъ на томъ же мъсть еще пару оборотовъ ленты и тъмъ самымъ окончательно закрвиляють одинь ея конець, далве оставшимся длиннымъ концомъ последовательно дълаютъ тугіе горизонтальные обороты. Главокъ, конечно, оставляется незакрытымъ, и обороты мочальной ленты идуть до техъ поръ, пока совершенно не закроютъ основанія вертикальнаго надріза; въ этомъ мъстъ дълается послъдній обороть петлей. въ которую пропускается оставшійся свободный конецъ мочальной ленты, чъмъ онъ и закръпляется (рис. 73). На рис. 74 изображена правильно завязанная окулировка.

Въ большихъ питомникахъ, обыкновенно, введеніе за кору дичка щитковъ и обвязка бываютъ распредёлены между ра-



Рис. 65. Сръзка щитка съ черенка.

бочими такъ, что одинъ «окулировщикъ», вставляетъ щитки съ глазками, а другой, идущій вслъдъ за нимъ,— «обвязчикъ» — произ-




Рис. 66. . . . прижимая большимъ пальцемъ правой руки и, нагибаясь книзу.

водить обвязку. При такой совмѣстной работѣ, послѣдняя идеть весьма быстро. Мочальныя ленты рѣжутся длиною около 10—12 вершковъ. Приверженцы окулировки при помощи «выщипыванія», крестьяне-

пепиньеристы утверждають, что при окулировкъ помощью выщиныванія, т. е. безъ древесины, пріокулированные глазки якобы въ гораздо меньшей степени склонны прорастать осенью того же года, нежели это имъетъ мъсто при окулировкъ съ древесиной.

Дней черезъ десять можно уже видъть результатъ окулировки по легко отпадающему черешку пріокулированнаго щитка и свѣжему состоянію глазка. Не принявшіе окулировки дички, по провъркъ рядовъ, дней черезъ 10 подвергаются вторичной окулировкъ, конечно, при условіи легкаго отставанія коры. Недъли черезъ три повязка ослабляется, иначе мочала врѣжется въ кору, и дичокъ



Рис 67.... правой рукой дълаетъ указанные на рис. 64 надръзы.

можеть тогда легко быть въ мѣстѣ окулировки сломанъ вѣтромъ. Принято производить окулировку преимущественно на сторонѣ дичка,




Рис. 68.6... въ надръзъ вставляетъ щитокъ при помощи костяшки ножа.

обращенной къ съверу, для защеты отъ солнца, хотя постоянно приходится от ст у пать отъ этого правила, отыскивая гладкое мъсто для надръза.

Однимъ изътлавныхъ условій удачной о к у л и р о в к и считается быстрота ея исполненія. Въ опытныхъ рукахъ процентъ принявшихъ окулировокъ не бываетъ ниже 95%, но у косточ-

ковыхъ процентъ бываетъ обыкновенно ниже, нежели у зереовыхъ. Прививка черенкомъ въ питомникъ играетъ сравни-





Окулировка являет-

ся главнымъ и почти единственнымъ способомъ размноженія въ питомникѣ плодовыхъ деревьевъ, особенно яблонь и грушъ, одинаково хорошо принимающихъ окулировку, какъ съ древесиной, такъ и безъ древесины. Можно сказать только одно, что въ умѣлыхъ и въ



Рис. 70. А—дичекъ, В— введенный за кору щитокъ.

привычных руках у яблонь и грушъ окулировка съ древесиной примъняется такъ же хорошо, какъ и окулировка безъ древесины, но кто уже привыкъ къ чему-нибудь одному, тотъ въ большинствъ случаевъ будетъ имъть успъхъ въ томъ, что онъ усвоилъ.



Рис. 71. Выравниваніе указательными пальцами объихъ рукъ краєвъ разръзанной коры.

Для окулировки косточковыхъ, разумъя здъсь особенно вишню, надо брать побъги съ хорошо выспъвшею древесиною и въ выборъ такихъ побъговъ быть построже. Далъе, вишню надо окулировать на молодыхъ дичкахъ, по возможности съ тонкою, еще не загрубъвшею корою, и непремънно въ первомъ году по посадкъ дичка въ кварталъ питомника, потому что на второй годъ вишневый дичекъ будетъ имъть болъе грубую кору. Поэтому, не принявшіе окулировки дички лучше прививать весною черенкомъ, минуя оку-

лировку, потому что подобные дички, при всемъ стараніи иногда не даютъ болье 25—30% пріема, а часто и того менье. Затьмъ



Рис. 72. Наложеніе обвязки и закръпленіе верхняго конца мочальной ленты.

при окулировкъ вишенъ нельзя спъшить съ ослабленіемъ, а тъмъ болъе совершеннымъ удаленіемъ повязки. Сплошь и рядомъ бываетъ, что при развязкъ мочалы щитокъ кажется совершенно принявшимся и хорошо приросшимъ, между тъмъ черезъ нъсколько дней подобный освобожденный щитокъ начинаетъ отделяться отъ подвоя, а края надръзовъ кожицы на послёднемъ разлёзаются въ стороны. Поэтому при окулировкъ вишенъ приходится весьма тщательно дълать обвязку, непремънно наблюдая, чтобы мочала плотно и вездъ закрыла разръзы дичка, и чтобы оставался незакрытымъ только одинъ глазокъ. При ослабленіи и возобновленіи обвязки надо увязывать съ прежнею тщательностью.

Гдъ на подвой употребляють черешню и антипку, а не кислую




Рис. 73. Послѣднее кольцо обвязки и ея закрѣпленіе на дичкѣ.

вишню и морель, окулировка вишенъ и черешенъ идетъ болъе успѣшно, и потому всѣ сказанныя предосторожности относительно окулировки вишенъ, если не отпадаютъ окончательно, то, можеть быть, не такъ важны. Но гдъ на подвой употребляютъ морель и кислую вишню, необходимо имъть въ виду всв вышеупомянутыя

частности окулировки вишенъ. Сказанному относительно нъкоторой трудности облагораживанія вишенъ подтвержденіемъ можетъ служить тотъ фактъ, что на уъздныхъ базарахъ центрально-черноземныхъ губерній неръдко можно найти яблоневыя и грушевыя «присадки» (конечно, цъною не изъ высокихъ,



Рис. 74. Видъ обвязаннаго мочалой щитка.

а качествомъ и еще ниже) но встрътить тамъ вишневыя облагороженныя деревья удается очень ръдко, потому что разведение облагороженныхъ вишенъ в питомникъ во много разъ труднъе, нежели яблонь и грушъ.

Выборъ черенковъ для облагораживанія. Не только у насъ въ Россіи, но и заграницей до сихъ поръ обыкновенно не обращають вниманія на то, съ какого дерева черенки берутся для цълей облагораживанія. Обыкновенно этотъ вопросъ совершенно игнорируется, и предполагается, что съ какихъ деревьевъ ни брали бы черенки для прививки или окулировки, совершенно безразлично. Такое безразличие въ выборъ черенковъ или, върнъе, въ выборъ племенныхъ деревьевъ, съ которыхъ сръзаются черенки, ведетъ въ тому, что плодоводъ можетъ получить у себя въ плодовомъ саду деревья, которыя не плодоносять чрезвычайно долго; у такихъ деревьевъ можно не дождаться плодовъ лътъ 20 и даже болъе, несмотря на то, что въ отношении здоровья, силы и роста они не оставляють желать ничего лучшаго. Во всякомъ случав, существованія такого явленія или его возможности отрицать совершенно нельзя, и потому этотъ весьма еще темный и неизученный вопросъ необходимо считать пока открытымъ. Извъстный плодоводъ О. Э. Ромеръ утверждалъ, что для того, чтобы имъть въ своемъ саду деревья, входящія въ пору плодоношенія въ нормальный срокъ, и не опаздывающія съ урожаемъ на очень долгіе годы, необходимо брать черенки для облагораживанія не съ молодых, растущихъ въ питомникъ неплодоносящихъ деревьевъ, а съ деревьевъ, уже вошедшихъ въ пору плодоношенія. Въ сѣверо-американской спеціальной печати существуютъ указанія, что при прививкъ въ крону молодыхъ деревьевъ черенками яблони Съверный Шпіонъ, взятыми съ сильно плодоносящихъ деревьевъ этого сорта, получались скоро приходящія съ плодомъ и очень урожайныя деревья, при чемъ тутъ же упоминается о деревьяхъ, не дающихъ урожаевъ въ теченіе нъсколькихъ десятильтій, именно въ томъ случав, если деревья эти получены прививкой черенками, взятыми съ деревьевъ, росшихъ еще въ питомникахъ. Въ спеціальной статьв, посвященной этому вопросу въ американскомъ журналъ «Канадскій Садоводъ» (Canadian Horticulturist) за 1906 г., между прочимъ, говорится, что во многихъ питомникахъ принято размножать деревья посредствомъ черенковъ, взятыхъ съ молодого дерева и привитыхъ на молодыхъ растеніяхъ. Это практикуется въ течение 20, 30, 40 и 50 лътъ и въ концъ концовъ такой способъ размноженія оказывается самымъ дъйствительнымъ способомъ разведенія неплодоносныхъ деревьевъ.

Конечно, приводимыя здѣсь выдержки изъ вышесказаннаго американскаго садоваго журнала вовсе не могутъ претендовать на какой-нибудь особый авторитетъ, но нельзя не отмѣтить, что не только у насъ въ Россіи, но даже въ С. Америкъ раздаются тре-

вожные голоса съ предостереженіями, чтобы для прививки не брали черенковъ съ молодыхъ, растущихъ въ питомникъ, деревьевъ, а брали бы ихъ съ деревьевъ, уже бывшихъ съ урожаями, изъ плодоваго сада. Указанія о томъ, что къ выбору черенковъ для облагораживанія нельзя относиться безразлично, мы находимъ и у англійскаго ученаго—плодовода Найта (Knight), еще въ сороковыхъ годахъ прошлаго стольтія. Онъ послъ своихъ опытовъ и наблюденій надъ прививками плодовыхъ деревьевъ пришелъ къ заключенію, что черенки, снятые съ того или иного дерева, при прививкъ ихъ удерживаютъ и хорошія, и отрицательныя ихъ свойства.

Какъ въ русской, такъ и въ иностранной литературѣ по плодоводству существуютъ указанія, что если прививку или окулировку произвести черенкомъ или глазкомъ, взятымъ изъ водяного побъга, получается дерево съ сильнымъ ростомъ, но не плодоносное или съ плодоношениемъ, наступающимъ черезъ много лътъ. Принимая это во вниманіе, нельзя такого явленія не поставить въ связь съ темъ обстоятельствомъ, при которомъ мы изъ года въ годъ прививаемъ наши подвои въ питомникъ черенками, взятыми съ деревьевъ, полученныхъ точно такимъ же путемъ и растущихъ тутъ же въ питомникъ, повторяя это послъдовательно изъ года въ годъ. Очевидно, въ деревъ существуетъ какая то особая наклонность къ отдаленію или приближенію срока урожайности и плодоношенія, весьма в роятно сопровождающаяся вегетативными внутренними измъненіями. Пока одно можно сказать, что все это еще совершенно не изучено, и эти задачи и вопросы будутъ рѣщены новыми покольніями, но этого вопроса въ плодоводствъ игнорировать намъ никакъ нельзя. Поэтому, подходя къ разрѣшенію этого вопроса чисто практическимъ путемъ, приходится остановиться на выборъ лучшихъ черенковъ. Такими черенками будутъ прежде всего черенки вполнъ развитые, находящіеся на южной, болье солнечной сторонъ дерева. Затъмъ, такими лучшими черенками будутъ тъ, которые сръзаны съ деревьевъ, заявившихъ себя не только начавшимся у нихъ плодоношеніемъ, но и максимальною урожайностью, а также и наиболье совершенными плодами. Все это относится главнымъ образомъ въ зерновымъ, т. е. въ яблонямъ и грушамъ, а не къ косточковымъ, потому что у последнихъ подобное безплодіе при нормальных условіяхь бываеть гораздо ріже. Кромі того, у косточковыхъ вообще урожайность наступаетъ несравненно скорће, чамъ у зерновыхъ. Лично, составителю этой книги и самому приходилось встржчать пользовавшіеся отличнымъ уходомъ яблоневые сады, упорно отказывавшіеся (несмотря на ихъ зрѣлый возрастъ) плодоносить, и врядъ ли можно было абсолютно поручиться за то, что безплодіе это не происходило отъ выбора для облагораживанія нежелательной древесины. Изъ всего вышесказаннаго можно придти къ следующему заключенію. Кто имфеть возможность, пусть лучше облагораживаетъ свои яблони и групи черенками, снятыми не только съ плодоносящихъ уже, но и обладающихъ максимальными урожаями наиболѣе совершенныхъ плодовътеревьевъ

Выведеніе въ питомникъ деревьевъ. Первый годъ. Окулированные нами дички уже перезимовали, и съ весны начинается выведеніе благороднаго дерева. Рис. 75 изображаетъ тронувшійся весною въ ростъ пріокулированный на яблоневомъ дичкъ глазокъ. До развитія пріокулированныхъ глазковъ начинается уда-

леніе лишнихъ частей дичка, или такъ называемая разка на шипъ, т. е. укорачивание дичка съ оставленіемъ надъ благороднымъ глазкомъ части стволика, длиною какъ уже было указано, отъ 3 до 5 вершковъ. Болъе высокій шипъ, о чемъ также уже говорилось, предпочитается при болье открытыхъ, и следовательно при болье подвергнутыхъ дъйствію вътра, мъстоположеніяхъ. Съ оставленнаго шипа удаляютъ всъ дикіе глазки или начинающие развиваться изъ последнихъ побъги при ихъ основаніи. Когда благородный побъть при дичкъ изъ пріокулированнаго глазка достигнеть вышины 5 — 6 вершковъ, то онъ притягивается къ шипу мочалой для того, чтобы побътъ росъ совершенно вертикально. Рис. 76 изображаетъ благородный побъгъ яблони, уже привязанный къ шипу въ срединъ мая *). Побъги, уклоняющиеся отъ вертикального направленія, приходится иногда привязывать (мочалой



Рис. 75. Тронувшійся весной въ ростъ пріокулирован. глазокъ.

или ивовыми прутьями) къ приставленнымъ прямымъ колышкамъ. Здёсь мы на время оставимъ наши молодыя деревца и скажемъ, что, по высоте ствола или штамба, деревья раздёляются на высокоштамбовыя, полуштамбовыя и низкоштамбовыя. Собственно, настоящихъ высокоштамбовыхъ деревьевъ съ вышиной ствола въ три аршина, какъ это принято заграницей, въ Россіи не разводятъ, а потому у насъ принято считать за штамбовыя деревья экземпляры съ высотою ствола около 1½ аршина, (но не выше) полуштамбовыя—съ высотою ствола около ½ аршина и низкоштамбовыя, —имъющія стволъ вышиною около ½ аршина или нъсколько болье. Послъдняя форма дерева будетъ приближаться уже къ кустовой. Относительно высоты штамба (у штамбоваго дерева, а не полуштамба и тъмъ болье не у низкоштамбоваго дерева) слъдуетъ замътить, что чъмъ съверные мъстность, тъмъ иредпочтительнъе дълать штамбъ ниже. Вотъ почему нъкоторые опыт-

^{*)} Рачь везда идеть о времени работь въ климата Курской губ.

ные и авторитетные плодоводы предпочитають штамбъ на сѣверѣ короче $1^1/_2$ аршина (24 вершка), а именно всего лишь вершковъ 18-20 и даже 17. Чѣмъ ниже штамбъ, тѣмъ скорѣе вырастить въ питомникѣ дерево и легче получить у него сильную правильно развитую крону.

Вернемся теперь къ оставленному молодому, только что раз-




Рис. 76. Благородный побёгъ яблони, подвязанный къ шипу.

Рис. 77. Тотъ же побъгъ въ концъ лъта.

вившемуся изъ пріокулированнаго глазка благородному побъту, изображенному на рис. 76 и посмотримъ, какимъ онъ будетъ къ срединѣ іюля. Къ тому времени побъть уже начинаетъ превращаться въ стройную и рослую однолѣтку, какъ это видно изъ рис. 77. Приблизительно въ серединѣ іюля, когда въ шипѣ уже нѣтъ надобности, такъ какъ къ тому времени благородный побътъ достаточно окръпнетъ и одеревенѣетъ, шипъ удаляется, а образо-

вавшаяся отъ того рана до осени успеть нёсколько зажить, образовавъ наплывъ, который на следующій годъ совершенно затя-

нетъ плоскость срѣза. На томъ же рисункъ 77, между прочимъ, видно, гдѣ былъ срѣзанъ лежащій недалеко отъ деревца на землѣ шипъ. Удаленіе шипа требуетъ нѣкотораго навыка и осторожности, во-первыхъ, чтобы при его удаленіи не задѣть ножомъ благороднаго побѣга, а во-вторыхъ, произвести правильный отлогій срѣзъ и не сдѣлать неправильнаго сильно скошеннаго срѣза. На рис. 78 изображены рядомъ правильный и неправильный срѣзы шипа при основаніи благороднаго побѣга спереди, а на рис. 79 можно видѣть тѣ же самые срѣзы сбоку.

Второй годъ. На вторую весну оставленное нами съ осени однолътнее деревцо, переросшее вышину кроны, при-

Рис. 78. Правильный (слъва) и неправильный (справа) сръзы.

кронивается, т. е. ему дается рѣзка въ крону. Для этого на молодомъ штамбъ (слѣдовательно, на однолѣтнемъ побъгѣ), на высотъ не выше шести четвертей, выбираются на образованіе сучьевъ будущей кроны шесть хорошихъ глазковъ, при чемъ выборъ конечнаго верхняго глазка падаетъ на такой, который расположенъ на противоположной сторонъ тому мъсту на дичкъ, откуда при основаніи послъдняго выходитъ побъгъ. Такимъ образомъ, конечный глазокъ будетъ въ данномъ случаъ находиться какъ разъ надъ сръзомъ




тв удаленія шипа.

этого верхняго
оставляется
обой разумвется,
а, чтобы преду, шипъ лишаютъ
се ножомъ. Шипъ

Рис. 80. Полулунный надръзъ.

шинъ длиною вершка въ три; само собой разумъется, что на шинъ удаляются всъ глазки, а, чтобы предупредить навърняка развите ихъ здъсь, шинъ лишаютъ значительной части коры, сръзывая ее ножомъ. Шинъ въ данномъ случав назначается только для временной привязки къ нему верхушечнаго главнаго побъга т. е. приблизительно до половины іюля. Что же касается выбора конечнаго на штамбъ глазка, то

выборъ этотъ необходимъ для того, чтобы выровнять штамбъ, такъ какъ при этомъ условіи образующаяся кривизна при основаніи благороднаго побъга выравнивается тою кривизною, которую образуетъ при основаніи въ свою очередь верхній главный побъгъ второго года. Такимъ образомъ достигается прямизна и правильное направленіе будущаго штамба.



Но одной ръзки на шипъ и выбора требуемыхъ глазковъ недостаточно для полученія правильной и хорошо развитой кроны.
Такъ какъ верхніе глазки—вслъдствіе стремленія сока дъйствовать сильные вверху—образуютъ болье сильные побъги, то въ
огромномъ большинствъ случаевъ верхніе побъги развиваются въ
ущербъ нижнимъ, почему послъдніе часто бываютъ много слабъе
верхнихъ. Чтобы по возможности выровнять силу побъговъ, дълаются надъ тремя нижними глазками будущей кроны у яблонь
и грушъ, т. н. полулунные надръзы, захватывающіе вмъстъ съ
корой немного и древесины (рис. 80); эти надръзы, останавливая на

Рис. 82. Тоже самое де-

рево, но съ удаленными

лишними побъгами.

Рис. 81. Прикроненная

яблоневая однольтка къ

серединъ іюля.

пути стремящійся вверхъ сокъ, заставляють его пойти на пользу нижнихъ побъговъ кроны и тъмъ самымъ усиливають ростъ послъднихъ. Нъкоторые сорта развивають болье или менье правильныя кроны и безъ примъненія этихъ надръзовъ, но зато у многихъ сортовъ, отъ природы лишенныхъ прямого и сильнаго роста,

безъ примѣненія надрѣзовъ получаются неважныя кроны, и большинство деревьевъ этихъ сортовъ въ питомникѣ будетъ имѣть неправильныя, однобокія или неполныя кроны.

Прикроненная нами

яблоневая однолѣтка къ срединѣ іюля будетъ такою, какъ изображено на рис. 81.
Какъ видно изъ рисунка, избранные наверху штамба шестъ
глазковъ образовали
крону, при чемъ главный срединный побѣтъ
привязанъ къ шипу
(удаляемому въ одно
время съ шипами на
дичкахъ), лежащіе же

ниже глазки развили побъги. Въ концъ мая

или въ началъ іюня

верхушки этихъ по-

бъговъ прищипывают-

ся, какъ показано на



Рис. 83. Прикроненное деревцо "Долговътка".

Рис. 84. Тоже деревцо, но съ очищен. до высоты кроны побъгами.

рисункъ 81 черточками, чтобы направить сокъ ихъ на усиленіе штамба. Уничтожать же весною нижележащіе развивающіеся глазки, находящіеся ниже глазковъ кроны, было бы большою ошибкою, потому что образующіеся изъ этихъ глазковъ побъги содъйствуютъ усиленію штамба. Если съ удаленіемъ этихъ побъговъ запоздать, то образовавшіяся отъ поръзовъ ранки не успъютъ къ осени заплыть и зарубцоваться. Побъги эти удаляются въ срединъ іюля косымъ сръзомъ.

Вернемся къ рисунку 81, на которомъ изображено деревцо въ іюль со всьми побъгами. Рядомъ съ послъднимъ, на рис. 82 изо-

бражено то же самое дерево, у котораго въ началъ второй половины іюля уже удалены всё лишніе побёги, и оставлены только ть, которые образують крону. Но не всь сорта способны развивать ниже побъговъ кроны болъе или менъе длинные побъги, какъ это видно изъ рис. 81 и 82. Нъкоторые сорта ниже побътовъ кроны развивають или укороченные побыти, или только однъ ро-



Рис. 85. Однолътнее деревцо "Добраго Крестьянина".

зетки листьевъ. На рис. 83 изображено прикроненное яблоневое деревцо курскаго сорта «Долговътки» въ срединъ іюля, а рядомъ съ нимъ на слъдующемъ 84 рисункъ представлено то же деревцо, у котораго въ срединъ іюля штамбъ быль очищень отъ побъговъ вплоть до кроны. Осенью эти деревья уже готовы къ выкопкъ ихъ изъ питомника и пересадкъ въ плодовый садъ. Если же случается, что однолътній побътъ доросъ до требуемой высоты штамба, но не переросъ ее, такъ что образовать шипъ не изъ чего, тогда верхняя конечная почка предназначается для образованія главнаго побъга, а изъ слъдующихъ нижележащихъ глазковь образуется крона. Вследствіе отсутствія здісь сверху шипа для правильнаго направленія главнаго побъга послъдній можетъ быть подвязанъ къ колышку, прикрапляемому къ верхушкъ прошлогодняго побъга. Нъкоторые сорта яблонь, какъ

и грушъ, въ первомъ году не даютъ одиночнаго побъга, а вырастаютъ пирамидкой, развивая изъ пазухъ листьевъ главнаго побъга въ то же лъто вторичные побъги. На рис. 85 изображено однольтнее деревцо яблони Добрый Крестьянинъ, имъющей эту харакгерную особенность (та же особенность, между прочимъ, свойственна китайскимъ и другимъ мелкоплоднымъ яблонямъ). При прикрониваніи такихъ экземпляровъ, весною боковыя вътки не всъ удаляются совсёмъ, а съ ними поступають следующимъ образомъ. Самыя сильныя при основаніи ихъ при весенней різкі совершенно удаляются, наиболье слабыя вовсе не обрываются, а вытки средней

силы укорачиваются на 3-4 глазка, какъ показано на рисункъ 86.

На томъ же рисункъ двумя черточками отмъчено, гдъ предполагается сдёлать шипъ, при чемъ конечный гла-

вокъ выбирается на штамбъ, согласно сказанному о томъ ранбе.

Рисуновъ 87 представляетъ обезлиственное двухлѣтнее кронистое деревцо Добраго Крестьянина, полученное изъ однолътки, изображенной на

рисункъ 85.

Получение кронистыхъ деревьевъ въ три года. Мы разсмотръли случаи полученія кронистыхъ двухлётокъ со стволомъ вышиною около 6 четвертей въ 2 года, при чемъ прикронивались однолътки, переросшія опредъленную нами высоту кроны, или въ крайнемъ случат доросшія лишь до этой высоты. Но могутъ быть случаи, напр., на кварталахъ съ болъе слабымъ ростомъ или у сортовъ, не имъющихъ отъ природы быстраго и сильнаго роста, когда однолътки не достигають до требуемой высоты, чтобы быть прикроненными въ первомъ году, а потому такіе экземпляры кронятся лишь на второй годъ, т. е. на вторую весну. Однолътній, не доросшій до высоты кроны, побъть



тогда укорачивается приблизительно, на 1/3-1/4 его длины. Если этотъ побъгъ крониваются недостаточно силенъ, то онъ ръжется добныя изо. длиннве, т. е. въ отрвзъ идетъ большая браженному часть, съ болъе же сильнымъ побъгомъ на рис. 85. поступають наобороть, т. е. укорачиваютъ его менъе. Для примъра возь-

мемъ однолътку яблони Крымская Зеленка, изображенную на рис. 88. Черточками показано, что часть побъга, заключенная между ними, идетъ на удаляемый впоследстви шипъ. Рис. 89 изображаетъ то же деревцо въ листьяхъ къ концу лъта На рис. 90 изображено то же самое, но обезлиственное деревцо, какимъ оно будеть на весну следующаго года.

При прикрониваніи этого деревца, достигшаго уже теперь вышины, необходимой для образованія кроны, боковыя вътки весною не удаляются совершенно, а Зеленки".




Рис. 87. Лвухлът. кронистое деревцо "Доб раго Крестьянина".



Однолътка

ръжутся на 2—4 глазка, нижнія нъсколько длиннье, верхнія покороче, какъ это показано на рис. 91. Часть главнаго вертикальнаго побъга, заключенная между двумя черточками, назначается для образованія шипа; конечный же глазокъ выбирается на сторонъ штамба, противоположной тому мъсту, откуда вышелъ несущій его главный побъгъ въ прошломъ году, такъ что въданномъ случав конечный глазокъ будетъ на той же сторонъ





Рис. 89. То же деревцо въ листьяхъ къ концу лъта.

Рис. 90. То же деревцо, но обезлиственное.

штамба, откуда развился пріокулированный глазокъ. Предста вленное на 91 рис. обръзанное такимъ образомъ деревцо къ срединъ іюля приметъ видъ, изображенный на рис. 92. Развивающіеся побъги, находящіеся ниже побъговъ образующихъ крону, если слишкомъ длинны, могутъ быть тогда прищипнуты для усиленія штамба и побъговъ кроны. Въ срединъ іюля или нъсколько ранъе всъ развътвленія и побъги на штамбъ удаляются до побъговъ кроны; тогда это дерево въ безлиственномъ видъ поздно осенью или рано весною будетъ такимъ, какъ представлено на рис. 93, т. е. вполнъ сформированнымъ и, слъдовательно, готовымъ уже къ выкопкъ и продажъ.

Приведенные выше примъры выведенія въ питомникъ яблонь въ равной степени относятся также къ грушамъ и сливамъ. Мно-

гіе сорта сливъ въ нашихъ черноземныхъ губерніяхъ обыкновенно развиваютъ въ первомъ году побъги такого роста, что могутъ быть ръзаны на крону по первому же году. То же самое можно сказать и о буйнорослыхъ черешняхъ.



Выведеніе въ питомникѣ вишенъ. Однолѣтніе побѣги вишенъ рѣдко достигаютъ такой высоты, какъ яблони, груши и сливы. Вишнямъ чаще всего даютъ низкоштамбовую форму съ высотою штамба около $^3/_4$ аршина или немногимъ болѣе.

Вишни въ молодомт возрастъ гораздо болъе склонны развивать вторичные побъги изъ пазухъ листьевъ главнаго (первичнаго) побъга, нежели яблони и груши, поэтому молодыя вишневыя деревца, особенно выращиваемыя путемъ окулировки, въ первомъ году развиваются пирамидкой на подобіе Добраго Крестьянина. На рис. 94 изображена однолътка вишни Любка, развившеяся

изъ глазка, пріокулированнаго лътомъ предшествовавшаго года. Въ срединъ лъта у вишни удаляются шипы. Весною слъдующаго года боковые (вторичные) побъги



Рис. 94. Молодое вишневое деревцо сорта "Любка".

сразу обръзаются при ихъ основаніи, а не укорачиваются предварительно, какъ это имфетъ мъсто у яблонь и грушъ, такъ какъ косточковыя чувствительнъе ко всякимъ поръзамъ, нежели яблоня и груша, и потому, если бы боковые, еще тонкіе, побъги не удалялись сразу, а лишь укорачивались, то впоследствии пришлось бы срёзать более толстую древесину-и, слѣдовательно, увеличивать раны, которыя у вишенъ заживаютъ гораздо труднее, нежели у яблонь и грушъ. Весною слъдующаго года вишневая однолътка, лишенная боковыхъ вътокъ, ръжется въ крону на вышесказанной высотъ 3/4 аршина (второго шипа),

а полулунныхъ надръзовъ у вишни (какъ вообще у косточковыхъ) не примъняютъ. Къ осени прикроненное вишневое деревцо будеть имъть видъ, какъ показано на рис. 95.

Нѣкоторые болѣе слаборослые сорта сливъ, не достигающіе въ первомъ году достаточной вышины, приходится кронить на следующую весну; если же останавливаться на штамбъ меньшей 5-6 четвертей высоты, то крону можно выводить и у однольтокъ. То же самое относится и къ абрикосу, у котораго часто останавливаются на штамбъ вышиною около аршина. Персикъ, со свойственнымъ ему побъжистымъ ростомъ, вырастаетъ въ первое лъто обыкновенно кустомъ, въ какомъ видъ его обыкновенно и продаютъ. Такія молодыя персиковыя деревья, если они остаются въ питомникъ, подръзаются для удаленія лишнихъ боковыхъ вътвей съ осени.

Образование второго этажа кроны дерева въ питомникъ. Если дерево съ однолътней кроной не выкапывается изъ питомника, а по тъмъ или другимъ причинамъ остается въ





Рис. 95. Кронистое вишневое деревцо въ обезлиственномъ состояніи.

немъ еще на годъ, то оно получаетъ вторую ръзку въ крону, при чемъ второй этажъ образуется изъ главной срединной вътки, для чего последняя укорачивается въ среднемъ вершковъ до 12 или около того, а побъги, развивающиеся впоследствии изъ глазковъ. лежащихъ между верхнимъ сучкомъ первой кроны и нижнимъ побъгомъ второй кроны, уничтожаются при ихъ появленіи.



При выборъ шести глазковъ для образованія второго яруса кроны руководствуются тъми же соображеніями, какъ и при образо-

груши "Маликовка".

ваніи перваго яруса или этажа кроны, при чемъ непремѣнно стараются, чтобы развивающіеся изъ пяти выбранныхъ глазковъ, для образованія развітвленій второго яруса кроны, приходились бы между развътвленіями перваго яруса кроны.

Чтобы получить второй ярусъ кроны не только съ правильно размъщенными, но и съ равномърно развитыми побъгами, необходимо примънять и здъсь полулунные надръзы. Что же касается боковыхъ вътокъ перваго яруса кроны, то онъ обръзаются такъ, что въ отръзъ идетъ приблизительно отъ 1/3 до 3/4 ихъ длины, при чемъ верхнія вътки укорачиваются соотвътственно

болье, а нижнія—наобороть.

Рис. 98. Какъ слъдуеть обръзать крону груши "Безсвиянка".

Ръзка производится всегда надъ наружнымъ, но ни въ какомъ случав не надъ внутреннимъ глазкомъ. Если двъ какія-либо сосъднія вътки нарушають симметричность кроны тъмъ, что отстоять другь отъ друга слишкомъ далеко, то ръзка какой-либо другой изъ нихъ можетъ быть произведена и надъ боковымъ глазкомъ, чтобы впоследствии эти ветки оказались между собою болье сближенными. Рис. 96 представляеть двухлътку

(съ хорошими, вполнъ развитыми корнями) Апорта; нижнія черточки (въ кронъ деревца) показываютъ примърно тъ пункты, при которыхъ должна быть произ-Рис. 99. Кри- ведена ръзка боковое и корявое выхъ вътокъ и деревцо, отъ срединной главной котораго ни- вътки для образоне будетъ. ванія второго этажа кроны. Такимъ же

точно образомъ нижнія черточки на следующихъ рис. 97 и 98 показывають, какъ надо ръзать однольтнюю крону (нижній этажь) оставшихся въ питомникъ еще на годъ этихъ двухъ сортовъ грушъ. Изъ этихъ же двухъ рисунковъ можно видъть разницу въ ростъ кронъ. Въ то время, какъ груша Безсъмянка (рис. 98) образуетъ совершенно правильныя вытянуто пирамидальныя кроны, груша Маликовка (рис. 97) образуетъ неправильныя раскидистыя кроны.

Заканчивая рачь о воспитаніи деревьевъ въ питомникъ, мы еще разъ скажемъ, что успъха въ плодовомъ саду можно ожидать только отъ



Рис. 100. То же сидъвшее въ саду въ теченіе 7 лвтъ.


правильно выращенныхъ и сильныхъ деревьевъ съ хорошими корнями; отъ корявыхъ же деревьевъ, выращенныхъ на плохихъ дичкахъ перестаркахъ, нельзя ожидать пользы. Поясненіемъ тому могутъ быть рисунки 99 и 100. На рис. 99 изображено молодое кривое и корявое, безъ корней, деревцо (яблоня), купленное мною за нъсколько копъекъ на базаръ убзднаго города въ Курской губ. На рис. 100 изображено подобное же деревцо (также яблоня) просидъвшее въ плодовомъ саду 7 лътъ и вынутое изъ почвы для фотографированія съ корнями; будучи смолоду заморышемъ, это деревцо, несмотря на уходъ въ течение 6 лътъ-такъ зачахло, что для исправленія ошибки оставалось лишь одно выбросить его вонъ.

Выведеніе пирамиды. Посл'є штамбовой формы, въ которой воспитываются яблони и груши для этихъ же породъ, и для груши особенно, наиболье важною формою является пир мида. Пирамида является особенно подходящею формою для груши, такъ какъ большинство грушъ по природъ своей имъютъ пирамидальную форму.

Въ «Руководствъ къ плодоводству для практиковъ» по Гоше, томъ II, относительно пирамиды для яблонь, между прочимъ, говорится: «Въроятно, мы въ съверной и с; едней Россіи могли бы достигнуть разведеніемъ карликовыхъ пирамидъ такихъ же отличныхъ результатовъ, какіе достигаются этимъ путемъ на западъ, разумъется, только въ домашнихъ, защищенныхъ, а не въ полевыхъ садахъ. Необыкновенная скороспълость, плодородность и ограниченный рость этихъ деревьевъ представляетъ большія удобства на тъсномъ пространствъ. Получить хотя бы небольшой урожай черезъ 2-3 года послѣ посадки, вмѣсто 5-6 лѣтъ, очень привлекательно. Разумъется, мы должны разводить лишь собственные наши выносливые и доброкачественные сорта, каковы, напр., между лътними Ананасное и Хорошавка, между осенними Черное дерево, Боровинка и Шеропай, между зимними Анисъ, Антоновка и Варгулекъ, между наливными Сквознина, Шампанское и Императорское, а между сладкими Аркадъ, Авенаріусъ и Коробовка. Заграничныхъ и даже южныхъ и западныхъ русскихъ сортовъ въ родъ Апорта, Березинскаго, Золотаревскаго на съверъ должно избъгать. Спорный до сихъ поръ вопросъ о вліяніи чувствительныхъ къ морозу карликовыхъ дичковъ на выносливость привитыхъ на нихъ деревьевъ, насколько до сихъ поръ наблюдалось, ръшается въ пользу последнихъ: привитыя на этихъ дичкахъ деревья оказались до сихъ поръ столь же выносливыми, какъ и привитыя на лъсныхъ дичкахъ. Конечно, только дальнъйшими наблюденіями на различныхъ почвахъ и въ различныхъ мъстностяхъ можно окончательно рышить этотъ важный

Здёсь говорится между прочимъ о пригодности пирамиды для яблони въ съверной Россіи. Не говоря уже о съверной Россіи, можно было бы вполнъ удовлетвориться пригодностью пирамиды хотя бы въ средней Россіи. Для южной же Россіи пригодность пирамиды считается внъ сомнънія, и наши передовые пепиньеристы у себя въ питомникъ на ряду со штамбовыми деревьями отпу-

скаютъ также и пирамиды.



Нижнія первыя развътвленія у пирамиды начинаются на разстояніи 8 вершковъ отъ поверхности почвы, при чемъ на однольтнемъ побъгъ отсчитываютъ 6—8 глазковъ. Отсчитавъ и помътивъ эти глазки, для образованія перваго яруса пирамиды, какъ и при выведеніи штамбовой формы, верхній глазокъ, служащій для образованія побъга продолженія, направляемаго вертикально, выбираютъ такимъ образомъ, чтобы этотъ верхній глазокъ находился надъ сръзомъ

верхній глазокъ находился надъ сръзомъ или надъ мѣстомъ удаленія бывшаго шипа. Выше этого глазка оставляють шипъ, уничтожая на побѣгѣ 2 — 3 слѣдующихъ глазка, чтобы они не развивались. Такимъ образомъ поступають въ данномъ случаѣ точно такъ же, какъ это имѣло мѣсто и при выведеніи штамбовой формы.

Рис. 101. a — мъсто об-

ръзки боковыхъ вътвей;

b—глазки для образова-

нія ростоваго побъга;

с — шипъ, подлежащій

удаленію; д-верхушеч-

ный побъгъ, укорочен-

ный въе для образованія второго яруса сучьевъ;

f—глазокъ для верху-

шечнаго побъга; q - мъсто

закладки перваго побъга

для новаго яруса.

Преслъдуя возможно большую равномърность въ развитіи изъ намъченныхъ глазковъ побъговъ надъ тремя нижними глазками, дълаются полулунные надръзы. По мъръ того, какъ вышедшіз изъ оставленныхъ глазковъ побъги станутъ развиваться, въ срединъ мая или нъсколько позднъе, смотря по мъстности, слишкомъ сильно растущіе боковые побъги, чтобы выровнять ихъ, сверху прищипываются. Неръдко на развивающихся изъ глазковъ побъ

гахъ, особенно же вслъдствіе ихъ прищинки, начнутъ развиваться вторичные побъги. Тогда съ ними поступають слъдующимъ образомъ: наиболъе сильные сръзаются совершенно, т. е. при ихъ основаніи, болье же слабые побъги укорачиваются до двухъ глазковъ. Далее, такъ какъ боковыя развътвленія пирамиды должны быть симметрично расположенными вокругъ ствола и имъть соотвътственно съ этимъ уклонъ около 45°, то всемъ отклоняющимся отъ правильнаго пути побъгамъ даютъ должное направление. Съ этою цёлью боковые побъги, приближающіеся черезчуръ къ центру дерева, т. е. къ главному вертикальному побъту, отводятся отъ последняго помощью распорокъ, а побъги слишкомъ отклоняющиеся въ противоположномъ направлении, т. е. наружу, приближаются мочальной лентой къ срединному вертикальному (главному) побъту. Послъдній въ этомъ случав, чтобы не гнулся, привязывается къ укръпленному въ землъ колышку.

Тѣ изъ боковыхъ развивающихся побѣговъ, которые, несмотря на прищипку, продолжаютъ расти слишкомъ сильно, прищипываются вторично; они укорачиваются въ соотвѣтствіи съ силой роста




Рис. 102. Предыдущее дерево послъ обръзки: a—верхушечныя почки; b—конецъ шипа, c—мѣ-сто начала слъдующаго ярус: d—верхушечная почк ствола; e—шипъ.

другихъ побъговъ. Осенью, послъ листопада или весною слъдующаго года до развитія почекъ, выводимая правильно такимъ обравомъ пирамида будетъ имъть видъ, какъ представлено на рис. 101. На этомъ рисункъ буквами аа показаны тъ пункты, въ которыхъ ръжутся образовавшіяся развътвленія перваго яруса пирамиды. Буквами bb отмъчены тъ наружные глазки, откуда должны выходить верхніе побъги продолженія этихъ боковыхъ развътвленій. Такимъ образомъ части аb назначаются для шиповъ, и въ этомъ мъстъ слъдовательно уничтожаются всъ глазки. Буква с обозна-

чаетъ оставленный весною прошлаго года шипъ, который весною непремѣнно срѣзается при основаніи, но по настоящему этотъ шипъ с должно было за ненадобностью удалить еще лѣтомъ въ іюлѣ прошлаго года. Буква с обозначаетъ пунктъ, въ которомъ срѣзается на шипъ этотъ главный вертикальный побѣгъ, а буква с обозначаетъ пунктъ, въ которомъ срѣзается на шипъ этотъ главный вертикальный побѣгъ, а буква с обозначаетъ верхушечный глазокъ, предназначаемый для развитія вертикальнаго главнаго нобѣга, т. е. побѣга продолженія. Послѣ обрѣзки, это деревцо съ первымъ ярусомъ образуемой пирамиды будетъ имѣть видъ, какъ это изображено на рис. 102, гдѣ аб будутъ шипы боковыхъ вѣтокъ, с шипъ главнаго вертикальнаго побѣга и с—та часть вертикальнаго побѣга, изъ которой будутъ выводиться развѣтвленія второго яруса кроны, и которая на рисункъ 101 обозначена буквой с

Такимъ образомъ, теперь у насъ на очереди выведение второго яруса кроны изъ оставленной части главнаго вертикальнаго побъга, которой дается длина вершковъ въ 8, и на которой онять намьчають глазковь 6—8 для образованія пяти боковыхь побьговъ и шестого главнаго, т. е. побъга продолженія Выведеніе этого второго яруса кроны дълается точно такъ же, какъ и перваго, съ оставленіемъ шиповъ и нанесеніемъ надъ тремя нижними глазками полудунныхъ надръзовъ. Верхній глазокъ въ предупрежденіе искривленія ствола выводимой пирамиды выбирается опять такимъ образомъ, чтобы онъ приходился надъ сръзомъ верхняго (второго) шипа. Но глазки, изъ которыхъ имфютъ выйти боковые побфги этого второго яруса, выбираются такимъ образомъ (точно такъ же. какъ это мы видели и при выведении втораго яруса кроны штамбоваго дерева), чтобы каждый побъть или каждое развътвление этого втораго яруса приходилось въ прочежуткъ между двумя развътвленіями нижняго яруса, занимая такимъ образомъ срединное между ними положеніе.

Третій и послѣдующіе этажи выводятся точно такимъ же образомъ, какъ и первые два яруса съ непремѣнымъ опять таки условіемъ (помимо нанесенія полудунныхъ надрѣзовъ, образованія шиповъ и т. д.), чтобы каждый боковой побѣгъ занималъ срединное положеніе по отношенію къ нижнимъ двумъ развѣтвленіямъ. При этомъ условіи у идеально выводимой пирамиды каждое очередное развѣтвленіе нижняго перваго яруса по отвѣсной линіи какъ разъ будетъ находиться подъ соотвѣтствующимъ ему очереднымъ развѣтвленіемъ третьяго яруса.

Если рость выводимой пирамиды происходить правильно, т. е. если его развивается достаточно сильно и болье или менье развиваются собым его вытки или однолытне побым подрызаются слыдующимь образомь. Нижнія вытки или пражній однолытий побыть уже выведеннаго яруса должны имыть

въ длину вершковъ 8 (по возможности не менње) или чуть чуть больше, а остальные вышележащие отнолътніе побъги ръжутся надъ глазками, находящимися приблизительно на одной высотъ съ верхнимъ глазкомъ обръзаннаго нижняго однольтняго побыга выводимаго яруса. Срвзъ у боковыхъ побъговъ дълается всегда на наружный глазокъ. При такой обръзкъ нижнее развътвление яруса или нижній однольтній обръзанный побъть будетъ наиболъе длиннымъ, а самый верхній наиболье короткимъ.

Само собой разумъется, что при выведеніи пирамиды можетъ встрътиться не мало различныхъ частныхъ случаевъ, когда приходится отступать отъ вышеописанной ръзки, и общаго шаблона въ отношении ръзки здъсь быть не можетъ. Такъ если главный, вертикально растущій побъть продолженія разовьется значительно сильнъе въ отношении ниже лежащихъ, боковыхъ побъговъ, то онъ съ пълью уравновъшиванія роста укорачивается болье, а боковые побъги обръзаются лишь слегка или не ръжутся совств. Въ противоположномъ же случав поступаютъ обратно, - главный побыть оставляется подлиннъе, а боковые соотвътственно короче. Вообще же при ръзвъ




Рис. 102a. III естилътияя правильная пирамида.

побъговъ различной силы руководствуются правиломъ: болъе слабые побъти оставляются длиннъе, а болъе сильные - короче.

Отстающую въ ростъ боковую вътвь въ ярусъ пирамиды усиливають темь, что надъ нею делають более или менее сильный, не полулунный, а такъ называемый крышеобразный надръзъ, и кромъ того съ тою же цълью усиленія такую ослабъвшую вътвь подвергають бороздованію.

Относительно размфровъ пирамиды Гоше говоритъ: пирамиду ръдко приходится выращивать выше 81/, арш. и за предъльную вышину можно принять 8 арш. По крайней мъръ, привитыя на айвъ груши очень удобно заканчивать на этой высотъ. Ширина пирамидъ, опредъляясь отведеннымъ для нихъ пространствомъ, равняется обыкновенно 11, саженямъ, при чемъ вполнъ допустимы

колебанія въ ту или другую сторону.

Пирамида является больше всего пригодною формою для груши, за исключениемъ развъ тъхъ сортовъ, которые отъ природы имъють мало свойственный грушамъ растопыренный не пирамидальный рость. Что же касается яблони, то для пирамидъ пригодны лишь немногіе ея сорта съ пирамидальнымъ естественнымъ ростомъ. Въ пирамидахъ иногда выращиваются черешни, древовидныя вишни и даже сливы, но выведение этихъ деревьевъ въ формъ пирамиды представляеть собою лишь любительское занятіе. Вообще, когда говорять о пирамидальной формъ, приходится разумъть грушу.

Кустовая форма и выведение куста. Кустовая форма или кусть извъстенъ въ плодоводствъ давно, и отечествомъ этой формы, по моему мевнію, надо считать Англію, такъ какъ въ англійской садовой литератур'в давно уже говорилось о кустовой формъ для плодовыхъ деревьевъ. Но на континентъ въ Западной Европы на кустовую форму особенное внимание было обращено со времени выхода въ свътъ книги Беттнера «Кустовое плодоводство», при чемъ кустовая форма, особенно пропагандированная Беттнеромъ въ настоящее время по крайней мъръ въ Западной Европъ.

имъетъ явную тенденцію къ расширенію.

У насъ къ кустовой формъ въ плодоводствъ одни отнеслись съ полною симпатією, другіе съ недовъріемъ. Такимъ образомъ, по отношенію къ кустовой формъ въ плодоводствъ образовалось два лагеря, при чемъ въ обоихъ лагеряхъ, какъ это всегда въ этихъ случаяхъ бываетъ, многіе не были объективны въ своихъ сужденіяхъ, такъ что одни стремились выставить возможно болже вынукло недостатки кустовой формы, другіе поступали наоборотъ. Правда, какъ и всегда, лежитъ посрединъ. Кустовая форма имъеть свои недостатки, но безусловно имъеть и свои достоинства, при чемъ какъ недостатки, такъ и достоинства куста совершенно одинаковы съ пирамидой. Однако, отрицать значение пирамиды въ Россіи, кажется, не приходило никому въ голову, и потому лично

меня удивляеть то отрицательное отношение къ кустовой формъ, которое встрътила эта форма со стороны нъкоторыхъ авторовъ, высказывавшихся о кустовой формъ въ спеціальной печати въ смыслъ ея непригодности вообще, а для Россіи въ частности. Между тъмъ, обладая недостатками пирамиды, кустъ имъетъ передъ нею безусловныя преимущества. Последнія состоять въ томъ, что кустъ гораздо легче вырастить, чъмъ пирамиду. Для выведенія безусловно правильной пирамиды нужны опытность и знанія, а для выведенія куста ихъ въ такой степени далеко не нужно. Недаромъ Р. И. Шредеръ, относительно книги Беттнера «Кустовое плодоводство» сказаль: «Это одинь изъ самыхъ разумныхъ и практически примънимыхъ въ настоящее время трудовъ на поприщъ плодоводства, пригодныхъ какъ разъ при существующемъ у насъ недостаткъ въ свъдущемъ по древоводству и пло-

доводству персоналъ».

Пишущій эти строки принадлежить безусловно къ сторонникамъ кустовой формы, потому что отридать кусть, значить отрицать и пирамиду, передъ которой кусть, между прочимъ, имфеть то преимущество, что въ то время, какъ пирамида пригодна почти исключительно для грушъ, кустъ пригоденъ и для яблони. Продолжая річь въ защиту куста, мы должны сказать, что въ дійствительной жизни, т. е. въ садахъ, засаженныхъ пирамидами, мы ръдко встръчаемъ не только безупречно выведенныя, но далеко не часто встръчаемъ и просто выведенныя мало - мальски правильно пирамиды. Сплошь и рядомъ мы имфемъ дело съ пирамидами, выведенными безъ особой претензіи на правильность формировки, почему встръчаемыя въ садахъ пирамиды очень часто и смахивають на кусть, при выведеніи котораго, какъ это мы увидимъ ниже, не приходится раздумывать объ этажахъ, о ихъ симметріи И Т. Д.

По нашему мнѣнію, не будеть большой ошибки, если мы признаемъ кустъ за упрощенную пирамиду, которая по своимъ размфрамъ, кстати сказать, и подходитъ къ кустовой формъ. Во всякомъ случав мы склонны думать, что въ будущемъ, съ развитіемъ у насъ плодоводства, кустъ получитъ у насъ большее распространеніе, чъмъ пирамида.

Не только у насъ, но и въ Западной Европъ, кажется, не выяснено, какая разница въ плодахъ отъ пирамиды и отъ куста. Разницы здъсь или вовсе не можетъ быть, или, если и можетъ, то эта разница такъ ничтожна, что не изъ чего и хлопотать, выводя пирамиды по всемъ правиламъ искусства. Противоположныя мевнія могуть высказываться пока лишь предположительно, но, логически разсуждая, предполагаемъ, что этой разницы нътъ, или она незначительна, и потому мы становимся въ данномъ случаъ на сторону куста.

Кустовая форма имъетъ главное значеніе для яблонь и грушъ и безусловно имъетъ помимо достоинствъ и недостатки, которые у этой формы съ пирамидой общіе, что мы особенно здъсь и подчеркиваемъ. Этимъ мы хотимъ сказать, что отрицающій кустъ, отрицаетъ и пирамиду.

Обращаясь теперь къ недостаткамъ кустовой формы, мы будемъ исходить изъ сравненія куста съ обыкновенной штамбовой формой, какъ это обыкновенно принято. Недостатки же эти слъдующіє:

- 1) Большая чувствительность къ холоду кустовыхъ подвоевъ.
- 2) Большая опасность для кустовъ отъ поврежденія зайцами и снъговала зимою.
- 3) Необходимость болье тщательней обработки почвы.




Рис. 103-105. Последовательное развитие кустовой яблони.

- 4) Необходимость наличія лучшей почвы и поливки въ сухіе годы.
 - Достоинствами куста, какъ и пирамиды, являются слъдующія:
- 1) Болъе раннее и обильное плодоношение.
- 2) Лучшее качество плодовъ въ сравнении съ плодами, получаемыми на штамбахъ.
- 3) Уменьшеніе сбиванія плодовъ вътромъ.
- 4) Болже облегченный сборъ плодовъ съ дерева.
- 5) Облегченное производство всякихъ работъ и манипуляцій надъ деревомъ по опрыскиванію, обръзкъ и пр.
- Пригодность кустовой формы не только для груши, но и для яблони.

Для подвоевъ, при выведеніи кустовой формы, у яблони предлагается преимущественно дусенъ, т. е. тотъ полвой, который употребляется у яблонь и для пирамиды. Псэтому-то вполнъ развивижяся кустовая яблоня на дусенъ, по своему объему, будетъ не меньше пирамиды. Такимъ образомъ, дусенъ будетъ полукарликовымъ подвоемъ, а привитой на немъ кустъ—полукарликовою формою. Но кустовая форма можеть быть и карликовою, если будеть выволиться на карликовомъ подвой (требующемъ орошенія и хорошей питательной почвы)—на порадизки или настоящей райской яблони.

Имѣя въ виду чувствительность къ сильнымъ морозамъ дусена, для болѣе сѣверныхъ мѣстностей предлагаютъ дусенъ при выведеніи кустовой формы замѣнить, будто бы равной по силѣ роста

дусену, настоящей ягодной сибирской яблонью—Ругиз baccata genціпа. Эта предполагаемая качественная эквивалентность требуетъ еще большаго и многосторонняго опыта. Ручаться за то, что сибирка на съверъ можетъ совершенно замънить дусенъ, по нашему мнънію, еще нъсколько преждевременно.

Что же касается груши, то подвоемъ для кустовой формы будетъ айва. Изъ косточковыхъ породъ персикъ самъ собою превращается въ кустъ, почему, говоря о кустовой формъ, этой породы мы и не имъли въ виду.

Выведеніе куста начинается болье или менье короткой подрызкой посаженной на мысто однолытки или двухлытки, при чемы самое нижнее развытиленіе, какы и у пирамиды, начинается на разстояніи не болье полуаршина оты поверхности почвы. Ныко-



Рис. 106. Четырехлътняя кустовая яблоня.

торые, однако, совътуютъ вызывать нижнія развътвленія еще ниже соотвътственно короткой обръзкой, Между прочимъ, нъкоторые заграничные авторитеты совътуютъ, для образованія кустовой формы лучше брать двухльтки, съ чъмъ едва ли всегда можно согласиться. Намъ кажется цълесообразнъе брать для этой цъли однольтки (имъя въ виду здъсь главнымъ образомъ яблони), нъсколько укорачивая ихъ при посадкъ и затъмъ давая окончательную обръзку весною слъдующаго года, для вызова достаточно сильныхъ развътвленій. Оставленіе шипа для вертикальнаго направленія побъга продолженія здъсь необязательно. Затъмъ подръзкой вызывается столько развътвленій, сколько это окажется нужнымъ, причемъ вызываемыя развътвленія не должны быть слишкомъ густы. Въ послъдующіе же годы поді тяка ограничивается удаленіемъ лишь слишкомъ густо сидящихъ развътвленій,

перекрещивающихся между собою или направляющихся внутрыкроны. Въ общемъ, такимъ образомъ подръзка ограничивается самымъ необходимымъ, и кустъ въ этомъ отношении предоставляется самъ себъ.

Последовательное развитие кустовой яблони изображено на следующихъ рисункахъ. На рис. 103 изображено молодое въ кусто-




Рис. 107. Пятилътняя кустовая яблоня.

вой форм'я деревцо яблони, подр'язанное весною, такимъ, какимъ оно выглядитъ посл'я листопада осенью въ годъ первой обр'язки или до развитія листьевъ весною сл'ядующаго года. Четыре дальнъйшихъ рисунка 104, 105, 106 и 107 представляютъ собою посл'ядовательное развитіе кустовой яблони, изображенной на рис. 103, въ теченіе четырехъ л'ятъ.

Кустовая культура, особенно на райской яблонъ, требуетъ или сплощной глубокой предварительной обработки почвы, или рай-

ольнаго паханія съ почвоуглубителемъ, или перевала. Что же касается разстоянія, на которое сажаются деревца въ кустовой формѣ, то это прежде всего будетъ зависѣть отъ силы роста подвоя, а затъмъ отъ той или другой породы, климатической широты мѣстности и, наконецъ, иногда отъ сорта.



Рис. 108. Связка деревьевъ въ пучки.

Для южной Россіи (Раевскій. Изданіе седьмое, стр. 227) разстояніе указано для яблони на дусень (а слаборослымъ сортамъ и на дичкь) 8 арш. между отдъльными экземплярами кустовой формы, а на парадизкь 6—7 арш. и 6 арш. для груши на айвь. Р. И. Шредерь, различая дусень нъмецкій и французскій, назначаеть для яблони въ кустовой формь 4 арш., а на парадизкь 3 арш.



Рис. 109. Соломенная перевязка и подкладка мху.

Выконка деревьевь изъ питомника и ихъ упаковка. Выкопку производять следующимъ образомъ. По объимъ сторонамъ дерева становятся двое рабочихъ и на разстояніи полуаршина отъ дерева (по направленію рядовъ) копаютъ канавки приблизительно въ аршинъ длиною или нъсколько короче и глубиною вершковъ въ 10, при чемъ лопатами стараются подръзать идущіе слишкомъ глубоко въ землю корни; последніе вмъсть съ окружа-

ющею ихъ землею сваливаются въ одну изъ вырытыхъ канавокъ, послъ чего корни освобождаются осторожнымъ подниманіемъ дерева за штамбъ. Если подкопанное дерево не вынимается, то дъль до-




Рис. 110. Укладка тюковъ на постельку.

стигается дальчайшимъ углубленіемъ канавокъ и подразываніемъ допатой корней.

Для упаковки выкопанныя деревья связываются въ пучки, по пяти штукъ въ каждомъ (рис. 108). Связываются они обыкновенно ивовыми прутьями, при чемъ связка происходитъ въ двухъ мѣстахъ—при корневой шейкъ и на кронахъ. Въ предупрежденіе поломки кронъ въ тюкъ, вѣтки ихъ между собою перекладываются мятой соломой или сѣномъ. Далѣе берутся небольшіе пучки прямой соломы (старновки) и связываются колосьями вмѣстѣ для



Рис. 111. Первая обвязка тюка.

полученія соломенныхъ перевязей, которыя и раскладываются на одинаковомъ разстояніи другъ отъ друга. На середину разложенныхъ соломенныхъ перевязей кладется слой мятой соломы, т. е. приготовляется такъ называемая «ностелька». На одинъ изъ концовъ этой постельки, гдъ будутъ лежать корни кладется слой мху (рис. 109), послъчего на приготовленную «постельку» кладутся въ пучкахъ деревья, само собой разумъется,

корнями въ одну сторону. Послъ этого корни сверху обкладываются мхомъ, а пустоты внутри ихъ заполняются мятой соломой или съномъ (рисунокъ 110), корни же и кроны смачиваются изъ лейки водой. Затъмъ, поднимая и стягивая съ одной и другой стороны концы соломенныхъ перевязей, дълается первая обвязка тюка, при чемъ концы перевязей, стягиваясь, закладываются одинъ за другой

(рис. 111). Подготовленный такимъ образомъ къ окончательной упаковкъ тюкъ при налобности еще разъ спрыскивается изъ лейки водой. Для окончательной упаковки берется уже не мятая, а прямая




Рис. 112. Стягиваніе тюка жгутами.

солома (старновка), а для стягиванія тюка употребляются не соломенныя перевязи, а жгуты изъ крѣпкихъ ивовыхъ прутьевъ, которые для этого связываются узлами вмѣстѣ на тонкихъ жонцахъ и раскладываются, подобно соломеннымъ перевязямъ, парал-



Рис. 113. Тюкъ, стянутый жгутами, но еще незадъланный.

лельно другъ другу, но на белъе близкомъ разстоянии (вершковъ на 5—6). На разложенные ивовые жгуты кладется не толстымъ слоемъ старновка такъ, чтобы концы однихъ ея пучковъ входили въ концы другихъ, послъ чего на старновку накатываются обвя-




Рис. 114. Задъланный тюкъ.

занныя уже мятой соломой полузапакованныя деревья такимъ образомъ, чтобы оставить на одномъ концѣ солому свободною, такъ какъ эта часть, подъ которую не подкладываются жгуты, назначается для приготовленія такъ называемаго «хвоста» тюка. Далѣе начинается стягиваніе тюка ивовыми жгутами; стягиваніе ведется возможно туго; концы жгутовъ между собою скрѣпляются скручиваніемъ, послѣ чего продѣваются чрезъ положенные кольцами жгуты (рис. 112). Рисунокъ 113 представляетъ закрѣпленный ивовыми жгутами, но не окончательно готовый тюкъ.

Для окончательной задёлки тюка, сверху рукою выбирають




Рис. 115. Закрѣпленіе тюка ивовымъ прутомъ.

на широкомъ концѣ его три пряди соломы и начинаютъ вить ихъ косою, сохраняя среднюю прядь и постепенно захватывая новыя пряди съ боковъ. Когда всѣ свободные концы соломы постепенно будутъ увиты, то внизу образуется свитый косою же соломенный «хвость», къ концу котораго прочно привязывается ивовый

прутъ (рис. 114), послъ чего хвостъ поднимается кверху, а придъланный къ хвосту ивовый прутъ продъвается черезъ два или три первыхъ кольца жгутовъ (рис. 115), на одномъ изъ которыхъ онъ и закръпляется. Рисунокъ 116 представляетъ совершенно готовый тюкъ. Въ одинъ тюкъ обыкновенно упаковываются приблизительно 50 деревьевъ. При большихъ тюкахъ приходится дълать

двъ или даже три косы; къ каждой изъ нихъ привязывается ивовый прутъ, и они закръпляются точно такъ же, какъ это было показано на рис. 107—108, накладываясь другъ на друга, если плетутся двъ косы, или перекрещиваясь между собою, если плетутся три косы. Приведенные здъсь рисунки упаковки были сдъланы по фотографическимъ снимкамъ,




Рис. 116. Окончательно задъланный и закръпленный тюкъ.

приготовленнымъ авторомъ въ садахъ и питомникахъ И. Н. Гангардтъ, упаковка деревьевъ которыхъ на Международной выставкъ плодоводства въ Петроградъ въ 1894 г. была признана экспертами образдовой.

IV. Плодовый садъ.

Выборъ мѣста подъ плодовый садъ и устройство защиты. При выборѣ мѣста подъ плодовый садъ, помимо защиты, о которой мы будемъ говорить подробнѣе, необходимо прежде всего сообразоваться съ качествомъ почвы и подпочвы близостью къ почвенной поверхности грунтовой воды, съ рельефомъ и уклономъ

мъстности и, кромъ того, съ условіями экономическаго характера, въ родъ близости желъзнодорожной станціи, рынковъ и прочіе. Вопрось о подпочвъ можетъ быть иногда еще важнъе вопроса о почвъ. Послъдняя тъмъ или другимъ путемъ можетъ быть улучшена и дзивнена, но водонепроницаемая, состоящая, напр., изъ твердой глины подпочва можеть служить непреодолимымъ препятствіемъ къ заложенію на такомъ участкъ плодоваго сада точно такъ же, какъ и чрезмърная близость къ почвенной поверхности грунтовой воды. Впрочемъ, вліяніе близости въ почвенной поверхности грунтовой воды на здоровье и долговъчность плодовыхъ деревьевъ находится въ извъстной зависимости отъ климата. Другими словами, въ южной Россіи плодовыя деревья допускаютъ большую близость грунтовыхъ водъ къ почвенной поверхности, чъмъ въ съверной и средней Россіи. Однако, сырыя мъста въ южной Россіи ръдки, и ихъ при закладкъ плодовыхъ садовъ приходится избъгать особенню тамъ, гдъ они болъе обыкновенны, а именно въ средней и съверной Россіи. Здъсь, если грунтовая вода находится весною ближе, чёмъ на 3 аршина къ поверхности почвы, мъсто не годится уже для закладки плодоваго сада. Обыкновенно на такомъ, слишкомъ влажномъ, съблизкою къ почвенной поверхности грунтовой водою, мёстё деревья въ первые годы растуть хорошо, а потомъ начинаютъ пропадать, что сопровождается усыханіемъ сучьевъ и кроны; такое усыханіе начинается обыкновенно съ центральныхъ частей кроны, что имфетъ мфсто, какъ только корни дерева дойдутъ до грунтовой воды. Нъчто подобное наблюдается и при неподходящей, напр., известковой подпочвъ.

Конечно, излишняя подпочвенная вода можетъ быть отведена путемъ дренажа, но вообще безусловно надо избъгать для плодоваго сада влажныхъ мъстъ, допустимыхъ и подчасъ даже полезныхъ гдъ-нибудь на югъ. Не менъе важенъ при выборъ мъста для закладки плодоваго сада и рельефъ мъстностей, разумъя особенно здёсь котловины. Обширныя, съ широкой площадью, котловины, подобно прирачнымъ долинамъ, какъ имающія природную защиту мъста, представляются даже особенно благопріятными для засадки ихъ плодовыми деревьями. Совершенно другое дёло котловинынебольшія, у которыхъ ихъ глубина, вследствіе менже обширнаго ихъ пространства, выдъляется особенно ръзко. Въ такихъ узкихъ котловинахъ зимою скопляются массы снёга, которымъ заносятся кроны плодовыхъ деревневъ, что можетъ повести къ сильнымъ поврежденіямъ послёднихъ. Кромъ того въ узкихъ котловинахъ и балкахъ въ большей степени представляется опасность отъ весеннихъ утренниковъ во время цвътенія деревьевъ. Это послъднее обстоятельство надо всегда имъть въ виду при выборъ подъ садъ мъста.

Относительно склоновъ можно сказать, что чъмъ круче склонъ, тъмъ менъе онъ пригоденъ для засадки плодовыхъ древьевъ. Но

помимо этого большую роль играетъ положение склона относительно странъ свъта. Не только въ южной Россіи, но и во многихъ мъстностяхъ средней Россіи покатые склоны, обращенные къ югу, какъ слишкомъ подверженные солнденску и выгоранію, совершенно непригодны для засадки плодовыми деревьями. Ао слабо покатые склоны могутъ быть употреблены подъ посадку/плодовыхъ деревьевъ. Если, однако, эти склоны обращены на югъ или на юго-востокъ, то здёсь необходимо имёть въ виду въ конпъ зимы и весною энергичное дъйствіе солнца на штамбы деревьевъ, которые именно въ это время года особенно страдають/отъ солнечнаго нагръва, что выражается затъмъ въ общензвъстныхъ ожогахъ. Чтобы предупредить последніе, стволы деревлевь следуеть обвязывать хвойными вътками, камышемъ и т. д., что одновременно защищаетъ деревья и отъ зайцевъ. По той же причинъ для защиты стволовъ отъ солнечнаго пригрѣва, на такихъ участкахъ рекомендують разводить низкоштамбовыя леревья, у которыхъ не только штамбъ, по возможности, защищался бы отъ солнца кроной, но и самые штамбы были бы, по возможности, короче, во избъжание появленія на нихъ ожоговъ и морозобоинъ.

Что касается вопроса о защить, то съ нимъ можно не считаться только развъ лишь въ мъстностяхъ съ исключительно благопріятнымъ климатомъ, какихъ въ Россіи найдется немного. Въ нодавляющемъ же большинствъ мъстностей Россіи, госполствующіе вътры заставляють серьезно призадуматься объ искусственной защить для сада, если только не имъется естественой зашиты, въ видъ горъ, холмовъ, рощъ или строеній. Защита для сада намъ необходима противъ вътровъ, на съверъ особенно противъ очень холодныхъ зимнихъ, а на югь, кромъ того, еще и противъ лътнихъ, всеизсущающихъ вътровъ и сильныхъ, сбивающихъ съ деревьевъ плоды и уничтожающихъ такимъ образомъ урожаи, бурь. Въ свверной и средней Россіи и вообще тамъ, гдв хорошо растутъ хвойныя деревья, лучше всего опушку делать изъ этихъ породъ, а именно изъ елей или пихтъ, такъ какъ эти деревья, въ наибольшей степени даютъ преграду вътру. Въ центрально-черноземныхъ губерніяхъ между прочимъ рекомендовалась накоторыми плодоволами для защиты илодовыхъ садовъ туйя (Thuia occidentalis). Древесную защиту или опушку для плодоваго сада лучше всего закладывать не послѣ засадки сада, а одновременно съ засадкою его, а еще будеть лучше, если явится возможность, такую опушку или древесную защиту устроить ранъе засадки плодоваго сада.

На нашемъ степномъ югѣ надобность въ защитѣ или древесной опушкѣ плодового сада скорѣе даже большая, чѣмъ въ средней и сѣверной Россіи, а потому мы здѣсь остановимся особенно на устройствѣ защитныхъ опушекъ въ засушливыхъ мѣстностяхъ юга Россіи. Устройство этихъ защитныхъ опушекъ въ южной половинѣ

Россіи можетъ дать руководящія указанія (напр., относительно разстоянія между саженцами при посадкі и проч.) при устройстві подобных насажденій и въ другихъ містностяхъ Имперіи. Но, конечно, въ этихъ защитныхъ насажденіяхъ прежде всего изміненіе будетъ касаться древесныхъ породъ, выборъ коихъ долженъ стоять въ зависимости отъ климатическихъ условій и містности.

Главными породами, которыя въ южномъ районъ могутъ служить намъ для зашитныхъ насажденій будуть диственныя деревья. изъ которыхъ прежде всего надо упомянуть вязъ (Ulmus effusa)прекрасное довольно большое дерево съ темной когой, и очень похожие на него: бересть (Ulmus campestris) и карагачь (Ulmus campestris suberosa). Берестъ можетъ быть особенно рекомендованъ лля южной половины Россіи, такъ какъ онъ представляетъ собой незамънимую древесную породу, въ высокой степени выносливую въ степномъ климатъ. Для болъе съверныхъ мъстностей карагачъ и берестъ могуть быть замънены, на ряду съ вязомъ, - ильмомъ (Ulmus montana), дающимъ прекрасныя огромныя деревья съ корою стропепельнаго цвта. Вст ильмовыя породы, называемыя такъ по ихъ принадлежности къ семейству ильмовыхъ (Ulmaceae), кромъ ихъ большого значенія въ качествъ защитныхъ деревьевъ, принадлежатъ къ весьма піннымъ по ихъ высокаго качества древесинъ, идущей на разныя цънныя подълки. Онъ отлично растуть на нашемъ черноземъ, распуская однако къ сожальнію) широко въ сторону свои корни, чего нельзя не принимать во вниманіе, имін въ виду состдство съ ними плодовыхъ деревьевъ. За этими породами илуть: обыкновенный или остролистный кленъ (Acer platanoides) и ясени — обыкновенный (Fraxinus excelsior) и бълый американскій (Fraxinus americana) родомъ изъ Канады. Обыкновенный, или остролистный, кленъ представляетъ собою прекрасное средней и больше средней величивы дерево. Обыкновенный нашъ ясень образуетъ большія прекрасныя дегевья, характеризующіяся почками чернаго цвъта, американскій же ясень ваеть деревья меньшей величины и характеризуется почками сфраго цвъта, тотъ и другой ясени даютъ отличную древесину для доротихъ подълокъ. Кромъ обыкновеннаго клена, на защитныя насажденія идуть: полевой клень (Acer campestre), образующій небольшія красивыя деревья, и черный или татарскій кленъ (Асег tataricum) съ его тиничными краснокрылыми съменами, образующій небольшія или даже маленькія деревья. Къ весьма цаннымъ породамъ, отлично растущимъ на нашемъ черноземъ, надо отнести дикія груши, превращающіяся съ возрастомъ въ стройныя, высокія и красивыя деревья и весьма любимыя южными лъсоводами за выносливость къ засухъ. Для болъе южныхъ мъстностей среди д евесныхъ защитныхъ породъ весьма важное мъсто занимаеть былая акадія, которая вы южной половины Курской г. является не только вполнъ выносливымъ, но даже и обременительнымъ деревомъ по способности ен засорять почву отъ самосъва и отпрынками отъ выкорчевываемыхъ экземпляровъ. Громадное достоинство бълой акаціи заключается въ чрезвычайно быстромъ ростъ. При развиденіи бълой акаціи, образующей прелестныя, субтропическаго облика, деревья съ прекрасными душистыми бълыми цвътами, слъдуетъ отдавать предпочтеніе мъстнымъ съменамъ.

Затъмъ для опущекъ, на ряду съ татар кимъ и полевымъ кленомъ, какъ съ невысоко поднимающимися деревьями надо особенно отмътить двъ, весьма цънныя, изгородевыя породы—желтую акацію (Caragana arborescens) и лохъ или дикую маслину (Elaeagnus angustifolia). Къ невысокимъ породамъ, приближающимся по характеру роста къ кустарникамъ, употребляемымъ на опушку, долженъ быть отнесенъ боярышникъ или глодъ (rataegus охуасапта). Наконецъ, нъкоторыми садоводами для защиты резомендуется вышеупомянутая туя (Thuia оссіdentalis),—превосходная хвойная въчно зеленая порода, на югъ при благопріятныхъ условіяхъ вырастающая въ довольно рослыя деревца, ростъ которыхъ уменьшается по мъръ приближенія къ съверу, гдъ она, однако, совершенно вынослива и ежегодно даетъ съмена.

Въ своихъ защитныхъ насажденіяхъ Н. К. Срединскій основною породою беретъ вязъ, съ которымъ ч редуетъ другія породы, при чемъ саженцы сажаются следующимъ образомъ: вязъ, остролистный кленъ, вязъ, ясень, вязъ, берестъ, вязъ, дубъ, вязъ, ильмъ, вязъ, остролистный кленъ и т. д Для цёли защиты сада можно или производить посадку, слёдуя порядку въ чередованіи породъ, или просто засаживать внутренніе ряды защитнаго насажденія высоко поднимающимися породами, а края занимать породами кустарнаго роста, которыя будуть образовывать собою опушку. Н. К. Срединскимъ приняты семирядныя насажденія, но чемъ больше число рядовъ будетъ имъть защитное насаждение, т. е. чъмъ оно шире, тъмъ это будетъ лучше для защищ емаго сада, если, конечно, нътъ необходимости экономить мъстомъ. Для успъщнаго роста насажденій въ открытой, возвышенной и сухой мѣстности нътъ даже необходимости поливать посаженные съянцы; достаточно очищать ихъ въ теченіе льта отъ сорныхъ травъ, тщательно взрыхляя вокругь нихъ землю. Эта работа производится мотыгами (сапками) и пропашниками или просто сохою. При устройствъ защитныхъ древесныхъ насажденій употребляется спеціальный пропашникъ, называемый «скобелемъ», очень простого устройства. Смотря по лъту, въ смыслъ выпаденія вь теченіе лътняго періода дождей, очистка и пропахиваніе продолжается отъ 3 до 5 разъ. Она должна производиться изъ года въ годъ до тёхь поръ, пока насажденія затёнять почву разросшимися вётвями, что будеть на четвертомъ году жизни насажденія.

Зайсь такъ же, какъ и въ плодовомъ питомникъ, очистка насажденій отъ сорныхъ травъ и взрыхленіе почвы среди рядовъ деревьевъ замѣняетъ собою самую сильную поливку деревьевъ водой. Въ добавленіе къ вышесказанному по тому же поводу можно привести слова профессора Н. С. Шафранова, что количество добытой такимъ образомъ почвою воды очень значительно и превышаетъ въ нѣсколько разъ количество влаги, ниспадающей въ видѣ дождя и снѣга. Если къ этому еще прибавить, что покрытая бурьяномъ почва испаряетъ воды втрое больше почвы очищенной, то становится понятнымъ, какую важную роль играетъ истребленіе бурьяна и разрыхленіе почвы для древонасажденій въ безводной степи съ сухимъ климатомъ.

На разрыхленной почвъ защитныхъ насажденій на глубинъ 2-3 верш. Н. К. Срединскій находиль въ августь посль полуторамъсячныхъ сильныхъ засухъ настолько сырую почву, что изъ нея можно было катать шарики; на такой почвъ деревья отличаются свъжестью, обладая большою жизненною силою; на нихъ незамътно ни поврежденій коры, ни сухихъ вътвей, ни желтыхъ наростовъ лишайника, тогда какъ задернълая почва, на которой посажены деревья въ ямки, замътно задерживаетъ ростъ послъднихъ, ослабляя въ сильной степени ихъ жизненную дъятельность. Такія деревья обыкновенно отличаются корявостью, и почти всв безъ исключенія усажены желтымъ лишайникомъ. Задернълая же почва при засухахъ быстро засыхаетъ и даетъ большія трещины, которыя касаются даже корней дерева. Деревья и кустарники отъ соприкосновенія воздуха съ ихъ корнями чрезъ образовавшіяся трещины быстро усыхають. Неудивительно выслушивать на нашемъ степномъ югъ послъ такихъ явленій укоренившееся въ народъ убъждение, что молодую посадку можно тогда только считать при нявшеюся, когда она благополучно просуществуетъ августъ.

Такъ какъ вопросъ о защитныхъ насажденіяхъ очень важенъ и въ степномъ районѣ заслуживаетъ особаго вниманія, то мы не можемъ не сказать, что неудовлетворительный ростъ деревьевъ въ саду, особенно этого района, несомнѣнно имѣетъ главной причиной отсутствіе солидной защиты. Особенно отсутствіе послѣдней сказывается въ обширныхъ садахъ, гдѣ какъ зимніе, такъ и лѣтніе вѣтры, не имѣющіе на довольно значительномъ пространствѣ никакой преграды, не только сбиваютъ съ деревьевъ зрѣющіе плоды, но и вызываютъ недомоганіе и угнетеніе роста деревьевъ.

Вотъ почему въ обширныхъ садахъ степного района необходимо, кромѣ солидной внѣшней древесной защиты вокругъ сада, производить внутреннія посадки защитныхъ насажденій для образованія въ саду такъ называемыхъ вѣтроломныхъ линій. Такія внутреннія защитныя насажденія или вѣтроломныя линіи могутъ быть на разстояніи 100 саженей одно отъ другого, а если хо-

зяинъ располагаетъ въ достаточной степени мъстомъ, то даже и болъе близкое сосъдство между собою этихъ внутреннихъ защитныхъ насажденій или вътроломныхъ линій скажется только болъе

благотворно на плодовомъ садъ.

Необходимо, однако, въ первые годы заложенія защитнаго насажденія оберегать послѣднее отъ потравы скотомъ, для чего прикодится прибѣгать къ устройству изгородей изъ кольевъ; если же средства не позволятъ устроить изгородь, то тогда вдоль опушки или защитнаго насажденія приходится вырыть канаву около 2 аршинъ глубины и ширины; каждая погонная сажень такой канавы будетъ стоить около 15 копѣекъ. Но канава имѣетъ тотъ весьма существенный недостатокъ, что края ея обваливаются, отчего глубина канавы уменьшается, а послѣдняя теряетъ въ своемъ значеніи, требуя болѣе или менѣе частаго возобновленія, вслѣдствіе чего даже несолидная легкая изгородь имѣетъ больше преимуществъ передъ канавой.

Столь важныя для плодового сада древесныя опушки вовсе не такъ дороги и вполнъ доступны каждому садоводу. Для того, чтобы показать стоимость устройства древесныхъ опушекъ для сада, мы пользуемся цифровыми данными, любезно сообщенными намъ почтеннымъ корочанскимъ садовладъльцемъ М. С. Балабановымъ.

У М. С. Балабанова при шестирядной опушкъ на протяжени 130 саженъ, по обоимъ краямъ посажено 4000 саженцевъ желтой акаціи, что стоить по покупной цене всего 3 рубля; на два слёдующихъ ряда, состоящихъ изъ посадки вяза, употреблено 3000 саженцевъ, стоящихъ 4 руб.; на остальные два внутреннихъ ряда, состоящихъ изъ американскаго ясеня, употреблено 2000 саженцевъ, стоящихъ 3 руб.; весь же посаженный матеріаль, такимъ образомъ, стоитъ 10 рублей, т. е. но 8 к. на погонную сажень. Рядъ отъ ряда находится на разстояни двухъ аршинъ; слъдовательно, шестирядная опушка будетъ имъть въ ширину 4 сажени. Приготовление полосы земли на ширину 4 саженъ производится обыкновенно плугомъ на 4 или 5 вершковъ глубины. Ло посатки земля боронуется въ 2-3 следа железной бороной, послъ чего по шнуру на разстоянии двухъ аршинъ копаются канавки; при посадкъ саженцы прикладываются въ вертикальномъ положени къ краю канавки и слегка присыпаются землею, а затемъ одинъ рабочій выравниваетъ посадку, обсыпая и обтаптывая землю сколо саженцевъ. Стоимость посадки каждаго ряда, при поденной плать 25-30 коп. рабочему и 20 коп. работницамъ, опредъляется цифрою 2 руб.; слъдовательно, посадка 6 гядовъ на длину 130 саженъ обходится 12 руб. Разрыхленіе земли тяпками и уничтожение сорныхъ травъ между рядами опушки сказанныхъ размъровъ обходится въ теченіе лъта при четырехкратномъ мотыженіи, по 1 руб. 25 коп.—5 рублей.

Итакъ, при устройствъ древесной опушки въ 6 рядовъ на 130 саженъ въ теченіе года получается слъдующій расходъ: 1) стоимость посадочнаго матеріала—10 руб.; 2) пахота плугомъ полосы земли шириною въ 4 сажени на 130 саженей 1 р. 25 к.; 3) бороньба той же полосы въ три слъда—50 коп.; 4) посадка съянцевъ рабочими—12 руб.; 5) очистка саженцевъ отъ сорныхъ травъ и рыхленіе почвы въ теченіе лъта 5 руб., а всего первоначальное устройство шестирядной древесной опушки и уходъ за нею на протяженіи 130 саженъ въ теченіе перваго года стоитъ 28 руб. 75 коп., слъдовательно, погонная сажень обходится 23 к.

Н. К. Срединскій, столь много поработавшій по устройству насажденій и являющійся у насъ въ Россіи выдающимся авторитетомъ по этому вопросу, проектировалъ стоимость культурныхъ работъ по устройству одной версты семиряднаго насажденія вдоль жельзнодорожной линіи вибсть съ десятильтнимъ уходомъ въ 422 руб. 74 коп. Опыть же, произведенный на практикъ, показаль, что въ дъйствительности работы по устройству насажденій обходятся дешевле почти на 1/2 противъ проектной расцънки. Но это проектное исчисление касается, какъ сказано, посалки по жельзнодорожнымъ линіямъ, гдъ далеко не имъется въ наличности всвхъ благопріятныхъ условій для успъшности и удешевленія посадокъ, тогда какъ производство защитныхъ насажденій въ одномъ опредъленномъ мъстъ и при рабочихъ, знакомыхъ съ прісмами посадки, должно обойтись значительно дешевле. Но и тогда погонная сажень семиряднаго защитнаго насажденія съ десятильтнимъ уходомъ, по Н. К. Срединскому, обходится около 85 коп. Необходимо, однако, сказать, что при настоящихъ болже высокихъ пенахъ прежде всего за трудъ, приводимыя здъсь ціны Н. К. Срединскаго, несомпънно, измънились въ сторону повышенія.

Размеры засаживаемаго сада. Автору, при его довольно многочисленныхъ разъбздахъ по различнымъ мъстностимъ, съ цълью осмотра садовъ, особенно часто приходилось встръчаться съ двумя капитальными ошибками садовладельцевь, которыя они допускають при закладкъ сада. Эти ошибки состоятъ, во-первыхъ, въ слишкомъ боль шомъ размъръ сада, т. е. въ размъръ, значительно превышающемъ силы и средства садовладельца, а, во-вторыхъ, въ слишкомъ частой, противъ существующихъ нормъ, густой посадкъ. То и другое делается неопытнымъ садовладельцемъ въ надежде на возможность наибольшихъ доходовъ и, конечно, изъ желанія наилучшаго использованія земли. Между тімь впослідствій горькая дъйствительность неумолимо разрушаетъ всъ эти призрачныя надежды даже и въ точъ случав, если садов адвлецъ посадитъ свои деревья на достаточномъ разстояніи, но заложить садъ слишкомъ большой, которому онъ не въ состояніи дать соотвътствующій уходъ. Къ глубокому сожалънію, тенденція къ обширнымъ насажденіямъ встрѣчается вовсе не такъ рѣдко, и тѣ плодовыя датифундіи, которыя автору приходилось видѣть на своемь вѣку. чаще всего не только не даютъ хозяину никакого дохода, но еще становятся для него разорительными, заставляя его изъ года въ годъ нести только одни расходы. Поэтому, всякому засаживающему плодовый садъ, необходимо обо всемъ этомъ хорошенько предварительно подумать и основательно взвѣсить всѣ хозяйственные разсчеты и данныя, которые имѣютъ то или другое соприкосновеніе съ будущимъ садовымъ хозяйствомъ. Это особенно должны имѣть въ виду новички въ садоводствѣ.

При закладкъ сада необходимо помнить, что гораздо лучше имъть незначительный по пространству садъ съ наименьшимъ количествомъ деревьевъ, окруживъ последнія заботливымъ уходомъ, чтмъ имъть обширный садъ съ многочисленными деревьями, кои вследствие отсутствия за ними должнаго ухода, не могуть дать ожидаемыхъ отъ нихъ результатовъ въ смыслъ доходности. При закладкъ сада необходимо помнить, что при уходъ за плодовымъ садомъ есть немало не только срочныхъ работъ, но и сверхъ того еще и работъ, требующихъ сразу, иногда даже внезапно. массы рабочихъ рукъ. Вотъ именно эти-то случаи, когда нътъ необходимой наличности рабочихъ рукъ въ требуемомъ количествъ и свободнаго капитала, сплошь и рядомъ и ведутъ къ неудачамъ въ деле. Поэтому-то, гораздо лучше иметь небольшое количество деревьевъ, но правильно ухаживать за ними и упорно вести борьбу съ вредителями. Возьмемъ, напр., такой случай. Во время обильнаго, объщающаго богатый урожай, цвътенія деревьевъ, вдругь является опасность отъ весенняго утренника. Необходимо принять должныя мфры вплоть до нововведенія, состоящаго въ отопленіи сада жаровнями, которыя надо приготовить къ использованію быстро. Это последнее можно произвести съ необходимою скоростью лишь при наличности достаточнаго количества рабочихъ рукъ, при чемъ справиться со всеми приготовленіями для устраненія вреда отъ утренника будетъ несравненно легче при необширномъ салъ, чъмъ въ обратномъ случат. Но бываютъ и осенние утренники, отъ которыхъ (хотя сравнительно и въ ръдкихъ случаяхъ) гибнетъ урожай сада. Тогда необходимо скоръе снять урожай, а оставшіеся висьть на деревьяхъ плоды спасти отопленіемъ жаровнями. Опятьтаки это скорфе и удобнфе выполнимо при меньшемъ, чфмъ при большемъ, садъ. Возьмемъ для наглядности третій примъръ. Салъ вполнъ благополучно существуетъ много лътъ. Вдругъ въ одну весну появляется много мышей и портить массу деревьевъ. Необходимо произвести залъчивание ранъ, нанесенныхъ мышами, примънить прививку мостикомъ и проч. Все это будетъ гораздо достижимъе въ небольшомъ саду, а въ общирномъ это бываетъ по большей части или затруднительно, или даже невозможно.

Разстоянія между деревьями въ плодовомъ саду. Разстояніе, на которомъ сажаются плодовыя деревья въ саду, зависить отъ климата и географической широты мъстности, отъ сажаемой плодовой породы и отъ формы, въ которой дерево выводится, отъ подвоевъ, отъ качества почвы, и, наконецъ, отъ сорта. Такъ, въ съверной и средней Россіи Р. И. Шредеръ, для яблонь и грушъ въ полуштамбовой формъ, признавалъ нормальнымъ или достаточнымъ разстояние въ 3 сажени между деревьями со всёхъ сторонъ, а для вишни и сливы—по $2^{1}/_{2}$ саж. между рядами и 2 саж. между деревьями въ рядахъ. Однако, по моему мнънію, для яблонь въ средней Россіи, хотя бы, напр., въ Московской губ., 3-саженное разстояніе между яблонями надо считать недостаточнымъ, доводя таковое здѣсь, какъ и въ болѣе южныхъ мъстностяхъ, до 4 саженъ. 3-саженнымъ разстояніемъ для яблонь если и можно ограничиваться, то развъ лишь въ съверной Россіи. Въ Курской и Харьковской губ., какъ и вообще въ южной Россіи, яблонямъ въ полуштамбахъ надо давать разстояніе не менфе 4 саженъ, на югъ же разстиние между яблонями въ полуштамбахъ совътуютъ доводить здъсь даже до 15 аршинъ, имъя въ виду использование междурядій каними-либо культурами до тъхъ поръ, пока въ будущемъ кроны насаженныхъ деревьевъ не станутъ смыкаться другь съ другомъ.

Груши по крайней мъръ большинство сортовъ, имъютъ менъе распростертую, чёмъ яблони, крону, сообразно чему и могутъ быть посажены аршина на два ближе дерево къ дереву, чъмъ яблони. Впрочемъ, о разстояніяхъ между деревьями въ той или другой формъ говорилось уже въ началъ настоящей книги при описаніи отдельныхъ плодовыхъ породъ. Здесь же повторимъ еще разъ, что точное разстояніе, на которомъ сажаются плодовыя деревья, дать болье трудно даже для одной и той же формы и для одной и той же породы, такъ какъ это зависить отъ вышеприведенныхъ различныхъ обстоятельствъ и причинъ и, между прочимъ, отъ сорта. Такъ, напр., образующія широкораспростертыя роскошныя кроны вишни-шпанки (изъ группы мореллей) потребуютъ большаго между ними разстоянія, чёмъ имёющая карликовый обликъ, относящаяся также къ группъ мореллей – Любка; изъ грушъ, имъющая узкопирамидальный рость-Клержо, какъ уже было сказано, должна сажаться на болье близкое разстояніе, чымь, напр., дающая болже широкую крону Лесная Красавица и т. д.

Время посадки. На сѣверъ безусловно единственно возможною является только весенняя посадка, при чемъ весенней посадки безусловно можно совѣтовать придерживаться и въ средней Россіи. Даже на югѣ, при обыкновенныхъ условіяхъ, надо отдать предпочтеніе весенней посадкѣ—до развитія почекъ. Только въ мѣстностяхъ крайняго юга, съ мягкими, безморозными зимами можно

вполнъ свободно допустить осеннюю и даже зимнюю (напр., на черноморскомъ побережьъ) посадку Въ южной половинъ Россіи, напр., начиная съ Курской губ., уже допустима и осенняя посадка рано трогающихся весною въ гостъ косточковыхъ, а именно вишни, и авторъ съ полнымъ успъхомъ въ Корочанскомъ уъздъ въ свое время производилъ осеннюю посадку вишенъ сорта Любки.

При переносѣ посадки съ осени на весну исходятъ изъ тѣхъ соображеній, что тронутыя съ мѣста деревья при выконкѣ сопровождающейся разрывомъ корней ихъ изъ питомника, временно, до момента прирастанія ихъ на новомъ мѣстѣ, находятся въ состояніи болѣзненности, вслѣдствіе чего, встрѣчая зиму при осенней посадкѣ незакоренившимися, деревья подмерзаютъ и вообще болѣе или менѣе страдаютъ отъ зимнихъ морозовъ, а иногда и совершенно замерваютъ, что обыкновенно при нормальныхъ условіяхъ, т. е. у закоренившагося дерева мы не наблюдаємъ. Именно эта временная болѣзненность и незакорененіе дерева на зиму при осенней посадкѣ сплошь и рядомъ ведетъ къ тому, что произведенныя на зиму осеннія посадки замерваютъ, чего при весеннихъ посадкахъ обыкновенно не бываетъ.

Размѣщеніе плодовыхъ деревьевъ въ саду при посадкѣ и разбивка сада. Что касается размѣщенія плодовыхъ деревьевъ, по площади засаживаемаго сада, то повидимому въ плодоводствѣ многіе пришли къ тому заключенію, что наиболѣе цѣлесообразною является шахматная посадка, при которой деревья въ одномъ ряду находятся въ промежуткахъ деревевъ сосѣдняго ряда.

Преимущество шахматной посадки состоить въ томъ, что деревья развиваются совершенно равномърно и безпрепятственно во всъ стороны какъ своими кронами, такъ и корнями, и при этомъ равномърно освъщаются солнцемъ, чего въ той же мъръ не достигается при квадратной посадкъ, при которой каждыя четыре сосъднія дерева образуютъ между собой квадратъ, и при которой такимъ образомъ ряды деревьевъ образуютъ между собою перпендикуляръ. Тамъ, гдъ производится конная обработка почвы между деревьями и ведутся промежуточныя пропашныя культуры, несомнънно квадратная посатка будетъ представлять свои выголы.

Разбивка плодоваго сада для точнаго и вполнѣ правильнаго размѣщенія деревьевъ, при которомъ бы послѣднія находились на совершенно равномъ разстояніи другъ отъ друга, само собой разумѣется, происходитъ послѣ того, какъ участокъ вполнѣ будетъ для того готовъ. Такимъ образомъ, если отведенная подъ садъ площадь, подготовляется для засадки сплоніною обработкою почвы, напр., помощью пахачія, то разбивка производится послѣ паханія. Для разбивки сада, т. е. для вполнѣ точнаго обозначенія рядовъ и пунктовъ посадки прибѣгаютъ обыкновенно къ провѣшиванію линій, начиная провѣшиваніе съ какой-либо одной стороны сада. На про-

въшенныхъ линіяхъ посредствомъ шнура, а еще лучше цѣпи, дѣлаются точныя размѣтки тѣхъ разстояній. на которыхъ сажаются
деревья, послѣ чего то мѣсто, гдѣ станетъ стволомъ сажаемое
деревцо, обозначается вертикально укрѣпленнымъ въ почву колышкомъ.

Тамъ, гдъ производится шахматная посадка, съ успъхомъ примъняется разбивка помощью трехугольника. Послъдній сбивается изъ трехъ длинныхъ прямыхъ шестовъ изъ нетолстыхъ брусьевъ или реекъ; каждая сторона этого трехугольника должна быть равна разстоянію, которое дается деревьямъ, т. е. на которое послъднія




Рис. 117. Разбивка сада.

между собою сажаются, а такъ какъ чаще всего мы сажаемъ яблони, то каждая сторона трехугольника въ этомъ случав должна быть равна 4 саженямъ.

Итакъ, при разбивкъ сперва съ какого-нибудь одного края отводимаго подъ садъ участка прокладывается первая крайняя (исходная) линія; какъ только эта линія будетъ провъшена, то ее отбиваютъ на землъ лопатою. Далъе съ какого-либо одного конца проведенной линіи одною стороною накладывается трехугольникъ, какъ показано на рис. 117. По тремъ угламъ этого трехугольника ставятся три колышка которые обозначаютъ мъсто посадки первыхъ трехъ деревьевъ. Когда эти три колышка воткнуты, трехугольникъ двигается дальше, при чемъ ставятся новые два колышка, послъ чего трехугольникъ передвигается опять точно также и т. д. Когда первый и второй ряды такимъ образомъ будутъ отмъчены, тъмъ же порядкомъ отмъчается третій и послъдующіе

ряды, при чемъ всѣ воткнутые колышки будутъ распредѣлены правильно по всѣмъ направленіямъ.

Однако такой трехугольникъ стоитъ сооружать лишь при болте или менте значительной посадкт. При посадкт же небольшого количества деревьевъ будетъ гораздо проще ограничиться однимъ провъшиванимъ. При этомъ обозначение рядовъ и пунктовъ посадки легко можетъ быть произведено послъ установки провъшиваніемъ первой исходной линіи помощью двухъ проволокъ. Для этого на первой (основной или исходной) линіи сперва ставятся колышки на тъхъ мъстахъ, гдъ будутъ потомъ посажены деревья. Затымь берутся равныя по длины двы проволоки. Ллина этихъ проволовъ должна быть точно равна разстоянію между деревьями. Каждый конецъ проволокъ кончается кольцомъ, которое можно свободно надъть на воткнутые въ землю находящіеся на линіи колья. Поэтому-то и колья для разбивки сада въ данномъ случав приходится брать одинаковой толщины. Затъмъ на первые два крайнихъ колышка надъваются кольцами проволоки, которыя затъмъ вытягиваются, и ими очерчиваются дуги; въ мъстахъ, гдъ эти дуги сойдутся, ставится третій колышекъ. Послѣ этого первая проволока переносится кольцомъ на третій колышекъ, при чемъ проволоки опять натягиваются, и опять ими вычерчиваются на землъ двъ дуги, въ мъстъ перекрещиванія которыхъ опять ставится колышекъ, и такимъ образомъ колышками обозначается второй рядъ деревьевъ. Когда по всему этому второму ряду будутъ поставлены колышки, помощью проволокъ точно такимъ же образомъ обозначается третій рядъ и т. д.

Пріобратеніе деревьевъ и сохраненіе ихъ до весны. При засадкъ плодоваго сада и даже при посадкъ нъсколькихъ деревьевъ чаще всего случается такъ, что деревья приходится пріобрътать со стороны, выписывая ихъ изъ пиломниковъ. Выписку и пріобратеніе деревьевъ, несомнанно, только и можно рекомендовать осенью даже по одному тому, что весною въ торговыхъ питомникахъ если что и остается, то нередко бракъ, а весь более или мене доброкачественный матеріалъ обыкновенно бываетъ распроданъ еще съ осени. Весенняя выписка деревьевъ особенно рискованною является издалека, въ какомъ случав не только деревья, но даже и пересылаемые черенки въ пути прорастаютъ (у косточковыхъ) и подсыхаютъ. Такимъ образомъ, во всъхъ случаяхъ, если посадка призводится деревьями не изъ своего питомника, полученныя осенью деревья до весны приходится все таки подвергать временной посадкъ, имъющей название прикопки, задача и суть которой состоить въ томъ, чтобы какъ надземныя части, такъ и особенно корни, предохранить отъ замерзанія и вообще отъ вреднаго вліянія чрезм'єрнаго холода.

Для такой временной прикопки деревьевъ вырывается канава глубиною вершковъ 10-12, у которой одинъ край д \pm лается

отвъснымъ, а другой сильно отлогій. На этотъ сильно отлогій край канавки и раскладываются деревья такъ, чтобы кроны ихъ приходились около поверхности почвы; послѣ того какъ на отлогомъ краѣ канавы будутъ разложены параллельно другъ другу деревья, они засыпаются землею до основанія кронъ и даже выше. Выходящія на поверхность развѣтвленія кроны въ случаѣ надобности защищаются отъ мышей, зайцевъ ельникомъ, т. е. еловыми лапками (гдѣ таковыя имѣются) или противъ этихъ вредителей, если ихъ надо опасаться, принимаются другія предупредительныя мѣры.

Копка ямъ и посадка деревьевъ. Несомновно, что деревья луше всего будуть расти на участкъ, который быль подверженъ сплошному глубокому перевалу; но перевалъ почвы съ помощью лопаты, на требуемую въ данномъ случав глубину 12 вершковъ, обходится такъ дорого, что о немъ серьезно можетъ рфчь итти въ какихъ-либо исключительныхъ случаяхъ. Скорфе, если есть возможность, можно остановиться на такъ называемой райольной пахотъ съ помощью сильнаго райольнаго Сакковскаго плуга, съ запряжкой 3-4 паръ животныхъ и при слъдовани за этимъ плугомъ сверхъ того и почвоуглубителя. Но такая обработка по разнымъ причинамъ далеко не вездъ осуществима; при небольшихъ же посадкахъ о такомъ райольномъ паханіи почвы съ почвоуглубителемъ не можетъ быть и ръчи. Вообще, въ подавляющемъ большинствъ случаевъ, особенно при маленькихъ домашнихъ пространствахъ приходится обращаться просто къ копкъ ямъ подъ каждое отдъльное дерево.

Что касается самаго размѣра ямъ, то необходимо сказать, что чѣмъ шире ямы будутъ выкопаны, тѣмъ лучше; на сѣверѣ, гдѣ ростъ деревьевъ вообще слабѣе, ямы должны быть шириною не менѣе 2 аршинъ, а уже въ нашихъ центральныхъ черноземныхъ губерніяхъ, напр., въ Орловской губ. ширину ямъ лучше доводить до сажени. Что же касается глубины ямы, то она зависитъ главнымъ образомъ отъ географической широты мѣстности, отъ качества почвы, а также и отъ сажаемой породы. На сѣверѣ ни въ коемъ случаѣ не слѣдуетъ давать глубину ямъ болѣе ³/₄ арш. Такою же глубиною приходится довольствоваться и въ центральныхъ нашихъ черноземныхъ губерніяхъ и вообще во многихъ другихъ мѣстностяхъ Россіи. На югѣ Россіи при сухой почвѣ съ водонепроницаемой подпочвой, можно совѣтовать, для грушъ особенно, доводить глубину ямъ до 1¹/2 аршина.

оснью, доводить глуоину ямъ до 1-/₂ аршина. Если же, что имъстъ мъсто въ ръдкихъ случаяхъ, почва для посалки была полготовлена переваломъ или глубокой райольной

посадки была подготовлена переваломъ или глубокой райольной вспашкой, то въ этомъ случат дълаютъ въ пунктахъ посадки деревьевъ небольшія ямки, въ которыхъ могли бы лишь свободно

при посадкъ размъститься корни.

Относительно времени выконки ямъ подъ посадку въ плодоводствъ давно уже установилось правило, что для весенней посадки ямы копаются осенью, а для осенней-весною. Вообще же, чёмъ дольше яма остается открытою, тёмъ лачше, потому что земля, изъ которой состоять стънки ямы, будучи приведена въ непосредственное прикосновение съ воздухомъ, замътно улучшается, а въ течение зимы морозъ дъйствуетъ благотворно на глинистыя почвы, еще и разрыхляя ихъ. На нашемъ засушливомъ югъ не следуеть откладывать посадки, держа ямы долго весною открытыми, потому что онъ тогда сильно просыхають. Поэтому, посалка на югъ производится весною возможно раньше, чтобы можно было использовать еще при посадкъ дерева заключающуюся въ почвъ весеннюю влагу. Въ виду этого следуетъ, какъ только оттаетъ почва, и станетъ доступною для обработки, приступить дней за 10 къ предварительному заполненію ямы землею около 2/2 ея глубины, дабы только что посаженное дерево визств со всей массой насыпаемой въ яму и находящейся въ первое время надъ ямой земли не давало бы черезчуръ большой осадки.

Необходимо отмътить, что при выкопкъ ямъ всегда хорошую, питательную землю, т. е. верхній слой, черноземъ или наземъ, вийстй съ дерномъ кладутъ въ особую первую кучу съ одного какого-либо края выкапываемой ямы, а находящуюся въ болбе низкихъ слояхъ, обыкновенно или часто менте питательную и доброка чественную землю складывають въ другую кучу, съ противуположной стороны ямы. Находящаяся въ этихъ кучахъ земля, (вынесенная на поверхность почвы и лежащая на открытомъ воздухъ въ кучахъ) въ теченіе осени и особенно зимы, вплоть до момента засынки ею ямы весною при посадкъ, подъ вліяніемъ воздуха и мороза, подвергаясь благодътельному ихъ дъйствію, также улучшается. Одновременно съ посадкой, передъ засыпкой ямы неръдко связывають улучшение почвы удобренимъ, которое и вводять въ яму. Такое удобрение безусловно полезно и дъйствительно можетъ быть съ особенною выгодою для дъла примънено въ случат бъдности вочвы. Но имъя въ виду въ данномъ случав удобрительныя цели, ни въ коемъ случае нельзя класть глубоко, т. е. на дно ямы, неразложившагося навоза, который здёсь, при отсутствіи воздуха, такъ и останется неразложившимся, т. е. окажется по меньшей мъръ безполезнымъ для сажаемаго дерева. Если же такимъ неразложившимся навозомъ обложить корни дерева-а не свъдущіе люди къ этому очень склонны, воображая, что именно этимъ то они и принесуть дереву пользу-то этимъ можно вызвать только одно гніеніе корней. Въ лучшемъ случав, если этого и не будеть, навовь вдёсь окажется безполезнымь. Поэтому, кладя удобреніе въ ямы, необходимо употреблять разложившійся, окончательно превратившійся въ компость навозь, или унотребляють иля

этого питательный черноземъ. Вообще, пользы помѣщенія въ яму при бѣдности почвы удобренія отрицать никакъ нельзя, но только, во-первыхъ, это удобреніе, какъ только что было сказано, должно состоять изъ компоста и отнюдь не изъ неразложившагося навоза, а, во-вторыхъ, удобреніе не должно приходить въ непосредственное соприкосновеніе съ корнями; послѣдніе могутъ и должны даже быть окружены черноземомъ, т. е. лучшею землею, но не удобреніемъ. Преслѣдуя удобрительныя цѣли, слѣдуетъ имѣть въ виду, что вообще цѣлесообразнѣе удобреніе вводить не снизу, а съ поверхности почвы при ея обработкѣ и разрыхленіи, производя это удобреніе деревьевъ систематически и планомърно въ будущемъ, по мѣрѣ роста и урожайности дерева.

Еще передъ засыпкой ямы заблаговременно, какъ разъ въ центръ ея, ставится колъ. Чемъ глубже последній войдеть въ




Рис 118. Выкопка посадной ямы: a — менѣе доброкачественная земля; δ —лучшая земля; ϵ —грунтъ; ϵ земля, насыпанная въ яму за ϵ недѣли до посадки дерева.

вемлю, (въ подпочву) тъмъ, слъдовательно, онъ будетъ устойчивъе и. слъдовательно, тъмъ больше для дерева онъ дастъ опоры.

Концы корней передъ посадкою отръзаютъ острымъ ножемъ для полученія сов ршенно гладкихъ порізовъ, и если на корняхъ имъются пораненія или переломы, то корни необходимо ръзать, но только до совершенно здороваго мъста и отнюдь не больше. Послъ этого отръзанные такимъ образомъ и подготовленные къ посадкъ корни обмакиваются въ жидкую грязь, состоящую изъ глины и коровяка для того, чтобы земля могла плотно прилечь къ корнямъ посаженнаго дерева, что особенно важно къ рекомендуемой теперь почти всюду весенней посадкъ. При посадкъ, особенно въ южной Россіи и вообще, въ мъстностяхъ съ знойнымъ сухимъ лътомъ безусловно следуетъ при посадкъ штамбъ дерева ставить такимъ образомъ, чтобы онъ помъщался съ съверной стороны кола. Другими словами, необходимо, чтобы колъ съ южной стороны притеняль штамбъ дерева, защищая его темъ самымъ отъ вреднаго вліянія палящаго солнца. Защита отъ палящихъ солнечныхъ лучей только что посаженнаго дерева инветъ далеко немаловажное вначение въ смысле более удачнаго приживания дерева на новомъ мъстъ, а слъдовательно и дальнъйшаго его развитія. Поэтому, притънение молодого стволика имъетъ весьма существенное значение въ первое время по посадкъ, пока дерево еще не закоренилось въ достаточной степени, и пока его стволикъ не притъняется кроной и листьями. Если справедливо указывають на то, что при обертываніи стволиковъ ради защиты отъ холода слёдуетъ избъгать соломы, какъ дающей пріють мышамъ, то такого рода покрышка штамбовъ можетъ быть страшна на зиму, когда въ ней мыши ищуть убъжища. Весною же и особенно съ наступленіемъ льта, когда мышь вездь имъеть пріють, я не вижу надобности опасаться поселенія мышей подъ солому около штамбика дерева, тъмъ болъе, что здъсь и соломы бываетъ очень немного. Но само



Рис. 119. Посадка плодоваго дерева.

собой разумъется, что эта соломенная лътняя покрышка, служащая для защиты стволика недавно посаженнаго дерева отъ солнечнаго нагрѣва въ концъ лъта, когда въ ней минуетъ надобность, удаляется. Кто имъетъ основаніе опасаться поселенія мышей въ такой легкой воломенной покрышкъ штамба даже и лътомъ. тотъ можеть для этой цъли примънить какой-

либо другой матеріаль, напр., мохъ, камышъ и т. д. Я только подчеркиваю далеко немаловажное значение защиты штамбовъ вновь посаженнаго дерева отъ палящаго солнца, что можно игнорировать развъ на съверъ Россіи.

Самая посадка дерева производится двумя рабочими, при чемъ одинъ изъ нихъ де житъ дерево въ требуемомъ (вертикальномъ) направленіи, а другой расправляеть корни и засыпаеть ихъ землею. Деревцо садится такъ, чтобы корневая его шейка была вершка 2-3 выше прежняго, т. е. другими словами, корневая шейка должна находиться на 2-3 вершка выше поверхности земли засаживаемаго участка. Поэтому, посадка и производится холмикомъ. Когда при такой посадкъ земля въ ямъ вокругъ корней дерева черезъ нъкоторое время осядеть, а вмысты съ этой землею осядеть и дерево, то корневая его шейка опять будеть на томъ же мъстъ, гдъ она была во время роста дерева въ питомникъ, т. е. на поверхности земли, что является непреминнымо условіемъ правильной посадки. Если же корневая шейка попадеть ниже поверхности земли, то это можеть служить причиною заболъванія и даже гибели дерева. Вообще новичковъ надо очень и очень предостеречь отъ неправильной глубокой посадки. Къ сожальнію, эта ошибка встрычается нерыдко, вслыдствіе чего мы видимы постоянное недомогание неумъло посаженныхъ деревьевъ, у которыхъ, конечно, о правильномъ плодоношении не можетъ быть и ръчи.

Чтобы при посадкъ не опустить дерево въ яму болье, чымь слыдуеть, передъ посадкой на поверхности земли поперекъ ямы черезъ центръ ея кладется совершенно прямая палка или рейка съ тремя отмътинами или зарубинами. Когда эта рейка или палка будеть должнымъ образомъ уложена надъ ямой, то двъ крайнія ея зарубки должны находиться надъ стѣнками ямы, а третья какъ разъ налъ центромъ ея, т. е. надъ тѣмъ мѣстомъ, которое займетъ штамбъ дерева. По этой положенной горизонтально, на одномъ уровнъ съ землею, палкъ не трудно уже посадить дерево на должной высотъ, стоитъ только приподнять корневую шейку на 2—3 вершка выше средней зарубки и удержать дерево на этой высотъ при посадкъ.

Рис. 120. Посаженное дерево.

При засыпаніи корней землею дегево слегка поды-

маютъ и опускаютъ, чтобы земля лучше окружила и облегла корни, для чего поверхность холмика по засыпки ямы уминается ногами. При посадкъ дерево поливается двумя или тремя ведрами воды для того, чтобы земля хорошо облегла корни, и чтобы около последнихъ не было пустотъ. При весенней посадкъ эта поливка является необходимостью.

Привязка дерева къ колу производится обыкновенно съ помощью ивовыхъ прутьевъ (или мочала), при чемъ вновь посаженнное дерево сперва привязывается къ колу слабо, потому что если привязать сильно, то дерево будеть прикраплено къ колу, что будеть мъщать ему осъдать вмъстъ съ землею, что недопустимо. Привязка дълается «восьмеркой», т. е. такимъ образомъ, что одно кольцо ел огибаетъ штамбъ дерева, а другое колъ. Для устраненія вреда отъ тренія штамба о колъ, штамбъ въ мѣстѣ привязки оборачивается мхомъ. Нѣкоторые плодоводы стали примѣнять способъ прикрѣпленія штамба къ колу подъ угломъ согласно указанія Гоше. При этомъ способъ привязки подъ угломъ уклонъ кола дается въ сторону господствующихъ вѣтровъ.

Говоря выше о посадкъ холмикомъ я имъю въ виду случай обыкновенной посадки. Но, какъ извъстно, подъ названіемъ «посадка холмикомъ» существуетъ совершенно особая посадка на




Рис. 121. Какъ привязываются къ кольямъ плодовыя деревья.

земляныхъ насыпяхъ или кулахъ, остающихся приподнятыми надъ обшимъ уровнемъ почвенной поверхности и тогда, когда посаженное детево совершенно осядетъ. Такая посядка рекомендуется въ случаяхъ низкаго мъстоположенія, т. е. въ случав близости къ почвенной поверхности грунтовой воды. Не ръшаясь отрицать совершенно пользы такой посадки, я полагаю, что она примънима развъ въ случаяхъ крайности, имъя лишь любительское значение. Нельзя же въ самомъ дълъ признать допустимою посадку плодовыхъ деревьевъ на низкомъ мъстъ, съ близкою къ почвенной поверхности грунтовою водою, въ раціональномъ плодоводствъ,

по крайней мъръ въ съверной и средней Россіи.

Не мѣшаетъ на всякій случай имѣть въ виду, что корни мелкоплодныхъ яблонь гораздо болѣе выносливы къ грунтовой водѣ и къ низкому мѣстоположенію, чѣмъ корни обыкновеннаго яблоневаго дичка. Поэтому, если кто-либо желаетъ непремѣнно испробовать счастья отъ посадки на холмикахъ, вызываемой близостью къ почвенной поверхности грунтовой воды, тому цѣлесообразнѣе сажать яблони, привитыя на дичкѣ китайской яблони, корни которой менѣе страдаютъ отъ грунтовой воды.

Ръзка кронъ вновь посаженныхъ деревьевъ. Сажаемыя или посаженныя деревья непремънно подлежатъ подръзкъ, производимой одновременно съ посадкой. Цъль ръзки или укорачиванія кроны высаживаемыхъ изъ питомника въ садъ деревьевъ троякая. Не закоренившееся вновь посаженное дерево въ той или другой степени страдаетъ отъ пересадки, почему въ первое лъто и не можетъ дать сильныхъ побъговъ, какіе оно дало бы, оставаясь не пересаженнымъ. Такимъ образомъ, корни свёженосаженнаго

дерева не въ состояніи дать достаточно воды и питанія надземнымъ частямъ и тъмъ самымъ обезпечить за послъдними способность въ должной степени противустоять летней жаре. При уменьшеніи же надземныхъ частей, т. е. при укорачиваніи кроны, корни свъжепосаженнаго дерева, сила которыхъ пересадкой значительно ослаблена, будуть уже въ состояніи въ большей степени справиться съ своею задачею, т. е. пропитать надземныя части, и уменьшение последнихъ такимъ образомъ облегчитъ дереву пережить первое лъто по посадкъ. Отсюда первая цъль подръзки кроны вновь пересаженнаго дерева заключается въ уменьшении непосильной работы корней въ первое лъто, что при нашихъ лътнихъ засухахъ и бездождіи весьма важно. Вторая цёль обрёзки кроны состоить въ томъ, чтобы содъйствовать образованию не только достаточно сильныхъ, но и правильно расположенныхъ въ требуемомъ количествъ развътвленій кроны. Наконецъ, третья цёль подръзки кроны вызывается необходимостью сосредоточивать основаніе будущихъ сучьевъ кроны ближе къ штамбу и тъмъ самымъ сообщить кронв желаемую степень крыпости и устойчивости, въ предупреждение могущихъ произойти впоследствии отвисания сучьевъ и разрыва последнихъ въ месте соединенія ихъ со штамбомъ.

При обръзкъ вътокъ кроны послъднія ръжутся примърно отъ двухъ третей до трехъ четвертей ихъ длины, или, другими словами, оставляется одна треть или одна черверть ихъ длины, при чемъ вътки, расположенныя ниже, ръжутся глазка на два или на три длиннъе верхнихъ. Это относится къ боковымъ въткамъ. Что же касается главной верхушечной вътки, то она оставляется длиннъе боковыхъ: на ней оставляется для дальнъйшаго продолженія кроны глазковъ примърно отъ 8 до 10. Ръзка боковыхъ вътокъ кроны всегда производится на наружный глазокъ, т. е. на глазокъ, обращенный къ ръжущему; если же разстояніе между двумя сосъдними вътками кроны несоотвътственно велико, то ръзка боковой вътки, для возстановленія симметріи, производится на соотвътствующій боковой побътъ.

Рвзка кроны яблонь и грушъ. При обръзкъ кроны у яблонь и грушъ окончательная ръзка производится на второй годъ, на первый же годъ производится лишь временное укорачиваніе кроны, при чемъ въ отръзъ идетъ, примърно, одна четверть длины вътокъ. Какъ произвести подобное временное укорачиваніе, показано черточками на рисункахъ 96, 97 и 98. Окончательнаго же укорачиванія у яблонь и грушъ въ первую весну по посадкъ не производится потому, что вновь посаженное дерево въ первое лъто не можетъ дать требуемыхъ сильныхъ побъговъ, —будущихъ основныхъ развътвленій кроны. Окончательная ръзка кроны, даваемая слъдующею весною, показана на тъхъ же

рисункахъ нижними черточками. На второй годъ однолътняя древесина обратится уже въ двухлътнюю, при чемъ наверху ея вырастутъ однолътнія второго порядка вътки, но глазки, надъ котерыми должна быть произведена ръзка на этой, уже теперь двухлътней, древесинъ, останутся спящими и, будучи вызваны къжизни укорачиваніемъ, разовьютъ сильные побъги, какихъ свъжепосаженное и потому недостаточно еще закоренившееся дерево въпервомъ году совершенно не могло бы дать.

Разка кроны у косточковыхъ. У косточковыхъ, у которыхъ побъги изъ двухлътней и болъе старшаго возраста древесины вызываются много труднее, нежели у зерновыхъ, ръзка кроны, въ силу этого обстоятельства, производится въ первый же годъ безъ временнаго укорачиванія. Намъ неоднократно приходилось видъть деревья высаженныя въ садъ изъ питомника уже переросшими, т. е. четырехлѣтками и пятилѣтками. При посадкъ въ садъ такихъ деревьевъ ихъ владълепъ обыкновенно жальеть сильно укорачивать развътвленія кроны, совершенно не подозрѣвая того, что сильное укорачивание развѣтвленій кроны будеть здёсь болёе, нежели умёстно, и что именно безъ такого сильнаго укорачиванія деревья будуть замітно страдать и даже рискують пропасть отъ явтнихъ солнцепека и жары (у такихъ переросшихъ въ питомникъ косточковыхъ деревьевъ полезно обвертывать на лъто штамбы и крупныя развътвленія соломой или мхомъ), а потому, чтобы предупредить пропажу отъ пересадки подобныхъ деревьевъ, мы, на основани нашихъ наблюденій, должны рекомендовать сильную рёзку разветвленій кроны, вслёдствіе чего такія вновь посаженныя деревья переносять вначительно легче пересадку и растуть первое лъто гораздо успъшнъе.

Пересадка взрослыхъ деревьевъ. Выше, говоря о посадкъ деревьевъ, мы имъли въ виду молодыя, выкопанныя изъ питомника деревца. Но на практикт мы встртчаемъ случаи, когда посадкъ подлежать взрослыя, достигшія уже извъстнаго возраста, деревья. Въ данномъ случат чаще всего мы имъемъ дъло собственно съ перенесеніемъ деревьевъ изъ одного плодоваго сада въ другой, что производится обыкновенно въ силу необходимости. Имън въ виду такую пересадку, деревья къ ней подготовляются заблаговременно. Эта подготовка состоитъ главнымъ образомъ, въ томъ, что осенью или рано весною дерево окапывается канавкой на разстояніи отъ ствола около аршина и приблизительно на такую же глубину, при чемъ всъ встръчающиеся на пути корни перерубаются, по возможности не расщепляя ихъ. Затъмъ выкопанную канавку лучше всего заполнить прошлогодними листьями или тому подобнымъ рыхлымъ матеріаломъ. Цёль этой операціи надъ корнями дерева состоить въ томъ, чтобы перерубленные толстые корни, развили въ течение лъта побольше мелкихъ корней, обезпечивающихъ

прирастаніемъ дерева на новомъ мѣстѣ черезъ годъ. Затѣмъ весною слѣдующаго года у дерева обнажаются отъ земли его корни на глубину около аршина, послѣ чего у дерева подрубаются вертикально идущіе въ почву, не подрубленные еще въ прошломъ году, корни. У вынутаго изъ ямы дерева сильно укорачиваются (какъ при обмолаживаніи) сучья, съ одной стороны для того, чтобы дерево легче можно было бы доставить на новое мѣсто, а съ другой стороны, чтобы облегчить дереву прижиться на новомъ мѣстѣ.

Старыя деревья совсёмъ не стоитъ подвергать пересадкѣ, но взрослыя, нестарыя деревья (яблони и груши) приблизительно въ возрастѣ лѣтъ 20—25, могутъ еще вынести надъ собою подобное насиліе. Чтобы спасти дереву жизнь, стволъ и сучья дерева для защиты отъ солнцепека, покрываются мхомъ, соломенными жгутами, тряпками и тому подобнымъ матеріаломъ, который полезно время отъ времени увлажнять водой. Равнымъ образомъ не малую роль въ удачѣ такой пересадки могутъ играть отѣненіе почвы приствольнаго круга и болѣе или менѣе частая и обильная поливка дерева въ засуху. При пересадкѣ взрослыхъ деревьевъ, ихъ сажаютъ, принимая во вниманіе первоначальное положеніе дорева

относительно странъ свъта.

Уходъ за вновь посаженными деревьями. Уходъ за вновь посаженными деревьями въ первый годъ начинается съ отъненія штамба, т. е. обвязки его на лето для защиты отъ палящаго солнца соломой, камышемъ и тому подобнымъ матеріаломъ, при чемъ если можно располагать мхомъ, то последній, какъ въ наибольшей степени удерживающій въ себъ влагу, является самымъ желательнымъ. Къ сожальнію, въ южной Россіи мохъ или отсутствуетъ совсемъ, или очень редокъ. Не только въ южной Россіи, но и въ средней, гдъ также продолжительная засушливая и знойная погода не составляеть ръдкости, для того, чтобы дерево лучше принялось и закоренилось, очень важно отфненіе приствольнаго круга засыпанной ямы съ посаженнымъ въ нее деревомъ, т. е. окружающей дерево рыхлой земли, сильно соломистымъ навозомъ или тому подобнымъ матеріаломъ. Рекомендуемая почти во всёхъ мёстностяхъ Имперіи, обязательная на сѣверѣ, весенняя посадка, особенно на югъ должна сопровождаться сильной поливкой нъсколькими ведрами воды. Притънка изъ соломистаго навоза, соломы или другого подобнаго матеріала, достаточно толстымъ слоемъ, для воспрепятствованія просыханія взрыхленной и хорошо увлажненной поливкой земли, накладывается тотчасъ послъ поливки деревьевъ. Въ южной половинъ Россіи, а иногда и въ средней Россіи, при продолжительной жаръ и засухъ, приходится, чтобы отстоять деревья отъ изсушающаго зноя, полить льтомъ, хотя бы еще разъ, посаженныя весною деревья, но при этомъ полить основательно, т. е. опять-таки нъсколькими ведрами воды каждое дерево, такъ

какъ легкая поливка, какъ не приносящая пользы, была бы бевцёльною. Сохраняющая влагу въ почвъ соломенная или другая подобная притънка остается на поддревесномъ кругъ все время до осени, когда въ ней уже минуетъ надобность.

Итакъ, въ первое лѣто предполагается, что поверхность почвы вокругъ дерева отѣнена какой-либо сохраняющей подъ ней свѣжесть земли покрышкой. Послѣдняя, будучи достаточно плотною, препятствуетъ появленію и развитію въ этомъ мѣстѣ сорныхъ травъ. При появленіи таковыхъ (при недестаточно толстой покрышкѣ, или при совершенномъ ея отсутствіи), сорныя травы должны быть истребляемы.

О выдающемся значеніи защиты или отъненія стволика вновь посаженнаго дерева уже говорилось. На съверъ, да во многихъ мъстностяхъ и средней Россіи, съ суровыми зимами, въ первую зиму по посадкъ, когда молодыя, посаженныя весною деревпа еще мало закоренились, и всладствіе этого особенно подвержены дайствію зимняго холода, следуеть принять меры къ защите деревьевъ отъ зимней стужи, такъ какъ такія вновь посаженныя при суровой зимъ весною деревца могутъ оказаться замерзшими. Поэтому, въ стверной, да и средней Россіи, имтя въ виду сказанную суровость зимъ приходится основательно укутывать чемъ-либо штамбы дерева, распространивъ такую защиту вмѣстѣ со штамбиками и на основание развътвлений кроны. Въ дальнъйшемъ, когда деревцо основательно закоренится, оно становится гораздо болже выносливымъ къ морозу. Что же касается корней вновь посаженнаго и недостаточно укоренившагося дерева, то отъ морозовъ они обыкновенно тмою бывають въ достаточной степени защищены естественной покрышкой - снъгомъ.

Съ весны следующихъ летъ въ плодовомъ саду начинается уже регулярная обработка почвы подъ деревьями и между ними, т. е. въ междурядіяхъ. Обработка эта состоитъ въ глубокой перекопкъ, которой подвергается та часть почвы, которая окружаеть яму. Другими словами, вокругъ прежде копавшейся ямы, въ которой теперь находятся корни дерева, земля глубоко перекапывается кольцомъ, ежегодно равномърно расширающимъ такимъ образомъ эту яму на ширину приблизительно въ 11/2 арш., при чемъ глубина при такой перекопкъ почвы вокругъ дерева кольцомъ остается та же, что и была при выкопкъ первоначальной ямы, т. е. 12 вершковъ (на югъ и при посадкъ грушъ и глубже). Такимъ образомъ, мы ежегодно имфемъ дфло съ кольцевымъ переваломъ, при чемъ, выкапывая такую кольцеобразную канаву, землю изъ нея вынимають точно такъ же, какъ и при выкопкъ ямы, т. е. верхній наиболье питательный слой кладуть особо, а болье нижній, менже питательный и доброкачественный слой почвы кладется особо. Это делается для того, чтобы при заполнении канавы вышутой изъ нея вемлей можно было бы поступать такъ же, какъ это дѣлалось при выкопкѣ ямы, т. е. верхній слой идетъ внизъ, а нижній наверхъ, гдѣ этотъ нижній, обыкновенно менѣе питательный слой почвы со временемъ, подъ вліяніемъ воздуха, удобренія и обработки почвы, улучшается. Одновременно съ описываемымъ кольцевымъ переваломъ въ почву вносится при надобности и удобреніе, внесеніе коего въ почву въ данномъ случаѣ является наиболѣе удобнымъ.

Само собой разумѣется, что наиболѣе удобнымъ временемъ для производства кольцевого перевала, какъ и вообще для производства вначительныхъ земляныхъ работъ, является осень, когда все можно сдѣлать не спѣша. Далѣе надо имѣть въ виду, что перевернутая переваломъ почва, при обратномъ ея помѣщеніи въ вырываемую кольцомъ канаву, въ этомъ мѣстѣ будетъ значительно выше общаго уровня почвы. Послѣ перевала почва здѣсь притаптывается, а еще до завала вырытой почвой въ канавѣ, если рытье послѣдней затронетъ лопатой болѣе или менѣе крупный корень, поперечный срѣзъ его возобновляется острымъ ножомъ, чтобы произведенный порѣзъ корня былъ совершенно гладкимъ, дабы онъ скорѣе могъ затянуться.

При примѣненіи описываемаго здѣсь кольцевого перевала, почва междурядій, въ теченіе относительно короткаго времени, а именно въ теченіе 5—6 лѣтъ, будетъ состоять изъ сплошного, производимаго постепенно перевала. Принимая разстоянія между деревьями въ 4 сажени, т. е. 12 арш., окажется, что при ширинъ ямы въ 2 арш., эти 2 арш. изъ 12 арш. (какъ уже подвергнутые перевалу) должны быть исключены. Такимъ образомъ, съ осени второго года перевалу въ междурядіяхъ будетъ подлежать въ междурядіяхъ, за вычетомъ уже двухъ переваленныхъ, 10 аршинъ.

Если вырывать кольцевыя перевальныя канавы шириною въ аршинъ, то такъ какъ въ междурядіяхъ канавы роются вокругъ двухъ деревьевъ, т. е. съ двухъ сторонъ, то ежегодно каждое междурядіе переваливается на 2 арш., а такъ какъ послів выкопки 2-аршинной ямы въ междурядіи перевалу подлежить 10 арш., то для окончательнаго перевала потребуется при аршинной ширинъ перевальной канавы 5 льтъ. Если же ширину кольцевой перевалочной канавы взять большую, напр., около 11/, арш., то почва междурядій можеть быть тогда перевернута въ болбе короткій срокъ, въ три года. Но не всё плодоводы следують этому правилу, а сплошь и рядомъ ограничиваются только вырытіемъ посадочныхъ ямъ, а затъмъ лишь разрыхленіемъ поддревесныхъ круговъ, что часто нельзя признать вполнъ раціональнымъ. Другими словами, многіе плодоводы ограничиваются только поверхностной перекопкой поддревесныхъ круговъ на глубину одной лопаты. Въ такомъ случав перекопка поддревесныхъ круговъ

должна быть производима не меньше двухъ разъ въ лѣто—весном и осенью, Вообще двукратная перекопка лопатою или мотыженіе являются минимумомъ при обработкѣ почвы въ плодовомъ саду, и, въ зависимости отъ разныхъ условій, главнымъ образомъ климатическихъ, такое двукратное взрыхленіе почвы можетъ оказаться недостаточнымъ, почему въ срединѣ лѣта потребуется добавочное, повторное рыхленіе. Вообще въ плодовомъ саду принято за правило, если даже при обработкѣ почвы въ междурядіяхъ ограничиваются только рыхленіемъ поддревесныхъ круговъ, поверхность почвы послѣднихъ должна быть чистою и не зарастать сорными травами, которыя здѣсь приносятъ двоякій вредъ: высасывая изъ почвы влагу, изсушаютъ и истощаютъ ее своимъ ростомъ, существуя такимъ образомъ за счетъ культивируемыхъ плодовыхъ деревьевъ.

Въ наибольшей степени обработка почвы будетъ зависъть отъ влажности мъстности; такимъ образомъ, въ отношеніи обработки почвы плодоваго сада, напр., въ озерной области, на съверъ Россіи, съ влажнымъ климатомъ, будетъ до извъстной степени противоположной обработкъ въ мъстностяхъ нашего сухого и знойнаго степного юга, гдъ приходится дорожить каждой каплей воды, и гдъ обработка почвы, помимо ея прямого назначенія, заключающаяся въ рыхленіи, сверхъ того, должна преслъдовать еще и

совершенно другія цъли-увлажненіе почвы.

Поддревеснымъ кругомъ будетъ тотъ кругъ, въ центръ котораго находится стволъ дерева, и края котораго совпадають съ внѣшними краями кроны. Такимъ образомъ широта поддревеснаго круга всегда бываетъ равна ширинъ кроны и измъняется, т. е. увеличивается, по мъръ роста и расширенія кроны, до тъхъ поръ, пока дерево достигнетъ максимальнаго размъра и предъльнаго возраста, послъ чего крона уже не расширяется. Но такъ какъ, съ возрастомъ, кроны деревьевъ, изъ которыхъ состоитъ плодовый садъ, смыкаются, т. е. закрывають все междурядіе, то, согласно принятому правилу относительно поддревесныхъ круговъ, взрыхленію должна подлежать вся площадь сада. На практикъ, однако зачастую этого мы не встръчаемъ, и въ садахъ съ разросшимися уже деревьями и съ смыкающимися кронами мы встречаемъ лишь поддревесные, круги, ръдко вскапываемые шире 5-6 арш. въ діаметръ. Но такой размъръ поддревесныхъ круговъ нельзя признать правильнымъ, и потому площадь подлежащаго перекопкъ поддревеснаго круга должна быть доводима, по возможности, до размфровъ кроны, занявъ все или почти все междурядіе. Говоримъ почти все, потому что небольшая и неширокая тропинка, оставляемая для прохода по срединъ междурядія, не займетъ много мъста.

Такимъ образомъ, даже въ мъстностяхъ, не страдающихъ отъ долгаго лътняго зноя, сопровождающагося сильной засухой, кото-

рая съ особенною силою проявляется на нашемъ степномъ югѣ и юго-востокѣ Россіи, мы приходимъ, въ разросшихся садахъ съ большими деревьями, къ сплошной поверхностной перекопкѣ почвы, которая и будетъ такъ называемымъ чернымъ паромъ. Подъ чернымъ паромъ принято понимать не только сплошную перекопку лопатой или сплошное мотыженіе, но и частую, въ теченіе лѣта 4—6 кратную, неглубокую, поверхностную обработку почвы сада другими взрыхляющими орудіями, въ зависимости отъ климата или точнѣе, отъ болѣе или менѣе засушливаго лѣта; благодаря столь частому рыхленію, появленіе сорныхъ травъ при черномъ парѣ становится совершенно невозможнымъ.

Въ настоящее время во всъхъ мъстностяхъ съ болъе или менье засушливымъ и знойнымъ лътомъ черный паръ признанъ за единственную, вполнъ раціональную обработку почвы, такъ какъ черный паръ замъняетъ собою или совершенно, или въ значительной степени дорого стоящую и не вездъ осуществимую регулярную поливку деревьевъ. Но, само собой разумъется, на ряду съ этимъ черный паръ, кромъ того, выполняетъ вообще всъ функціи, къ которымъ призвана обработка почвы, изъ нихъ главная—прове-

деніе воздуха въ почву и къ корнямъ.

Черный паръ надо считать единственнымъ способомъ добиться плодоношенія и обильныхъ урожаевъ у деревьевъ нашего степнаго юга, гдѣ продолжительная засуха, сопровождающаяся обыкновенно зноемъ и крайней бѣдностью лѣтнихъ атмосферныхъ осадковъ, дѣлаетъ безъ него успѣшную культуру плодовыхъ деревьевъ невозможною. И не только на югѣ, но даже на сѣверѣ—въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ нельзя жаловаться на недостатокъ атмосферной влаги для плодоводства, черный паръ, при разумномъ его употребленіи, ничего, кромѣ очень большой пользы, принести не можетъ.

Въ мъстностяхъ съ чрезмърно засушливымъ климатомъ однимъ чернымъ паромъ безъ сопутствующаго ему орошенія обойтись, конечно, нельзя. Пока, за отсутствіемъ въ Россіи достаточно исчерпывающихъ изследованій, вопросъ, где, можно еще обойтись въ плодоводствъ однимъ чернымъ паромъ, а гдъ для плодоношенія и поддержанія урожайности сада черный паръ орошенія замінить не можеть, остается открытымь. Благодътельное дъйствіе чернаго пара сказывается въ томъ, что благодаря ему почва содержится всегда чистою, а главное рыхлою. Только совершенно не свъдущимъ, далекимъ отъ земледълія людямъ можетъ казаться, что рыхлая почва гораздо въ большей степени подвержена высыханію, чъмъ твердая; на самомъ же дълъ въ отношени высыханія почвы, т. е. потери почвенной влаги, высыхаетъ именно твердая почва, тогда какъ хорошо разрыхленная почва способна въ наивысшей степени къ удержанію въ себъ почвенной влаги, которую тъмъ больше удерживаетъ, чёмъ совершеннёе взрыхлена. При разрыхленіи твердой почвы, которое естественно производится сверху, въ послідней разрушаются ті тонкіе сосуды—воздушные ходы, по которымъ вслідствіе капиллярности или волосности вода или влага поднимается изъ нижнихъ слоевъ на поверхность почвы и здісь испаряется. Итакъ, поверхностное рыхленіе почвы, нарушая связь вышеупомянутыхъ капиллярныхъ сосудовъ или влагоносныхъ путей въ почві, кладетъ преділь капиллярности и высыханію почвы, но въ наибольшей степени это достигается лишь въ сильно рыхлой почві, потому что всякому понятно, что какъ только разрыхленная почва начнетъ слеживаться и уплотняться, то связь разрушенныхъ влагоносныхъ ходовъ снова возстановится, и испареніе ихъ почвой начинается съ прежней силой. Поэтому-то въ засушливыхъ містностяхъ и требуется частое рыхленіе, какъ уже было сказано, въ зависимости отъ интенсивности засухи отъ 4 ло 6 разъ.

Е. Ф. Незнаевъ въ своей цънной стать в «Способы сбереженія и локализаціи атмосферныхъ осалковъ» (Плодоволство, 1910 г.). подчеркивая важность чернаго пара на нашемъ степномъ югъ. между прочимъ, писалъ: «Дъло въ томъ, что обсолютно сухого воздуха въ природъ нътъ, ибо атмосфера постоянно и непрерывно насыщается водяными испареніями океановъ, морей, ръкъ, озеръ, болотъ, всей земной суши ея; насыщенный испареніями ихъ воздухъ, соприкасаясь въ ночное прохладное время съ почвою, отдаетъ ей часть этихъ испареній, при чемъ, смотря по степени гигроскопичности и влагоемкости, 1000 частей почвы поглощаютъ водяныхъ паровъ до 97 частей за сутки, т. е. 10% по въсу. И чёмъ больше влагоемкость почвы, чёмъ меньше составныя части ея, и чамъ больше въ почва перегноя и глины, тъмъ больше будеть поглощаться ею водяныхъ наровъ атмосферы. При болже быстрыхъ и ръзкихъ перемънахъ температуры тъ же водяные пары атмосферы, соприкасаясь съ рыхлою почвою, превращаются въ капельно жидкое состояние-росу. Какъ бы ни казалось ничтожнымъ это столь незамътное иля глаза накопление влаги въ почвъ, ему нельзя не придавать важнаго значенія какъ въ экономіи природы, такъ и въ хозяйствъ человъка».

Далже, относительно обработки почвы для полученія чернаго пара Е. Ф. Незнаевъ говоритъ: «Лучшимъ орудіемъ рыхленія почвы для небольшихъ домашнихъ садиковъ будетъ обыкновенная мотыка, для садовъ средней величины—ручной полольникъ Планетъ, а для большихъ садовъ — конный культиваторъ Планетъ. Ручнымъ Планетомъ самый лѣнивый поденщикъ въ состояніи обработать четверть десятины и болѣе въ день, а добросовѣстный и ловкій успѣетъ промотыжить свыше полдесятины. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что рабочіе охотнѣе берутся за Планетъ, при которомъ не надо сгибать спины, чѣмъ за обыкновенную ручную

тяпку (сапку). Употребленіе Планета хозяину даетъ большія выгоды: требуется меньшее число рукъ и меньше времени. Чтобы промотыжить десятину сада простою мотыкою, надо не меньше 20 поденщицъ, тогда какъ Планетомъ ту же работу сдѣлаютъ двое рабочихъ, и потому Планетомъ можно работу произвести всегда своевременно и при томъ равномѣрно, чисто и безъ фальши. И только при соблюденіи, какъ этихъ, такъ и вышеприведенныхъ условій, мотыженіе почвы является въ рукахъ хозяина дѣйствительнымъ средствомъ локализаціи атмосферныхъ осадковъ на культивируемой землѣ». Насколько хорошо могутъ себя чувствовать



Рис. 122. Молодой плодовый опытно-промышленный садъ

благодаря черному пару плодовыя деревья, межно видёть изъ рисунка 122, на которомъ представленъ роскошно произрастающій молодой яблоневый опытно-промышленный садъ Молочанскаго отдёла И. Р. Общества Плодоводства въ Мелитонольскомъ убздё, Таврической губ., гдё какъ извёстно, жаркое лёто при его продолжительности, отличается еще весьма значительною сухостью и рёдкостью въ теченіе его атмосферныхъ осадковъ.

Такъ какъ въ большинствъ случаевъ мы встръчаемъ небольшіе сады, то для сплошной поверхностной обработки почвы чаще всего и можно останавливаться ва ручномъ Планетъ, не требующемъ конной тяги. Примъненіе этого орудія, двигаемаго лишь человъкомъ, имъетъ ту выгодную сторону, что позволяетъ для рыхленія подходить ближе къ штамбу, тогда какъ при конной

обработкъ тянущія орудія животным не могутъ подходить близко къ штамбамъ, вслъдствіе чего является необходимость въ ручномъ рыхленіи земли человъкомъ посредствомъ мотыки подъ самыми кронами и вокругъ штамба. Кромъ вышеназванныхъ орудій, служащихъ для поверхностнаго рыхленія и поддерживанія требуемаго состоянія чернаго пара, А. С. Гребницкій («Уходъ за плодовымъ садомъ») указываетъ на требующія упряжки животныхъ лопатчатыя дисковыя бороны, изъ коихъ, между прочимъ, должно рекомендовать американскій лопатчатый дисковый культиваторъ Ситамау. Затъмъ, для той же цъли рекомендуются пружинныя бороны, каковы, напр., одиночная американская борона «Баджеръ» или «Грифъ» Венцкаго.

Обмолаживаніе деревьевъ. У взрослаго плодоваго дерева, а тъмъ болъе дерева стараго (мы здъсь имъемъ въ виду лишь яблони и груши) плодовая древесина обыкновенно береть перевъсъ надъ ростовой; у стараго же дерева годовой приростъ древесныхъ побъговъ бываетъ очень незначительнымъ, а неръдко и совершенно ничтожнымъ. Одновременно съ этимъ уменьшается приростъ и корневой системы; последнее влечеть за собою уменьшение на корняхъ числа корневыхъ мочекъ, вследствіе чего дерево не будетъ въ состояніи давать хорошо развитыхъ плодовъ. Далье многочисленныя развътвленія дерева, особенно же плодовой древесины у старыхъ деревьевъ, затрудняетъ движение сока, вслъдствие чего послъдний, стремясь найти себъ выходъ, вызываетъ образование водяныхъ побътовъ, появленіемъ которыхъ само дерево какъ бы указываетъ на то, что оно уже устарило и требуеть замины старых сучьевь съ корявыми вътками новыми развътвленіями или, другими словами, такъ наз. обмолаживанія.

Обмолаживаніе собственно представляеть собою короткою різку (точніве спиливаніе) многолітней древесины и является весьма важнымъ средствомъ для поддержанія плодородія и жизни дерева. Вмісті съ тімь обмолаживаніе до извістной степени даеть возможность дереву бороться съ засухами, такъ какъ обмоложенное дерево, пуская вслідствіе напора сока массу молодыхъ побітовъ, въ то же время на корняхъ развиваетъ новыя мелкія развітвленія, питающія дерево почвенной влагой. Нельзя, поэтому, не пожаліть, что обмолаживаніе приміняется далеко не въ такой степени, какъ оно того заслуживаеть.

Если дерево живеть 40-45 лѣть, къ каковому времени деревья обыкновенно требують обмолаживанія, то, чтобы обмолодить дерево весною до распусканія листьевь, сучья кроны коротко обрѣзаются или точнѣе спиливаются, при чемъ удаляется приблизительно отъ $^2/_3$ до $^3/_4$ всей длины сука. Принято обыкновенно одинъ какой - либо сукъ временно оставлять совершенно цѣлымъ: сукъ этотъ укорачивается, подобно другимъ, лишь слѣдующею весною.

Рисуновъ 123 изображаетъ дерево груши, крона котораго, за исключениемъ одного сука, мною была спилена въ 1894 году въ Корочанскомъ земскомъ питомникъ. Всъ остальные сучья кроны были такъ же длинны, какъ и оставленный сукъ. Надо замътить, что при обмолаживании сучья кроны укорачиваются сообразно съ

ихъ длиною и формою кроны, т. е. срединные сучья ръжутся длиннъе, а боковые соотвътственно короче. Точно также болъе длинные сучья ръжутся болъе длинно (т. е. оставляются болъе длинными), а болъе короткіе—наоборотъ.

Обръзанное такъ старое дерево весною разовьетъ массу молодыхъ побъговъ. Если оставить веъ выросшіе побъги, то крона сразу сдълалась бы очень густой: потому, слъдующею весною удаляются веъ лишнія вътки, и оставляется лишь нъкоторая часть ихъ, изъ которой и образуется новая крона. На рис. 124 изображено то же самое обмоложенное дерево, но спустя два года.

Несмотря на большую пользу обмолаживанія, подвергать посліднему цільй садъ сразу, т. е. одновременно, было бы крайне невыгодно и даже рискованно, потому что крона обмоложеннаго дерева образуеть плодовыя почки лишь на третій

годъ. При обмолаживаніи плодоваго сада всего сразу, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ пришлось бы отказаться отъ урожаевъ. Несравненно выгоднѣе обмолаживать застарѣвшій садъ ежегодно по частямъ. Если, напримѣръ, имѣется подлежащій обмолажива-

Рис. 123. Груша, крона которой была спилена, за исключеніемъ одной вътви.

нію садъ пространствомъ въ 8 десятинъ, то ежегодно обмолаживанію надлежить подвергать приблизительно десятины полторы.

Перепрививка деревьевъ. Перепрививка деревьевъ въ плодоводствъ, какъ въ любительскомъ, такъ и въ промышленномъ, является очень важною операцією, такъ какъ къ ней приходится прибъгать весьма неръдко. Даже при пріобрътеніи деревьевъ изъ самыхъ надежныхъ источниковъ можетъ случиться, что выслано дерево не желаемаго, а другого сорта. На практикъ мы очень часто встръчаемся со случаями наличности или малоцънныхъ сортовъ, или сортовъ, не подходящихъ по климату. Перепрививка деревьевъ въ крону, для превращенія ихъ въ цънные, доходные сорта, является какъ нельзя болъе цълесообразнымъ и цъннымъ пріемомъ.

Необходимо подчеркнуть, что прививка въ крону и вообще перепрививка преимущественно имфетъ мъсто у аблонь и грушъ;




Рис. 124. То же самое дерево, но спустя два года посл'в спиливанія кроны.

у косточковыхъ она менъе примънима, во-первыхъ, потому, что при культуръ косточковыхъ, вообще менте долговѣчныхъ, чѣмъ зерновыя породы, въ ней не встръчается обыкновенно надобности, а, во-вторыхъ, и потому, что косточковыя вообще труднее принимаютъ прививку черенками, чтмъ зерновыя породы. Перепрививка деревьевъ можетъ имъть неудачу лишь въ случаъ старости деревьевъ, которыя по этой причинъ бывають лишены здороваго роста. Но и деревья въ возрастъ могутъ съ полнымъ успъхомъ быть перепрививаемы, если ихъ перепрививкъ будетъ предшествовать вышеописанное обмолаживание деревьевъ. Дело въ томъ, что легко и върно принимаютъ прививку лишь не толстыя гладкокожія вътви и вътки дерева, не толще двухъ, трехъ пальцевъ. При прививкъ сучьевъ и развътвленій съ

болье старой, потрескавшейся корой срастаніе привоя съ подвоемъ идетъ менье энергично, и потому такія прививки нерьдко пропадаютъ. Всльдствіе этого мы на практикь обыкновенно и видимъ, что молодыя деревья съ нетолстыми еще развътвленіями прививаются прямо въ эти посльднія, при перепрививкь же деревьевъ болье стараго возраста сперва необходимо обмолаживаніе, дабы вызвать образованіе молодыхъ побъговъ, которые весною сльдующаго года (посль удаленія лишнихъ побъговъ, дълающихъ излишнюю густоту кроны) и прививаются черенкомъ, для чего лучше всего пользоваться улучшенной прививкой за кору и англійской копулировкой съ двумя язычками.

Перепрививка деревьевъ можетъ быть произведена окулировкой въ перезимовавшіе побъги, но обыкновенно для этого пользуются, какъ было сказано, весенней прививкой черенками, при чемъ для полнаго успъха прививки необходимо, какъ и при прививкъ вообще закоренившихся уже и растущихъ въ открытомъ грунту подвоевъ, чтобы подвой (т. е. перепрививаемое дерево) тронулся въ ростъ, а черенокъ былъ бы въ состояніи полнаго покоя. Перепрививка деревьевъ облегчается еще и тъмъ обстоятельствомъ (по крайней мъръ, это относится къ весьма многимъ мъстностямъ Имперіи), что ее можно производить, смотря по мъстности, въ течение недъль трехъ и даже четырехъ. Но въ мъстностяхъ съвера, съ короткимъ лътомъ, необходимо помнить, что поздно произведенная перепрививка даеть побъги, которые къ осени не вполнъ закончатъ ростъ; другими словами, ихъ древесина къ зимъ недостаточно выспаваеть и затвердаеть, результатомъ чего при продолжительной морозной зимъ привитыя части могутъ отмерзнуть. Вообще къ перепрививкъ слъдуетъ приступать, какъ только деревья тронутся въ ростъ, и кора легко будетъ при обильномъ полносочіи дерева отдъляться отъ древесины. Какъ только привитой черенокъ хорошо примется и станетъ развивать побъги, не слъдуетъ забывать удалить прежнюю повязку, замънивъ ее новой, т. е. ослабить наложенный мочальный бандажъ. Если же последняго не ослабить и не возобновить, то бандажъ станетъ вразываться въ кору перепривитаго побъга и не только тъмъ самымъ изуродуетъ его, но и можетъ легко привести къ поломет. Наконецъ, когда изъ привитого черенка разовыются побыти и достигнуть въ длину вершковъ двухъ, оставляютъ изъ нихъ одинъ какой либо, наиболже сильный, чаще всего верхній, а остальные удаляють. Этоть оставленный побыть, въ предупреждение поломки его вътромъ или отчахивания отъ прививка, привязывается къ прикрупляемой къ дереву палочку. Это привязываніе побъга производится въ нъсколькихъ мъстахъ по мъръ роста побъга. Въ течение лъта палочка не мъщаетъ побъгу и удаляется, какъ выполнившая свое назначение, весною слъдующаго года, если не спадетъ съ дерева раньше (см. рис. 55 на стр. 74).

Удобреніе плодовыхъ деревьевъ. Удобреніе плодовыхъ деревьевъ чаще всего имѣетъ мѣсто въ плодовомъ саду, но иногда въ случаѣ бѣдности почвы удобреніе примѣняется и въ питомникѣ. Въ послѣднемъ случаѣ чаще всего удобреніе вносится въ почву при подготовкѣ квартала къ засадкѣ дичками

Чаще же всего мы имѣемъ дѣло съ удобреніемъ деревьевъ въ илодовомъ саду. Врядъ ли надо доказывать, что постоянные, т. е. ежегодные урожаи только и возможно удержать на требуемомъ уровнѣ удобреніемъ, о регулярномъ примѣненіи котораго садовладѣлецъ долженъ подумать еще до заложенія своего сада. Однако,

прежде всего надо помнить, что удобрение приносить связанную съ нимъ пользу лишь въ томъ случат, если въ почет въ теченіе не только весны и осени, но вообще въ теченіе всего періода роста импется достаточный запась влаги. Если же последней въ почве недостаточно, то удобрение становится безцёльнымъ, такъ какъ отсутствіе или недостатокъ влаги въ почвё мертвитъ последнюю, ибо тогда все процессы по приведенію удобрительныхъ веществъ въ удобоусвояемое для деревьевъ состояніе, и самое корневое питаніе дерева пріостанавливаются. Въ мъстностяхь, гдв чувствуется летомъ недостатокъ почвенной глаги (а такихъ мъстностей, къ сожальнію, въ Россіи много), прежде всего надо подумать о примънении въ саду чернаго пара, который здъсь имъетъ особую цънность. Черный паръ имъетъ такой эффектъ потому, что увлажняетъ почву, да еще, кромъ того, открываетъ въ послъднюю должный доступъ воздуха. Всладствіе этого и вса процессы по переработкъ въ почвъ удобренія и воспринятію корнями питанія протекаютъ тогда безъ замедленія и вполнъ нормально.

Удобренія раздѣляются обыкновенно на двѣ группы: 1) на удобренія, дѣйствующія косвенно или косвенныя, и 2) на удобренія, дѣйствующія непосредственно, или прямыя удобренія. Къ этой второй группѣ и принадлежитъ большинство удобреній, причемъ эта вторая группа въ свою очередь подраздѣляется на неполныя (вспомогательныя) и полныя удобренія. Таково главное подраздѣленіе удобреній, согласно ихъ дѣйствію, но помимо того въ отношеніи примѣненія удобреній послѣднія могутъ быть еще подраздѣлены на твердыя и жидкія, а по своему происхожденію—на

искусственныя и естественныя.

Въ группу косвенно дъйствующихъ удобреній входитъ весьма незначительное ихъ число, а именно ъдкая или жженая известь, мълъ (углекислая известь), мергель и гипсъ. Вторая группа прямыхъ удобреній заключаетъ не только подавляющее ихъ большинство, но и наиболъе часто примъняемыя удобренія. Прямыя удобренія въ свою очередь распадаются на: 1) удобренія неполных или вспомогательныя, и 2) на полныя удобренія. Группа полныхъ удобреній заключаетъ въ себъ не только наиболъе важныя, но и наиболъе часто примъняемыя въ саду удобренія (какъ имъющіяся чаще въ хозяйствъ), а именно навозъ, птичій пометь, человъческіе экскременты или ночное золото и компостъ. Сюда же относятъ и искусственные минеральные туки.

Къ вспомогательнымъ или неполнымъ удобреніямъ будутъ относиться: 1) азотистыя удобренія (сърнокислый амміакъ, чилійская селитра, гуано, зеленое удобреніе и другія богатыя азотомъ удобренія), 2) фосфорнокислыя удобренія (томасшлакъ, суперфосфаты, костяная мука и фосфориты), и 3) удобренія каліевыя (стассфуртскія соли и зола).

Итакъ наиболъе часто примъняемыя въ плодоводствъ удобренія суть удобренія естественныя, изъ которыхъ наибольшее значеніе имъстъ навозъ. Навозъ не только представляетъ собою главное и наиболье часто встръчающееся удобреніе, но и при этомъ удобреніе дъйствительно полное, такъ какъ навозъ заключаетъ въ себъ вст вещества, необходимыя для развитія и жизни дерева. Навозное удобреніе, мало того, что дъластъ почвы болье теплыми и рыхлыми (слъдовательно, содъйствуетъ въ нихъ благодътельному проникновенію и вліянію воздуха), еще вводить въ почву особыя бактеріи, содъйствующія наиболье успътному произрастанію деревьевъ.

Чаще всего мы имъемъ дъло съ конскимъ перепръвшимъ или неперепръвшимъ навозомъ. Легкія песчаныя почвы удобрять свъжимъ неперепръвшимъ навозомъ не рекомендуется, такъ какъ на такія почвы свъжій навозъ оказываетъ изсушающее дъйствіе, чего не бываетъ на болье плотныхъ, глинистыхъ почвахъ. Изъ тъхъ же основаній коровій навозъ болье рекомендуется для легкихъ, а

лошадиный для связныхъ почвъ.

Необходимо особенно подчеркнуть то, что настоящую, связанную съ навознымъ удобреніемъ, пользу оно приноситъ тогда, когда навозъ сохраненъ надлежащимъ образомъ. Неръдко вмъсто навоза удобреніе производится старой выщелочившейся навозной трухой, отъ которой, конечно, немного будетъ толку. Цълесообразное сохраненіе хлъвного навоза имъетъ громадное значеніе при удобреніи деревьевъ, потому мы настойчиво рекомендуемъ всякому садовладъльцу обратиться къ спеціальнымъ по удобренію плодовыхъ деревьевъ сочиненіямъ.

Въ чрезвычайно ръдкихъ лишь развъ случаяхъ бываетъ опасность отъ переудобренія плодовыхъ деревьевъ навозомъ, обыкновенно же навозомъ можно удобрять, безъ боязни переудобрить. На десятину можно вносить отъ 4000 до 7000 пудовъ при удобреніи черезъ каждые 3—4 года, или отъ 2400 до 3500 п. ежегодно или черезъ два года. Плотныя глинистыя почвы, которыя нуждаются въ попутномъ разрыхленіи навознымъ удобреніемъ, лучше удобрять ежегодно. Хотя наши черноземныя почвы и не нуждаются въ максимальныхъ количествахъ удобренія, тъмъ не менте было бы большой онибкой полагать, что можно имть на этихъ почвахъ ежегодно желаемые урожаи безъ удобренія.

Навозное удобреніе, при внесеніи въ почву, закапывается на глубину 2—3 вершковъ. При этомъ подлежащая удобренію площадь земли должна занимать по возможности все пространство, гдѣ расположены мелкіе корни дерева. Было бы большой ошибкой класть и зарывать навозъ около корневой шейки. Помъщенный здѣсь навозъ останется безъ пользы, потому что около ствола находятся крупныя развѣтвленія деревьевъ безъ мелкихъ корешковъ, которые

только и способны къ воспринятію питательныхъ веществъ изъ почвы. Класть навозное удобрение близъ ствола, поэтому, можно развъ лишь у молодыхъ недавно посаженныхъ деревцовъ. При удобреніи болье или менье взрослыхь плодовыхь деревьевь, навозь кладется, нёсколько отступя отъ штамба, тамъ, гдё предполагаются уже болбе мелкія развътвленія корневой системы. А такъ какъ мелкіе корни выходять обыкновенно за предълы кроны, то удобрить надо не только площадь, занимаемую такъ называемымъ поддревеснымъ кругомъ, но и нъкоторую пограничную часть, выходящую за этотъ кругь и следовательно выходящую за пределы кроны. Особенно это надо имъть въ виду въ садахъ съ тъсной (неправильной) посадкой. Вообще же, внося удобрение, надо принять за правило раскладывать навозъ, а затъмъ и вкапывать въ почву его такъ, чтобы удобрять кольцомъ вокругъ дерева, при чемъ ширина этого кольца должна равняться радіусу кроны, выходя за предълы кроны на половину этого радіуса. Такъ, если общая ширина кроны (т. е. ея діаметръ) равна 4 аршинамъ, то, слъдовательно, радіусомъ ея будеть два аршина. Соотвътственно этому ширина удобряемаго кольца будеть также равна 2 аршинамъ, при чемъ придется начать это кольцо на разстояніи аршина отъ ствола и закончить его также на разстояніи аршина отъ внѣшнихъ краевъ кроны, т. е. вывести его на аршинъ за крону.

Удобрять навозомъ надо осенью, когда деревья вполнѣ закончатъ ростъ, въ случаѣ же если этого нельзя было сдѣлать осенью, удобреніе производится раннею весною до начала роста. Въ первомъ случаѣ берется не вполнѣ или мало перепрѣлый навозъ, во

второмъ случат навозъ болбе или менте перепръвшій.

Къ навозному удобренію должны быть отнесены и удобрительныя поливки навозной жижею, оказывающія особенно благопріятныя дъйствія на старыя съ остановившимся ростомъ деревья. Къ такимъ поливкамъ навозной жижей для усиленія плодоношенія рекомендуется прибавление фосфорнокислыхъ, калійныхъ и известковыхъ удобреній. Сюда же относятся и удобрительныя поливки настоемъ куринаго или голубинаго помета; но такъ какъ это удобрение очень сильное, то его разбавляють при внесеніи въ почву 5-6 объемами воды. Напболже подходящимъ временемъ для удобренія навозной жижей является ранняя весна. Весьма полезными оказываются повторныя удобренія навозной жижей вскор' посл' образованія завязи, въ какомъ случав употребляется не цельная, а разведенная на половину водой жижа. Наконецъ, въ случать развитія мелкихъ плодовъ ради большаго ихъ объема можетъ быть рекомендована еще одна или двъ поливки также разведенной на половину водою жижей, — въ срединъ лъта. Слишкомъ позднія удобрительныя поливки, произведенныя во второй половинъ лъта, могли бы вызвать излишній рость, т. е. повести къ недостаточному вызрѣванію къ вимъ древесины, почему вмъсто пользы можетъ получиться вредъ. При поливкъ жижею, въ почвъ дълаются углубленія, въ которыя и льютъ жижу, выливая отъ 2 до 3 ведеръ ея на 1 кв. сажень занятаго кроною пространства, при чемъ во время засухи рекомендуется жижу разбавлять на половину водой. При поливкъ большихъ деревьевъ жижей, устраиваютъ съ внъшней и внутренней стороны орошаемаго жижей пространства (кольца) валики, чтобы жижа не растекалась въ стороны.

Въ нъкоторыхъ случаяхъ, а именно-при отсутствии навоза, ночное золото, какъ удобрение, получаетъ особенное значение, при чемъ последнее повышается еще более при бедности почвы азотомъ, напр., при тощихъ песчаныхъ почвахъ. Песчаныя почвы вообще являются наиболье подходящими для удобренія ночнымъ золотомъ, связныя же глинистыя почвы часто и сильно золотомъ удобрять не рекомендуется. При удобреніи этихъ почвъ золотомъ несравненно лучше примънять послъднее съ торфомъ или переработанное въ компостъ. Въ этомъ случат, если есть возможность, лучше примънять торфъ или точнъе торфяную землю или просохшій въ достаточной степени болотный черноземъ. Имъя въ виду пользование золотомъ, какъ удобреніемъ, удобнѣе всего производить постоянную и регулярную засыпку ретирадныхъ мфстъ сухимъ торфянымъ порошкомъ, благодаря которому значительно облегчается примънение этого удобрения, и, если не совствить устраняется, то уменьшается зловоние. Относительно времени внесенія въ почву золота можно сказать то же, что и относительно навоза. Что же касается количества вносимаго въ почву золота, то по этому поводу нътъ опредъленныхъ данныхъ. Между прочимъ А. С. Гребницкій (Уходъ за плодовымъ сад мъ, стр. 129) говорить, что извъстны примъры употребленія золота до 100 ведеръ на кубическую сажень земли съ превосходными результатами Золото применяется како во цельномо, тако и во разжиженномъ видъ, т. е. въ видъ удобрительной поливки, которая предпочитается примъненію золота въ чистомъ видъ. Въ мъстностяхъ, гдъ ночное золото для удобренія плодовыхъ деревьевъ нашло широкое примънение, - говоритъ А. А. Гинценбергъ, - какъ напр., въ Богеміи, Вюртембергѣ и другихъ странахъ, оно, разжиженное на половину водою, выливается въ следующемъ количествъ на дерево: въ возрастъ 15 лътъ отъ 1 до 3 веде ъ, 20 лътъ отъ 2 до 5, 30 лътъ отъ 5 до 8, и 50 лътъ отъ 8 до 10 ведеръ. Если требуется сплошное удобреніе, то можно взять на десятину отъ 1000 до 2000 ведеръ.

Что касается примѣненія искусственныхъ удобреній, то въ данномъ случаѣ, по мнѣнію автора, требуется детальное знакомство читателя съ даннымъ вопросомъ, для раціональнаго пользованія этими удобреніями. Поэтому, авторъ интересующимся удобреніемъ въ плодоводствѣ вообще, а въ частности искусственными удобреніями,

рекомендуетъ обратиться къ спеціальнымъ сочиненіямъ, каковы, напр., Удобреніе плодоваго сада и огорода. Естественныя удобренія. Искусственныя удобренія. А. А. Гинценберга; Удобреніе плодовыхъ деревьевъ. М. Е. Софронова, и др.

Уходъ за корою.

Вороздованіе коры. Само собой разумѣется, что пока дерево молодо, когда стволь его не телстый, съ гладкою, совершенно ровною корою, то въ это время кора дерева за собою вызываетъ гораздо меньше ухода, чѣмъ въ послѣдующее время, когда стволь станетъ не только болѣе толстымъ, слѣдовательно объемистымъ, но и кора его получитъ трещины, сдѣлается грубою и потребуетъ удаленія со ствола омертвѣвшихъ ея частей. Съ возрастомъ дерево въ большей или меньшей мѣрѣ подвергается ожогамъ коры, обмораживанію и другимъ дефектамъ, кои плодоводу приходится частью предупреждать, частью исправлять и лѣчить отъ нихъ дерево.

Къ мърамъ болъе или менъе предупредительнымъ, какъ содъйствующимъ силъ и здоровью дерева, относится, между прочимъ, бороздованіе стволовъ и главныхъ развітвленій дерева, каковой операціи чаще всего и подвергаются яблони, но также и груши. Бороздованіе также можеть быть въ некоторыхъ случаяхъ произведено не безъ пользы и у косточковыхъ, напр., у черешенъ, хотя у косточковыхъ бороздование примъняется у больного дерева, слъдовательно, является средствомъ излѣчивающимъ, тогда какъ у зерновыхъ породъ вообще, а у яблони въ частности, бороздование примъняется почти съ начала жизни плодоваго дерева, послъ пересадки его изъ питомника въ садъ, и можетъ быть начато на другой годъ послѣ посадки дерева, когда послѣднее уже закоренится и будеть обладать достаточною полносочностью. Йоэтому то производить бороздование надъ только что высаженными въ плодовый садъ деревьями было бы не только безполезно, но скоръе даже вредно.

Цёль бороздованія у зерновыхъ породъ состоитъ въ усиленіи ствола и развѣтвленій дерева, которыя вслѣдствіе этой операціи утолщаются, что въ свою очередь способствуетъ болѣе скорому и желательному развитію дерева. Нѣкоторые опытные практики-плодоводы увѣряютъ, что бороздованіе отражается замѣтно благопріятнымъ образомъ на усиленіи плодоношенія, что должно особенно относиться къ яблони. Благотворное вліяніе бороздованія коры сказывается, между прочимъ, въ томъ, что стремленіе дерева къ заживленію производимыхъ бороздованіемъ порѣзовъ вызываетъ усиленный притокъ къ этимъ порѣзамъ соковъ для ихъ зарубцо-

выванія, слёдствіемъ чего является общее повышеніе живнедѣятельности дерева и циркуляціи его соковъ. Именно въ этомъ то и надо искать объясненія завѣреніямъ тѣхъ плодоводовъ, которые утверждаютъ, что бороздованіе повышаетъ плодородіе дерева (у зерновыхъ).

Нѣкоторые неопытные въ плодоводствѣ люди и новички склонны очень недовѣрчиво и даже враждебно относиться къ бороздованію, тогда какъ большинство плодоводовъ высказывается безусловно въ пользу бороздованія, рекомендуя начинать его у зерновыхъ породъ со второго года по посадкѣ дерева въ плодовый садъ. Бороздованіе состоитъ просто въ разрѣзѣ коры, причемъ избѣгаютъ по возможности запускать ножъ въ древесину, такъ какъ бороздованіе имѣетъ цѣлью лишь разъединеніе между собой недостаточно упругихъ тканей коры. Впрочемъ, если случайно ножъ и задѣнетъ слегка древесину, то это обыкновенно вгеда не приноситъ.

Самая операція бороздованія состоить въ проведеніи по стволу или развѣтвленіямъ дерева прямыхъ разрѣзовъ, идущихъ по оси ствола или развѣтвленія; слѣдовательноо, борозды, проводимыя на стволѣ, будутъ вертикальными. У молодыхъ, недавно пересаженныхъ въ плодовый садъ, деревьевъ, довольствуются однимъ или двумя порѣзами,—по одну и другую сторону ствола. Черезъ нѣкоторое время, когда стволъ молодого дерева утолстится и будетъ имѣть приблизительно въ діаметрѣ вершка 2—2½, на такомъ стволѣ дѣлаютъ 3—4 равно другъ отъ друга отстоящихъ разрѣза коры. Сообразно этому дѣлаются и разрѣзы на развѣтвленіяхъ, причемъ на нетолстыхъ развѣтвленіяхъ, особенно въ первое время, бываетъ достаточнымъ сдѣлать одинъ разрѣзъ. Такія же развѣтвленія молодой кроны, если послѣднія имѣютъ толщину мизинца или около того и вовсе нѣтъ надобности задѣвать ножомъ, подо-

ждавъ въ данномъ случат съ этою операцією годъ или два.

Время для бороздованія—поздняя весна до начала лѣта. Такъ какъ бороздованіе является операцієй очень легкой, требующей очень немного времени для ея выполненія, то съ бороздованіемъ нетрудно справиться вовремя даже и въ обширномъ плодовомъ саду. Начало сезона бороздованія можетъ быть отъ распусканія почекъ, при чемъ съ этого момента бороздованіе заканчивается недъли черезъ три.

Хотя для бороздованія и рекомендують особые ножи (съ клинкомъ, выступающимъ изъ рукоятки настолько дишь, чтобы онъ могъ разръзать только лишь одну кору), но на практикъ обыкновенно употребляютъ для бороздованія простые садовые ножи, достаточно лишь острые.

Самые разръзы коры гораздо легче вести снизу вверхъ, чъмъ въ обратномъ направленіи, что не рекомендуется. Бороздованіе производится, пока дерево еще не старо, и пока оно обладаетъ

нетолстой, легко поддающейся поръзамъ, корой. У двадцатилътняго или нъсколько болъе молодого дерева яблони, кора становится уже настолько плотною и грубою, что бороздование не даетъ того эффекта, ради котораго оно производится и потому не достигаетъ цъли. Впрочемъ, необходимо подчеркнуть, что, говоря здъсь о предъльномъ возрастъ деревьевъ для бороздования, такового въ точности никакъ установить нельзя. Предъльный возрастъ этотъ, между прочимъ, сказывается въ переходъ молодой коры въ старую, а старая кора будетъ загрубълая, потрескавшаяся, легко отдъляющая отъ себя кусочки корки. Съ этого момента бороздование и становится безполезнымъ.

У косточковыхъ, чаще всего у черешни, а также у мореллей и сливъ, какъ уже говорилось, также рекомендуется примънять бороздованіе коры, какъ излъчивающее средство, помогающее зальчиванію и исцъленію ранъ, образующихся вслъдствіе солнечныхъ ожоговъ, морозобоинъ и другихъ причинъ.

Въ этомъ случат производятъ продольные или поперечные, вообще же параллельные другъ другу надртвы коры по всему пораненію или больному місту такимъ образомъ, чтобы эти надртвы захватили вершка на полтора и здоровыя части коры, расположенныя близъ раны. Благотворное дійствіе надртвовъ здісь сказывается въ томъ, что эти надртвы какъ и у зерновыхъ породъ, напр., у яблони, привлекаютъ къ себт соки дерева, дійствіе коихъ здісь становится болье энергичнымъ, что и содійствуетъ затягиванію и исціленію раны.

Бороздованіе коры является операціей, которая примѣнима во всѣхъ климатахъ и при всѣхъ географическихъ широтахъ, развѣ за исключеніемъ весьма сѣверныхъ мѣстностей. Но вообще, гдѣ яблоня культивируется съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ, тамъ бороздованіе, предпринимаемое вездѣ весною, вполнѣ примѣнимо. Поэтому, будутъ правы тѣ, которые утверждаютъ, что бороздованіе примѣнимо вездѣ или почти вездѣ.

Чистка коры. Чистка коры выпадаетъ, главнымъ образомъ, на тѣ мѣсяцы, когда въ саду имѣется наиболѣе свободное время, за исключеніемъ лишь морозныхъ дней. Такимъ свободнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ безморознымъ является конецъ лѣта и вся осень, вплоть до наступленія зимнихъ холодовъ. Отчасти временемъ, въ которое производится очистка коры, является и ранняя весна, при условіи, конечно, если тогда имѣются для выполненія этой работы свободныя руки. Особенно подходящимъ временемъ для очистки коры является поздняя осень съ ея насквозь пронизывающей (по крайней мѣрѣ во многихъ мѣстностяхъ Имперіи) сыростью, что очень облегчаетъ оскребываніе коры и отдѣленіе отмерзшихъ, шелушистыхъ ея частей отъ здоровыхъ. Въ южной половинѣ Имперіи, а иногда даже и въ средней Россіи очистку коры можно производить

и зимою во время болье или менье продолжительных оттепелей, при которых в настаеть благопріятная для этой работы осенняя сырая погода. Одновременно съ очисткой коры отъ отмершихъ,



Рис. 125. Очистка коры. Подъ деревомъ подостланы рогожи, на которыя и падаютъ всѣ обрѣзки.

шелушистых вен частей, съ коры, благодаря сырой погодъ, особенно легко удаляются лишаи и мохъ.

Для производства оскабливанія и очистки коры предлагаются различных формъ и системъ жельзные скребки, пользу которыхъ врядъ ли кто станетъ отвергать, но нельзя сказать, чтобы эти

металлическіе скребки у насъ нашли большое распространеніе. Происходить это потому, что наши плодоводы въ нихъ мало нуждаются, съ успѣхомъ замѣняя ихъ деревянными ножами, т. е. попросту деревянными дощечками, обточенными съ одного края и имѣющими подобіе ножей.

Изъ скребковъ, предложенныхъ за границей и предназначаемыхъ для чистки коры инструментовъ, у насъ болъе вышеупомянутыхъ заграничныхъ скребковъ скорве бы нашли примвненіе жельзныя и такъ называемыя сіамскія щетки съ очень грубой и твердой щетиной, которая въ предупреждение полома передъ употребленіемъ въ дёло должна у сіамскихъ щетокъ смачиваться. Жельзныя щетки кое-гдь у нась продаются на складахъ садовыхъ орудій, сіамскія же щетки у насъ пока большая редкость, и какъ таковая можетъ быть замънена щетками, употребляемыми для мытья половъ и бълья, тъмъ болъе, что такія щетки можно достать всюду, и онъ дешевы. Загрубълая, толстая и вмъстъ съ тъмъ состоящая изъ значительной мертвой части кора скоблится не деревянными или другими какими-либо скребками или щетками, а очищается просто садовымъ ножомъ. При очисткъ коры ствола, вокругъ ствола дерева кладутся рогожи, на которыя и падаютъ отделяемыя отъ дерева части коры, которыя, потомъ тщательно собираются и немедленно сжигаются, какъ содержащія въ себъ обыкновенно разныхъ вредителей, особенно изъ міра насъкомыхъ.

Обмазка коры и обмываніе ея. Тольке что описанная очистка коры отъ старыхъ, помертвёлыхъ ея слоевъ и чешуистыхъ частей является подготовительной работой, за которою слёдуетъ производимая также ежегодно обмазка коры и ея обмываніе, для чего въ плодоводствё обыкновенно принято пользоваться жидкими растворами, наносимыми на дерево чаще всего мочальными самодёльными кистями. Эти кисти надёваются или прямо на длинную палку, или предварительно укрёпляются на короткую палку, которая уже прикрёпляется подъ угломъ къ другой, болёе длинной палкё или рукояткё.

Такими кистями и наносятся известковое молоко или другіе, разведенные въ водѣ, составы на дерево, т. е. какъ на его стволъ, такъ и на главныя развѣтвленія дерева.

Безусловно, что въ не очень обширныхъ, промышленныхъ садахъ, долгое время будутъ придерживаться обмазки деревьевъ кистями, хотя, какъ это будетъ видно изъ нижеслъдующаго, обмазка кистями является далеко не совершеннной и значительно уступаетъ опрыскиванію деревьевъ изъ помпъ или насосовъ. Но огромная выгода обыкновенной кистевой обмазки состоитъ въ дешевизнъ этого способа.

Сперва въ Америкъ, а затъмъ и въ Западной Европъ, стали кистевую обмазку, какъ первобытный способъ, оставлять и пере-

ходить (конечно, только при болье или менье обширныхъ культурахъ) къ машинной работъ, т. е. къ опрыскиванию растворами изъ очень сильныхъ помпъ, равныхъ по силь дъйствия пожарнымъ насосамъ. Въ данномъ случаъ только такой, очень сильный, снаб-




Рис. 126. Обмазываніе коры известью.

женный большимъ воздушнымъ колпакомъ, насосъ и является пригоднымъ для такой цёли, ибо приходится выкачивать и выбрасывать болёе или менёе густыя жидкости, съ коими работать обыкновенными, менёе сильными насосами, невозможно. Изъ такихъ насосовъ А. С. Гребницкій указываетъ на насосъ системы Ноэля, стоящій 150 рублей, производительность котораго 800 ведеръ въ часъ.

Въ настоящее время во многихъ раціонально поставленныхъ плодовыхъ садахъ деревья ежегодно опрыскиваются известью и жельзнымъ купоросомъ. Сперва дълается $10^{\circ}/\circ$ растворъ жельзнаго купороса, и затъмъ къ нему прибавляется известь, чтобы она съ растворомъ жельзнаго купороса образовала свободно проходящее черезъ наконечникъ опрыскивателя молоко.

Для обмазыванія коры дерева, какъ уже было сказано, употребляется известковое молоко, т. е. погашенная известь, доведенная до густоты сливокъ. Цель такой обмазки или покрыванія известью коры дерева (чаще всего при работъ кистями одного ствола и главныхъ развътвленій дерева) состоить съ одной стороны въ томъ. чтобы защитить дерево отъ разныхъ паразитовъ. Покрывая дерево известью, мы съ одной стороны запломбировываемъ всъ трещины на коръ и, слъдовательно, тъмъ самымъ закупориваемъ и умерщвляемъ вредителей, гивздящихся въ корв, а съ другой стороны преграждаемъ доступъ къ коръ дерева этимъ вредителямъ извиъ. Подъ вредителями же въ данномъ случав приходится разуметь какъ насъкомыхъ съ ихъ личинками и яйцами, такъ и грибныя споры. Кромъ того, въ данномъ случат известковое молоко дъйствуетъ какъ и очистительное средство, разъбдая верхнія, остающіяся на деревь, отмирающія чешуйки коры и подготовляя ихъ тъмъ самымъ къ наиболъе легкому удаленію съ дерева при последующей чистке коры. Словомъ, известь или известковое молоко дъйствуетъ на кору очищающимъ и освъжающимъ образомъ. Но помимо всего этого, благотворное дъйствіе извести сказывается въ томъ, что выдъленная ею кора отражаетъ солнечные лучи, предохраняя тымъ самымъ дерево отъ солнечныхъ ожоговъ, превращающихся потомъ въ раны. Вслёдствіе отраженія солнечныхъ лучей выбъленныя известью деревья весною менъе пригръваются солнцемъ, чёмъ не выбеленныя, и вследствие этого позднее распускаются и зацвътають, а такое запаздывание деревьевъ въ развитии и цвътеніи уберегаеть цвыть оть поврежденія его весенними утренниками. Мимоходомъ еще скажемъ, что покрывание всего дерева известью, достигаемое опрыскиваниемъ изъ сильныхъ насосовъ, покрывая цвфточныя почки и заковывая ихъ такимъ сбразомъ до поры до времени въ нѣкоторую броню, препятствуетъ раннею весною вреднымъ насъкомымъ (долгоносикамъ) дълать уколы и откладывать въ эти уколы яички, а также защищаетъ одновременно деревья и отъ другихъ вредителей.

Обмазка деревьевъ известью производится, главнымъ образомъ, осенью. Въ мъстностяхъ съ мягкими маломорозными или безморозными зимами есть полное основаніе поступать по заграничному, производя побълку известью тотчасъ послѣ чистки коры зимою. А. С. Гребницкій предлагаетъ для обмазки деревьевъ смѣсь изъ 2 частей извести, 1 части глины и 1 части коровьяго помета.

Для отпугиванія же отъ деревьевъ грызуновъ, избъгающихъ дурного запаха, къ этой смъси прибавляютъ дурно и остропахнущія
вещества—нафталинъ, ассафетиду, масло оленьяго рога и др. А. С.
Гребницкій указываетъ на примъненіе для обмывки деревьевъ десятипроцентнаго (и болье кръпкаго) раствора жельзнаго купороса,
который недорогъ; такая обмывка деревьевъ, съ помощью опрыскивателей, примъняется раннею весною до распусканія почекъ и
даетъ поразительные результаты: мохъ и лишаи исчезаютъ, дерево
развиваетъ здоровый ростъ. Съ своей стороны къ этому добавлю,
что растворять для этой цъли жельзный купоросъ надо непремънно кипяткомъ и потомъ, разбавивъ этотъ первоначальный
кръпкій растворъ до должной пропорціи водою, немедленно приступать къ обливанію имъ деревьевъ или опрыскиванію. Иначе,
при стояніи раствора жельзнаго купороса на воздухъ, онъ разлагается, и растворъ его принимаетъ мутно-ржавый цвътъ.

Лѣченіе ранъ и морозобоинъ. Раны чаще всего встрѣчаются на стволь, потому что стволь въ этомъ отношении является наиболье уязвимымъ мъстомъ. Послъ ствола въ наибольшей, само собой разумъется, степени подвержены ранамъ и изъязвленіямъ главныя части развътвленій кроны, какъ непосредственное продолжение ствола. Раны можно распредълять на только что полученныя деревомъ, такъ сказать, свъже-нанесенныя и болъе или менъе застарълыя, получившіяся изъ небольшого пораненія дерева, но увеличившіяся въ своемъ размъръ вслъдствіе того, что своевременно на причиненное дереву поранение не было обращено должнаго вниманія. Всякое пораненіе дерева, неосторожно нанесенное человъкомъ, орудіями, колесами и т. п., равно какъ и пораненія, причиняемыя грызунами (о вредв грызуновъ будетъ говориться ниже въ своемъ мъстъ) должны быть немедленно подвергнуты должному личенію и уходу, какъ только будуть замичены. Чъмъ больше будетъ запущена рана, тъмъ она сильнъе будетъ полвержена вліянію солнца и воздуха и, следовательно, обнаженная раною древесина и разорванныя части коры тамъ болае будутъ подвержены внъшнимъ разрушительнымъ вліяніямъ. Поэтому, какъ только рана будеть замъчена, необходимо сейчасъ же принять соотвътствующія мъры, которыя состоять въ следующемъ. Прежде всего поврежденная и расщепленная древесина совершенно сглаживается острымъ ножомъ, а затъмъ сглаживается до здороваго мъста и поврежденная кора; другими словами, до здороваго мъста острымъ ножомъ удаляются поврежденные и размочаленные края коры. Затемъ сглаженная такимъ образомъ рана покрывается замазкой изъ смъси жирной глины съ мякиной, которая дълаетъ эту замазку болье связной, дабы посльдняя лучше держалась и покрывала рану. За отсутствіемъ мякины и даже при наличности таковой, въ жирную глину кладуть вмёсто мякины коровій навозъ и дёлаютъ изъ всего этого родъ тёста, которое, слёдовательно, и наносится на раны. Рана затягивается и исцёляется надлежащимъ образомъ только тогда, когда она до заживленія будетъ все время покрыта этой замазкой. Чтобы такая замазка не отставала и не сваливалась съ мёста, т. е. съ раны, она сверху забинтовывается тряпкою или рогожею и затягивается, т. е. зашнуровывается для необходимаго скрёпленія бичевой. Въ этомъ собственно и состоитъ лёченіе недавно полученныхъ деревомъ и скоро замёченныхъ ранъ. Находясь подъ защитой замазки, обвязанная такимъ образомъ рана начинаетъ изъ ровно обрёзанныхъ краевъ керы развивать наплывы свёжей ткани, и, въ концё концовъ, рана сама собой зарубцовывается.

Имѣя въ виду возможно быстрое заживленіе ранъ отъ открывшихся, при удаленіи сучковъ и крупныхъ развѣтвленій дерева, спиливаній или порѣзовъ необходимо поверхность отпиленнаго мѣста, гдѣ былъ отнятъ сукъ также тотчасъ сгладить ножомъ, чтобы гладкою была и обнаженная древесина, и обнаженное кольцо коры. Затѣмъ эта рана также покрывается глиняной замазкой, въ которую нѣкоторые садоводы для большей связности и крѣпости

прибавляютъ часть извести.

Покрываніе вышеприведенными замазками рант и обнаженной древесины не только помогаетт образованію наплывовт изъ краєвт здоровой коры, но и препятствуетт проникновенію вт обнаженную древесину извит болтанстворных зародышей, причиняющих гнилость древесины. Если рана запущена, то обыкновенно мы уже имтемт дтя оста омертвтой и сухой древесиной. Эти раны покрываются для защиты отт дальнтивают разрушенія или каменноугольнымт дегтемт, или масляной краской, или, наконецт, просто олифой.

Образующіяся отъ поломки сучьевъ и другихъ подобныхъ поврежденій дупла заполняются цементомъ съ щебнемъ, тъстообразною смёсью глины съ известью и тому подобными смёсями. Передъ этимъ дупло выскабливается, внутренняя поверхность его по возможности, выравнивается, дабы удалить изъ дупла наиболже пораженныя части древесины и пріостановить дальнъйшее разрушеніе посл'ядней. Если дупло небольшое и им'я бол'я или менъе цилиндрическую форму, то для его заполненія въ него вбивають деревянную соотвътствующихъ размъровъ и формы дупла втулку, передъ закладкой которой внутреннюю поверхность заполненнаго дупла весьма полезно обмазать или каменноугольнымъ дегтемъ (но не газовымъ, который для этой цёли непригоденъ) или масляной краской, или олифой. При этомъ выступающій изъ дупла конецъ втулки подпиливается въ уровень съ краями дупла. Заживленію ранъ у косточковыхъ, какъ это было видно изъ вышеизложеннаго, содъйствуетъ вышеописанное бороздование неповрежденной, находящейся вблизи раны, коры.

Дальнвишая обрвака кроны въ плодовомъ саду. После того какъ дерево высажено на постоянное мъсто въ плодовый садъ, начинается уходъ за его кроной, т. е. за ея правильнымъ развитіемъ, при чемъ этотъ уходъ особенно выражается въ ръзкъ и въ удаленіи изъ кроны лишнихъ или препятствующихъ правильному развитію кроны развътвленій. При выведеніи молодой кроны въ плодовомъ саду (имъются въ виду яблони и груши), т. е. при образованіи второго и третьяго ярусовъ и дальнъйшемъ развитіи кроны, различаютъ двъ формы послъдней—котлообразную и пирамидальную. При выведеніи кроны въ большинствъ случаевъ останавливаются на пирамидальной кронъ, котлообразную же и шаровидную форму кронъ примъняютъ у тъхъ сортовъ, которые по природъ своей склонны къ такой формъ кроны, а не къ пирамидальной.

Мы принимаемъ, что дерево посажено въ плодовый садъ съ одноярусными кронами; поэтому нашей задачей является выве деніе сперва второго этажа кроны, а затѣмъ черезъ годъ, т. е. въ слѣдующую весну и третьяго яруса кроны. По выведеніи же этого третьяго яруса кроны, дерево уже предоставляется самому себѣ, и изъ кроны удаляются по мѣрѣ надобности только излишнія, причиняющія чрезмѣрную густоту, развѣтвленія. Каждый послѣдующій ярусъ долженъ начинаться отъ нижняго яруса, т. е. отъ послѣдней верхней вѣтки этого нижняго яруса, на приблизительномъ разстояніи 10—12 вершк. При этомъ верхній, растущій вертикально побѣгъ продолженія какъ перваго, такъ и остальныхъ двухъ располагающихся надъ нимъ ярусовъ подвязывается, какъ и въ питомникѣ, къ шипу, который весною слѣдующаго года удаляется.

При выведеніи развѣтвленій второго и третьяго яруса, эти вѣтви располагаются такимъ образомъ по отношенію къ вѣтвямъ нижняго яруса, чтобы онѣ по возможности заняли срединное положеніе между ними. Каждый ярусъ кроны долженъ, какъ и первый, состоять изъ пяти основныхъ главныхъ равномѣрно расходящихся въ стороны вѣтвей и верхушечнаго побѣга продолженія. Главныя отходящія въ стороны развѣтвленія кроны при формировкѣ ярусовъ должны отходить отъ ствола приблизительно подъ угломъ въ 45°. Развѣтвленія же, направленныя слишкомъ близко къ стволу, должны быть отодвинуты отъ послѣдняго, т. е. быть направлены помощью распорокъ до сказаннаго угла въ 45°, а развѣтвленія, слишкомъ отошедшія отъ этого направленія, т. е. наклоненныя слишкомъ книзу, придвигаются до должнаго разстоянія къ стволу помощью ихъ привязки къ послѣднему.

Обръзка главныхъ отходящихъ въ сторону однолътнихъ развътвленій кроны состоить въ ихъ укорачиваніи приблизительно на одну треть, т. е. оставляется приблизительно 2/3 побъга; болъе

коротко рѣжутся только слишкомъ длиниме побѣги, т. с. отъ нихъ отнимается болѣе $^{1}/_{3}$, болѣе же слабыя вѣтви рѣжутся еще менѣе, а самыя слабыя вѣтви кроны и совершенно не обрѣзаются. Такъ какъ при выведеніи ярусовъ кроны нижніе побѣги всегда склонны давать болѣе слабый ростъ, чѣмъ верхніе, то, чтобы выровнять ихъ въ отношеніи силы роста съ верхними побѣгами, надъ двумя или тремя нижними глазками, предназначенными для развитія побѣговъ выводимаго яруса, дѣлаются полулунные надрѣзы.

Верхній, направляемый вертикально побътъ при выведеніи ярусовъ, какъ уже было сказано, ръжется на опредъленномъ разстояніи, т. е. на немъ оставляется (не считая шипа) часть длиною въ 10—12 вершк. Ръзка расходящихся въ сторону основныхъ вътокъ кроны производится всегда на наружный глазокъ и только за неимъніемъ такого подходящаго наружнаго глазка ръзка производится на боковой глазокъ.

Укороченные боковые основные побъги или развътвленія кроны вслъдствіе обръзки или укорачиванія не замедлять развить на нихъ побъги; эти побъги, если ихъ не укорачивать (а иногда вследствіе надобности при излишней густоть не удалять) нередко ведуть къ чрезмърному сгущенію образуемыхъ ярусовъ. Чтобы избѣжать такого чрезмѣрнаго сгущенія побѣговъ въ молодыхъ ярусахъ, этимъ боковымъ побъгамъ, находящимся на главныхъ основныхъ вътвяхъ, не даютъ развътвляться на разстояніи 12 и даже 16 вершк. отъ мъста выхода основныхъ развътвленій кроны. Имън это въ виду, боковые, развивающиеся на основныхъ вътвяхъ кроны, побъги укорачиваются въ началъ лъта прищипкой верхушекъ, когда онъ достигнутъ въ длину 3-4 вершк. Если такая прищипка верхушекъ этихъ побъговъ повлечетъ за собою дальнъйшее ихъ удлиннение и развитие нобъговъ, то приблизительно черезъ мъсяцъ послъ первой прищипки производится вторая прищипка. Если по той или другой причинъ лътняго прищипыванія побъговъ не производилось, то эти неприщипнутые побъги, чтобы они не давали излишней густоты въ образуемыхъ

до 2—3 глазковъ или на 1—2 вершка.

Что касается той вертикальной части продолженія ствола, которая образуеть разстояніе между ярусами, то и на ней развиваются побъги. Эти побъги, само собой разумъется, не должны превращаться въ вътви, такъ какъ въ такомъ случат они вели бы къ ненужной или върнъе къ недопустимой густотъ кроны. Поэтому, развивающіеся здъсь побъги одинъ или два раза лътомъ прищипываются, а весною при весенней обръзкъ удаляются совсъмъ.

ярусахъ, укорачиваются, т. е. подръзываются на всемъ протяже-

ніи главной вътки отъ ся основанія на разстояніи 14—16 вершк.

Послѣ того какъ выведены три яруса кроны, какъ уже сказано, дерево предоставляется, въ отношении послѣдующаго его

развитія, самому себъ и въ дальнъйшемъ уходъ за кроною сводится, главнымъ образомъ, къ ея прочисткъ или къ проръживанію, т. е. къ удаленію изъ нея излишнихъ и ненужныхъ развътвленій, вызывающихъ излишнюю густоту и потому мъщающихъ правильному росту кроны и нарушающихъ нормальную урожайность дерева.

При этомъ слѣдуетъ разъ навсегда принять за правило, что необходимо такія лишнія, мѣшающія правильному развитію кроны вѣтви, удалять во время, т. е. не допускать ихъ долгаго существованія на деревѣ, потому что въ противномъ случаѣ приходится имѣть дѣло съ удаленіемъ, т. е. съ вырѣзкой черезчуръ большихъ вѣтвей и даже сучьевъ дерева, вслѣдствіе чего послѣднему наносятся большія раны и жестокія ампутаціи, чего уже никакъ нельзя признать нормальнымъ и допустимымъ.

Удаленію изъ кроны прежде всего будутъ подлежать вътви, растущія не только параллельно, но и настелько придвинутыя одна къ другой, что явно мъщаютъ другъ другу въ правильномъ ихъ развитіи. Необходимо стремиться кт тому, чтобы главныя развътвленія кроны находились между собою на разстояніи около 10 вершк. Далѣе, удаленію изъ кроны будутъ подлежать вътви, трущіяся одна о другую, вътви, направляющіяся не наружу, а внутрь кроны и перекрещивающіяся между собой. Изъ такихъ вътвей, само собой разумъется, удаляется вътвь, расположенная наименъе благопріятно по отношенію къ другой. Далѣе удаленію изъ кроны будутъ подлежать поврежденныя, высохшія и вообще погибшія отъ мороза и другихъ поврежденій вътви. Кромъ того, удаленію будутъ подлежать и водяные побъги или волчки, если они не назначаются для заполненія пустыхъ мъстъ въ кронъ на мъсто погибшихъ по той или другой причинъ вътвей.

Все вышесказанное, какъ относительно образованія ярусовъ, такъ и относительно проръживанія кроны, касается яблонь и грушъ, а не косточковыхъ породъ, у которыхъ послѣ выведенія перваго яруса, дерево обыкновенно предоставляется самому себѣ.

Кромъ того, и изъ числа сортовъ, хотя бы яблонь, есть такіе, которые по самой своей природѣ неспособны къ развитію правильныхъ кронъ и къ созданію болѣе или менѣе симметрично располагающихся одинъ надъ другимъ ярусовъ, какъ, напр., Литовская Пепинка или Осенній Штрейфлингъ. У такихъ сортовъ, какъ у косточковыхъ породъ, приходится ограничиваться уже только выведеніемъ одного перваго яруса, а затѣмъ крона дерева развивается сама собою, при чемъ заботятся лишь о своевременномъ удаленіи излишнихъ, причиняющихъ густоту, развѣтвленій. Прочистку кроны и удаленіе изъ нея лишнихъ развѣтвленій въ средней, а особенно въ сѣверной Россіи приходится производить весною, точно такъ же, какъ и въ южной части Россіи, напр., въ Малороссійскихъ губерніяхъ и во-

обще тамъ, гдѣ вимы бываютъ болѣе или менѣе суровы и моровны, и гдѣ оту работу также приходится производить весною. Въ противномъ случаѣ дереву можетъ грозить опасность отъ нанесенія ранъ на зиму. Въ болѣе же теплыхъ мѣстностяхъ, гдѣ не приходится бояться зимнихъ морозовъ, оту работу можно производить и осенью, а въ самыхъ южныхъ мѣстностяхъ или мѣстностяхъ крайняго юга—съ наступленіемъ осени и до весны, т. е. до развитія почекъ.

Защита цвътовъ и плодовъ на деревъ отъ мороза. Помимо всъхъ прочихъ работъ въ садахъ, приходится предпринимать работы по защитъ цвътовъ во время весеннихъ утренниковъ. Весенніе заморозки поражаютъ неръдко не только цвъты, но и завязи, именно, у рано цвътущихъ косточковыхъ, сочныя молодыя

завязи также гибнуть отъ сильныхъ утренниковъ.

Въ качествъ предупредительной мъры для спасенія цвътовъ отъ гибельнаго вліянія утренниковъ предпинимается въ концѣ зимы утаптываніе спѣга на поддревесныхъ кругахъ съ покрытіемъ послѣднихъ сильно соломистымъ навозомъ, просто соломой или другимъ какимъ-либо подобнымъ матеріаломъ. Цѣль такой мъры—искусственно вызываемое запозданіе цвътенія дерева, вслѣдствіе

чего цвъты уходять отъ утренниковъ.

Затъмъ, въ борьбъ съ заморозками или утренниками пользуются окуриваніемъ сада дымомъ. Эта міра можеть быть использована въ случат надобности и осенью, если приходится защищать отъ осенняго утренника находящіеся еще на деревъ плоды. Для окуриванія, защищающаго цвіты отъ замораживанія, употребляется сыроватый хворость и т. п. матеріаль, дающій какъ можно больше дыма. Съ этою цёлью такой матеріаль заготавливается заблаговременно и раскладывается въ кучахъ, зажигаемыхъ вечеромъ съ такимъ расчетомъ, чтобы дымъ окутывалъ деревья какъ можно сильне всю ночь и часть утра, словомъ, до момента прекращенія утренника. На каждыхъ 6 кв. саженяхъ должно быть устроено не менъе одной кучи. Обыкновенно приходится заготовлять двойной комплекть кучь, потому что куча часто сгораеть въ теченіе 2-3 часовъ, и цвъты тогда замерзаютъ. Между тъмъ, необходимо значительно болье продолжительное горьніе кучь, которыя зажигають, какъ только вечеромъ термометръ опустится до 10 или + +2°. При окуриваніи, къ сожальнію, часто дылають ошибку, а именно слишкомъ поздно зажигаютъ и рано прекращаютъ окуриваніе.

Въ настоящее время изъ С. Америки рекомендуютъ новое средство противъ утренниковъ или заморозковъ, состоящее въ отопленіи сада грѣлками или жаровнями. У насъ уже примѣнялось отопленіе цвѣтущихъ садовъ въ Курской губ. и, по отзывамъ А. А. Гинценберга, дало прекрасные результаты. Примѣняемыя для

отапливанія цвётущихъ садовъ грёлки, или жаровни, представляютъ собою желёзную воронку съ отверстіями въ ея стёнкахъ для притока къ топливу воздуха. Воронка эта ставится на желёзный же треножникъ. Сперва для горѣнія (собственно на под-

топку) идеть дерево, т. е. дрова или сухой хворость, на который кладется каменный уголь. Такія грѣлки могуть горѣть отъ 8 до 12 часовъ. Но ихъ надо много,—на каждыя 2—3 квадр. саж. по грѣлкѣ, снабжаемой крышкой. По словамъ заграничной печати, хотя отопленіе и обходится не столь дешево, какъ это было бы желательно, но тѣмъ не менѣе оно вполнѣ себя окупаетъ, такъ какъ спасаетъ урожай отъ гибели. Этими грѣлками при морозѣ въ—2 градуса можно температуру поднять свободно до—4° и даже до—7° тепла.



Рис. 127. Грълка для плодоваго сада (общій видъ).

Въ случав сильнаго пониженія температуры приходится зажигать второй комплекть жаровень. Въ тъхъ мъстностяхъ, гдв дешевы дрова, для отопленія цвътущаго сада можно пользоваться просто кострами, поддерживая въ нихъ огонь всю ночь до минованія опасности отъ мороза.

Подпора обремененных плодами вътвей и сборъ урожая. Подпора обремененных плодами вътвей и сучьевъ производится посредствомъ кольевъ или шестовъ. Въ извъстномъ подъ

Рис. 128. Грѣлка для плодоваго сада (разрѣзъ).

Москвою саду Т. И. Коробкова употребляются для подпоры шесты, у которыхъ къ одному изъ концовъ прибивается гвоздями кусочекъ такого же шеста (одинаковой толщины). Затъмъ оба конца, т. е. шестъ и прибитая къ нему часть спиливаются подъ угломъ, такъ что образуется трехугольная выемка, въ которую и вкладывается опирающійся на шестъ сукъ. За служащими для опоры шестами далеко нелишне слъдить въ смыслъ чистоты, ибо при помъщеніи ихъ подъ леревьями они привлекаютъ къ себъ насъкомыхъ. Между прочимъ, иногда на шесты-подпоры надъваютъ ловчія кольца изъ ваты или древесной шерсти противъ плодожорки.

Сборъ урожая находится въ зависимости отъ сезона созрѣванія плодовъ. Ранніе лѣтніе сорта яблокъ и грушъ должны срываться за нѣсколько дней до наступленія полной спѣлости, такъ какъ, если они перевисятъ на деревѣ, то тогда теряютъ во вкусѣ и сочности, становясь мучнистыми. Зимнія яблоки и особенно груши должны висѣть возможно дольше на деревѣ.

Чёмъ дороже и нёжнёе плоды, тёмъ тщательнёе они собираются. Въ садахъ со взрослыми яблонями и грушами, т. е. съ высокими деревьями, нельзя обойтись безъ особыхъ орудій, предназначаемыхъ для снятія съ дерева плодовъ, такъ называемыхъ плодоснимателей. Въ большинстве случаевъ, пользуются наиболёе простыми плодоснимателями, но нельзя не отмётить большую пользу, которую при уборкъ урожая могутъ принести пружинные

плодосниматели, которые относительно недороги.

Кромѣ плодоснимателей, при уборкѣ урожая необходимыми принадлежностями часто бывають козлы, лѣстницы и корзины съ ручками. Упавшіе на землю плоды—яблоки и груши, при ударѣ о вемлю получаютъ поврежденія и потомъ пятна. Такіе поврежденные плоды не годятся для долгаго храненія и должны быть немедленно употреблены въ дѣло. Поэтому то сборъ плодовъ, особенно зимнихъ сортовъ, и требуетъ большей осторожности, при чемъ приходится смотрѣть не только за цѣлостью плодовъ, но и за цѣлостью самихъ деревьевъ, особенно же за цѣлостью плодовой древесины, съ которой нерѣдко обращаются болѣе, чѣмъ небрежно, уменьшая урожайность дерева въ будущемъ.

Изъ косточковыхъ плодовъ при сборъ вишенъ употребляются ножницы, которыми переръзывается плодоножка, съ которою плоды

идуть въ продажу.

Что касается упаковки плодовъ для пересылки, то въ настоящее время стремятся по возможности къ наименьшей величинъ, къ трехпудовымъ и даже двухпудовымъ ящикамъ взамънъ прежнихъ пятипудовыхъ. Дешевый же упаковочный матеріалъ, солому стараются тоже замънить древесной шерстью. Конечно, здъсь не имъются въ виду дорогіе и вообще цънные плоды, которые при упаковкъ заворачиваются въ бумагу и перекладываются въ ящи-

кахъ бумажной стружкой.

Что касается зимняго храненія плодовъ, то послѣдніе хранятся въ особыхъ спеціально для того предназначенныхъ помѣщеніяхъ, которыя называются плодохранилищами. Устройство ихъ весьма разнообразно, но при этомъ плодохранилища должны удовлетворять основнымъ двумъ условіямъ,—они должны обладать ровной температурой, около — 1°, и не страдать избыткомъ влажности воздуха, излишекъ которой удаляется, впрочемъ, помощью т. н. влагопоглотителей, при чемъ съ этой цѣлью употребляется чаще всего хлористый кальцій.

Кто желаетъ сохранять плоды на зиму, тому необходимо ознакомиться съ этимъ предметомъ во всёхъ подробностяхъ, которыя читатель найдетъ въ спеціальномъ нашемъ изданіи: «Зимнее хра-

неніе плодовъ и овощей».

V. Борьба съ вредителями.

Планомърная и вмъстъ съ тъмъ неустанная борьба съ вредителями занимаетъ въ плодоводствъ чрезвычайно видное мъсто, потому что безъ нея всъ труды плодовода сплошь и рядомъ сводятся на нътъ.

Кромъ нъкоторыхъ животныхъ (грызуновъ) главными вредителями плодовыхъ растеній являются или насъкомыя, или паразитные грибки; послъдніе представляютъ собою низшіе невидимые простымъ глазомъ организмы, причиняющіе бользни растеній.

Въ настоящее время въ большомъ ходу особые аппараты, примѣняемые въ борьбѣ съ этими вредителями, такъ называемые опрыскиватели, системъ которыхъ теперь уже стало немало, и среди нихъ есть болѣе слабые, и соотвѣтственно этому болѣе дешевые, и болѣе сильные и производительные аппараты, а слѣдовательно, и болѣе дорогіе. Самое опрыскиваніе жидкими составами, убивающими и отравляющими вредителей растеній, представляеть одну изъ лучшихъ и наиболѣе дѣйствительныхъ мѣръ въ борьбѣ съ вредителями, т. е. съ насѣкомыми и болѣзнями, хотя, къ сожалѣнію, для нѣкоторыхъ вредителей изъ насѣкомыхъ опрыскиваніе непримѣнимо, такъ какъ не достигаетъ цѣли и потому для такихъ вредителей примѣняются другія средства и мѣры борьбы.

Жидкости и составы, употребляемые въ борьбъ съ вредителями, насъкомыми или паразитными грибками, т. е. болъзнями раздъляются на двъ категоріи, на инсектисиды и фунгисиды. Инсектисиды употребляются для борьбы съ насъкомыми, а фунгисиды—съ паразитными грибками или, какъ теперь говорять, фунгисиды

служать для льченія растеній.

Въ свою очередь инсектисиды могутъ быть подраздълены на двъ группы. Къ первой группъ относятся такіе инсектисиды, которые попадають въ желудокъ насѣкомаго вмѣстѣ съ поѣдаемыми ими листьями и другими частями растеній. Сюда относятся яды, которыми нарочно для этого и часто заблаговременно опрыскиваются растенія. Ко второй же группъ относятся такіе инсектисиды, которые входять въ соприкосновение съ насъкомыми и, попадая на его тело, такимъ образомъ убиваютъ его. Къ сожалению, инсектисиды этой второй категорія непримінимы съ успіхомъ ко встмъ насткомымъ, такъ какъ наружные покровы, напр., у жуковъ, слишкомъ тверды и потому не пропускаютъ чрезъ себя ядовитыхъ веществъ въ тело насекомыхъ. Зато эти инсектисиды отлично помогають противъ мягкотелыхъ насекомыхъ, каковы гусеницы и травяныя тли. Между прочимъ, следуетъ сказать, что въ борьбъ съ вредителями различають жующихъ и сосущихъ насъкомыхъ. Жующія насъкомыя отравляются ядомъ, который они поглощають съ пищей. Но сосущихъ насъкомыхъ, а именно вшей или травяныхъ тлей нанесеннымъ, путемъ опрыскиванія, на растенія ядомъ отравить возможно не всегда, потому что тли не фдять наружныхъ листьевъ и другихъ покрововъ, а сосутъ сокъ зеленыхъ частей растенія, опуская для этого внутрь ихъ хоботки. Поэтому при истребленіи этихъ сосущихъ насткомыхъ опрыскиваніе инсектисидами производится не только заблаговременно, но и въ самый моментъ ихъ появленія. Иногда примъненіе опрыскиванія инсектисидами разсчитано на то, чтобы отравить тѣ яички, которыя насъкомыя кладутъ на наружныя части растеній.

Что касается борьбы съ паразитными грибками или лѣченія растеній отъ болѣзней, то лѣченіе это состоитъ въ покрываніи растеній снаружи (чаще всего также путемъ опрыскиванія), какъ это сказано, фунгисидами. Послѣдніе или убиваютъ споры болѣзнетворныхъ грибковъ до ихъ прорастанія, или въ моментъ ихъ прорастанія, а кромѣ того убиваютъ и самое тѣло грибка—мицелій.

Обыкновенно какъ фунгисиды, такъ и инсектисиды, употребляются каждый порознь, но бываютъ случаи соединенія фунгисида съ инсектисидомъ, при чемъ такою смѣсью борьба производится одновременно съ грибными заболѣваніями, и съ насѣкомыми.

Важнвише фунгисиды. Бордоская жидкость. Если не единственнымъ, то безусловно главнвишимъ фунгисидомъ является такъ называемая бордосская жидкость, представляющая собою водную смѣсь мѣднаго купороса и извести. Для растворовъ мѣднаго купороса и извести употребляются деревянные сосуды, т. е. кадки (чаще всего) или глиняные горшки, но ни въ какомъ случаѣ не цинковые или желѣзные. Впрочемъ, могутъ быть употреблены и желѣзные сосуды, но они должны быть эмалированными.

Для приготовленія бордоской жидкости потребляется только негашеная известь. Далье, растворы какъ мъднаго купороса, такъ и извести дълаются порознь, при чемъ известковое молоко обыкновенно вливается въ растворъ мъднаго купороса, но не наоборотъ. Чтобы скорве получить растворъ купороса, для этого употребляется кипятокъ, дающій концентрированные растворы, которые затъмъ надлежащимъ образомъ, т. е. согласно рецепту или должной пропорціи разбавляются. Бордоская жидкость нормальнаго состава содержить въ себъ 1,3% мъднаго купороса; для состава такой нормальной бордоской жидкости берется 6 фунт. вполит доброкачественнаго мъднаго купороса; 4 ф. негашеной извести и 17 вед. воды. Вся суть приготовленія бордоской жидкости заключается въ правильной надлежащей пропорціи входящихъ въ ея составъ мъднаго купороса и извести. Правильно составленная бордоская жидкость имъетъ красивую, свътлобирювовую окраску. При лъченіи растеній бордоскою жидкостью, она ежедневно приготовляется свъжею (обыкновенно раннимъ утромъ). Постоявшая бордосвая жидеость десть основно и для унотребленія не годится.

При составленіи бордоской жидкости, между прочимъ, слъдуетъ избъгать избытка мъднаго купороса. Этотъ избытокъ легко узнается опусканіемъ въ испытуемую бордоскую жидкость синей лакмусовой бумажки, которую можно достать въ каждой аптекъ. Погруженная въ испытуемый составъ синяя лакмусовая бумажка при избыткъ купороса краснъетъ, посинъніе же красной лакмусовой бумажки, опущенной въ жидкость, покажетъ избытокъ въ послъдней извести. Кромъ того, если въ испытуемую бордоскую жидкость опустить гладко-отполированный стальной предметъ, — перо, ножъ, гвоздь, то при избыткъ купороса сказанная отполированная поверхность покрывается мъднымъ налетомъ. При избыткъ въ бордоской жидкости извести надо сообразно надлежащей пропорціи состава прибавить купороса, а при избыткъ послъдняго поступить наоборотъ.

При покупкъ извести необходимо обращать особое вниманіе на ея доброкачественность. Слъдуетъ брать только комковую (въ кускахъ) негашеную известь, а не такъ называемую распушенку, погасившуюся сама собой отъ свободнаго доступа къ ней воздуха. Доброкачественная негашеная известь легко узнается потому, что такая известь энергично поглощаетъ воду и шипитъ при соприкосновеніи съ послъдней.

Опрыскивание бордоской жидкостью примъняется противъ различныхъ болъзней, но главнымъ образомъ противъ, такъ называемой, парши или росы на яблокахъ и грушахъ, причиняемой грибкомъ Fusicladium dendriticum. Парша или роса, производящая на яблокахъ и грушахъ извъстныя черныя пятна если противъ нея не принимать никакихъ мъръ, получаетъ сильное распространение въ саду и, наоборотъ, начинаетъ исчезать при регулярномъ опрыскивании деревьевъ бордоской жидкостью. При борьбъ съ паршею или росою первое опрыскивание дълается, когда почки только что тронутся въ ростъ, и должно быть закончено еще до цвътения деревьевъ. За этимъ первымъ опрыскиваниемъ слъдуетъ второе по отцвътении деревьевъ, когда съ цвътовъ спадутъ всъ лепестки. Этими двумя опрыскиваниями обыкновенно и ограничиваются, но при сильномъ развити парши черезъ двъ недъли производятъ еще повторныя опрыскивания.

Въ настоящее время въ продажѣ имѣется составъ сухой бордоской жидкости, подъ названіемъ лавуринъ; составъ этотъ быстро растворяется въ водѣ и дѣйствуетъ какъ бордоская жидкость. Цѣна лазурина на фабрикѣ около $4^1/_2$ р. пудъ. Вообще же однократное опрыскиваніе одной взрослой яблони или груши бордоской жидкостью стоитъ около $3^1/_2$ коп.

Известново-сперная жидкость. Для этой смъси берутъ по равной части, — по 5 ф. сърнаго цвъта и негашеной извести. Послъднюю гасятъ небольшими частями воды, при чемъ подмъшиваютъ стольно же, т. в. 5 фунт. сърнаго цвъта, который хорошо

смѣшиваютъ съ погашеной известью. Путемъ сказаной смѣси получаемая такимъ образомъ тѣстообразная масса затѣмъ разбавляется 11 ведрами воды. Известково сѣрная жидкость употребляется противъ мучной росы на яблони, персикахъ, а также и противъ сферотеки на крыжовникѣ. Опрыскиваніе этой жидкостью производится нѣсколько разъ въ лѣто и послѣ развитія листьевъ. Стоимость ведра известково сѣрной жидкости около $1^1/2$ коп.

Калифорнская смъсъ, Калифорнская смѣсь, представляя собою измѣненную прибавкой соли вышеупомянутую известковосѣрную жидкость, иначе можетъ быть названа известковосърной жидкостью и употребляется противъ грибныхъ заболѣваній, какъ, напр., мучной росы на крыжовникѣ, курчавости листьевъ у персика и пр. Но вмѣстѣ съ тѣмъ калифорнская смѣсь представляеть собою и инсектисидъ, такъ какъ употребляется противъ нѣкоторыхъ насѣкомыхъ, какъ, напр., противъ щитовыхъ тлей или червецовъ на плодовыхъ деревьяхъ. Калифорнская смѣсь составляется изъ сѣрнаго цвѣта въ количествѣ 10 ф., такого же количества негашеной извести и поваренной соли въ количествѣ 2 ф.; эти составныя части разводятся въ 8 вед. воды.

При приготовленіи калифорнской смѣси, сперва гасится известь нѣкоторымъ количествомъ воды, при чемъ во время гашенія къ извести исподволь прибавляется сѣрный цвѣтъ. Къ полученной смѣси грибавляютъ для разжиженія нѣкоторое количество воды и при помѣшиваніи кипятятъ смѣсь въ теченіе нѣсколькихъ часовъ. Затѣмъ приготовляется растворъ соли, который медленно приливаютъ къ кипящей смѣси и кипятятъ еще въ теченіе часа или двухъ. Затѣмъ полученную смѣсь разбавляютъ такимъ количествомъ воды, чтобы послѣдней было всего 7 ведеръ. Для примѣненія въ дѣло калифорнская жидкость берется свѣжеприготовленною, при чемъ опрыскиваніе ею производится весною или въ концѣ зимы, т. е. когда деревья находятся въ обезлиственномъ состояніи. Стоимость ведра калифорнской смѣси около 2 коп.

Полисульфидъ. Легко растворяющіеся въ водѣ полисульфиды, продаваемые также готовыми, представляютъ собою многосѣрнистыя натріевыя соединенія, съ содержаніемъ сѣры до 40°/о. Обыкновенно употребляется полупроцентный водный растворъ полисульфида, при каковомъ растворѣ на 10 ведеръ воды берется 1¹/2 фунта полисульфида. Весьма рекомендуютъ смѣсь полисульфида съ мѣднымъ купоросомъ, при чемъ къ полупроцентному раствору полисульфида въ 10 ведрахъ воды прибавляютъ также 1¹/2 фунта мѣднаго купороса. Эта смѣсь полисульфида съ мѣднымъ купоросомъ не только замѣняетъ вышеописанную бордоскую жидкость, но и является отличнымъ средствомъ противъ мучнистыхъ грибковъ, почему особенно и рекомендуется въ боръбѣ съ мучнистымъ грибковъ (сферотека) крыжовника. При борьбѣ съ

сферотекой производять 4-хъ-кратное опрыскиваніе, но разнаго состава. Первое опрыскиваніе производится полупроцентнымъ растворомъ, а послѣдующія, производимыя съ двухнедѣльными промежутками, производятся уже четверть процентнымъ растворомъ, при которомъ, слѣдовательно, на 10 ведеръ воды берется $^3/_4$ ф. нолисульфида и столько же мѣднаго купороса. Между прочимъ, въ борьбѣ этими растворами со сферотекой крыжовника избѣгаютъ солнечныхъ полуденныхъ часовъ. Вообще же растворы полисульфидовъ безъ купороса примѣняются преимущественно противъ мучнистыхъ грибковъ, какъ, напр., противъ мучной росы на яблоняхъ, персикахъ и другихъ растеніяхъ.

Главнъйшіе инсектисиды. Парижская зелень. Парижская зелень (называемая также Швейнфуртской зеленью) представляеть собой двойную уксусновислую соль мышьяка и мъди и, являясь наиболье важнымъ и распространеннымъ инсектисидомъ, имбетъ видъ тонкаго порошка, красиваго изумруднаго, яркозеленаго цвъта. Парижская зелень заключаетъ въ себъ около 50%, т. е. около половины мышьяка, почему является веществемъ, очень ядовитымъ, требующимъ при обращении съ нею извъстной осторожности. Для опрыскиванія на 50-80 ведеръ воды берутъ фунть парижской зелени. По причинъ значительнаго содержанія въ себъ мышьяка парижская зелень съ цёлью опрыскиванія всегда употребляется въ равной мъръ съ негашеной известью, которая умъряетъ ея ъдкія свойства. Поэтому, при разведеніи 1 фунта парижской зелени въ 40-80 ведрахъ воды, къ последней примешивается также и фунтъ негашеной извести. На одно же ведро воды парижской зелени берется 1—11/, золотника и столько же негашеной извести.

Такъ какъ смъшанная съ водою парижская зелень въ послъдней не растворяется, а только остается въ водъ въ болъе или менъе взмученномъ состояніи, то для того, чтобы парижская зелень при опрыскиваніи все время распреділялась по всему объему жидкости совершенно равномърно, воду съ парижской зеленью во время опрыскиванія безпрерывно пом'єшивають палкой, т. е. взмучивають. Непрерывное и вибств съ твиъ внимательное взмучиваніе во время опрыскиванія очень важно, потому что въ противномъ случай вмисто пользы, можно принести чрезвычайный вредъ. Посладнее произойдеть, если всладствие отсутствия непрерывнаго взмучиванія парижская зелень станеть давать на днъ сосуда осадокъ. Въ этомъ случат непремънно при опрыскивании раньше или позже будетъ выходить изъ опрыскивателя смёсь со слишкомъ большой дозой парижской зелени съ водою, которая обожжетъ листья дерева, и последнее будетъ испорчено. Впрочемъ нъкоторые опрыскиватели, какъ напр. нижеупоминаемая «Помона», для безпрерывнаго взмучиванія парижской зелени им'єють въ ихъ

ревервуарахъ особыя приспособленія,—автоматически двигающіяся мѣшалки.

Опрыскиваніе парижской зеленью примѣняется противъ грызущихъ насѣкомыхъ,—гусеницъ яблоневой моли, боярышницы, а также противъ гусеницъ, плодожорки, различныхъ жучковъ листоѣдовъ и др. Опрыскиваніе парижской зеленью избѣгаютъ производить во время цвѣтенія деревневъ, чтобы не отравить пчелъ. Чаще всего опрыскиваніе парижской зеленью производится противъ яблоневой моли (майскаго червя) и плодожорки и имѣетъ мѣсто обыкновенно вслѣдъ по отпаденіи лепестковъ. Стоимость однократнаго опрыскиванія одного дерева среднихъ размѣровъ парижской зеленью около $1^1_{/2}$ коп.

На практикъ очень часто пользуются комбинированной смъсью парижской зелени съ бордоской жидкостью, каковая смъсь является превосходнымъ средствомъ борьбы какъ съ грибными вредителями такъ и со многими насъкомыми.

Квассія. Квассія въ продажѣ встрѣчается въ видѣ болѣе или менѣе мелкихъ опилокъ древесины одного тропическаго дерева Quassia атага. Впрочемъ въ борьбѣ съ насѣкомыми квассія употребляется чаще всего не одна, а въ смѣси съ зеленымъ мыломъ, при чемъ смѣсь эта приготовляется слѣдующимъ образомъ. Берется З фунта квассіи, кладется въ котелокъ или чугунокъ, заливается водой и кипятится часа 2, послѣ чего полученный отваръ сливается въ отдѣльную посуду. Затѣмъ въ бутылкѣ или двухъ бутылкахъ горячей воды распускается веленое мыло и прибавляется къ отвару квассіи. Эта состоящая изъ квассіи и зеленаго мыла основная смѣсь, при употребленіи, т. е. для опрыскиванія, разводится 8 ведрами воды.

Квассія употребляется для истребленія сосущихъ побѣги зеленыхъ и другихъ травяныхъ вшей, а также и медяницы.

Чаще всего опрыскивание этимъ инсектисидомъ приходится примънять въ питомникахъ. Ведро инсектисида обходится около 12 коп.

Керосиновая эмульсія. Для приготовленія этого инсектисида беруть воды 6 бутылокь, керосина 13 бутылокь и фунть твердаго мыла. Вода доводится до киптнія въ какомъ-либо огнеупорномъ сосудь, и тогда въ ней распускають измельченное на кусочки мыло. Когда мыло въ кипящей водъ распустится, въ сосудъ исполволь приливается керосинъ, послъ чего эту смъсь сильно мъшають или, пользуясь всасываніемъ и быстрымъ вытаскиваніемъ обратно въ сосудъ садоваго ширица, или, при отсутствіи послъдняго, взбивая до полнаго смъщенія проволочнымъ вънчикомъ, пока не получится однороднаго состава клейстероподобная жидкость, такъ называемая основная смъсь. Одна объемная часть этой основной смъси при опрыскиваніи разбавляется 10—15 объемными частями воды.

Въ настоящее время имъются спеціальные опрыскиватели «кероватеры», которые механически соединяють въ требуемой пропорціи

заключающіеся въ нихъ воду съ керосияомъ и такимъ образомъ дѣлаютъ излишнимъ вышеописанное приготовленіе керосиновой эмульсіч, которая употребляется при борьбѣ съ медяницей или листоблошкой, тлями и другими мягкотѣлыми насѣкомыми.

Въ настоящеее время химическимъ заводомъ А. Рублева въ беодосіи, Таврической г. выпущенъ особый составъ подъ названіемъ Скелсидъ (цѣна 2 р. 40 к. за пудъ), представляющій собою готовую эмульсію и замѣняющій керосиновую эмульсію и карболинеумъ.

Хлористый барій. Хлористый барій занимаєть довольно видное мѣсто среди инсектисидовь и въ въ плодоводствѣ употребляется главнымъ образомъ противъ мягкотѣлыхъ гусеницъ въ родѣ гусеницъ яблоневой моли. Хлористый барій хорошо и быстро растворяется въ водѣ, въ десяти ведрахъ которой при опрыскиваніи плодовыхъ деревьевъ растворяютъ 4¹/2 ф. хлористаго барія, а чтобы сообщить этому раствору линкость, на каждыя 10 ведеръ прибавляютъ бутылки полторы натоки или лотъ соды. Необходимо замѣтить, что полное дѣйствіе при опрыскиваніи хлористымъ баріемъ сказывается лишь въ сухую погоду, что и слѣдуетъ имѣть въ виду, если идутъ дожди. Стоимость опрыскиванія хлористымъ баріемъ одного взрослаго дерева около 10 коп., вслѣдствіе чего несмотря на хорошее дѣйствіе этого раствора хлористому барію, продающемуся около 4 руб. за пудъ, часто предпочитаютъ болѣе дешевое опрыскиваніе парижской зеленью.

Мышьяковистая известь. При пользованій мышьяковистою известью составляется сперва основная смёсь, приготовляемая сладующимъ образомъ. На ведро воды берутъ фунтъ обыкновеннаго бълаго мышьяку и 4 фунта кристаллической углекислой соды и подвергають эту смъсь кипяченію на огнъ въ теченіе приблизительно получаса, чтобы въ этомъ горячемъ или върнъе кипящемъ растворъ распустился мышьякъ, хотя бы нъкоторый его осадокъ въ видъ мути и оставался на днъ сосуда, въ который затъмъ доливають нъсколько кипятку или воды, чтобы первоначальное последней количество оставалось темъ же самымъ. Когда такимъ образомъ мышьякъ распустится, въ кипящую смфсь, не снимая ее съ огня, кладутъ нераспавшуюся въ порошокъ, только что передъ этимъ погашеную известь въ количествъ 4 фунтовъ и продолжають еще кипятить около часа или немного менте. Получаемая такимъ образомъ основная смѣсь при опрыскиваніи разведится 10—15 объемами воды. Мышьяковская известь употребляется противъ тёхъ же насёкомымъ, противъ которыхъ употребляется и парижская зелень, при чемъ этотъ инсектисидъ по стоимости опрыскиванія почти одинаковъ съ парижской зеленью.

Разведенный табачный экстракть. Въ прежнее время этотъ инсектисидъ приготовляли домашнимъ способомъ, вываривая листья махорки. Въ настоящее время пользуются гото-

вымъ уже, приготовленнымъ фабричнымъ способомъ экстрактомъ, отпускаемымъ спеціальнымъ заводомъ табачнаго экстракта А. И. Пастака въ Симферополѣ. Этотъ заводъ пудъ экстракта, крѣпостью въ 6%, продаетъ по 5 р. за ведро, которое при опрыскиваніи разводится въ 50 частяхъ (ведрахъ) воды, при чемъ къ нему прибавляется еще тогда на каждое ведро разведеннаго экстракта 1/4 ф. зеленаго мыла. Разведенный такимъ образомъ табачный экстрактъ примѣняется противъ травяныхъ вшей и голотѣлыхъ гусевицъ. Широкому примѣненію этого инсектисида, къ сожалѣнію, не можетъ не мѣшать нѣкоторая его дороговизна.

Опрыскиватели. Вышеприведенные составы, или инсектисиды и фунгисиды, служать для опрыскиванія деревьевь посред-




Рис. 129—130. Слѣва ординарный наконечникъ Вермореля; справа двухструйный наконечникъ Вермореля.

ствомъ уже упомянутыхъ особыхъ аппаратовъ, носящихъ названіе опрыскивателей. Въ борьбъ съ насѣкомыми составы, распыляемые или распрыскиваемые этими аппаратами, дѣйствуютъ на нихъ двояко. Составы эти или наносятся чаще всего на листья, при чемъ насѣкомыя, какъ уже было сказано, отравляются и погибаютъ, поѣдая послѣдніе, или эти ядовитые составы при опрыскиваніи ими падаютъ на самихъ насѣкомыхъ и уничтожаютъ этимъ самымъ. Точно также борьба ведется помощью

опрыскиванія и съ грибными бользнями, при чемъ деревья подвергаются опрыскиванію какъ въ обезлиственномъ состояніи, такъ и по

развитіи на деревьяхъ листьевъ.

Въ настоящее время опрыскивателей существуетъ много различныхъ системъ, и среди нихъ есть и болѣе сложные и дорогіе, и менъе сложные и небольшіе, --болъе дешевые. Всъ они представляють собою различной силы помпы или насосы, выбрасывающіе при дъйствіи ими направляемую на дерево черезъ рукавъ (изъ гутаперчи или другого матеріала) струю. Последняя, выходя изъ аппарата, разбивается на мельчайшія капли, благодаря чему примъняемые въ борьбъ съ вредителями жидкіе составы распредъляляются наиболье равномърно по защищаемымъ отъ вредителей растеніямъ. Такое разділеніе выходящей изъ опрыскивателя струи на мельчайшія брызги или капли достигается помощью особыхъ наконечниковъ, прикрѣпленныхъ къ концу дъйствующаго выбрасывающаго рукава, каковыхъ наконечниковъ существуетъ также нъсколько системъ, дающихъ очень мелкую пул веризацію или распылъ. Изъ этихъ наконечникокъ, составляющихъ самую существенную часть каждаго опрыскивателя, наибольшимъ распространеніемь пользуется наконечникъ «Верморель», который, какъ

это видно изъ рисунковъ 129 и 130, можетъ быть одиночнымъ или двойнымъ. Кромъ «Вермореля» имъются и др. наконечники.

По своимъ размѣрамъ и производительности, всѣ опрыскиватели (называемые также пульверизаторами) могутъ быть раздѣлены на три группы, а именно на опрыскиватели малой, средней и большой производительности. Первые при работѣ съ ними требуютъ 2 человѣкъ, вторые—человѣкъ 6 и третьи—человѣкъ 6—8. Опрыскиватели первой группы, какъ аппарагы мелкіе, могутъ быть названы переносными, вторая группа уже требуетъ постановки

на колесный ходъ, а третья группа, куда относятся наиболъе громоздкіе аппараты, требуетъ для передвиженія по саду животной тяги и постановки аппарата на платформу. Впрочемъ, эти наиболье дорогіе аппараты третьей группы (стоимость въ 150-500 руб. и дороже) находять примънение лишь въ очень большихъ хозяйствахъ, при чемъ даже у насъ, въ Крыму, въ наиболъе обширныхъ садахъ предпочитаютъ имъть вивсто одного опры-




Рис. 131—132. Опрыскиватели-гидропульты Гульда.

скивателя наибольшей производительности (т. е. третьей группы) нъсколько опрыскивателей средней производительности.

Несомнѣнно, что наибольшій спросъ существуєть на дешевые опрыскиватели первой группы, предназначенные для обслуживанія маленькихъ садовъ; по своей дешевизнѣ эти опрыскиватели особенно пригодны для крестьянскихъ садовъ. Изъ этихъ дешевыхъ опрыскивателей слѣдуєть особенно указать на гидропульты завода Гульда и К⁰ въ С. Америкѣ (The Gulds Manufacturing Co. N. Y. Seneca Falls. U. S. A.). Премьеръ № 561¹/₂ (Premier), рис. 131. Бордо № 1129 (Bordeaux) и др., рис. 132.

Этимъ дешевымъ опрыскивателямъ свойственны и недостатки, заключающіеся въ томъ, что они тяжеловаты въ работъ, но недостатки эти окупаются ихъ общедоступной цѣной 12—14 рублей, тѣмъ болѣе, что при всѣхъ своихъ недостаткахъ эти опрыскиватели сдѣланы прочно и даютъ удовлетворительные результаты.

Кстати сказать, на бывшемъ въ Симферополв въ 1908 году первомъ международномъ конкурст опрыскивателей изъ этихъ двухъ гидропультовъ удостоенъ награды былъ только «Премьеръ».

Съ самаго начала введенія въ практику опрыскиванія особеннымъ распространеніемъ стали пользоваться ранцевые опрыскиватели (надъваемые въ работъ на спину), каковымъ распространеніемъ эти опрыскиватели пользуются и теперь.

Однако, ранцевые опрыскиватели все же рекомендуются главнымъ образомъ для опрыскиванія низкорослыхъ растеній и кустарниковъ (напр., винограда, малины и пр.), гдѣ они являются не-



Рис. 133. Ранцевый опрыскиватель бр. Жульянъ.

замънимыми. Изъ этихъ ран. цевыхъ опрыскивателей особенно извъстенъ Эклеръ (Eclaire) вавода Вермореля во Франціи, стоимость коего 15 р. Изъ ранцевыхъ опрыскивателей на сказанномъ международномъ конкурст въ 1908 г. первой награды удостоенъ былъ ранцевый опрыскиватель бр. Жульянъ во Франціи, какъ за опрыскиватель низкаго давленія, выполненный изъ отличнаго матеріала и отличающійся весьма простой, доступной и остроумной конструкціей основныхъ частей, а также снабженный суще-

ственными усовершенствованіями. Цѣна опрыскивателю бр. Жульянъ 16 руб. Изъ ранцевыхъ опрыскивателей, которые можно также приспособить и для опрыскиванія болѣе высокихъ деревьевъ, можно указать на опрыскиватель «Эксцельзіоръ» (Excelsior) завода К. Платца въ Людвигсгафенѣ въ Германіи. Стоимость этого опрыскивателя со всѣми принадлежностями около 22 руб.

Къ сожалънію, нельзя не признать, что выбора по наиболье доступнымъ цънамъ прочныхъ, удобныхъ и продуктивныхъ опрыскивателей, спеціально предназначенныхъ для опрыскиванія высокихъ деревьевъ, пока еще не существуетъ, и потому изъ хорошихъ продуктивныхъ опрыскивателей мы сразу должны переходить къ опрыскивателямъ типа «Помона», изображеннымъ на рис. 134. Эти опрыскиватели приготовляются вышеупомянутымъ уже съверо-американскимъ заводомъ Гульда и у насъ пріобръли извъстность подъ общимъ именемъ «Помона», хотя среди нихъ различаютъ по размърамъ собственно «Помону» и «Фрюнталь», при чемъ «Помона» крупнъе «Фрюнталя». Аппараты «Помона» въ настоящее время являются самыми распространенными опрыскивателями въ крымскихъ садахъ, и мѣстные садовладѣльцы вполнѣ ими довольны. Болѣе обширные сады въ Крыму имѣютъ по нѣскольку экземпляровъ «Помоны» и иногда устанавливаютъ ихъ на колесный ходъ. Цѣна «Фрюиталя» 42 р., «Помоны» 45 р. безъ бочки.

Изъ опрыскивателей большой производительности можно упомянуть сильные, снабженные воздушнымъ колпакомъ, помпы завода Гульда «Адмиралъ» (цѣна 135 р.) и «Монархъ» (цѣна 115 р.). По своей тяжести и громоздкости эти приборы требуютъ животной

тяги на колесахъ. Въ С. Америкъ опрыскиватели большей производительности, сколько мнъ извъстно, пользуются большимъ распространеніемъ; у насъ же на упоминавшемся уже международномъ конкурсъ въ Симферополъ въ 1908 г. эти конные опрыскиватели дали малоудовлетворительные результаты.

Изъ опрыскивателей-кероватеровъ (названіе кероватеръ происходить отъ англійскихъ словъ кего — керосинъ и water — вода) можно указать на кероватеръ Сексессъ (Success) завода Деминга въ С. Америкъ (рис. 135) цѣною около 25 руб и боченочный кероватеръ




Рис. 134. Помона.

(№ 1187) завода Гульда цѣною безъ бочки 75 р. Однако, нельзя не упомянуть, что экспертная комиссія не разъ упоминавшагося выше перваго международнаго конкурса опрыскивателей въ Симферополъ въ 1908 г. не одобрила кероватеровъ и сочла необходимымъ указать на полную неудовлетворительность продающихся въ Россіи кероватеровъ (даже такой солидной фирмы, какъ Гульдъ и Ко), собранныхъ изъ плохихъ матерьяловъ и дающихъ неправильное смѣшеніе. Кероватеры имъютъ два резервуара - одинъ, большій, для воды, а другой, меньшій, для керосина (water-вода, oil-керосинъ, рис. 136). Кероватеры устроены такимъ образомъ, что при выходъ изъ аппарата струи керосина и воды смъшиваются между собою въ пропорціи отъ 5 до 25%, но соединение тъмъ совершените, чъмъ меньше пропорція. Какъ ни несовершенны эти кероватеры, однако, несмотря на всв ихъ недостатки, признано, что все-таки ими приходится работать въ техъ случаяхъ, где нужно много применять коросина, или, точнее, заменять въ большомъ количестве керосиновую эмульсію, обычное изготовление которой домашнимъ способомъ мѣшкотно.

Съ опрыскивателями, чтобы они не скоро портились и изнашивались, нужно не только обращаться бережно, но и держать ихъ постоянно въ безусловной чистотъ, промывая внутреннія ихъ части чистой водой послъ каждаго опрыскиванія. Въ особенности нужно приступать къ немедленной промывкъ чистой водой послъ опрыскиванія разъъдающими внутреннія части опрыскивателя мышьяковистыми соединеніями.

Способы борьбы съ насѣкомыми кромѣ опрыскиванія. Опрыскиваніе къ насѣкомымъ, живущимъ внутри частей

дерева (коробды, древоточцы) оказывается по полной своей безполезности вовсе непримънимымъ. Къ другимъ же насъкомымъ хотя опрыскиваніе и




Рис. 135. Пульверизаторъ-кероватеръ.



Рис. 136. Большой кероватеръ Гульда съ двумя рукавами.

примъняется съ большимъ или меньшимъ усиъхомъ, тъмъ не менье для усиъшной борьбы съ ними приходится наряду съ опрыскиваниемъ примънять и другия мъры, и къ числу именно такихъ насъкомыхъ принадлежитъ плодожорка.

Въ случаяхъ значительнаго размноженія гусеницъ бабочекъпяденицъ, особенно небольшой, травянозеленой гусеницы пяденицы-зимней, отлично помогаетъ опрыскиваніе парижской зеленью.
Но чтобы скорѣе избавиться отъ массоваго нашествія пяденицы,
наряду съ опрыскиваніемъ, отличною мѣрою борьбы являются
ловчія кольца изъ гусеничнаго клея. Эти ловчія кольца дѣлаются
изъ достаточно толстой, напр., сахарной бумаги и укрѣпляются
на стволѣ деревьевъ путемъ достаточно тугой подвязки бичевкой
внизу и вверху. Затѣмъ эти пояса намазываются гусеничнымъ

клеемъ, который для этого спеціально приготовляется и ввозится къ намъ изъ заграницы. Гусеничный клей можно достать на сел.хоз. складахъ. Агрохимическій заводъ А. Рублева въ Өеодосіи предлагаеть гуссничный клей зимній, не застывающій при довольно низкой температуръ, и весенній, не стекающій отъ жары. Тотъ и другой клей этотъ заводъ предлагаетъ въ 10 пудовыхъ боченкахъ по 2 р. 40 к. за пудъ. При нашествіи гусеницъ зимней пяденицы эти пояса наносятся на дерево и смазываются клеемъ при наступленіи зимы, въ средней Россіи съ 15 октября или нісколько ранъе, а въ Крыму, напр., съ 10 ноября. Въ это время изъ окуклившихся въ землъ гусеницъ пяденицы выходятъ ихъ безкрылыя самки, которыя по выходъ изъ кокона и спарившись съ самцами взбираются по стволу на дерево для откладки яичекъ. Наложенныя на стволъ липкія кольца всёхъ ихъ заперживають. такъ какъ взбирающіяся наверхъ по стволу безкрылыя самки прилипають къ ловчимъ кольцамъ. Последние въ это время почаше осматриваются, очищаются отъ пристающихъ къ нимъ самокъ, при чемъ въ случав надобности клей на кольцахъ возобновляется новой обмазкой. Ловчія кольца не должны быть уже 3 вершковъ; если же приходится бороться съ болъе крупной пяденицей-обдираломъ, то кольца нужно делать не мене 4 вершковъ ширины, такъ какъ болъе крупныя безкрылыя самки этой бабочки могутъ при недостаточно широкомъ кольцъ перепрыгивать черезъ послъднее.

Кромъ того, весьма полезными въ борьбъ съ нъкоторыми мелкими насъкомыми являются такія липкія кольца, наносимыя на стволы дерева раннею весною, когда они взбираются на дерево, просыпаясь отъ зимней спячки. Точно также, несомнинную пользу оказывають приствольныя довчія кольца изъ крашеной жести или изъ цемента. Такія кольца представляють собою резервуары, наполняемые послъ опоясыванія ими ствола при земль керосиномъ съ водою. Эти кольца, если они сделаны изъ цемента, состеять изъ двухъ половинокъ, которыя скръпляются (спанваются) между собою воедино цементной же кашицей, а жестяныя или жельзныя кольца закръпляются иначе. Съ внъшней стороны эти кольца, когда будуть украплены при ствола на земла, присыпаются землею, чтобы направляющіяся на дерево насъкомыя не миновали заключающихся въ кольцъ керосина съ водою, и не пробирались къ стволу, подползая по землъ подъ кольцемъ. Тамъ, гдъ приходится вести борьбу съ непарнымъ шелкопрядомъ, съ нимъ борются смазываніемъ керосиномъ кучекъ его яичекъ, которыя эта бабочка имъетъ обыкновеніе откладывать невысоко отъ вемли на стволь. Разъ ознакомившемуся съ этими кучками янчекъ непарнаго шелкопряда отыскать ихъ нетрудно. Для болье скораго уничтоженія яичекъ непарнаго шелкопряда помощью керосина (безъ воды) въ настоящее время особенно рекомендуется такъ называемая лейка Галя.

Наши яблони, (а также и груши) обыкновенно очень сильно страдають отъ червоточины, т. е. гусенинъ бабочки плоложорки, Гусеницы плодожорки сплошь и рядомъ портятъ такъ яблоки, что неръдко большая часть урожая полжна итти въ бракъ. Поэтому, плодоводы принуждены вести особенно энергичную борьбу съ этимъ вреднъйшимъ насъкомымъ и не допускать развитія плодожорки у себя въ саду. Одной изъ дъйствительныхъ мъръ уничтоженія плодожорки являются ловчіе пояса изъ ваты или превесной шерсти. Ватные пояса будуть особенно умъстны въ южной половинъ Россіи, гдъ лътомъ и раннею осенью дожди не бываютъ частыми, и гдъ, вслъдствіе этого, вата булеть сохранять свойственную ей первоначальную рыхлость. Эти ловчіе пояса изъ ваты и древесной шерсти могуть быть наносимы какъ на стволы, такъ и на главные сучья дерева въ теченіе второй половины літа и съ начала осени. Какъ только будутъ нанесены на дерево эти пояса. подъ нихъ не замедлятъ собраться для окукливанія выводящіяся изъ плодовъ гусеницы плодожорки. Пояса эти тогда следуетъ почаще развязывать и осматривать, уничтожая тотчасъ собравшихся подъ нихъ гусеницъ, изъ коихъ нередко многія уже начинають здёсь коконироваться.

Ведя энергичную борьбу съ плодожоркой, необходимо убирать изъ сада червивыя опавшія яблоки, чтобы не дать выйти на волю находящимся въ нихъ гусеницамъ и превратиться потомъ въ бабочку. Точно также нужно наблюдать какъ за плодами, внесенными для зимняго храненія въ плодохранилище, такъ и за самимъ внутреннимъ помъщениемъ послъдняго. Въ немъ часто можно найти во множествъ живыхъ маленькихъ съренькихъ бабочевъ плодожорки. Въ данномъ случав нужно принять всв мъры къ тому, чтобы бабочки эти не были выпущены на волю изъ плодохранилища, а были немедленно забсь уничтожены. Борьба же съ плодожоркой тъмъ труднъе, что оканчивается желанной и полной побъдой только въ томъ случав, если и всв сосвди садоводы станутъ вести такую же энергичную борьбу съ этимъ вредителемъ, иначе бабочки начнутъ прилетать изъчужихъ садовъ. Впрочемъ, то же самое, къ сожалвнію, нужно сказать и относительно многихъ другихъ насъкомыхъ.

Возвратимся, однако, опять къ довчимъ поясамъ и именно, прикръпляемымъ къ деревьямъ осенью,—въ концъ осенняго рабочато сезона. Въ тъхъ садахъ, гдъ ведется энергичная борьба съ вредными насъкомыми, въ это время приступаютъ къ нанесенію на стволы деревьевъ поясовъ-пучковъ, состоящихъ ивъ прямой соломы (старновки, камыша, тростника и тому подобного матеріала), который наръзывается или върнъе, нарубается пучками вершковъ 8—10 длиною. Такими пучками стволъ каждаго дерева равно- и въ срединъ пучка при-

тягивается къ стводу достаточно тугимъ обвязываніемъ крѣнкой бичевкой. Такіе пояса-пучки представляеть собою для ищущихъ защиты отъ предстоящихъ зимняхъ холодовъ отличныя убъжища ло весны, въ которыя и начнутъ забираться въ силу своего инстинкта различныя вредныя насъкомыя. Эти пояса наносятся на деревья съ такимъ разсчетомъ, чтобы они, по крайней мере въ первую половину зимы, - передъ Рождествомъ или вскоръ послъ Новаго года были бы уже убраны, для чего рабочіе отправляются въ садъ на саняхъ, снимаютъ съ деревьевъ эти пояса и, бросая ихъ въ сани, собираютъ ихъ всъ вмъстъ и затъмъ сжигаютъ. Всякому понятно, что такимъ образомъ уничтожается масса вредныхъ насъкомыхъ, которыя иначе, оживши весною, принялись бы немедленно плодиться. Поэтому наложение такихъ ловчихъ поясовъ и зимнихъ убъжищъ несомнънно поведетъ къ замътному освобожденію сада отъ массы вредныхъ насѣкомыхъ, если будетъ аккуратно выполняться до техъ поръ, пока въ такихъ поясахъ минуетъ налобность.

Во многихъ мъстностяхъ, особенно съ сухимъ, знойнымъ лътомъ, плодовымъ деревьямъ сильно вредятъ маленькіе жучки-коровды (Scolytus'ы). Послъдніе, однако, нападаютъ на взрослыя деревья, избъгая деревьевъ полносочныхъ, молодыхъ, со здоровою, гладкою корою и особенно поражаютъ деревья старыя, съ слабымъ приростомъ кроны. Присутствіе на деревьяхъ коровдовъ легко узнать по такъ называемымъ летнымъ отверстіямъ, —круглымъ дырочкамъ въ корф деревьвъ и сучьевъ, чревъ которыя жучки вылетаютъ

наружу.

Тъ мъры, которыя предлагались въ печати противъ коровдовъ, служащихъ для ихъ отвлеченія отъ нападенія на здоровыя деревья, по моему мнѣнію, не выдерживаютъ никакой критики, и потому я могу предложить только одну,—очень сильное и энергичное моложеніе коры, съ полнымъ удаленіемъ всѣхъ пораженныхъ частей и съ немедленной обмазкой въ значительной (иногда даже и въ очень сильной) степени оголенныхъ отъ коры ствола и главныхъ сучьевъ. Въ случаъ сильнаго нападенія коровдовъ на деревья это энергичное моложеніе производится слѣд. образомъ.

У пораженнаго коровдомъ дерева со ствола и главныхъ сучьевъ сръзается почти вся кора до древесины, при чемъ стараются не трогать древесины, хотя легкое пораненіе или тонкій сръзъ ея, производимый рабочимъ то въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ, не вредитъ особенно дереву. Кора на сильно пораженныхъ коровдомъ деревьяхъ сръзывается почти сплошь вся, съ оставленіемъ лишь тонкихъ прожилокъ. Сниманіе коры начинается сийзу и постепенно идетъ вверхъ. Для этой работы обыкновенно употребляются подставляемые къ дереву козлы, безъ которыхъ невозможно было бы производить сръзываніе коры по всему дереву.

Проръзывание коры по всему дереву производится съ тою цълью, чтобы, съ одной стороны, сдёлать невозможнымъ просмотръ мёстъ, пораженных в коробломъ, а, съ другой стороны, для того, чтобы тъмъ самымъ обмолодить кору и вызвать сюда приливъ соковъ, что и служить главной защитой отъ коробдовъ. На большихъ старыхъ деревьяхъ съ загрубълою, сильно потр скавшейся корою было бы не только трудно, но даже и невозможно отыскать всв тронутыя коробдомъ мъста; обыкновенно такія деревья бываютъ сплошь устяны по стволу и сучьямъ ходами коротдовъ, поэтому то для избавленія отъ нихъ и приходится производить сръзку коры по всему дереву. Сръзывание всей твердой коры съ оставлениемъ только лишь тонкихъ ея прожилокъ приходится практиковать на сильно пораженныхъ и старыхъ деревьяхъ; на молодыхъ же деревьяхъ съ относительно тонкою корою можно ограничиться сръзкой коры и очисткой только мъсть пораженій, но обыкновенно въ садахъ старыхъ и запущенныхъ приходится прибъгать къ сильной сплошной съ прожилками срезкъ коры.

Такимъ моложеніемъ коры не только съ полнымъ, но и съ выдающимся успъхомъ борьба съ коробдомъ ведется въ общирныхъ извъстныхъ Лазаревскихъ садахъ Д. П. Алферова въ Корочанскомъ убздъ, Курской губерніи, гдъ исполняющіе эту работу садовые рабочіе начинають сръзку коры на деревьяхъ съ какогонибудь одного конца сада и проходять такимъ образомъ всв ряды деревьевъ. При сръзкъ коры надъ однимъ деревомъ обыкновенно манипулирують двое рабочихъ, работая съ двухъ противуположныхъ сторонъ и приставляя козлы съ одной и другой стороны дерева. Операція сръзыванія коры производится въ первой половинъ лъта, и чъмъ раньше къ ней приступить, тъмъ лучше, потому что тогда изъ оставленныхъ на деревъ не тронутыхъ ножемъ прожилокъ коры ранве начнется образование новой коры, которою въ свою очередь ранъе начнетъ заплываться обнаженная ножемъ древесина. Всъ сръзанныя въ борьбъ съ коробдомъ кора и части дерева тщательно собираются и немедленно сжигаются. Непривычному глазу бываеть странно смотрать на дерево, бълъющее обнаженной древесиной, на которой виднъются только оставшіяся прожилки коры и всякому невидавшему такой операціи, кажется, что дерево по снятіи ножемъ, если не всей коры, то весьма значительной ея части, должно неминуемо погибнуть, но именно такое сильное обмоложивание коры и спасаетъ жизнь дереву, обреченному на медленную, но върную гибель отъ нападенія цълыхъ полчицъ коробдовъ. Какъ только съ дерева кора сръзана, приступаютъ къ обмазкъ дерева довольно густымъ растворомъ глины, дабы обнаженному дереву дать защитный слой отъ солнца и воздуха. Съ весны второго года на обработанномъ такимъ образомъ деревъ начинается возобновление коры изъ оставщихся прожилокъ, а съ

весны третьяго года дерево зарастаетъ новой корой и уже въ концѣ этого третьяго года кора на деревѣ становится гладкою, получая вполнѣ свѣжій здоровый видъ, обыкновенно немолодымъ уже деревьямъ не свойственный. Описанное очень сильное моложеніе, производимое въ широкомъ масштабѣ въ Лазаревскихъ садахъ, примѣняется исключительно къ яблонямъ. Но, какъ свидѣтельствуетъ г. Костаревъ, такое обмолаживаніе г. Костаревымъ съ полнымъ успѣхомъ примѣнялось въ Сочи противъ короѣдовъ на сливахъ.

Считая ецинственно цёлесообразнымъ вышеописанный способъ моложенія коры при сильномъ нападеніи короёдовъ, я подчеркиваю, что способъ этотъ можно смёло рекомендовать лишь въ мёстностяхъ не сёвернёе Курской губ., или болёе или менёе по климатическимъ условіямъ съ ней сходнымъ. Во многихъ же мёстностяхъ средней Россіи такое моложеніе коры не испытано, поэтому, здёсь, если его и можно рекомендовать, то сперва лишь для пробы. Тъмъ болёе въ отношеніи сильнаго моложенія коры нужно быть осторожнымъ въ сёверной Россіи, гдё лёто коротко, и гдё вслёдствіе этого затягиваніе обнаженныхъ частей древесины и коры становится болёе затруднительнымъ. Впрочемъ, слёдуетъ сказать, что, сколько мнё извёстно, въ болёе сёверныхъ мёстностяхъ у насъ жалобъ на вредъ и распространеніе короёда въ плодовыхъ садахъ

слышать до сихъ поръ мнв не приходилось.

Обратимся теперь къ другой механической мъръ, а именно къ стряхиванію насъкомыхъ съ плодовыхъ деревьевъ. Несмотря на всю простоту и какъ бы на примитивность этой мфры, стряхивание является единственнымъ до сихъ поръ пріемомъ борьбы, съ упорно отстаивающимъ свое засилье въ садахъ, маленькимъ долгоносикомъяблоневымъ цвътобдомъ, личинка котораго весною является причиной порчи множества цвътовъ и связанной съ этимъ гибели урожая. По крайней мъръ, до сихъ поръ какъ практики, такъ и теоретики, не расходились во мнжніяхъ, что стряхиваніе-единственное наиболье дъйствительное средство противъ многихъ долгоносиковъ и, въ особенности, яблоневаго цвътоъда. Къ борьбъ съ последнимъ вредителемъ обыкновенно приступаютъ весною, какъ только станетъ тепло, когда, покинувъ свои зимнія убѣжища, жучки появятся на деревьяхъ, за чёмъ приходится зорко наблюдать. Какъ только жучки весною появятся, ихъ начинаютъ отряхивать съ деревьевъ. Небольшія молодыя деревца можно трясти просто рукою, на взрослыя же деревья (яблони) приходится забираться по лъстницъ человъку и, стоя между вътвей, трясти сучья дерева внезапными порывами. Ловля долгоносиковъ - цвътобдовъ помощью стряхиванія основана на томъ, что пугливыя по природъ, эти насъкомыя, почувствовавъ сотрясеніе, сейчась же падають на землю, чтобы тамъ укрыться Поэтому, до сотрясенія дерева, почва подъ послёднимъ застилается двумя (или большимъ числомъ, смотря по объему дерева) полотнищами

холста или парусины, на которую и падаютъ жуки. Все, что упадетъ на подостланныя холстины, тщательно собирается и сыплется въ ведро, на дно котораго налито нѣсколько керосина. Затѣмъ содержимое ведра можетъ быгь сожжено. Стряхиваніе производятъ въ утренніе безвѣтренные часы, когда жучки малоподвижны и при паденіи съ дерева не относятся въ сторону вѣтромъ.

Не противъ одного только яблоневаго цвътоъда примъняется эта мъра борьбы. Стряхиваніе по утрамъ съ деревьевъ примъняется также и противъ ужаснаго бича южно русскаго плодоводстваоденовъ вловонной и особенно мохнатой (Oxythyrea stictica и Троpinota hirta). Эти жуки, появляясь въ южной Россіи какъ разъ ко времени цвътенія плодовыхъ деревьевъ, съ жадностью набрасываются на последнія, такъ что объ урожать не приходится и думать. Стряхиваніе раннихъ утромъ жуковъ-оленокъ съ деревьевъ рекомендуется, какъ одна изъ мъръ истребленія. Но вообще противъ оленки, къ сожалѣнію, дъйствительно радикальныхъ средствъ еще не найдено, и среди мъръ противъ нея между прочимъ рекомендуютъ разведение въ садахъ сильно дымящихъ костровъ, чтобы относить налетающую въ садъ извит оленку. Но такъ какъ вредъ оленки устранить вообще очень трудно, то среди морь борьбы съ нею заслуживаетъ вниманіе и покрытіе или закутываніе цвътущихъ деревьевъ марлей, оставляя свободными отъ марли лишь однѣ верхушки кронъ. Какъ ни странною можетъ казаться съ перваго взгляда эта мъра, но, принимая во внимание вообще отсутствие дъйствительныхъ средствъ борьбы съ оденкой, и окутывание кронъ марлею во время цвътенія деревьевъ можетъ имъть свою цъну.

Въ числъ мъръ борьбы съ такимъ упорнымъ, столь часто встръчающимся вредителемъ, какъ съ листовой блохой или медяницей на яблоняхъ и грушахъ (Psylla Mali и Psylla Pyri), уничтожающимъ столь часто въ садахъ урожан, И. И. Гайке было предложено окуриваніе деревьевъ табачнымъ дымомъ лътомъ, когда медяница становится взрослою и летаетъ. Именно въ этотъ періодъ табачный дымъ и дъйствуетъ губительно на медяницу. Въ Орловской губерніи, по указанію И. И. Гайке, этотъ періодъ бываеть съ половины мая до половины іюня, но въ другихъ мъстностяхъ этотъ періодъ можетъ приходиться на иное время. По указанію И. И. Гайке всего лучше и выгоднъе для окуриванія употреблять табачную пыль, которую можно достать у табачныхъ фабрикантовъ по 15-25 к. за пудъ. Пыль эту разсыпаютъ кучками между рядами яблонь по 4 -- 5 фунтовъ въ каждой кучкъ и приблизительно на 8-аршинномъ разстояній кучка отъ кучки по длинъ междурядія, при чемъ въ каждомъ междурядін (имѣющемъ 4 саж. ширины) кучки располагаются въ два ряда. Для того, чтобы табачная пыль лучше разгоралась, следуеть подкладывать несколько соломы или сухихъ щепокъ. Табачная пыль не горитъ, а только

тлъетъ. Зажигать кучи нужно вечеромъ при тихой погодъ, особенно послъ дождя, когда воздухъ влажный, тогда дымъ не поднимается кверху, а стелется по землъ. Отъ табачнаго дыма гибнетъ поголовно вся медяница. Описанное здъсь окуриваніе примънялось въ большихъ размърахъ въ садахъ Орл. губ. и давало хорошіе результаты.

Проще, дешевле и радикальное, по мнонію г-жи Рождественской («Плодоводство», 1913, стр. 136), съ медяницей бороться опыленіемъ деревьевъ самой табачной пылью. Маленькія деревья, товорить г-жа Рождественская, можно свободно обсыпать табачной пылью руками, при чемъ надо сильно бросать пыль снизу вверхъ, такъ какъ тля обычно находится кромъ побъговъ на нижней сторонв листьевъ, но г жв Рождественской приходилось такимъ же способомъ опыливать огромныя грушевыя деревья. Для этого ставились 5-аршинныя лъстницы, и люди, забравъ съ собою ведро табачной пыли, бросали ее на верхушку дерева, а нижнія вътки опыливались людьми съ земли. Тзкъ какъ въ Саратовской губерніи (гдв находится садъ г-жи Рождественской) вътеръ дуетъ, за ръдкими исключеніями, всю весну, то, чтобы онъ не сдувалъ пыль, деревья до опыленія опрыскивались водой изъ опрыскивателя. Тогда табачная пыль настолько прочно приставала къ листьямъ, что деревья оставались покрытыми ею более месяца, несмотря на то, что въ теченіе этого времени проходили дожди.

Въ моемъ саду, сообщаетъ г-жа Рождественская, растетъ много персидской сирени, и бронзовки зеленая, мохнатая и сфрая сильно нападають на ея цвъты, почему цвъты яблонь отъ нея совершенно избавлены. Въ Саратовской губерніи оленка и мохнатая бронзовка не производять такого опустошительнаго действія, какъ въ Крыму, но изъ того, что г-жъ Рождественской приходилось ежегодно наблюдать надъ дъйствіемъ табачной пыли на оленокъ и бронзовокъ, г-жа Рождественская полагаетъ, что табачная пыль могла бы принести пользу въ тъхъ мъстностяхъ, гдъ оленка и бронзовка наносять садамъ огромный вредъ, выбдая въ цвътахъ тычинки и пестики, такъ какъ эти вредители совершенно избъгаютъ садиться на опыленные табакомъ цвъты. Такъ какъ борьба съ оденкой, представляющей до сихъ поръ неотразимый бичъ плодоводства на югъ, довольно трудна, то указание относительно опудриванія цвущихъ деревьевъ табачной пылью во время лета оленки очень важно. Если только табачная пыль найдеть себъ широкое примънение въ борьбъ съ медяницей и оленкой, то въ болже обширныхъ садахъ придется обратиться при этомъ способъ борьбы къ спеціальнымъ аппаратамъ, т.-е. опылителямъ.

Нельзя отрицать накоторой пользы въ борьба съ зимующими на деревьяхъ въ коконахъ гусеницами посредствомъ, такъ наз. факеловъ. Посладние состоятъ изъ насаживаемой на достаточно длинный шестъ жестянки съ горлышкомъ, сквозь который пропу-

щенъ выходящій наружу фитиль. Въ жестянку наливается керосинъ и затѣмъ фитиль зажигается, послѣ чего такимъ приборомъ поджигаютъ оставшіяся на деревѣ зимою гусеничныя гнѣзда. Такіе факелы,—точнѣе служащія для этой цѣли жестянки съ фитилями, имѣются въ продажѣ, но могутъ быть изготовлены и домашними средствами.

Ворьба съ грызунами и итицами. Изъ животныхъ наибольшими вредителями въ плодоводствъ являются грызуны, особенно зайцы и мыши, противъ которыхъ предлагается много средствъ, изъ которыхъ дъйствительны далеко не всъ. Исключеніемъ въ данномъ случать будетъ, между прочимъ, вполнт надежная и цълесообразно устроенная, т.-е. достаточно высокая проволочная изгородь, чрезъ которую зайцамъ совершенно преграждается доступъ въ питомникъ или садъ.

Никакіе заборы, кром'я проволочныхъ, у насъ въ Россіи противъ зайцевъ не помогаютъ, потому что при нашихъ снъгахъ около деревянныхъ заборовъ наметаются зимою сугробы, черезъ которые зайдамъ очень легко попасть въ питомникъ и садъ. Другое дёло достаточной (приблизительно саженной) вышины проволочная изгородь. Черезъ нее снътъ будетъ легко проноситься и потому здёсь сугробовъ не будеть. Поэтому, чёмъ крупнее будуть отдёльныя клётки или петли, тёмъ лучше, конечно, по опредёленныхъ размъровъ, чтобы черезъ нихъ не могъ пройти заяцъ. Изгородь съ болже крупными петлями или клътками, будеть одновременно и дешевле. Между прочимъ, дорого стоящую металлическую сътчатую изгородь предлагали замънить веревочной съткой, вымоченной для большей прочности въ жельзномъ купорось. Такую сътку предлагали натягивать въ видъ сплошного забора осенью и снимать ее весной, когда опасность отъ зайцевъ прекратится. Но въ практику эта веревочная сътка не вошла, можетъ быть, всявдствіе понятнаго противъ нея предубъжденія въ томъ смысяв. что подобная сътка можетъ быть зайцами легко перегрызена. Однако, все же такая сътка достойна испытанія.

Дальнъйшія мъры защиты противъ зайцевъ состоятъ въ покрываніи штамбовъ и основанія кроны на зиму древесными вътвями или тому подобнымъ матеріаломъ. Для этого чаще всего употребляютъ наиболъе подходящія въ данномъ случать вътки хвойныхъ деревьевъ (такъ наз. лапки), ели, сосны или можжевельника. Гдт этого матеріала нтът, онъ замтняется камынемъ. Эти покрышки имтютъ на своей сторонт то безспорное преимущество, что помимо защиты отъ зайцевъ, защищаютъ стволы деревьевъ зимою и въ концт зимы отъ ожоговъ и морозобоинъ.

Необходимо отмѣтить, что мѣра эга примѣнима лишь въ плодовомъ саду, но не въ болѣе или менѣе обширномъ питомникѣ. Здѣсь предлагается немало мѣръ, изъ коихъ большинство сводится къ обмазыванію деревьевъ въ питомникъ вловонными веществами, размѣшанными въ глиняномъ известковомъ молокъ или растворъ, Изъ такихъ веществъ указываютъ на ассафетиду, нафталинъ, бычью желчь, калъ и проч. Лично автору извъстны случаи примѣненія съ этою цълью масла оленьяго рога. Имъющіе отвращеніе къ зловонному запаху, зайцы пахнущихъ этими веществами деревьевъ не трогаютъ. Однако, съ этимъ не всъ согласны, и потому не всъ признаютъ эти мъры вполнъ дъйствительными. Между прочимъ, совътуютъ смазывать деревья смъсью, содержащею въ себъ бульонъ изъ лисьей тушки. Зайцы такъ боятся лисицы, что не ръшаются подходить къ деревьямъ, смазаннымъ этимъ средствомъ.

М. С. Балабановъ предлагаетъ противъ зайцевъ слѣдующее средство. Берутъ конину или другое подобное негодное мясо и разбрасываютъ его въ саду для приманки по ночамъ собакъ, встрѣчи съ которыми такъ боятся зайцы. Еще лучше, по мнѣнію М. С. Балабанова, кусокъ или нѣсколько кусковъ падали привѣшивать на шестъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы собаки не могли достать этой приманки. Послѣдняя будетъ привлекать собакъ по ночамъ, но не будетъ ими по недосягаемости съѣдена. Чтобы собаки не теряли привычки искать падаль въ саду, для большаго ихъ привлеченія изрѣдка падаль вѣшаютъ пониже, чтобы собаки могли ею пользоваться. Такимъ образомъ, можно достичь того, что собаки будутъ въ саду охотиться за падалью всю зиму.

Наконецъ, въ качествъ отпугивающихъ мъръ противъ зайцевъ рекомендуютъ установку въ саду мельницъ трещетокъ, хотя эти мъры и не кажутся надежными, ибо голодныя зайды въ концъ-кондовъ привыкаютъ къ производимому трещетками шуму.

Какъ ни великъ бываетъ вредъ отъ зайцевъ, но все же отъ послъднихъ можно избавиться хотя бы надежной оградой. Гораздо труднъе бороться съ мышами, которыя бываютъ особенно страшны въ такъ наз. мышиные годы, когда они вдругъ въ силу какихъто внезапно возникающихъ причинъ, содъйствующихъ ихъ чрезмърному размноженію, появляются въ изумительномъ множествъ. Въ эти «мышиные годы» неръдко мыши появляются во множествъ уже съ осени, и уже это служитъ указаніемъ, что противъ мышей необходимо принять всъ имъющіяся въ рукахъ плодовода мъры.

Одною изъ мъръ предосторожности относительно мышей является содержание садовъ и питомниковъ въ чистотъ отъ сорныхъ травъ. Если въ саду межтурядія не держатъ подъ чернымъ паромъ, а ограничиваются только взрыхленіемъ почвы на поддревесныхъ кругахъ, то въ предупрежденіе вреда отъ мышей осенью преходится обращать особое вниманіе на то, чтобы на поддревесныхъ кругахъ не оставалось сорныхъ травъ. Дъло въ томъ, что осенью сорныя травы привлекаютъ мышей, которыя и собираются около послъднихъ въ поискахъ за ихъ съменами. Съ наступленіемъ же

зимы, когда сорныя травы мышамъ больше питанія не даютъ, мыши набрасываются на тутъ же находящіяся деревья. Объѣданіе мышами деревьевъ, находящихся тамъ, гдъ были осенью оставлены сорныя травы, особенно рельефно можно бываетъ наблюдать въ питомникахъ. Такъ какъ въ послѣднихъ во всѣхъ мѣстностяхъ безъ исключенія долженъ быть черный паръ, то на полное, абсолютное удаленіе на зиму сорныхъ травъ въ питомникахъ должно быть обращено особое вниманіе.

Старинное и вмѣстѣ съ тѣмъ достаточно вѣрное средство противъ мышей состоитъ въ томъ, что въ концѣ зимы, во время оттепелей какъ въ садахъ, такъ и въ питомникахъ, утаптываютъ около деревьевъ снѣгъ для того, чтобы надъ почвой при корневой шейкѣ создать ледяную кору. Утоптанный здѣсь снѣгъ по прошествіи оттепели не замедлитъ обратиться въ ледяную кору, которая и недопуститъ мышей пробираться къ корневой шейкѣ и основанію стволовъ, къ которымъ мыши пробираются подъ снѣгомъ.

Мыши представляють собою темь более опаснаго вредителя, что садовладълецъ можетъ подвергнуться ихъ массовому нашествію, такъ сказать, совершенно внезапно после многихъ латъ ихъ полнаго отсутствія. Въ этомъ случат садовладтлецъ, пріученный долгими годами къ отсутствію у него мышей, даже и не передвидить бъдствія, которое обыкновенно обрушивается на него внезапно. Имъя въ виду такія безотрадныя явленія, авторъ считаетъ нелишнимъ сообщить слъдующій фактъ, котораго быль недавно наблюдателемъ. Одинъ знакомый автору садовладълецъ заложилъ себъ очень общирный плодовый садъ на нъсколькихъ десяткахъ десятинъ. Прошло восемнаддать безмятежныхъ лѣтъ, и садъ успѣлъ уже вырасти настолько, что сталъ производить впечатлъніе взрослаго плодоваго насажденія. Вдругь весною девятнадцатаго года по заложеніи сада обнаруживается, что большая часть деревьевъ попорчена мышами, при чемъ у огромнаго количества деревьевъ кора събдена по всей окружности штамба, отчего эти деревья должны быть обречены на гибель, если къ нимъ не будетъ примънена прививка мостомъ. Но въдь такую прививку легко произвести надъ какимъ-нибудь десяткомъ-другимъ деревьевъ, а не надъ тысячами. Въ результатъ наблюдался страшнъйшій мышиный погромъ, отъ котораго да сохранитъ судьба всякаго садовладёльца. Авторъ нарочно подчеркиваетъ этотъ печальный примеръ, который у всякаго желающаго заложить плодовый садъ долженъ быть передъ глазами. Если по истечении нъсколькихъ лътъ по заложении сада садовладълецъ не испытывалъ болъе или менъе серьезнаго отъ мышей вреда, то онъ все равно не гарантированъ отъ ихъ нашествія въ будущемъ, и одинъ несчастный мышиный годъ можетъ повести къ несчастію и разгрому сада, а слъдовательно и къ раззоренію садовладъльца. Заложеніе плодоваго сада, вследствіе мышинаго нашествія, именно и иметт ту теневую сторону, что садовладелець должень ждать много леть результатовь своихь трудовь, и вдругь, накануне этого вознагражденія его постигаеть неслыханное несчастіе.

Авторъ, какъ свидътель такихъ несчастій, считаетъ долгомъ своимъ предостеречь читателей въ томъ смыслъ, что мышиные погромы бываютъ внезапны, подобно землетрясеніямъ, о существованіи коихъ люди склонны совершенно забывать.

Поэтому-то и необходимо всегда быть наготов и своевременно принимать противъ мышей мфры. Среди мфръ противъ мышей въ плодовомъ саду самою серьезною и вполнъ достигающею своей цъли является защита основаній ствода и корневой его шейки металлическими цинковыми сътками, предложенными для этой цъли К. И. Тихомировымъ. Цинковыя сътки К. И. Тихомирова состоятъ изъ мелкихъ колецъ, образующихъ кольчугу, и легко свертываются въ трубку или складываются въ нъсколько разъ. Поэтому ими очень легко обернуть основание штамба и корневую шейку, распространивъ эту броню противъ мышей нъсколько и на находящіеся у корневой шейки корни. Такимъ образомъ, тъ части дерева, которыя подвергаются ежегодно риску быть испорченными мышами, легко могутъ быть этими сътками вполнъ защищены. Сътки эти накладываются на деревья осенью, снимаются весною и могутъ служить, конечно, весьма многіе годы. Конечно, эти сътки будуть кое-что стоить; но всякому понятно, что гораздо лучше ими обзавестись и, примъняя ихъ, быть разъ навсегда вполнъ покойнымъ, чэмъ потерять заключающиеся въ саду результаты долголътнихъ заботъ и денежныхъ сбереженій.

Серьезную мъру истребленія мышей въ такіе годы является примъненіе бациллъ мышинаго тифа. Для этого, какъ извъстно, жидкость съ бациллами мышинаго тифа вводится въ тъсто, кусочки котораго осенью разбрасываются по мышинымъ норкамъ или вообще по слъдамъ по питомнику. Вызываемая примъненіемъ такой мъры эпидемія часто губитъ мышей, но за безусловный успъхъ этой мъры ручаться все-таки нельзя. Тъмъ не менъе по своей доступности и дешевизнъ эта мъра заслуживаетъ всяческаго вниманія.

Наконецъ, не безъ пользы противъ мышей могутъ быть при-

мъняемы отравы, капканы и т. д.

Сильно объжденныя мышами или зайдами деревья, а особенно такія, у которыхъ кора совершенно обглодана по всей окружности штамба, требуютъ для ихъ спасенія прививки мостомъ. Если же кора мъстами на штамбахъ сохранилась, то спасти деревья можно довольно просто. Необходимо лишь какъ можно скорѣе весною обчистить острымъ ножемъ раны и подровнять кору, послѣ чего обмазать поврежденныя мъста смѣсью глины съ коровякомъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

I. Общая часть.		
Яблоня. — Груша. — Айва. — Слива. — Персикъ. — Миндаль Кизилъ		CT1
Знакомство съ терминологіей и главнъйшими ботаническі особенностями плодовыхъ деревьевъ	ими	
II. Школа подвоевъ.		
		9
Полученіе и подготовка стмянъ къ поству		3
Зеленая пикировка		4
Выкопка и сортировка дичковъ		4 5
III. Питомникъ.		
Выборъ мъста, разбивка и подготовка кварталовъ питом	ни-	
ка къ засадкъ		
Выборъ дичковъ и посадка		5
Уходъ за дичками и обработка почвы		. 6
Облагораживаніе		5
Получение кронистыхъ деревьевъ въ три года		Ç
Выведеніе вишень		ç
Образован е второго этажа кроны дерева въ питомникъ.		6
Кустовая форма и выведеніе куста		. 10
Выкопка деревьевъ и ихъ упаковка		10
IV. Плодовый садъ.		
Быборъ мъста и устройство защиты		11
Разм'вры сада	3.57	. 11
Разстоянія между деревьями		. 11
Время посадки		. 11
Пріобрътеніе деревьевъ и сохраненіе ихъ до весны		12
Копка ямъ и посадка деревьевъ		12
Ръзка кронъ		15
Пересадка взрослыхъ деревьевъ		18
Обмолаживаніе и перепрививка деревьевъ		15
Удобреніе		. 14
Ухолъ за корою. Бороздованіе. Чистка коры	146	-14
Обмазка коры и обмываніе ея		15
Лъчение ранъ и морозобоинъ		. 15
Дальнъйшая обръзка кроны		. 15
Защита цвътовъ и плодовъ отъ мороза		. 1:
Подпора вътвей и сборъ урожая		15
V. Борьба съ вредителями.		
Важнъйшіе фунгисиды и инсектисиды	162	-16
Опрыскиватели		. 16
Способы борьбы съ насъкомыми, кромъ опрыскиванія		. 17
Ворьба съ грызунами		. 18

NPOBAH BEHHO-NINOCT

N = COUNTENIS

20 3.500 гран. фанцузских пистене заващее вы заначене на изгранет заначене заначене

HOMBCRAFO

OCADA

52 KHNFN 8.500 crpan.

ANDHALO

подписчиновъ

выбору

ПО

пюстрированный в ЕНІЯ: абонементь No

пРИЛОЖЕНІЯ:

БЕЗПЛАТНЫЯ

Neve

HA 1915

L KHMT B N TO B e npenaule - Ocrans Bohlapsyske, - KA-160PbbA 3A KPANOBS, - Jana csha. a ocomuch - Kymracs, sowins muromess. The company of t

Севые 30 рисунков, портовь и до севые 300 рисунков, портовь и до севые 30 рисунков, портовь и до севые 30 рисунковь при досунковь взложени, усему 6 рисунков рук шрокой бесторовые борчествую бот досунков трания усред мурила.

10 ЧЕТИ 601к предмета таковы гланыя чорты жундам. Всез. журы. «Природа и Лоди» подпичня цена измане для Всехую» 4 руб. се дост. и перес

É

Соймин

Открыта подписка на 1915 годъ (III-й г. изданія НА ЕЖЕКЪСЯЧНЫЙ ОБШЕЛОСТУПНЫЙ ЖУРНАЛЪ САМООБРАЗО

съ нартинами въ праскахъ, нартами.

Нать вът по справедливости называють въкомъ науки. Наука давно вышла изъ кабинетовъ ученыхъ. Идейная жизнь человъчества. все его духовное богатство, весь его многовъвовый опыть, исканія и стремленія лучшикь умовь выражаются главнымъ образомъ въ ли

чертежами и иллюстраціями въ тенств,

тературъ. Поэтону въ высшей степени важно. чтобы эта сокровищница была доступна воз можно большему числу лиць, чтобы кажтый легко и быстро могь самостоятельно разбираться вы ней и безъ труда заимствовать изъ нея все то, что отвъчало бы его запросамъ.

Энциклопедія знаній — программа журнала «Знаніе для Всёхь».

Строгая научность при деступн мъ изложения, небольшой объемъ при возможно широкой всесторонней обработкъ предмети.

Не переводы или передълки съ иностранныхъ языковъ, а труды выдающихся русскихъ ученыхъ, извъсти, писателе, и популяризаторовъ.

Въ журналъ "Знаніе для Всьхъ"

принимали и принимаютъ участие: В. К. Агафонова, проф. К. И. Арабажина, П. В. Быкова, К. Е. Вейгелина, проф. Б. П. Вейверга, проф. В. С. Грудева, проф. А. Н. Краснова, В. П. Лебедева, проф. Б. Н. Менычинския, пр. ф. А. М. Никольскій, проф. А. Л. Погодина, Я. И. Перельмана, проф. К. Д. И. кровскій, инж. В. В. Рюмина, прио-доц. В. Н. Сементовскій, К. К. Серебрякова, М. И. Сизови, О. О. Соколова, Э. А. Старка, В. В. Стратонова, А. Г. Ширлева, прив.-доц. К.З. Яцута.

Не подлежить сомнъню, что никакая шко-ла не можеть давать все, что нужно знать и повимать образованному человъку. Общее образованіе, даваемое среднею школою, не-дестаточно, а высшее образованіе об кно-венно спеціально. Только путемъ самостоя-тельнаго чтенія можно пріобръсти тъ филосефскія, научныя, яравственныя и историче-

скія воззр'внія, которыя необходимы для удовлетворенія запросовъ мысли, для выработки міросозерцанія.

Еще большее значение пріобрътаеть такое чтеніе для лицъ, не попавшихъ въ среднюю школу: для нихъ научно-популярныя книги журнала «Знаніе для Всвхъ» являются необходимымъ источником в образованія.

Журналъ печатается на бумагъ высокаго качества "атласъ", а многокрасочныя картины на мъловой бумагь. Каждая книга изобилуетъ рисунками, портретами, репродукціями съ фотографій и отд вльно вклеенными картинами 3-хъ цвътной печати. Книги большого формата, въ папковомъ переплеть. Красота, изящество и роскошь отличають "ЗНАНЕ для ВСБХЪ" стъ обычнаго типа иллюстрированныхъ журналовъ,

Періодическая печить дали единодушный om36665, umo журналь «ЗНАНІЕ для ВСБХБ» даеть разумное, полезное и влисти св тимв интересное и разнообразное чтеніе по всимь отраслямь значін, литературы и ивничных чежувства, а св внюшней стороны небывалов по роскоши.

Журналь «Знанів для Всъхъ» на основ. Высоч. повел. 2 дек. 1905 г. считается до-пущеннымь къ выпискъ въ безплати. народи. читальни и (ибліотеки.

годовые подписчики получатъ

Роскошно изданный АЛЬВОМЪ въ краскакъ

на журналъ съ дост. и перес. "ЗНАНІЕ для ЕСБХЪ"

ГЛАВНАЯ ИОНТОРА и РЕДАКЦІЯ журнала "ЗНАНІЕ для ВСБХЪ" № Петроградъ, Стремянная, 12, соб. домъ. Издатель П. П. Сойкинъ.

Тип. П. П. Сойкина.